

Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

38





IOANNIS
RIOLANI
38 FILII.

ORIGINE ET ORDINE PARISIENSIS,
DOCTORIS MEDICINÆ
IN ACADEMIA PARISIENSI,

Anatomes & Herbariæ Professoris Regij, atque Decani,

REGINÆ; MATRIS REGIS LVDOVICI XIII.
Primarij Medici per decennium, & postremi,

OPERA ANATOMICA

Vetera, recognita, & auctiora;

QVAM-PLVRA NOV

Quorum seriem dabit sequens pagina.

Bib. Med. Soc.



coll. An. Soc. Regia



LVTETIÆ PARISIORVM,
Sumptibus GASPARI METVRAS, viâ Iacobæ,
sub signo SS. Trinitatis, prope Maturinenses.

M. DC. XLIX.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

OPVSCVLA ANATOMICA
NOVA.

Quæ nunc primùm in lucem prodeunt.

*De motu Circulatorio sanguinis in Corde,
Noua Doctrina.*

*Accessere Notæ in Ioannis Vallæi duas
Epistolas de Circulatione sanguinis,*
Authore IOANNE RIOLANO,
Professorum Regionum Decano.

Eiusdem Animaduersiones

In Historiam Anatomicam Andreæ Laurentij.

In Theatrum Anatomicum Caspari Bauhini.

In Librum Anatomicum de Fabrica humana Andreæ Spiegelij.

Ad Institutiones Anatomicas Caspari Bartholini.

Ad Anatomica Caspari Hofmanni.

In Syntagma Anatomicum Ioannis Veslingij.

De Monstro nato Lutetiz.

In Tractatum de Diaphragmate Æmilij Parisani.



A D
LECTOREM
ANTIQUA
PRÆFATIO.

VETERI proverbio fertur, quam quisque norit
artem, in hac se exerceat, huicque à teneria assuesce-
re multum est. Nec enim omnibus idem placet vita
studium, & exercitij genus, nec singuli ad omnes ar-
tes capeendas apti & nati sunt, trahit sua quemque voluptas. Po-
lyclesus diis potius, quàm hominibus pingendis, præcla-
rus habebatur; Serapion Scenas optimè pinxit, sed Ho-
minem pingere non potuit: contrà Dionysius nihil aliud
quàm Homines pinxit, ob id Anispropographus cognomi-
natus, adeoque verum, quod scripsi Ptolomeus in Centilo-
quio, Anima ad rem aliquam apta, seipsa plus veri assequitur,
quàm qui diutissimè in illa se exercuerunt. Cum primis Medici-
na sacra initiarer, studium Anatomicum mihi tantopere placuit,
ut huic parti me totum addiderim atque consecravim, quam ar-
dentius excolui, & amplexus sum, cum liberalitate nostri Regi
Henrici Magni tunc maxime, Professione Anatomica Regia do-
natus, atque decoratus fus. Tum enim diligentius & accuratius
cæpi rebus Anatomicis incumbere, uti Spariam quam nactus e-
ram dignè sustinerem, atque exornarem. In eo studio tam alacri-
ter & strenuè vacavi, ut improbo & indefesso labore per trigin-
ta hyemes repetito, in cadaueribus plusquam centum propria ma-
nu dissectis, Anatomen docendo, & demonstrando, peritiam aliquam

adeptus, possum nunc *Anatomen* rectè profiteri, atque perfectè li-
 seris mandare, quantum potest humana industria, absit dicto inui-
 dia, parcatque mihi Nemesis. Nec mireris amplius, si post tot, tam-
 que egregios *Anatomicos*, ausim aliquid de re *Anatomica* commen-
 tari, & in lucem conspectumque hominum proferre, quasi *Recentio-
 rum* opera & industria tantum perfectionis fastigium sit adepta,
 ut posteris prærepta fuerit, noni aliquid inueniendi gloria. Forsan
 fastiditus ero, quod postremus succedam aliis, re iam confecta, &
 omnibus suis numeris absoluta. Theodorus, inquit *Aristoteles*,
 lib. 7. *Politic.* nullum unquam, ne contemptum quidem *Tragæ-
 dum* passus est ante se, in scenam prodire, quod existimaret spectan-
 tium aures, iis qua prima audiunt captas occupari, quod idem
 usu venit, & in omnibus colloquiis, & in rerum tractationibus.
 Nam que prima nobis offeruntur cuncta, sunt probatissima, quod
 desumptum ex *Hippocrate*, lib. 1. de *Dixta*. Multi nolunt
 credere, inquit, iis qui postremi dicunt, de aliqua matè-
 ria, tantum valet præiudicata opinio: quod si multa noua in
 singulis partibus profero, audacior in lucem conspectumque *Me-
 dicorum* prodibo. Fateor equidem omnia iam vulgata, & cui
 non dictus *Hylas*? ut est in proverbio, nihilominus, tentanda
 est via, qua me quoque possim

Tollere humo, victorque virum volitare per ora.

Priorum enim vestigia premere, & eadem inculcare ridiculum
 est: Nec probat *Galenus*, *Commentarium Anatomicum*, nisi no-
 ni aliquid contineat. Pigri est ingenij contentum esse iis,
 quæ sunt ab aliis inuenta, siquidem mentis acrimoniæ ni-
 hil non humanarum rerum subiicitur, ait *Quintilianus*.
Immensi sunt *Natura thesauri*, & inexplicabilis eius sapientia,
 ut qua de ea quotidie in lucem producuntur, viam præparent ad
 succedentia inuestiganda. *Galenus* lib. 10. de usu partium,
Natura solertiam in humani corporis fabrica tantam esse predicat,
 ut cum eam magni viri diligenter & assidue perscrutati sint, non
 omnem tamen inuenerint,

---restabit ventura quod ætas

Quærat, & ut studio se quondam exerceat isto.

Non omnia apud priores inuenta sunt, multa laudis & ar-

Lib. 1.
 administ.
 Anat. c. 1.

Tacitus l.
 3. annal.

tium posteris reliquere. Hac nobis certamina ex honesto manent.
Ac proinde agamus bonum patremfamilias, faciamus
ampliora quæ accepimus, maior ista hæreditas à nobis
ad posteros transeat. Quam multa animalia hoc primum
cognouimus sæculo, & quidem multa venientis æui po-
pulus ignota nobis sciet, multa sæculis tunc futuris, cum
memoria nostri exoleuerit reseruantur, pusilla res mun-
dus est, nisi quod quærat omnis mundus habeat: Non
semel quædam sacra traduntur, Eleusis seruat, quod
ostendat reuisentibus. Rerum Natura, sacra sua non
simul tradit, initiatos nos credimus, in vestibulo eius
hæremus, illa arcana non promiscuè, nec omnibus pa-
tent, reducta & in interiore sacrario clausa sunt, ex qui-
bus aliud hæc ætas, aliud quæ posterius subibit, adspi-
ciet.

Seneca e.
pist. 30.

Idem lib.
7. nat. q.
cap. 31.

Et quemadmodum in hoc maiore mundo subinde deteximus
motus calorum varios, demersas insulas, & novos penè orbes, no-
uas maculas in Sole, & Luna, noua sidera in celo, & nouum
mundum in Luna, si credimus nouis Vranoscopis, sic in hoc altero
mundo iuxta quod, in dies noua multa, recessus alios, & particu-
las veteribus ignotas nanciscimur, & obseruamus. Quodque mi-
rari subit, eodem tempore nouus Orbis terrarum detectus fuit, &
noui caelestium orbes reperti, quo Anatome intermortua, ac peni-
tus extincta, facta fuit rediuiua, diligentius exculta, multisque
inuentis amplificata à Mundino, Iacobo Carpo, quos passi-
bus aquis sequutus est Nicolaus Massa. Hic successores habuit
Syluium, Vesalium, Fallopium, Columbum, atque ma-
gnam iuniorum Anatomicorum cohortem. Ac sunt, si
verum fateri volumus, immensa est, ac supra quàm dici queat
ardua, partium humani corporis inuestigatio: atque haud scio, an
hodie quisquam reperiat, qui integram & undique absolutam
Anatomes cognitionem sibi iure vindicare possit, aut debeat. Nam
multa sunt in corpore, quorum vim rationemque per-
spicere nemo, nisi qui fecit, potest, ait Lactantius, li-
bro de opificio Dei, capite decimo quarto. Hæc est utilitas
occultorum operum Dei, ne propterea vilescant, ne

Ex D. Au-
gust. hb.
6. c. 4. cō-
tra Iulianum.

Ecclesiā-
stica, 1.
& 3.

Ecclesiā-
stica, c. 33.

Gal. lib. 2.
de diffi-
cult. re-
spicit, c. 1.

comprehensa, mira esse definant. *Itaque nullus unquam obliuiscatur se esse Hominem, neque Deo dei insipientiam, si non plenè capiat eius sapientiam, inquit idem Author. Cunctæ res difficiles, non potest eas homo explicare sermone, afflictionem dedit Deus filiis hominum, ut distendantur in ea, cuncta fecit bona in tempore suo, & mundum tradidit disputationi eorum, ut non inueniat homo opus, quod operatus est Deus, ab initio usque ad finem. Sapientissimi Siracidis modesta est de suo instituto commendatio quam ego licet longè impar & inferior, liberè, neque arroganter mihi attribuam in rebus Anatomicis. Ego ultimus euigilaui, tanquam is qui spicas legit post Messores, profeci benedictione Domini, & tanquam vindemiator, quasi pleno Autumno, impleui torcularis lacum: Considerate me mihi non soli laborasse, sed omnibus quærentibus eruditionem. Etenim impellimur natura ut prodesse velimus, imprimisque docendo, rationibusque sapientiæ tradendis. Itaque non facile est inuenire, qui quod sciat ipse non tradat alteri, vel literarum monumentis non consignet, hoc solo premio contentus, quod dum ista musinatur, pluribus horis uiuit. Siquidem hoc instum decensque primum eorum est, qui bonum aliquid inuenere, ut eorum inuenta non pereant, sed apud posteros aeterna sit meritorum recordatio. Scitum est istud Archytæ Tarentini, etiamsi Dei gratia concessum esset alicui celos ascendere, & mundi huius fabricam stellarumque pulchritudinem contemplari, mirabilem tamen illam contemplationem minus ei gratam fore, si non haberet postea, cum quo ea quæ uidisset communicaret.*

Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.

Eleganter apud Athenæum, lib. 5. c. 27. Anaxandrides.

2. si quis inuentum nouum

Excogitauit, huic volupe est id omnibus

Proferre, nam qui tantum sapiunt sibi,

Priuantur eruditionis iudice,

Suntque inuidi, nam spargere in vulgus decet,

Quicquid nouitatem quandam habere cernitur.

Ideoque noster Galenus rem Anatomicam cum ex peritissi-

ANTIQUA PRÆFATIO.

miſi Anatomicis didiciſſet, aliis labenter imperitiit, rogauitque om-
nes eodem animo erga ſtudioſos eſſe affectos, ac bene animatos. Nam
qui ſcientiam rei utiliſ poſſidet, eamque non conſert in commune,
nec Deo placet, nec ab hominibus ſapientibus commendatur, affir-
mante Diuo Paulo. At hodie multi elaborata abſcondere, at-
que ſupprimere cupiunt, & fraudare vitam alienis bonis. Ita cer-
te recondunt, qui pauca aliqua nouere, inuidentes aliis, & nemi-
nem docere in authoritatem ſcientie eſt. Tantum ab excogitandis
nouis, ac iuuanda vita mores abſunt, ſummumque opus ingenio-
rum diu iam hoc fuit, ut intra unumquemque rectè facta veterum
perirent. Mihi verò cum Hippocrate inuenire aliquid eorum;
qua nondum inuenta ſunt, quod ipſum notum quàm occultum eſſe
preſtat, ſcientie voſum ac opus eſſe videtur: ſimiliter inchoata ad
finem perducere & abſoluere. Nam, ut ait Ariſtoteles, lib. 7. po-
liticōn, cap. vlt. omnis ars & diſciplina implere vult, quod na-
tura deſt, πᾶσι τέχνη ἐ παῖδία, τὸ πρὸς αἰὲν βούλεται τῆς φύ-
σεως ἀναπληροῦν. Commentarios de Dieta ſcripturus Hippo-
crates, cūm animaduertiret eam eſſe ingeniorum labem, ut faſti-
diant quacumque poſt alios ab aliquo proferuntur, quaſi nihil di-
ci queat, quod non prius dictum fueris: Ne parem iudiciorum a-
leam ſubiret, utendum ſibi cautione in illius operis veſtibus iudi-
cauit, reddita ſcilicet ratione, cur ipſe poſt alios ſcriptores eandem
telam retexeret, ſiue eandem commentationem ſuſciperet. Nimi-
rum quod ex prioribus neminem rectè quidnam ſcri-
bendum foret expendiſſe cognosceret, ſed leges condi-
diſſe, de his quæ non intelliſerent. Sic ego ſcriptioni me dedi
cum plurima animaduerti falſa ab Anatomicis producta, multa
ab illis neglecta, vel non obſeruata deprehendi. Nec fiducia operis
hæc eſt, ſed indicatura: quia non ſum adeo ſuffenus, ut artis Ana-
tomica gloriam mihi velim arrogare, nec dubitamus quedam ſu-
perſeſſe diligentius indaganda, qua nos præterierint. Non reprehen-
ditur, qui in ampla ſegete ſtipulam ad ſpicilegium reliquit. Sed ad
ornatum & ſplendorem huius artis mēum talentum contuli, perito-
rum Anatomicorum libris adiutus, quos ubi ſequutus ſum lau-
dauit, ut plagij crimen euitarem. Benignum enim & plenum
ingenui pudoris ſemper exiſtimaui cum Plinio, fateri per

Plin. lib.
25. nat.
hiſt. cap.
1.

Epiſt. ad
Cœc. 15.
cap. 14.

Cap. 1. l.
1. admin.
Anat.

quos profeceris, obnoxij verò animi & infelicitis ingenij est deprehendi in furto malle, quàm mutuum reddere, cùm præsertim fors fiat ex vsura. *Discere sine pudore, docere sine invidia debemus, & si quid rectè dictum ab alio non occultare, quemadmodum impudica mulieres nò hos liberos supponentes, sed pronunciare gratè patrem & inuentorem alicuius rei, inquit D. Basiliius. Atque ut loquar cum Scaligero Exercit. 170. sect. 3. suam cuique laudem laborum premium relinquimus libenter, & concedimus cumulatè, & deferimus liberaliter, non ut quidam ignaui & ingrati facere audent, ut alienis laboribus titulos imponant suos, tum gratiam quam debent, dissimulant superciliosi, aut abolent maleficiis, ne ipsis Authoribus quidpiam debuisse videantur. Isti homines conscientiam pro accusatore, pro iudice habituri sunt posteritatem. Notum est quàm ridiculi & infames fuerint illi litterati, qui in ludis quos Apollini & Musis Ptolomeus dedicauit, suppresso nomine aliena recitauerant, sed cùm ab Aristophane in furto deprehensi fuissent, Rex iussit cum his agi furti, condemnatosque cum ignominia dimisit.*

Ego verò neque alienis indicibus mutatis, interposito nomine meo, id profero corpus *Anatomicum*, neque aliorum inuenta inique ut superans institui ex eò me approbare. Sed peritis scriptoribus infinitas ago gratias, quod egregiis ingeniorum solertiis ex aui collocatis, fecundiores & expeditiores ad scribendum facultates nobis reliquerint, talibusque confidentes authoribus, audemus nouum corpus *Anatomicum* condere, & in lucem proferre. In eo contexendo omnes *Anatomicos* quotquot extant legi, consului, & inter se comparauit, ut quod utile & veritati consentaneum mihi videbatur, deciperem, colligerem, & in meum succum conuerterem: Operis mei & studij fuit, multos legere, ut ex plurimis diuersos flores carperem, non tam probaturus omnia, quàm quæ bona sunt electurus, assumpsi multos in manus meas, ut à multis multa cognoscerem: ut loquar cum Diuo Hierony no aduersus Vigilantium.

Nec tamen tribute, quæso, superciliosa arrogantia ceteros præ se fastidienti, si more aliorum, qui hodie scribunt, authorum quibus usus sum, longum indicem non contexuerim, atque premiserim,

rim, me ab hoc instituto deterruit, elegans Photij admonitio, qui dum istud in Cephaleone reprehendit, subiungit, animi nondum inanem puerilemque gloriam repudiantis, magnum satis argumentum est, è quot, quantisque authoribus historia collecta sit iactare. Vnumquemque suo loco nominavi: imprimis verò Galeni, peritissimi Anatomici opem & auctoritatem imploravi, quem in re Anatomica, ut in Medicina ducem atque præceptorem semper habui, ex eius libris sparsa & neglecta collegi, forsan ab aliis non animadverta.

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant,
Omnia nos itidem depascimur aurea dicta.

Gloriabatur Æschylus, quod sue Tragediæ essent reliquæ, vel analecta magnorum conviviutorum Homeri, sic nostros labores Anatomicos ex Galeno depromptos liberè profiteamur.

Nec tantum Anatomicorum libris credidi, quantum oculis fidelibus rerum Anatomicarum internuntiis, quia melius auctoritas comparatur Anatome, quàm longa lectio, & profunda meditatio. Eupompus pictor egregius interrogatus, quem antecedentium sequeretur, dixisse fertur demonstrata hominum multitudine, Naturam ipsam imitandam esse, non artificem. Neque nos tam authores in rebus Anatomicis sectandos esse, quàm observationum momenta inuestiganda duximus. Nam ut prudenter monet Tullius, obest plerumque iis qui discere, aut scribere volunt, authoritas eorum qui se docere profitentur, desinunt enim qui ex aliorum auctoritate scribunt, plerumque iudicium adhibere, dum id habent ratum, quod ab eo quem probant iudicatum vident. Nunquam id probavi, quod de Pythagoriciis acceperimus, quæ ferunt, si quid affirmarent in disputando, cum ex iis quæreretur, quare ita esset, respondere solitos, ipse dixit: Ipse autem erat Pythagoras, tantum opinio præiudicata poterat, ut etiam sine ratione valeret authoritas. Nec legenti statim persuasum sit, omnia quæ magni doctores dixerunt, utique esse perfectæ. Nam & labuntur aliquando, & oneri cedunt, & indulgent ingeniorum suorum voluptati: Nec semper intendunt animum, & nonnumquam fatigantur: cum Ciceroni dormire interdum Demosthe-

nes, Horatio etiam Homerus ipse videatur, summi etenim sunt, homines tamen. Quare cum sapere, id est veritatem querere omnibus sit innatum, sapientiam sibi adimunt, qui sine ullo iudicio inuenta maiorum probant, & ab aliis pecudum more ducuntur. Sed hoc eos fallit, quod maiorum nomine posito, non putant fieri posse, ut aut ipsi plus sapiant, quia minores vocantur, aut illi desipuerint, quia maiores nominantur. Quid ergo impedit, quin ab ipsis sumamus exemplum, ut quomodo illi qui falsa inuenerunt, posteris tradiderunt, sic nos qui verum inuenimus, posteris meliora tradamus: ex Lactantio.

Plinius l. 5. c. 1. *Vtinam qui ad scribendum animum appellant, neuiquam aliorum mente, & voce plerumque falsa loquerentur, non tam falsis opinionibus conspurcata esset Anatome, in qua multa sæpe fallacissima experimento deprehenduntur, quia dignitates cum indagare vera pudeat, ignorantie pudore mentiri non piget, haud alio fidei prouiore lapsu, quam ubi falsæ rei grauis auctor existit. Quos enim Anatomicos in errorem duxit auctoritas Aristotelis, qui contentus uidisse in Corde nervosa filamenta, inde nervos oriri credidit, nec ultra perquisiuit, quomodo nervi ab eo fonte in singulas partes derivarentur? Multas, inquit Galenus, huiusmodi apud Medicos Anatomicas sententias prauè scriptas inuenire licet, qui quod ex dissectione apparent, spectare noluerunt, sed ex consequutione quadam quali inspexissent, ita esse sperarunt. Quales autem sit consuetudinis viæ etiam ipsa leges demonstrant, in quibus fabulosa & puerilia, eo quod eis assueti sumus plus valent, quam veræ earum cognitio, inquit Aristoteles, lib. 2. Metaphys. cap. 3.*

Torro te scire cupio, me de industria, questiones Physiologicas qua rationem potius, quam auctoritatem requirunt, rescuisse: monitum & edoctum ab Aristotele, cuiusque artis præcepta syngenea esse debere, nihil heterogeneæ, & aliunde mutuatum immiscendum: alioquin omnia in singulis essent explicanda. Cur potius ad Anatomem Hepatis Physiologica questiones referuntur, quam Chirurgica & Therapeutica? Galenus libro de dissectione Musc.

ANTIQUA PRÆFATIO.

eo potissimum nomine damnavit Lyci librum Anat. quod prolixius omnia interpretetur, quodque Logicas quæstiones iis, quæ ex dissectione apparent, inseruerit: Ac præterea, quod de affectibus multos sermones habuerit, quorum quadam nulla in rem muscutorum dissectionibus convenirent. Idem Galenus prolixos Marini commentarios in *Epitomen* contraxit, resectis iis quæ parum Anatomica videbantur. Logicam quæstionem appellat Aristoteles, quæ à propriis principiis remota est, & quò univèrsalior, eò remotior, cap. 8. lib. 2. de gener. animal. Ideoque Logica quæstiones doctiorem quidem efficiunt artificem, sed non peritiorem in arte sua. Eam ob rem Galenus finem Anatomica doctrine duplicem proposuit, Philosophicum, & Medicum, quoniam aliter Anatomie à Philosopho, aliter à Medico spectatur, & describitur. Omnes artes, inquit Crassus apud Ciceronem, aliter ab iis tractantur, qui eas ad usum transferant, aliter ab iis, qui ipsarum artium tractatu delectati, nihil aliud in vita sunt acturi. At tamen ipse Galenus, lib. 6. de usu partium, cap. 12. faretur se librum de dissectionibus Anatomicis composuisse.

Cùm autem omnis doctrina sit, vel rerum, vel signorum: Res verò per signa cognoscantur, atque verba sicut signa, quæ de natura rei aliquid intimant. In explicandis propriis partium nominibus, sedulam dedi operam. Quia qui ignarus est vocabulorum, inquit Plato in *Gorgia*, ignarus est rerum. οὐ δὴ τὰ ὀνόματα εἰδὼν, εἰσὶν οἱ τὰ δεξιόματα. Ipsemet Galenus, lib. 3. simplic. cap. 12. monet conturbatum nominum usum, rerum ipsarum cognitionem perturbare. Plato in *Cratilo*, rem etymologicam indagare, & scire, studium non indignum Philosopho indicavit. Atque I. Scaliger in Philosophicis scriptis sola notatione nominis scita & eleganti, deducit Lectorem ad cognitionem rei, quam per ambages verborum vix assequi posset. Ionicus Sardonius Medicus auditor Zenonis, & condiscipulus Oribasij, nomina cum rebus ipsis adeo exactè pernoverat, ut magni etiam nominis viri in curandis corporibus absolutam eius diligentiam admirarentur, & palam profiterentur, se eius industriam adiutos, intelligere quæ à prisco Medicis fuerant prodita, atque in usum convertere, non aliter quàm voces, quarum scriptura & si-

gnificationes vetustate fuerant oblitterata, ex Eunapio in vitis Philosophorum. Merito igitur asseuerare possum cum Epicteto, quod principium eruditionis, est nominum consideratio. ἀρχὴ παιδείας ἡ τῶν ὀνομάτων ἰστορία. Quando Plato scripsit in Politico, nos doctiores sapientia ad senectutem peruenturos, si nomina neglexerimus, id de affectato verborum aucupio intelligendum, non de nominum notatione, quam in libris suis studiosè persequutus est.

Porro ridiculas Anatomicorum opiniones silentio praterij, eas tantum quæ à peritis & probatis authoribus enuntiate sunt laudauimus, vel refutauimus: τὸ γὰρ τῷ τυχόντι ἐναντία τῆς οὐδαμῶς ἀποφωμιμῶν φρονήσιν ἐνδείξις ὄσιν, ait Aristoteles, cap. 9. lib. 1. Topic. & alibi monet, cap. 3. lib. 3. de partibus animalium. Non quasuis opiniones refellendas esse, sed quæ probabilitatem aliquam habent, & rationes quibus nitantur. In iis explicandis & definiendis veritatem ducem sequor, non mihi res, sed me rebus subicere conor, atque inspectione oculata fretus, libere meum iudicium interposui. Siquidem in Medicina, ac potissimum illius parte Anatomica, oculus magis credere oportet, quàm opinionibus, inquit Hippocrates, lib. 1. de Dieta. At ut loquar cum eodem authore, præclara est, quæ ex opere quod quis didiceris, proficiscitur oratio, καὶ λανθάνει τῷ διδασκόντι ἐργον λόγος, lib. de Elegantiâ. Itaque nulli me mancipaus, nullius nomen fero, multum magnorum virorum iudicio credo, aliquid & meo vendico,

Quid verum atque decens curo, & rogo, & omnis in hoc sum,

Condo, & compono, quæ mox depromere possim.

Hac in re consilium Seneca sequutus sum. Rogatus, inquit, in Senatu dicere sententiam, ridebor, si non examinem, & meum iudicium proferam. Nam semper illam vnus sequi sententiam, non id Curia, sed factionis est.

Quapropter hoc vnum audenter affirmabo: Si tam compta & eleganti oratione Anatomem descripsissem, quam accurata & diligenti obseruatione mihi comparauimus, & nouorum inuentione locupletauimus, utrumque docti ac periti Anatomici punctum assequutus

ANTIQUA PRÆFATIO.

fuissem. Nos etenim sumus tanquam pueri, gigantis humeris elati, longius videre possumus, quam viderit antiquitas, ut notavit Guido de Cauliaco,

--quia non omnia grandior ætas

Nos quæ scimus habet, feris venit usus ab annis.

Artes & omnia cetera esse audita videmus, non per eos qui usitata retinuerunt, sed eorum opera qui correxerunt, loquere mouere primi non dubitarunt. Nam plurimi, quem ex ingenio suo poterant habere conatum, velut adstricti certis legum vinculis perdiderunt, & magistrum respicientes, naturam ducem sequi desierunt, ait Quintilianus. Non ausim tamen orationis meæ ruditatem excusare, ne idem mihi obiiciatur, quod Cato urbanè admodum A. Albino respondit sua scriptio- nis barbara veniam postulanti apud Macrobius. Nugari cum qui culpam deprecari, quàm admittere maluerit. Ad meam excu- sationem, rei difficultatem prætexam, vel Medici conditionem, cum nobis non liceat esse tam disertis, Musæ qui colimus seniores. Nam, ut ingenuè fatetur Hippocrates, ἱατροὶ ἔ παῖδες ἱατρῶν, raro contingunt eloquentes, cum περὶ τῆς ἱερᾶς, quàm πρὸς τῆς δόξης videri malint.

Ornari res ipsa negat, contenta doceri.

Eleganter Diuus Augustinus, lib. 4. de Dôctrina Chri- stiana, cap. 11. bonorum ingeniorum insignis est indoles in verbis verum amare, non verba, quid enim prodest clavis aurea, si aperire quod volumus non potest, aut quid obest lignea si hoc potest, quando nihil quærimus, nisi patere quod clausum est. Proponam igitur sine suo meum opus Anatomicum, ne id mihi contingat quod Veneri accidisse memorat Philostratus, Momoeam quidem placituras fuisse, si sandalias crepitantes non habuisset.

Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi verbis

Pagina turgescat, dare pondus idonea fumo,

Pollio Asinius triumphalis senex, Acroascs suas nunquam populo commisit, siue quia parum in illis habueris fiducia, siue quod magis credit Seneca, tantus Orator inferius, id opus ingenio suo duxerit, exerceri quidem illo volebat, gloriari fastidiebat. Nec ego

ad pompam auramque popularem aucupandam, meas Exercitationes Anatomicas toties in lucem exire permisi, sed bene merendi de mea professione desiderium, me ad editiones huius operis inuisavit, ut eruditorum iudicia, de meis laboribus quos publico examini subiici, viuens adhuc explorarem. Ut contra iudiciorum varietates, superesset artifici regressus ad veniam, velut emendaturo quidquid desideretur, si non fueris interceptus. Iamdudum Platonis præceptum apud me perpendi, & animo penitus infixi. Omnium maximum quoddam malum in multorum hominum animis est ingentum, in quo cum sibi indulgeant, remedium quo sese ab illo liberent, nondum inuenerant. Est autem id quod dicere solent, unumquemque sibi natura amicum esse. Is enim qui amat, circa id quod amat, obsecatur. Ac proinde de rebus iustis, bonis, honestis malè iudicat, cum in ea est sententia, ut opinetur maiorem sibi, quàm veritati honorem tribuendum. Non tamen decet eum, qui vir magnus sit euasurus, in rebus acquiescere, sed ea potius complecti, quæ vel apud seipsum, vel apud alium quempiam iustè fieri videantur. Ex eodem peccato, hoc etiam omnibus contingit, ut quisque imperitiam suam sapientiam esse arbutetur. Hinc fit, ut cum nihil norimus, omnia tamen nos scire opinemur. Propterea de me ipso humilius adhuc sentirem, nisi mihi animos addidisset eruditissimus Medicus Vratistauienſis Fridericus Monavius, ut patruæ professionis, sic eruditionis legitimus hæres, atque patruus magnum incrementum: qui perlustratis 54. Academiis intra 14. annos, & diligenter obseruatis earum Professoribus, tandem redux in patriam, ingenuè professus est, Scholam Parisiensem Academicarum esse Optimam, & Maximam, & Augustissimam nulla intercedente, mihi que tanquam Anatomicorum primicerio, suorum laborum primitias, non sine honorifico elogio consecrauit: laudari à laudato viro gloriosum est. His ergo stimulis incitatus, hoc opus Anatomicum exaravi.

Cum autem sextæ cogitationes debeant esse præcedentibus sapientiores, ut est in proverbio, hac editione dedimus operam, ut quàm emendatum, & accuratum in lucem exiret hoc opus, postrema manu fictum, & elaboratum. Primo quidem decipi incommodum, iterum stultum, tertio planè turpe: Ætas multa limat, vsus plurima

delegit, anni plura concoquunt, ideoque recentissima quaque, emendatiora videntur. Sotigenes tribus lucubrationibus de siderum motu editis, non cessavit addubitare ipse, semet corrigendo. Itaque quod Protogenes pictura sua Jalyso fecit, id in hoc opere prestissimus. Ille quater colorem induxit, subsidio iniuria & vetustatis; ut decedente una, altera succederet. Nos verò ex diuturna & assidua rerum Anatomicarum observatione, ac meditatione, sextam manum huic operi adhibuimus,

Multa dies, variusque labor mutabilis æui
Rettulit in melius.

Agricolæ imitatus sum, qui ut plus frugum ager ferat, arare non contenti; etiam iterant, atque tertiant, similiter pictores prius corpora adumbrant, quæ postea alterâ & tertiâ manu additâ accuratius exprimunt, & laboribus suis absolunt, inquit Nazianzenus, Epistola 114.

Galenus in gratiam Boëtij Romanorum Consulis, Anatomicas Administrationes scripserat, quæ post illius obitum perire. Tandem precibus amicorum victus, novæ edidit, quibus magna nunc animi iucunditate, reique Anatomica commoda fruimur. Has laudat, quod secundis curis sint elaboratiores, novisque inuentis auctiores.

Nunquam quisque tam bene subducta ratione ad vitam fuit,

Quin ætas, usus, semper aliquid adportet novi,
Aliquid moneat, ut ea quæ te scire credas, nescias;
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo repudies.

Galenus de Iuliani Institutionibus scripsit, iterum atque iterum edidisse, assidue transponendo, & immutando, nunquam iis quas scripsit contentum. Idem mihi forsan exprobrabitur, quod in singulis editionibus interpolatis, multa mutaverim & adiecerim. Quidni, cum eiusdem sit producere, & distinctiones explicare eorum, quæ primus descripsit, tempus talia inuenire, ac innovare potest. Sic artium amplificationes factæ fuere, inquit Aristoteles, lib. 1. Ethic. cap. 7. Nihil quidquam, inquit Apuleius, potest in suo primordio perfici, sed in omnibus ferme ante est spei ru-

dimentum, quàm rei experimentum. Sed postrema hac editione contentus, manum de tabula tollam. Protogenes habitus fuit indoctior, quod nesciret manum de tabula tollere. Apollodorus inter cunctos pictores diligentissimus artis fuit, sed inimicus sui iudex, crebrò perfectà signa frangens, dum satiare cupiditatem arti nequit, & insanus cognominatur. Callimachus insignis operibus fuit, semper tamen calumniator sui, nec finem habens diligentia, ob id Cacicotechnos, exemplo adhibendi cure modum, huius sunt saltantes Lacena, emendatum opus, sed in quo gratiam omnem diligentia abstulerit.

Non defuturos prevideo, qui mihi obijcient, quod scriptum ab Aristotele, lib. 3. de Cælo. De omnibus enunciare, velle, vel de omnibus nihil præterire, videtur hoc vel multa imprudentia, vel multa arrogancia instrumentum. Istud de me non profiteor, nec adeò Lynceum, & perspicacem me fuisse in rebus Anatomicis, ut nihil eorum, quæ ab aliis Anatomicis observata fuere, & descripta, oculos & manum effugeris. Fateor tamen quacumque scripta & observata fuere ab aliis, diligenter indagasse, vera & falsa notando in cadaueribus humanis, plusquam centum per triginta annos manu mea dissectis, & publicè demonstratis: plurima etiam summo labore & diligentia adinueni, & forsàn plura adhuc inuenissem, nisi à studio & exercitio Anatomico distractus fuissem, & euocatus ad Aulam Reginae Matris, functus per decennium officio primarii Medici. Propterea non reformido illud probrum, quod obijcit Pacius Anatomicus, de suis inuentis magnam fiduciam habentibus, qui in Anatome confidit se minima quæque ita persequutum, ut nihil illum effugiat, hic se præstantiorem iactat humana conditione, qui autem quæ ipse non vidit, ita esse negat, ne iis quæ ait se vidisse fidem meretur. Quæ scripsi non sunt imaginaria, & chimerica, in meo Cerebro concepta, sed accurata inuestigatione deprehensa, & fideliter descripta, experietur qui dubitabit, facem prætuli, & lampadem alius tradidi.

Quacumque verò de rebus Anatomicis à me traduntur, ex meo penu deprompta sunt, ne quod ab aliis dictum & occupatum est, de nuò repetatur.

ANTIQUA PRÆFATIO.

ἐχθρὸν δὲ μοι εἶναι, non mihi animus est,

Αὐτὸς ἀριζήλων, εἰρηδία μυθολογεῖν.

Rurſus ab integro iam dicta retexere verba.

Ceterum, in deſcribendo hoc opere Anatomico veritatem & fidelitatem adhibui, memor huius præcepti Galenici, qui in diſſectione corporum mentitur, is nullibi fidem meretur. Contra juniorum Anatomicorum opiniones multa obſervavi, quæ non credet, niſi qui diligenter ea in diſſectionibus indagaaverit. Nam ſi ſolis libris conſiſſus, non ultra ſollicitus fuerit, forſan me vanum mendacemque Anatomicum iudicabit, quod de ſua fama & exiſtimatione metuebat Galenus: quando ſcitione ſola aliquis contentus erit, priſcis & præcedentibus Anatomicis credet, eo-que libentius quod etiam plures ſint. Sed Galeni ipſius excuſatione, vel poſius admonitione metuebor, qui notat, non ubique eundem ſitum & progreſſum vaſorum obſervari. Ideoque ſi membrum incidenti aliquid præter ea quæ à nobis ſcripta ſunt, inveniatur, ſcito hoc rarò exiſtere, quare nec antea damnare noſtra opera oportet, quàm ipſe quemadmodum nos, frequenter corpora inſpexeris. Sed iſta inſpectio debet eſſe accurata, propriis manibus oculatis adminiſtrata, ductu alicuius peritiſſimi Anatomici, in lectione authorum, & arte ſecandi exercitati. Nam miſerè cacutiunt in rebus Anatomicis, qui alieno ex ore ſapiunt, & ex alienis oculis vident, & alienis manibus palpant. Proinde nemo unquam peritus evadet Anatomicus, niſi peritiſſimos Anatomicos in lectione authorum, & praxi Anatomicæ verſatiſſimos ſelettur. Vel ab aliis rudem aliquam cognitionem adeptus, tandem lectione, & aſſidua ſecandi exercitatione eam perficiat. Niſi enim manum Operi Anatomico adhibuiſſem, aliorum oculis & manibus conſiſſus, nunquam ea quæ à Columbo, Fallopio, Euiſtachio, Arantio, Coite-ro, Fabricio ab Aquapendente, ſupra Galenum, Veſalium reperta ſunt, cognoviſſem, nec eorum quosdam errores, & poſteriorum Anatomicorum animadvertiſſem, neque plurima ſupra illos Anatomicos unquam obſervaviſſem. Itaque cupiens quàm plures Anatomicos fieri, quemadmodum Hippocrates, πολλοὺς βουλόμενος οὕτως τε ιατροῦ, quæ via & methodo ſit progredien-

AD LECTOREM ANTIQVA PRÆFATIO.

dum, in rebus Anatomicis administrandis & inuestigandis, lubenter edocui. De qua tamen Encheirisi possem istud usurpare, quod Hippocrates de Chirurgia pronunciauit. Chirurgiam scripto exquisitè prodere non est facile, sed ex iis quæ scripta sunt, formam ac imaginem concipere oportet. Quoniam eiusmodi Encheirises magis instruunt, quàm faciunt artificem. Vsus, & experientia dominantur in artibus, quare nostra præcepta non consummare scientiam, sed adinuare promittunt. Nec statim quisquam compos artiæ Anatomica erit, his perlectis præceptis, nisi & obire ea voluerit, & per facultates potuerit. Ideoque hæc velut adminicula studiosis promittimus, non profutura per se sola, sed cum aliis, lectione, inspectione, & exercitatione.

--hæc qualiacumque
Arridere velim, doliturus si placeant spe.
Deterius nostra, Demetri, teque Tigelli,
Discipulorum inter iubeo plorare cathedras.





S A P I E N T I
LECTORI MONITVM.
QVO DECLARATVR
INSTITVTVM AVTHORIS,
in hac Editione postrema.

V T in rerum naturalium produccionibus, sic in scien-
tis ingeniorum, verissimum est illud effatum Aristoi-
telis, principia rerum mole quidem parua sunt, sed
potestate maxima, quae sensim incrementa capiunt:
sic fontes maiorum fluminum saepe sunt exigui, sed riuulorum con-
fluxu gliscunt & intumescunt. Nec dissimilis liberorum & libro-
rum formatio, educatio, & ad sapientiam promotio: viden ut à par-
uis exordiis emergunt, sensim adolescunt, & suam tandem perfe-
ctionem assequuntur. Cum cœpi scribere de rebus Anatomicis, par-
uum libellum anno Dom. 1608. sub nomine Scholæ Anatomicæ
edideram Parisiis, dein Geneuæ renouatum: Crescente materia,
docendo, meditando, & secando assidue cadauera humana, creuit
Opus, editumque fuit, & adiunctum operibus Parentis mei, anno
1610. (eodem tempore recusum in Germania,) quia deerat A-
natome. Postea ex assidua cogitatione de rebus Anatomicis, &
dissectione, propria manu, tum plusquam in sexaginta cadaueri-
bus administrata, cum sedula & exacta interiorum & exteriorum
perscrutatione, multum accreuit Opus, instar Aduersariorum
Anatomicorum, quod nomen retinere cupio, & pro tertia Editione lu-
cem adspexit, anno D. 1618. Tandem cum library vellent iterum
typis excudere, & excutere in conspectum Medicorum, illud accu-

AD LECTOREM;

ratus recognoui, & pro quarta Editione prodit, anno D. 1625. Atque cum Medicus Doctor Tholosanus, Petrus Constant, postea Doctor Parisiensis, Collega noster, meam Anatomem in linguam Gallicam traduxisset, in gratiam Chirurgorum, permisi editionem ex meo Autographo auctiorem, & emendatiorem ex mea recognitione, idque pro quinta Editione, anno 1628. Tandem ultima & sexta Editionis, quam negligebam, cum aliis Anatomicis sub spongia iacentibus, Author fuit & Promotor eruditissimus Medicus, Dom. Guido Patinus, Collega noster, cui pro renate ac instaurate huius Editionis fructu, si quis accedat Philiatris, gratia debentur. Scitum est illud Comici, vino vendibili non est opus suspensa hedera, Laudat venales qui vult extrudere merces,

Astamen si vis scire quid vini feram, prae gustabis: nam gustus emptorem trahit. Declarabo igitur, benigne Lector, meum institutum in hoc Opere renouato, ne in emptione libri, pecunia & opere dispendium & iacturam facias. Vniuersum Opus recognoui, interpolavi, ac emendaui, atque plurimum auxi: ut nunc reiectis aliis Editionibus, Authoris manu postrema factum ac renouatum, merito dici queat, Riolani vltimum Testamentum Anatomicum, suam mentem in Anatomicis explicans: Ac proinde abrogat, reuocat, atque improbat alias praecedentes Editiones, excepto Encheiridio. Vt hoc sciat, si quis vitiligator velit cum ipso altercari de rebus Anatomicis. Tractatū adjunxi, ad Praxim medicam, ni fallor, vtilissimum, de Circulatione sanguinis, quam inuenit Doctissimus Haruæus, quoad reuersionem sanguinis ad Cor antea ignotam: sed vias breuiores, faciliores, ac veriores demonstraui, & ad usum Medicum reuocaui, cum antè Circulatio sanguinis, philosophicè dumtaxat fuerit tractata & exposita, non medicè. Hoc Tractatu credo me ita veram medendi methodum instaurasse, ut non displicere debeat peritis Medicis & Anatomicis, ringentibus aliis ignaris, si nostram sanguinis Circulationem appellauerim Instauracionem Physicæ & Medicinæ, quia Circulatio sanguinis, vel est ipsamet Natura, vel saltem ius Opus precipuum ad visæ conseruationem. Præterea, iure quodam

NOVA PRÆFATIO.

senilis professionis & peritiæ in *Anatomicis* adepta, per quadraginta quinque annorū studia, & exercitia, confidenter Animaduersiones scripsi, in sex posteriores *Anatomicos*, qui de re *Anatomica* editis *Commentariis* hoc sæculo inclaruere, iamdudum à 20. annis scriptas, in fervore studij *Anatomici*, (quoad *Laurentium* & *Bauhinum* spectat,) cum alij quatuor nondum essent noti suis scriptis, quæ tamen festinante calamo & prelo examinaui. Magna est ars, inquit *Cassiodorus*, contra artifices loqui, & apud illos aliquid agere, qui se putant omnia præcedere. Id suscepi, non ut insultarem mortuis & viventibus, spretisque ac fastidiis eorum laboribus, meos commendarem & anteponerem: Nondum enim istud ambiciosum & insanum scribendi cacœthes, & obtrectandi maligna prurigo, meam mentem percussit & labefecit, sed ut cautiore redderem *Anatomicos*, in legendis libris *Anatomicis*, parèque diligentiam & cautionem in meis etiam examinandis adhiberent: Modestè tamen & amicè cum illis egi, parem gratiam ab his qui supersunt, & aura fruuntur ætherea expectans. Quapropter istas Animaduersiones haberi cupio, non pro criticis censuris, sed pro scholiis, siue interpretationibus locorum difficultium, & obscuriorum, vel pro supplementis deficientium, ut à *Philatriæ* erudita hac monumenta *Anatomica* facilius & rectius intelligantur, & ad ulteriorem indagatorem ipsi promoveantur. Itaque lubenter *ἑνσυνμαρτυρία* appellabo, cum *Cl. Casaubono*, Notis ad *Laërtium*, more veterum, qui notabant ea, de quibus dubitabant, *Authores* legendo: Atque patienter feram, in rebus *Anatomicis* pares Animaduersiones, post hanc Editionem, quam puto aliis præcedentibus emendatiorem euulgasse.

Possum ego censuram Lectoris ferre seueri,
 Et possum modica laude placere mihi.
Mæonio qualem cultum quæsiuit *Homero*
Censor Aristarchus, normaque *Zenodoti*.
 Pone obelos igitur spuriorum stigmata *Vatum*,
 Palmas, non culpas esse putabo meas,
 Et correctæ magis, quàm condemnata vocabo;
 Apponet docti quæ mihi lima viri.

AD LECTOREM NOVA PRÆFATIO.

Porro, si quadam offendas dubia, vel erronea, prius adibis Indicem Erratorum, quam sinistrè iudices, forsan inuenies emendationem, vel supplementum deficientis alicuius dictionis, aut detractionem superflua, quæ sensum perturbat.

FINIS.





INDEX
LIBRORVM ET CAPITVM
ANTHROPOGRAPHIÆ
D. IOANNIS RIOLANI;
DOCTORIS MEDICI PARISIENSIS,
ET PROFESSORIS REGII.

	LIBRI I. Caput primum. <i>Humani capiti commendatio.</i> pag. 1	Cap. 16. <i>Qualis esse debeat Anatomia stu-</i> <i>dis?</i> 51
	Cap. 2. <i>Anatomes antiquitas,</i> <i>etius & progressus.</i> 16	Cap. 17. <i>Conditiones Doctoris Anatomici.</i> 55
	Cap. 3. <i>An apud Indios cognita fuerit, &</i> <i>tractata Anatomie.</i> 20	Cap. 18. <i>De apparatus Anatomico veteri &</i> <i>novo.</i> 59
	Cap. 4. <i>Iudicium de Aristotele, in rebus</i> <i>Anatomicis.</i> 21	Cap. 19. <i>Dolissimis & amantissimis Colle-</i> <i>gis Escharisticon, pro extructione Thea-</i> <i>tri Anatomici.</i> 63
	Cap. 5. <i>Iudicium de Scriptis Anatomicis</i> <i>Galenii.</i> 25	Cap. 20. <i>Consiliorum quorundam precepta.</i> 67
	Cap. 6. <i>Iudicium de scriptis posteriorum A-</i> <i>natomicorum, Græcorum & Latinorum.</i> 28	Cap. 21. <i>Qua Methodo doceri debeat Ana-</i> <i>tome?</i> <i>ibid.</i>
	Cap. 7. <i>Seſſe Anatomicorum.</i> 35	Cap. 22. <i>Quid in singulis partibus conside-</i> <i>randum?</i> 69
	Cap. 8. <i>Verum Anatomie potius ad Physi-</i> <i>cam, quàm ad Medicinam, vel Chirur-</i> <i>giam pertineat, & an Anima considera-</i> <i>tio ad Anatomiam referri debeat?</i> 37	
	Cap. 9. <i>Anatomem esse Medicinæ funda-</i> <i>mentum, ac principium.</i> 38	
	Cap. 10. <i>De Subiecto Anatomies.</i> 39	
	Cap. 11. <i>An vivum hominem secare sit ne-</i> <i>cessarium, & liceat?</i> 42	
	Cap. 12. <i>An veteres Anatomici, præsertim</i> <i>Galenus, humana cadavera dissecuerint?</i> 44	
	Cap. 13. <i>Anatomem Theoreticam esse, &</i> <i>Præcticam, & quoniam earum præcedere</i> <i>debeat?</i> 46	
	Cap. 13. <i>Anatomes definitio.</i> 48	
	Cap. 14. <i>Divisio Anatomie in suas species.</i> 49	
	Cap. 15. <i>Finis Anatomies explicatur.</i> 50	
		L Ib. 2. Cap. 1. <i>Totius Corporis divisio.</i> 73
		Cap. 2. <i>Ventris inferioris divisio.</i> 74
		Cap. 3. <i>Ventris superioris prima Admini-</i> <i>stratio.</i> 77
		Cap. 4. <i>De Cuticula.</i> <i>ibid.</i>
		Cap. 5. <i>De Cute.</i> 79
		Cap. 6. <i>De Membrana Adiposa, & Carno-</i> <i>sa, sine Adipocarnosa.</i> 80
		Cap. 7. <i>De Membrana Communi Muscula-</i> <i>rum.</i> 82
		Cap. 8. <i>De Musculis Abdominis.</i> 83
		Cap. 9. <i>Musculorum abdominis administra-</i> <i>tio.</i> 89
		Cap. 10. <i>De Peritonæo.</i> 90
		Cap. 11. <i>Divisio partium contentarum in</i> <i>Abdomine.</i> 93
		Cap. 12. <i>De Umbilico.</i> <i>ibid.</i>

Index Librorum & Capitum

Cap. 13. De Omento.	91	Cap. 1. De Capitis dignitate.	251
Cap. 14. De Intestinis.	99	Cap. 2. Capitis Structura, conformatio, & eius Administratio Anatomica.	252
Cap. 15. De Mesenterio.	107	Administratio Anatomica Capitis externi.	253
Cap. 16. De Pancreate.	109	Cap. 3. De Facie.	265
Cap. 17. De Vena Porta.	111	Cap. 4. De Oculo.	268
Cap. 18. De Arteria Ciliaca.	115	Administratio Anatomica Oculi.	280
Cap. 19. Quid in extirpandis Intestinis observandum.	ibid.	Cap. 5. De Aure.	281
Cap. 20. De Ventriculo.	116	Cap. 6. De Nasu.	283
Cap. 21. De Hepate.	120	Cap. 7. De Ore.	285
Cap. 22. De Vesicula Fellea.	124	Cap. 8. De Lingua.	286
Cap. 23. De Lien.	129	Cap. 9. De Colla, & Offe Hyoide.	289
Cap. 24. De Vena Cava.	141	Cap. 10. De Glandulis Oris, Fauccium, & Colli.	290
Cap. 25. De Arteria descendente.	143	Cap. 11. De Larynge.	292
Cap. 26. De Renibus.	ibid.	Cap. 12. De Pharynge.	292
Cap. 27. De Pretere.	147	Cap. 13. De Gargareone.	293
Cap. 28. De Vesica.	148		
Cap. 29. Necessitas & utilitas partium Genitalium aemonstratur, quas duplices esse oportebat sexu distinctas.	151		
Cap. 30. De Partibus Genitalibus viri. Praefatio.	153		
Cap. 31. Partium Genitalium Virilium enarratio.	157		
Cap. 32. Genitalium Partium Virilium administratio Anatomica.	165		
Cap. 33. In Partes Genitales Mulieris Praefatio.	167		
Cap. 34. Discrimen Corporis Muliebris & Virilis.	172		
Cap. 35. Partium Genitalium Mulieris Administratio Anatomica.	180		

L Ib. 3. Praefatio in Librum tertium. De Partibus Thoracis.	202
Cap. 1. Thoracis divisio.	205
Cap. 2. Thoracis prima Administratio Anatomica.	207
Cap. 3. De Mammis.	208
Cap. 4. De Diaphragmate.	210
Cap. 5. De Pleura.	215
Cap. 6. De Mediastino.	216
Cap. 7. De Pericardio.	217
Cap. 8. De Vena Cava Ascendente per Thoracem.	220
Cap. 9. De Arteriis Thoracis.	225
Cap. 10. De Nervis intra Thoracem contentis.	227
Cap. 11. De Pulmonibus.	228
Cap. 12. De Corde.	232
Cap. 13. De Thyroide Glande.	242
Cap. 14. De Canalibus Aspera Arteria & Oesophagi.	ibid.

L Ib. 4. Praefatio.	244
Explicatio verborum Salomonis, cap. 11. Ecclesiastes.	250

L Ib. 5. Cap. 1. Myologia utilitas.	296
Cap. 2. Musculorum natura, compositio & differentia.	297
Cap. 3. De Tendone.	300
Cap. 4. De Musculorum actionibus, & unde procedant.	302
Cap. 5. De Motu Tonico.	303
Cap. 6. De modis & extremis figuris motus.	304
Cap. 7. Quibus notis in Musculo actionis modus, & propria natura dignoscantur?	305
Cap. 8. Musculi frontales, sine Musculi superciliarum.	306
Cap. 9. Musculi occipitales.	307
Cap. 10. Musculi palpebrarum.	ibid.
Cap. 11. Musculi Oculi.	308
Cap. 12. Musculi labiorum.	309
Cap. 13. Musculi nasi.	310
Cap. 14. Musculi auri externa & interna.	ibid.
Cap. 15. Musculi maxilla inferioris.	311
Cap. 16. Musculi Offis Hyoidis.	312
Cap. 17. Musculi Linguae.	ibid.
Cap. 18. Musculi Laryngis.	313
Cap. 19. Musculi Pharyngis.	314
Cap. 20. Musculi Gargareonis.	ibid.
Cap. 21. Musculi Capitis.	ibid.
Cap. 22. Musculi Colli.	315
Cap. 23. Musculi Omoplate.	316
Cap. 24. Musculi Brachij.	ibid.
Cap. 25. Musculi Cubiti.	317
Cap. 26. Musculi Radij.	318
Cap. 27. Musculi Carpi.	ibid.
Cap. 28. Musculi vola manus.	ibid.
Cap. 29. Musculi Digitorum.	319
Cap. 30. Musculi Pollicis.	321
Cap. 31. Musculi Thoracis.	ibid.
Cap. 32. Diaphragma.	322.
Cap. 33.	323.

Anthropographiæ D. Ioannis Riolani.

Cap. 33. Musculi dorsi & lumborum, quibus spina mouetur.	323
Cap. 34. Musculi Abdominis.	324
Cap. 35. De motu Osium Ilium, & Osium Sacri simul iunctorum, & de eorum musculis.	325
Cap. 36. Testis musculi.	327
Cap. 37. Musculus Vesicae.	328
Cap. 38. Musculi Penis.	329
Cap. 39. Musculi Clitoridis.	ibid.
Cap. 40. Musculi Ani.	ibid.
Cap. 41. Musculi Femoris.	330
Cap. 42. Tibia Musculi.	332
Cap. 43. Pedis, sive Tarsi Musculi.	333
Cap. 44. Musculi digitorum Pedum.	334
Cap. 45. Musculi Pollicis.	335
Cap. 46. Anacephaleosis Muscularum sinus Corporis, à Capite ad Pedes.	336
Cap. 47. Arium Angustissime.	340
Cap. 49. De Valvulis venarum.	345
Cap. 50. De Nervis, qui à spinali medulla procedunt.	348
Cap. 51. De Piliis.	351
Cap. 52. & vltimum. De Vnguib.	359

datio vltima Anatomica, sine corporis suspensio.

417

In Librum Galeni de Ossibus ad Tyrones.

Commentarius Didacticus & Apologeticus, pro Galeno, aduersus Nonnos & Rhautores Anatomicos.

Simiae Osteologia, ut discrimen Ossium Hominis & Simiae innoteſcat.

Osteologia ex Hippocratis libris eruta, collecta, & in ordinem digesta.

Per IOANNEM RIOIANVM Filium, &c.

427

Philatris Lectoribus & Auditoribus suis, IOANNES RIOIANVS.

Cum me Phœbus amet, Phœbo sua semper apud me Munera sunt Ossa, & suae rubens hyacinthus.

429

Cap. 1. An Galenus Auctor huius Libri?

431

Cap. 2. De Inscriptione Libri.

432

Cap. 3. Quod Galenus in rebus Anatomicis, ceteris preferendus est, & quid in eius lectione Anatomica sit obseruandum?

433

Cap. 4. De quibus Ossibus agit Galenus.

436

Cap. 5. An ab Osteologia incipienda Anatomie.

ibid.

Cap. 6. Osteologia diuisio.

438

Cap. 7. Commentarius in Praefationem huius Libri.

ibid.

De Qualitatibus Ossium.

439

An ad Medicum pertineat Osteologia?

ibid.

An ad Fracturas, & Luxationes curandas tantum necessaria Osteologia?

440

Ossis definitio.

ibid.

Cur Ossa durissima?

441

Cur Ossa siccissima?

442

Cur Ossa terrestria, & an sentiant?

ibid.

De generatione Ossium, ac imprimi de Materia.

443

De Ossium diuisione.

445

Cur Ossa sint caua?

446

Cur Ossa sint medullosa?

ibid.

De Epiphysi.

447

De Apophysi.

448

Quid manus, eiusque diuisio?

449

Quid Articulis?

ibid.

Doctrina Galeni de Articulis accuratè explicatur.

450

Species Diarthroses & Synarthroses.

452

De Gynglymo particularis Observatio.

453

De Trochoide Articulo.

454

Particularis explicatio Capitis, Cernicis &

6

Lib. 6. De Fœtu Humano.

Praefatio 362.

Cap. 1. Fœtus cognitus quomodo disci & doceri debeat?

364

Cap. 2. De constitutione partium Genitalium in muliere gravidâ.

ibid.

Cap. 3. De Cystledonibus.

367

Cap. 4. De Membranis Fœtus.

369

Cap. 5. De Vasis Umbilicalibus.

376

Cap. 6. De Conformatione Fœtus.

380

Cap. 7. De Naturalibus Facultatibus.

386

Cap. 8. De Vitali facultate, & admirabili structura Vasorum Cordis in Fœtu.

389

An Fœtus extrinſea matris tamdiu superflet fuerit, ut post triginta sex horas ab interitu matris, vivus super impetu ab ergastulo suo erumpere possit?

398

Obiectiones quæ moueri possunt, si quallio aliter explicetur.

399

Cap. 9. De Facultatibus Animalibus.

400

Cap. 10. De Sinu Pueri in Ptero.

401

Cap. 11. De Partu.

403

Cap. 12. Vtrum in partu Ossa Pubis distrahantur?

404

Lib. 7. Cap. 1. Videntis Animalis Observationes Anatomica.

413

Cap. 2. Conclusio Operis,

Com alione gratiarum ad Deum, & Exhortatione ad studium Anatomicum, quod non potest comparari sine Praeceptore. Ingratitudo discipulorum erga Praeceptores. Lan-

413

Index Librorum & Capitum

<i>cauitatū in Osibus.</i>	ibid.	<i>ostium, De Metacarpo, & Digitis.</i>	512
<i>Synarthrosis species figillatim enarrantur.</i>		Cap. 26. <i>Commentarius in Caput decimum nonum, De Osibus cum Osse Sacro commissis.</i>	512
455.		Cap. 27. <i>Commentarius in Caput vigesimum, De Crure.</i>	514
<i>De Symphyse.</i>	456	Cap. 28. <i>Commentarius in Caput vigesimum secundum, De Tibia.</i>	516
<i>Articulatorum doctrina, ex Aristotele.</i>	459	Cap. 30. <i>Commentarius in Caput vigesimum secundum, De Mola.</i>	517
Cap. 8. <i>Commentarius in Caput primum Libri, ac imprimis de figura naturali, & de prauata Capitis.</i>	ibid.	Cap. 31. <i>Commentarius in Caput vigesimum tertium, De Pedis Osibus.</i>	518
<i>An pro varietate figurarum Capitis, futurarum numerus, & situs immutetur?</i>		Cap. 32. <i>Commentarius in Caput vigesimum quartum, De Pedis, & Digitis.</i>	520
462.		<i>De alius Officulis a Galeno pratermissis.</i>	521
<i>De Sutura Capitis.</i>	464	<i>De Sesamoides Officulis.</i>	523
<i>De Osibus crani.</i>	467	<i>De numero Ossium totius Corporis.</i>	ibid.
<i>Quid in Osibus Capiti Galenus omiserit, vel ignorauerit?</i>	472		
<i>De Canaliculis, & Osibus Auris interna.</i>	ibid.		
<i>De Cavitatibus Crani, nempe Fossis, Foraminibus, sinibus.</i>	474		
Cap. 9. <i>Commentarius in Caput secundum Libri.</i>			
<i>De Zygomate.</i>	476		
Cap. 10. <i>Commentarius in Caput tertium Libri, de Osibus maxilla superioris.</i>			
ibidem.			
Cap. 11. <i>Commentarius in caput quintum Libri.</i>			
<i>De Dentibus.</i>	479		
Cap. 12. <i>Commentarius in caput sextum, De Osibus Maxilla inferioris.</i>	485		
Cap. 13. <i>Commentarius in Caput septimum, De Rachis.</i>	487		
Cap. 14. <i>Commentarius in Caput octauum, De Spondylis Colli.</i>	489		
<i>De Motu Capitis.</i>	ibid.		
<i>Reliqui Capitis explicatio.</i>	492		
Cap. 15. <i>Commentarius in Caput nonum, De Spondylis dorso.</i>	493		
Cap. 16. <i>Commentarius in Caput decimum, De Lumborum Spondylis.</i>	495		
Cap. 17. <i>Commentarius in Caput undecimum, De Osse Sacro.</i>	496		
Cap. 18. <i>Commentarius in Caput duodecesimum, De Coccyge.</i>	497		
Cap. 19. <i>Commentarius in Caput decimum tertium, De Thoracis Osibus, Costis & Hemo.</i>	498		
Cap. 20. <i>Commentarius in Caput decimum quartum, De Omoplaistis.</i>	502		
Cap. 21. <i>Commentarius in Caput decimum quintum, De Clauis.</i>	504		
Cap. 22. <i>Commentarius in Caput decimum sextum, De Brachio.</i>	505		
Cap. 23. <i>Commentarius in Caput decimum septimum, De Cubito.</i>	506		
Cap. 24. <i>Commentarius in Caput decimum septimum, De Carpo.</i>	509		
Cap. 25. <i>Commentarius in Caput decimum</i>			

Cap. 1. <i>Simia Osteologia, siue Ossium Simia & Homini comparatio.</i>	525
Cap. 2. <i>De Capitis & Faciei Osibus.</i>	526
Cap. 3. <i>De Spina, & Osibus ei adnexis.</i>	527
Cap. 4. <i>De Artibus superioribus.</i>	529
Cap. 5. <i>De Artibus inferioribus.</i>	ibid.
Cap. 6. <i>De Sesamoidis.</i>	530

Osteologia Corporis Humani, ex Hippocrate collecta, & in ordinem digesta
Per IOANNEM RIOLANUM, Professorem Regium Anatomicum. 531
Præfatio, quæ docet Hippocratem periculum fuisse Anatomicum, & ab eo vniuersam Anatomiam descriptam. 532
Osteologia Corporis Humani, ex Hippocrate collecta, & in ordinem digesta. 533

Opuscula Anatomica noua, quæ nunc primum in lucem prodeunt.
Initiaturatio maxima Physica & Medicinæ, per nouam doctrinam.
De motu Circulatorio sanguinis in Corde.
Accessere Nota in Ioannis Valli duas Epistulas de Circulatione sanguinis,
Authore IOANNE RIOLANO, Professore Regiorum Decano.
Eiusdem Animaduersiones in Historiam Anatomicam Andreæ Laurentij.

Anthropographia: D. Ioannis Riolani.

<i>In Theatrum Anatomicum Caspari Bauhini.</i>	<i>& in medicando plane perniciofa.</i>	574
<i>In Librum Anatomicum de Fabrica Humana Andreæ Spigelij.</i>	Cap. 15. <i>Opinio RIOLANI, de Circulatione sanguinis.</i>	577
<i>Ad Institutiones Anatomicas Caspari Bartholini.</i>	Cap. 16. <i>Nova opinio de Circulatione sanguinis.</i>	579
<i>Ad Anatomica Caspari Hofmanni.</i>	Cap. 17. <i>Nova Circulationis accuratior explicatio.</i>	ibid.
<i>In Syntagma Anatomicum Ioannis Veslingij.</i>	Cap. 18. <i>Utilitas Circulationis declaratur.</i>	580
<i>In Tractatum de^o Diaphragmate Æmilij Parisani.</i>	Cap. 19. <i>Quasnam utilitates Medicus percipiat ad bene medendum, ex Circulatione sanguinis?</i>	582
<i>De Monstro nato Lutetia, Liber iam pridem editus.</i>	Cap. 20. <i>Quod vera Methodus medendi per venæ sectionem, ex Circulatione sanguinis clarius innotescit, & obiter demonstratur, quantum Hippocrati & Galeno visitata fuerit.</i>	584
<i>Manus ad Lectorem.</i>	Cap. 21. <i>Ex Circulatione sanguinis facilius determinatur tempus, & utilitas purgationis.</i>	595
<i>Questio Medica quodlibetarius disputationibus manè discutenda in Scholis Medicorum, die Iouis 9. Februarij,</i>	Cap. 22. <i>Circulationis sanguinis utilitas confirmatur ad usum medendi.</i>	596
<i>M. IOANNE RIOLANO, Doctore Medico, Moderatore, &c.</i>	Cap. 23. <i>Ex Circulatione sanguinis delictus venarum in mittendo sanguine facilius innotescit.</i>	597
<i>An propter motum sanguinis in Corde Circulatorium, vitanda Galeni methodus medendi?</i>	Cap. 24. <i>Per Circulationem sanguinis dignoscitur, quomodo sit minuendus ad curationem morborum, an per venæ sectionem, vel diætā, & quamvis sit tutior?</i>	599
<i>Objectiones contra Thesim.</i>	Caput ultimum. <i>Anacephalesis huius Tractatus.</i>	601
<i>Probationes Thesim.</i>		
Cap. 1. <i>Circulationis sanguinis primus Author & Inuentor Harueus, quibam assertores huius opinionis, quāquam aduersarij? Riolanus nouam circulationem inuenit.</i>		553
Cap. 2. <i>Probatio Circulationis sanguinis.</i>		554
Cap. 3. <i>Circulatio sanguinis quodammodo cognita Aristoteli, eiusque sectatoribus, imò ante Aristotelem, Hippocrati, & alijs, non fuit incognita.</i>		555
Cap. 4. <i>Examen, & Refutatio opinionis Haruei.</i>		558
Cap. 5. <i>Circulationem sanguinis non fieri per Pulmones.</i>		560
Cap. 6. <i>Impossibilis Circulatio sanguinis ab arterijs effusa in carnes extremarum partium, & à venis exsucta, neque in die naturali, ter aut pluries perficitur, Eruditi Præmissis refutatio expenditur.</i>		564
Cap. 7. <i>Examen opiniois Vallæi.</i>		565
Cap. 8. <i>Examen opiniois Contringij.</i>		566
Cap. 9. <i>Examen opiniois Cartelij. ibid.</i>		
Cap. 10. <i>Examen opiniois Plempij.</i>		567
Cap. 11. <i>Examen opiniois Leichneri.</i>		568
Cap. 12. <i>Opiniones Cornelij ab Hogelande, & Henrici Regij examinata. ibidem.</i>		
Cap. 13. <i>Fortunij Liceti de Circulatione sanguinis in Corde, opinio noua examinata.</i>		570
Cap. 14. <i>Quod sit impossibilis sanguinis totius Circulatio, & sæpius in die repetita,</i>		

IOANNIS RIOLANI Nota ad duas Epistolas Ioannis Vallæi. 605

A Nimaduersiones in Opus Anatomicum Andreæ Laurentij. 623
Ad Lectorem Prefatio, ibid. & seq. paginis usque ad pag. 684

A Nimaduersiones in Theatrum Anatomicum Caspari Bauhini.
Prefatio. 685, & seq. paginæ usque ad pag. 734

A Nimaduersiones in Librum Anatomicum de Fabrica humana Adriani Spigelij, Præfatoris Anatomici Patavini. 735. & seq. paginæ usque ad pag. 757

Index Librorum & Capitum

<i>causati in Osibus.</i>	ibid.	<i>octauum, De Metacarpio, & Digitis.</i>	512
<i>Synarthrosus species sigillatim enarrantur.</i>	411.	Cap. 26. <i>Commentarius in Caput decimum nonum, De Osibus cum Offe Sacro commissis.</i>	512
<i>De Symphyse.</i>	416	Cap. 27. <i>Commentarius in Caput vigesimum, De Crute.</i>	514
<i>Articularum doctrina, ex Aristotele.</i>	419	Cap. 28. <i>Commentarius in Caput vigesimum secundum, De Tibia.</i>	516
Cap. 8. <i>Commentarius in Caput primum Libri, ac imprimis de figura naturali, & deprauata Capitis.</i>	ibid.	Cap. 30. <i>Commentarius in Caput vigesimum secundum, De Mola.</i>	517
<i>An pro varietate figurarum Capitis, futurarum numerus, & situs immutetur?</i>	462.	Cap. 31. <i>Commentarius in Caput vigesimum tertium, De Pedis Osibus.</i>	518
<i>De Sutura Capitis.</i>	464	Cap. 32. <i>Commentarius in Caput vigesimum quartum, De Pedis, & Digitis.</i>	520
<i>De Osibus crani.</i>	467	<i>De aliis Oficulis à Galeno pratermissis.</i>	521
<i>Quid in Osibus Capitis Galenus omiserit, vel ignorauerit?</i>	473	<i>De Sesamoides Oficulis.</i>	523
<i>De Cavitatibus, & Osibus Auris interna.</i>	ibid.	<i>De numero Oficium totius Corporis.</i>	ibid.
<i>De Cavitatibus Crani, nempe Foris, Foraminibus, sinibus.</i>	474		
Cap. 9. <i>Commentarius in Caput secundum Libri.</i>	476		
<i>De Zygomate.</i>	476	C ap. 1. <i>Simia Osteologia, sive Ossium Simia & Hominis comparatio.</i>	525
Cap. 10. <i>Commentarius in Caput tertium Libri, de Osibus maxilla superioris.</i>	ibidem.	Cap. 2. <i>De Capitis & Faciei Osibus.</i>	526
Cap. 11. <i>Commentarius in caput quintum Libri.</i>	487	Cap. 3. <i>De Spina, & Osibus ei adnexis.</i>	527
<i>De Dentibus.</i>	479	Cap. 4. <i>De Artubus superioribus.</i>	529
Cap. 12. <i>Commentarius in caput sextum, De Osibus Maxilla inferioris.</i>	485	Cap. 5. <i>De Artubus inferioribus.</i>	ibid.
Cap. 13. <i>Commentarius in Caput septimum, De Rachis.</i>	487	Cap. 6. <i>De Sesamoides.</i>	530
Cap. 14. <i>Commentarius in Caput octauum, De Spondylis Colli.</i>	489		
<i>De Notu Capitis.</i>	ibid.	O steologia Corporis Humani, ex Hippocrate collecta, & in ordinem digesta	
<i>Reliqui Capitis explicatio.</i>	492	<i>Per IOANNEM RIOLANVM, Professorem Regium Anatomicum.</i>	531
Cap. 15. <i>Commentarius in Caput nonum, De Spondylis dorsi.</i>	493	<i>Præfatio, quæ docetur Hippocratem peritum fuisse Anatomicum, & ab eo uniuersam Anatomiam descriptam.</i>	532
Cap. 16. <i>Commentarius in Caput decimum, De Lumborum Spondylis.</i>	495	<i>Osteologia Corporis Humani, ex Hippocrate collecta, & in ordinem digesta.</i>	533
Cap. 17. <i>Commentarius in Caput undecimum, De Offe Sacra.</i>	496		
Cap. 18. <i>Commentarius in Caput duodecimum, De Coccyge.</i>	497	O puscula Anatomica noua, quæ nunc primum in lucem produnt.	
Cap. 19. <i>Commentarius in Caput decimum tertium, De Thoracis Osibus, Costis & Hænis.</i>	498	<i>Inlauratio magna Physicæ & Medicinæ, per nouam doctrinam.</i>	
Cap. 20. <i>Commentarius in Caput duodecimum, De Omoplastis.</i>	502	<i>De motu Circulatorio sanguinis in Cordis.</i>	
Cap. 21. <i>Commentarius in Caput decimum quintum, De Clauis.</i>	504	<i>Accessere Nota in Ioannis Valli duas Epistolas de Circulatione sanguinis,</i>	
Cap. 22. <i>Commentarius in Caput decimum sextum, De Brachio.</i>	505	<i>Authore IOANNE RIOLANO, Professore Regiorum Decano.</i>	
Cap. 23. <i>Commentarius in Caput decimum septimum, De Cubito.</i>	506	<i>Eiusdem Animaduersiones</i>	
Cap. 24. <i>Commentarius in Caput decimum octimum, De Carpo.</i>	509	<i>In Historiam Anatomicam Andreæ Laurentij.</i>	
Cap. 25. <i>Commentarius in Caput decimum</i>			

Anthropographia: D. Ioannis Riolani.

<i>In Theatrum Anatomicum Caspari Bauhini.</i>	<i>& in medicudo planè perniciofa.</i>	574
<i>In Librum Anatomicum de Fabrica Humana Andreæ Spigelij.</i>	Cap. 15. Opinio RIOLANI, de Circulatione sanguinis.	577
<i>Ad Institutiones Anatomicas Caspari Bartholini.</i>	Cap. 16. Noua opinio de Circulatione sanguinis.	579
<i>Ad Anatomica Caspari Hofmanni.</i>	Cap. 17. Noua Circulationis accuratio explicatio.	ibid.
<i>In Syntagma Anatomicum Ioannis Veslingij.</i>	Cap. 18. Utilitas Circulationis declaratur.	580
<i>In Tractatum de Diaphragmate Æmilij Parisani.</i>	Cap. 19. Quasnam utilitates Medicus percipiat ad bene medendum, ex Circulatione sanguinis?	582
<i>De Monstro nato Lutetia, Liber iampridem editus.</i>	Cap. 20. Quod vera Methodus medendi per vena sectionem, ex Circulatione sanguinis clarius innotescit, & obiter demonstratur, quantum Hippocrati & Galeno uisitata fuerit.	584
<i>Monitis ad Lectorem.</i>	Cap. 21. Ex Circulatione sanguinis facilius determinatur tempus, & utilitas purgationis.	595
<i>Quæstio Medica quodlibetorum disputationibus manuè discutienda in Scholis Medicorum. die Iouis 9. Februarij.</i>	Cap. 22. Circulationis sanguinis utilitas confirmatur ad usum medendi.	596
<i>M. IOANNE RIOLANO, Doctore Medico, Moderatore, &c.</i>	Cap. 23. Ex Circulatione sanguinis delendus venarum in mittendo sanguine facilius innotescit.	597
<i>An propter motum sanguinis in Corde Circulatorium, mutanda Galeni methodus medendi?</i>	Cap. 24. Per Circulationem sanguinis dignoscitur, quomodo sit minuendus ad curationem morborum, an per vena sectionem; vel diatam, & quamam via sit tutior?	599
<i>Obiectiones contra Thefim.</i>	Caput vltimum. Anacephalesis huius Tractatus.	601
<i>Probatones Thefim.</i>		
Cap. 1. Circulationis sanguinis primus Author & Inuentor Harueus, quinam asseriores huius opinionis, quinam aduersary? Riolanus nouam circulationem inuenit.		513
Cap. 2. Probatio Circulationis sanguinis.		514
Cap. 3. Circulatio sanguinis quodammodo cognita Aristoteli, eiusque sectatoribus, imò ante Aristotelem, Hippocrati, & alijs, non fuit inuenta.		555
Cap. 4. Examen, & Refutatio opinionis Ruui.		558
Cap. 5. Circulationem sanguinis non fieri per Pulmones.		560
Cap. 6. Impossibilis Circulatio sanguinis ab arterijs effusi in carnes extremarum partium, & à venis exsucti, neque in die naturalis, ser aut pluries perficitur, Eraditi Primærosij refutato expenditur.		564
Cap. 7. Examen opinionis Vallzi.		565
Cap. 8. Examen opinionis Conringij.		566
Cap. 9. Examen opinionis Cauteij. ibid.		
Cap. 10. Examen opinionis Plempij.		567
Cap. 11. Examen opinionis Leichneri.		568
Cap. 12. Opiniones Cornelij ab Hogelande, & Henrici Regij examinata. ibidem.		
Cap. 13. Fortunij Liceti de Circulatione sanguinis in Corde, opinio noua examinata.		570
Cap. 14. Quod sit impossibilis sanguinis totius Circulatio, & sæpius in die repetita,		

IOANNIS RIOLANI Nota ad duas Epistolas Ioannis Vallzi. 605

A Nimaduersiones in Opus Anatomicum Andreæ Laurentij. 613
Ad Lectorem Prasatio, ibid. & seq. paginis vsque ad pag. 684

A Nimaduersiones in Theatrum Anatomicum Caspari Bauhini. Prasatio. 685, & seq. paginæ vsque ad pag. 734

A Nimaduersiones in Librum Anatomicum de Fabrica humana Adriani Spigelij, Professoris Anatomici Patavini. 735. & seq. paginæ vsque ad pag. 757

Index Librorum & Capitum Anthropographiæ, &c.

A Nimaduersiones in Caspari Bartholini, <i>Doctoris Medici, Theologi, ac Professoris Regij Institutiones Anatomicae.</i>	758	P refatio.	831
Ad beneuolum Lectorem meum. Præloquium Bartholini Patris.	759. & seq. paginis usque ad pag.	Cap. 1. <i>An ista gemella debeant in censa monstrorum haberi.</i>	832
	788	Cap. 2. <i>Differentia monstrorum.</i>	835
		Cap. 3. <i>Causa monstrorum secundum speciem.</i>	ibid.
		Cap. 4. <i>De causis monstrorum inuidius.</i>	837
		Cap. 5. <i>An Gemelli unica anima, an sua cuique?</i>	838
		Cap. 6. <i>An Romanorum præcepto monstra interfici debeant?</i>	839
		Cap. 7. <i>An monstra aliquid triste minentur?</i>	840

A Nimaduersiones in Caspari Hofmanni <i>Anatomica, suis Institutionibus Medicina inserta.</i>	789. & seq. paginis usque ad pag.	804
--	-----------------------------------	-----

A Nimaduersiones in <i>Synagmæ Anatomicæ Ioannis Vellingij, Professoris Anatomici Patuini.</i>	
P refationis consideratio.	805. & seq. paginis usque ad pag.
	829

D e <i>Monstro nato Lutetia anno Domini 1605. Disputatio Philosophica.</i>	830
---	-----

I OANNIS RIOLANI <i>Anatomes & Pharmacia Professoris Regij & Decani</i>	
<i>Spongia Alexiteria aduersus virulentos tactus</i>	
<i>Emilij Parisani, sine Responsio ad singulare certamen de Diaphragmate.</i>	845

FINIS.





IOANNIS RIOLANI

ANTHROPOGRAPHIÆ LIBER PRIMVS.

HYMANI CORPORIS COMMENDATIO.

CAPVT PRIMVM.



QVOD *Pericles Atheniæ Orator insignis*, quoties in publicum ibat di-
sturus, à Diis precari solitus erat, *Ne quid ingratum aut inuisum apud*
vicinos auditorum suorum aures, & in civitate Atheniensium præseret, idem
meliori iure licebit mihi in hoc celeberrimo doctissimorum homi-
num confesso, ac in Scholis Medicis verba faciendo exoptare, & à
Deo summis precibus exorare, ne quid absurdum & inutile v:stis
studiis eloquar, & ostendam, quod vobis tedium, mihi dedecus adferat. Nam, vt
inquit *Tullius*, magnum est suscipere ac profiteri, se, omnibus silentibus vnum, ma-
ximis de rebus magno in consuetu hominum audiendum; cum sit ferè nemo, qui
non acutiùs & accuratiùs vitia in dicente, quàm recta videat. Itaque quod pictori-
bus accidere solet, id ego cum *Critia*, apud *Platonem* reformido, ne mihi ad humani
corporis fabricam describendam accedenti eveniat. Illi cum penicillo aut res di-
uinas efformant, aut terram pingunt, vel montes, vel flumina, vel sylvas, cælumque
vniuersum delineant, abunde muneri suo satisfacisse iudicantur, si vel exiguum eaz ù
gerum imaginem expresserint, neque à nobis eorum opera diligenter examinantur,
aut severiori censura notantur: ut si ad nostrorum corporum similitudinem effingen-
dam manum adhibuerint, tum demum propter plurimam nostrarum rerum cogni-
tionem, & familiarem earum animadversionem, vel leuissimos errores acutè digno-
scimus, seuerique sumus censores aduersus eos, qui non satis singula linamenta
effinxere. Idem etiam evenit illis, qui de humanis rebus scribere profiterentur; nam
de diuinis, cæterisque rebus natura constantibus mediocriter esse loquentur, te-
nentque earum cognitionem tradidisse satis esse putatur. At ea, quæ ad nostra cor-
pora pertinent, exactè solemus examinare, & si quid non dico peccatum, sed mi-
nus quàm res postulat appositè dictum, aut accuratè explicatum liberius reprehen-
dere. Quare si ea quæ meditamur scribere *de hominis natura, & structura*, non satis
pro rei dignitate exposuimus, veniam & excusationem aliquam meremur, quoniam
res humanæ non quidem per se, & ex sua natura, sed ex hominum opinione difficul-

Ex corpora re
verfacioni.
linguam
habui in
publicis A-
natum.
Proposuit
ori dicit id.

ter explicari possunt. Accedit eius rei de qua agitur, nempe corporis humani cognoscendi difficultas maxima, cum nemo adhuc hominem intus & in cute perfectè notum habuerit, & accuratè descripserit. *Athenes* situm aliquem extra terram optabat, ita sperans se totam terram moturum: aiebat enim, *Da mihi vobis pedem figam, & terram totam monachos quamdiu stabo in terra, contra eam nullam habeo potestatem.* Ex *Aristoteles* cognoscendam facultatem ea re, quam cognitura sit spoliata esse voluit, vt rectius cognoscat: idèoque Philo Iudæus, lib. de *Opificio Mundi*, scribit animum res omnes externas intelligere, seipsum cognoscere non posse. Propterea nihil sapientibus visum est difficilius quàm seipsum cognoscere, ac proinde nulla tractatio subtilior, atque præstantior, quàm de Anatome hominis: idèmq; possum vobis reponere, quod *Simonides* respondit *Pausania*: Interrogatus ille vt aliquid magnum enunciaret, respondit, *memineris te hominem esse.* Ac si diceret, se nihil magnum & admirabile supra hominem effari potuisse. Liceat igitur *Salomonis* omnium sapientissimi verba vîsurpare: *Magna res est homo, & res pretiosa vir misericors.*

Quidnam magna res homo? cum sis miraculum mundi, ac delicia orbis terrarum, germen immortalitatis, Microcosmus, imò Megalocosmus, mundi Dominus atque Agens, Epitome seu abbreviata tabula rerum creaturarum, finis diuinarum operum, meta laboris Dei in creatione mundi, Angelarum socius, Horizon, Nexus, perfectio, & finis omnium creaturarum, imago & similitudo diuina maiestatis, Solium omnipotentis Dei, hares celestium thesaurorum.

Laudatur
corpus hu-
manum ex
opifice.

Qui de re Anatomica scribunt, ab Hominis commendatione præstantur, eumque laudant ex animi dotibus, quibus speciali naturæ priuilegio cæteris animantibus præcellit. At cum nobis mortuus homo, non viuens, dissecandus exponatur, cadauer humanum celebrare, eiusque dignitatem demonstrare atque venerari proposui. Nec verebor *Cyrilli* reprehensionem, qui Nestorium tanquam ἀνθρώπου λατρεῖν, hominiscalam damnauit. Forſan etiam φιλοσοφώτατος; audiam & appellabor.

Homo duabus naturis, essentiâ multum inter se disparibus constat, *Animâ & Corpore*: ille vnitus corpori, vitæ omniumque actionum author est, atque adeo hominis forma & perfectio: nec enim tu is es, quem forma ista declarat, (inquiebat *Cicero*, lib. de *Somnio Scipionis*) sed animus cuiusque is est quisque, non ea figura quæ digito demonstratur. Cum autem sit spiritus à Deo delibatus, terrenum hoc corpus suis radiis illustrans, dignum efficit, quod Deus habiter, illudque requirat, separatus à corpore cadauer relinquit telluris inuile pondus, adeoat quicquid in laudem hominis à veteribus præclare dictum fuit, id totum animo conuenire videatur. Ergone cadauer humanum sine honore contemptum iacebit, ipsi etiam hominibus inuisum? Sicine palatium spernitur propter Regis absentiam? Tum enim licet inspicere domum, & penitiores recessus iustrare, scire iuuat quid in singulis locis agatur, animumque picturis, & peristromatis pascere, summa delectatio est. Quandiu Animus in corpore moratur, huius ambitum, & superficiem duntaxat intuemur, illo abeunte corporis latebras adire, & inquirere negligemus? Nos præsertim Medici, qui fartum tectum hoc ædificium tueri suscipimus? In cuius contemplationem eò diligentius incumbendum, quod maior est illius dignitas. Superbi alicuius palatii fabrica laudatur ab Architecti industria. Materialibus, vt pote si sint parietes è pario lapide, vel marmore structi, & contignationes deauratæ, atque optima ædificij forma, & partium conuenienti dispositione: Nostrum corpus à summo Opifice Deo Opt. Max. constructum fuit & exornatum, animo diuinitatis furculo suscipiendo; cuius domicilium cum summus ille Architectus, qui verbo, & nuda totam mundi machinam creauerat, formare voluit, in consilium, & operis societatem sacrosanctam Trinitatem adhibuit. Tantæ molis erat humanum corpus condere, & sedem animi maiestate dignam præparare. Nec malè Arabs quidam dixit, existimare se, plus operæ opificem Naturæ in vnico homine, quàm in vniuerso condendo posuisse, ex *Pico Mirandulano*. Vnde intelligitur quantum immane desipuerint *Patriciani*, *Paterniani*, *Eunomiani*, & *Ethioprocoptæ* hæretici, qui hominis conditorem & fabricatorem, non Deum, sed dæmonem fuisse impiè sustinuerunt. Quasi verò nefarius, & coniuratus naturæ hostis, à quo nil rectum, & laudabile potest proficisci, tam admirabilis opificij Architectus esse potuerit. Præter sacre Scripturæ testimonium, quod extat cap. 6. *Genesis*, *Propheta* regius, *Psalm.* 138. se formatum à Deo fatetur & agnoscit. *Dominus tu formasti me, & posuisti super me manum tuam. Mirabilis facta est scientia tua ex me, confusata es, & non potero ad eam. Piusima*

matrem dum natorum suorum constantiam in tormentis videt, tandem in has voces erumpit, *lib. 2. Mathebarum, cap. 7. Nescio qualiter in vtero meo apparuisse, neque cum ego spiritum & animam datus videri, & vitam, & singularem membra non ego ipsa compigi, sed mandis creatus qui firmant hominis naturam, quaque omnium inuenit originem. Antiqui Poetæ qui pariter erant Philosophi, quum nostri corporis officium admirabile cernerent, ab omnibus Diis conditum fuisse pronunciarunt. Tiberianus in Prometheus dicit Deos singulares sui partes homini contribuisse, quas sibi vendicent, suæque tutelæ proprias agnoscant: Caput Ioui defecit, Neptuno pectus, cinctum Marti: quod spectasse putant Homerum in Agamemnone describendo.*

Ομοίαν τῇ ἀσθύνῃ ἱκανὸν δὲ ὑπερκαρπύῃ,

Ἀπὸ δὲ τοῦ τοῦ, τοῦ τοῦ δὲ τοῦ τοῦ τοῦ.

Quapropter iniqui sunt Dei operum æstimatores, qui corpus humanum & operum suorum æstimationem, & inordinatum concursu constanti sustinent, cum in eo nihil fortuitum, & inordinatum deprehendatur. Galenus, *lib. 3. de v'su part. cap. 10.* stolidum, & amantem illum indicauit, qui Naturam in partibus sæcum excretionis dicatis accusabat, quod è lecto surgere alui exonerandæ causâ molestum esset: fatius & optabilius fuisse, hominem ita componi, si solum pedem porrigens excrementa per ipsum excreneret. Istitis operum Dei calumniatoribus centum annos Galenus concedebat, *lib. 7. de v'su part. cap. 16.* vt situm, figuram, & structuram alicuius partis immutarent, neque dubitaret futurum tandem, vt inimitabilem Dei sapientiam agnoscerent, nec id aliter fieri posse faterentur. Natura, inquit Arist. *lib. 8. Meteor. nihil* vquam sine ordine meditata est, vel effecit: & *lib. de incessu animal. c. 2.* scribit Naturam nihil fecisse frustra, sed semper ea, quæ cuicunque animalium generi conueniebant, id quod optimum erat, quamobrem si melius hoc modo, ita Natura fecisset. Non igitur tam apta, & elegantis partium dispositio, fortunæ temeritati tribuenda: ordinatoris fortæ opificum est, Dei Opt. Max. quem in tanti operis inspectione suspicere & venerari conuenit. Nam si *Polydorus* ab omnibus laudatur, ait Galenus, *lib. 17. de v'su part. cap. 1.* propter elegantiam statum, quæ partium tantum externarum proportionem, & ornatum referebat, & tamen *Cæca* appellari meruit, quæ veneratione nostri corporis Conditorum profectumur? quibus laudibus huius statum Archetypum effremus, cuius structura admirabilis non tantum in partibus externis, verumetiam in interioribus visceribus exquisitam proportionem atque summum decus ostendat, vt nescias vtrum in ea maior vel utilitatis habita ratio, quam decoris. *Praxiteles aut Phidias*, aut alius cuiusvis statuarii foris tantum materiam ornabant, quæ scilicet parte licebat eam attingere internas verò partes illaboratas reliquerunt: sed Natura non ita operatur, ossis partem quamlibet os efficit, & carnis carnem, & adipis adipem. Nulla siquidem pars corporis existit quæ ab ea non tangatur, aut quæ operam eius cultumque effugiat, auctore Galieno, *lib. 2. de naturalibus facultatibus.* Atque si velis scire quantum Anatomici Medici artem Naturæ omnes admirati fuerint, & quam piceclare de Deo artifices fenserint, eundem Galenum leges, *cap. penultimum, lib. 9. de placitis Hipp. & Platonis.*

Materia quam ad huius opificii compositionem summum ille Opifex vsurpauit, non è marmore aut Pariò lapide quæ sita fuit, sed è limo propter opificis fastigium, auro & gemmis pretiosiore. *Delatades Syriani* in insignis statuarii referente Arist. *lib. 1. de partibus animalium, cap. 5.* ex argilla præstantissima simulachra fingebat, quæ propter artificis ingenium & peritiam, quibuslibet aliis ex auro compositis præferiebantur, materiam superabat opus. Idiotas, inquit Galenus, reddit attonitos Iouis Olympici ornata vndeque mirabilis, ebur lucidum, aurum multum, magnitudo totius statum, quam si ex luto factam viderint, insulatum præteribant: At non item peritus artifex, laudabit Phidiam lignum & lutum tractantem, nec materiam pretium admirabitur, sed artificij pulchritudinem considerabit. Quod si limi nomen tibi fordeat, ecce carnem ex manu, & affatu Dei gloriosiore, quæ limi sordidate deposita animi ornamenta suspicitione non diligenter Deo, ait *Tertullianus, lib. de resurrex. carnis*, si Scythicas, & Indicas gemmas, rubentis maris grana candentia, non plumbo, non ære, non ferro, ne argento quoque obloqueas, sed electissimo, & insuper operosissimo defecrobes auro, & vnguentis pretiosissimis quibusque vasculorum prius congruentiam cures, atque perfectæ ferroginis gladii vaginarum adæques dignitatē. Deus verò animæ suæ vmbra, spiritus sui auram, oris sui operam vilissimam alicui commiserit capulo, & indi-

Vide Pub:
grosius
lib. 1. Me-
taph.
lib. 1. cap. de
Pelle & Te-
dyde.

Ex necessitatē

Vide de As-
sistum cum,
a) part. su-
in cap. 1.
Gruic. vid-
ca forma-
toris, in ma-
teria nobili
corpus pre-
stantissimū
esse lectum.

gnè collocando vtique damauerit. *Rabini & Cabaliffa* scribunt Deum Angelis creationem hominis de limo reuelasse, & quomodo spiritu insufflato ipsum animasset: Tum omnes Angeli præter Diabolum hominem adorarunt, tanquam caelestem, Deus verò interrogauit Diabolum cur opus manuum suarum adorare recusaret, quia inquit, *ego sum ille præstantior, Tu cum ex limo, me verà ex igne creasti*. Exinde Angeli mali deuoluti sunt in Sazara formam, quia Dei mandato adorandi Adamum obtemperare noluerunt: quæ omnia recitat Doctissimus Gaulminus, *Notis ad lib. de vita & morte Moysi*. Quod videtur desumptum ex Alcorano, *Azara 49*. Vbi narrat Angelos à Deo creatos fuisse, vt Adamum adorarent, quod cum recusassent præstare, mutatos fuisse in Dæmonas. Ea fuit etiam opinio sanctorum Patrum. *E. Rasilus* in quadam homilia, sic loquitur, *Vidit Diabolus honorem hominis & inuidit, Vidit hominem sibi prælatum, quia iussu Dei productus, ille verò manibus Dei formatus est. Sed creatus est propter hominem, homo verò propter Deum, ut ipse in opere suo glorificaretur, Sed verà ut hominibus inferiret.*

Ex foca.

Nec satis est nosse materiam edificij, forma etiam specdanda est, quæ ob exactam partium symmetriam, regula & mensura statuitur: vnde scripsit *Hippocrates lib. 1. de artic.* homines iustum obinuisse corpus. Etenim in humano corpore *Circularis Figura* omnium absolutissima manifestè deprehenditur, homine resupino, manibus pedibusque expansis. Nam si circini pedem alterum, in vmbilico collocaueris, altero pede circumagente rotundationem, vtrarumque manuum, & pedum extremos digitos attinges. In ea quoque quadrata figura inuenitur, si quod à pedibus imis ad summum caput mensum est, ad manus expansas relatum fuerit: Ideo cum causa constituisse videntur antiqui, vt in operum perfectionibus, singulorum nostri corporis membrorum ad vniuersam figuræ speciem habeant commensus exactiorem: vt cum in omnibus operibus ordines traderent, id maxime in ædibus Deorum obseruare voluere, quibus operum laudes, & culpæ æternæ solent permanere. Sic feruat *Templum Salomonis*, ad exemplar humani Corporis conditum, & *Arcam Noë* ex fabrica nostri corporis acceptam fuisse. Humani quippe corporis longitudo à vertice, vsque ad vestigia fœces tantum habet, quantum latitudo, quæ est ab vno latere ad alterum latus, & decies tantum quàm altitudo, quæ secundum mediastini longitudinem mensuratur. Vnde facta est *Arca* trecentorum in longitudine cubitorum, & quinquaginta in latitudine, & triginta in altitudine. Mensurarum quoque rationes, quæ sunt in omnibus operibus necessariæ, ex corporis membris desumptæ fuere, vti digitus, palmus, pes, cubitus, & ex distributis in perfectum numerum qui decem dicitur, namque ex manibus denarius digitorum numerus.

Hoc testatur D. August. lib. 12. contra Faustum Manichæum c. 14.

Legendos Gecopius Beccatus in Gogitoma-chia

Ex Varrone.

Ex D. Ambrosio Hexameter. lib. 7.

Vide G. Veneri. Canon. 1. tom. 6. cap. 3. & quart. in Gen. 1. 1. 8.

Compositio est carcer & supplicium animæ.

Nec minorem parit admirationem *Corporis venustas, eiusque conueniens longitudo, vt neque enormis sit pœcrositas, neque vilis & abiecta paucillitas*: tum ipsa habitudinis suauis & grata, vt neque belluina vastitas horrore sit, nec gracilitas tenuis infirmitati. Admirabilis est Symmetria partium corporis inter se, quælibet enim pars cognatam alteram æquissima commensuratione respicit, vt *Pomponius Gauricus, & Albertus Durerus*, suis libris de *Proportionibus* demonstrarunt.

Porro dum meditor humani Corporis dignitatem, & præstantiam demonstrare, frustra laborarem, nisi peruersam eorum opinionem refellerem, qui *Corpus* dicunt animæ carcerem, & locum in quo animæ pœnas luant, & tormenta patiuntur. *Origenes* inter alia sui ingenij portenta obstinatè defendit, corpora humana à Deo creati, vt sint carceres & supplicij loca, in quæ iam olim creatæ animæ propter præcedentia peccata detrudantur, vnde corpus vinculum, *Anas* vocari docet, & *animæ* quasi *vincula* animæ sepulchrum. Hoc Pythagoreorū, & Platoniorum dogma fuit, vt videre est apud Platonem, in *Gorgia* & *Cratylis*, & apud Macrobiū Platonium, lib. 2. *comment. in somnium Scipionis*, cap. 12. vbi animam ideo *ψυχή* frigidam vocari refert, quod corporis consortio refrigeretur: eam ob rem scribit *Porphyrius Platonius*, omne corpus frigidū à minoribus Dijs creati, vt æstantē peccatis animā refrigerare queat. Propterea cœsus idē *Porphyrius*, teste D. Aug. lib. 22. de *Ciuit. Dei*, c. 26. Omne corpus animæ esse fugiendū, si beatū se esse cupit. Eundē errorem suis quoque temporibus maxime persuagatum *Cyrillus ipse* testatur, cuius propugnatores Patricianos Hæreticos fuisse docet *Isidorus*, qui eo tandē dementiae proue di sūt, vt affirmarent humanū corpus non à Deo, sed à diabolo fuisse conditū. Istorum hominum ineptias, & deliramenta facile est scripturæ sacræ testimoniis cōfutare atque peruincere. Scriptū est c. 26. *Gen. vers. 17. & 28. Creauit Deus hominem ad imaginem suam masculum & feminam: creauit eos, & benedixit eis, dixit-*

que ad eos creſcite et multiplicamini et replete totam terram. Quia ſi Deus primis
creaturis maximè benedictionis loco dedit, vt creſcerent et multiplicarentur, et
replerent totam terram, et ex eadem benedictione promiſit Abraham fore ſemen ſuum
vt ſtellas celi. Moſes vero maxima quæque populo ſuo cupiens, orat vt mille vici-
bus multiplicetur. Si Deus vix omne quod ſecerat, eſſe valde bonum, ſcilicet eſſe
noſtra corpora ſupplici et tormentorum loca eſſe, in quibus animæ pœnas luant, miri-
ficæ modis excrucietur. Sapientiores loca eſſe, in quibus philoſophi, qui, vt reſpondit D.
Hieronymus ad Parmeniam, et D. Auguſtinus, ſcilicet, de libero arbitrio, cap. 1. animam deſi-
derio corporis, in illud ipſe defendere atque reſidere voluerunt.

Scribet immemores super te conuena renisanti,

Ray(n) & incipians en cartara velle reueriti.

Atque *Rubini* scripsere animam à corpore separatam lugere suam separationem. *Per. Acad.*
te in ea fuere opinione. *Statui* de morte *Plauciz* pueri.

Florantemque animam super funera vidi.

Nonnulli ex antiquis philosophis existimantur humani corporis pulchritudinem, empyreos illos spiritus in terram coacasse, illoque potente illicio delinatos ad osculum & complexum corporum inuicatos fuisse, quos Diuina littere filios hominum vocant. Hanc vetustam opinionem D. Hilarius copiosa oratione persequitur tanquam absurdam. Curandum est corpus, inquit Plato, *lib. 3. de Rep.* ob eam quam habet anima cum corpore harmoniam & consuetudinem, per corpus enim viure nobiliter, ac recte viuere, si veritatem clara voce tellari velimus. Quem enim nature vsum, quem mundi fructum, quem elementorum saporem, nisi per corpus anima depascitur: per quod omni instrumentum sensuum fulcitur, visus, auditus, gustus, odoratus, tactus, per quod diuina potestas respergitur. Artes per corpus, studia, ingenia per corpus, opera, negotia, officia per corpus, atque adeo totum viuere animæ, corporis est. Vt non viuere animæ, nihil sit quam a corpore diuertere. Videamus nunc de propria Christiani nominis forma quanta hinc substantiæ friuolæ ac fordide apud Deum prærogatiua sit. sufficiat tibi quod nulla omnino anima salutem possit adipisci, nisi dum est in corpore, adeo corpus salutis est cardo. Etenim corpus abluuitur vt anima consecratur, corpus signatur, vt anima cæmuletur: corpus vngitur, vt anima munia- tur: corpus manus impositione adumbratur, vt anima spiritu illuminetur: corpus corpore & sanguine Christi vescitur, vt anima de Deo saginetur: non possunt ergo separari in mercede, quæ opera coniungit: ita corpus dum ministrat & famulat ut animæ, confors & coheres inuenitur, si temporalium, cur non & æternorum? Hoc est corpus cuius resurrectio fido ci Christianorum est, illam credentes sumus, credere veritas cogit, veritatem Deus aperit. Illud ipsum est corpus, quod Deus tantopere dilexit, vt manuum suarum operam, ingenij sui curam, adflatus sui vaginam, molitionis suæ reginam, liberalitatis suæ heredem, religionis suæ sacerdotem, testimonij sui militem, Christi sui forem: cuius munditias amat, cuius castigationes probat, cuius passionis sibi adæquat. Denique edo corpus cum Tertulliano commendamus, vt quicquid homini a Deo prospectum atque promissum est, non solum animæ, verum & corpori scias debitum, vt si non ex consorcio generis, certe vel ex privilegio nominis.

Quum igitur humani corporis perfectio & claritudo eximia, & supra ceteras rerum naturalium formas & effigies, profani omnes atque fidei scriptores olim de- creuerant, Deum non nisi humana forma pingendum esse, sculptendum & effin- gendum. Hanc esse Dei formam *Sacra Scriptura* nos docent, cum referant hominem ad imaginem Dei figuratum & effictum esse. Super quod, vt ait Propheta regius, *figura- tum est lignum cuiusdam Domus, Tresque filij eiusdem hominem vocat vna uirga, quod Zoroastres Brachmanni, scriptor antiquissimus, in Chaldaeis saculis se expressit, quibus* *mei uisui sunt homines quatuor, signa paterna mei in seculis animis. Pileus interpres per signa pater- na imaginem Dei nostris animis consignatam interpretatur, quod etiam Phocylides in paravis subodoratus fide loquitur, spiritus est uisura Deum mortalibus atque imago, ueluti* *Dei Dei uisus dicitur.* & Alii.

Exemplumque Dee quifque eſt in imagine parva.

Sextus Empiricus aduersus Mathematicos Deum esse negantes disputans, Deum artificem sapientissimum colligi vult ex imagine ipsius nobis insculpta. D. Paulus in Areopago Atheniensis disputans, Arati veteris Poëtae hemisclichium protulit *Act.* 17.

ipſius enim Iouis genus, ſumus, vt noſtram naturam planè diuinam demonſtraret. *Epicurus* Deum hominis parem, & viciffim hominem Dei filium aſſeuerabat, vt ſignificaret eandem nobis eſſe cum Deo cognitionem, & animos noſtros particulas diuinitatis ab ea deſtuentes. Nec *Sibylla* diuino ſpiritu aſſatæ tacuerunt iſtam hominis diuinitatem: ex earum numero *Erythra* ſic de homine effata eſt, teſte *Laſtancio*, lib. 3. diu. Inſt. cap. 10. imago mea eſt homo rectam rationem habens. Nec aliam ob cauſam nos inuicem adoramus, niſi quod ad imaginem Dei facti ſumus, inquit *bat D. Damascen.* Idcirco cæleſtis imperij conſors, & cohæres dicitur homo ad dexteram Dei ſedere, non Angelus, ait *D. Ambroſius*. Vnde in *Canonicis decretis* charagma Dei, ſue ſignum aut ſculptura nominatur. Nuſquam Deus Angelos apprehendit, ſed ſemen Abrahæ, referente *D. Paulo Hebraeorum* 2. & vt loquar cum eodem Apoſtolo *Rom. 12. Siſtatis corpora veſtra hoſtiam viuam, ſanctam & acceptam Deo*. Huius nobilitatis memor Angelus noluit permittere, vt reuerentiam aut adorationem aliquam ei præberet homo, vt in *Apocalypſi* declaratur.

Noſtri corporis dignitatem magis extollit, quod Deus eius ſpeciem & habitum induere non dubitavit, in illud corpus naſci, atque per naturæ noſtræ contumelias volutari non erubuerit, vt hominum ſocietatem & commercium quæreret, *delitia mea eſſe cum filiis hominum*. Vetus etiam opinio fuit, inquit *Philo Hebraeus*, Deum ſub humana imagine orbem terrarum perambulare, hominum bene vel malè facta obſervantem & examinantem.

Quidam.

Sum Deus, humana ſub imagine terras.

Sunt qui dicunt *Ariſtolelem* vehementer approbaſſe illam ex *Odysſæa* *Homeri* ſententiam, quâ non eſſe Diis immortalibus indecorum pronuntiatur, hominis naturam induere, quæ ab erroribus ſeruentur mortales: qua in re, inquit *Calvus Rhodiginus*, Chriſti præſenſiſſe aduentum augurantur nonnulli eius gloſiæ addicti. *Tullius* lib. 1. de natura Deorum, ex oratione *Rolphi Stanci* contra *Velleium Epicureum*, imaginantem ſibi Deum corporeum qualis pingitur, docet hanc formam Diis attributam fuiſſe, vt imperitum vulgus ſenſu maximè ducatur ad cognoscendum Deum, & naturæ ſuæ dignitatem agnoſcat, cum membra Deo ſimilia ſe habere intuebitur.

Corpus Di-
uinum &
Diis attri-
buitum.

Narrat *Ariſtoteles* lib. de Mundo. Phidiam ſtatuarium, cum admirandam illam *Mi-neruam* ære duceret, clauum fixiſſe, quem qui auferret, totam effigiem diſſolueret; in eius verò clauī apice ſe ipſum expreſſiſſe. Ita Deus Opt. Max. cum elegantiffimum huius mundi opificium fabricaſſet, veluti colophonem adiecit Hominem, in quo ſuam imaginem poſuit; ex cuius inſpectiōne artifex cognosceretur. Voluit, inquam, Deus ſuam imaginem in hominem transfundere, vt Homo ſuum archetypum cognosceret, & ſe archetypo ſubiectum eſſe ſciret. Voluit nos tanquam libros eſſe, in quibus ſuam ſapientiam & induſtriam ſuis digitis inſcriberet, *digitus Dei eſt hic*: idcirco Deus poſtquam terram, cælum, & animalia cuncta creauit, Hominem poſtremum creauit tanquam Microcoſmum, in quo ſummatim cæleſtia & terrena omnia velut in parua mappa depicta continerentur. Vnde *Macrobius* eleganter Hominem, paruum mundum nominauit, & maiorem mundum, ingentem Hominem. Prudenter *D. Irenæus* ſcribit Deum in creationem hominis tum incubuiſſe, vbi quidquid prius creauerat, mente collegiſſet: vt duobus libris vno paruo, altero maiore inſtructi, ad Dei cognitionem facilius deduceremur.

Quum autem omnia quæ ambitu cæli comprehenduntur, ad vſum hominis creata ſint, oportuit prius domum ædificari, rebusque neceſſariis inſtrui quàm in eam hoſpes & habitator induceretur, qui rebus iſtis pro nutu & arbitrio ſuo vteretur. Exiſtimandum eſt, inquit *Ariſtoteles* lib. 1. Politic. vt plantæ animalium cauſa ſunt, ipſa autem animalia hominis gratiâ: ſic cæleſtia propter hominem condita eſſe. Idem repetit lib. 2. Phyſic. nos, inquit, vimur omnibus rebus tanquam noſtri cauſa procreatis, idcirco rerum conditarum ſiſtis cenſemur. Et lib. 1. Metaph. vniuerſam naturam homini ſeruire ſcribit: idem aſſeuerat *D. Paulus*, *Epiſt. ad Corinthios*. Eleganter *Philo Iudeus* lib. de opificio mundi, philoſophatur hominem vltimum à creatore productum fuiſſe, veluti colophonem Diuinorum operum, vt ad conuiuium & ſpectaculum huius mundi diuina & diuina introductus, tanquam conuiuator rebus omnibus, quas terra procreat vteretur, & tanquam æternitatis hæres cælum aſſiduè ſpectaret.

Quare Natura veniens ad hominis compoſitionem ceſſauit, tanquam nihil honoratius componendum præ manibus haberet, inquit *Algaſſel*, in quo, teſte *Galeno*, concluſa

est omnis naturæ sapientia. Proceffit postremus creaturarum omnium Homo, inquit D. *Ambrusius libro 6. Epist. 38.* Ipe de gratos, me ut sublimis, ve esset omni creaturæ miraculo & naturæ finis, &c. Proinde veteres Philosophi humanum corpus ob perfectam & absolutam elegantiam mundo compararunt, quod iam ceteris alijs factum purant ob huiusmodi rotunditatem, alij propter analogiam partium nostri corporis, *per seipsum* cum partibus magni illius animalis mundi. Vt enim mundus est compages cæli & quatuor elementorum, sic *per seipsum* aduociente spiritu cælesti ex ijsdem elementis constituitur; vt partes *per seipsum* muneribus & officiis distinguuntur, ita *per seipsum* partes, quæ eodem munere fungantur, eadem nomina retineant. Quid aliud stella, inquit *Platarchus*, quàm oculi lucentes in facie vniuersi? Sol vti cordis prædixus, vt hoc sanguinem & spiritum suppeditat, sic ex se vegetantem calorem & lucem diffundit. Mundus terra & mari, vt nostrum corpus venire & vesica vitur. Luna inter cælum & terram posita est, vt iecur inter cor & ventrem consistit. Cur autem homo *per seipsum*, dicatur aliter exponit Moses *Ægyptius pag. 104. editionis postremæ: & pag. 354.* probat hominem non esse finem totius vniuersi. *Riccius, pag. 134.* eleganter exponit quomodo sit pars mûdi. *Mantius* Poëta eleganter describit quomodo duodecim signa Zodiaci partibus nostri corporis respondeant. Idem enarrauit fufius Georgius Venetus, *Canticæ pag. 1.* *quamade homo sit per seipsum*, ex mente *Pythagoræ*, explicat incertus Auctor, in *bibliotheca Physicæ*. Quum igitur vtriusque mundi partes functionibus & officiis sibi inuicem consentiant, ne mireris amplius monitorem Galeno, *lib. 3. de viti part. cap. 10.* Solem & Lunam, atque vniuersam reliquorum syderum seriem. Nec te terat in admirationem eorum magnitudo, vel pulchritudo, vel motus perpetuus, vel circuitum cetera descriptio. Hæc omnia humano corpori comparata longè inferiora sunt, vt etiam omni ornatu carere videantur. Nulla pars corporis abiectione pede; at in ejus fabricatione Deus non minorem operam & diligentiam adhibuit quàm in condendo Sole splendidissimo sydere, & si credimus *Galeno*. Soli alio splendidissimo præferendus. Miro quodam & arcano nexu iunguntur Homo & Mundus, homo Dei imago est, & Mundus Hominis. Homo paruus est Mundus, sed Mundus non est magnus Homo, quia propter Hominem Mundus, non Homo propter hunc. Itaq; perfectus quid Homo quàm Mundus, & idem tamen imperfectior: perfectior quatenus Mundi finis & complementum, imperfectior quatenus ejus pars, sed hæc pars totum ipsum in se continet, ideoque toto ipso perfectior, quoniam omnia, & plera, & maiora quàm mundus ipse comprehendit, vt doctè philosophatur *Barth. Keckermannus*. Ludit igitur operam qui tanto cum labore mundi fabricam perquirat, cum illam ex seipso minore cuspideo possit ediscere, inutilis & superuacanea erit orbem celestium conreplatio, si oculi structuram omnino similem spectauerit. Legitur in *Anthologia. Pallada Epigramma.* aduersus eos qui cælorum scrutantur plagas, nec vident quæ sunt ante pedes, sui ipsius notitiam ignorantes, quod à vetula *Theophrasti Philosophi* exprobratum fuit, dum conreplando sydera, in foueam cecidisset. *Furor est profecto, furor est, de ex homine*, inquit *Plinius, iustia lib. 2. naturalis historia.* & tanquam eius cuncta plene iam sint ante oculos, sunt ante externa, quasi totæ mensuram videri res possit agere, quæ sunt neglectæ, aut mens hominis videre, quæ mundus ipse non capit. Eunt homines, inquit D. *Augustinus*, mirari alta montium, ingentes fluctus maris, altissimos lapsus fluminum, Oceani ambitum, & gyros syderum, & relinquunt seipso, nec mirantur. Huius inerte causam subiungit, quod magnam illud miraculum videri hominibus, videndi apud iustitiam voluerit.

Cur parum
si quæ.De consen
tu homin
cum mun
do, vide lal
tissimum
lib. 3. Man
diti, in
Platarchi
de hoc primi
capituli.Galenus
lib. 1. de
viti part.

Vt autem intelligatis humanum corpus, non esse tam multuarium & incogitatum naturæ opus, placet singularum partium tam exterarum quàm internarum figuram, à cæteris animantibus diuersam percensere, vt omnibus innotescat hominis corpus, quia postremum animalium creatum fuit, sic perfectissimum & absolutissimè effectum fuisse. Vt cuiusque animantis, ita hominis corpus animæ gratia conditum est, non modò vt diuersiorum, verum etiam vt organum accommodatum illius infinitis viribus expromendis. Atque vt Mens, ex *Aristotele*, formatum est præstantissima, ita illius organum pulcherrimum & perfectissimum esse conueniebat, qualiter formatum fuit humanum corpus. Id ipsum aperit significauit *Galeno, lib. 1. de viti part. cap. 1.* Naturam animalium corpora diuersa effingere, secundum cuiusque animæ conditionem: atque vt simia ridiculam habet animam, sic corpus adeptam fuisse ridiculum. Homo verò quia rationalem habet animam, eam obrem corpus inter ea quæ sunt super terram dis

Differet
mo tam in
partibus.

venis quam
exterius a
corpore re-
liquorum
animalium.

uinum obtinuisse, atque conuenienter ad animæ facultates comparatum; quod non tantum in partibus externis à brutorum fabrica differt, verum etiam in partibus internis planè dissimile factum fuit.

Imprimis partium externarum discrimen inspicimus; Homo figuram celsam & erectam adeptus est, quæ in cælum, & ad suum conditorem sese attollens, cælestes igniculos & semina diuinitatis suæ testatur. *Galenus* probat ideo hominem erectum esse, ut omnem figuram imitari posset sese stectendo. *lib. 3. de vsu partium*: sed *Aristoteles* præter finalem hanc causam à *Galeno* assignatam, efficientem alteram proponit, *lib. de respiratione, cap. 13.* quod pulmonem maiore copia sanguinis & caloris repletum haberet, ei magnitudo corporis maior est, & quod plurimi & purissimi sanguinis compos est, ut homo, id ex omnibus animalibus erectum incedit, atque partem superiorem ad vniuersi supremum erectam obtinet. Si quis obijciat leonis sanguinem calidiorem esse, nec propterea rectum stare, & incedere, is sciat leonis sanguinem esse terrestriorem: sanguinem verò hominis subtiliorem, ideoque in leone ignis vrit nec lucet, in homine lucet & vrit. Addit *Philosophus, lib. de animalium incessu, cap. 11.* aliam causam erecti corporis in homine, quia solus inter animalia, crura habet ad supernas corporis partes ex pedestribus maxima & firmissima, quod in infantibus manifestè conspicitur, qui nequeunt erecti ambulare, quia sunt omnes pumilioes, maioresque & valentiores quam par sit, summas imis corporis habent partes, procedente verò ætate infima maius accipit incrementum, donec ad iustam peruenierit magnitudinem, tuncque erecti ambulare possunt: hæc enim figura recta maximè accommodata & expedita est ad quaslibet artes, & scientias capessendas & exercendas: quid enim contraemus, vel stantes, vel sedentes id agimus, nil vero proni, aut supini, siquidem positum eiusmodi artes ferè omnes nesciunt, inquit *Cælius Rhodiginus, lib. 2. cap. 11.* *Arist. lib. 4. de partibus animal. cap. 10.* scribit hominem solum inter animalia erectum esse, quoniam ex natura atque substantia diuina est, officium autem Diuini est intelligere atque sapere. *Et lib. 3. cap. 10. eiusd. operis.* notat hominis pedes omnium maximos proportionè magnitudinis merito concessos fuisse ad erigendam corporis molem. Si credimus *Protopio Gazæ* veteris Testamenti interpreti *Grazco*, belluæ capite demisso & ad terram inclinante stantem hominem & erectum circumstant, sequuntur & intuentur, quo possint cultu maiore imaginem Dei velo corporis coopertam colere, & sub hac imagine reuelatam venerari. Caput habet orbiculari figura tornatum ad capacitatem, & dyspathiam. *Aristoteles, sect. 30. problem. particula 3.* docet hominem omnium animalium esse prudentissimum, quia capite minimo ad sui corporis proportionem præditus est, & inter homines qui sunt minori capite prudentiores nasci. In capite hominis plurimus pilus nascitur, qui cum deciduus est, caluitium parit, soli homini innatum; equus quidem canitium patitur, sed homo semper à priore parte capitis canescit, tum deinde ab aduerso. Pilorum conuersio binos vertices effingit in humano tantum capite. Facies homini tantum, cæteris os & rostrum: illa tristitiæ, hilaritatis, clementiæ, & seueritatis index est; & quod in facie mirabile est, cum decem aut non multo plura membra contineantur, nullas tamén duas in tot millibus hominum indiscretas effigies existere. Scribit *Euantes Persæ*, ubi Chaldaicam religionem enarrat, non esse homini suam & nativam imaginem, extraneas multas & aduentitias, hinc illud Chaldaeorum, *homo varia ac multiformis & de iustioria natura animal.* Quis igitur hominum formas in tot millibus discrepantes, & nullibi prorsus in vniuersis conuenientes non admiratione prosequatur atque obstupescat? Verùm, si causam consideres, summæ providentiæ opus in tali singularium dissimilitudine consistere deprehendes, si enim vniuersi mortales omni remoto discrimine vnâ eandemque figuram sortirentur, maxima inde rerum confusio oriretur: in quanta enim rerum omnium ignoratio ac tenebris versaremur si distinguendi notum hominem ab ignoto, hostem ab amico, probum ab improbo nulla nobis facultas daretur? Nec si tale discrimen intercederet, nihil impediret quin cum parentibus forribusque misceri & coire liceret, si fur in furto deprehensus paululum secederet, aliis permixtus non discerneretur, sed & inter liberos ac parentes nullum omnino cognitionis discrimen esset. Præterea, aliud nihil in hac mortalium vita fieri laudabile posset. Nam homo hominis causa cæcus quodammodo esset, cum visui ipsius nil aliud comprehendere quàm ætatem atque corporis magnitudinem daretur. Tanta igitur bona summi Creatoris providentiæ, ex formatum discrimine nobis largita est.

Et Merito,

Nec tantum figurâ, verùm etiam voce, colore, atque ætate homines distingui ac separari vult, vt nobis iudicij imbecillitatem omni arte subleuaret. Faciei color facile mutatur, sed homo solus in se mutatur, secus animalia quæ colorem mutant, vt Polyphus, & Chamæleon, colorem alienum accipiunt quodam repercussu. In assensu faciei hominis supercilia, & pariter, & alternè mobilia, & in ijs pars animæ. Oculi homini tantum diuerso colore, & numerosissimâ varietatis atque differentiz, cæteris animalibus in suo cuique genere similes. Palpebras valde mobiles habet aduersus incurstantia, vt magnæ difficultatis sit homini ad comminationem non conuicere. Aures habet immobiles. Malas infra oculos, quas prisci *genas* vocabant, pudoris hæc sedes est. Infra genas hilaritatem risumque indicant Buccæ: & altior homini tantum Nasus, ex quo profluuium sanguinis ei peculiare. Mentum nulli præter hominem. Dentes cum ipsis animalibus nascuntur, homini postquam natus est septimo mense, reliquis perpetuò manent, mutantur homini, cuius dentibus quoddam virus inest, nam speculi nitorem ex aduerso nudati hebetant, & columbarum fortis implumes necant. Pectus homini tantum latum, reliquis carinatum. Mammæ solus homo possidet, cætera mammarum notas: sed ne femina quidem in pectore, nisi quæ possunt suos partus atollere. Humani ventris figura à brutis animalibus diuersa, siquidem pro magnitudine corporis venter est angustissimus, à posteriori parte in priorem, præcipue ad thoracem. Umbilicum eminentem nullum animal præter hominem habet, sed durum quiddam umbilici loco apparet. Bruta partem corporis superiorem multo maiorem habent quàm inferiorem. Vni homini humeri, cæteris armi, vni vngue. Manum instrumentum sapientiz, quatuor digitis inæqualibus distinctam, & in ea Pollicè reliquis digitis oppositum, homo solus adeptus est: solus etiam ambidexter, solus quoque inter animalia terrestria bipes; ei genus & cubiti contraria, in flexione, & articulorum dispositione: homini suræ tantum & crura carnosæ, pedes maximi, & in his calcis proiectione, ad sustinendum corpus necessaria. Solus homo sedet, quia femora cum spina rectum angulum faciunt, idcirco ad sedendi commoditatem solus natus habet: vt commodè federe possit ad meditando & Philosophandum: sedens enim anima, ex *Aristot. 7. Physic.* prudentior est: idcirco ex eodem Philosopho, *lib. 4. de partibus animal. cap. 10.* Simia quia formæ est ambigua, nec caudam habet, nec nates, cauda caret quia bipes, naibus quia quadrupes: homini verò pedes omnium maximè quoniam erectus est: vni homini cutis polita, æquabilis, candida, & maximè temperata: cæteris eorum: vola homini tantum, vngues lati, & defuncto crescent. Comparatio autem cum sit cuiuspiam rei præstantioris cum deteriore collatio, hoc ad illud tanquam ad mensuram referendum est. Quæ fuit causa sapienti viro Aristoteli, vt hominem cuiusque partes proponeret, ad quas aliorum animalium naturam reduceret. Igitur si cum locis vniuersi quos Natura supra infraque disposuit, superius inferaque hominis partes comparentur, inuenies ipsum facillè cæteris animalibus antecere, ita eæ ad vniuersi orbis situm atque ordinem accedunt, quemadmodum anteriores quoque & posteriores, item dextræ atque sinistræ: Atalia animalia aut eas neutriquam nata sunt, aut non ita expressas ex *Aristotele, lib. 1. de hist. animal. cap. 16.* Denique plures in homine, quàm in cæteris omnibus animalibus differentiz reperiuntur, quoniam velocitas cogitationum, animique celeritas, & ingenij varietas, multiformes notas imprimunt: cum cæteris animalibus immobiles sint animi, & similes omnibus, singulisque in suo cuique genere, homo in sensibus à cæteris animalibus superatur, sed tactu excellentius cæteris cuncta percipit, eam ob rem animalium est prudentissimum, inquit Aristoteles, *cap. 9. lib. de Anima.*

A partibus externis, ad internas pergamus. Fatentur omnes humani corpus quoad figuram externam, à brutorum corporibus diuersum esse, sed interiores partes cum illis nobis esse communes, ac penè consimiles. Quum enim par sit nutritionis & vite ratio, siue naturalium & vitalium organorum non est dissimilis structura, inquit *Laurentius*, neque cerebri structuram dissimilem iudicauit *Vesalius*. Sed quàm illi miserè deiciantur, & toto cælo aberrent, breui partium internarum enarratione patefaciamus proinde illos profus inepitire, qui viscerum humanorum structuram, ex brutorum inspectione, æque cognosci censent. Nam oportebat præstantioris animæ domesticæ cameræ, & in his conclusa organa distingui à brutorum structura: vt non tantum decus & discrimen in externis, verum etiam in partibus internis appareret: quippe natura cuique animanti corpus animæ affectibus idoneum condidit: hæc quidem

cognitione fiet, ut intuitus quoddam animal non antea visum, prænoscas qualem sub cute structuram habeat, ac frequenter hoc iudicari, non aliunde eius cognitionem perituramque adeptus, quàm ex formæ persuasione, quòd singula animantia corporis structuram animi moribus facultatibusque propriam obtineant, ait *Galenus lib. 6. admin. Anat. cap. 1.* Panniculus carnosus in brutis corio substratus est, ut illud corrumpere queant, quod fuisset homini indecens & inhonestum, propterea natura interposuit adipem. Musculi abdominis in brutis differunt structurâ, & numero. In structura differant, quòd Recti longiores sunt, ad clauas vsque protensi; in brutis carent nervosis intersectionibus: in numero dissident, quia bini recti superiectione erigendo peni sunt destinati, carent etiam musculus pyramidalibus. Resecto abdomine quatuor vasa umbilicalia non apparent iam oblitterata, quæ tamen in homine vsque ad extremum senium conspicua sunt, & vsum habent, omnem tamen gracile, nec multum adipesum, cuncta intestina tegit & obuoluit, in homine naturaliter infra umbilicum non descendit, totum circa ventriculum & superiora intestina collectum. Intestina in brutis alio modo constituta & disposita sunt. Nam crassiora inuicem locum ventris occupant, contrâ quàm in homine, longitudine superant hominis intestina, cæcum caret epiphyli vermiculari & longitudinali, & verè saccum exprimit. Hepar in quatuor lobos fissum est; homini contrarium & æquabile, quamuis enim bubulum accedat ad humanum, discrimen tamen aliquod obseruatur. Ventriculus in ruminantibus quadruplex, in alijs vtrique maxilla dentatis vnus adest, sed is corneam musam non refert ut in homine. Lien brutorum tenuis, angustus & oblongus, linguæ bubulæ similis, vix didimiam humani lienis magnitudinem & pondus æquat. Renum figura & fabrica planè dissimilis, quoniam in brutis phaeoli figuram exprimit, & duplicem intus cauitatem ostendit, in homine admirabilis, & ei peculiaris interna renis structura, qualis descripta *cap. de Renibus.* Vter uterque situs & insertio in vesicam planè contraria quàm in homine, quia non traducitur per duplicaturam peritonæi, & inter duplices vesicæ membranas, nec ipsam perforat iuxta ceruicem: In brutis vesica non est separato ventre disclusa ut homini, sed in imo hypogastrio fluirans oberrat, penis figura & structura in brutis omnino diuersa est. Vter uterque membranosus, oblongus, & in duo cornua sursum extensa diremptus. Denique reliquarum partium genitalium fabrica longe dissimilis existit. Atque ut intelligatis nostræ generationis principia diuersa à brutis animantibus, obseruabitis vterum in grauidis mulieribus diuersum ab vtero belluino foeto, membranas foetus dissimiles, umbilicum alio modo extractum, vasa umbilicalia diuersa, ut in *historia Fetus* demonstratur: cotyledones in brutis reperiuntur loco placentæ muliebris vterinæ. In thorace brutorum pulmones in sex lobos fissi sunt. Pericardium non adhæret centro nervo diaphragmatis nisi in boue. Cor in brutis verè conoides, durius est quàm in homine, cunctis animalibus in medio pectore consistit, homini tantum infra læuam papillam turbinato mucrone in priora eminens, in animalibus, ac in homine deorsum inclinat centrum nervi diaphragmatis feriens. Cerebrum homini amplissimum & quatuor bouum cerebris grandius atque ponderosius, neque viro quàm feminæ maius est, quamuis aliter senserint *Arif. & Parnas.* Ex Philosopho, *lib. 2. de part. animal. cap. 7.* homo inter animalia maximum proportionem corporis, humidissimūque cerebrum obtinuit, ob id è cunctis animalibus solus florum talinmq; rerum odores sentit, & iisdem gaudet. Interior cerebri structura omnino dissimilis apparet, vni homini cerebrum in infantia palpitatur, nec corroboratur ante primum sermonis exordium. Ut externæ auris figura diuersa est, sic internæ auris structura dissimilis. Nam in brutis quatuor illas cauitates non obseruamus, labyrinthus deest, & ossicula tria aliter figurata sunt. Oculus in brutis diuerso modo compositus: septem intra orbitam continentur musculi, sed septimus trifidus nervum opticum amplexatur, obliqui maioris trochlea in certis tantum animalibus reperitur. Vux color variegatus est, crystallinus humor lenti similis; organa vocis aliter in brutis constructa sunt, larynx ex tribus cartilaginibus constata, caret glottide, soli homini concessa, ut omnium animalium voces imitari queat. Quod *Vux* nomine vltimo palato dependet, in homine tantum reperitur, ut etiam Tonsillæ, quæ in suis glandulæ dicuntur, *Plin. lib. 11. cap. 37.* Denique homo, siue corpus siue animam spectes, id habet supra reliqua animalia, ut sicut in Geometria quadrangulum in se continet triangulum, non autem triangulum recipit in se quadrangulum: Ita quidquid brutis inest peculiare, id suo modo etiam in homine reperitur, non autem ea

quæ hominis sunt, brutorum generi communicata conspiciuntur. Eleganter *Aristoteles* homini, animali civili & ad societatem nato, sermonem præ cetera animantium concessum fuisse scribit *lib. 1. Polit. cap. 2.* quia vox tantum iucundi & molesti signum est, id cœque aliis uimantibus data, ut molestum & iucundum sentiant, & inter se significent. Sermo autem ad id quod prodest & noceat declarandum valet, ergo etiam ad id quod iustum & iniustum est enuntiandum. Hoc autem præter ceteras animantes, hominis est proprium, ut solus boni & mali, iusti & iniusti, & aliorum similium sensum habeat. Attebam cottonidis loco, quæ *Meletius* scripsit in commendationem hominis. Solus homo vocis dulcedinem distinguere ac percipere potest. Sed & soli homini tantum ad cantus modulamina varia musices instrumenta fabricare datum, soli etiam homini per literas absentibus amicis salutem dicere. Solus etiam homo animaduertendi ac consilij capiendi vi præditus est. Solus etiam homo animal rufus capax est, quamvis simia nescio quam rufus similitudinem exprimere videatur, nomen tamen rufus non meretur. Solus homo vocalibus instrumentis quæ dicenda exprimendæque sunt, articulata voce format, cum cetera animalia inarticulata voce vtantur. Sed & intelligentias ipsas ac demones rationali sermone, non quemadmodum nos vocalibus instrumentis ac spiritus reciprocatione ut nonnulli opinantur. Soli etiam homini eisi mortali conditione natus sit, à mortuis resurgere, ac immortalitate donari datum est. Solum hominem rerum ille opifex hic creatum, & aliud transmutandum condidit. Solus homo inter utramque vitam providentissima curâ quæ ad præsentem attinent fatagit, & ne à futura priuatur summopere inuigilat, hanc præsentem tempore mutabilem, illam verò æternam nouit. Præterea solus homo in præsentis vitæ lubrico in crimina peccataque prolabendo, cum seipsum corrigit, ex poenitentia, veniit dignus à Creatore efficitur. Siquidem erga solum hominem rerum opifex præter alia animalia, præcipua providentia vtitur, cunctique exactissima ipsius cura dignum censet. Hactenus *Meletius lib. de natura humana*. In homine vox magnam vultus habet partem, agnoscimus eam priusquam eamamus, & non aliter quam oculis: toridemque sunt eæ, quot in rerum natura mortales, & sua cuique, sicut facies, hinc illa gentium, totque linguarum toto orbe diuersas, tot cantus & moduli, flexionisque: sed ante omnia explanatio animi, quæ nos distinguit à feris, ex *Plinio*. De laudatione hominis egregia plurima profert *Nemesius, lib. de natura hominis, ad finem cap. 1.*

Nec satis laudatum esset Corpus humanum, nisi quorundam calumnias & opprobria in Naturam inique iacta, & temerè effutira repellere, quibus diuinum opificium imperfectum esse cauillatur. Imprimis Naturam arguunt, quod hominem uerum natum die abiecerit, ad vagitus statim & ploratus, quam ceteris animantibus varia regumenta tribuerit. Præterea, quod infirmum, alienæ opis egenum hominem produxerit: cetera animalia ubi nata sunt, naturæ suæ semina sentiant: alia pernicitem vsuipant, alia præpries volatus, alia natatos. At homo scit nihil, sine doctrina, non sati, non ingredi, non vesci, breuiterque non aliud naturæ spœce, quam reliquæ. Deinde quod hominem sine vilo præsidio inermem mittit in terram, quum recte ad sui tutelam dentibus, cornibus, ungulis, spiculis armarerit, aut saltem alium vel pernicitem dederit, quod saluti suæ consulere. Tandem, quod magnitudine corporis non æquamus elephantes, velocitate ceruos, impetu tauros, & quod magis iniquum putant,

Refutatio
eorum qui
repellenda
sunt in sa-
bra cor-
pora hu-
mana.

Nos aper audita, hux visu, simia gustu.

Canis odoratu nos vincit, aranea tactu.

Has omnes calumnias, & deliramenta refellere facillimum est. Homo, inquit *Aristoteles*, sicut corpus æmis non dum, sic animam artibus desitutam habet, sed pro corporis nuditate manus, pro animæ imperitia rationem accepit: quorum vsu & ministerio corpus quidem omni genere armorum munire potest, animam autem omnibus artibus exornare. Nam, ut prudenter ait *Plato Indus*, pro omnibus brutorum donis ratio homini data est, quâ sibi factam iniuriam vlciscatur. Rationi tamen manus additæ, quæ prælo essent ad iussa capessenda & exequenda, ut intellegens duplex est, ad cognoscendum & ad faciendum, vnde scientia & ars: ita dicere solitus erat *Isidorus Casar Scaliger, Exercit. 250.* rationem esse manum intellegens, rationis duplex orationis manum: manus enim iussa facit, iussa obediunt rationi, ratio vis est intellegens. Quisquis est iniquus fortis humanæ æmulator, cogita quanta nobis tribuerit parent

*Lib. 1. Po-
lit. c. 2. &
7. Ethic. 6.
& 10. lib. 1.
de part. ani-
mal. c. 10.*

Natura, quanto valentiora animalia sub iugum mittimus, quanto velociora cursu consequamur, denique quòd nihil sit mortale, quod non sub nutu nostro positum. Certi sunt domitores ferarum, qui scississima animalia, & ad occursum exterritum hominum docent pati iugum, nec asperitatem excussisse contenti, vsque in contubernium mitigant. Leonibus magister manum insertat, osculatur tigrim suus custos, elephantem rixus Æthiops iubet subsidere in genua, & ambulare per funem. *Seneca Epist. 85.* Apud *Philoplatum* miratur *Damis* puerum elephantò, belluæ quas alit terra maximæ, imperitare & dirigere quòd velit: respondet *Apollonius*, hanc belluam omnium ferarum maximè docilem esse, quæ vbi colla submisit homini, omnia ab eo patitur, morumque similitudinem æmulatur, caputque intra fauces suas tamdiu recipit quamdiu libuerit homini: noctu ferur suam deplorare seruitutem, flebiliter & miserabiliter immurmurans; quod si ira ingemiscenti homo superuenerit, querelam sistit quasi verecundia permotus. *Plinius lib. 8. cap. 4.* scribit Elephantum humanissimam belluam, & Tigrem ferocissimum animal, ad hominis conspectum expauescere; *Elephas*, inquit, priusquam domitus hominem times, & nondum eo confecto ex vestigia & edore reformidat. Ad hanc venerationem hominis lubens attulerim quod non patiantur se aduersus eum adduci, vt ministri fiant alienæ scissitudinis; quod explicat eleganter *Plinius lib. cit.* Nec homini nocere possunt, nisi inebriati fuerint thure addito. Primus autem hominum leonem manu tractare ausus est ostendere mansuetudinem Hanno, è clarissimis Pœnorum traditur, damnatusque illo argumento, quoniam nihil non persuasurus vir tam artificis ingenij videbatur, & malè credi libertas ei, cui in tantum cecidisset etiam feritas. *Ex Plinio, lib. 8. c. 16. Ibidem* postquam exposuit leonem, formidabile animal, hominis opem implorasse, subiungit, Miremur postea vestigia hominum intelligi à feris, cum etiam auxilia ab vno animalis sperent, cur enim ad alia non iere, aut vnde medicas manus hominis sciunt. Ergo solus homo leonem ferocissimum animal rugiens cuius nomen formidabile regit, vincit, & edomatur, ita vt *Zoroastres* assueverit leonem elictellas asinarias gestare. Mirabilia narrat in *Hydrographia Gallica Pater Iussita*, de occisione Balæx ab infanto superequitante; & ad portum siue litus deducente, vt inde disces imperium hominis in omnia animalia maris & terræ etiam vastissima. Quis nisi homo belluas vel atrocissimas eludit? nonne *Pardos* decipit cum in statua hominis chartam ponit, quam illi inepèrè lacerant, homo verò in infidiis loco inferiori positus belluæ amentiam ridet, *ex Diuo Basilio*. Feræ agresles hominem reformidantes interdum delitescunt, atque terribiles ac fortissimæ bestię suarum virium oblitæ hominem reformidant, præsertim interdum, itaut lupus hominem conspiciatus præcipiti fuga vertat. Propterea verissimum est hoc editum in gratiam hominis ab Omnipotente Deo promulgatum. *Terror vellet ac tremor sit super cuncta animalia terra, & super omnes volucres cali, cum vniuersis quæ mouentur super terra, omnes pisces maris manus vestra traditi sunt.* 1. *Geneseos cap. 20. & 9.* Ecce dedi vobis potestatem calcandi super serpentes & scorpiones, & super omnem virtutem inimici, inquit *Mosias*, *D. Luca cap. 10.* *Plato* cum ex *Anatome* sui corporis fabricam didicisset, Naturæ gratias egisse fertur, quod homo natus esset. Eleganter *D. Bernardus*, tract. de misericordia: Admonete te, inquit, vt sine intermissionibus recorderis, quàm bonus & dulcis erga te sit creator tuus, quanta bonitas eius fuit, quod te cum non esses creauit, & quod te non pecus aut creaturam insensibilem, sed eam creaturam fecit, quæ eum posset intelligere & amare, & cum eo suam aternitatem aternæque & felicia possidere. Neminem igitur tam vecondem puto, qui spectata corporis sui structura, belluarum conditionem sua sorte potiorum esse censet: non alium testem produco, quàm *Apuleium*, qui conuersus in asinum seruata mente, nihil prius expetiuit quàm in hominis figuram emigrare. *Nabuchodonosor* in brutum conuersus, cum formam istam suædam agnouisset, sensu cordis humani recepto, fleuit, & quauis die ac nocte quadragies orauit, ob sibi restitutam figuram humanam, ait *Epiphanius, lib. de vitiis Prophetarum*. Stoicis adeò placuit humani corporis forma, vt insipientiam cum figura humana, prætulere sapientiæ cum figura belluina. In illa *Ezechielis* visione, animalia ante thronum Dei, figuram & imaginem hominis veluti nobiliores in vultu præ se ferebant. Equidem plena diuinitatis mihi videtur humani corporis fabricatio, nec absque summa ratione *Pythagoras* hominem ad sui venerationem hortabatur, quippe credebat nomen esse quoddam terrenæ nibe circumfusum. Interrogatus *Philosophus* quid esset Deus, & quid Homo: Deus est, inquit, immortalis Homo, & Homo Deus mortalis,

Domini, in terra
omnis ho-
mini datus.

D. Augustino, seriò sapite, & vobis alta mente repositum nunquam excidat hoc præceptum, *quoniam dillum est, ut cognoscam meipsum, sustinere non possum ut me habeam incognitum. Nam si te ignoras, è pulcherrima (sic alloquitur Deus animam hominis) recedere, & ubi post hordes tuos: ut significaret eos qui naturæ suæ conditionem ignorant, dignos esse qui ad pecudum greges ablegentur.*

Sciscitanti quæ utilitas Deo ex homine, ut eum propter se crearet, egregiè respondit *Lactantius, lib. 7. de Divino premio, cap. 5. ut esset qui opera eius intelligeret, qui providentiam disponendi, rationem faciendi, virtutem consummandi, & sensu admirari, & verum proloqui posset.* Quorum omnium summa hæc est, ut Deum colat, is enim colit, qui hæc intelligit. Is artificem rerum omnium, is verum patrem suum debita veneratione prosequitur, qui virtutem Maiestatis eius de suorum operum inventione, in exceptione, perfectione metitur. *Epistetus apud Arrianum lib. 3. cap. 8.* Omnia animantium genera Dei opera esse fatetur, sed hominem opus illius præcipuum, & cuius gratiæ cetera sunt creata; Illa Deum intra se habere, hominem Divinæ naturæ particulam esse, & illum intra se circumferre, aut saltem in creaturis omnibus Deus est per modum vestigi; in homine solo per modum imaginis. *Hermes Trismegistus* de homine scriptum reliquit, quod ipse brutis & mundo præstat ratione & mente, spectator enim operum Dei factus est, & admiratus ea, tandem cognovit Creatorem, quod qui facit, Creatori gratias habebit & pius erit, unde sine Philosophia summè pius esse impossibile statuit.

Quod autem nobis aperit & ostendit ad mirabilem nostri corporis structuram, scilicet nos ad Dei summi opificis cultum & venerationem excitat & inducit, *Anatome* censetur; quæ nihil est aliud quam humana divinæque sapientiæ theatrum, lucidissimum speculum, quo nos Deumque intuemur. Illa præstantissimam nostri corporis fabricam retextit, contextam nervis, arterijs, venis, cæterisque omnibus, quæ commuioa brutis animantibus, meliorem in nobis compagem, præstantioremque figuram adeptæ, usum ostendunt quem animus divinæ mentis deliberatio, & æoræ celestis particula postulat. Propterea non pudit Christianos Theologos, *Lactantium, Ambrosium, Basilium, Chrysostomum, Theodoretum*, divinæ providentiæ validiora argumenta ex nostri corporis fabricatione depromere; Nam Deum qui vult nosse, seipsum ut cognoscat necessum est, inquit *D. Chrysostomus*, siquidem accurata nostri corporis speculatio sufficienter te manu deducet ad Dei cognitionem, ut eleganter *D. Basilus* adiunxit. Etenim opera Naturæ testantur de suo opifice, & nos in auctoris trahunt cognitionem, ac potissimum si causas eorum cognoscamus, ait *Aristoteles, lib. 2. de partib. animal. cap. 5.* quod videtur designatum à *D. P.ulo, cap. 1. ad Romanos. Mercurius Trismegistus* affirmat, divinam essentiam à nobis comprehendere non posse nisi per illius comparisonem cum natura nostra, *scilicet ut animæ nostræ*, idcirco vir pius & sanctus à Deo quotidie postulat, nouerim te, nouerim me, nouerim me, nouerim te. Idem *Trismegistus* in *Pimandra*, quærens, quomodo Deus fugiens nostrum conspectum imbecillum ex operibus quæ tanguntur & cernunturprehendatur, monet imprimis ex hominis operis pulcherrimi consideratione Deum auctorem intelligi. Quicumque discendi cupidus, inquit *Pisides lib. de vanitate vitæ*, in sui cognitione laborat, nihil ei in tota natura occultum & ignotum esse potest, quoniâ Hominis natura parvus est mundus. Sed ex hoc iucundo Anatomæ studio maior utilitas ad Medicos deriuatur. Nam apud *Galenum*, nihil est aliud in arte medica *peritum*, peritum artificem fieri, quàm *Anatomes & Pharmacia perfectam habere notitiâ*. Illius enim ope & ductu, vniuersa Medicinæ patefcit, adeo ut Anatomicus intra semestre possit edicere, quod alius absque Anatomæ vix in duobus annis assequeretur: eam ob rem dicere soleo, *Anatomæ esse Medicinæ oculum, quo quid agendum, quid vitandum admonemur, atque peruenimus.* Eiusmodi lumine quum esset orbatus iuuenis Medicus, ad ægrum accersitus, pro vena secuit artetiâ, quæ repentinam mortem intulisset, nisi maturè Galenus succurrisset. Alter cum ex solis cõmentarijs Anaromen didicisset, sine oculatâ partiû inspectione, puncturâ nervi in brachio instat alterius vulneris curauit, quû ex situ partis affectæ non animaduerteter fuisse neruum: tandem ex malè curato vulnere contigit ægrum interire, magna medici infamia, artij: dedecore. Nouit *Galenus* Chirurgum, qui cùm ex externis brachij musculos innoxie præcidisset, postea tenuiore scalpello in musculos interiores temere adactos nervos, venas & arterias præcidisset, ægro interea medicû increpante; qui brachium motu seculûque priuatû haboit. Simile infortunium ignari Chirurgi recitat *Gale-*

lib. 1. de loc. aff. quum ex ceruice strumas in profundo sitas excinderet, & inter secandum quoddam vas membraneum non specillo fecaret, sed vnguibus euelleret, imprudens ob ignorantiam, simul recurrentes nervos distinxit, & abruptis, sicque puerulum liberauit à strumis, sed motum reliquit. *Galenus* ex notitia nervorum magnam laudem sibi comparauit, quod ei qui ex alto in spinam deciderat, & in manuum supplexum torporeque inciderat, non manibus quibus Medici Anatomæ signari medebantur, sed spinæ remedia admoeret, à qua nervos in ipsas manus deduci ex Anatomæ didicerat. Ad huius rei confirmationē admirabilis locus exstat apud Hippocratem *lib. de veteri et cetera*. Multæ extra & intra corpus figurarum species sunt, quæ magnopere inter se differunt, quod ad affectiones pertinet, tum ægroto, tum sano, veluti capita parua aut magna, colla tenuia aut crassa, longa aut brevia, ventres longi aut rotundi, pectoris & costarum latitudines aut angustæ, & alia infinita, quæ omnia nosse oportet, quatenus differunt, quò causas singulorum cognitias probe obscrues. Quorum istas historias? vt omnes intelligat doctrinæ Anatomici necessitatē in exercenda Medicinæ, vt illos errores vel potius homicidia, quæ ab ignaris & imperitis perpetrantur, peritus Anatomicus evitare possit. Quis adeo lyoceus & perspicax, vt corporis oculis interiorum & latentium morborum sedes dignoscere queat. Non est fenestratum corpus humanum, vt quod intus agitur peruideamus. Sed fenestra, quam Momo in humano corpore desiderabat, ipsa est *Anatomie*, corporis abditos recessus inuestigans, quorum obseruatione, interiorum morborum sedes, partium consensus inter se, & hostis intestini eiicendi viæ accommodatæ deprehenduntur. Id aperit *Galenus* declarauit. *Artis par. c. c. 74*. Constat quod plurimum ad eorum quæ latent sensuum cognitionem conferret, ea quæ ex Anatomæ habetur peritia, & operationum, & usus inuentio. Quicumque igitur facultatem dignoscendi corpora lapsa consequi cupit, oportet ipsum in sectionibus, ac operationibus & visu inuentionibus exercitari: quisquis enim artificiosè corpora humana secare nouit, eorumque singulas particulas diligenter inquirat, ex his latentium morborum causas & sedes facile intelliget, nec non accommodata remedia prescribet. Adiunge primum *cap. lib. de vocalium instrumentis, diffinit. ane.* Quicumque ratione curaturus est, causas situm actionum nostrarum secundum naturam, tum affectionum præter naturam, vt illas seruare, has è corpore eiicere possit, cognouisse debet. Modos item secundum quos actio fit, & locos in quibus, & instrumenta per quæ. Actionis enim modus cognitus promptiores ad opitulandum nos reddit, oimrum qui naturæ opera imitemur, locus localiter opitulari nos docet, ne illis particulis tanquam affectis, frustra molestiam inferamus, affectisque tanquam sanis non opitemur. Instrumenta deoque propriam ac suam cuiusque ostendunt curationem; alio enim modo nervus affectus, alio cartilago, & alio carnosum genus curatur. Secus verò Anatomiz ignavis accidit, quos non incipit cæco & insano comparaueris, qui nunquam visâ horologii fabrica, velut tamen, si motus cessaret, consilium dare, quid esset in eo agendum. *Pontius in Bibliotheca, Artz* librum inferiore mō *Orbassii* scilicet iudicauit, quod Anatomem neglexerit. Cum *Orbassio* collectione inquit *Photus*, quæ septuaginta libros complectitur, committere se ausus est *Artz* labor, inferior fortasse videbitur: tum quod tractationem de *Anatomie* præterierit, quam ille explicauit: tum quod considerationem de *usu partium*, quæ Philosophi potius erat quàm Medici curantis opus, similiter hic prætermiserit. A Græcis ad Arabes transeo, qui cùm Anatomice doctrinæ vtilitatem agnoscerent, etsi in hac arte rudes essent, vt *Auerroës* de suis ingeniis fatetur, forsân quia ludz, quibus cadaueris humani inspectio & attritatio interdita; nihilominus præclara de hoc studio Anatomico elogia scriptis suis inieuerunt. Imprimis quanti fecerit *Auicenna* artem Anatomicam, ipse manifeste declarauit *lib. 1. fen. 2. drall. 5. cap. 1.* Oportet illum qui ægritudines vult cognoscere occultas, Anatomice cognitionē ad optus sit, vt per eam cognitio substantiæ cuiusque membri acquiritur, si est carnosum aut non carnosum, & cuiusmodi est eius forma, vt fiat verbi gratia, si apoplexia hoc, quod habet hanc figuram in hoc aut in alio sit membro, ut sit proportionatum figuræ eius, & sciat si possibile est, quid in eo retineatur, & sciat societatem, & membri operationem, vt ipsius cognoscat ægritudinem. Quare medico qui vult ægritudines regere quæ in membris existunt occultis, necessaria est Anatomia. Idem *lib. 3. fen. 4. c. 26.* agens de sectione frontis, monet Aoratomem Chirurgis esse apprimè necessariū. Atque vt ad praxim siue curationem morborum Anatomies vtilitatem indicat, in therapeuti morborum cuiusque partis, Anatonem siue o

Quæ
um
hæc
cogni-
tio sit
necesse
Philosophi
& Medici.

ganicam structuram, tanquam fundamentum præmisit. *Albucasis Arabs in suo sua Chirurgia* idem testatur. Nemo debet in re tam difficili (intelligit Chirurgiam) quidquam conari, nisi sit Anatomus & medicamentorum sciens, quia aliàs est impossibile ut non cadat in errorem, quo interficiuntur homines. Vidi, *inquit*, Medicum stolidum secuisse apostema scrophulosum in collo mulieris, & incidit quasdam arterias, ex quibus fluxit sanguis donec cecidit mortua inter manus eius, &c. Necessitate in scientiæ Anatomice in definiendis quæstionibus Physiologicis agnoscat *Auerroes lib. de part. animal.* Dum sui sæculi deplorat infortunium, quod propter intestina & ciuilia bella de religione, priuatus dissectionibus Anatomicis, coactus fuerit vacare speculationi sine dissectione ad conciliandum dissenientes Aristotelis & Galeni opiniones: idcirco præcepit *Fernelius*, & ut nemo ad Pathologiam suam particulari accedat, nisi gnarus Anatomus ac peritissimus, & quæcumque quis leget & audierit, fixa meditatione ea contempletur in humano corpore. Itaque ut ad historiz fidem, Geographia, ait idem *Fernelius*, sic ad rem medicam humani corporis descriptio pernoſcenda. Ut enim qui rerum gestarum memoriam repetunt, non illas rectè possunt animo concipere, nisi prius locos & regiones quibus obtigerint, vel sensibus lustrarint, vel sibi quodammodo ipsi cogitatione depinxerint: sic profecto si quæcumque solet ars medendi, tractare, inspicienda sunt, necessum est humanum corpus perfectum habere, in quo omnia contempleremur, & quasi penitus animo cernamus. Quapropter eos in curationibus morborum cecos reputo, quibus hic medicinz oculus non præluceat, vel, ut loquitur *Galenus*, similes iis qui in lectica iter cæci faciunt, vel sine pixide nautica pelago se committunt, longinqua littora petituri, in summa securitate sunt meticolosi, in periculoso mari gurgitur & latentium scopulorum ignorantia secusi & audaces. Ananem igitur ducem sequatur, qui perfectam rerum naturæ cognitionem affectat, hanc Medicus assidue colat & diligenrer amplectatur, si materiam quam tractat, perspectam & probè cognitam habere desiderat.

ANATOMES ANTIQVITAS,

ortus & progressus.

CAPVT II.

Gen. c. 31.



S A C R A litteræ certissimi rerum omnium indices, artis Anatomice vterque manifestè docent; dum referunt luctum Iacobi Patriarchæ cum Angelo, & ligamentum illud rotundum describunt, quo femur acetabulo ischij coarptatur & articulatur, vel neruum eum designant, qui omnium crassissimus in femur, tibiam, imumque pedem deferitur, solusque hanc totam pedis molem agitat, qua corpus sustentatur. Vnde eo nervo tacto totum crus emarcuisse perhibent: cuius calamitatis memores Iudæi, ab eo tempore esu neruorum & carnum pedumque posteriorum abstinerunt. Deinde *Iosephus* præcepit suis Medicis, ut Patris sui corpus condirent aromatis ex more Aegyptiorum, apud quos solebant cadauera exenterari. Evidentiùs adhuc probatur primo millenario non ignotam fuisse Anatomem, eo quod brutorum animantium dissectio, quæ penes Sacerdotes erat in populo Israëlito, in sacrificijs publicis exercebatur, ubi non decebat carnes pro libitu lanare, sed *ritè*, & *ritè* partiri iuxta præscriptum. Hostia dicitur *Abraham*, quando in partes seu membra crassiora & maiora fectur; *probrum* quando in partes breues seu minuras diuiditur, inquit *Eustathius*, comment. in *Odys.* 2. & *Venerunt* vocabant, mensam in qua carnes fectabantur. Ista verò dissectio fiebat, dextrè, solenter, *ritè*, vnde apud *Homerum* illæ particulæ *Venerunt* scienter, *ritè*, *ritè* dicitur, siue consideratè, & *ritè* *ritè* & decenter fectè dicuntur. Nec hodie caret artificio pecorum dissectio quæ macantur ad esum, quæ sit iuxta ritus antiquos, ex commentariis & picturis Anatomicis, ut docet *Buxtorfius*, lib. de *Synagoga Indicia*, cap. 28. Ab ijs sacrificiis postea manauit consuetudo ad alios putà Philosophos, & à pecudibus ad hominum corpora transfusum est. Vetuslatem illam Anatomiz doctrinæ confirmant tempora quibus *Salomon*, *Homerus*, *Hippocrates* &

Primiti temporibus apud Iudæos & Græcos cognita Anatomia.

Democritus summus Anatomicæ scientiæ cultores floruerant. *Apud Salomonem cap. 12. Excelsissimus* quædam Anatomica leguntur, quæ sunt interpretatus *initio lib. 4. Vniuersa Mæmoriæ Persæ* elegantioribus artis Anatomicæ scholis abundat. *Melesius lib. de natura hominis*, demonstrat Homerum peritum fuisse Anatomicum. *Galenus* Homeri testimonium proferit, dum explicat ligamentū hepatis, *lib. 4. de usu part. cap. 14.* quod in Cyclope lethali vulnere fregit Vlysses, dum telum adigit ad eam partem, quæ venæ caue truncus ab hepate emergens diaphragmati occurrit. *lib. 9 Odysseæ, in uoluntate* *cap. 10. lib. 9. de usu part. cap. 14.* Quam graphicè describit *Homerus* magnum pedis pollicis tendonem, quo bigis raptatus fuit Hector ab Achille.

Αμφότεροι περὶ τὴν ἀνθρώπου ἀντομήν.

Εἰς τὸν αὐτὸν οὐκ ἴσους βολὴς εἰς τὸν αὐτὸν ἴσους.

Non potest Medicus & Anatomicus, exactius fraduram & luxationem articuli coxendicis describere, quàm Homerus Iliados 5.

Τὸ βάλειν Αἰνὸς κατ' ἰσὺν, ἵδμεντες μὲντες

Ἰσὺν εὐερίσμεν, κατὰ τὴν δὲ μὴ καλῶς

Θάλασσαν δὲ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ, ἵδμεντες εἰς τὸν αὐτὸν τινέμεν.

Homerus
non fuit
hominis
Rudius.

Arystoteles lib. 3. de historia animalium progressum venæ magnæ ex *Hæmorrhoidibus* recitat.

Tellatur *Galenus*, *Comment. in lib. 3. de Artic.* Hippocratem potissimum rationi corporum incidendum sedulam operam dedisse, cum Anatomen mirum in modum ad artem Medicam conferte sciret, quod nunc aperte docet eum spinæ naturam intelligi voluit, quàm Empirici non secus atque exterarum partium contemplationem inuilem esse dicunt. Ipsemet *Hippocrates lib. 3. de artic.* Commentarios de venis & arteriis pollicetur, quos nunquam videre potuit Galenus. Attamen quum liber de *ossium natura*, duas Anatomicæ doctrinæ partes contineat, ossa, atque venas & arterias; Ausim affirmare primam libri partem esse *Mechanicam* conclusionem, & reliquam huius libri partem esse *libram de venis*, quem pollicetur Hippocrates, ossibus male adsumtum: & in hac opinione fuit Galenus, *lib. de Ossibus Hippocratis, diffinitione anatomica*. Præterea *librum de corporum diffinitione* conscripsit, quem imperfectum habemus. Ipsemet *Galenus* *librum de Anatomie secundum Hippocratis doctrinam* composuerat, quorum deploranda est iactura. *Hippocrates* canes dissecti ut pulmones obseruaret, *lib. de Corde*. Ibidem monet quod dissectio accurata huius partis non est opus eniauis, sed periti artificis, & appellat istud opus Chirurgiam. *Lib. 6. Epidem.* scribit hominem habere cola intestina cani similia. *Ibidem, lib. de intern. affec.* testatur se in boue, in cane & fœc quadrupedibus dissectis tubercula in pulmone aquâ repleta deprehendisse, unde natus fuerat *Hydrax Thoracis*. Idem testatur se ex hominis ossibus ossa descripsisse, primus spinæ admirabilem figuram descripsit: primus vesiculas feminarias, eas ûnque situm, omenti vsum, valvulas venarum, ortum nervorum, lienis actionem, vteri conformationem. Atque ut extaret aliquod monumentum æternum & immutabile suæ diligentis laborisque in hoc studio exantlati, sceletum ære fabricatum Apollini Delphico consecrauit, ut *author est Pausanias*; ille idem *lib. de Ossium natura*, crudèdè prohetur, se quæcumque de ossibus exarauit, ex Hominis ossium inspectione didicisse. *Democritus* Hippocrati coruæ, animalium dissectionibus assidue vacabat, quem animalia secantem offendit *Hippocrates*. Quamuis ea de re dobet *Cornelius in suis Medicis* *Chamaeleontem* per singula membra dissectum *Democritus*, *peculiari volumine* dignum iudicauit, *teste Plinio*. Idem tantum extorum inspectioni tribuebat, ut ex solo eorum habitu ac colore, rerum quas terra procreat vbertatem, tenuitatemque aeris, qui nos ambit, salubritatem ac pestilentiam significaret, ex *Cueruæ*, *Commentariis Martellianis lib. 38.* Democritum peritum fuisse Anatomicum declarat, dissectionum pecudum exta rimari cum Anatomicis Democritum putes, docentem quibus modis posteritas mederi doloribus possit internis. Foran eius libri tam Anatomici, quàm de Magia, & rebus reconditis ad nos peruenissent, nisi magna eorum pars à Platone in ignem coniecta fuisset, ut tanti viri memoria periret, inquit *Leontius*: nihilominus extat superstes *Epistola* quædam *Democriti ad Hipp.* Scripta, ubi mysteria artis Anatomicæ paucis verbis aperiantur. Interim monebo *geminum Democritum* excussisse, vnum seniore & Comum, qui præceptor fuit Hippocratis, in senectute cæcus fuit, de quo intelligendus est *Tullius, lib. 5. Tuscul.* alterum *Aldemritum*, qui

Hippocrates
non fuit
hominis
Rudius.

Quædam
Democritus
fuit Anatomicus.

non potuit esse præceptor Hippocratis, quamvis id asserat *Soranus*, & dubitet *Celsus* in præfatione. Nam ille docebat Medicinam, nempe magicen eodem tempore, quo *Hippocrates*. Veram Medicinam profitebatur, attestante *Plinio*. Propterea magnam obferuo in utroque Democrito distinguendo confusionem, nec puto epistolas, quæ nomine Hippocratis & Democriti circumferuntur veras, & germanas esse scripturas istorum hominum, sed supposititias. De Democriti excecatione spontaneâ propter insanum mulierum amorem, lege *Terullianum* in *Apologético*. De Democrito Chymiam profitentem, vide *Senecam* in epistolis. De magicis operibus Democriti multa reperiuntur apud *Plinium*. De libro secretorum Democriti *Pitranus*. De opinionibus Philosophicis Democriti passim *Aristoteles*. Sed nunquam nominat *Abderum*. De responsione Democriti Abderitis ad Darium lugentem mortem uxoris suæ, lege *Epistolam* 37. *Iuliani Imperatoris*. De Democrito, qui elusit Abderitanos fidei terroribus dæmonum, ipsum terrefacientes vide *Lucianum* in *Philopsude*, *Solinum* de *Cathobrite lapide Democriti*, *Agellius* lib. 10. cap. 12. conqueritur de portentis fabularum quæ *Plinius Secundus* indignissimè Democrito adscripsit, tandemque concludit, *Multa videntur ab hominibus male scientibus huiusmodi commenta in Democriti nomen data, nobilitatis auctoritatisque perfugio utentibus*. Nunc è diuerticulo ad viam redeo. Si Anatomie à tam longo tēpore fuerit cognita priscis Philosophis, ineptè *Chalcidius*, *Comment. in Timæum* *Platonis*, Anatomes inventionem, *Alcmeoni Pythagore* Philosopho eminentissimo acceptam retulit. Nam illa simul cum Medicina nata est, & a doleuit, & si verum fateri volumus, reliquas Medicinæ partes præcessit. Neque enim curatricis Medicinæ præcepta tradi potuissent, nisi prius perspecta & explorata hominis natura, nec sciri potuisset quid in corpore contra naturam contigerat, nisi prius quæ inerant secundum naturam, cognita fuissent.

Nunc paulò diligentius inquiramus artis Anatomice iocunabula, quibus initiis orta fuerit, quando adoleuerit, & ad maturitatem seu perfectionem suam peruenit.

Animantium sectio corporumque apertio siue euisceratio, præterquam in sacrificijs, primo sæculo inusitata fuit: quod tunc homines ab esu carniū abstinere, forsitan ex illa Pythagoreorum Metempsychosi deterri,

*Spiritus èque feris, humana in corpora transit,
Inque ferax noster, nec tempore deperit vilo.*

Ob eam causam Pythagoras ex diuinationibus solam Aruspicinam repudiavit ac improbauit. At ille plures discipulos educauit ac eduxit, inter quos *Empedocles*, & *Alcmaon Crotoniata* præ cæteris excelluerunt, auctore *Laërtio*. *Empedocles* doctrinam præceptoris sanctè retinuit, nec ab ea discedere voluit. Existimauit omne quod viuunt & mouetur edendum non esse. Alter verò, nempe *Alcmaon Crotoniata*, cuius opiniones Anatomicas recitat *Aristoteles*, nempe capras auribus spirare, animam esse immortalem, quia mouetur vt cælestia corpora, ille inquam homines ad vsum, & esum carniū traduxit, ob idque primus *Anatomen* inuenisse atque vulgasse perhibetur. Ab eo tempore animalium sectio tam ad sacrificia quàm ad hominum epulationes popularis facta fuit, quoniam in sacrificijs licebat cunctis victimarum cæsarum viscera inueneri: & cùm familiaris esset esus carniū, poterat vnusquisque emptas viscera domi per otium contemplari; quod præstare consulit *Galenus* ei qui Anatomie studio tenetur, vt ex macello cor, pulmones, cerebrum emat, ad priuatam & domesticam exercitationem.

Cùm autem Medici & Philosophi secundis animalibus assuescerent, audaces iam facti, humanis corporibus non pepercerunt. Est enim verisimile veteres Medicos humana corpora resecuisse, vt singulorum viscerum, membrorum etiam sapores omnes indagarent, omnia persequutos vsque ad relegendam vnguium. Ex *Plinio* lib. 28. in præfatione, & *Galeno* lib. 10. de simpl. medic. faculi, in præfatione, qua de re commentarios scripserunt *Xenocrates*, & hoc multum antiquior *Democritus*. Lacedæmonijpe cùm *Aristomenes Messenus* disseccuere, causa videndi, hirsutumque Cor repperitum est. *Plinius* lib. 31.

Certum est *Anatomen* primo & secundo sæculo exosam atque inuisam fuisse, quod crederent Medicos, quorum quidam erant *Magici*, visceribus humanis abuti ad perniciem hominum, ex quibus sua veneficia pararent. Scribit *Plinius*, *Magisem natum primum è Medicina, ac specie saluari irrepsisse, velut altiore sanctiorémque, quàm Medicinam.*

Vitamque non Medicinam, Magisquæ eadem ætate effloruisse, sicut Hippocrate, hanc Democriti celsitatem. Quod autem Magus ex humanis viscibus sua beneficia conficebat, docet Lucanus lib. 6.

*languine nudiq; necatū
Ovisq; caput, pendensq; corpora carpi,
Alraſtiq; cruces, percussiq; ossa nimbiū
Vulsi, & incellū admisso Sale medullas, &c.*

Eodem crimine apud Horat. in Epod. Canida notatur. Nemo dubitat *Druidarum* Medicinam antiquissimam fuisse, eamque *vulnerariam* extitisse; At illa infans iudicatur, quod humanis victimis vteretur. Hominum corpora incidisse potius credendum, ad investigandam hominis fabricam. Cum autem apud *Romanos* exta humana aspicere, & mandis nefas haberetur; *Tiberius Cæsar* hoc genus Vatum Medicorumque destruxit. Hinc illa congratulatio *Pliny*: *Non satis æstimari potest, quantum Romanis debeat, qui sustulere monstra, in quibus hominem occidere religiosissimum erat, mandis etiam saluberrimum.*

Galenus vique proficitur collapsam æ penè intermortuam *Anatomen*, ab *Hippocrate* erectam & infusa ram fuisse; quem *Anatomici* plures imitati, acceptum patri-
monium plurimum auxerunt, certatum in commune negotium operam navantes. Illos verò *Anatomicos Galenus* in duas classes distribuit. Quosdam enim pisces facit, à quibus negligenter exenta fuit *Anarome*, etiam si quædam litteris consignarent. Primus omnium post *Hippocratem*, *Diocles*, de *Anatome commentarius* edidit, quem sequuti sunt *Praxagoras*, & *Asclepiades*, *Philiscus*, *Philistinus*, *Mesiasius*, *Dienichers*, *Chrysippus*, *Euryphon*, & *Antigenes*.

Comment.
in lib. 2. &
notis ha-
manis.

Enimvero Anatomici à quibus doctrina Anatomica plurimum illustrata fuit, *Hierophilum*, & *Endemum* nominat; quos nullus ad memoriam usque *Marini* & *Nicomachii* sublequutus est, vt aliquid inuentum adderet: quod neque præstitit *Heraclianus Medicus Alexandrinus*. *Nicomachii* verò præceptor fuit *Pelops*, *Marini Quintus*. Hic etiam produxit discipulos *Satyrum*, quem ansecutus *Galenus*, & *Lycum*. *Galenus* lib. de diffect. vultu, cap. 9. inter præstantissimos *Anatomicos*, qui optime dissectionem tractarunt, enumerat *Asclepietum*, *Hierophilum*, & *Endemum*, *Dionem*, & *Praxagoram*, *Philistinum*, sed eos in corpore nostro multa ignorasse non est mirum, quippe quod rudem dissectionis cognitionem habuerunt, ac proinde nullam sibi horum habendam esse rationem censet. Scribit *Macrobius*, *Platonem* in *Anatomicis* de se risum posteris tradidisse. Sed omnium *Anatomicorum* conatus *Galenus* longè superavit, qui totus à teneris huic arti deditus, magna ingenij felicitate, præceptis herbarum, adhibitis etiam assidua encheusis, & vitijs fideli, *Anatomen* ad hoc fastigium, quale nunc cernitur, perduxit. *Galenus* alibi meminit *Atliani*, quem de musculis & partibus corporis scripsisse testatur in præfat. lib. de diffect. muscul. Mentionem quoque facit *Martianus*, qui in honore sui propter duos libros de re Anatomica conscriptos. Hunc lib. de libris proprijs septuagenarium vocat, inuidum & vitulicatore, atque suspicote eum intelligere lib. 7. adim. Anat. cum loquitur de sene septuagenario. Intro libri de dissectione musculorum quid sentiret de scriptis *Anatomicis Marini*, *Atliani*, *Pelops*, *Lycis* proposuit: *Pelops* verò sui præceptoris passim mentionem facit: & cap. 9. libri de dissectione vultus, monet *Hierophilum* in his quæ ad artem spectant eruditum fuisse, tum verò ad exquisitissimam dissectionis cognitionem pervenisse, ac maxima ex parte non in brutis, vt plerique solebant, sed in hominibus ipsis exercitatum fuisse. *Hierophilus* verò discipulus fuit *Praxagora Nicarchi Phidy*, qui cum in alijs Medicinæ partibus præstantissimus, tum in naturalibus speculationibus peritissimus fuit, cuius errores abundè refecit & castigavit ex *Galen*. Intro lib. de Tremore, *Rassus Ephesus* in suis lib. *Anatomicis* istos auctores *Anatomicos* nominat, quorum auctoritate vitur, nempe *Asclepiades Medicus*, *Atli*, *Greco* *Euryphatem*, *Endemum*, *Hippocratem*, *Asclepietum*, *Hierophilum*, *Praxagoram*, *Philiscum* *Italum*, *Dionysium* *Ozymachisium*, *Mesiasium*, *Zenonem*, *Empedoclem*. *Ennapius* in vitijs *Philosophorum* narrat *Ionium Sordianum*, auditorem *Zenonis*, fuisse eximie peritum corporis membrorum, & naturæ humanæ indagatorem summum.

Asclepiades lib. 3. de hist. animal. cap. 3. mentionem facit *Syrmenensium* & *Medici Cypri*, & *Dionigeni Apolloniata*, & *Polyji*, qui tractarunt de Penis.

AN APVD IVDÆOS COGNITA

& tractata Anatome?

CAPVT III.



VAMVIS apud Iudeos horribile & expiatione dignum fuerit *Cadaver*, vel *atrectare*, nihilominus inuenio apud illos excultum fuisse *Anatomica* doctrinæ studium; quod in monte *Sinar* à Deo reuelatum fuisse *Moyfi* *Rabbini* asseuerant. In primis scire conuenit, *Iudeorum* nationem valde sollicitam, ac ferme supersticiosam fuisse in asseruandis Patrum suorum ossibus, quin etiam aliò migrantes secum ossa tanquam *Dei Penates* deuexisse, sic *Iosephi* ossa ex *Iudea* in *Polestinam* translata fuere. Nec solius *Iosephi* ossa aduecta, sed ceteri *Isaactita* Patrum suorum vnusquisque de tribu sua ossa transtulerunt, vt notat *liber Resus*, propter antiquitatem magni nominis inter *Iudeos*.

Ab his ad *Aegyptios* manauit hic ritus, & solennis hæc consuetudo conseruandi ossa, vt passim apud priscos Authores, *Herodotum*, & alios non minoris famæ legitur. *Tenatam* *Chaldeis* per quamdam traditionem notat corpus *Iosephi* conditum aromatibus, ac feretro impolitum, *Nilo* profundo demersum fuisse. Quo fine dubitari potest, *An* ut absconderetur cadaver, an potius ut aquarum gurgitibus expositum illud ossuarium, ossa cadaveris carnibus spoliata magis exsiccarentur, & nitidiora fierent? hoc enim artificio ossa mūdāri perhibent *Anatomici*. Præterea in *Genesi*, cap. 30. *Ioseph* præcepit Medicis seruis suis, vt Aromatibus condirent Patrem; sic conditus fuit *Iacob* aromatibus & repositus in *Arca*. Hanc pollinctorum & condituram cadaveris præstare non poterant Medici, sine dissectione artificiosa cadaveris. Inde nata *Anatome*, scilicet cognitio corporis humani per dissectionem comparata.

Quæret aliquis, quo fine facer iste ritus apud *Iudeos* tam religiose obseruatus? Dices ex *Mose* *Barceph* lib. 2. de *paradyso*, cap. 14. *Noë* alter instaurati mundi patens post illum vniuersalē orbis cataclysmum, cum liberis in varias terræ partes dimitteret, singulis distribuit ē lapideis, ossibusque *Adami* partem, vni caluariam, aliisque alia ossa, vt eo aspectu modestē se gererent, & in pietate viverent, dum mortales se esse recordaretur. Quanti sit momenti ossium humanorum recordatio apud *Iudæos* docet *Iuxtafilius* in *Synagoga Iudæica*. Diuidunt illi legem *Moylis* in præcepta 630. eademque rursus in *Iussiones* & *Prohibitiones* distinguunt: Ideoque mandatorum iubentium 348. faciunt, quot nimirum secundum *Anatomen Rabinicam*, homo ossa in corpore suo diuinitus adeptus est. Mandatorum verò prohibentium 365. imaginati sunt, quot nimirum dies annum perficiunt, vel vt alij loquuntur, quot sunt venæ & ligamenta in corpore humano ossa neſſentia. Itaque si membrum hominis vnumquodque vnoquoque die mandatorum Dei iubentium reſequatur vnum, vnum ē contra mandatorum prohibentium omittat, inde fiet vt lex vniuersa, & non modò *Decalogus* vulgò dictus, annis singulis & in æternum optimē per eos præstita fuisse dicenda sint; quod si quis non obtemperet præceptis legis, de eo dicitur quod nullum habeat membrum vel os bonum, quod incitet hominē ad exequenda legis præcepta. Considerate quæso, ridiculam *Osteologiam Rabinicam*. Cum sint membra hominis creata ad ea præstanda, quæ ab homine *Deus* fieri voluit, 348. creauit secundum præcepta legis iubentia, sic autem ossa ab *Hebræis* numerantur 30. in infimo pede, nempe sex in vnoquoque digito pedis, decem in talo, duo in crure, quinque in genu, vnum in femore, tria in coxis, 30. in manu, 6. scilicet in vnoquoque digito, duo in cubito, vnum in brachio, quatuor in humero, vndeſcim costæ, ideoque centum & vnum, ab vno latere; totidem ab altero faciunt ducenta duo. Præterea octodecim vertebrae in spina dorsi, nouem in capite, octo in collo, sex in aperturis Cordis, id est thorace, quinque in foraminibus suis, sic habes ducenta quadraginta octo ossa, quæ hoc modo distribuuntur in *libello* quæſocatur *Achaz Reſchel*, id est pilus aromatarius. Quamuis hæc ossium distributio sit imperfecta & p̄ſorſus reiſcienda, indicat tamen studium *Anatomicum* apud omnes nationes viguisse, & antiquissimum fuisse. Quapropter *Picus Mirandulanus* inter sua

Iudei sol-
liciti in os-
sibus asser-
uandis.

Iosephus
conditis
Aromati-
bus.

Cur Noë
distribuit
ossa Adami
suis filiis.

Osteologia
Rabinica.

Cabalistica axiomata illud inferuit. *Id est* cum obitus non est sepultus, quia eius ossa erant virtutis eximie propter influentias aëoris superioris vocatæ *radix*.

Accuratum quorundam *Indarum* studium in *Anatomico*, declarat illæ mirabiles observationes, quas proponā: in primis verissima est illa observatio de ossium dissolutione in partu in *Zoare declarata a Rabbi Simone comment. in cap. 1. Exodus*. Haud facili quidem aliud magis mirandum in tota rerum natura reperies (inquis ille) quam dissolutionem istam ossium partu, quæ fit in parturientibus magno iuvamento nature, quæ potius providentiæ quadam Dei, cui Natura ipsa ministrat, etenim id nulla quantumvis validissima vi, & nixu alio tempore quàm in partu fieri posse certum est: sicut in cornibus cervorum, quæ quotannis decidunt & denud renascuntur. Adde singularem observationem de extractionsæ factæ per uteri sectionem, quæ confirmat *Indæ* non ignaros filios rerum Anatomicarum & Chirurgicalium. In *Mysiaci Doctores* legimus, quærent si filius per lateris sectionem eductus sit censendus primogenitus, quia non aperuit vulvæ matris. Præterea dubitationem mouent de *Gemedi*, putā si coniungat *Gemellos* in ventre gestari, & vnus per viam lateris in eisdem educatur, alter per viam vteri exeat, quisnam primogenitus reputandus? An cæso, vel aliter. Præterea *Indæ* vnus *Lani* mactant & dissecant pecudes secundum præcepta, quæ continentur in libro quem callere debent *Lay*, priusquam huius ministerio se accingant, si credimus *Buxtorfio* in *Synagoga Iudæica*. Sed præ cæteris admirabilis est isthæc observatio si vera, in dorso hominis *si maneat* *Luz* contineri: in quo Radix humane compaginis, et vigor consistat, ex eo Cor, Hepar, Cerebrum, & ipsa Genitalia ducunt originem, tanquæ est virtutis istud os, vt more aliorum non patiatur potredinem, nec igne vratur, nec molâ conundatur, sed semper remaneat tanquam germen resurrectionis. Ex *Paulo Riccio* pag. 171. *Artis cabalistica*. *Georgius Vercius* addit, ex isto osse *Luz*, magnitudo ciceris mundati, repullulare totum corpus animale veluti plantam ex semine, pag. 403.

Quæstio
de primo-
genio in
gemellis.

De ossi
Luz.

IVDICIVM DE ARISTOTELE

in rebus Anatomicis.

CAPVT IV.



Vm viris ingenuis & sapientibus adeo sit insitum veritatis studium, vt eius amore ipsi Philosophi sua decreta rescindere non dubitarent, referent *Aristotele*, non possum probare iudicium *Aphroditiæ*, vel alterius, de illo edicto quod Philosophorum scholis inscripsum erat. *Eorum omnium qui scribunt in Aristotelem, est ei a disciplina sapienter inscripta sit, scilicet propter audaciam criminandi, à cæcis Philosophorum excludantur*. Exrat apud *Epiphonium* lib. 25. de preparatione Evangelica, *Aristotelis iudicium de Aristotele*, omnes qui tum temporis ab eo discesserant fuisse sophistas & *inani*, & *inani*. Amicus quidem *Aristoteles*, sed magis amica veritas. Nec *Hippocrati* credit *Galenum*, quem pro Deo & oraculo Medicinæ veneratur, nisi consentanea veritati scribat, aut certas demonstrationes adferat. Itaque nullius à dictis iurare in verba magistri, quid sentiam de scriptis *Aristotelis* *Aristoteles* libet pronunciare. Certum est *Aristotelem* nature miraculum, diuinum & incomparabilem, ac immensæ subtilitatis virum, vt loquitur *Plinius*, humane sapientiæ patrem esse, teste *Julio Cæsare Scaligero*, principem & quasi Deum recte philosophantem, quem *Plato* veritatis Philosophum, & lux Academicæ Mentem appellavit, & quo neminem doctiorem, neminem acutiorem, neminem in rebus inueniendis ac iudicandis acriorem fuisse iudicauit *Tullius*. *Ammenius* in vita *Aristotelis* eum humane sapientiæ fines transiisse censet. *Amerro* in lib. 3. de Anima, *Comment. 14.* scribit *Aristotelem* fuisse regulam & exemplar, quod Natura inuenit ad demonstrandam vltimam perfectionem humanam in materiis: & lib. de fructu, disp. 3. part. 1. 13. intelledum *Aristotelis* fuisse finem humani intellectus, quare bene dicitur de illo, quod ipse fuit creatus & datus nobis diuinâ providentiâ, vt non ignoremus possibilia fieri: & alibi notat mille & quingentos præterisse annos, ex quo scripisset



Aristoteles, nec vllum in eius libris errorem alicuius momenti inuentum fuisse. Laudemus, *ait Auerroës*, Deum qui separauit hunc virum ab aliis in perfectione, & dedit ei vltimam perfectionem humanam, quam nullus homo potest in vlla ætate attingere.

His adductis testimoniis de certa & indubitata eruditione *Philosophi*; nunc cum vt in tota *Philosophia*, sic in *Medicina*, & præsertim *Anatome*, supra ceteros excelluisse demonstrabo, vt eius scriptis deinceps maior fides habeatur, quidquid fecus scripserit *Laurentius*. Itaque *Aristoteles* patre *Nicomacho* natus est, qui fuit *Amynta* patris *Philippi* Macedonum Regis Medicus, & in *vi. libris* conscripserat, *ait Auerroës*. Ab eo *Medicinam* tanquam *matrem* *Aristotelem* didicisse probabile est, quoniam adhuc iuuenis in militia profectus, cum paterna bona abligerisset, *pharmacopolam* egit. Quod confirmatur ab *Asbenas lib. 8. de pharmopoliis*, & *Suidas ex Timaeo* narrat *Aristotelem* honorabile *pharmacopolium* clausisse, vt transiret ad scholas *Philosophorum*. Nec solum delectatus est *medicina Theoretica*, verumetiam *Practicam* excoluit; quoniam amicis laborantibus auxilia dedit, & medicationes quasdam, & dicitur præcepit, vt est manifestum ex eius *Epistolis*, referente *Plutarcho in vita Alexandri Magni*. Testatur *Laertius*, *Aristotelem* in *vi. libris*, *Medicinalium lib. 2.* conscripisse, quorum inscriptiones non profert; forsitan erant illi duo commentarij *de sanitate & morbo*, quos pollicetur *lib. de sensu & sensib.* & *lib. de respiratione*. Illos nominauit *Galenus*, & vt opinor vidit, ex quibus nonnulli suspicantur *Galenum* suos admirabiles libros *de differentiis & causis morborum*, *de differentiis symptomatum* deprompsisse. *Ipsemet lib. de partib. animal.* istos libros designare videtur, agens de causis catarrhi. De his (inquit) cum de morborum causis agitur, disserere congruum est, quia tractare de his naturalis scientiæ interest: De morborum discrimine, quot hi, quique sint, ac de symptomatis, de vtrorumque causis prius omnium *Hippocrates* re ad principia dedisse videtur post eum verò *Aristoteles* fusissimè ea est interpretatus. Ex *Galeno lib. meth. med. c. 2.* Sed rebus *Anatomicis Aristotelem* sedulam dedisse operam, fidem facient *nonnulli libri nouem*, & *corpi animalium*, quos libros citat *Laertius in vita Aristotelis*, quique ab *Apollonio & Antigono* in *Admirandis*, memorantur. Testatur *Apuleius* se libros *Aristotelis de animalibus* & explorare studio, & augere. Hi longè differunt à libris de animalibus, quorum vsurà nunc incundissimè fruimur. In illis cōmentariis *Anatomicis* haud dubiè consignata erant, quæcunque *Aristoteles* in rebus *Anatomicis* secundo cadauera deprehenderat. Accedit quod à *Galeno Medicorum principe* traditur, referente *Theodoro Gaza*, *Aristotelem* primum *Anatomen*, hoc est membrorum dissectionem scripsisse, qua in re primus & optimus fuit auctor. Ipsemet *Galenus* testatur *lib. 7. de administrationum anatomic.* quosdam errores *Aristoteli* in rebus *Anatomicis* condonandos esse, quia videntur eosqui nihil aliud agant quàm *Anatomica*, foràmque vitam huic speculationi dicantur, vt *Marinus*, in planibus hallucinatos. Primus autem *Aristoteles* *Arteria* nomen imposuit magnæ arteriæ ex *Gal. lib. de dissect. venarum*. Quamuis nomen istud dumtaxat in plurali *Hippocrates* vsurparit, pro arteriis Cordis, *lib. de Corde*. Sed *Aristoteles* addixit trunco magni illiustubi, cuius progressum & direptum proposuit, supra *Hippocratem*. Primus *Aristoteles* de partibus corporis, & quæ sint earum appellationes docuit atque literis prodidit: ex *Gal. in Isagoge*. Quamuis in *lib. de Animal.* mentionem non fecerit musculorum, non inde sequitur musculum ignorasse, *Hippocrati* cognitum, & vario nomine pro ratione diuersarum actionum ab eo designatum. Nam *lib. 2. de partibus animalium, cap. 9.* à tendonibus moueri ossa. Sic *Hipp.* carnis nomine musculos intelligit, vt *sestione 4. Aph. 16.* Attamen in *problematis*, musculi nomine vitur, carnes ad motum ossibus circumfundi scribit *Aristoteles*. Sed absolutè & in toto genere *Animalium*, motum ab innato spiritu edi & perfici scripsit, quia multa reperiuntur animalia quæ moventur, & tamen carent musculosis carnibus. Imò, ante *Fabricium*, in secunda specie nerui duplicem tendonem in capite & sine agnoscit, ad robur corporis, & vocat epitomum, & humerarium, ut *inquit* *lib. de partibus animalium* & *lib. de motu animalium* *Arteria* & *Arteria*: sic emendo, vt hæc dictio respondeat tendoni. Sed nemo doctius *Aristotele* *Articulationes ossium* expressit, vt in *Osteologia* demonstrabitur. Denique nemo veterum *Anatomicorum* accuratius tractauit *Anatomica*, vt longè superarit *Hippocratem*. Ex eius libris de *Animalibus*, peritus *Anatomicus* arcana multa aliis indita & occulta eruct & obseruabit. Ita vt au-

sim assuerat Aristoteles libros de Animalibus non intelligi nisi ab erudito Medico, & perito Anatomico. Quæcumque verò scripsit, non solum ex aliorum relatione recepit, sed suum iudicium fideli inspectione, & accurata sectione confirmatum adhibuit, propterea loquendi genus illud, iam usum est, non adhuc usum est, crebro usurpat, vt legere est lib. 1. de hist. Animal. de icoris ac lienis sedibus permutatis agens, de quibusdam partium ratione lib. 2. & in tertio eiusdem, de viri caluaria sine futuris ita scribit, de 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. Item in secundo sunt hæc. pueri & adulescentes. Quæ præcisè vertit Plinius illis verbis, solida ungula & bicornis nullum: in 3. adu. lib. 1. de hist. animal. albas aues nequaquam nigrescere scribit his verbis, in 3. adu. lib. 1. inquit, in omni his partibus, cap. 5. lib. 2. de hist. animal. de his nondum quorundam habemus quod fidem faciat satis: & cap. 2. lib. 8. de hist. animal. Omnium animalium quæ nouimus sus grandinem concipit: & lib. 4. de generatione animalium, homo plus temporis quam quoduis animal viuit, quod quidem vsu adhuc fide digno notuimus, & Aristoteles lib. 1. de hist. animal. atque lib. 2. & 3. & 4. de partib. Animalium, de Cordis offe differens, confidenter affirmat, est sine offe omnium. Cor quæcumque nos vidimus, excepto equorum & cuiusdam generis bouum ordine. Notate loquendi genus, quæcumque nos vidimus. Vt inde cognoscatis Philosophum, interiora corporum diligentè inplexisse.

Ne quis autem existimet illum animalium tantum corpora discuisse, librum 1. de hist. animal. exorditur ab externarum partium hominis descriptione, tanquam ab exemplari & regula, ad quam reliquorum animalium corpora referre voluit: sunt enim partes hominis, inquit ille, & propter sensum & propter consuetudinem nobis notissima, sed quia eius seculo rara & ferme inusitata erat corporis humani dissectio, interanea è brutorum corporibus quæ ad hominem propius accedunt, dignoscenda esse censuit. Sed non inde sequitur eum corporibus humanis abstulisse. Nam lib. 1. de hist. animalium manifestè docet, se in cadaueribus humanis ductum & feriem venarum peruestigasse. Cum scitur sanguinis venarumque natura videatur obtinere principij vim, primum de his descendum est, præsertim cum præci Auctores aliquot minus vera prodideret. At sanè hoc cognoscere fecit obscura res difficultas: nam principalis cuiusque venæ natura latet in corporibus vitæ sanctis. Præterea, quod illa præter ceteros exente sanguine subsistat illico, quippe ab illis tanquam de vase effunditur vniuersis, neque enim illa animalis pars per se ipsam sanguinem possidet, tantummodo quiddam in corde pusillum efficit, ne animæ in venas continetur. At in vniuersis quibusdam insit, nullo deprehendi pacto potest, quoniam eius natura abditæ est. Quare qui in dissectionibus cadaueribus scrutati sunt maxima principia illis quæ tunc apparebant, determinarunt. Porro vt intelligatis Aristotelem in dissecandis animalibus eruditum & versatum fuisse, varios qui passim apud eum reperimus locos, in quibus lectores suos ad dissectionem, & dissectionem, & lib. Anatom. remittit, proferam. Ex Aristotele lib. 1. de hist. animal. c. 11. de 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. & de 11. & de 12. & de 13. & de 14. & de 15. & de 16. & de 17. & de 18. & de 19. & de 20. & de 21. & de 22. & de 23. & de 24. & de 25. & de 26. & de 27. & de 28. & de 29. & de 30. & de 31. & de 32. & de 33. & de 34. & de 35. & de 36. & de 37. & de 38. & de 39. & de 40. & de 41. & de 42. & de 43. & de 44. & de 45. & de 46. & de 47. & de 48. & de 49. & de 50. & de 51. & de 52. & de 53. & de 54. & de 55. & de 56. & de 57. & de 58. & de 59. & de 60. & de 61. & de 62. & de 63. & de 64. & de 65. & de 66. & de 67. & de 68. & de 69. & de 70. & de 71. & de 72. & de 73. & de 74. & de 75. & de 76. & de 77. & de 78. & de 79. & de 80. & de 81. & de 82. & de 83. & de 84. & de 85. & de 86. & de 87. & de 88. & de 89. & de 90. & de 91. & de 92. & de 93. & de 94. & de 95. & de 96. & de 97. & de 98. & de 99. & de 100. Oportet verò & de hoc & de aliis veteris quæ se habeant modo, ex dissectionibus contemplatum esse: & ex historiis lib. 2. cap. 5. de 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. & de 11. & de 12. & de 13. & de 14. & de 15. & de 16. & de 17. & de 18. & de 19. & de 20. & de 21. & de 22. & de 23. & de 24. & de 25. & de 26. & de 27. & de 28. & de 29. & de 30. & de 31. & de 32. & de 33. & de 34. & de 35. & de 36. & de 37. & de 38. & de 39. & de 40. & de 41. & de 42. & de 43. & de 44. & de 45. & de 46. & de 47. & de 48. & de 49. & de 50. & de 51. & de 52. & de 53. & de 54. & de 55. & de 56. & de 57. & de 58. & de 59. & de 60. & de 61. & de 62. & de 63. & de 64. & de 65. & de 66. & de 67. & de 68. & de 69. & de 70. & de 71. & de 72. & de 73. & de 74. & de 75. & de 76. & de 77. & de 78. & de 79. & de 80. & de 81. & de 82. & de 83. & de 84. & de 85. & de 86. & de 87. & de 88. & de 89. & de 90. & de 91. & de 92. & de 93. & de 94. & de 95. & de 96. & de 97. & de 98. & de 99. & de 100. Oportet autem hæc inspicere in exemplis dissectionum, & iis quæ in historiis scripæ sunt. Lib. 2. cap. 5. de 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. & de 11. & de 12. & de 13. & de 14. & de 15. & de 16. & de 17. & de 18. & de 19. & de 20. & de 21. & de 22. & de 23. & de 24. & de 25. & de 26. & de 27. & de 28. & de 29. & de 30. & de 31. & de 32. & de 33. & de 34. & de 35. & de 36. & de 37. & de 38. & de 39. & de 40. & de 41. & de 42. & de 43. & de 44. & de 45. & de 46. & de 47. & de 48. & de 49. & de 50. & de 51. & de 52. & de 53. & de 54. & de 55. & de 56. & de 57. & de 58. & de 59. & de 60. & de 61. & de 62. & de 63. & de 64. & de 65. & de 66. & de 67. & de 68. & de 69. & de 70. & de 71. & de 72. & de 73. & de 74. & de 75. & de 76. & de 77. & de 78. & de 79. & de 80. & de 81. & de 82. & de 83. & de 84. & de 85. & de 86. & de 87. & de 88. & de 89. & de 90. & de 91. & de 92. & de 93. & de 94. & de 95. & de 96. & de 97. & de 98. & de 99. & de 100. Sed quoniam situs sit singularum partium ex dissectionum descriptione contemplare. Lib. 2. de hist. animal. c. 15. in 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. & de 11. & de 12. & de 13. & de 14. & de 15. & de 16. & de 17. & de 18. & de 19. & de 20. & de 21. & de 22. & de 23. & de 24. & de 25. & de 26. & de 27. & de 28. & de 29. & de 30. & de 31. & de 32. & de 33. & de 34. & de 35. & de 36. & de 37. & de 38. & de 39. & de 40. & de 41. & de 42. & de 43. & de 44. & de 45. & de 46. & de 47. & de 48. & de 49. & de 50. & de 51. & de 52. & de 53. & de 54. & de 55. & de 56. & de 57. & de 58. & de 59. & de 60. & de 61. & de 62. & de 63. & de 64. & de 65. & de 66. & de 67. & de 68. & de 69. & de 70. & de 71. & de 72. & de 73. & de 74. & de 75. & de 76. & de 77. & de 78. & de 79. & de 80. & de 81. & de 82. & de 83. & de 84. & de 85. & de 86. & de 87. & de 88. & de 89. & de 90. & de 91. & de 92. & de 93. & de 94. & de 95. & de 96. & de 97. & de 98. & de 99. & de 100. Quo vero pacto Cor habeat foramen ad pulmonem, oportet inspicere ex dissectionibus, & historiis, & lib. 2. de hist. animal. c. 15. in 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. & de 11. & de 12. & de 13. & de 14. & de 15. & de 16. & de 17. & de 18. & de 19. & de 20. & de 21. & de 22. & de 23. & de 24. & de 25. & de 26. & de 27. & de 28. & de 29. & de 30. & de 31. & de 32. & de 33. & de 34. & de 35. & de 36. & de 37. & de 38. & de 39. & de 40. & de 41. & de 42. & de 43. & de 44. & de 45. & de 46. & de 47. & de 48. & de 49. & de 50. & de 51. & de 52. & de 53. & de 54. & de 55. & de 56. & de 57. & de 58. & de 59. & de 60. & de 61. & de 62. & de 63. & de 64. & de 65. & de 66. & de 67. & de 68. & de 69. & de 70. & de 71. & de 72. & de 73. & de 74. & de 75. & de 76. & de 77. & de 78. & de 79. & de 80. & de 81. & de 82. & de 83. & de 84. & de 85. & de 86. & de 87. & de 88. & de 89. & de 90. & de 91. & de 92. & de 93. & de 94. & de 95. & de 96. & de 97. & de 98. & de 99. & de 100. atque hæc satis conspeximus ex Anatomis. Lib. etiam de partib. 3. cap. 4. in 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. & de 11. & de 12. & de 13. & de 14. & de 15. & de 16. & de 17. & de 18. & de 19. & de 20. & de 21. & de 22. & de 23. & de 24. & de 25. & de 26. & de 27. & de 28. & de 29. & de 30. & de 31. & de 32. & de 33. & de 34. & de 35. & de 36. & de 37. & de 38. & de 39. & de 40. & de 41. & de 42. & de 43. & de 44. & de 45. & de 46. & de 47. & de 48. & de 49. & de 50. & de 51. & de 52. & de 53. & de 54. & de 55. & de 56. & de 57. & de 58. & de 59. & de 60. & de 61. & de 62. & de 63. & de 64. & de 65. & de 66. & de 67. & de 68. & de 69. & de 70. & de 71. & de 72. & de 73. & de 74. & de 75. & de 76. & de 77. & de 78. & de 79. & de 80. & de 81. & de 82. & de 83. & de 84. & de 85. & de 86. & de 87. & de 88. & de 89. & de 90. & de 91. & de 92. & de 93. & de 94. & de 95. & de 96. & de 97. & de 98. & de 99. & de 100. generatio- nibus, lib. quoque 5. cap. 10. de 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. & de 11. & de 12. & de 13. & de 14. & de 15. & de 16. & de 17. & de 18. & de 19. & de 20. & de 21. & de 22. & de 23. & de 24. & de 25. & de 26. & de 27. & de 28. & de 29. & de 30. & de 31. & de 32. & de 33. & de 34. & de 35. & de 36. & de 37. & de 38. & de 39. & de 40. & de 41. & de 42. & de 43. & de 44. & de 45. & de 46. & de 47. & de 48. & de 49. & de 50. & de 51. & de 52. & de 53. & de 54. & de 55. & de 56. & de 57. & de 58. & de 59. & de 60. & de 61. & de 62. & de 63. & de 64. & de 65. & de 66. & de 67. & de 68. & de 69. & de 70. & de 71. & de 72. & de 73. & de 74. & de 75. & de 76. & de 77. & de 78. & de 79. & de 80. & de 81. & de 82. & de 83. & de 84. & de 85. & de 86. & de 87. & de 88. & de 89. & de 90. & de 91. & de 92. & de 93. & de 94. & de 95. & de 96. & de 97. & de 98. & de 99. & de 100. figura verò veri quomodo se habeat ex Anatomis spectetur, cap. tertius undecimus, & de 3. & de 4. & de 5. & de 6. & de 7. & de 8. & de 9. & de 10. & de 11. & de 12. & de 13. & de 14. & de 15. & de 16. & de 17. & de 18. & de 19. & de 20. & de 21. & de 22. & de 23. & de 24. & de 25. & de 26. & de 27. & de 28. & de 29. & de 30. & de 31. & de 32. & de 33. & de 34. & de 35. & de 36. & de 37. & de 38. & de 39. & de 40. & de 41. & de 42. & de 43. & de 44. & de 45. & de 46. & de 47. & de 48. & de 49. & de 50. & de 51. & de 52. & de 53. & de 54. & de 55. & de 56. & de 57. & de 58. & de 59. & de 60. & de 61. & de 62. & de 63. & de 64. & de 65. & de 66. & de 67. & de 68. & de 69. & de 70. & de 71. & de 72. & de 73. & de 74. & de 75. & de 76. & de 77. & de 78. & de 79. & de 80. & de 81. & de 82. & de 83. & de 84. & de 85. & de 86. & de 87. & de 88. & de 89. & de 90. & de 91. & de 92. & de 93. & de 94. & de 95. & de 96. & de 97. & de 98. & de 99. & de 100. specietur verò quomodo se habeant masculorum pori, ex descriptione Anatomis. Venæ sunt conceptacula sanguinis, venarum autem initium Cor, id quod ex dissectionibus perspicui potest: lib. de somno cap. 3. forum dissecuit, vt exploraret vtrum fetus sugeret ore, lib. 2. de generat. animal. c. 7. & lib. de iunioribus, cap. 3. In aliis locis Anatomicarum exercitationum mentionem facit, lib. 2. de partib. animal. cap. 3. & lib. 3. cap. 5. & lib. 1. de generat. animal. cap. 11. & lib. 2. de

generat. animal. cap. 4. & cap. 7. bis repetit, & eiusdem operis lib. 5. cap. 1. & lib. de respiratione, cap. 16. qualiter sinus Cordis ad oculum per dissectiones spectari debet, exactè per historias, quasi dissectio esset sola demonstratio; Historia verò descriptio accurata partium corporis humani.

Neque putetis omnia ab ipso *Aristotele* inuenta aut excogitata fuisse: opus illud de Animalibus multorum hominum labore concinnatum & adornatum fuit, teste *Plinio* lib. 8. cap. 16. *Alexandro magno*, inquit, rege inflammata cupidine animalium naturas noscendi, delegatæque hæc commentatione *Aristoteli*, summo in omni doctrina viro, aliquos milia hominum in totius Asia Græciæque tractu parere iussa, omnium quos venatus, aucupia, piscatusque alebant, quibûsque vinaria, armenta, alucaria piscina, auaria in cura erant. Ne quid usquam gentium ignoraretur ab eo, quos percontando quinquaginta ferme volumina illa præclara de Animalibus condidit.

Quinetiam ex ipso *Hippocrate* multa mutuatum fuisse *Aristotelem*, ex eorum collata lectioneprehenditur. Nam ex *Hippocratis* scriptis de semine, de fetus natura, de principis, de corde, de glandulis, de osium natura, de insomniis, plurima dogmata *Aristotelem* deprompsisse & inseruisse libris de historia, de partibus & generatione animalium, de vitæ longitudine, de respiratione, de somno, facile animaduertet qui exactè vtriusque lectionem contulerit. Vt inde agnoscere liceat, *Aristotelem* non aliud quàm *Hippocraticorum* dogmatum expositorem fuisse, iudicio *Galeni*. Mirorque hunc indictum, & illaudatum ab eo prætermisum fuisse, quem tamen non ausus est reprehendere. Mentionem verò fecit in libris de animalibus, *Democriti*, *Parmenidis*, *Empedoclis*, *Anaxagoræ*, *Leophran*, *Alcmeonis Crotoniata*, *Syennesis Cyprii Medici*, *Diogenis Apolloniata*, *Polybi*, semel autem nominauit *Hippocratem* extra proprium locum, nempe lib. 8. Politicûm. Sed pro more habuit *Aristoteles*, auctores nominare, quos improbare voluit, neminem nisi perfunctoriè laudare: cum tamen antiquiorum Philosophorum scrinia compilarit, vt aliena messe ditesceret, vti nimis superbè & acerbè demonstrauit *Patricius* in suis discussionibus Peripateticis. Cæterum, quo ordine libri de Animalibus, qui nobis supersunt distribui debeant, inter Recentiores controuertitur; qua de re iegendus *Gesnerus* in *Physiis*, & *Accorambonus* initio libri de historia animalium. Parùmque refert quo ordine legantur, modò intelligantur: ex istis libris vsus & actiones partium corporis humani verissimè cognoscet, quamuis in dissimilium animalium historia expositas; exemplum istud pro multis aliis adfero. Constituit *Aristoteles* aues quæ parçè bibunt, licnem exiguum habere, ac proinde vesicâ carere, & pulmonibus paruis prædita esse. Inde vsum ventris in homine licet colligere, quod vapores superflui diuertit, & absorbet ex ventriculo, & concoquit eos potest. Plurima & confimilia exempla producere possum de vsu & actione partium, quæ in animalibus obseruantur, & generaliter proponuntur ab *Aristotele*, quamuis diuersa sint in quibusdam animalibus pro diuersa partium constitutione.

Ideoquæ *Aristoteles* in describenda animalium Historia ex diuersorum animalium contemplatione, generales propositiones constituit de actionibus partium in animalibus, quoniam, vt ipse ait, ignoratis communibus, non possumus perfectè particularia cognoscere; propterea, siquid in historia partium internarum apud *Aristotelem* occurrat, quod non exactè cõueniat structuræ humanæ, non ob id inficitur anatomicè accusandus venit *Aristoteles*, cum probabile sit istas differētias in *Electis anatomicis* exposuisse. Quare in hoc peccant Anatomici, qui cum de partibus animalium, earumque actionibus cognoscere & discernere aliquid meditantur, vnum tantum hominem, eumque mortuum respiciunt, similes sunt illis, qui ex vna Reipublicæ forma perfectâ, generatim scientiam politicam dicere, aut ex vnus agri naturâ cognitâ, totam agriculturam tradere se posse confidunt. Nec plus sapiunt & agunt, quàm si ex vna particulari propositione de vniuersali differere & ratiocinari vellent; quin etiam Medici grauiter hallucinantur, dum partis Theoricæ veritatem ex sola praxi cognoscere & probare nituntur. Deberent potiùs praxim ex cognitione vniuersali componere; Naturalis enim contemplatio est vniuersalis, & versatur circa omnia, solâque potest rectam stabilire cognitionem, praxis verò naturalis scientiæ à Medicis exercetur circa solos homines, ideoque non est hominis cognitio sufficiens ad cognoscendum vniuersale, quod ex omnibus viuentibus perfectis habere debet. Sed *Aristotelem* praxim circa particularia non neglexisse ex eo intelligitur, quod lib. 1. *Physicæ*. Veteres Philosophos errasse monuerit in cognitione rerum naturalium ob inexperienceiam,

*Et lib. 1. de generat. animal. reprehendit Platonem ob inexperientiam, & Democritum ob experientiam, illi anteposit; & cap. 1. lib. 1. de generat. animal. disputans aduersus Empedoclem, de generatione gemellorum, testatur se multoties insexisse in dissectionibus animalium viupariorum, tum pedesrium, tum piscium, marem & feminâ in eadem vterque parte generati. Subiungit, quod si Empedocles id non insexerat, merito errauit, cum eam adferret causam, quasi reprehenderet Empedoclem ob ignorantiam, aut incuriam studij Anatomici. Atque lib. 8. Physic. reprehendit veteres philosophos, quod in rerum naturalium inuestigatione sensum dimiserint, ideoque lapsos fuisse in errores maximos. Atque disputans aduersus Melissum, Parmenidem, & Zenonem de motu, monet, *neglecto sensu quætere rationem, esse infirmitatem intellectus, quæ nequeat indicare vnde oportet deduci cognitionem: & lib. 3. de generat. animal. cap. 10. notat tum rationis credendum, si quæ demonstrantur, conueniant cum iis, quæ sensu percipiuntur: Inde manifestè liquet, quomodo Aristoteles experientiam & sensum adhibuerit ad rerum naturalium inuestigationem: ac proinde merito Auerroës reprehendit in Galeno, quod ex vna obseruatione, & ex vno experimento constituat vniuersale, cum enim vidisset in quibusdam animalibus neruum & cerebrum esse sensui necessaria, absolutè pronunciavit, cerebrum ad sensum esse necessarium: Idcirco Galenus non fuit exercitatus in rationibus naturalibus, nec prius magister quidquam dixit sine forti ratione. Auenennæ, lib. 9. de animal. cap. 1. Iudicium tale de Galeno proposuit. *Videamus, inquit, quid dicat iste Medicus contra Aristotelem, putans se aliquid dixisse, cum nihil dixerit, quamquam multum sciret de ramis, tamen ignorans radices scientiæ.***

In hac hominis partium historia, quam meditator, non ausim vbique fauere & adhibere Aristotelis opinionioni, repudiât Galeni doctrinâ, ac Veterem Medicinam euertere videat. In explicatione partium eo sine proponam Philosophi opinionem, cuiusque interpretationem, vt si vera sit & probabilis, retineatur, sin falsâ, reiiciatur: vt omnibus innotescat Aristotelis in rebus Anatomicis non adeo perierat, vt illi Galenus contumeliosè læpibus imponit & exprobrat: Denique ita me geram consilio Auenennæ, vt Philosophi suæ contemplationis principia relinquatur, in Galeno suæ praxeos principia non omnino destruantur. Itaque quicumque peritus Anatomicus desiderat fieri, Aristotelis libros de animalibus diurna nocturnaque manu verset, & euoluat, in quibus reconditos Physiologiæ & Anatomizæ thesauros adhuc ignotos, inueniet, vt Cremeninus eruditissimus Philosophus, & in doctrina Aristotelis optimè versatus, lib. de principia membrorum manifestè probauit. Vtinam quæ de reliqua corporis structura præ manibus habebat commentaria perfectisset & edidisset, vt Aristotelis doctrinæ veritas reuiuisceret, æternùm duratura, eius doctis interpretationibus illustrata. *Notæ Collegæ Gulielmus Doualini, Vir pius & doctus, synopsim laborum Aristotelis edidit, sed cum ad libros de Animalibus peruenit, Anatomem corporis humani substituit ex Laurentio & alii deceptam & contextam, quæ particularis est de homine, non generalis de omnibus animantibus. Nec quidquam de structura hominis ad mentem Aristotelis scripsit, quem in hac parte deseruit.*

JUDICIUM DE SCRIPTIS ANATOMICIS Galeni.

CAPIT V.



IN scientiis, inquit Seneca, si velis aliquid trahere quod fideliter animo sedeat, certis ingeniis immutari & immorari oportet, atque ea potissimum sedari, quæ auctoritate clarent, & ab omnibus probantur. Martialis lib. 9.

Multum crede mihi referi, à fonte bibatur

Qui fluit, an pueri quæ super unda laetant.

Tardi ingenij est riuiolos consecrari, fontes rerum non videre, quis enim contentus erit potare de riuiolo, cum possit baurire de fonte. Qui Philosophicis studiis delectatur, ex fonte Philosophiæ potissimum larices hauriat; Aristotelem Philosophiæ principem diurna nocturnaque manu euoluat. Medicina suos

Confer hoc
cuius cum
electo quod
habetur in
Ostelo.
gla.

parentes agnoscit *Hippocratem & Galenum*, à quibus in lucem producta fuit. & exulta: Ipsos igitur auctores imitari debet, qui veræ Medicinæ scientiam affecerat. Cùm autem amplissima sit Medicina, ex diuersis partibus composita: *Hippocrates* vniuersam artem descripturus, *Anatomen*, seu Medicinæ fundamentum diligenter excoluit, vt testantur diuina eius monumenta, quibus hodie magna cum utilitate & animi iucunditate fruimur. Sciebat vir sapiens, ruinofum esse illud ædificium, quod caducis fundamentis superstruitur. Verùm, vt artes suas ætates habent, sensim incrementa capiunt, nec eodem tempore nascuntur & adolefcunt, successit *Galenus*, qui rudem & imperfectam *Hippocrati* Anatomen exornauit, atque perfecit, *testimonis ipsius Auerrhois*: qui tempore *Galeni* perfectam fuisse Anatomen candidè proficitur, cuius vmbra vix retinuerunt *Arabes*. Etenim ætate *Galenii* florebat præstantissimi Anatomici, à quibus ipse fuit eruditus. Postquam *Pergami*, *Satyræ*, peritissimo Anatomico sedulam dedisset operam, varias & longè diffitas regiones adiuit, celeberrimos huius artis professores, *Smyrnæ Pelopem*, *Corinthi Numerianum*, in *Alexandria Medicos* Ossium doctrinâ clarissimos consulitur, quorum diligentiam & industriam ipse superauit, vt honestè gloriatur, *lib. 2. de vsu part.* cùm ait: multa proferre veteribus Anatomicis intacta & ignorata: quod repetit *lib. 1. Admin. Anat. cap. 3.* Multa certè id genus in vniuerso animante Anatomicis neglecta offendimus, quippe quos incidere pigeret, contentos dixisse quid probabile sibi maxime videretur. Quare non est quod mireris, tam multa existere quæ animali adhuc viuo ignorarunt, quandoquidem quæ solùm diligenter rescando spectare conueniebat, tanquam nullius momenti reliquerunt.

Quis igitur meritum hunc honorem inuideat *Galeno*? Cùm ante eum nemo musculorum dissectionem inculpatè scripserit, vt ipsemet testatur *lib. de dissect. muscul.* Ante *Galenum* anatomici musculos octo ignorarunt, *cap. 3. lib. 1. Administrationum Anatomicarum*, vt & quosdam musculos faciei: in motu thoracis, veteres decepti fuisse, & in veris organis: primus enim *Glossidem*, præcipuum vocis instrumentum demonstrauit. Ante *Galenum* nullus neruorum dissectionem accuratè tractauerat, *lib. 1. de locis affectis*. Primus neruum recurrentem obseruauit *cap. 14. lib. 7. de vsu part.* Primus quoque digitorum musculos inuenit, qui aliis Anatomicis incogniti fuerant, vt ipse recitat *lib. de lib. propriis*. Primus anastomoses vasorum Cordis infortu deprehendit, & graphicè descripsit. Primus exortum neruorum Opticorum, eorumque reuolutiones, quas *pedes hippocampi* vocat *Arantius*, circa magnas illas eminentias, quæ anteriorum ventriculorum cerebri latera claudunt, & *thalami* vocat, obseruauit. Quod posterioribus Anatomicis inditum & ignoratum fuit, nec à *Varolio* obseruatum: Cùm tamen id vsu & dignitate longe superet, quæ in basi cerebri notauit, de quibus libello peculiari gloriatur. *Libris de vsu partium* benignè tradit & exponit ea, quæ verè in Anatomicis apparent, quorum nullus antè mentionem fecerat. Et licet ingratitudine posteritatis præuiderit, diuinum hunc commentarium canino dente laceratuz, non propterea ab instituto opere desistit, sed generosè profanos istos homines contempsit, & eorum orationes sicut præterfluere, quandoquidem *cum mortuis non nisi larua lullantur*. Doctis tantùm hominibus scripsit, quorum mentè & iudiciū requirit in lectione suorum librorum. Idem *lib. de præcognitione ad Pothumum, cap. p. ait*. Si dandos libros meos indignis scissem, ne amicis quidem ipsos præbuissem; voco autem indignos, quicumque malo sunt animo, nec libros ut discant legunt, sed ut quempiam inde calumnientur. Nihilominus tam benignus & liberalis fuit in communicandis suis Obseruationibus, vt ea omnia quorum cognitionem ab initio adeptus sum, (sic de se loquitur) iis qui requirebant impertij, capiens vniuersos homines si fieri possit ea perdiscere, etiam si nonnulli qui mihi operam dederunt, intelligam aliis nolle, quæ est ipsorum inuidia, communicare: quibus si repenti fato suægi contigeret, post me simul speculationes interibunt. Tanti beneficii immemores sunt, qui *Galenum* iniquè traducunt & vitiligant, veramque hominis Anatomen ignorasse proclamant: vt illi restitutæ Anatomes gloriæ præripiant. Nam ipse non diffitetur multa suis adici posse, sed humaniter postulat, vt antequam erruris vel negligentiz accusetur, id quod obicitur, sæpius & diligenter in corporibus humanis inspicatur. Si membrum incidenti, aliquid præter ea quæ à nobis scripta sunt inueniat, scito hoc rarum existere: quare nec antea damnare opera nostra oportet, quam ipse quemadmodum nos, frequenter corpora inspexeris. Idem repetit *libro vndecimo de vsu part.* Si quid exiguum à nobis est prætermisissum, quod ab iis qui diligenter hosce libros euolue-

rint, intelligi queat, id existimare oportet, nos dedita operâ prætermisisse, quàm his proportionem respondeant, quæ nullies iam exposuimus, facillimum esse arbitramur, ea quæ relicta sunt inuenire. Similem excusationem proferet & adducit *cap. 6. lib. 1. q. de uso part.* Tu autem qui hoc in loco versaris, tractatumque hunc euoluas, ne prius verâ sint necne expendaris, quàm ea quæ dico, ipse tuis oculis inspexeris. Nam certò scio partium ipsarum aspectum, quod verbis deest adiecturum. *Ingratioli lib. de Tumoribus.* Galenum excusata calumniis recentiorum hoc modo: Maxima pars contradictionum Galeni quæ sibi discordant, vel nequeunt componi, inde dependet, quod ille non pluribus mensibus aut annis librum edebat, verum expoliulantiis amicis aut discipulis in dies varia volumina componebat: quamobrem quod in aliquo loco diminutè vel non satis perspicuè exponit, in alia libris exquisitius & emendatius describit, idèquæ semper posteriores libros Galeni sequi oportet. Sed hic non institui Galenum tueri ab omnibus Recentiorum calumniis, scio multa ab eo prætermissa, Recentiorum diligentia reperta fuisse: in quibusdam etiam errasse Galenum fateor, sed propter viri auctoritatem, confirmata eius opinio, si non longè distet à veritate, benignè est interpretanda, alterique præferenda. Hoc nobis consilium dedit Galenus in examinandis Anatomicorum sententiis. Non tamen aliter docentes, reprobare decorum est, quando parum ab ea descuerint, secus enim facilius est, quàm à plerisque bonæ exiluminationis viris scriptum nonnihil inuenimus, quod non multum ab optima doctrina degeneret, adeoque nos priore illa vti præstiterit, ne audiuires turbemus in discordiæ imaginationem perducetes. *Polihius lib. 3. historia sua monet, veterum errores cognoscendos esse, non ut acrius insisterent, sed laudes potius. & apud te cogites etiam istos, si ad hanc aetatem peruenissent, multa quæ scripserant fuisse emendatos, ac mutatos.*

Non sunt autem ignorantie, aut negligentie taxandi maiores nostri in re Anatomica: si hodie in nostris corporibus pauca quædam aliter appareant, quàm Hippocrati aut Galeni tempore. Sed mutationis in nostris corporibus causa est agnoscenda, quæ corporum naturam vitiauit, quod imprimis adscribendum est corporis nostri magnitudini multum diminutæ: vt ex veterum libris & sarcophagis comprobatur à Syllao. Deinde, vitæ nostræ breuitati, quæ veteribus longior erat. Præterea, certum est partium internarum quarundam magnitudinem, numerum, figuram, situm mutata multis esse regionibus, nec eadem nostris corporibus superesse, quæ veteribus fuerint obseruata. Cuius varietatis in corporibus causæ sunt, *Calum, Salum, & Viscum.* Venia igitur danda Galeno, ignoscendumque videtur, si quando in minutulis quibusdam non admodum Medicinæ necessariis, vel ob grauiora studia, vel ob corporum humanorum raritatem aberrauerit. Quis enim vnquâ præsertim in rebus obscuris & latentibus, tam fustigulatus, tam vbique certus, tamque circumspectus, qui non aliquando cespitauerit? Nisi Phryni fuisse, nunquâ Mulica extitisset. Multum inuentoribus artium debemus, neque merita laude fraudandi sunt, qui illas excoluerunt atque petfecerunt. Nisi Galeni arti Anatomice manum adhibuisset, forsitan rudis & inculca ad nos deuoluta fuisset. Nec dubito si omnes Galeni commentarii Anatomici integri adhuc, sicut ipse amicis & discipulis conscripsit, hodie extarent: quin nostri aduersarij longè præclarior de illo sentirent, Cuius tanta fuit apud primum sæculum exilumatio, vt si Enstius credendum est, propemodum adoraretur. *Nicéphorus lib. 4. hist. Ecclesiastica cap. 31.* redarguit eos, qui Galenum adorabant tanquam hominem Diuinum celitus demissum in has terras. *Alexander Trallianus* sapissime Galenum cum hoc epitheto (*Diuini summi*) appellat. *Orsibius, Vtrum admiratione dignum vocat. Paulum Agnetia lib. 1. cap. 2. 9. admirabilem.* *Auicenna* ingenue fateatur se esse solum Interpretem Galeni: & *Rabbi Moses* asseuerat Galenum in Medicina plus sciuisse, quàm alium cuius famam audierit, aut scripta legerit. *Athenæus lib. 5. dignosce phylarum, in Galeni commendationem hæc scripsit.* *Galenus Pergamenus* tot editis libris Philosophiam Medicinamque locupletauit, vt superiores omnes à tergo reliquerit, interpretationis claritate ac eloquentiâ, veterum nulli postponendus.

Quod ad me attinet, multum ex Galeni lectione in Anatome profecisse candide proficor, eius opinionem quantum res veritas patitur amplector, meliorem quæ mihi obicitur non recuso. *Ætoliæ additis iurare in verba magistri, quum ipsemet Galenus non credat Hippocrati vt testis, nisi quatenus certas & firmas demonstrationes adfert.* Et quum viderem nostram Anatomem ex Galeno, velut è fonte huius artis vberimò

Lib. 6.
Chiron.

deriuatam, satius esse duxi, ex ipso fonte purissimam doctrinam haurire, quàm riuulos confectati. Vt enim lucidissimæ gemmæ multorum manibus circumductæ, splendor tandem deteritur vel obscuratur, sic Authoris doctrina à diuersis ingeniiis explicata, variis interpretationibus, censuris & glossematibus sapissimè deprauatur; Nec tam nitida in aliis reperitur, propter variam transcribentium sortem, quàm in ipso auctore sincera continetur. Quum igitur ex Galeno veram Anatomem repetere oporteat, semper meis auditoribus consului, hunc Authorem diligenter & assidue legere & euoluere, reliquos tanquam interpretes adiungere; & quò magis illos incitare ad Galeni lectionem, meas Exercitationes Anatomicas ad Galeni libros, velut ad Cynosuram teuocaui, vt intelligerent eas esse Galeni tantum interpretationes. Syluium elegantes hos versiculos in laudem admirabilis libri Galeni de Vsu partium composuit, quos hic attexam ad Authoris & libri commendationem.

*Est mundus, sunt cali, homines sunt, est Deus Orbi,
Nil homine est maius, calidiusque Deo.
Magna hominem, maiora Deum, quæ scripta celebrant,
Ille utrumque canens, maxima iure voco.*

JUDICIUM DE SCRIPTIS POSTERIORVM Anatomicorum, Græcorum & Latinorum.

CAPVT VI.

De Iulio
Pollace.

De Russo
Ephesio.

IS TIS authoribus addo posteriores Græcos, qui de re Anatomica quædam monumenta nobis reliquere. *Russum Ephesium, Soranum, Oribasium, Meletium, Theophilum Protospatharium, & Anonymum Gratum.* Quibus addere licet *Iulium Pollacem* illis antiquiorem, qui sub Imperatore *Commodo* vixit, ei *Onomasticum* dicauit, cuius liber secundus appellationes partium externarum & internarum exponit, ex eo quædam decerpſi, plenius illustratas in *Lexico Cæmægarj*, de appellationibus partium corporis humani, quod est commentarius in librum secundum *Iulij Pollacis*, cuius Latina versio est valde deprauata & infida. *Russi* liber qui de appellationibus partium externarum ex professo agit, obiter quædam de internis intertexens, Græcè & Latine seorsim excusus est. Huius lectio licet multis erroribus fœdata, Anatomica studia plurimum adiuuare potest. Quo tempore vixerit non satis liquet. *Suidas* mentionem facit *Russi Ephesi*, qui cum *Critone* sub *Traiano* vixit: sed dum eius opera recitat, nullam facit mentionem libri de appellationibus partium corporis, & aliorum Opusculorum quæ nunc prostant. Inde colligitur istos libros nunc vulgatos, non esse istius *Russi*, sed alterius iunioris post *Galenum*: quoniam ipsi *Galeno* fuit incognitus, meminit quidem *Russi*, qui de *Melaucholia* librum scripsit, & citat *Russi* interpretationes in lib. *Epidem. Hippocrati*.

De Sorano.

De Mele-
tio.

Quæcunque *Oribasius* scripsit de re Anatomica, omnia sunt ex *Galeno* deſumpta, & in eo laudatur à *Photio* in *Bibliotheca*, quod Anatomica tractat, impetite neglecta ab *Aëtio*. *Oribasii* tantum Anatomica Græcè extant excusa, Parisiis apud *Morcellium*. *Sorani* fragmentum quoddam Anatomicum haud ineptum, nec repudiandum suis libris Anatomicis *Oribasius* inseruit: apud *Suidam* duo extant *Sotani*, Medici Ephesij; Alter antiquior qui Romæ Medicinam fecit sub *Traiano* & *Adriano*; Alter iunior, mulierium rerum scripsit lib. 4. & alia opera. Forſan fragmentum quod superest de veteri, reliquæ sunt illius operis & iunioris. *Martilius Cæmægarus* lib. 4. variarum leſ. doctè probat, libellum Latinum qui circumfertur cum hac inſcriptione, *Uſagoge medica auctore Sorano*, non esse illius *Sorani* Græci, sed supposititium commentarium: inde probatur duas illas epistolas impudicissimas, quas suis *Preiæpeis Caspar Schioppius* attexit & *Sorano* adſcripſit, esse adulterinas, cum scriptæ sint ad *Antoniam* & *Cleopatram*. *Meletius Philoſophus Chriſtianus*, de natura humana librum composuit, quem verius *Onomasticum corporis humani* nuncupare licebit; Latine editus est, exemplar oræcum deſideratur, quod in quibusdam bibliothecis Parisiis aſſeruatur. In eo libro nominum origines quamplurimæ notantur, quas non reperies in *Etymologico magno* Græco, ac proinde non erit inutilis eius lectio.

Theophrastus Praeceptorum Epigrami, Epitomen liberum Galeni de symptomatibus conferenti-
at Antistile qui liberum de viris scriptis, et Chlusianni erat, dubitari potest. Iu-
dicium Sylve de hac Epitome extraxit in cuius titulum fecit *Ordo ordinatus et legens*
de Hippoc. et Gal. libris, *Theophrasti nescio qui indoctissimus libros Galeni fecidit et*
scia Epitome, ubi quamplurima de Galeni sententia scribit alienissima et falsissima. Et
liber non modo *Epitomen* in illos Galeni libros nomine, sed etiam lectione fit indi-
gnissimus. Editio Græca ex Typographia Gulielmi Morely prodit ex Bibliotheca Re-
gia.

Anonymi Graeci Iffigien Anatomicam ex Aristotele deceptam concinnavit, nu- De Anony-
per Græcæ & Latine editam, è bibliotheca Regiæ Galliarum communicatam, & mo Græcæ.
Laurentbergus, Germano Medico ad Afium traductam, cuius lectio, etfi in quibusdam lo-
cis corrupta, viam feruet ad *Anatomiam Perspiciam*.

Quamvis prima laus in rebus Anatomicis debeatur Graecis auctoribus, non oportet tamen posteriores Anatomicos Latinos sua gloria fraudare, in his quae reddidit magno labore, summâque industria inuenere. Propter sceleratam Hippocratis authoritatē, qui libertatem iudicandi de scriptis auctorum, petitis in arte concedit; philosophica libertate meum iudicium interponam. Magnam vero artes partem esse arbitror, etiam de his quae scripti sunt recte posse considerationem facere ac indicare, qui enim hoc nouit, et huius uictor, non videtur mihi in arte multum fuisse posse, quia si prius adhiberem rationem, ut Aristoteles ait, et deinde persequarur ipsius, et postea de experimentis bonis in se habentibus persequitur, ut in libro de animalibus lib. 3. epidem. Simile iudicium Aristotelis extat in libro 16. de partibus animal. et lib. 3. Ethic. cap. 1. Vnusquisque bene iudicat ea quae nouit, et eorum bonus est aestimator. Hac fiducia multis Anatomis mea manu sedulo & laborioso administrata comprobata, in libros et auctores Anatomicos censuræ et animaduersionis auctoritatem usurpabo, quod efficiam cum omni modestia & humanitate, ne cornicum oculos configere videar, et insuper larum cum meritis lacerari, more Arrogantem, qui de sepiplo fissus est, quod per ætatem ambitiosius & vehementius egredit contra quosdam, vi vexaret illos & vreret. Sed ceteri tantum Anatomicos nominabo & producam, qui solerti ingenio, manûque oculatâ tradunt Anatomica cultro & calamo descripta.

Inter Anatomicos posteriores Latinos primus numeratur *Mundinus*, *Medicus Bomanensis*, qui populariter *Anatomicus* descriptus ad vsum Scholarum, sicut in Theatris dissectat et demonstretur. Hunc amplius commentariis illustravit *Jacobus Carpus* De *Medicis & Anatomicis Bomanensis peritissimus*, primus huius artis indistrius artifex, & restaurator, iudicio *Fallopii*. Hic plerumq. centena cadavera dissectuere, vt de testatur priusquam *Opus suum Anatomicum* conderet. *Cirius* ex *annalibus Bomanensibus* didicit quadringenta ferme cadavera à *Corpo* dissecta fuisse. In eius libris multas questiones Anatomicas aliis indicatas, quamvis rudi stylo scriptas observabimus, simulque plurima ab eo reposita. Ex istis rudibus Anatomicis, vt *Virgilius* ex *Enny* stetit quilibet, gemmas collegi.

Huic succedit *Nicolaus Massa Medicus Puteus*, qui acceptum artis Anatomicæ patrimonium amplificavit, & scripto non contentendo locupletavit. In suis *Epistolis* conquiretur de plagiario, qui furtivis penis exornatus, infans *Epiſcopæ* corniculæ, gloriæ doctrinæ Anatomicæ sibi arrogat, nulla factæ eius mentione. Intelligit ut opinor *Petrum*, iam actionibus anatomicis inſectatorem.

Carolus Stephanus Medicus Parisiensis, Rurey Chirurgi industria & manu adiutus, rebus anatomicis diligenter operatus est, iuxta Galeni doctrinam tunc temporis ignotam; quam primus suo sculo vtcumque patefecit, atque legendam eleganti sermone proposuit, quinctiam Iconibus ante Vesalium illustravit. De Carolo Steg. hmo.

hac Academia profiteri cepit, docendo, demonsttrandis, & propria manu fecundo e cadaveribus. Diuino commentario *librum Gal. de Offibus* est interpretatus, & calumaiis *Fefaj*, quem *Fefanum* vocat, alto libello respondit; post eius obitum edita fuit *Spagoge Anatomica* solertis ingenij sctura incomparabilis, si postrema circumscriptione fuisset expolita. Nihilominus, saepius in libro memoratur *Sylvius vno*, quàm *Fefaj* in tota fua praelegendi anatomie. Ille confusionem quæ in musculis, venis, arteriis, & nervis reperiebatur, studij anatomici remoram, propter quam viximur agere rebar, in ordinem digessit, prorsusque nominibus distincte; quæ nunc ab omnibus anatomicis tractantur. Propterea valde commendo eius libros anatomicos, videli-

et *Isagogen Anatomicam*, *Comment. in lib. Gal. de Ossibus*, & *librum Responsorum ad calumnias Vesalii*.

De Ferac-
lio & An-
drenaco. Ante *Syluium*, aut ferme eodem tempore, *Fernelius* & *Andernacius*, ambo contempora-
nei, æmulo doctrinæ studio in hac *Academia Parisiensi* docebant *Anatomica*. *Vesalius*
auditor fuit *Andernaci*, vt ipsemet testatur in suis *Institutionibus Anatomicis*, & *lib. 1. de*
De Vesalio. *Veteri & noua Medicina*. Fuit etiam *Andreas Vesalius* auditor *Syluij*, quem *libros Galeni*
de vsu partium interpretantem audiuit; & *Anatomica* demonstrantem spectauit. In-
genue professus est se *Lusette in Curmisterio Innocentium*, vbi ingentes ossium acerui,
in monte *Falconii*, vbi suspensorum cadauera deportantur, multa ad *Anatomem* spe-
ctantia didicisse. Propterea *Medicos Parisienses*, suos preceptores vocat, & candidè
profiteatur se *Discipulum Syluij*. In præfatione prima editionis testatur se in brutorum ali-
quot dissensionibus sub celebri & nunquam satis laudato viro *Iacobo Syluijs* versatum
fuisse, quod elogium in secunda editione deleuit.

De Ioanne
Euo. *Vesalius*, scholæ Parisiensis doctrinâ eruditior factus, artem *Anatomicam* in *Acade-*
mia Patavina docuit atque demonstrauit anno 1537. Post editionem *Epitomes Anato-*
mica, magnum illud *Opus Anatomicum* typis & figuris elegantibus exornatum bis in
lucem emisit, sed prima editionis icones sunt nitidiores anno 1543. secunda editionis
1555. Typicæ licet sunt grandiores: in secunda editione multa mutauit, cotrexuit, &
adiunxit, atque mitius egit cum *Galeno*, ideoque secunda editio præferenda est prima,
nisi quis vttramque comparare voluerit. Notabilis est animaduersio *Ioannis Caij Bri-*
tanni contra *Vesalius*. Habitant ambo in eodem hospitio *Patavij*, quo tempore *Ves-*
alius suos libros de *Corporis humani fabrica* scripsit & depinxit. Illi transmissæ fuerant
variz castigationes, vt libros *Anatomicos Galeni* Græcos & Latinos emendaret, quâ
ei prouinciam commiserat *Aldinus Iunta Typographus Venetus*: At ipse magis corrup-
pit textus *Galeni*, vt haberet quod reprehenderet. *Vesalijs* dictio ampullata, periodi
longiores, rei iam satis obscuræ tenebras maiores offundunt, propterea suspicito non
à *Medico Vesalio*, sed ab alio viro docto genus istud Latini sermonis profectum, quo-
niam eius magna *Chirurgia*, *Examen Observationum Fallopyj*, & libellus de radice *China*,
Epistola de mittendo sanguine in pleuritide, dissimili stylo conscripta sunt. Quare lectio-
nem magnæ *Anatomes tyronibus* obsecutam, sed in arte prouectis vtilem ac necessa-
riam iudico, assidue legentibus plenius responsuram. Nec spernendum erit *Examen*
Observationum Fallopyj, in quo rara quædâ continentur: Nec repudiandus erit liber de
radice *China*, qui totus est *Anatomicus*, errores *Galeni* acerbis quâ pat est examinâs.

De Fuchio. *Leonardus Fuchius Tigurinus*, acerrimus *Galeni* propugnator, non erat *Anatomicus*,
sed eam *Physiologia* partem, quam in suis *Institutionibus* breuiter adumbrauerat, &
imperfectam reliquerat, statim atque fuit edita magna *Vesalijs* *Anatome*, supplere
voluit, dum opus suum *Anatomicum* deserto *Galeno*, ac mutato clypeo velut trans-
fuga, ad exemplar & imitationem *Vesalijs* composuit, quem propterea possis metitò
nuncupare *Vesalijs* simiam & imitatore, ne dicam plagiarium absolutissimum.

De Reald
Colombo. *Patavio* discedens *Vesalius* successorem habuit *Realdum Columbium*, anno 1544. vt
notat *Riccobonus lib. de Gymnasio Patavino*, cuius mentionem fecit *Vesalius*, cap. 13. lib. 1.
prima editionis, quod exponit in secunda. Paulò post *Columbus* in *Romano Gymnasio*
Anatomè professus est, fuit non imperitus artifex, quamuis de illotali iudicium proferat
Carcanus Italus, *Fallopyj* discipulus, libello de *Oculorum musculis*. *Columbus* si quid
boni & veri dixit, à *Vesalio* suffuratus est, primò *Pharmacopœium* excoxit, neque huic
arti à tenetis de deditus fuit, deinde litterarum prorsus expertus fuit, quo factum est, vt
eius opus quod vernacula lingua compilauerat, ab aliquo, vti mihi videtur ex eius
phrasi generequedecendi, fuerit translatum.

De Fallo-
pio. *Fallopius* anno 1551. *Patavij* docebat, artem *Anatomicam* plurimum illustravit,
nouisque inuentis locupletauit supra *Syluium* & *Vesalius*, vt *Diuinum* illud opus *Ob-*
seruationum attestatur. Præterea, *Galeni librum de Ossibus* commentario est interpreta-
tus, atque breues *Institutiones Anatomicas* edidit, quæ nec sapienti, nec redolent e-
ruditionem illam *Fallopyj in Observationibus* expressam, quas *Anatomie* studiosi assidue
legere & euoluere debent.

De Ioanne
Valerida. Præceptis *Italarum* institutus & informatus *Ioannes Valerda Hispanus*, *Colum-*
bij discipulus, ex Italia in Hispaniam *Anatomen* reportauit, quam libro Hispanicè
scripto, & Latinè versò exposuit, laude potius dignus ob studium propagandi
Anatomen, quàm ob descriptionem *Anatomicam*, quæ nullo modo cum *Vesalio*, *Colum-*

be, Fallopiæ conferri potest, si credimus *Carceno*, libello iam citato, nihil aliud in *Anatomicis*, quia, ut à *hâc* digni accepi, & *lyppu* & *lufius* fuit, ideoque conscriptis seu acularia *naſſi* ſemper habebat affixa, deinde ipſe nunquam ſciuit, ſed tantum *Columbo*, qui male ſcicabas, aſſiſſe.

Bartholæus Euaſtathius, Medicus & Anatomicus Romanus præſtantiffimus, cùm inſinitorum præſe hominum, & eorum animalium, quæ in ſua terra gignuntur corporibus incidendis, multos iam annos verſatus eſſet, Opuscula quædam Anatomica, tam accuratè & eruditè elaborata, de *Renibus*, *Dentibus*, *Oſibus*, *Aure interna*, & *Azgy* publicauit, vt nobis dulce deſiderium totius Anatomie ſic explicatæ reliquerit: quam ſi perfectiſſet, labores *Veſaly* & *Fallopy* longè ſuperariſſet, & aliis occaſionem aliquid ſimile paruriendi præripuiſſet.

Iulius Caſar Arantius non inferiora ſequutus, in *Romanenſi* Academia ſupra triginta annos *Anatome* cum magna ſui nominis laude excoluit. Primus *hiſtoriam Vteri* in *grauida muliere*, & *Fœtus humani fabricam* aperuit, atque aliâ nonnulla protulit. Ideoque aureus eius liber de *Fœtu humano* lectione dignus eſt, cum eius *Obſeruatiōnis* ex editione poſtrema *Venetis* facta, anno Domini 1587.

In Germania præſtantes Anatomici ſororete *Volcherus Coiterus*, & *Felix Platerus*. Ille diligens fuit in rebus Anatomiciſ perſeſtandis, vt ex quibuſdam *Obſeruatiōnibus* intelligitur; ex quo ſpecimine, tanquam ex vngue leonem, vii ſedulitatem & induſtriam agnoſcere licet, plura ſorſan adieciſſet, niſi iuuenis expeditionem Germanicam vt caſtrenſis Medicus ſecutus, in *Gallia* obuiſſet. Nec erit inſtructuola huius Auditoris lectio.

Quamuis *Platerus* fateatur ſe primùm in *Gallia*, ſubinde in *Germania* pluſquâ quinquaginta cadauerum humanorum ſectiōnibus manum adhibuiſſe, priuſquam ſuum *Opus Anatomicum* in lucem proferret: Nihilominus tamen pauca vel nulla ab eo reſertaprehendo, & ſuo ſcribendi genere in tabulas diſtributo, rem ipſam magis obſcurare.

Archangelus Piccolominus non erat *Anatomicus*, ſed tanquam Philoſophus *Anatomica* tractauit: eiſ *Præleſſiones Anatomica* quæſtioniſ Physiologicis, & controuerſis diſſiſſimis reſertæ, & ſecundum partes corporis diſtributæ laudantur, ſed ex earum lectione nemo peritior, ſed loquacior euadet *Anatomicus*.

Conſtantinus Varolius, *Anatomicus Romanenſis*, *Anatomicum* librum compoſuit, qui poſt eius obitum editus eſt, & alium de *Rernis Opticis*, multiſque aliis præter communem opinionem in humano Capite obſeruatis. Qui quidem libellus erſi in quibuſdam mutilus, magis commendabitur apud *Anatomicos* *Varoly* induſtriâ, quàm alter grandior liber totam *Anatome* completens, in quo quædam actiones & vſus nouos partium ſupra cæteris excogitauit.

Eodem tempore prodit in lucem *Ambroſii Paraſi* *Anatome*, *Galliæ* ſcripta, poſtremo manu ſiſta & elaborata à junioribus Medicis *Paraſienſibus*, quorum induſtriâ in condendis ſuiſ libris emendicabat, & pretio redimebat, ſperans hac arte vir æternandi nominis cupidiffimus, immortalitatem ſibi comparare. *Nen omnis moriar*, in quibet ſiſte, *magnæque pars mei vitabitur Liſtinam*: ſed *Anatome* multis erroribus ſcæter, quamuis methodicè deſcripta fuerit, *Chirurgia* non ſunt contemnenda, variis exemplis & hiſtoriis ab ipſo *Paraſo* ſoppeditatis intertextæ. Reliqua eius Opera ſunt ſæragines ab inſueto *Chirurgico* proſuſ alienæ, cuiuſmodi ſunt quæ inchoant & claudunt magnum illud volumen. Hæc tamen omnia potiùs commendant ipſius diligentiâ & induſtriâ in rebus *Chirurgicis*. Idcirco *Paraſus* non mediocrem ex hoc opere à viſis *Chirurgicis* gratiam inuicit. Dum viuere procurauit *Latina* editionem librorum ſuorum, à Medicis *Paraſienſibus* factam, qui quoniam innotefcere noluit, nec à me nominabitur. Itaque ſciant præſentes & poſteri, *Paraſum* & *Medicos Paraſienſes*, opus illud *Galliæ* & *Latina* condidiſſe & adornariſſe.

Non equidem inuidio, miror magis eruditum opus *Anatomicum* *Andreae Laurentii*, eleganti ſtylo conſcriptum, diuinum eruditi ingenij monumentum. Rem *Anatomicam* ſecorſim exponit, cui *dubias & controuerſas quæſtiones* inſtar commentarij attæxit. In his nihil eſt animaduerſione dignum, cùm Philoſophicæ quæſtioneſ tanquam Logicæ in veramque partem agitari & deſendi queant. Proinde iniquè videatur reprehendenſ *Laurentius à Colladone*, qui errores rei *Anatomicæ* paſſim obuiſos intactos reliquit. Itaque cogar in deſenſionem *Laurentij* proferre, quod à *Galeno* lib. 5. de *Placit.*

De Bartheo.
Iunior. Euaſtathio.

De Galieno.
Cæſare Arantio.

De Volchero
Coitero, &
F. Platero.

De Archangelo
Piccolomino.

De Conſtantino
Varolio.

De Ambroſio
Paraſio.

De Andrea
Laurentio.

tis cap. ult. scriptum est. Cum incerta sint dogmata & rationum argumentis probabilia, alias absurda videantur, sicuti succensendum non est, si quis veras suas opiniones defendit, ita concedere, ut aliis nobis ipsis contradicant debemus, et carpere mordaciter, atque irridere quasi stultum aliquid quod dogmaticè in controuersiam venerit, aliud procacis atque petulantis hominis est. Nam ut notat *Aristoteles lib. 1. analyt. poster. cap. 8.* Quid est quod verbo labefactari, resellique non queat, at si suam quisque mentem consulat, multa sunt, quibus obistere non possis. Consimiles quæstiones apud *Mercatum Hispanum Medicum* in eius *Physiologia* fermè iisdem verbis paribûsq; rationibus expositas inuenies, vel per metèphycolium *Mercatus* factus; est *Laurentius*, ut *Ennius* *Homeri* ingenio animatus fuit, vel amborum ingenia consimili genio regebantur. Cum super ea te interrogarem *dottissimum Regis Hispaniarum Cubicularium Medicum* apud *Serenissimos Principes Belgij primarium, Dominum PaZ,* fassus est *Mercatum ex Laurentio* suâ Anatomica deprompsisse. Quod cum illi in *Hispania* exprobrasset, ingenuè respondit, *Agnosco Laurentium in re Anatomica me doctiorem, malo eius opinionibus adherere, quam ridiculus proferre, nec possum melioribus uti verbis.* Interim *Mercatus* plagij crimen insigne vitare non potest, cum nullibi *Laurentium* nominarit vel laudarit. Grata posteritas multum debet *Laurentij* laboribus, quibus perlegendis neminem vnquam pœnituit bonas horas collocasse. Sed in re Anatomica pluribus abundat erroribus, nullumque ferme caput est de re Anatomica, in quo ipse non peccarit, aut hallucinatus fuerit. Errorum causa fuit, ut opinor, nimia *Laurentij* credulitas, quæ aliorum manibus & oculis confusus, plurima tanquam vera & extantia litteris mandauit. Ex quibus intelligitur *Laurentium*, suis manibus nunquam aut leuiter rem Anatomicam tractasse, neminemque fore peritum. Anatomicum nisi manus in secandis & perscrutandis corporibus humanis attritas habuerit. Miror quomodo tam lynceus & perspicax fuerit in rebus Anatomicis *Petrus Laurebergius*, qui in *Lauro Delphica*, pollicetur se in *suo Prometheus*, siue libro *Anatomico*, offensurum errores notabiles *Laurentij* supra bis mille: fateor equidem multos errores in opere *Anatomico Laurentij* offendi, quorum tamen nonnulli benignè possunt excusari.

~~~~~ Vbi plura nitent in carmine non ego paucis

Horat.

Offendar maculis, quas aut incuria fudit,

Aut humana parum cavit natura.

De Laureb.  
begio.

Cum autem *Laurebergij Proceffus Anatomica*, anno 1619. edita mihi dono dedisset eruditissimus Medicus *Paulus Marquartus Schlegel*, nunc Professor in *Academia Italia*, animaduerti errores 232. *Laurentij* annotatos, quorum vix triginta merentur reprehensionem, potius hallucinationes dici debent, namque opere in *magna, sua est obr. pere summum*: grauiore & inexcusabile in *Laurebergio* inueni ipse quæstiones Anatomicas duntaxat examinat, nil quicquam de re Anatomica, siue existentia & conformatione partium reprehendit, postquam in diuisione similium & dissimilium partium multum se exercuit, siccò pede transiit ossa, musculos, venas, arterias, nervos, ligamenta, cartilagines, & ad librum 6. properat, in quo tantum partes ventris inferioris vsque ad pancreas inscienter admodum recensuit, atque in *Prefatione* vix vigesimam errorum partem hic enumerari arroganter iactat, quibus Anatomen tum *Laurentius* tum alij collutularunt, atque hæc minutula esse fatetur, & nil nisi vmbra sui libri *Anatomici*.

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Vt in Collegio suo Anatomia manifestè demonstrauit se *Vmbriticum Anatomicum*, qui nunquam secuit cadauera, vel peritè secantibus adstitit, curiosus & sedulus spectator.

Ludere qui nescit campetribus abstinet armis.<sup>7</sup>

De Hieron.  
onymo Fab.  
ricio ab  
Aqua-pa-  
deue.

*Hieronymus Fabricius ab Aquapendente* per annos quinquaginta professus est Anatomien in celeberrimo *Æsculapij* fano *Antonoreo*, ab anno 1565. & plurima opuscula Anatomica, docta quidem & laboriosa elegantia dictione conscripsit. Sed postrema primis non respondet, siue dictionem, siue eruditionem spectes. Quinetiam *Operationes Chirurgica* rudi stylo exaratæ, manifestè demonstrant primum opus de *Visu, Voce, & Auditui*, ab alio expolitum & exornatum fuisse. Ideoque prudenter & cautè fecisset, si more & exemplo *dottissimi Mercurialis*, editionem *suarum Operationum* cuidam è discipulis commississet, qui ex eius ore collectas istas *Operationes* ipso inscio vel coniuente publicasset. Nihilominus tamen illum de re Anatomica bene meritum iudico,



quam plucibus inuentis auxit & ditauit. Propterea huius Authoris lectionem tanquam vtilem ac necessariam valde commendo.

*Iulius Cæssarius Placentinus*, Anatomicus Patauinus, æmulo doctrinæ studio Fabricio sese conferre voluit, imò superare tentauit in labore consimili, de *Voce*, *Auditu*, & *Oculo*, quem eodem tempore promulgauit. Sed irritò conatu, nec pari successu, cum eius labor multis paralangis distet ab opere Fabricij. Elegantissimis tamen iconibus rem Anatomicam locupletauit, quas omnes tam editas, quam nondum editas, tradidit *Daniel Bæretius* ab interitu vindicauit, dum eas cum *Spigelij* libro Anatomico cudi & coniungi curauit, atque suis interpretationibus illustrauit.

*Gasparus Bauhinus* in Academia *Basilicensi* per annos quadraginta Anatomix professor, librum de *partibus externis corporis humani* composuit, alium de *partibus similioribus*, *Isagogæ Anatomicæ*, & *Theatrum Anatomicum* edidit: *Isagoge* placuit, fæpius excusa & renouata, & nuper suum *Theatrum Anatomicum* denuò publicauit, vt inscriptio libri præ se fert, infinitis locis auctum, ad morbos accommodatum, erroribus ab autore repurgatum, obseruationibus aliquot nouis illustratum. Sed citra inuidiam & obreftationem alienæ famæ monebo lectorem, istam reformationem *Theatri Anatomici* ad exemplar meæ *Anthropographiæ* factam fuisse, suppressio tamen meo nomine, vt animaduertet quicumque meam *Anthropographiam* cum eius *Theatro secundæ editionis* conferre voluerit. Itaque si placuit Bauhino meus labor,

*Non sum adeo infirmis, nuper me in lustrare vidi,  
Cum placidum ventis faret mare, non ega Dædalon  
Iudice te metumam, si nunquam fuitis imago.*

Sed ne videatur indidit plagæ crimine iniquè *Bauhinus* accusatus & condemnatus, non proferam veterum anthorum, siue rei medicæ, siue humanioris literaturæ innumeratas sententias, ad rem Anatomicam spectantes, à meo libro surreptas. Quia dicit à me prius occupatas fuisse, iam pridem à se in iisdem libris adnotatas, cum vnicuique pateat eiusmodi scriptorum lectio. De meis dumtaxat inuentis magno labore quæsiis conqueror, & repetundarum rerum acculo *Bauhinum*, quas recitat vt nomine alterius innominati, quidam aut nouissimi dicunt, quod cum in *Theatro Anatomico* offendes (amice Lector) scito *Ritlandum* esse autorem: equidem operæ precium duxi istam animaduersionem in *Theatrum Anatomicum* proferre, vt presentibus & posteris innoteret, *Bauhinum*, eximium fuisse compilatorem, nihil de suo cerebro parturisse, nec quidquam in re Anatomica inuenisse, neque opiniones *Anatomicarum* controuerfas conciliasse: Denique nullum in citandis authoribus delectum habuisse, quoniam indoctus & imperitus Anatomicus, se quoque Principibus permixtum agnoscit *Achuius* in hoc *Theatro Anatomico*. Verumtamen, in *Bauhino* laudo diligentiam & summum laborem in condendo hoc *Theatro Anatomico*, vt in suo *Physiognæ*, opere laboriosissimo & vtilissimo, sed in Anatomicis maiorem industriam, accuratam censuram in probandis, vel improbandis desidero. Nam persequi quod quisque vnam contemptissimorum hominum dixerit, aut nimis miseræ, aut inanis iactantia est, & detinet atque obruit ingenia melius aliis vacatura, ait *Plinius lib. 7. cap. 37.*

*Æmilij Parisani, Vetus Medici, in locum emissi Nobilium Exercitationum librorum* *doodecim de Subtilitate*, vt præ se fert libri inscriptio: in hoc opere quasdam quæstiones Anatomicas de structura hominis examinauit more *Laurentij*, sed ita superbe, & insolenter se gerit, vt solus sapere videatur, reliqui cœcutiant, & in densissimis ignorantie tenebris versentur, cum tamen ipse rudis & barbarus, rei Anatomice prorsus ignarus, passim ineptias & solœcismos effusiat, quare *caecata hæc charta*, & animalium Volucianorum fato dignissima, quæ *Parisani* fatuitatem declarat, deferatur in vicum vendentem thos & adores, & pipet, & quicquid chartis amicitur ineptis.

*Quid Roma faciam? me uisui nescio, librum  
Si malus est nequeo laudare, & pessere.*

Iuuenal.

*Petrus Pannius*, ob strenuè nantatam operam in rebus Anatomicis, nec illaudatus abibit, multa pollicetur de re Anatomica, sed quæ nobis communicauit de *Officiis*, neque raram & exquisitam doctrinam, neque nouas obseruationes supra cæteros Anatomicos exhibent. Non qui vincere potuerit, sed qui vicerit corona dignus est, inquit *Philosophus*.

Anatomicis annumerabo *Gasparum Heffmannum* eruditissimum Medicum, uenit à *Calapio* *Heffmanni*, ob elaboratos commentarios in libros *Gal. de vñ partium*, in quibus multa

De *Salut*  
Collection.

De *Bæretio*  
De *Bauhino*  
De *Bauhino*

De *Remi*  
De *Pauli*  
De *Pauli*

De *Petrus*  
De *Pannio*

De *Calapio*  
De *Heffmanni*



qui rectè aliquid inuenere, aut examine eorum, quæ ab illis perperam dicta, aut inuenta fuere, atque fœnera & vera declaratione eorum, quæ supra veteres & recentiores Anatomicos ab ipsis reperta, aut rectius exposita videbuntur. Consilium *Celsi lib. 1. cap. 14.* valde mihi placet oportet neque recentiores viros in his fraudare quæ vel repererunt, vel rectè sequuti sunt, tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt auctoribus suis reddere.

*Daniel Sacerdotius* absoluta ista editione *Lutetiam* se contulit, ubi per hyemem moratus est, ut me audiret, & spectaret *Anatomica* tractantem, & secantem plura cadauera: Proximus adflabat mihi, nec cum quidquam celavi. Cum ei exprobarem *Spigelium* ex meo libro multa descripsisse, nulla mei mentione facta, ut erat ingenuus, & ex *Lutherano* verè *Catholicus* factus, sincerè confessus est, id à seipso factum in honorem *Aulæ* & *Præceptoris*, ut posterì crederent cuncta hæc à *Spigelio* profectâ: sed cum tempore *Quadragesima*, eius circa nostram religionem seruo magis ineluisset, ex consilio, & apparitione *Beatissima Virginis* facta Confessori suo *Dominicano*, quæ nullam salutem eius animæ spondebat, nisi sacrum illum ordinem ingrederetur: me tamen dissuadente, & reditum in patriam suadente, & pro itinere pecuniam ei offerente, per internuncium huius negotij *Dom. Gilbertum Phylon*, nostrum Collegam eruditissimum, qui huius rei testis fidelis esse potest, Monasticam illam vitam elegit, vixque biennio exacto, *dysenteria strabularia*, quæ tum erat popularis & contagiosa, interiit, cum esset Clinicus Medicus istius familiæ religiosus.

Quoniam laus in ore proprio fordescit, ne *Suffenus* videar, & tanquam *Astydamas* laudator operis, de meis laboribus Anatomicis iudicium æquo Lectori, & Anatomico relinquo. Iudicio de meipso ero, vos eritis Iudices.

*Rara coronato plausere Theatra Menandro,  
Et sua riserunt secula Menidem.*

Nec ego laudem & applausum ex hoc labore spero vel affecto, utilitatem iuandi prætulì gratiæ placendi, & si ingenio non est locus, saltem curæ testimonium promeruisse contentus ero. Posteris an aliqua cura nostri nescio, nos certè meremur, ut sit aliqua, non dico ingenio, id enim superbum, sed studio & labori, ex *Plinio lib. 9. epist. 1.* Audacter igitur dicam, citra fastum & arrogantiam, corpus humanum à multis dissectum & descriptum fuisse, sed à nemine tam accuratè sectum, examinatum, & descriptum, quàm fuit nostris laboribus pæfactum. Quod si omnia non fuerimus assequuti, excusationem *Plinij* prætexam, qui terrarum vniuersum orbem descripsit his verbis veniam precat. Hand vilo in genere venia iustior est, si modò minimè mirum est hominem genitum non omnia humana nouisse, libro tertio *naturalis historia*.

*Multa regit sacro involucre Natura, neque ullis  
Fas est scire quidem mortalibus omnia; multa  
Admirare modo, nec non venerare; neque illa  
Inquires, quæ sunt arcana proxima.*

## SECTÆ ANATOMICORVM.

### CAPVT VII.



N omnibus scientiis quæ ratione sola reguntur, præceptionum inconsistentia peperit opinionum diuortia: sed in his quæ sensu & ratione nituntur, nullus dubitationi locus relinquitur. Quod enim ratione probatum fuerit, & sensu ipso confirmatum, oppugnare summa dementia est, iudicio *Aristotelis*: quid enim sensibus ipsis certius esse queat, quæ vera & falsa notantur. Proinde mirum est in *Anatome*, quæ solo sensu ducitur, varias sectas, & diuersa studia Medicorum extitisse.

*Methodici* negabant utilem esse Medico humani corporis contemplationem, sufficere morborum & remediorum cognitionem. Contra *Theophrastum* huius sectæ auctorem *Galenus* disputat, cap. 2. lib. 1. *Methodi*, & ex *Hippocrate*, *Platone*, & *Aristotele*

Dr. Bacon;  
to.

Author de  
sensu iudicium  
relinquit  
quæ lectio  
& postulat  
sati.

Methodici  
reputabant  
Anatomiam  
aut locum

aut cogni-  
tionem de-  
siderabant.  
Celsus per-  
fac. lib. 2.  
Empirico-  
Anatomic.

ostendit, neminem posse morbos commodè curare, ignoratâ corporis vniuersi natura.

*Empirici* non omnino partium humani corporis inspectionem auersabantur, sed ad eam fortuiti vulneris occasione utebantur. Dicebant interdum gladiatorem in arena, vel militem in acie, vel viatorem à latronibus exceptum, sic vulnerari, ut eius interior aliqua pars aperiat, & in alio alia sita, ita sedem, positum, ordinem, figuram, similiaque cognoscere prudentem Medicum, non eadem ad sanitatem molientem: idque per misericordiam discere, quod alij dira crudelitate cognouerint. Ob hæc ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse, quæ etiam non crudelis, tamen fœda sit, quum aliter pleraque in mortuis se habeant. *Cruent. lib. 4. Academicarum quæstionum*, hanc Anatomiz speciem describit, & locum *Celsi* plurimum illustrat. Corpora nostra, inquit *Tullius*, non nouimus, qui sint situs partium, quam vim quæque pars habeat ignoramus. Itaque Medici ipsi quorum intererat ea nosse, aperuerunt ut viderentur, nec tamen aiunt *Empirici*, notiora essent illa, quia posset fieri, ut patefacta & detecta mutentur. Eiusmodi Anatomem *Empiricorum Galenus* *Sic quæstionibus*, & *Anatomen* *ut eadem* appellat, quæ cum fortuita sit, & subcutanea tantum penetraret, non cadit in artem: propterea exploditur à *Galeno* *lib. 1. Admin. Anat. cap. 2. & lib. 2. eiusdem Operis cap. 3. & lib. 3. de compo. medic. per genera, cap. 2.* Inspicere enim prius oportet nullo cum otio quamque particulam, ut statim visa cognoscatur: At nemo *Empiricorum* dum citò faucium curare studet, ubi vulneratis partibus nerui, ubi arteriæ & venæ subiaceant, contemplantur. *Empiricorum* Anatomæ casu contingens, inquit *Galenus* *lib. 3. secundum locum, cap. 2.* prolixum nugamentum est, simile capris quæ iuicis manualibus, compunguntur: hæc nugacior est ex libris Anatomicis institutio, non ab similibus iis, qui secundum parcemiam *ex libro gubernare* dicuntur. Solum inter Medicos Recentiores quos legi, obseruari, *Tulum Alexandrinum* corporis humani dissectiones exofas habuisse, idcirco suum odium in *Anatomen* declarauit, *lib. de Medicina & Medica*. Miror quomodo exciderint hæc verba ex ore & calamo *Guinterij Andernaci*. Multa in rerum natura extant, quorum notitia non quidem Medicum aptiorem facit, sed Medicinæ tantum perfectum reddit, sic nulli ob accuratam illam ne dicam curiosam nimis partium corporis perquisitionem Medici excellentiores, sed ob curationes dextrè tentatas absolutasque censentur.

Nescio qui sint illi *Rabini*, sic appellat *Presalut. lib. 1. Anat. cap. vlt.* afferentes musculorum, tendinum, ligamentorum, neruorum, venarum, & artèriarum videndirationem, solum è corporibus in aquarum gurgitibus emaciatis, non è nuper mortuis discendam esse: quasi v erò quidquam eruditione dignum in corporibus ad eum modum coactatis, prorsusve hac ratione corruptis, disci possit. Forsan *Presalut* intelligit barbaros Anatomicos, putà *Zerbum*, & alios qui similem opinionem protulerunt.

Existerant quoque Medici, qui doctrinam Anatomicam in sola nominum cognitione constituebant, quæ tamen partibus tantum indita fuerit, ut inter se discernerentur. Imò *Galenus* optabat res ipsas sine nominibus explicari; etenim *Anatomes* utilitas in partium naturæ scientia, non in appellationibus sita est, ut docet *Galenus* *lib. 9. Admin. Anat.* Huius sedis fuerunt *Erasistratus discipuli*, degeneres prorsus Anatomici, ut *Apollonius Memphites*, & hoc prior *Xenophon*, qui ex appellationibus partium sufficientem earum haberi cognitionem existimabant, sine vlla dissectione. Quæ prauâ opinione plerique adhuc imbuti, putant cognitis partium appellationibus, earumque figuris diligenter inspectis, perfectam *Anatomes* peritiam consequi. Quemadmodum *Geographia* sine vlla peregrinatione, & locorum lustratione, ex lectura librorum, & chartarum inspectione perfectè, ut opinantur, ediscitur.

At verò *Dogmatici* Anatomem, uti artem Medicis omnino necessariam diligenter excoluerunt, & adhibito studio humana cadauera secuerunt, uti non tantum partes externas, verumetiam internas accuratè cognoscerent. Hanc *Anatomen Hippocratis & Galeni* doctrinâ stabilitam profitemur, eam tamen eludit *Agrippa* *lib. de vniuers. re scientiarum*, horrendam lanienam, & *Theatralem Carnificem* appellat: & eius imitatione, *Paracelsus* nostram *Anatomen*, mortuam & cadauerosam vocat, atque improbat. In cuius locum ridiculam, & ad hunc diem inauditam *Anatomen* excogitauit, quam *Formalem & Spiritualem* vocat, non materialem; viuum, non mortuum; Hæc *Anatome*, hominis essentiam non ostendit in homine, sed extra hominem in vniuersis partibus,

*Galenus in  
introduc.*

*Dogmatici  
Anatome.*

*Anatomia  
præcelsica  
in metalis.*

partibus, præsertim *mineralibus*: In cupro ostendit Anatomiam iecoris, quia igitur se-  
paratione essentia, quæ est iecur non corporeum & materiale, sed essentialitatum: Pari-  
tatione in argento ostendit Cerebrum, in auro Cor essentialitatum, ita ut possis dicere  
argentum cerebrum minerale, vicissimque cerebrum argentum animale. De hac *A-*  
*natome Chymica* pluribus egit, in *Comparatione veteris Medicinæ cum noua.*

VTRVM ANATOME POTIVS AD PHYSICAM,  
quàm ad Medicinam, vel Chirurgiam pertineat, & an Anima  
consideratio ad Anatomen referri debeat.

C A P U T VIII.

**N**ON erit alienum paucis examinare, num *Anatome* potius ad *Physicam* An *Anato-*  
quàm ad *Medicinam* referri debeat. Tradit enim *Galenus*, plures Philo- me *Par-*  
sophos de rebus Anatomicis tractasse. *Aristoteles* utramque artis Ana- Physica.  
tomice partem exercuit, nempe historiam & sectionem. Quinetiam  
*Galenus* Philosophis consulit, huic arti sedulam operam nauare, si o-  
perum Naturæ scientiam comparare student. Ipsemet *Hippocrates* Medicumhorta-  
tur, ut sit Physicus, ad habitum & robur corporis respiciens in curatione ægrorum.  
Hæc omnia demonstrant *Anatomen*, non esse Medico proprietariam, sed tantum vfu-  
fructuariam, & à Philosopho depromere.

*Vides Vides Anatomen* referri ad *Chirurgiam*, quia cum non administraretur, nisi à do- An *Chirur-*  
cto atque artificiosa manu, & referatur ad curationem morborum, siue propriè, siue tis.  
alio interfectio medio manu tractetur, meritò ad *Chirurgiam* tenocatur quod fecis-  
se videtur *Galenus*, qui lib. 3. de decretis, examinans vnde oriatur motus voluntarius;  
an à Corde, vel à Cerebro, fecit Thoracem viuents belluæ, & Cor, aut auellit, aut  
ardè comprehendit, eumque Anatomen appellat *Chirurgiam*: & lib. de vssu pulsum, ut  
caloris originem exquirat, Cor viuents belluæ inedit, & eiusmodi Anatomen simi-  
liter *Chirurgiam* vocat: *Hippocrates* Thoracis sectionem, siue hanc administratio-  
nem Anatomicam appellat *Chirurgiam*, lib. de Corde. Obstat an à potu colorato in-  
teriora pulmonis insiciantur, non cuius hanc manuum actionem aggredi datur;  
vnde *omni, ubi à chirurgo*. Quamvis *Hippocrates* & *Galenus* istas operationes nominant  
*Chirurgiam*, non sequitur *Anatomen* referri ad *Chirurgiam*. Nam quilibet manus ope-  
ratio cum ratione suscepta, à Græcis auctoribus *Chirurgia* vocatur, & *chirurgia* manu  
operarius dicitur, quod nostra lingua Gallica dicimus *Manouvrier*, ut laus exposit  
*Rodens* in *Pandellus*, & *Hieronymus Stephausus* in suis *Thesauris* lingua Græca. *Aristoteles* in  
*Antechan* operationem *Chirurgiam* appellat. *Pappus Alexandrinus* lib. 7. coll. 17. scribit  
*Mechanicam* constare partibus, vna rationali, quæ mentis operâ vitur, Altera quæ  
manus actionem adhibet, & *Chirurgiam* vocat.

Quidam *Anthropologiam* diuidunt in *Psychologiam* & *Somatologiam*, quia homo dua-  
bus naturis præditus est, vna materiali, nempe Corpore, altera formali, scilicet Ani-  
ma, cuius explicationem præcedere volunt. Neque Delphicum illud, *nosce te ipsum*  
præcipit, vt membra nostra, vel staturam figuramque noscamus, quippe nos non  
Corpora sumus, sed dicat Oraculum, *nosce Animum tuum*, qui solus Hominem con-  
stituit. Hinc nata illa paradoxa, *Hominem neque tangere, neque adspicere, neque comprehendere*  
*posse*; hinc *Therapompus*, cum in mortario tunderetur, *Vasculum solum tundi, non Ther-*  
*pompum* exclamabat. Eam ob rem *Aristoteles*, *Animæ considerationem* voluit præcedere  
*historiam animalium*. Videtur huius cognitio, cum ad omnem veritatem, tum maxi-  
mè ad naturæ cognitionem magnum adferre adiumentum, quoniam animantium  
quasi fons quidam & principium est, lib. 1. de *Anima*. Ridentur à Poëtis *Prometheus*, quod  
cum hominem fingere & fabricare vellet, à massa terrena seu Corpore inceperit.

O prima insulsi fingenti terra *Promethee*,

Ille parum canis pettoris egit opus:

Corpora disponens, mentem non vidit in arte,

Acta enim primùm debuit esse vias

Verum *Animæ* consideratio pertineat ad hominis Anatomem discere ex *Arist.* cap. 4. lib. 1. de partibus animal. Verumtamen *Galenus* lib. de natura humana ex *Platone* refert non posse deprehendi Animæ naturam, ignorâ totius corporis naturâ; quod etiam confirmant *Alexander Aphrodisius*, scilicet animæ naturam non posse perfectè considerari, nisi perspecto antea corporis apparatu, ideoque libros de Animalibus præmittunt libris de Anima, qui ordinem librorum *Aristotelis* præscribere.

His omnibus rationum difficultatibus quæ propolite sunt, ita responderem. Anatomie duplex est, *Physica*, atque *Medica*. *Physicus* omnium animalium structuram exquirat, ut nihil frustra & temerè à Natura factum intelligat, & demonstrer. Itaque *Galenus*, ut *Physicus*, animalia quamplurima discit, ut animantium differentias cognosceret, de quibus commentarium pollicetur. At *Medicus*, ut *Homini* vnius sanitatem tueri, & amissam restituere suscipit, sic solius *Homini* structuram persequatur, & inquire: & quoniam *Physicus* hominem viventem contemplatur, variis mentis & corporis actionibus obcundis idoneum, idcirco *Physica* Anatomie ab Anima exordienda est, non autem *Medica*, quæ in Homine tantum, prout est æger aut sanus, occupatur.

## ANATOMEN ESSE MEDICINÆ fundamentum, ac principium.

### CAPUT IX.

**M**EDICINA vulgò diuiditur in *Physiologiam*, *Pathologiam*, & *Therapeuticam*, quæ eo se consequuntur ordine, ut *Physiologia* primum locum teneat, *Pathologia* secundum, *Therapeutica* postremum. *Physiologia* autem totiusque artis principium in Elementa constituunt, quæ principia sunt Cosmica, ex quibus omnia quæ cæli ambitu continentur concreta sunt. Idcirco Medici superioris scientiæ, videlicet *Physicæ*, conclusiones reperiunt, & in dubium reuocant, quando tractant de Elementis, quas certas & ratas habere debent. At nullus artifex principiorum suorum initia inquirat, sed ea à superiore scientia definita supponit. Cur enim potius de Elementis agit Medicus, quàm ac Cælo, quod miscet elementa ad hominis generationem? Obiciet aliquis, *Hippocratem* de Elementis tractasse, lib. de natura hominis. Respondeo id fecisse, ut teperhenderet *Physicos* in elementorum doctrina deceptos: sed argumenta quibus vtitur, ex penu Medico deprompta sunt. *Galenus* de iisdem elementis secundum *Hippocratem* egit, ut mentem & breuitatem summi Præceptoris explicaret, ut ipse testatur libro de ordine suorum librorum. *Auicennas* doctrinam *Galen*i retinuit, & proposuit. Sed subtilis *Auerroës* Methodicus Philosophus, Elementorum ne meminit quidem tanquam exotericorum in Medicina.

Certum est animalium contemplationem ad *Physicam* pertinere, ex animalibus perf. ctissimum esse Hominem, in quo *Physica* terminatur. At ubi illa desinit, incipit Medicus, ergo Medicus de subiecto suo agere debet, quatenus animal est partibus compositum, quæ sanitati & morbo obnoxie sunt. Dicam igitur & asseuerabo, artes subalternantes vniuersalia theorematà omnibus subalternatis commodare, subalternas verò ea pro principiis sumere, & ad usum suum transferre, ipsòque usu magis ac magis confirmare. Quorsum dicit aliquis, repudias elementa? Ut dem locum aliis Medicinæ principiis verioribus systaticis, ex quibus corpus nostrum constatum est: Cuiusmodi sunt Partes nostri corporis Similares, quæ ab antiquis Anatomicis, pro principiis nostri corporis, totiusque Medicinæ habentur. *Asclepiades Prusensis* vera corporis elementa constituebat partes solidas. Itaque Anatomie principium ac fundamentum erit Medicinæ. Quod adhuc variis rationibus demonstro. Via & ratio quam naturæ præscripto tenere debemus, ab illustrioribus, & notioribus nobis rebus ad eas, quæ natura illustriores clariorefque sunt, progredi solet. Est autem corpus humanum notius nobis quatuor elementis, ex quibus componitur: Ergo ab humano corpore exordienda Medicina. Quæ cum sensu ipso ducatur, à sensibilibus quoque principiis auspicanda videtur. Totum enim notius est parte, faciliusque hominē integrum comprehendimus, quàm in sua principia elementaria resolutum. Quod si artifex

subiectam quam tractat materiam omnino perspectam habere debet, quò expeditius in omnem artificij speciem, & decorem sedere illam possit & torquere; quidni Medicus humani corporis naturam primum cognoscet, omnibus suis partibus absolutam? cùm hoc sit totius Medicinæ fundamentum, principium & finis. Scribit Hippocrates, principium Medicinæ esse hominis naturam, & ab ea auspicandum esse decrevit lib. de locis in homine. Contrarium tamen proposuisse videtur sub finem libri de praxi Medicina. Plineus Medicus Sophista quidam, fieri non posse, ut quis perscili Medicinam calleat, sinem intelligat quid sit homo, quæ prima eius generatio, & compositio. At quæ sunt à Sophista vel à Medico dicta, aut scripta de Natura, non tam ad artem Medicam pertinere arbitror, quam ad pictoriam. Certam verò naturam scientiam non aliunde haberi, quam ex Medicina, quam facile est assequi, ubi totam Medicinam complexus fueris. Hoc in loco damnat Hippocrates eos, qui existimabant totam artem Medicam sitam esse in cognitione corporis humani, nihilque præter eius causas, & compositionem speculabatur. Vult præterea actiones partium considerari, ut ex earum viuis morbos intelligamus. Quæ omnia si Medicinæ finibus coercantur, perfectè sciri possunt, ubi totam Medicinam comprehenderit.

Ceterum, ne quis existimet me sine exemplis, & auctoritate, *Anatomen* reliquis Medicinæ partibus anteposuisse, *Genilis* vocat *Anatomen* *Alphabetum* Medicinæ, in quo primum instruendi sunt Medicinæ studiosi, sicut literas alphabeti prius nosse oportet, quàm legere possis. *Fernelius* suam Medicinam exorditur ab *Anatome*, cui subnectit cæteras *Physiologia* partes. Sunt enim, Os, Cartilago, Nervi, & reliqua huiusce generis, prima humani corporis elementa: quamvis hæc non admittat *Asbenam*, quorum loco alia constituit, ex quibus priora componuntur. *Auerroës* suam Medicinam ab *Anatome* auspicatur. Ipsemet *Galenus* dum exponit & designat suorum librorum ordinem, quem legendo servari voluit, libros *Anatomicos* cæteris præfert, & ab his inchoandum esse monet, quibus elementorum tractationem subiecit, atque idem fecit, sub finem libri *Artis parva*, cùm ordinem librorum suorum ad edificandam præscribit. Quamvis præposuerit elementa, temperamenta, facultates naturales suis libris *Anatomicis*, subiungit ad earum rerum demonstrationes prius in *Anatomicis* exerceri oportere. Sed ut evidentiùs pateat *Anatomen* principium esse Medicinæ, atque omnibus *Physiologia* partibus præmitti debere: singulas *Physiologia* partes pereuramus. Illa septem partibus constat. Imprimis agit de *Elementis*, quorum tractatio planè Physica est. Deinde *Temperamenta* partium similiaium, ut ossis, carnis, cutis, venæ, &c. & dissimiliaium, siue organica: ut, ut cerebri, Cordis, hepatis perquirat de quibus non potest certò aliquid statuere, ignoratis partibus. Postea docet *Humores* in hepate generari, eorum excrementa in liene, cystis, & vesica colligi: quæ omnia perfectè scire non licet, nisi instrumenta cognoscantur. Quo modo rectè iudicabis *spiritum* animale in ventriculis cerebri, aut plexu retiformi præcreari, nisi partes antè perspectas & exploratas habueris? Incertus eris in assignandis facultatibus & functionum sedibus, nisi prius partes exactè noueris, ut principes quæ actionem exercent, à ministris & famulantibus partibus internoscas. Videtis igitur curam esse *Physiologiam*, nisi lumen *Anatomicum* præcesserit.

## DE SVBIECTO ANATOMES.

### CAPVT X.



**A**NATOMES subiectum est *Corpus Humanum*, cuius structuram & conformationem accuratè sectione percuratur *Anatomicus*. Doctissimus *Laurentius* tale subiectum non admittit, sed *Partem* tanquam proprium artis *Anatomicæ* subiectum constituit, hac inducitur ratione. Corpus integrum & continuum non tractat *Anatomicus*, sed diuisum, in membra partèque diremptum. Certum est totum corpus humanum simul & semel secari non posse, & incipiendum esse à parte aliqua, quæ cùm sit vitta toti & coherens, merito quis affirmabit corpus humanum integrum & continuum esse subiectum artis *Anatomicæ*. Non inficiamur tamen partem dici posse subiectum, quando

An corpus  
vel pars  
subiectum  
Anatomicæ



quidem apud Galenum duplex est *Anatome*, subiecto distincta. Vniuersalis *Anatomes* subiectum, est *Corpus Humanum* integrum & continuum. Particularis *Anatomes* subiectum *Parti à toto separata*. Vulgatum est Philosophorum axioma: *Quidquid vi totum alicuius scientia subiectum exitus, id etiam vi talibus partibus compositum subiectum esse*: exempli gratia, *Physica* subiectum vi totum, est *corpus naturale*, cuius partes sunt simplex, mixtum, & viuens: possitque dicere *Physica* subiectum corpus esse naturale, vniuersum, vel quatenus his & illis partibus constat; Nec absurdè dicitur corpus humanum integrum, vel partem eius quamlibet, esse *Medicinæ* subiectum. Ac proinde pars poterit dici *Artis* *Anatomicæ* subiectum, modò corpus humanum integrum non excludatur: quod ita compositum & conformatum spectatur ab *Anatomico*, tanquam instrumentum quoddam, vnicam operationem exercens.

Corpus autem humanum vnicum esse instrumentum sic demonstratur præter auctoritatem Galeni, qui lib. 1. de usu part. cap. 2. Animæ organum corpus esse statuit. Ex omnibus corporis partibus vna compages, vna corporatura exurgit, quam vocat *Hippocrates* *σύνολον*. Ergo dabitur vnum quoddam instrumentum ex his compositum, nempe totum corpus; cuius vnica erit operatio, quemadmodum persuadere videtur *Galenus* lib. 1. de usu part. cap. 8. vbi ex mente Hippocratis, scribit omnes particulas corporis sibi inuicem condolare & consentire, atque in famulitium vnius operationis omnes conspirare. At si datur vna operatio, cui omnes corporis partes subserviunt, dabitur vnum instrumentum actionem illam exercens.

Quænam illa sit operatio nunc inuestigandum. Verisimile est Deum & naturam homini diuinius aliquid tribuisse, quàm cæteris animantibus, quibuscū vita nobis communis est: ac proinde operatio illa, vita esse non potest; neque sensus; & motus, quibus homines & bruta peræquè fruuntur; neque est ratio, quæ hominem à brutis distinguit, quia facultas est, non actio. Sequitur ergo operatione illam totius instrumenti, nempe corporis, esse motum rationalem seu artificiosum. Quod euidentissimè probatur ex *Gal.* Methodus optima docendæ *Anatomes* est *Analytica*, quæ à toto ad partes vsque minimas progreditur. *Galenus* autem libris de usu part. hominem integrum describitur, communem illius operationem explicat, videlicet motum, ideoque musculis omnibus partibus præmittit, tanquam huius operationis instrumenta. Et quoniam motus ille non tantum voluntarius est, sed artificiosus à ratione directus, propterea incipit à musculis manus, quæ est instrumentum sapientiæ, homini propter rationem concessum. Sui enim instituti rationem reddit lib. 4. *Admin. Anat.* cap. 1. In opere de usu part. hoc mihi fuit institutum, vt omnium humani corporis partium struendam quanto artificio constant, exponerem. Itaque à manibus haud temerè sermonis sumpti exordium, quod has partes in solis hominibus videre liceat; nec absurdum fuit flammæ de cruribus nonnulla commentari, quandoquidem & in his, homo præter animantia proprium quiddam sibi vendicat, &c. Idem repetit cap. 3. lib. 2. *Admin. Anat.* Quapropter non est aliud constituendum artis *Anatomicæ* subiectum, quàm *Corpus Humanum*.

Si tamen latè fumatur *Anatome*, quatenus etiam ad bruta extenditur, dicam *Anatomes* subiectum esse duplex, *Particulare* & *Vniuersale*: *Vtrumque viuens, & mortuum* & *Particulare* & adæquatum est *Corpus Humanum*, in quo præcipue Medicus exerceri debet: Vniuersale, brutorum quodlibet corpus, in quibus etiam Medicum si operi naturæ cognitionem affectat, versari conuenit. Nam vt sapienter monet *Aristoteles*, vtiliorum animalium disputationem & inspectionem spernere, indignū est Philosopho, cum nulla res sit naturæ, cui non insit aliquid admirabile: Quare si quis cæterorum animalium contemplationem ignobilem abiectamque putat, idem de suo corpore sentiat, necessum est. Interdum Medicus cadaueris, humani penuria, quædam brutorum corpora, quæ ad illius fabricam propius accedunt, rescindere cogitur, quorum sex genera recensentur à *Galeno* lib. 4. *Admin. Anat.* cap. 3. & lib. 6. eiusdem operis cap. 3. Eadem referuntur à *Russo Ephefio* lib. 1. cap. 17. Primum genus est *Simiarum*: Secundū eorum animalium, quæ *μακάριον* vocat, id est, simiis affinia, vt sunt *Lyces*, *Satyri*, & *Cyncephali*: Tertiū *Vrsorum*: Quartum serratis dentibus præditorum, vt *Suum*: Quintū *Solipedum*: Sextum *Ruminantium*. Nos loco istorum animalium *Canes* accipimus, quorum dissectione nostrum lienem affici non puto, quidquid scribat *Herapollus in Hieroglyphicis*, cap. 39. eos nimirum qui canes euiscerant, magna ex parte fieri spleniticos, quia graui illo halitu & vapore, qui ex inciso dissectione cane expirat, inficiuntur. Nam si

Brutorum  
corpora et-  
iam perti-  
nent ad A-  
natomen, &  
quædam  
illa.  
Sub finem  
lib. 1. de par-  
tibus animal.



salubriter canina caro esitatur, vt quondam apud Romanos *refte Plinius lib. 28. cap. 4.* si eam probet *Hippocrates lib. 2. de dieta, & lib. de morbis internis*, lienosis prescribat. si *Galenus lib. de attenuantiis, vltius ratione cap. 8.* carnes vulpis & canis iisdem viribus pol- lere credit, qui ambo temperamento sicco præditi sunt, non video qua ratione sulpe- ra nobis esse debeat canum dissectio. Adde quod *Hippocratem* defectu cadauerum humanorum, canes dissicuisse probabile est, quum scripsit *lib. 6. Epid. sect. 4. pars. 7.* Quia habet cani similia, maiora autem, &c. Hæc *Hippocratem* emendicentis causis in- seruasse, quæ ad secandorum corporum præcepta pertinent, notauit *Galenus in Com- mentariis.*

Sed vtrum ab hominis vel bruti corpore inchoanda sit *Anatome*, controuertitur. Ma- uult *Syluius Tyronem* in folis hominis partibus primùm exerceri, dein de scientia partium hominis consummata, in aliis animalibus colludere permittit. *Carulus Ste- phanus* censet in solo Homine discendam esse *Anatomem*, licet enim Simia multas ha- beat partes humanis similes, & porci aut canis viscera à nostris parum differant: ta- men *simia*, vt dicitur, *semper est simia*, vetiùsque mihi videtur corporis humani par- tium formam imitari, quàm eas exactissimè referre. Quapropter existimo, aliorum animalium homini in multis similitum corpora rescindere superuacuum, cum illa ratione animæ ab humano corpore longè differant, *authore Galeno*. Tota igitur via mihi aberrare videntur, qui in cadaueribus animalium, diuinam hominis consti- tutionem atque artificium explorant, res planè eo indigna, qui se Anatomicum pro- fectur. Nam partes omnes hominis, longè absolutiores & perfectiores sunt, quàm be- stiarum: etiã mihi simias proposueris, in quibus prima placuit veteribus exerci- tatio, vt eùm musculos vellent tradere, Simias ad hoc deligerent. Contrà, *iusus E- phesus lib. 1. cap. 2.* ab animalibus exordium esse fualet. Ante omnia, *inquit*, vt in- teriora appellanda sint, animal quoddam hominè quàm similitimum dissicantes, in- struere conabimur. Nihil enim impedit, tametsi non omnia omnibus similia sunt, quo minùs mammam falcem cuiusque doceamus. Quinetiam *Aristoteles* asserit, inte- riora corporis in bruto longè melius inspicì, quàm in homine. Cùm tamen alibi à se- ipso dissensiat, & ab homine rudimenta Anatomica sumenda esse consulat. *Lib. 1. de hist. animal. cap. 8.* Incipiendum, *inquit*, ab hominis partibus. Nam quemadmodum nummos exploramus, vnumquemque conferendo cum eo qui nobis notissimus est, ita in aliis quoque agendum est. Atque homo inter omnia animalia nobis necessariò notissimus est. *Idem cap. 10. lib. 2. de partib. animal.* primùm de homine discendum, quia animal præ cæteris diuinitatis participes, tum quod exteriorum eius partium forma notissima est. Huius repugnantiæ facilis erit concordia ex ipso *Aristotele cap. 17. lib. 1. de historia Animalium*, vbi scribit hominis partes externas nobis notas esse: id- eoque ab iis inchoandum. Interiores verò eùm sint ignotæ, eas ad aliquum anima- lium partes relatas, quibus eum habent naturæ affinitatem contemplari oportet. Idcirco *Aristoteles librum primùm de hist. animal.* dicitur hominis partibus externis expli- candis, internas ex brutorum inspectione repetendas esse monet.

Nos verò dicemus ad conciliandam hanc controuersiam, *Theoreticam Anatomem* de hominis, non bruti corpore tradi debere, *Altiã* verò *Anatomem* ab animalibus ex- ordiendam esse, quò teniores animi, humanorum cadauerum inspectionibus affue- scant, & anequam ad eorum confectionem accedant, rudem aliquam partium cog- nitionem consequantur, & manus in discendo expeditam & exercitatum habeant. Quamvis *Galenus* propter exercitationes Anatomicas in brutis à *Vesale* castigatus fuerit, ipse tamen confitetur se tyrones instruere solitum in cane vel agno, *libro 3. suæ Anatomies capite vltimo*. Similiter forsan *Galenus*, vt homines formidolos paulatim corporibus se candis affuefaceret, animalia rescindebat. Verumtamen in his non ef- fè consistendum monet, sed si prius in simiis instructus fueris, vbi postea in homi- nem cadauera incidere facile cuncta cognosces, & discrimina notabis. Nam vt alibi notat *lib. 2. de comp. sit. medicament. per genera, cap. 2.* si frequenter in simiis, cuiusque parvis frum, & magnitudinem inspexeris, in humano corpore singula statim inue- nies; aliqui si in exercitatus accedas, non plus inde proficies quàm Medici, qui bello Germanico barbarorum corpora dissicantes, ea tantum didicere, quæ eoqui intelligunt. Idem repetit & fusiùs explicat *lib. 3. Aduio. Anat. cap. 5. & lib. 2. cap. 2. eiusdem operis*. Vt ossium figuram cognoscas, Simias deligito quæ ad hominis figu- ram proximè accedunt, quippe si hoc pacto instructus in humanum cadauer exlic-

An à bruto-  
rum corpo-  
ribus, vel  
homine in-  
choanda a-  
natomica  
rudimenta?

catum postea incidas, facillè omnia cognosces & memineris. Dico iterum *Galenus* diuersa animalia dissectuisse, non quod ex his structuram hominis melius & perficius cognoscere speraret, sed vt illorum differentias ab inuicem obseruaret; quæ de re passim *Commentariorum* pollicetur, sed nunquam colices, pulices, aliaque id genus minuta animaleu'sa dissectare aggressus est, quæ autem repunt, quæmadmodum mustelæ & mures, tumque conuolutim serpunt, veluti serpentes, multa quæ uiuum generâ & piscium incidit: vt persuasum haberet, & vnam esse mentem quæ hæc formet, & motibus animantis corpus esse peculiare, ex *Galeno*.

## AN VIVVM HOMINEM SECARE SIT necessarium, & liceat.

### CAPVT XI.



**D**IXI Anatomes subiectum esse corpus Viuum, & Mortuum; Vtrumquædam perfectionem Anatomies cognitionem summè necessariam *Galenus* existimat, lib. 9. *Adm. Anat. cap. 1.* Quia in cadauere sola partium organica constitutio spectatur, in viuo actio, & eius inueniendæ ratio deprehenditur. Quodnam debet præcedere? Mortuum, *Galeni* iudicio, vt prius omnes partes agnoscas, quàm in viuo earum vsum & actionem explorares. Etne necessarium incidere viuorum hominum corpora, eorumque viscera perferutari? Id nonnulli probant, longèque optimè fecisse *Herophilum*, & *Erasistratum*, qui nocentes homines à regibus è carcere acceptos, viuos incidunt, considerantque etiam spiritum remanente, ea quæ natura antè clausisset. Neque esse crudele (sicut plerique proponunt) hominum nocentium, & horum quoque paucorum suppliciiis, remedia populis innocentibus sæculorum omnium quæri. Sic *Mithridates*, & *Attalus*, omnium ferme simplicium medicamentorum, quæ venenis aduersabantur, sedulo vim experti sunt, in illis hominibus qui morte damnati erant, teste *Galeno*, lib. de antidotis, cap. 1. Et Romani Pontifices Christiani flagitiosis hominibus patibulo destinatis, venena propinari permiserunt, vt antidoti cuiuspiam vim & facultatem experirentur. *Ludovicus II.* Galliarum Rex permisit *Medico Parisiensibus*, militem capite damnatum, & calculo laborantem, viuum in perinæo secare, vt calculi vesicalis extrahendi modum perquirerent, quod factum fuit anno salutis 1474. mensè Ianuario. Ex libro 2. *Pauli Diaconi* anno 24. impetij furentis impij ac scelesti *Constantini*, comprehensus est Christianus, qui primus Scaurorum effectus est quem apud sanctum Thomam manibus & pedibus detruncantes, adduxere Medicos, qui hunc viuum inciderunt à thorace pubetens ad hominis cognoscendam positionem, atque structuram, & sic eum tradiderunt igni, quod refertur in *Diario Ecclesiastico sanctorum Medicorum à Molano edito*.

Id factum à  
veneribus.  
Apud Cel-  
sum præ-  
sum opor-  
et.

Apud Ma-  
thæolum cõ-  
ment. lib. 1.  
& Dissect.

Necesse illud  
atrociter.  
Ex Celso  
loco citato.

Alij contra crudele censent, viuorum hominum ælium atque præcordia incidi, salutis humanæ præsidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre: cum præsertim ex his quæ tantà violentiâ quærentur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam non sine scelere. Nam colorem, læuorem, molliorem, duritiem, simili quæ omnia non esse talia inciso corpore, qualia integro fuerint, quæ cum corporibus inuolutis, hæc tamen metu, dolore, inedia, eruditate, lassitudine, mille aliis mediocribus affectibus sæpe mutantur, multò magis verisimile est interiora, quibus maior mollior, lux ipsa noua sit, sub grauissimis vulneribus, & ipsa trucidatione mutari. Neque quidquam esse stultius, quàm quale quidque viuo homine est, tale esse existimare moriente, imò iam mortuo. Idcirco concludit *Celsus* incidere viuorum corpora, & crudele, & superuacuum esse, mortuorum corpora discentibus necessarium. Nam positum & ordinè nosse debent, quæ cadauera melius, quàm viuos & vulneratos homo, representant. *Galenus* quoque lib. 2. de temper. viuos homines non esse dissectandos censet. Impia igitur & inutilis ista lætrocinantis Medici curiositas, quam vetant religio & pietas, maior in feris, quam in hominibus: quæ nonquam nisi in dispar genibus æuiunt. Parciat cognatis maculis simi-

lib. 1. Apud Senecam lib. 10. controuers. 5. Porcellus pictor Atheniensis accusatur læ-  
se Reipublicæ, quod viuum senem emisit ex captiuis Olympiis, quos Philippus vē-  
debat, quem deinde torerat & intersecerat, vt ad exemplar torti, Prometheus pin-  
geret. Idem de Michael Angelo pictore narratur, qui vt Christum crucifixum morien-  
tem depingeret, hominem torlit, & cruci affixit. Omnes Helieabalam & Iulianum  
Apolloniam criminantur, ob suam & fetinam crudelitatem, quam in viuos homines  
exercabant, vt ex visceribus adhuc calentibus futorum euntes captarent; In eu-  
ius tam immanis sceleris vindictam,ambo miserabili morte periere.

Præstat Galeni exemplo in brutis viuum *Anatomiam* administrare, in quibus eadem  
quæ in homine viuo, notari & obseruari possunt. Dissecuit Galenus capram grauidam  
& viuentem, vt ipsemet testatur lib. 6. Epid. Atque vt demonstraret vocis instrumen-  
ta in viuis animalibus, hircos, & porcos accipiebat, lib. ad Præf. Idem caput viuē-  
tis animalis aperuit, vt motum cerebri, & sensum membranarum spectaret. Mo-  
tum Cordis, & arteriarum, pulmonum, actionem ventriculi & œsophagi in viuē-  
tibus animalibus obseruauit, nullusque adeo curiosus fuit, *Anatomia* vna, atque  
Galeni, vt hinc faciunt eius *obseruationes innumerae*. Non possum non detestari feti-  
nam Valsy, & Iacobi Carpenis crudelitatem, qui viuos homines dissecarunt. Id  
negat Iulium à Vesilio Crato in Epistola, nam voti soluendi, non sceleris expiandi  
causa, in Indam & Palæstinum profectus fuerat. Itineris illius Palæstini aliam cau-  
sa à priori, clarissimus Præles, Iacobus Augustus Thuanus, lib. 74. hist. sub an-  
no 1511. Ex Epistola viri doctissimi fama est Vesilium esse mortuum: audiui illi pro-  
culdubio cum profectum esse Hierosolymam, causa illius peregrinationis est mirabi-  
lis, vt ad nos ex Hispania est perscriptum, commissus fuit cura eius quidam vir no-  
bilis in Hispania, quem cum obiisse exultimaret, nec satis percepisse causam morbi  
sui videretur: petuit à propinquis defuncti, vt sibi liceret eadauer dissecare: concess-  
um est ei quod petebat, cumque pectus aperuisset, reperit Cor adhuc palpitans. Cog-  
nati mortui non contenti cum seculare factæ cordis, accusant etiam impietatis apud  
Inquisitionem, exultimantes sibi seueroiorem vitionem consequuturos, cum consti-  
ret de corde, nec facile excusaretur error tam periti Medici. Voluit omnino Inqui-  
situs de eo sumere supplicium, vixque potuit Rex sua auctoritate, vel potius suis  
precibus, eum periculo tanto eripere. Tandem concessus est Regi, & toti aulæ pro  
eo deprecanti, ea condicione, vt ad expiandum illud scelus proficisceretur Hiera-  
solymam, & ad montem Sinai. At Iacobus Carpenis cum esset infensus Hispanis, gemi-  
nos huius nationis ægros, laborantes lue venerea cepit, & viuos Anatomicis adimi-  
nistationibus delinavit, qua de causa in exilium relegatus Ferraria obiit. Fallopius  
lib. de lue Venerea. Verum tamen ipse Carpas comment. in Anatomia Mandini, detestatur  
& execratur hanc fructum secandi & aperiendi viuos homines. Tempore nostro,  
regni, non sit Anatomie in viuis, nisi tute à Medicis, vt mihi contigit interdum  
videndo apostemata, & secando vlcera, & trespando, & perforando membra,  
ubi cognoscuntur nexus membrorum, positiones & operationes: & longè melius  
cognoscuntur in viuis, quàm in mortuis, nisi præ immahitate desisteremus à ta-  
li opere. Cum autem quamplurima centena cadauera secuerit, vt ipse de se testat-  
ur, ob fructum secandi cadauera, cum id esset antea insolens & inauditum, viuis  
etiam non abstulisse creditus est, vt magis iniustus & exosus haberetur. Cederem  
potius patri Nonomensi succedere coactum fuisse, ob nefanda vitia, patrum Inquisi-  
tionis animaluestione digna, quibus suam *Anatomiam* conspurcauit.

An Vesilius  
viuos ho-  
mines se-  
cavit.

An Iacobus  
Carpas id  
fecit?

AN VETERES ANATOMICI,  
præsertim Galenus, humana cadauera  
dissecuerint.

## CAPVT XII.

**N**on erit alienum obiter inquirere, si veteribus humana cadauera secare licuerit, vt constet de veritate scriptionis antiquæ, & à calumniis recentiorum, vereres Anatomicos, præsertim Galenum, libereamus. Non est dubium olim summam penuriam & raritatem humanorum corporum fuisse, quia præcis sæculis cadauera quamprimum rogo imposita cremabantur. Quineriam etuci vel patibulo suffixa, lex *Mosis* intra biduum, aut triduum inhumari, vel aduri iubebat, aut etiam eodem die, vt habetur *Deuteronomy cap. 12.* quæ consuetudo cremandi corpora illico post obitum, introducta fuit apud Romanos, temporibus *Mary & Sylla*, lara lege ob bella ciuilia, ne quis sciret in mortuos, Propterea non licebat habere cadauera humana ad vsum Anatomicum. Deinde cetum est olim horrendum fuisse morticina tractare, ob eamque causam *Vespullones & Coriarios* vrbe summos. Parsi ratione *Romanos*, atque etiam *Rhodos, carnificem*, vt homicidam, ciuium sanguine & eade cruentatum vrbis domicilio priuasse: adeo molles erant Romani, vt ne quidem supplicia in media vrbe sumi tolerarent. Scribit *Iosephus* ab *Hebrais* lege cautum fuisse, vt qui mortuos custodissent, septem dierum spatio segregarentur, ne mala contagione populus contaminaretur. Hinc consuetudo illa, quæ notatur à *Virgilio* in exequiis *Miseni*, & *subiectam* more parentum, *Aneris* tenere facem. Apud Græcos inuisti & exossi atque infames erant, qui corpus mortuum tetigerant. *Enripides in Iphigenia Taurica.*

Veteribus  
horrendum  
fuit mori-  
entis tracta-  
re, & videri  
ta humana  
inspicere.

Si quis nascentes eade conspiceret manus,

Corpusque tangat mortuum, aut puerperam,

Altarihus seu impium prohibet fuis.

Lex memorabilis extat *Numerorum cap. 10.* qua humani cadaueris tactus *Iudeis* interdictitur. *Habebunt hoc filij Israel & aduenæ, qui habitant inter eos, sanctum in re perpetuo: qui tetigerit cadauer hominis, & propter hoc septem diebus fuerit immundus, aspergetur ex hac aqua die tertio, & septimo, & sic mandatur. Si die tertio aspersus non fuerit, septimo non poterit emundari.* Quapropter apud veteres adspici humana exta nefas habebatur, auctore *Plinio, libro 28. cap. 2.* Quia fieri non potest, inquit *Aristoteles, lib. 1. de partibus animal. cap. ult.* Vt sine magno fastidio inspiciamus, ex quibus constat corpus humanum, vt sanguinem, carnem, ossa, venas & reliqua eiusdem generis.

Nec pueros coram populo *Medea* trucidet,

Aut humana palam coquas exta nefarius *Atreus.*

Ait *Ouidius, Eleganter Phocylides.*

Ὅν κατὰ ἀρσένιον διὰ νόσον δι' ἑσπέρην,

Καὶ τὰς δ' ἐν γὰρ ἐν τῷ αἵματι ἐς φάος ἔλθω,

Λίαντα δὲ τὸν αἵματι ὅτιον δ' αἵματι ἔλθω.

Non dissoluimus pulchram hominis harmoniam,

Etenim subito à terra speramus in lucem

Venturas reliquias defunctorum, quæ postea dy fient.

Lib. 1. Ex-  
tranag. tit.  
de Segulari.

Inter Christianos, *Papa Bonifacius octauus* barbarum & inhumanum iudicauit, peregrè mortuorum corpora exenterare, carnibusque spoliare, vt ossa lecta & terla in locum sepulture quem viui delegerant, commodè perferri possent. Credebant Medici istas dissectiones agere in odium corporis humani, vt *Tertullianus lib. de anima cap. 10.* & *D. Augustinus lib. 22. de Civitate Dei, cap. 24.* perperam existimarent. Quorum leue iudicium abunde refellit summus ille operum naturæ persecutor *Demo-*



non fuisset corporis humani dissectio, non ipse nos ad eam remisisset. Idem apertè testatur, *lib. de Ossium natura*, se ex hominis ossibus vertebrae hominis didicisse. Vultis locupletiora & antiquiora in hominibus celebrare testimonia? Desinant igitur oblatrare & maledicere *Galenum astringes*, suisque calumniis finem imponant. Nam iniuste *Galenum* accusant, quod numquam hominem incidere, & *Anatomen* non hominis, sed simiae tradiderit. Ex infinitis apud *Galenum* locis facile probarem, illum Simiam atque Hominem dissectuisse, arcamen solius hominis *Anatomen* descripsisse. Vnum atque alterum locum proferam. *Lib. 4. de usu part. cap. 17.* De ventriculorum multitudine, qui in ruminantibus animalibus cernuntur, non est meum agere, neque de ventriculo singularum specierum animalis, quemadmodum neque de aliis nutritionis instrumentis, scripsit enim de his omnibus *Aristoteles*. Quod si breuitas pulcherrimorum inuestigationem non moraretur, fortassis aliquando quod in ea speculatione desideratur, exequeremur. Nunc verò satis habemus, si solius hominis constructionem possumus ad vnguem exponere. Idem repetit, *lib. 9. eisdem operis cap. 4. & 9.* de numero lobarum hepatis, in aliis animantibus definire non est propositum, neque enim alterius cuiusque instrumenti ipsorum constructionem attingimus, nisi forte in homine explicando, eò inuicti fuimus traducti. Quod si morte intercepti non erimus, illorum etiam constructionem membrarum, quomodo nunc hominem dissecantes, aliquo tempore explicabimus. Alius locus exstat *lib. 12. de usu part.* Rursus igitur considera artem quæ animalia effinxit, ut in omnibus est æqua, et si proposuerim solius hominis constructionem explicare: fieri tamen sæpe non potest, etiam si maximè nolum, quin etiam rationis expertum structuram attingam. *Galenus* Romæ Elephantem mortuum dissectuit, ut proboscidis usum & structuram cognosceret, *lib. 17. de usu part.* Reprehendit *cap. 3. lib. 2. Admin. Anat.* eos qui *Anatomen* ex brutis animantibus ediscunt. Nec mirum si in confectionibus venarum maximè errent; quippe Cor & linguam bubulam incidunt, nescientes hæc ipsa plurimum ab humanis discrepare.

## ANATOMEN THEORETICAM ESSE & Practicam, & quam earum precedere debeat.

### CAPIT. XIII.

Medicina  
pue sunt  
partes, con-  
templatio  
& actio,



**S**CRIBIT *Aristoteles lib. 1. cap. 11. & 3 cap. 2. Politic.* In scientiarum & ætium traditione, quædam ad *uoluntatem* & *hæc*, quædam ad *uoluntatem* & *hæc* pertinent; inde *posteri* cuiusque artis & scientiæ, quasdam partes *Theoreticas*, alias *Practicas* esse voluerunt. In *Medicina*, quæ *Aristoteles* perhibetur à *Galenus*, easdem partes Medici constituunt & agnoscunt. Ex *Galenus* in *Definitionibus medicis*, Medicinæ duæ sunt partes summæ, *Contemplatio* & *Actio*. Antecedat actionem Contemplatio, siquidem considerare prius aliquid conuenit, deinde agere. Nam perceptio ratione constans exercendorum operum principium est, atque ut in *Oeconomia*, sic in *Medicina*. *Acquisitio* diuersa est ab *Usu*, & *Actu*, differt à *Philosophia*, Ex *Galenus lib. 7. Epidem. part. 1. 43. sect. 2.* Illud quidem est *ipsum* artis per theorematum consequentia, Hoc verò *ipsum* artis in particularibus exercitatio. Adde quod *Aristoteles lib. 12. Metaphysic.* scribit absurdum esse simul scientiam, & sciendi modum querere: similiter *cap. 1. lib. 1. de part. animal.* notat in omni contemplatione duos esse habitus, alterum vocat *Peritiam*, alterum *Scientiam*. In hoc *Peritia* consistit, ut sciamus modum versandi circa quamlibet cognitionem. Cum autem *Medicina* latè pateat, si quæ pars illius *Theoria* & *Praxis* constet, *Anatome* censetur, siquidem aliud est instar *Philosophi*, *Anatomen* ediscere, qui contentus est scire, quo fine & usu partes nostri corporis conditæ fuerint, Aliud instar *Medici*, qui oculatâ inspectione & accuratâ sectione cuiusque partis naturalem structuram rimatur & explorat ad usum medendi, ut mutationes quæ in illis partibus accidunt, dignoscat. *Galenus Theoreticam Anatomen* distinxit à *Practica*. Nam *libris de usu partium*, *Theoriam* enarrauit, At *libris Administ. Anat.* praxim ac veluti manu ductionem descripsit, ut ipsi studiosi,





## ANATOMES DEFINITIO.

## CAPUT XIII.



T non licet aliculus ædificij compagem & structuram exactè cognoscere, sine partium dissolutione, inquit *Galenus, lib. de constit. artu, cap. 3.* ita non potest humani corporis fabrica perfectè cognosci, sine illius dissectione, quam Græci *ἀντομή* indigent, ac si diceret accuratam & repetitam sectionem. *Galenus* definit *Anatomen*, in definit. *Medicæ Abditarum partium speculationem*; reprehenditur tamen à *Fallopio & Volcheri*. Primum, quod actum incidendi excludat, qui caput artis est. Deinde quod externas partes negligere videatur. Contrà, existimo *Galenum*, per abditas partes, eas omnes intelligere quæ cute operiuntur, quarum consideratio *Anatomen* constituit. Externarum verò partium noticiam, quæ sine sectione comparatur, ad *Anatomen* non pertinere *Galenus* existimavit. Internas autem partes quæ cute detracta conspiciuntur, exactè scire consulit, *lib. 2. Adm. Anat. cap. 2.* quoniam earum cognitio, externis partibus utilior est. Iniquè adhuc arguitur *Galenus*, quod dissectionem prætermiserit: quum hanc supponat nomen *Anatomes*. Id enim significat accuratam & repetitam sectionem. Præterea *Anatome* potissimum perquirir partium actiones, ut ex earum vitio morbos dignoscat. Cuti autem nulla est actio, nec eius affectiones solitarie egent Medico, quia sponte sanantur. *Tarpidines* vocat *Hippocrates*, non morbos. Itaque varias cutis appellationes pro ratione locorum scire, parum interest Medico. Sicque interpretor locum *Galenus*, ab omnibus atro lapillo notatum. *Anatome abusivè* dicitur externarum corporis partium enarratio, quæ verbis illarum appellationes percipit, propriè verò *Anatome* interiorum cum sermone explicata dicitur. Siquidem oculis eas indicatas esse, *Anatome* non est: sed cuiusque noticiam ex sermone ac verbis accepisse, & quomodo naturales actiones obeant didicisse: Præterea, quam invicem coniunctionem ostensa, aliæque partes per venas habeant. Si minus placeat *Galenus* definitio, hæc videtur omnibus suis numeris absoluta. *Anatome* est pars *Physiologia* corporis humani, quæ per artificiosam sectionem, partium Conformationem, Actionem & Usum docet, ad earum conservationem. Nomen *Physiologia* retinui, quoniam *Anatome* est pars *Physiologia*, ut ostendit *Galenus, lib. 2. method. med.* eum scribit venas, nervos, & arterias esse elementa eius *Physiologia*, quæ tractat de homine. Dissectionem adiunxi, quamvis latius pateat Theoretica *Anatome*, quàm Practica. Nulla enim dissectionis in partibus externis. Addidi Corporis humani, ut distingueretur à *Physiologia* elementorum, humorum, &c. Forma definitionis est cognitio partium, quæ in earum conformatione, actione, & usu consistit. Finis *Anatomes*, partium cognitio, relata ad earum conservationem in suo naturali statu. Ut de earum statu non naturali iudicet Medicus: hanc definitionem Theoreticæ parti magis quàm Practicæ convenire si quis putet, sic definiam Actionem *Anatomen*, investigationem structuræ partium corporis humani, per artificiosam sectionem. Hanc definitionem latius explico; nomine *structuræ*, intelligo partis compositionem. Partem autem componit substantiæ proprietates, quæ facit, ut hæc pars ab altera differat. Substantiæ proprietatem cognoscimus ex his quæ consequuntur necessariò, ut sunt colores, durities, molliities; atque ab his quæ necessariò accidunt, cuiusmodi sunt situs, magnitudo, connexio, conformatio. Structuram verò humani corporis inuestigat *Anatomicus*, quia suæ artis subiectum est proprium & adæquatum.



## DIVISIO ANATOMIÆ IN suas species.

### CAPVT XIV.



NATONÆ pro ratione partium, quæ corpus nostrum constituitur, diuiditur in *Osteologiam*, & *Sarcologiam*. Hæc sub se comprehendit *Myologyam*, *Angiologiam*, & *Splanchnologiam*: In his tota Anatome consistit. Rursum respectu vario in certas species distribui potest, quæ omnes apud *Galenum* obseruare licet. Etenim ratione doctrinæ diuiditur in *Physicam* & *Medicam*: Quippe aliter *Physicus* Anatomen edidit, aliter *Medicus*: *Iste* structuram partium contemplantur, vt nihil frustra ac temerè à natura fidem demonstraret & intelligat. At *Medicus* partium vsus & actiones inquirat, structuram quoque diligenter explorat, vt io medendi sciat, quid læsam & affectum fuerit, ad conseruandam & restituendam hominis sanitatem. Ex operatione mentis & manus, quæ iam est Anatome *Theoretica*, alia *Practica*, vt iam demonstratum est ex *Aristotele* & *Galeno*. *Illa* comparatur mentis operà, lectione & auditu, hæc manus exercitatione, & oculata inspectione. Illa vsus & actiones partium meditatò examinât, hæc solam partium structuram exactius inuestigat in cadaueribus sanis & ægris. Respectu artificum cuiusque scetæ diuiditur Anatome in *Empiricam* & *Dogmaticam*. *Empirica* fortuiti vulneris occasione utebatur ad cognoscendam partium conformationem, idcirco *Servilis* & *Vulneraria* vocatur à *Galeno*. 3. *Administrationum Anatomicarum*, & in *descriptiis Medicis*: At *Dogmatica* Anatome animalia cuiuscerat, & adhibito studio & exercitio, singula quæque rimatur ad vsum Medicum. Ratione subiecti distinguitur *Anatome*, in *Humanam*, & *Beuam*. *Humanam* voco quæ humana cadauera fecat, *Beuam*, quæ in reliquis animalibus occupatur. *Vtramque*, *Galenum* & *reteres Medicos* exercuisse suprà demonstratum est. Ex conditione subiecti diuiditur Anatome, in *Viuam*, & *Mortuam*: *Viuam* dicitur, quæ in viuo animali celebratur, *Mortua* quæ mortuum animal incidit; vtrumque corpus ad perfectam Anatomies cognitionem summè necessarium esse suprà iam expositum fuit. Rursum *Mortua Anatome* vel celebratur in corpore sano, vel ægro, vi morbi pereunte. Hæc autem administratio hominis morbo enecti tantò vtilior est, quantò pars hæc Anatomiz ignotior est: sed ad causas morborum dignoscendas maximè idonea, & ad conuenientem remediorum vsus explorandum aptissima, quam in vsum reuocari à Medicis, suadent & exoptant *Eustachius*, lib. de *Reuibus* cap. 45. & *Dodonæus*, *Præfatione suarum Obseruationum*, *Marcellus Donatus*, lib. 4. de *Historia Medica mirabili*, cap. 3. *Aegyptus* regibus erat studii scrutari corpora mortuorum, & causas valetudinum oculata fide recognoscere, ait *Plinius*, lib. 4. cap. 1. Hanc Anatomen videtur agnouisse & approbasse *Aristoteles*, lib. 3. de *partibus animalium*, cap. 4. In dissectis animalibus, quæ morbo vituli quæ pereunt, affectus morbosus in Corde conspiciuntur; hæc est Anatome, quam desiderat *Franc. Baconus* de *Verulamio*, lib. 4. de *argumentis scientiarum*. Atque vnam isthæc *Anatomie* exerceretur In cadaueribus hospitalium, ad morborum cognitionem & publicam vtilitatem, ea conditione, vt quæ diligenter obseruata essent à Medicis Nosocomij; fideliter attestata ab aliis Medicis & Chirurgis præstibus io *Anatome* versatis, quotannis in *Commentariis* redigerentur, Instat *Diarr.* Istud esset verum *Collegium Anatomicum*, cuius est *Latetia* magna opportunitas & commoditas, cum In *Nosocomio Parisiensi* bis vel ter mille ægroti quotidie reperiantur. Sed Medicus non affectet in familiis secare cadauera eorum, qui febre maligna, aut ardente interire, nisi certa sit alicuius partis corruptæ coniectura, ne si labes in parte aliqua ab eo designata desit, accusetur Medici inscitia; & diffametur præsidia, quæ multis fuisse salutem, quoniam in eiusmodi febribus, potius *spiritus*, siue *calidum unatum* corrumpitur, quàm substantia partium. Præterea tunc peius & angue viter cadauera eorum, qui peste interire, (quorumvis *venenum pestilens* molli credant extinctum) ne postea contagio lædatur. Ratione finis, quædam est *Anatome Utilis*, alia *Superflua*. Vilem appellat *Galenus*; quæ tantum eas partes inuestigat, quarum cognitio rei Medicæ maximè conducit.

*Inutilem* vocat, quæ minutissimas quasque partes persequitur, veluti si quis scire vellet, quot sunt numero muscoli linguæ, & laryngis, & quales, & propter quid ita constructi: vel si quid cartilagineum, vel osseum in Cerebro contineatur. *Galenus* *Anatomen Sophisticam* nominat, quæ in quæstionibus & controuersiis tota vertitur, quam tamen non esse negligendam monet, vt *Sophistarum* arrogantiam tetundamus. Ex modo faciendæ Anatomies diuiditur in *Particularem*, & *Vniuersalem*. *Particularis* est, cùm pars aliqua à toto separata dissecatur. *Vniuersalis* est cùm Anatome totius corporis, ab umbilico ad vngues perducitur. Vtramque Anatomem *Galenus* exercuit. Nam totius corporis, vel partis alicuius Anatomem administrabat. Sunt enim quædam partes quæ separatæ à corpore seorsim possunt demonstrari. *Galenus* de hac Anatome particulari, quæ fit in partibus à toto separatis, postremis libris *administrationum Anatomicarum* cgerat, vt ipse testatur, *cap. 1. lib. 4. eiusdem operis*. De musculis oculorum differere in huius *commentary* locum discretemus, vbi quomodo animalium particulas incidere oporteat edocebo, quas sine aliis, per se toto corpore exemptas intueri licet, cuiusmodi sunt Cerebrum, oculus, lingua, larynx, pulmo, Cor, Iecur, lien, renes, vterus, vesica, Testes, intestina, ventriculus. *Idem* *Galenus*, *lib. definitionum Medicarum*, inquit, per industriam constat ea sectio quam tradunt Dogmatici partium occultarum gratiâ, vel in viuentibus, vel in mortuis, vel lire totis, vel in partibus. Eandem sententiam profert, *lib. 9. Admin. Anat. cap. 1. Galenus* autem publicè, & priuatim Anatomem demonstrabat, postquam euulgasset libros *de vsu part.* in quibus errores veterum perfecit, suæque inuenta declarauit, tanquam impostor ab inuidis quibusdam accusatus fuit. Tandem, inquit, coactus ab amicis, publicè in magno auditorio multis diebus demonstrare coepi, me nulloquam falsa tradidisse. Verùm frequentius priuatas habebat exercitationes coram suis discipulis, quibuscum acroamatiæ loquebatur, suæque arcana libere communicabat, quæ aliis exteris denegabat. Quippenoluit etiam rogatus, Medicis Romanis, qui ad spectandum Cor Elephantis mortui conuenerant, *Officulum Cordis* ostendere; quod discedentibus Medicis, ipse suis discipulis indicauit. Ipse neruum recurrentem vocis instrumentum esse, Romæ publicè demonstrauit, præsentibus Medicis Romanis, & quamplurimis Philosophis, ex quibus nominauit *Eudemum*, *Philosophum* *Peripateticum*, *Alexandrum Aphrodisiensem*, *Adrianum* *Rhetorem*, *Demetrium Alexandrinum*, *Phanorinam*. His quoque publicis dissectionibus principes viros interfuisse memorat, *Flauium*, atque *Sergium*, viros Consulares, *Paulum* *Pictorem* *urbanum*, *Barbarum* *Imperatoris* *Lucij* *auunculum*, *Seuerum*, atque *Boethum*, qui tum Romæ Consulatum gerebant.

## FINIS ANATOMES EXPLICATVR.

### C A P V T X V.



**V**ANVS & inutilis esset noster labor, nisi aliquem nostræ actionis finem propositum haberemus. Finis autem nostræ Anatomies duplex à *Galenus*, *lib. 2. Admin. Anat. cap. 2.* statuitur, *Philosophicus*, & *Medicus*, artes enim omnes, inquit *Cicero*, *libra 3. de Orat.* aliter tractantur ab iis, qui apparatus artium tractatione delectati, nihil aliud in vita sunt acturi: Aliter ab iis, qui ad usum transferant: Ideoque *Philosophus* eo fine hominis structuram speculatur, vt perfectam sui ipsius notitiam consequatur, omniumque partium naturâ & actionem intelligat, & in omnibus singularem Dei prouidentiam agnoscat, suspiciat, & veneretur. Hoc *Opus verum nostrum conditoris hymnum, veramque pietatem* esse putat *Galenus*, *lib. 3. de vsu part. cap. 10.* maiorem quàm si plurimas taurorum hecatombas sacrificaueris, & altariibus thura, cassasque adoleueris. Alibi *libro decimo septimo de vsu part. cap. penult.* perfectissimæ *Theologia* verum principium constituit: cuius sacris cum initiari conuenit, qui totius Naturæ scientiam assequi desiderat. *Galenus* cùm videret Philosophos Romanos ineptè de *Vacæ* disceptantes, cuius propria instrumenta ignorabant, coactus fuit in hædis & porcis viuentibus coram *Boetho*, Romanorum Consule ea demonstrare, vt ipse narrat & gloriatur *libro de Præognitione ad Posthumum*. Meted igitur *libro de formatione fatus*, carpit & infectatur

szu ætatis Philosophorum incertiam, qui mundi rerumque omnium generationem docere proficiebantur, cum tamen sui corporis fabricam & compagem prorsus ignorarent. Idem exprobrat *Acellum lib. 18. noctium Atticarum, cap. 10.* hominibus libetis, liberaliterque institutis, quod ea quæ ad notitiam humani corporis pertinent, non cognouerunt.

*Deficiam, qui scit quantum sublimis Atlas,  
Omnibus in Lybia sit montibus, hic tamen idem  
Ignotus quantum ferrata distet ab ætea  
Sæculis, & calo descendit ydæmon.*

Princeps ingenij & doctrinæ *Plato* negat animæ notitiam posse comparari, nisi cogitanti nostri corporis structuræ: siquidē *Anima* in hoc corporis cingulum deiecta, suas vires exercere, suæque functiones obire non potest, nisi corporeis adiuta instrumentis. Idem in *Alcibi.* recitatio ex *Socrate*, quid sit hominis natura, post multa argumenta conclusit. Homo prius intelligat, quid ipse sit, si velit boni Philosophi, & Medici, & curatoris officium præstare. *Aristoteles* eos, qui *Anatomen* despiciunt, Philosophi titulo indignos censuit, sed volupras summa & iucunda, cum agnoscimus instrumenta, quibus ætio quoque iuuatur atque perficitur, eodem auctore. Nam si Pictor nos bene pñerit oblectat, cum animal scitè depinxerit: quantum vehementius Natura ipsa nos efficit voluptate, cum eius tam multa & varia animalia mirâ membrorum conueniētia, inauditaque narratione facta cernamus, ex *Galēo, præfatione in lib. Aristotelis de hist. animal.* Hæc omnia *Medicus*, ut *Philosophus* obseruat. Sed ut *Medicus*, accuratius singulas partes rimatur, earumque cognitionem ad artis opera omnino tria reuocat, morborum disquisitionem, futurorum præuentionem, & curationem. Neque enim possis eertè de affectu & parte affecta ferre iudiciū, neque morbo cōtrariis opponere remedia, ne quidem conuenientem victus rationem præscribere, teste *Hippocrate lib. 1. de dieta*, citra exactam corporis notitiam, quod cum probè intelligerēt prius Medici, suos pueros doctores medicis corporum dissectionibus exercebant, & omnibus Medicinæ partibus doctrinam *Anatomicam* inferebant, auctore *Galēo lib. 2. Admin. Anat. cap. 3.* Itaque scitè *Aristoteles, cap. ult. lib. 1. Ethicorum* scripsit, Medicum oculos & vniuersum corpus nosse debere, si velit perfectè mederi, *si pñerit in præfatione in lib. Aristotelis de hist. animal.* *Elegantiores Medici multum laborant in humani corporis cognitione.* Incipit meo iudicio dissecpant *Galenus*, siue *Capinactis* & *Minadus*, de *Anatome* vtili & inutili, & malè nituntur autoritate *Galēi, lib. 2. Admin. Anat. cap. 2. & lib. 7. de vñ part.* Non enim assequuntur mentem Authoris, qui passim aduersus *Sophistas* demonstrat, nullum corporis partem frustra datam, omnes ad vñ procreatas fuisse. *Medicus* quidem singulas partes contemplantur, ut sanas ab affectis distinguere possit: at nemo lingux, ossis hyoidis, laryngis musculum vulneratum, vel malè affectum discernere poterit. Proinde *Medici* non sunt necessarii: quos tamen non negliget, si ut *Physicus*, singularum partium vsus inquirat. Eodem sensu interpretor *Galēi* locum ab illis prætermisum. *Medi*, neque *Philosophi* exactam habere debent iugularium tumorum cognitionem. *Libro de dissect. vñarum.*

## QUALIS ESSE DEBEAT ANATOMIÆ studiosus.

### CAPVT XVI.



Vicemque *Anatomen* perfectè scire, & administrare desiderat, huic arti à teneris assuecere debet, *quod* in rebus *Anatomicis* requiritur. Testatur enim *Galēus, lib. 1. Admin. Anat. cap. 1.* in veteri *Astlepiadaram* familia, *Anatomen* pueris demonstrari solitam. Vnde sic eruditus *medicus* dicebatur, & in *commentariis lib. 1. de Officina*, scribitur quæ in hoc libro *Chirurgico* continentur, ad tyrones & discipulos pertinere, quoniam in *Chirurgia*, ut in *Anatome* pueros à teneris erudiebant, ut docet *Plutarchus, lib. de Stoicis repugnantiis*. Vtramque Medicinæ partem, *Anatomen* & *Chirurgiam*, à Medicis tractatam fuisse *Galēus* demonstrat, *commentarius ad particulam 23. lib. 1. de Articulis* *Hippocratis* sæculo opti-

me artis præcepta discabant, & præsertim quæ ad manus operationem pertinent: ea nunc à *Medico*, vel nullo modo discuntur, vel certè exiguuo temporis spatio. Qui pro uocata iam ætate *Medicinam* discabant, *anatomiam* dicebantur, laborè Anatomicum, quem in *anatomia* operibus subire oportet refugientes, *Theoria* sola contenti: Proinde cum viis absolutis communicari coepit *Anatome*, neglecta exercitatione, quam à pueritia ediscebant; tum ars sprete & contempta iacuit, inquit *Galenus*. Nam olim prius operandi modum discabant, quàm *Theoriam*, siue operis rationem, vt hodie fit in *Officiis Chirurgicis*. Idcirco *Hippocrates* discipulorum *Medicorum* duo genera constituere videtur: nimirum vt alij essent tyrones, qui in tyrocinio artis pueritiâ transigebant, tractantes *Chirurgica & Anatomica*, & herbariam. Alij prouecti, qui deposito *Empirici* tyrocinio, in corporis natura & affectionibus per sua signa cognoscendis exercebantur. Præterea, *quædam*, diligentia & firma corporis valetudine munitus esse debet *Anatomicus* studiosus, vt molestias & labores, quos in administranda *Anatome* tolerare oportet, patienter ferat. Debet etiam esse interpidus, nec larvis territarius, ne simile infortunium perpetiatur, quod *Phasilius*, Phocentium dux expertus dicitur, qui cum attentius sceletum æneum *Hippocrati* aspexisset, se similem factum somniauit; inde paulò post macie contabescens hominij cunctum compleuit. *Arist.* cap. vlt. lib. 1. de partibus animal. monet quod si rerum naturalium imaginibus delectamur, multò magis contemplationem earum rerum depictarum amare & exoptare debemus, quod de pictura *Daniel Furlanuzius* comment. suo interpretatur. Eleganter idem, lib. de Poetica, cap. 4. docet cur homines picturis delectentur, quia gaudent omnes rebus per imitationem expressis, signum huius rei est, quod Artificum opera quæ molestè cernimus, horum imagines exactissimè expressas dum spectamus, gaudemus, vt ferarum formas abiectionissimarum & cadauerum: Nec solum Philosophis iucundissimū est hoc modo discere, sed etiam rudibus & parum in arte exercitatis, ob id enim gaudent cernētes imagines, quia spectando discunt & ratiocinantur, quid vnuquodque sit. Doctorem secantem diligenter inspiciet & obseruabit, siquidem in *Anatome*, vt in *Medicina*, oculis magis credendum est, quàm opinionibus & libris, *authore Hippocrate*, lib. 1. de diat. Nugacem ex libris Anatomicis institutionem iudicauit *Galenus*, cap. 2. lib. 3. de compo. medicam. secundum genera, ei non ab similem, quæ secundum partem, ex libro gubernare docet. Quia si palam à præceptore ostensos in corpore nervos & tendines obliuiscuntur, nisi sæpius eos inspiciant: multò minus ex lectione poterunt ediscere. Sed *Aristoteles*, lib. de respirat. cap. 15. Lectione autopsiæ & auditioni videtur præferre, quomodo Cordis situs se habeat ad brachias cognoscere oportet, inquit ille, *medicus autem ipse in anatomia autopsiæ & auditionis inueniens*: quasi verò maior *autopsia* sit scriptoris, quam presentis inspectionis: an dicendum est scriptores idoneos non quidvis, nec quod scire vel aut iterum tantum didiscunt, sed sæpius & accuratè cognita scriptis mandasse, vt exponit ad hunc locum *Gesnerus*, suis in *Scholiis*. Inspectio in omnibus certior est lectis & auditis, qui enim litterarum monumentis confidunt, inquit *Plato*, sine rerum inspectione, sæpe falluntur, & opinionem potius quàm veritatem sectantur: *autopsia* ducenta adhibere debet, qui perfectè *Anatomen* scire desiderat, non Anatomicis libris credere. *Galenus*, lib. 2. de visu part. cap. 3. Naturæ rerum visatque maiestas, in omnibus momentis fide caret, si quis modò partes eius, ac non totam oculis complectatur, inquit *Plinius*. Inspectio autè vel est figuratiua tantum, quæ in chartis pingi solent, vel corporum tam hominis quam bruti. Pictura fallax est, & coloribus tam numerosis, præsertim in Naturæ æmulatione, ait *Plinius*, vix corporis superficiem repræsentat, tantum abest, vt interiora fideliter referat. *Pergula* pictorum veri nihil, omnia falsa. Si *Galenus* plantas pingi noluit, præfatus, lib. 6. *Simpl.* multominus permitteret partes nostri corporis picturâ delineari.

Quid se vana innans picta ludibria charta?

Adspice quod possis dicere iure, mecum est.

Etenim *Iconica Anatomie* multos delectat, & rudibus admiratione excitat, sed in istis imaginibus accidit, quod *Hippocrates* dicebat, *omnis hominum, animalium & rerum, multis miratur, sed pauci cognoscunt*, veluti *Æneas* scribit *Romana historia*. in clypeo sculpsi inspicies, Miratur, rerumque ignarus imagine gaudet.

*Laurentius*, quoniam picturas Anatomicas *Vesali* in multis erroribus, fallaces & imperfectas, typis æneis elegantioribus exprimi curauit, suorum operi Anatomico inscriuit, vt prodesse simul & delectare posset, imagines Anatomicas approbavit, atq. cōmendauit,



Etandæ Anatomie causâ, *cap. 1. lib. 2. Admin. Anat.* Ipsemet adhuc iuuenis, varias & longinquas peregrinationes terra-marique suscepit, vt sui temporis Anatomicos, in *Smyrna Pelopem*, *Corinthe Numesianum*, in *Alexandria Heraclianum* consuleret. Hodie extra *Lutetiam Parisiorum*, non modo in *Gallia*, verum & in *Italia*, *Hispania* & *Germania*, rarè sunt Anatomia, vixque cadauer vnum singulis annis suppediatur ad vsum Anatomicum: non quod desint scelerati homines, suspensiosi, furciferi, sed qui ad remigium aut metalla damnantur. Imo, certis locis crudelis & inhumana censetur *Anatome*. Quæ cum temporibus *Vesalii* è tenebris quibus obruta & sepulta erat, in lucem reuocaretur, *Carolus Quintus Imperator*, rei nouitate motus, quæsiuit anno 1556. ab Academia *Salmanticensi*, liceretne Medicis Christianis humana cadauera secare? cui responsum fuit, id Medicis utile ac necessarium esse; ac proinde debere permitti. Quam igitur felix Academia *Parisiensis*, quæ ortum & lucem huic art i dedit, & ceteris liberaliter per suos professores *Fernelium*, *Guinterium*, *Vassum*, *Sylvium*, impertit: quam fortunata Academia, cui nullum cadauer ad *Anatomiam* denegatur, ita vt decem vel quindecim semestri spatio suppetant, vel concedantur.

*O Felices agricola, sua si bona norim!*

Tandem Anatomie studiosus manum operi admonere debet, vt singula quæque accuratè percrutetur, ne semper ex alienis oculis & manibus pendeat. *Galenus* consulit ei, qui rerum Anatomicarum desiderio tenetur, manum operi adhibere, vt ne quidem propriis manibus ipsam pellem auferre pigeat, *cap. 3. lib. 1. Admin. Anat.* Id e monet in vnaquaque arte oportere primum *exercitium*, deinde operi manum ad mouere, *ut in cithara*. Habitum in dissecando exercitatione longa sibi comparabit. Etenim ita, quæ manu tractare conuenit, priùs assuescere oportet, ac perpetuò manum operi ad mouere, inquit *Hippocrates*, *lib. de Flatibus*, & post eum *Galenus*. Quemadmodum citharædus assidue citharam pulsando, facultatem pulsandi sibi comparat, sic Anatomia studiosus assidua corporum sectione secandi peritus euadet; quoniam ad facultates comparandas necessarius est vñs atque exercitatio, quæ ab innata facultate proficiuntur. Præcedit enim quamlibet operam facultas, vt docuit *Aristoteles*, *lib. 9. Metaph. 1. cap. 3.* Sed operam imperfectam facultas consimilis quæ deinde assiduo vñs perficitur.

*Nec te pariteat dextram trivisse secando,*

*Hæc eadem vt sciret, quid non faciebat Amyntas.*

Sunt igitur quinque conditiones, quas requirit *Galenus* in discipulo Anatomie, *modestia, quiescentia*, assiduitas, locus, & exercitatio. Præterea debet esse *Pius & Misericors*, dum vacabit operationibus *Anatomicis* in corpore hominis, qui est omnium animalium nobilissimus, & eiusdem naturæ consors. Meminerit se mortalem esse, forsitan breui moriturum, quo tempore ipsius cadauer erit *teluris inutile pondus*: Propterea nihil iocosum in contemptum & ignominiam miserrimi olim viuentis, pronuntiabit, neque partes mulieris aut viri, quæ turpitudinem habent inuereconde tractabit, & per ludibrium ostentabit, neque cum lascitiâ & obscenitate verborum exponet, quamvis *Musa Sacra* valde pudica; seriis iocosa quædam immiscere soleat. Carnes verò diuinas & auillas diligenter conferuabit, ne à canibus, aut felibus deuorentur, neque viscera, & interanea in profluentem proiciet, sed cuncta diligenter collecta, post absolutam Anatomem exossati cadaueris reliquias terræ sanctæ mandabit, cum piis precationibus & supplicationibus ad Deum, vt parcat eius animæ, corpusque reddat ætemæ gloriæ & beatitudinis particeps in resurrectione mortuorum.

## CONDITIONES DOCTORIS

Anatomici.

## CAPVT XVII.

**D**EMOCRITVS solertissimus operum naturæ perscrutator, cum assidue secandis animalibus occuparetur, indicatus fuit infans ab *Acheris*, qui miserati sortem hominis, aduocauit *Hippocratem*, ut illi medicinam faceret, mentemque alienatam restitueret. Rogatus accurrit, & offendit *Democritum* animalia secantem, quo spectaculo mirum in modum oblectatus, omnes *Abderitas* insanire pronuntiavit, solum sapere *Democritum*, quem ex *Anatome* sapientissimum iudicauit. Nunc autem multi *Abderitana* pectora plebis habent, quia priscum hoc sæculum *Abderitanum* nostræ ætate renouatum video, in qua despicitur & contemnitur *Medicus*, qui gnauiter rebus Anatomicis incumbit, & tanquam ille *Ægypti*, incisor condiendi cadaueris apud *Ægyptios*, exosus habetur, sic apud nos *Anatomicus*. Elegans extat historia apud *Diodorum Siculum*, lib. 1. *Bibliothecæ*, quam hic atterere non erit inutile, nec iniucundum. Primus igitur qui scriba, *Ægypti* dicitur, deposito humi corpore circum illa sinistram latatus quantum inde rescandum sit, circumscribit, tum incisor, *Ægypti*, lapidem tenens *Ethiopicum*, ubi carnis quantum lex iubet, dissecuit, exemplū quanto potest cursu aufugit, persequentibus eum quorquor adfuit cum lapidum iactu & excretionibus, ac si placulum in ipsum auerterent; nam quicumque eiusdem naturæ corpori vim vulnūque, aut quoquomodo malum inferat, odio hunc dignum esse per suasum habent. Forsan eadem animi mollities, vel hebetudo plerosque detinuit, & ab exercitiis rerum Anatomicarum deterroit, quod sit alienum & indignum *Medicis*, nostris *Chirurgis* demandatum exercitium, vel potius desectum, magno nostræ artis detrimento, nostrique nominis infamia: quia nostris spoliis nunc onerati & ornati, palmam & gloriam faciendæ *Medicinæ* nobis audcēt præripere: nosque doctrinæ Anatomiciæ rudes ac prorsus expertes vbiq; proclamant, atque de dignoscendo tumore interno, vel dolore perueici primi consuluntur, vel cum *Medicis* in consiliū adhibiti, sepius nobis illudunt & imponunt. Ideoque nostræ gloriæ iactura, non aliunde quam ex *Anatomie* conceptu repetenda est. Cum enim *Medici* solum interhorū assilum curatiuam ad se pertinere autamantes, viderent dumtaxat cognitione contenti, assilum, musculorum, venarum, arteriarum notitiam velas ad se non spectantem neglexerunt, atque vniuersam *Anatomie* administrationem *Chirurgis* commiserunt, tum non solum vera viderent cognitione *Medici* periri, verum etiam discendæ industria profusa intercedi, eo quod scilicet hi resistentem non egredierentur, illi vero quibus manus artificum delegabatur, in dissolutum essent, quæ ut discitis professurum scripsit intellexerunt. Tantum abest, ut discant, ut artem manu ipsa traditam, ad hominum genus nobis affererent, quia patibis de nobilibus ritum in gymnasii introduxerit, quo alij hominū corporis sollicitam administrare, alij partium horarum enarrare consueverunt. Hi quidem gratularum modo, quæ nunquam aggreſſi sunt, tantum ex aliorum libris memorie commendati, descriptis præponunt, alie in cathedra egregio sultu occident. Hi autem adeo linearum imperiti sunt, ut dissoluta spectatoribus explicare nequeant, atque ex *Medici* præscripto ostendenda lærent, qui manu sessioni nunquam adhibet, tantum ex commentario natam, non sine supercilio erit. Tales oratores *Medicus* rideret *Galenus* si reuinceret, qui ad *Anatomen* manu & oculis dumtaxat opus esse scripsit. *Pamphilus* librum damnauit, quod ausus fuerit, hebras describere, quas ne quidem per somnium viderat. Id genus hominum *Hierodides Tarentinus* præconibus assimilabat, qui formam ac notas fugitiui mancipij, licet ipsi nunquam viderint, præconio tamen publicant, quia notas ab illis accipiunt, & ceu cantilenas aliis proferunt, ut si forsitan is, quem proclamant, adlaret, nequirent innotescere. Proinde *Galenus* illos subannat, & grauius increpat, qui ex cathedra docent *Anatomen* absque encheirisi. Hæc in cathedra sublimis aliquis sedens, resere po



est suis discipulis, sed in operibus artis ipsos educere non potest, ut qui ipse prius omnes doctorum animalis instrumentorum particulas ignoret. Illis potius fidem adhibere oportet, inquit *Valerius*, qui omne suæ vitæ tempus huic studio impenderunt, quam iis qui tibicinum more ex cathedris, non visa canunt, sed quæ puerulus quivis libere oculos posito legere possit. Non est obscurum, teste *Aristotele lib. 2. Politic. cap. 6.* intetesse multum, ad hoc ut efficiamur periti, si quis operum ipse sit particeps, nempe impossibile est, vel certe admodum difficile, ut qui ipsa opera non tractat, perite valeat iudicare. Quapropter qui *Encheirismum* Anatomicam Medicum dedecere ac dedecorare censent, aut sunt nimium venustuli, si sanguine humano tinctas & inquinatas manus exhorrescunt, aut sunt contemplatores Medici, qui in abstracto res medicas considerant, parum solliciti de his, quæ in arte nostra præuere aut recte geruntur. Prudenter dicebat *Cato*, agrum pessimè multari, cuius Dominus quid in eo faciendum sit non docet, sed villicum audit. Fatuus quoque iudicatus fuit *Lucullus à Plinio*, quod hanc de se præfecturam seruo suo dederat, ultimoque probro manus in cibis triumphali seni deducebatur, vel in Capitolio epulanti: *pudenda res seruo suo facilius parere, quam sibi.* Quamuis Chirurgos habeamus ministros, vel potius Anatomici operis consortes, attamen ut Medicum possit illis imperare, prius debet longo usu & exercitatione manus attritas habere. Domini scientia est, per quam vitæ seruis, Nam Dominus est, non in possidendo seruos, sed in utendo seruis. Quæ enim seruum scite facere oportet, illum oportet scire iubere, inquit *Aristoteles, lib. 6. Politic. cap. 1.* At quomodo aliis agendi & operandi modum dicere & præscribere potest, qui nunquam operi manum adhibuit, aut aliquid nouum inuenire, si operationem auersecutur. Scitum est illud, *oculus Domini impingnat equum*, quod cum probè sciret *Astibac* Scytharum Rex, propriis manibus equum suum defricare non erubuit, miratus quomodo *Philippus* Rex Macedonum, bellum illi inferret, qui hoc opus deridebat. Nos vero Medici, tutelam hominis suscipimus, quem factum rectum, & immunem ab iniuriis, tam internis, quam externis tueri studemus ac enitimur. Cut ergo straturam hominis cutiose rimari & perferutari dedignamur? mortuum etiam hominem attingere, ut *Amenagor*, exhorrescimus; quasi vile & fordidum esset hoc ministerium, quod salutis humanæ causa suscipitur. Ut autem gratior est palchro veniens in corpore virtus, sic *Anatome* semper erit gratior & fructuosior, quam ab honestis & elegantioribus manibus tractabitur & administrabitur. Vberiotem messem refundeat tellus, cum arabatut vomere laureato, & triumphali manu; Nunc ab aggressibus culta, illorū votis & laboribus, indignata non respondet: sic *Anatome* vigeret magis atque splenderet, si cultores haberet Medicos, tum suas opes & arcana liberius & vberius expansura. Verum obiciet aliquis, in artibus non solum quæri oportere utilitatem, sed etiam animi liberalem quamdam oblectationem, quæ animos discuntium allicit, & ad amorem artis vehementer inflammat: At nihil magis operosum & fastidiosum, quam *Encheirismus Anatomicus*. Equis vnquam bonum aliquod sine labore & molestiis consequens est? qui nucleum esse vult, corticem frangat necessum est, quod quid pulchrius & utilius existit, eò maior difficultas obicitur in eo comparando. Sunt quædam artes, inquit *Hippocrates, lib. de Flaribus*, quæ artificibus & possessoribus suis multum laboris & molestiarum exhibent; illis verò qui fructus earum decerpunt & colligunt, iucundæ ac vtilis existunt. Ex earum numero est *Medicina*, sed inter partes *Medicina*, si quæ laboriosa sit, ipsa est *Encheirismus Anatomicus*, quæ tamen labore fructus vbertate & utilitate compensat. Nonnulli *Operationes Anatomicas* ideo reformidant & auerfantur, quod qui secandis cadaueribus humanis sedulo incubuere, ut *Vesalius & Fallopius*, in medio flore iuuentutis è viuis erepti fuerit, vel à maligna cadauerum exhalatione enecti, vel à Natura sui officij destructionem indignè ferente suffocati; crederem potius Anatomicos continuò secandis cadaueribus addictos, laboris assiduitate fatigatos, & oneri succumbentes, tandem fatiscere, & è viuis adhuc iuuenes discedere: Nam qui studet optatam cursu contingere metam studij Anatomici, multa tulit, fecitque iuuenis, sudauit & alit: Verum, inter Anatomicos *Democritus*, Centenarius decessit. *Fabricius ab Aquapendente* fermè nonagesimum annum attingebat, cum satis concepsit. Neque vos deterreat ab hoc honesto opere, quorumdam hominum ignauia vel potius inertia, qui vituperant in Medicum exercitium Anatomicum, quod potius laudatione & commendatione



dignum videtur. Nam in aliis invidiose solent tepechendere, quod præstare nequeant. Omnes nimirum ea quibus carent, quod in aliis fiat, vitio ut supernacanea vertant, inquit *Hippocrates, Epistola ad Dionysium.*

*Vel quia nil rectum, nisi quod placuit sibi dicant,  
Vel quia turpe putant parere minoribus, & quia  
Imberbes didicere, senes perdenda sateri.*

Consimiles sunt *Ephefius*, qui cum *Hermodorum* è ciuitate expellerent, significarunt proclamatione, *Nemo de nobis vnus exultat, sed si quis extiterit, alii fcedat, vel apud alios habitet: ex Strabone.* Calumniatores illi, similes sunt huic negatori apud *Platonem in Epistola*, qui *Socrati* scilicetanti, quid agerent in schola *Dionysii Grammatici*, duo adulescentes, mechanicis operibus intenti, ineptè respondit, *Nugari nescio que cegum subtilia, & quasdam Philosophas tractare.* Cui mox repositus *Socrates*, hominis imprudentiam demiratus, *en ergo turpe & inhonestum inuentus sis philosophari? Rondeletius* impetrata quiete ob ætatem iam ingrauescentem, moribque obnoxiam, minus fuit otiosus, quam eum otiosus erat. Nam cepit in *Monspelensi Academia* tractare, & contemplari diuinam & nondum omnibus planè perfectam corporis humani fabricam, vt de se testatur in *Prefatione libri de Viscibus & Iuheribus in Rondeletij vita*, narrat illum *Anatomen* priuatim & publicè maximo studio exercuisse, in eaque tantum professioe, dissectione propriis manibus faciendâ apprime delectatum, vt omnes qui de *Anatomie* scriperunt, facile superarit. Tradit *Felix Platerus* se *Anatomes* exercitium, familiare & consecretum in *Academia Basiliensi* reddidisse, & quinquaginta amplius humanorum corporum sectionibus manus adhibuisse, priusquam *Opus* suum *Anatomicum* in lucem conspectumque hominum exire permisisset. Omnes *Medici*, qui perfectâ & absoluta de rebus *Anatomicis* opera posteritati reliquere, *enchirij* *Anatomicæ* excreuerant, inter quos produco *Syluium*, *Vesalium*, *Columbum*, *Falsopium*, *Enschium*, *Arantium*, *Cotterum*, & hodie qui proficuntur *Anatomen* in celeberrimis Academicis, sunt omnes *Medici*, propriis manibus *Anatomica* tractantes. In *Academia Patantina Fabricius ab Aquapendente*, & eius antagonista *Iulius Cæsserius*, in *Neapolitana Iulius Iulianus*, in *Leydensi, Petrus Pannius*, in *Basiliensi, Caspar Bauhinus*. Vtinam apud *Medicine* studiosos tantum valeret oratio mea, quantum potuit apud *Adversarios Hippocratis* autoritas, facillè demonstrare eos omnes desipere, ac in luce *Medicina* excutire, qui neglectâ *enchirij* perfectam *Anatomes* cognitionem se consequi sperant & opinantur: Illos verò qui *praxim Anatomiam* cum *Theoria* coniungunt, *Medicis* peritiores ac eminentiores existere. Nihil magis *Galenum* Romæ commendauit, & omnibus admirabilem reddidit, quam *Anatome*. Hanc ipse propriis manibus excutibat, *Romani Medici* ostendens modum dissecandi, cum antea mote lanionum, *Anatomes* administrarent: Ac ne longius exempla petantur i vidimus nostros *Chirurgos*, priusquam *Anatomen* viderent, sibi que propriam fecissent, in arte sua rudes & ignaros, quam auxilio *Anatomes*, tam feliciter excolerunt & illustrarunt, vt nunc de sua perfectione, cum antiqua *Chirurgia* certare queat. Pudet me nostras clades, nostrasque damna referre, & ad imitandum eos proponere, quos habere debemus subditos, sed hæc exprobratio, incitamentum esse debet, ad restituendam *Anatomen* in antiquam possessionem, vt deinceps *Medicorum* manu tractetur, gauderique coltores habere *Medicos*. Quamuis enim videamus *Chirurgos* nunc *Anatomen* tractantes, eam sibi proprietariam fecisse, non est rament existimandum, illos in hac arte maiorem peritiam adeptos fuisse, vel vnquam adepturos supra *Medicos*, si mentem Romanis rebus *Anatomicis* adhibere velimus. Elige, inquit *Philosodorus, lib. de plantatione Noë*, quamcumque artem maiorem minorémve, & aliquem in ea insuauissimum: deinde examina, an præceptis artis respondeant artificis opera. Videtis hæc ab illis non exiguo, sed magno intervallo abesse: quandoquidem ferme impossibile est in quacumque absolutum esse, quod hæc fontis in morem vndabundæ varias contemplationum species ebulliant. Itaque possum *Chirurgi* & *Medici* actiones comparare, *Physici & Asiatici* actionibus, quales apud *Poëtam* Latinorum principem describuntur. *Physici* enim *Asiæ* obiciit.

---tibi dextera bella  
Vtilis, ingenium est quod eger moderamine nostra,  
Tu vites sine mentis geris, mihi cura futuri est:  
Tu pugnare potes, pugnandi tempora mecum

Quid. lib.  
11. Metamorph.

*Eligis Atrides: tu tantum corpore prodes,  
Nos animo: quantoque ratem qui temperat anteis  
Remigis officium, quanto dux milite maior,  
Tantum ego te supero: necnon in corpore nostro  
Pectora sunt potiora manu, vigor omnis in illis.*

Addam coronidis loco Luciani iudicium in Hippia, ubi monet non indecorum & indignum sapientis viro manus exercitum: eos ego sapientes cum primis laude celebrandos esse existimo, quicumque non orationes solum magna industria elaboratas, ac singulis de rebus memoria proditas posteris reliquerunt, sed operibus quoque non dissimilibus ea qua orationibus amplius & magnifice polliciti sunt, confirmarunt: ex mechanicis quoque eos laude & admiratione non indignos puto, quicumque visendis operibus aliquam ingenij famam subcompararunt, eademque opera artis sua egregia monumenta post se reliquerunt, quandoquidem illi qui solis orationibus se exercuerunt, multo iustius Sophistarum, quam sapientum appellationem meruerunt.

Sed satis superque demonstratum fuit, *Anatomicas operationes* non esse indecoras, nec indignas Medico. Nunc singulas Doctoris *Anatomici* condiciones persequamur: hic enim plurimis dotibus instructus esse debet. Imprimis *Anatomen* assidua librorum *Anatomicorum* lectione, & diligenti cadauerum inspectione, atque dissectione propriis manibus administrata perfecte sciet; quam Auditoribus suis non tantum verbis enarrabit, sed etiam manu propria demonstrabit. *Hippocrates* passim reprehendit Medicos, qui in circularis & coetibus hominum imperitorum de *Medicina* multa loquuntur, deblaterant & effutiant, sed cum ad opus medicum ventum est, coram peritis artificibus, suam imperitiam & ignorantiam aperte declarant. Prudenter *Aegypti* linguæ oculum subiiciebant, & manum tenentem linguam depingebant; ut si significarent in omnibus artibus præcepta prius tradi debere, deinde usu & exercitatione confirmanda esse. Manus linguam tenens indicabat, non solo sermonis & cogitationis termino artes contineri, sed actione potissimum perfici. *Gregorius Nyssenus lib. de officio hominis*, propter sermonem homini manus datas fuisse scribit. Eleganter *Plato in Phædro*, narrat in mundi diuisione, *Vulcano* & *Mineræ* eandem sortem obtigisse: quod significatur, nunquam à *Praxi Theoriam* seiungendam esse. *Athenis* præ foribus positum erat, matrimonium *Polladis* & *Vulcani*, ære expressum iquod denotabatur, artes omnes non tam meditatione, quam ignis artificio, & manuum operatione inuelligari. Nunc autem periti habentur *Anatomici*, qui in scholis de suggestionibus, nullo repugnante, apud imperitos cum admiratione & applausu multa effutunt. Similes sunt *Theophrasto*, qui in alto throno sedens, à *quodam atheniensi*, inter blennosos homines, ut *Cercidas* ait, in præcio erat, inquit *Galenus, lib. 6. Meth. cap. 3.* Inepti sanè & ridiculi, qui ea quæ non nouerunt, confidenter doceant, & impudenter ostentent. Hi plures quæstiones agitant, totamque *Anatomen* sua loquacitate dubiam & controuersam faciunt, reliquæ *Encheirisi*, quam vilem abiectionemque putant: Sic omnes videri potius, quam esse docti cupiunt, nemine veritatem ipsam, sed tantum scientiæ famam querente. *Galenus* reprehendit Medicos, qui in *Anatome* potius ad disputationem se conuertunt, quam ad studiosam dissectionem; & cum videret hanc labem animos iuuenum infecisse, administrationes *Anatomicas* aggressus est, ut *Sophisticam* illam *Anatomen* extingueret. Tunc enim corruptus fuit *Anatome*, quod *Plinius* dixit de *Medicina*, cum ad verba garrulitatemque descendit: sedere in scholis auditioni operatos, gratius erat, quam in artis operibus se exercere. Ideoque prudenter prædixerat *Triptolegus*, sapientiam veterum in *Sophisticam* & inanem garrulitatem degeneraturam. Quod si *Anatome* *sophistica* introducatur, ad *praxim* tamen reuocata, sensu componi debet, qui solus potest quæstiones omnes dirimere; Nam quæ visu & tactu demonstrantur, in dubium reuocare dementia est, vel imbecillitas quædam mentis, ait *Aristoteles, 8. Physic. repudiata sensum auctoritate & constantia, rationem requirere*. Itaque in *praxi Anatomica* quæstiones omnes fugere oportet, dubias ex *anaphora* componere. Scribit enim *Hippocrates*, de subtilibus rebus, & quæstionibus Medicum per se non agere, ut *Medicus* est, sed ut *Philosophus*. Ergo multò minùs decet *Anatomicum Doctorem*, de his disserere; fieri tamen non potest, quin aliquid *Theoreticum* in *praxi Anatomica* interseratur.

Cum *Doctor Anatomen* administrabit, prius oratione breui & perspicua ostendenda enarret, quam ad opus se accingat: Sectiones verò partium difficiles & laborio-

fas, remotis discipulis administrabit, ne laboris dinturnitas, illos ab hac arte deterreat. Ad hoc spectaculum tantum admittet, quos huius rei cupidus esse noverit. *Discedat hoc opus longioris temporis intervallo, quare cum alteri capiam studium mensis firmum ostenderet, talem prius à membrana veluti montatam detrahens, quam spectare accessit. At si familiari cuidam consuetudinem velu impertire, qui etiam ipse alteri aliquando sit ostentatus, presente ipso rem aggredere: Quippe munus est, quod ex altam diligenter postulat, vero industrii descendique capido concurrentem, ex Galeno. Porro, ne totum laborem Anatomicum ferat, ex discipulis quemdam industrium seligit, qui partem oneris sustineat: id enim fiet consilio Hippocratis, lib. de Medico. Vnus, inquit, ex discipulis iam prouectus in arte, & inspector, & exequutor eorum, quæ absente Medico fieri debent, adstantibus adiungatur. Sic Galenus suis ministris iubeat pellem excoriare, nervos recurrentes laqueo constringere. Ex his euidenter patet, Galenum in *Dilecti Anatomico*, tria postulare, vt periciam habeat *Anatomes*, *Encheiræ* sive exercitæ, artem optima methodo doceat, atque demonstret.*

DE APPARATV ANATOMICO

veteri, & novo.

CAPVT XVIII.



**Q**UICVMQVE *Anatomen* administrare, & publicè demonstrare proponit, imprimis domum lucidam ac luminum eligat, ex Galeno, si fuerit perhibilis, commodior adhuc erit. Deinde tabulam ligneam sibi comparabit, quam Græci *Πασιον* vocant, sic enim ab *Anatomis* appellari corporum sectioni subiectorum tabulam notauit Galenus. Quo etiam nomine mensa sacrificiorum vocabatur, vt Latinis *apud Festum* mensa dilectioni hostiarum dicta *Antilebra* dicitur, ab antiquo verbo *anculare*, quod est ministrare, inde ancillas dictas esse voluit. Hæc autem tabula longitudinem habeat sex pedum, latitudinem trium, sive & altitudine sua non transcendat dilectoris zonam; sit quoque versatilis, per medium rotundo cardini ligneo infixa, vt in theatro circumagatur, ad partium demonstrationem. In extremis sit perforata ad laqueos demittendos, quibus ipsius *cadaveris* artus constringantur, si opus sit: super hæc tabula resupinum *cadaver* collocabitur; Cuius delectum haberi voluit Galenus in *Admin. Anat.* Macilentum & senile corpus ad *Anatomen* musculorum aptius est, quia musculorum fibræ & tendones clarius conspiciuntur, quæ in iuuenili & obeso animali, cum humiditate, tum carnis copia conteguntur. Consimile corpus requirit ad inuestigandos nervos, lib. 8. *Admin. Anat.* cap. 3. Alibi etiam scribit ad peruidendos nervos, corpora præ senio extenuata omnium aptissima esse, quia carnes habent modicas & aridas, longè verò aridiorem totam nervorum substantiam, quæ in eiusmodi corporibus manifestè spectatur. Quod si è duobus animalibus parum idoneis delectum facere oportet, alterius inopia, præstat recens natum capere, quàm magnam & pingue; nil enim magis obscurat nervorum consuetudinem, quàm pinguedo, ex Galeno lib. 4. *Admin. Anat.* cap. 20. Idem lib. 7. *encheiræ* animal iuvenile accommodatius esse scribit, si quando viuum inciditur, ad motus Cordis & pulmonum explorandos. *Aristoteles* lib. 3. de *historia animal.* cap. 4. ad inspectionem venarum animalia desiderat macilentæ & necata suffocatione: in quibus tamen non æquè apparere monuit, nisi animalia magnitudine corporis & sanguinis multitudine consentiant. Nam in his quæ minutura sunt, aut paucillum habent sanguinis, aut propter naturam, aut propter corporis obcitatatem, venæ haud æquè conspici possunt; siquidem meatuum horum confusi sunt, quemadmodum riuali quidam largiore limo. *Ancientius* lib. 3. de *Animalibus*, notauit corpus medium inter macrum & pingue & strangulari, idoneum esse ad *Anatomen*, Galenus inter animalia ad viuum *Anatomen*, suam grandem potius eligebat, quia magnam vocem edit, lib. 8. *Admin. Anat.* Scribit *Aulius Anatomia parva*, nullum animal homini simile esse, quàm simum quoad partes exteriores, At secundum interiores nullum propius accedere ad hominem, quàm Porcum;

Ex Galeno lib. 7. *Admin. Anat.* cap. 21.

Galenus libro de præceptis ad posticum 2. vt vocet instrumenta publicè demonstrandi hæc aulius vocet.

idcirco *Galenus* viscera in Sue demonstrabat, quia simia spectaculum est odiosum, nec plus habet quam Sus, lib. 8. *Admin. Anat.* Electum & destinatum animal ad *Anatomiam Galenus* frequentius in aqua suffocabat, ne pars vlla colli confrunderetur: hoc modo suas simias enecare solebat. Verumtamen fateatur, lib. 8. *Admin. Anat.* se aliis adhuc modis animalia interfecisse, interdum laqueo strangulabat, vel sectione spinalis medullæ iuxta primam vertebra facta, aut incisione grandioris alicuius venæ, aut arteriæ animal enecabat. Non probo modum illum interficiendi animalis, dum in aqua suffocatur, sic enim carnis corruptio ac putrefactio acceleratur. Nec lotura corporis necessaria videtur, nisi ad faciliorem depilationem; quod facilius solebant vereres in animalibus præcidaneis. Narrat *Lemnius Lemnius*, libro secundo de oculis *Regura miraculū*, capite ultimo, in Italia homines morti destinatos à Iudicibus impetrari in vsum dissectionis, quibus opij binas ternasve drachmas ex vino meracissimo exhibent, ne vlllos humores dissipari contingat, aut crassiores spiritus evanescere, omniaque se apertè proferant. Quod *Pijus* facilius testatur *Fallopianus*, libro de Tumoribus, cap. 14.

Vt autem perfectè demonstraretur vniuersa *Anatome*, tria vel quatuor cadauera habere conuenit, vt quæ in vno & eodem subiecto videri non possunt, in aliis conspiciantur. Consultit *Fernelius* lib. 1. cap. 16. vt alio cadauere musculorum, deinde ossium exsiccatorum, aptisque compagibus reuinctorum, alio viscerum interiorum confessionem institueretur, alio vcnarum, quas à Iecore; alio arteriarum quas à Corde; alio denique nervorum, quos à Cerebro atque spina in sensus atque singulos studiose diligenterque persequemur. Hæc enim summa est, & conducibilis inuestigandi ratio. Quod prius à *Nicolas Massa* in sua *Anatome* propositum fuerat: notent, inquit, qui perfectam hominum *Anatomiam* scire desiderant, eam haberi minime posse, nisi per plures corporum diuersorum, tam in ætate quam in sexu, & in complexionem & carnis multitudine & macredine sectiones, quia in vno corpore quædam membra nobis spectantur quàm in alio. *Sylvius* in corpore præcidaneo sex conditiones requirit, vt sit mortuum, non viuum, integrum, & minime mutilum, extinctum potius in aqua quàm suspensum, recens non morbo consumptum, mediocre in obesitate & statura, denique ablutum & rasum. Idem statuit *Fernelius*, cadauer imprimis delectum, sit bona corporis valetudine, integra constantique ætate, staturâ mediocri & apposita, incorruptum & partibus omnibus absolutum, nec morbo nec vulnere interemptum, verum suspendio, stragulis, aquave extinctum. Sed quamdiu calet corpus, si parum distat à suspendio, incidi non debet, quoniam humanitas & pietas à nobis exigunt, vt si quis vitæ nondum extinctæ spiritus effulgeat, omni arte suscitetur, vt vita misero restituatur ad poenitentiam agendam. Ideoque examinandum si corpus prorsus sit exanime, quod ex frigidityte cognoscitur. Cadauera occisa & violenta morte sublata corruptioni esse magis obnoxia, quàm quæ naturali morte decedunt, testis est *Homerus*, *Iliad.* 19. & 24. Contrarium probat *Rodericus à Castro*, lib. 3. de Meteoris Microcosmi, cap. 4. cui refragatur experientia quotidiana. *Franciscus Baconus de Verulamio*, libro de vita & morte, narrat se à Medico adhuc viuente audiuisse hominem, qui se suspenderat, atque per horam dimidiam suspensus manserat, in vitam frictionibus & balneis calidis reduxisse: quoniam etiam profiteri se, non dubitare suspensum quemcumque ad tempus prædictum reuocari posse, modò ceruices ei per impetum primæ demissionis non fuerint effractæ. Nec id fabulosum: ceterum & fieri posse in *Anglia*, vbi suspensi non succutiontur, vt in *Gallia*. Obseruatum est quosdam è patibulo ad Theatrum *Anatomicum* delatos, laxato & resoluto laqueo strangulatorio reuixisse. Narrauit mihi *Pareus* meus, se *Lyetia* operam Medicinæ dante, anni sunt octoginta elapsi, quendam fusciferum suspensum sectioni destinatum, vitæ superstitis indicia dedisse, quam Medicinæ studiosi aquæ vitæ potu, & fomentis calidis illi reddiderunt, ita ut saluus & incolumis abierit & euaserit. *Dionmedes Cornarius* lib. hist. admir. duas historias adfert de suspensis hominibus, qui ad vsum *Anatomicum* concessi reuixerunt. Anno 1440. decimo sexto Martij die, Decano Medicinæ facultatis existente *M. Ioanne de Pannegarten*, octo fures suspensi fuerunt, ex quibus vnus ad Spiritum sanctum introductus est, ac corpus eius destinatum *Anatomicum*; sed quia iterum ope & industria Medicorum *Viuennensium* reuixit, liber dimissus est. Anno 1492. *Conradus Prætorius de Puchberg*, ob furta suspensi ac strangulati corpus, facultati Medicinæ secundum tradebatur. Animaduertunt Medici aliquem spiritum

Spiritus vitalem in hoc corpore superesse, quamvis morti valde propinquus esset, ex utraque cephalica sanguinem largum detraxerunt, aliaque necessaria illi administrarunt. Hic tandem comite pedello ad Beatam Virginem in *Oettingen*, patriâ suam iuit, quo in loco hæc historia pro miraculo depicta est. Cur autem suspensum strangulâri nõ potuere, *Cardanus* rationem assignauit, & experientiâ vidit. Constat, *inquit*, quandam bis suspensum, seruatum miraculi specie, inde cum tercio iudicis solertia periisset, inueni ossæ asperam arteriam, *lib. 1. 4. de Varietate rerum, cap. 76. Ex eodem Cardano*, is qui diu suspensus *Bononia* iacuit, viuis inuentus est, quod asperam arteriam non cartilagineam, sed ossæam haberet. Hoc nos & ab aliis accepimus, *lib. 2. tract. 1. contr. 7. Quâdo igitur constabit de morte hominis, maturè sectionem administrabis.*

Reprehendit *Galenus veteres Anatomicos*, qui animal incidunt longo tempore mortuū, partibus iam aridis & contractis, quò sit vt in dissectione partes non faciliè diuellantur, sed lacerentur. Notat *lib. 8. Admin. Anat.* partes ab iniuicem faciliùs diuelli in animali viuo, quàm in mortuo, siquidem refrigerata post mortem corpora, quæ primò & *superius* possunt separari, secretioni minus obtemperant. Quod si carnes muscularum exsiccatae fuerint, ipsique tendones indurati, calentem aquam superinfundes, vt carnem recenti similem efficias; vel tendones manibus mollicos, reddes obsequetiores, *lib. 8. Admin. Anat.* Inter dissecandum non te terreat, & ab incepto opere reuocet *stolidum sanguinis* è naribus vel ore, quod sæpius contigisse vidi primo vel altero, tertio & quarto sectionis die, quodque meticulosi ducerent pro sinistro omine, ac si nefas esset corpus illud atrectare, cuius vmbra nondum à sanguine separata absistere moneret, quasi anima iam egressa, & à corpore separata sui adhuc corporis curam haberet, qua de re apud *Poëtam Polydorus Æntam* hortatur, *inuis libri 3. Æneid.*

----- Parce piæ scelerare manus.

Inde cognoscere leues esse coniecturas, quæ sumuntur à *Indicibus* de cruentatione cadaueris ad conspectum scarii. Qua de re legendus *Andreas Libanius libello peculiarari*. Nam cadauera exactis duobus vel tribus diebus, in malis siue genis carnosioribusque locis rubere visa sunt, ex sanguine seroso putrescente, & quoquo versu diffuente ex cadaueris cõmotione & reuolutione dum secatur, inde fit vt sanguis ex ore, naribus, oculis exsillet, quæ causa est cur cadauera profundè mandata terræ forsan aridæ, nec imbris irriguæ, si septem aut decem diebus à sepultura effodiantur, sæpius integra reperiantur, atque reuoluta præsentè scario sanguinem è naribus vel ore profundâ, quod etiam haud dubiè accidisset illo absente. Tempestas autem ad *Anatomen* accommodata eligi debet, qualis est hyems gelida, ne cadauera protinus putrescant: siccissima verò & gelidissima, dissectioni foret ineptissima, propter cadaueris congelationem, & secantis manus stuporē & rigiditatē, nisi in loco subterraneo administraretur. Vnde mirari subit quomodo veteres *Medici in Alexandria, Anatomi* pluribus diebus possent administrare, forsân propter corporis siccitatē, cadauera minùs corruptioni sunt obnoxia. Cùm circa *Amidam* ciuitatem, corpora *Persarum & Romanorum* ad sepulturam segregerentur, per *Descentium Tribunalum*, animaduersum est *Romanos* ceterosque *Europæos*, post quatuoriduum putrescere: contra *Persas*, siccatis corporibus sine tabo vt ligna durefcere. At cadauera quibus *Alexandrini Medici* utebantur, *Æthiopica* erant. Quod si æstate volueris cadauer aliquod muliebri dissecare, quod rarum est, & quouis tempore dum se offert accipiendum; ne breui putrescat & corrumpatur, supra *scordium* & *elematitem daphnoidem*, seu *vincam peruncam* recumbēs administrabitur, & peracta lectione iisdem herbis sepelietur. Interiora tamen aqua falsa, aut aqua vitæ, aut aceto lauantur; atque in loco frigido sectio *Anatomica* administrabitur, & noctu corpus in subterraneo loco collocabitur.

Sectionem aggreditur *Anatomicus* stans ad latus dextrum cadaueris: Manu sinistra vterur, ad suspensionem secandæ partis, ex *Galeno*. Manu verò dextrâ secabit, quam strenuam atque agilem habere debet, vt cùm necessum est altius scalpellum demittere, secare quæ duriora sunt, impellere, educere, atque in diuersa contendere possit, atque hæc firmissimè præstare. Dexteritas verò manus efficit, vt cæteris inuiolatis scalpello tantum attingat, quod propositum est, tum vt aptè partes inter se diducantur, nè dum vna tractatur, altera laceretur. Vngues non vt in aliis Chirurgicis operationibus, æquare debent digitorum summitates; Nam breuiiores nequeunt apprehendere breuiora corpuscula, longiores sunt valde accommodati ad apprehensionem & suspensionem: sed tantum vnguibus trium digitorum, pollicis, indicis & maximi opus est.

Ad peritè secundam varia instrumentorum sp̄llex necessaria est: *Ergaliam Anatomica* voco, cuiusmodi sunt nouaculæ, *rasoirs*, scalpella, *hissoris*, varia longa & lata, laurini folij figura, sed ancipiti acie prædita. Alia angustiora in formam folij myrthiui fabrefacta. Hamuli quoque sunt necessarij, simplices, vel in extremo duplices, quamquam relictis hamulis, vngues subinde operi in eleuandis corporibus vtilius adhiberes, nisi sinistra manus vmbra sectionem obtenebraret. Stylos varios habere conuenit, ex æneo filo factos: acus varias, rectas & obliquas, quibus filum adapebitur. Sed forficula maximè requiritur ad incidendas partes, vt sunt membranæ, peritonæum, vesica, pleura, meninges cerebri. Canula siue tubulus ad inflandas partium inanitates, spongiæ ad hauriendum sanguinem in capacitates effusum.

*Hæc tibi forte datur, tergendis spongia membris  
Vtilis, expresso cum lenis imbre tumes.*

Deinde ferrâ rectâ opus est, ad ressecandum cranium: quinetiam Spathæ vtilitas maxima erit, ad diducendas partes sine incisione. *Galenus* variis instrumentis instructus erat in administranda *Anatome*. Imprimis vsurpabat instrumenta introductoria, *Anatomici incisionem* vocant, quorum quædam *pica* dicuntur, vulgò *sondes*, quibus vtebatur ad explorandas cauitates renum & sinuum Cerebri. Alia sunt *anquans*, *desmyssatules*, ad meninges diducendas. Alia nominantur *dissepans*, *spatules entiers*. Alia *diviseurs*, *effronnettes à deux boutons*. Alia *puante*, *effronnettes à cure-oreilles*. Quæ quidem instrumenta vtplurimum ferrea erant, nonnunquam è buxo confecta. Variis scalpellis utebatur, modò scalpello vtrisque curuo in formam myrti, quo secabat musculos, & periosium eradebat, modò scalpello excisorio, quod *rasoir* Græci vocâr, modò cultris excisoriis, quos *scissors* appellat, interdum *Macheriis* oblongis utebatur, quæ latera duo acuta haberent in vnum extremum coeuntia, ad processus ossiles excindendos; Ad separandam cutem scalpellum acutum accipiebat, retusum verò ad musculos secernendos. Sternum excindebat scalpello acutissimo, quod ex vtroque latere secabat, sed vnum erat incuruum, alterum oppositum gibberum. Costas amputabat duobus cultris excisoriis sibi mutuò oppositis. Hamulis utebatur ad eleuandâ partem quæ secatur, hamulorum variz erant differentiz, ad nervos intercostales eos adhibebat, quibus in varicum curatione *Chirurgica* utebatur. Interdum hamulus erat perforatus ad nervos recurrentes extrahendos, & per foramē hamuli filum traducebatur, vt plurimum hamulorum loco digitis utebatur in attollenda parte, vossellis ad partem educēdam, tubulis ad inflandas partes. Similes erant aurificum foliis in formam calami Sambucini figuratis. Ossa verò excindebat fabrorum alicijs ex ferreo durissimo confatis. Alia ossa confringebat, veluti sunt vertebæ, scolopomacheriis optimo chalybe fabricatis, qualis in *Naricis*, siue *Rhachi* habetur, ne subito hebescat, reflectatur aut effringatur. Ad costam eleuandam Meningophylacem adhibebat. Sanguinem effusum spongia extergebat, acu obliqua partem ligandam perforabat, vel eleuabat, filo utebatur lineo & laneo, vt mollius esset. Ligaturæ formam siue laquei modum explicat, lib 8. *Admin. Anat.* ad illaqueandos nervos intercostales. Tam varia instrumentorum supellex ad elegantiam & commoditatem haberi potest: sed potissimum requiruntur forceps, nouaculæ duæ, scalpella duo, laurini folij figura, alia duo myrthifolij forma, styli duo vel tres longitudine & crassitie inæquales, acus incuruz, triangulares quia facilius penetrant, filum, tubuli ad insufflandum & inflandas partes, scerra, spongia, quinetiam cote optima opus est, ad nouaculas & scalpella acnenda, quorum acies in secandis cadaueribus plurimum hebetatur. An propter cadauerum immensum frigus? An potiùs propter carnum visciditatem, quæ adhærendo aciem ferri obtundit, vt credit *Mercurialis*, lib. 5. *variarum sectionum*, cap. 12. De ista quæstione, vide *Scaligerum exercit.* 332. Sed ne *Medici* secantis ætio sit horrida & sordida, partes omnes peritè, ac solerter secabit, vt vitet largas sanguinis effusiones, aut eas citissimè spongiabit, quæ si præstiterit eleganter, non indigebit eo vestitu, qui lanij pecudes mactantis speciem redoler. Propterea soleo tunicâ sericeâ talari indutus eo modo secare & demonstrare *Anatomem*, quo suggestum ascendo ad docendum. Appositè *Soranus* cap. 4. ad nostrum institutum. *Ipsa Natura interdum indolis etiam peritorum tribuit efficaciam: sed ipsa operatio, & ipsius honesta tractatio, longè in eo apparet, qui peritus est, & facillè improbat imperitiam.*

## DOCTISSIMIS ET AMANTISSIMIS COLLEGIS

*Eucharisticon, pro extructione Theatri Anatomici.*

## CAPUT XIX.

**S**UMMVS artis Medicæ magister & interpres *Galenus* litteris prodidit; binas olim celeberrimas Scholas, *Coam* & *Cnidiam*, Medicinæ studiis in *Græcia* florescentes, inter se magna contentione certasse; de inuentorum multitudine & præstantia. Certamen illud non erat de ostentatione census & opum, sed de *Apollinis* & *Æsculapij* arte tum exercenda, tum semper augenda, atque pro viribus perficienda. Easdem Scholas in *Galliam* migrasse, vel potius reuixisse iudicabit, qui *Scholas Parisiensem, & Monspelensem*, æmulo doctrinæ studio decertantes considerauerit. Cum enim *Medicina* subiectum, circa quod ars tota versatur & occupatur, duplex à *Galeno* constituitur, *Corpus Humanum, & Medicamentum*; *Monspelensis* Schola meritò iactare potest *Hierapim vbertatem*, quas benigna Pateris de suo sinu ad vsum *Medicina* in hac regione liberalissimè profundit, quippe solo natura subest; propterea de *Pharmacæ* peritiâ & perfectâ cognitione iure suo gloriatur. Neque tamen *Schola Parisiensis* tanto Naturæ beneficio priuata fuit, cum odtingentis circiter herbas solum *Parisienſe* proferat, quibus armati & instructi *Medici*, coniuratos vitæ nostræ hostes proſigare atque debellare pollicentur. Sed præ cæteris gloriam *Anatomica* doctrinæ sibi vindicare potest, quæ præstantissimos *Anatomicos* produxerit, *Sylvium, Mareſcatum, Courtinum*; à quibus ars *Anatomica*, densissimis ignorantie tenebris sepulta & immerſa, detecta fuit, & in apertam lucem producta, multisque nouis inuentis amplificata. Etenim antequam *Sylvius* suam *Isagogen Anatomicam* edidisset, nullus extabat commentarius lectione dignus, qui confusionem illam quæ in musculis, venis, arteriis, nervis reperitur, euoluere & explicaret. At proh dolor! imperfecti *Anatome* decessit è viuis, fatorum inuidiâ, & magno reipublicæ Medicæ detrimento, illudque perquam rarum ac memoria dignum, etiam posthuma opera artificis, imperfectæque tabulæ, in maiori sunt admiratione, quàm perfectum Opus *Anatomicum Vesalij*, quippe in iis lineamenta reliqua, ipsæque cogitationes artificis spectantur, atque id lenocinio commendationis dolor est, manus cum id agerent extinctæ desiderantur. *Iacobi Sylvij* auditor clarissimus *Michael Mareſcatius*, quondam *Schola Parisiensis* oraculum, in hoc *Athenæo* *Anatomen* publicè demonstravit, ad hoc studium accitis & assuesactis *Chirurgis Barbaris* foribus, qui tantum beneficium illius memorie acceprum referre debent. Præterea *Sylvij Anatomen* expoliuit, eius felicitatem adeptus, in nominandis musculis laryngis, pharyngis, linguæ, ossis hyoidis, quorum nomina ab exteris & recentioribus *Anatomicis, Bauhinum* intelligi *Lueticis commorantem*; diligenter exscripta legimus.

Hunc passibus æquis sequutus est *Germanus Courtinus*, qui floribus *Aulæ* perditus, & liquidis immixtis fontibus aprus ex suis lætibus *Anatomicis & Chirurgicis*.

Sed cum apud me antiquam *Schola* nostra consuetudinem expendo, à maiori bus nostris introductam, & à filiis *Medicorum* sanctè & religiosè in hunc usque diem conseruatam, quinetiam nuper edicto reformata *Academia* solemnî renouatam, quo sancitum est, vt *Medico* nomine & autoritate Scholæ vniuersam *Medicinam* biennio traditorus, ab *Ossibus* humanis suas prælectiones exordietur, binasque *Anatomias* quotannis *Medicina* studiosis exhibeat: Mihi succurrit simile institutum *Schola Alexandrina* studiis medicis olim adeo celebratæ, vt pro omni experimento sufficeret *Medico* ad commendandam artis peritiâ, si *Alexandria* se diceret eruditum. In hac Schola, cadaueris humani *Anatome* accuratissimè demonstrabatur, & ab eo tempore quo *Herophilus* *Anatomen* ibi professus est, *Anatomicum* studium ita florere cepit, vt omnes *Medici* tanquam ad mercaturam *Medicina* vndique confluerent. Nec aliam ob causam *Alexandrina Schola* laudatur à *Galeno*, quàm propter assiduum *Anatomes* exercitium, cuius ediscendæ causa omnes *Medicinæ* studiosos exhortatur,



Èo proficisci. Si *Parisiensem* urbem totius *Gallie* Epitomen, ac veluti Orbem in vrbe, *Alexandrina* compono, non ego demens ero sicut *Tityrus* apud *Poëtam*, qui *Romam* oppido suo similem putabat. In hac vrbe, *Aſclepiadum Scholam* studij *Medicina* celeberrima, supra ceteras *Academijs* meritò gloriari poteſt, quod *Anatomicum ſtudium* ſopium ac penitus extinctum in lucem excitauerit, inſtaurauerit, omnibuſque nationibus communicauerit.

Noſter *Sylvius*, qucm *Herophilo* poſſum aſſimilare, in hac *Academia* *Anatomen* accuratè proſiteri cepit, quam noſ in brutis, vt plerique ſolebant, ſed in cadaueribus humanis adminiſtrauit; quod in *Herophilo* commendat *Galenus*, propria manu ſecando cadauera. Id cum eſſet inſolens & inauditum, omnibus tamè *Medici* admirabile, & ob vtilitatem ſummè expetiſum, tantus ad noſtrum *Sylvium* *Philiatron* concurſus fiebat, vt tunc noſtram *Scholam* ſimilem dixiſſes *Alexandrina*, docente *Herophilo*. Ex hac *Schola* productus & egreſſus *Veſalius*, *Sylvij* præceptis inſtructus & informatus, in *Academia* *Italia* artem *Anatomicam* ſparſit & introduxit. Nec ei iniuriam facio, ſi *Schola* noſtræ diſcipulum voco, cum ipſe *Medicus* *Parienſis* ſuos *Præceptores* agnoſcat, alibi ſe diſcipulum *Sylvij* proſtituit, qucm docentem libros 17. de uſu part. audiuit, & *Anatomica* opera adminiſtrantem ſpectauit. Fuit ut etiam plurima ſe in hac vrbe ad oſſium cognitionem didiciſſe, dum oſſium aceros reuolueret in cœmiterio *Innocentium*, & in monte *Falconis*, ubi cadauera ſuſpenſorum deportantur. Ac ſanè *Veſalius* ſecundus erat artiſex, ſi non arrogantiùs & inſolentiùs uſus fuiſſet artis gloriâ. Nam accuratè rem *Anatomicam* tractauit, ſed prolixiùs & obſcuriùs, quàm vt queat à rudioribus *Anatomicis* intelligi.

Porto vt in hac *Academia* frequentius eſſet *Anatomies* exercitiùm, *Henricus magnus* i parauit, hortante ac poſtulate, primario *Medico* *Andrea* *Laurentio*, quondam noſtræ *Scholæ* alumno, profeſſorem *Anatomici* & *Botanicum* creauit, qui vtramque *Medicina* partem publicè doceret, atque demonſtraret: quod fuit olim *Petri* *Rami* *Profeſſorum Regij* uolum, in *Oratione* pro reformatione *Academia*. In *Medicina* exercitijs pars altera longè commodiſſima de operis *Medici* meditatione, & effeſtione omiſſa eſt: vt diſcipuli alio anni tempore philoſophatum, de herbis, plantis, omniumque generum ſimplicibus à *Profeſſore* in prata, hortos, ſyluas deducerentur, alio in ſecandis corporibus exercerentur, alio eoque præcipio, ægrotis tractando, conſilij, medicamenti, rationis totius participes eſſent. Hæc enim exercitijs *Medicus* faceret, vt in *Schola* *Montiſſepulana*, vt in omnibus *Medicis* *Italia* *Scholis* facit. Hæc enim *Medicina* eſt *ſciencia*. *Aliter* autem alium ſcholæſticorū ſola, tantum poteſt altercatore ſcholæſticos effeſcere, morborum curatores effeſcere non poteſt. Itaque *Medici* doctores lauream adepti, ac per ſolus alium ſilos inſtituti, artis uſum diſcunt periculis hominum, & experimenta per mortes agunt, vt inquit ille. Quamobrem *Cavole* nunc Rex *Francorū* *Chriſtiſſime*, conſtitue in ſcholis *Medicorum* *Profeſſores* *Regios* & *ordinarios*, conſtitue meditationes illas veras, exercitationes *germanæ*, &c. Cum autè doctiſſimus *Andreas* *Laurentius* meam in rebus *Anatomicis* diligentiam & induſtriam notam & exploratam haberet, me dignum ea profeſſione iudicauit, *Regique* nominauit, atque commendauit, vt in *Profeſſorum* *Regiarum* numerum cooptaret. Ab eo tempore *ſpæram* quam naſtus eram ita diligenter excolui, vt poſt innumeras in his *Scholis* cadaucrū diſſeſtiones palam adminiſtratas, vniuerſo *Medicorum* conſenſu, prouincia docendi & adminiſtrandi *Anatomen* per quadriennium mihi demandata fuerit anno 1614. Vt *Scholæ* alumnos ceteroſque, qui velent *Encheiriſtes* *Anatomicas* tractare edoceram, quod non ſine laude, & aliorum profeſſo perfecti, vt multi in hac vrbe *Medicinâ* proſtantes, niſi fuerint ingrati & inuidi imitatores, & alij alibi commorantes teſtari poſſunt, atque iam publicè demonſtratu.

Omnia quæ *Phæbo* quondam meditante beatus  
Audiit *Enrotas*, inſiſtente edificare lauros,  
Ille canit.

Neque deſinam quamdiu ſpiritus hos reget artus, de *Republica* *Medica* bene mereri, *Anatomen* docendo atque demonſtrando.

Sed cum *Anatome*, priuatim ac publicè ſole adminiſtrari, quæ fit priuatim paucos admittit ſpectatores: quæ verò publicè demonſtratur, maiore ſpectantium conuentu & conſeſſu celebratur. Propterea ad hoc ſpectaculū valde neceſſarium eſt *Theatrum*, vt per ordines diſpoſiti ſpectatores, abſque tumultu & conſuſione quæ requirunt intuitum, commodè poſſint adſpicere. Viramque *Anatomen* publicam & priuatam *Romæ* *Galenus* adminiſtrauit. Nam paucis cum diſcipulis arcana ſua *Anatomica*



communicabat, sed ad ostentationem publicè in magno auditorio, & in templo *Papae, Philippi, & Medici*, præsentibus etiam *Romanis* proceribus *Anatomici* celebrant.

Narrat *Pausanias* Epidauri in templo *Esculapij*, superbum Theatrum à *Polyeeto* extructum fuisse, quod non erat artis operibus destinatum, sed ludis in honorem *Esculapij* celebrandis dicatum. Nos vero laudamus desideratum Theatrum ad vltum *Anatomicum*. Impeius ad extructionem Theatri eligendus est locus quàm saluberrimus, dum enim spectantes delectationibus detinentur, & corpora propter voluntatem patentes habent venas, in quas incidunt aurarum flatus, qui si à regionibus palustribus, aut aliis vitiosis regionibus duentur, nocentes spiritus corporibus infundunt. Itaque si curiosius eligatur locus Theatri, virabuntur vitia, etiamque providendum est, ne impetus habeatur à meridie, Sol enim cum implet eius rotunditatem: aër conclusus curuatur, neque habens potestatem vagandi, versando confutur, & candens adurit, excoquitque, & imminuit & corporibus humores, inquit *Vitruvius*. Vbi locus electus fuerit pro dignitate *Academiae*, & studij *Anatomiae* celebritate, Theatrum edificabitur amplum & capax, ut plures spectatores recipiat, quadratam vel rotundam formam obtinebit. Sed rotunda quadrata praestat, quia nobilior & capaciore. Materia Theatri, vel erit faxea, vel publicia: lapidea diuturnior erit, lignea minore sumptu parari poterit, nec tantum spatium occupabit. Praeterea Theatrum debet esse persatile, valde clarum ac luminosum. Persabitur si per quatuor fenestras amplissimas aër ingreditur, cuius flabellatione feridi cadaueris vapores discutiuntur ac euerantur. Sæpius observavit *Mindanius*, libro de febre maligna, quamplures cadaueri proxime adstantes, in publicis *Parasinae* Scholæ dissectionibus, aëro stante, febre pessilenti correptos fuisse, nonnullos interiisse: nam observatum est à meridiani spatibus ad occasum Solis, pessilentiam semper ire, nec vnaquam ferè aliter quàm hyeme, nec ut terminet excedat menses, si credimus *Plinio*. Et quoniam hybernus temporibus potissimum administratur *Anatome*, ne imbris aut nivis delapsus spectatores offendatur, opusque *Anatomicum* perturbetur, Tectum Theatri superimponetur, quod etiam fenestratum erit, ut vndique clara luce Theatrum collustretur. Nam lucis claritas in administranda *Anatome* summo opere requiritur, uti minima quæque aptè & peritè secari queant, & ab omnibus adstantibus manifestè conspici. Propterea *Galenus* omnes *Chirurgiae* operationes in ægro, fieri sub dio censebat, nisi cæli & aëris iniurias reformidaret. Cauca Theatri claudatur conclavi ligneo, quod separet spectatores ab iis, qui opus *Anatomicum* administrant, ne spectantium multitudo compingantur. In media cauca intra conclauem constituitur Tabula *Anatomica* ad reponendum cadauer, crassiore ligno suffulta, sit versatilis, ut agendo rotundationem omnibus spectantibus partes ostendantur. In circuitu conclavis tres vel quatuor gradus disponantur, ac plures pro loci capacitate ad collocandos spectatores: quilibet gradus sit altitudine duorum pedum, ut qui sedent vel stant in secundo gradu, aliis infernè sitis superemineant ad rectius videndum: sit etiam gradus latitudine duorum pedum, ut qui superueniunt, ad vacuas & remotas sedes per eiusmodi ambulacrum commodè ire vel abscedere queant. Per scalam ad gradus ascendatur, quæ duæ sint in duobus extremis sibi oppositæ. In gradibus illis erecti stabunt spectatores, contignationibus ligneis innixi, tanquam pulpitis aut fulcimentum dispositi. Cum autem sumptus conuiuii Doctoralis anno 1564. abrogati fuissent, edicto *Regis Caroli noni*, Taxatio sexaginta aureorum imposita fuit ad vsus publicos, & potissimum ad impensas publicæ & theatrialis *Anatomiae* quam geminam singulis annis administrari decretum fuit, in reformatione *Academiae Parisiensis*, atque quo modo sit administranda ibidem præcise declaratum. Admittitur etiam *Archiducum*, inter Philiatros electus, ad secanda & demonstranda cadauera, si ipsam *Provinciam Doctor* detrahet, ex decreto Scholæ, anno 1576. Atque ut *Medici Parisiensis Anatomiam*, tanquam proprietariam sibi vendicarent, variis Senatusconsultis obtinuerunt & conseruauerunt ius & potestatem habendi & dispensandi cadauera suspensorum, quæ non conceduntur aliis, absque consensu *Decani*, ubi Scholæ satisfactum fuerit.

Considerate quæso quantum presenti sæculo beata sit *Academia Parisiensis* in tanta copia cadauerum, & peritia res *Anatomica*: quàm fuerit infortunata retroactis annis, dum *Anatomiam* demonstrabatur ex picturis, ut faciebat *Hieronymus de Hermondanilla*,

*Medicus Parisiensis*, qui tempore *Guidonis de Canliaco*, in tredecim picturis *Anatomen* ostendebat. Eandem *Betrucanus Monspessul* quatuor lectionibus demonstrabat. Cùm itaque *Medici Parisienses* nequaquam à prisca virtute degeneres, animaduertentes artibus *Anatomicis* desiderio quoamplius *Medicina* studiosos *Parisi* hyemare, ad spectaculi *Anatomici* commoditatem, iuxta propositum exemplar in Scholis Medicis *Theatrum Anatomicum* ædificarunt, quodque *Monspessul*, Regis *Henrici* secundi munificentia constructum fuit, & in aliis *Academiis* Reipublicæ sumptibus erigitur, vt *Parisi* & *Lyoduni Batavorum*, propriâ *Medicorum* impensâ *Luetsia* perficitur; opus verè regium, & tamen à *Medicis* publicæ magis, quàm privatæ rei sollicitis perfectum, de quo nunquam grata posteritas conticescet, cùm huius beneficii memoria longè superet *Crina*, *Majiliensis* *Medici* liberalitatem in extruendis patriæ moris. Laudatur *Ethnicus* ille *Centurio*, *D. Luca* 7. quod *Synagoga* siue *Scholam* ad erudiendam iuventutem erexisset, eoque nomine à primoribus *Iesu Christo* commendatur. At *Theatrum Anatomicum* condere & excitare, quid aliud nisi *Scholam* publicam extruere, vt manifestentur opera Dei? Propterea vobis authoribus & rectoribus studij *Anatomici*, *Dellissimi Collegæ*, meos labores *Anatomicos* excutiendos subiicio, vt sicuti in *Agypto* olim artium inuentum vnumquodque communi eruditorum consensu probatum, columnis quibuldam inscribebatur in locis sacris positus, ex *Galeno lib. aduersus Iulianum*, sic vestro *Theatro* consecratum & inscriptum nouum id opus *Anatomicum*, si veram doctrinam præ se ferat, retineatur, sin deprauatam & absurdam proferat, improbetur ac eliminetur. *Apelles* & *Polycletus* suas olim tabellas siue imagines celte & malleum tenentes publicè proponebant; sic ego cum spongia in manu vobis hæc offero, animo scilicet delendi quæcumque correctione ac liturâ egere videbuntur. Nec mihi placet *Nafonus quartin*, qui in suis carminibus non ignorabat vitia sua, sed amabat, inquit *Seneca in Controversiis*, quoniam suo quisque artifex opere impense delectatur, non aliter quàm rebus ex se progenitis, referente *Aristotele*: est enim artificis opus quasi quidam ingenij partus, de quo *Socrates* aiebat, rectius iudicare obstricticem quàm matrem: nihilominus

*Sit mihi fas spectata loqui, sit numine vestro  
Pandere res alta carne, & caligine mersas.*

*Herodotus* vt samam ingenij copiosiore colligeret, in multos annos celauit historiam suam, & panegyricos *Græcia* conuersus expectauit. Eodem consilio & instituto nouum hoc opus *Anatomicum* arca ingenij tam diu flagellauit, donec *Theatrum Anatomicum* exstrueretur, in quo tanquam in panegyrico conuentu publicè recitaretur & examinaretur.

*Primus ego in patriam mecum modò vita superis,  
Paroico rediens deducam verruce Musas, Anatomicas,  
Ac tibi Idumaas referam Luetsia palmas,  
Quæ viridi in campo templum de marmore ponis  
Propter aquam, tardis ingens vbi flexibus errat  
Sequana, quæ tenuera prætexit arundine ripas,  
In medio Ladoicus eris, templumque tenebit,  
Ipse caput tonsæ foliis ornatus Olina  
Dona feram, iam nunc solemnes ducere pompas  
Ad delubra iuuat, caesosque videre iuuenicos.  
Vel sicca ut versis discedat frontibus, usque  
Purpurea intexti tollant aulæa Britanni.  
Inuidia infelix furias æmnetque secuta  
Cocyti metues, turisq; Ixionis angues,  
Immanemque totam, & non exsuperabile saxum.*

Hæc oratio  
recitata fuit  
cùm capis  
fuit Ruper-  
la & prohi-  
bit Britan-  
ni.

## CONSECTIONIS QVÆDAM PRÆCEPTA

## CAPVT XX.

**N**on est satis *Anatomico* excellentem instrumentorum suppellectilem habere, nisi sciat iis conuenienter vti. Sectionis modum visû & tactu potius cognoscet, quàm auditu & lectione, quædam tamen præcepta apud *Galenum* licet obseruare. *Anatomicus* manum promptam & expeditam habeat, vt omnia celeriter exequatur. Manum in operando suspensam tenebit, ne scapellum vltcrius quàm par sit adigat. Scapellum, inquit *Galenus*, in cute rescenda tam leniter & moderatè adhibebit, vt solam ipsam diuidat: atque, vt *alibi* monet, non temere cutem feceritne oportet, coriarij more, sed mediocri sectione vtendum, quæ nec cutis quidpiam carni relinquat, nec subiectam membranam incidat. Instrumenta verò manu complicata non sunt tenenda more Janionum, sed tribus prioribus tantùm digitis, quomodo calamus, in scribendo tenere solemus. Cùm operabitur *Anatomicus*, quæ connata sunt diligenter & accurate separabit, quæ verò non sunt connata, celeriter & apè diuidet: quippe notat *Galenus*, partes quæ coitæ vniuntur, circa sectionem accuratam, aut violentam diuisionem ab inuicem separari non posse, atque separatarum lacerationem in vtraque apparere. At partium quæ inter se applicantur adhesionem infirmam esse, tenuibus interceptam fibris, vt earum diuilio facillima existat, *Anatomici* vocant & *disjunctio*, & à subiectis liberari, cùm velutaraneorum quædam telæ tenues ac numerosæ admodum corpora segreganda inuicem conueniunt, quare etiam in vno animali ipsa dissoluas, superficialia tamèn propriam seruant æqualem lætuncque, nulla ex parte diuulsam aut distictam: etenim in connatis, & præsertim musculis diuortium vtrique separato vltius parit. At verò hæc scalpito ad separationem indigent. Satiùs etiam fuerit in his quæ & *disjunctio* separantur, vti scalpello, vti quod agitur intuearis. Nam dumseparas digitis, apertius partium separandarum conspectus obliteratur, lib. 5. *Admin.* *Anat.* cap. 5.

Cæterùm, partes omnes tam artificiose secari debeat, vt nihil disruptum & lacerum appareat, quod si inopinato aliquid laceretur aut incidatur, id confectum filo religandum, quod potissimum accidit in vasorum inuestigatione. Tum illico ex vtroque latere incisionis aut rupturæ, vas filo constringes, effusumque sanguinem spongiâ exhausties: quia nil adeo vniuersam manus operationem in dissectionibus corporum solet perturbare, quàm sanguinis effusum. In dissectione viuui animalis, si vas aliquod vulneratur, scalpello transversum totum rescabis; sic enim sanguinis effusum coërcabis, quoniam vtraque vasis pars intra carnes retrahetur, quæ vasis ora obturabunt, ex *Galeno*, libro octauo *Admin.* *Anat.* Præterea diligenter cauebit *Anatomicus*, ne ex vna parte plures faciat, vel plures simul iunctas, vnâ esse constituat. At si quid opus obcurat, vt sunt pelliculæ, pinguedo vasis aut musculis intertexta, hæc peritè detrahet sine vlla partium offensione.

## QVA METHODO DOCERI

debeat *Anatome*.

## CAPVT XXI.

**V**omnium artium tractandarum, sic docendæ *Anatomes* duplex Methodus, vna quidem *Analytica*, quæ à toto eiusque compositis partibus, ad partes minùs compositas delabitur, donec petuerit ad simplicissimas: eaque obseruatur in *Theatris* publicisque dissectionibus, vbi totius corporis diuilio fit in tres ventres, & artus: vniui corporis, ac singularum partium particulæ inuestigantur, & proponuntur. Hæc methodo meas ob-

seruationes enarraui, & vnâ partium *Encheiristes Anatomica* coniunxi. Huius Methodi triplex ordo constituitur, *dignitate, situs, & necessitate*. *Anatomen* exordimur à ventre inferiore, ordine *necessitatis*, quia breui putrescunt huius cavitatis partes nisi remoueantur, & musculos abdominis, qui situ priores sunt, seecnerimus: dein sequimur ordinem *situs* in secandis & explicandis partibus. *Galenus* duplicem tantum ordinem agnoscit, *lib. 6. Adm. Anat. cap. 3.* dissectionem cadaueris duobus modis aggredi potes, incipiendo vel à partibus internis, quæ dignitate primæ sunt, vel à musculis abdominis, qui ordine priores sunt. Altera methodus *Syntheticæ*, orditur à simplicissimis partibus, & ad compositas progreditur, donec totius constructionem assequuta, rem ad vmbilicum perduxerit. Quæ posterior Methodus eò discedit *Anatomia* aprior est, quod Naturæ vestigiis inhæret, cuius opera persequatur. Siquidem, auctore *Fernelio*, ex simplicibus partibus vniuersi compositio luculentius perspicitur, quàm si confectionis ordine, compositiores partes seorsum perquirantur, quarum inspectione nihil certum sciri, nihil planè cognosci ac percipi potest earum, quæ simplices in omne corpus feruntur. Hac Methodo duce, partium similiarium explicatio eo ordine suscipienda, quem præstat, & suadet *Galenus, lib. 1. Adm. Anat. cap. 2.* Ossium omnium natura imprimis perdiscenda est, siue in humano, siue in simi corpore, præstat autem in utroque, postea ad musculorum dissectionem properandum. Nam hæc duæ corporis partes, reliquis omnibus veluti fundamenta subiecta sunt. Deinde licebit quodlibet vasorum genus aggredi, siue venas, siue arterias, siue nervos, quibus viscerum contemplatio subiungitur. Cum enim ex *Aristotele* initia libri *secundi de partibus animalium*, Triplex sit humani generis constitutio. Prima, ex *elementarum virtutibus*. Secunda, ex *similiaribus partibus*, potè *osse, carne, quæ dependent à primis principijs*. Tertia & vltima *numera ex partibus dissimiliaribus* constet, vt facie, manu, & reliquis eiusmodi membris, quis non videt & agnoscit similiares partes præcedere dissimiliares, ex doctrina *Aristoteles*, ac proinde à similiaribus partibus exordiamur esse *Anatomen*. *Carolus Stephanus Galeni ordinem* immutat, explicatis ossibus, & quibus continentur ac vincuntur ligamentis, protinus nervorum descriptionem subiungit, quod ab iis musculorum tum capita tum etiam fines pendeant: nihil exactum in musculis cognosci posse existimans, non prius cognita nervorum intercurfantium productione: qua quidem ratione membranas post nervos enumerat, & quod à nervis pendeant, & quod musculos, quemadmodum reliqua omnia membra conuoluant, ac contegant. *Vesalius* imitatione *Galeni* ab Ossibus exorsus est, quæ sunt fulcra & fundamenta reliquarum partium: mox ab illis ad musculos transiit, ordine situs ita postulante, quandoquidem ossa musculis obducuntur, & operiuntur. Ab his ad vasa progressus est, deinde ordine necessitatis trunci tres ventres enarrauit, eandem methodum sequutus est *Laurentius*.

Obiiciet aliquis *Galenum* Anatomicam doctrinam duobus voluminibus, nempe *libris de visu part. & Adm. Anat.* tradidisse, in quibus non incæpit ab Ossibus. Cur *Galenus* hunc ordinem seruauerit supra dictum est. Nonnulli partium externarum appellationes omnibus artis *Anatomica* partibus præmittunt, auctore *Ruffo*. Mathematici in principio librorum suorum declarant terminos, quibus vtuntur in progressu suorum operum. Nominum consideratio, inquit *Epiætetus*, cuiusque artis principium est, *ἡτοι τοῦ μαθητοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν πραγμάτων*, primi gradus ad cognitionem rei sunt *ἡτοι ἐν τῇ θεωρίᾳ*, ex *Platone*: verba, inquit *Tullius*, sunt rerum notæ, *ὅτι τὰς διὰ τῶν πραγμάτων ἐκείνων ἡτοι τῶν πραγμάτων*: qui verborum vim ignorant, facili decipiuntur, ait *Aristoteles, cap. 1. Elenchorum*. Ipsemet à partibus externis exorditur, *cap. 9. lib. 1. de hist. animal.* tanquam notioribus, & instrumentariis præmittit similiaribus. Inchoare licet à partibus externis cum *Anatome* in theatris demonstratur: namquam verò quum methodo synthetica docetur. Qui confectioni præest, corpore in ventres & artus distributo, omnes horum externas sedes explicet, quæque illi veteres tum Græci, tum Latini nomina indiderunt. *Fernelius, libri primi capite vltimo.*

## QVID IN SINGVLIS PARTIBVS considerandum.

### CAPVT XXII.



**I**Rta sunt in singulis partibus consideratione digna Anatomico cognoscenda, auctore *Galeno*, libro secundo ad *Glanc. c. 1. Dissectio, Actio, & Vfus*. Notitia cuiusque naturæ membrorum ex dissectione, & exquisita operationum scientia, atque vsuum cognoscitur. Quod repetit *artis paræ cap. 54*. Ad eorum quæ sensum latent cognitionem plurimum confert, tum apparentiam ex corporum dissectione cognitio, tum Actio-num, Vitæ atque inquisitio. Per dissectionem innotescit partis structura, siue conformatio, quæ aliter sciri non potest: structura verò nomine res septem includit *Galenus*, quas libro primo de *vsu part.* declarat, & in singulis partibus diligenter obseruari cupit, nimirum *Temperamentum, Consistentiam siue Substantiam, Quantitatem, Rhythmum, Figuram, Situm, Connexionem siue Communicationem*, quæ fit quatuor modis, cum partes inuicem coeunt, vel proxime appensæ, vel appositæ sunt, vel ad securitatem comparatæ. Communio tria comprehendit, *principium, finem & intermedium*, quia fit cum triplici partium genere, vel cum iis à quibus ducit originem, vel cum iis, in quas finit, aut cum iis, per quas progreditur. Communicationem & societatem partium *Hippocrates* refert ad *duo quædam*, quod omnia sint eiusdem generis, familiæ atque originis, videlicet ex iisdem principiis nata, vel ex quatuor elementis, vel ex femine & menstruo. Eleganter ille, libro de *locis in homine*, corpus ipsum sibi ipsi idem, & ex iisdem compositum est, etsi verò non eodem modo se habent partes parue, tamen si quis vel minimam corporis partem lædat, totum corpus affectionem illam sentit, qualiscumque tandem fuerit: Propterea quod minima corporis pars omnia habet, quæcumque maxima, & quidquid vel minima pars pertulerit id gentilibus suis indicat, vnaquæque pars, siue bonum id fuerit, siue malum, & propterea dolet & delectatur corpus, ob minimæ partis affectionem, eo quod in minima illa omnes aliz partes reperiuntur, æque gentilibus suis communicant, & omnia denuntiant.

Aduersus hanc doctrinam opponet aliquis ex *Galeno*, libro quarto de *Placitis*, inutilem esse structuræ cognitionem, ad inueniendam partis essentiam, siue naturam. Responsum assignat ibidem *Galenus*, Partes à Philosopho, & Medico diuerso modo considerari. Philosophus essentiam solam contempletur, Medicus verò structuram obseruat. Nam si quærās à Philosopho quid sit Oculus? Respondebit, *instrumentum visus*: Medicus dicet *instrumentum ex talibus partibus compositum*. Altera difficultas occurrit de Temperie partium, quam dixit *Galenus* per Anatomem inuestigari: quia mortuo animali perit & aboletur Temperies. Respondet *Galenus* per proprietatem substantiæ coniecturâ aliquâ deprehendi; exempli gratiâ, ex carne pulmonum, rara, laxa, & albicante, coniectiam pulmonis parenchyma esse calidum. Per temperiem, inquit *Galenus*, capite octauo libri primi de *vsu partium*, quæ propria est partis substantiæ, magna ex parte organum quoduis suam actionem nancisci deprehendit. Aristoteles cap. 1. lib. 2. de *partibus animal.* Cor in partes similes secari monet, quemadmodum quoduis ex aliis visceribus, atque dissimilare est propter suæ figuræ formam. Inde colligere licet in visceribus obseruandas esse partes similes, & dissimiles. *Galenus* in explicanda corporis fabrica triplicem nostri corporis substantiam, solidam, spirituosam & humidam exponi voluit, vt patet ex libro primo de *differentiis febrium*. Si quis humani corporis fabricam docturus, triplicem corporis substantiam complexus non fuerit, vel Anatomem non descripsisse, vel eandem omnium corporis partium scientiam non esse, fateatur necesse est. Sed cum spiritus & humores inter partes corporis non annumerentur, propterea ab Anatome separantur: Nec vllus est, qui rebus Anatomicis humores & spiritus inseruerit, ne quidem *Galenus* de iis ex professo egit in libris Anatomicis. Præterea, partium actiones & vsus indagare debet Anatomicus, vt naturalem cuiusque constitutionem, quam

vocat Hippocrates *hominem* cognoscat. Nam deprauata, aut abolita actio, aut vsus; naturalem partis constitutionem vitiatam esse indicant. Rectè Galenus, in essentiam alicuius partis deducimur, non tam ex fabrica, quàm ex actione, *libro octauo de Placit. capite primo*: & sine actione, inquit Aristoteles. 1. *Metaphys. cap. 7.* nulla pars rectè definitur. Eleganter idem *cap. ult. lib. 1. de partibus animalium*. Qui de quauis parte corporis, aut vase aliquo disputat, non absolute de materia, aut eius gratia rem ipsam examinat, sed actionem habet totius formæ, & ad quem vsus pars ipsa creata & destinata fuerit, expendit. Sicuti cum de ædibus agitur, non de lateribus, non de luto aut lignis, sed de forma ædium ad commoditatem habitationis inquiritur. Idcirco, cum ex Galeno, *lib. 17. de vsu partium*, partes omnes corporis humani sint creatæ propter actionem & vsus, quid sit Actio, quid Vsus scire conuenit: est autem Actio motus quidam actiuis Vsus verò nihil est aliud quàm *Expositio, ad utendum aptitudo quidam*: Quæ consistit in simularium partium temperie naturali, & legitima simularium conformatione. Quando Galenus, *libro secundo de natural. facult. scripsit, nolle quæ sit cuiusque instrumenti functio, id nullum præstat ad medendum vsus*, & Erasistratei actionem causas non esse perquirendas indicabant, sic Galenum interpretari oportet, quod ab actionibus partium non sumuntur medendi indicationes, sed ab ipsa parte affecta, quæ ex actione dignoscitur. Interdum tamen Vsus & Actio promiscuè vsurpantur apud Galenum, *ut lib. 1. de temperamentis, cap. 9.* manus duplicem esse vsus dixit, *Apprehensivam & Tactum*: at omnibus notum est tam apprehensionem, quàm tactum esse manus actiones. Sic in titulo librorum *de vsu partium*, nomine Vsus comprehendit quoque Actiones, quia partes quæ actionem edunt, habent quoque Vsus, sic Ventriculus actione sua chylum facit, vsu suo distribuit ad nutritionem partium, sic Hepar actione sua sanguinem conficit, quem vsu suo refundit ad alimoniam corporis. Propterea Iulius Cesar Scaliger, *libros de vsu partium, ubi xxiias posuit*, interpretatur *de officio partium*. Nam Vsus non consistit in possessione, sed in Actione. Possidemus multa tela, non omnibus vitimur nunc. Itaque Scaliger *xpias* vertit officium, quod ex vsu fit. Carnis officium est explorare, sanguinis accipere firmam carnis, quod quamquam passio quædam est, tamen officij nomine significatur. Distinguntur tamen hæc duo inter se, apud Anatomicos, quod Vsus cõueniatur partibus nihil agentibus: Actio partibus dumtaxat operantibus. Propterea Vsus est *ad utendum aptitudo*. Actio verò *motus effectiuis*, seu *actionis effectio*. Galenus *libro de differentiis morbor. cap. 8.* monet quasdam corporis partes Vsus tantum, non Actionem habere, quasdam Vsus & Actionem, Alias demum Actionem, & non Vsus habere. Ut autem quas Vsus discernere Actiones consequentes, ab iis vsibus qui per se existunt, nullo pacto dependentes ab actione; hanc regulam proponit Galenus, *lib. 1. de vsu partium, cap. 9.* Quoties omnium quæ organis insunt vtilitatem diligenter examinaturus es, imprimis disquire per quas partes actionem natum fuerit, magna enim ex parte per propriam substantiam inuenies; aliquando ob aliquod ex consequentibus, ut in oculis propter colorem, deinde & aliarum eius particularum vtilitatem sigillatim exquires: An scilicet ea propter actionem sit utilis, an propter eorum aliquid quæ temperamenta consequuntur, ut os propter duritiem. Post hæc autem vnumquodque illorum quæ & totis ipsis organis, & eorum particulis accidit, considerabis; cuiusmodi sunt *positio, magnitudo, connexio, conformatio*. Ex his colligitur quid propriè nomine Vsus intelligendum sit.

Interea, notabis ex *Varolio*, Anatomicos hallucinari in assignandis partium vsibus, cum ad euitanda hæc vel illa incommoda, Naturam hoc vel illo modo partes corporis humani fabricasse scribunt, quoni ipsa Natura in conformandis partibus, vsus sibi proposuerit actionibus congruentes, vel vsus necessarios ad essentiam partis constituendam. Sic ratiocinatur *Varolius*, Natura in fabricandis partibus nunquam mouetur ab eo quod est contra naturam; nam præter hoc, quod hæc sententia implicat contradictionem, deridenda esset vtiq; Natura, si in struendo corpore, à lationibus id præseruare voluisset, mox innumereis præter naturam affectionibus obnoxium produxisset. Scias ergo necessitatem fabricæ partium esse desumptam ab actionibus earum; & ab iis quæ in actionibus supponuntur, necnon has necessario concomitantur, vel insequuntur, & quauis multi etiam ex primariis veteribus, id quod præter naturam contingenter accidit, pro fine partium frequenter assignauerint: Hoc aliunde non prodiit, nisi quia veram aliquarum partium actionem igno-

De necessitate & ab vsu partium, eleganter Afferit C. Hofmannus comment. in lib. Galeni de vsu part. pag. 78.

rarunt, aut in speculatione rerum naturalium parum accurati fuerunt.

Porro omnem actionem à similari parte proficisci variis in locis demonstravit *Galenus*, & præsertim *lib. 2. Methodi cap. 6. & cap. 8. lib. 6. de Placuit*, statuit vnamquamque corporis partem, peculiarem habere substantiam, qua differt à reliquis, Ab ea procedit Actio, ab actione Vfus : à similariibus functiones edi certum est, & cuiusque instrumenti vnam tantum similem, reliquas verò quæ cum hac quodvis instrumentum perficiunt, vñs alicuius gratiæ existerè, & illius, quæ prima erat actionis causa, factas esse. Vt visus instrumentum est Crystallinus humor, reliquæ partes eius causâ factæ sunt; & quamquam propter crystallinum omnes sint conditæ, singulæ tamen earum aliquam seorsim actionem sunt nactæ: Ac vena quidem & arteria, & nervus toti animanti communem, membranulæ oculi omnes cum sint nutriti participes, naturalibus quoque facultatibus sunt præditæ: Ac proinde etiam functionibus, quæ ab his proficiuntur. Longè alia fuit mens & opinio *Aristotelis*, *lib. 8. de partibus animal. cap. 1.* ubi partes similes creatas fuisse propter dissimiles scripsit, à quibus dependens officia & actiones, in se & invicem, vt oculi, narium, & faciei totius, item digitæ manuum, propterea partes organicæ & officiales, & ipsarum *Ab ipso* dicuntur. At ex partibus dissimilariibus aliæ sunt sensoriæ, aliæ organicæ. In sensoris sensus actio fit per similes partes, quia quilibet sensus simplex existit, & vnius generis nempe elementis participes. Nam partes sensorias propriis elementis attribuit, vt aliam ad aërem, aliam ad ignem referat, solum tactum qui omnium qualitatum participes est pertinere iudicavit ad partem dissimilem, puta carnem quæ est corpus dissimile. Itaq; existimavit *Aristoteles*, actiones esse suppositarum, & composito tribuendas esse, non qualitatibus simplicibus, exceptis sensoris partibus. Quidam dicunt in mortuis non esse querendam partem similem, quæ sit proxima motionis causa, quoniam ex eo quod actio est composita, requirit partem compositam, quæ sit actionis causa.

Hanc controversiam inter *Aristotelem* & *Galenum*, Viri docti ita componunt, vt Actionis instrumentum adequatum sit *pars organica*, primum verò ac præcipuum, similes aliqua vna; quæ conciliatio sumitur ex *ipso Galeno 7. Methodi, cap. 2.* Itaque cum *Aristoteles* Actionem esse organicarum partium scripsit, respexit ad Naturæ propositum, ac finem, quia similes factæ sunt in gratiam organicarum. At *Galenus* respexit ad ordinem generationis, quia partes similes voluit causas esse efficientes actionum. Tenim pars mouens, aut similis est, aut reducitur ad similem, & licet ambulator sit actio crurum partium dissimilium, tamen si distinguas partem mobilem à parte mouente, animaduertes os esse quod mouetur, musculum moueri à nervosa parte, & à nervo ipso, vt liceat inferre primam causam & efficientem huius actionis, esse partem similem. Nam actiones sunt à facultate, facultas consistit in temperamento, & hoc similitudinem est. Quare similes partes sunt causæ omnium actionum. Sed de ista questione legendus *Pacius*, comment. in methodum *Galeni*.

Actiones autem partium sunt, vel *Communes*, vel *Publicæ*, vel *Privatæ*. Communes dicuntur quæ ab omnibus perque obeuntur, cuiusmodi sunt naturales Actiones, nutritio, accretio : Publicæ, quæ referuntur ad vñm aliarum partium, vt Chylotis & Hematosis. Privatæ quæ à quibusdam partibus eduntur. Præterea *Actiones* sunt vel *Altiæ*, vel *Passivæ*, ex *Galeno, cap. 6. lib. 1. Methodi, & inno lib. 17. de vñs partium*. Ad *passivam* referre licet eam, quæ tantum ad decus & ornatum comparata est, de qua *Galenus, lib. 11. de vñs partium, cap. 13.* *Altiæ* dicuntur quæ à se eduntur, *Passivæ* quæ ab alio præficiuntur, qualis inest motus ossibus, quæ in brachiis & cruribus sunt, mouenturque à musculis circumiectis. *Passivæ* etiam dicuntur in sensibus recipientibus, ex *Galeno, lib. 2. de temperamento, cap. 2.* In organicis siue compositis partibus quatuor partes integrantes obleruabis: Primariam, per quam actio fit, Alteram, per quam actio melior efficiuntur. Tertiā, sine qua non potest actio fieri. Quartā, quæ facit ad conservationem, ex *Galeno lib. 1. de vñs part.* Idem monet in historia partium tradenda, ab his quæ toti organo communia sunt inchoandum esse, quibus subiecti debent quæ singulis partibus eiusdem organi propria sunt. Ceterum, in discursu Anatomico alicuius partis, à conformatione exordendum esse docuit *Galenus, lib. 2. cap. 7. de vñs part.* Actionem cuiusque particulæ, & ante hanc constructionem totam exadè scire oportet, ea quæ in dissectionibus corporum apparent inspicendo ipsis oculis diligenter : Nam veritates particularum nullo negotio inuenies, ab ipsa doctus Natura, si solum noueris exadè constructionem. Historia partis vel Actionem indicat, vel demonstra-



vocat *Hippocrates* *hominem* cognoscat. Nam deprauata, aut abolita actio, aut vsus; naturalium partis constitutionem vitiatam esse indicant. Rectè *Galenus*, in essentiam alicuius partis deducimur, non tam ex fabrica, quàm ex actione, *libro octauo de placu. capite primo*: & sine actione, inquit *Aristoteles*, 6. *Metaphys. cap. 7.* nulla pars rectè definitur. Eleganter idem *cap. ult. lib. 1. de partibus animalium*. Qui de quauis parte corporis, aut vase aliquo disputat, non absolute de materia, aut eius gratia rem ipsam examinat, sed rationem habet totius formæ, & ad quem vsus pars ipsa creata & destinata fuerit, expendit. Sicuti cum de ædibus agitur, non de lateribus, non de luto aut lignis, sed de forma ædium ad commoditatem habitationis inquiritur. Idcirco, cum ex *Galenus*, *lib. 17. de vsu partium*, partes omnes corporis humani sint creatæ propter actionem & vsus, quid sit *Actio*, quid *Vsus* scire conuenit: est autem *Actio motus quidam actiuus. Vsu* verò nihil est aliud quàm *hexis*, ad *utendum aptitudo* quædam: Quæ consistit in simularium partium temperie naturali, & legitima simularium conformatione. Quando *Galenus*, *libro secundo de natural. facult.* scripsit, *nolle qua sit cuiusque instrumenti functio, id nullum prestat ad medendum vsus*, & *Erasistratei* actionum causas non esse perquirendas iudicabant, sic *Galenum* interpretari oportet, quod ab actionibus partium non sumuntur medendi indicationes, sed ab ipsa parte affecta, quæ ex actione dignoscitur. Interdum tamen *Vsus* & *Actio* promiscuè vsurpantur apud *Galenum*, ut *lib. 1. de temperamentis*, *cap. 9.* manus duplicem esse vsus dixit, *Apprehensionem* & *Tactum*: at omnibus notum est tam apprehensionem, quàm tactum esse manus actiones. Sic in titulo librorum de *Vsu partium*, nomine *Vsu* comprehendit quoque Actiones, quia partes quæ actionem edunt, habent quoque *Vsum*; sic Venter actione sua chylum facit, vsu suo distribuit ad nutritionem partium, sic Hepar actione sua sanguinem conficit, quem vsu suo refundit ad alimoniam corporis. Propterea *Iulius Casar Scaliger*, *libros de vsu partium*, *ubi vixit iuuenis*, interpretatur de *officio partium*. Nam *Vsus* non consistit in possessione, sed in Actione. Possidemus multa tela, non omnibus vtitur nunc. Itaque *Scaliger* *vixit* vertit officium, quod ex vsu fit. Carnis officium est explere, sanguinis accipere formam carnis, quod quamquam passio quædam est. tamen officij nomine significatur. Distinguunt tamen hæc duo inter se, apud *Anatomicos*, quod *Vsus* cōueniat partibus nihil agentibus: Actio partibus dumtaxat operantibus. Propterea *Vsus* est *ad utendum aptitudo*. Actio verò *motus effectiuus*, seu *actionis effectus*. *Galenus* *libro de differentiis morbor.* *cap. 8.* monet quasdam corporis partes *Vsum* tantum, non Actionem habere, quasdam *Vsum* & Actionem, Alias demum Actionem, & non *Vsum* habere. Vt autem quas *Vsus* discernere Actiones consequentes, ab iis vibus qui per se existunt, nullo pacto dependentes ab actione; hanc regulam proponit *Galenus*, *lib. 1. de vsu partium*, *cap. 9.* Quoties omnium quæ organis insunt vilitatem diligenter examinaturus es, imprimis disquire per quas partes actionem natum fuerit, magna enim ex parte per propriam substantiam inuenies; aliquando ob aliquod ex consequentibus, ut in oculis propter colorem, deinde & aliarum eius particularum vilitatem sigillatim exquires: An scilicet ea propter actionem sit vtilis, an propter eorum aliquid quæ temperamenta consequuntur, ut os propter duritiem. Post hæc autem vnumquodque illorum quæ & totis ipsis organis, & eorum particulis accidit, considerabis; cuiusmodi sunt *positio, magnitudo, connexio, conformatio*. Ex his colligitur quid propriè nomine *Vsus* intelligendum sit.

Interea, notabis ex *Varolio*, *Anatomicos* hallucinari in assignandis partium vibus, cum ad euitanda hæc vel illa incommoda, Naturam hoc vel illo modo partes corporis humani fabricasse scribunt, quum ipsa Natura in conformandis partibus, vsus sibi proposuerit actionibus congruentes, vel vsus necessarios ad essentiam partis constituendam. Sic ratiocinatur *Varolius*. Natura in fabricandis partibus nunquam mouetur ab eo quod est contra naturam: nam præter hoc, quod hæc sententia implicat contradictionem, deridenda esset vtique Natura, si in struendo corpore, à lationibus id præseruare voluisset, mox innumeris præter naturam affectionibus obnoxium produxisset. Scias ergo necessitatem fabricæ partium esse desumptam ab actionibus earum; & ab iis quæ in actionibus supponuntur, necnon has necessariò concomitantur, vel insequuntur, & quauis multi etiam ex primariis veteribus, id quod præter naturam contingenter accidit, pro sine partium frequenter assignauerint: Hoc aliunde non prodijt, nisi quia veram aliquarum partium actionem igno-

rarunt, aut in speculatione rerum naturalium parum accurati fuerunt.

Porrò omnem actionem à similari parte proficisci variis in locis demonstravit *Galenus*, & præsertim *lib. 2. Methodi cap. 6. & cap. 8. lib. 6. de Placitu*, statuit vnamquamque corporis partem, peculiarem habere substantiam, quæ differt à reliquis, Ab ea procedit Actio, ab actione Vfus : à similaribus functiones edi certum est, & cuiusque instrumenti vnam tantum similem, reliquas verò quæ cum hac quoduis instrumentum petitiu, vfus alicuius gratiæ existere, & illius, quæ prima erat actionis causa facta esse. Vt visus instrumentum est CrySTALLINUS humor, reliquæ partes eius causæ factæ sunt ; & quamquam propter crySTALLINUM omnes sint conditæ, singulæ tamen earum aliquam seorsim actionem sunt natæ : Ac vena quidem & arteria, & nervus toti animanti communem, membrana oculi omnes cum sint nutrimenti participes, naturalibus quoque facultatibus sunt præditæ : Ac proinde etiam functionibus, quæ ab his proficiuntur. Longè alia fuit mens & opinio *Aristotelis*, *lib. 8. de partibus animal. cap. 1.* vbi partes similes creatas fuisse propter dissimiles scripsit, à quibus dependent officia & actiones, *ipsa & mouetur*, vt oculi, narium, & faciei totius, item digiti manus, propterea partes organicæ & officiales, & *ipsarum huiusmodi* dicuntur. At ex partibus dissimilaribus aliz sunt sensoriæ, aliz organicæ. In sensoriis sensus actio fit per similes partes, quia quilibet sensus simplex existit, & vnus generis nempe elementi particeps. Nam partes sensorias propriis elementis attribuit, vt aliam ad aërem, aliam ad ignem referat, solum tactum qui omnium qualitatuum particeps est pertinere iudicauit ad partem dissimilem, puta carnem quæ est corpus dissimile. Itaq; existimauit *Aristoteles*, actiones esse supposituram, & composito tribuendas esse, non qualitati simplici, exceptis sensoriis partibus. Quidam dicunt in mortuis non esse querendam partem similem, quæ sit proxima motionis causa, quoniam ex eo quod actio est composita, requirit partem compositam, quæ sit actionis causa.

Hanc controuersiam inter *Aristotelem* & *Galenum*, Viri docti ita componunt, vt Actionis instrumentum adæquatum sit *pars organica*, primariam verò ac præcipuum, *similars aliqua vna*; quæ conciliatio sumitur ex *ipsa Galeno 7. Methodi, cap. 2.* Itaque cum *Aristoteles* Actionem esse organicarum partium scripsit, respexit ad Naturæ propositum, ac finem, quia similes factæ sunt in gratiam organicarum. At *Galenus* respexit ad ordinem generationis, quia partes similes voluit causas esse efficientes actionum. Etenim pars mouens, aut similis est, aut reducit ad similem, & licet ambulatio sit actio crutum partium dissimilium, tamen si distinguas partem mobilem à parte mouente, animaduertes os esse quod mouetur, musculus moueri à aëtuosa parte, & à nervo ipso, vt liceat inscribere primam causam & efficientem huius actionis, esse partem similem. Nam actiones sunt à facultate, facultas consistit in temperamento, & hoc similitudine est. Quare similes partes sunt causæ omnium actionum. Sed de ista questione legendus *Pacius, comment. in methodum Galeni.*

Actiones autem partium sunt, vel *Communes*, vel *Publicæ*, vel *Privata*. Communes dicuntur quæ ab omnibus peræquè obeuntur, cuiusmodi sunt naturales Actiones, nutritio, accretio : Publicæ, quæ referuntur ad vsum aliarum partium, vt Chylotus & Hæmatosis. Privatæ quæ à quibusdam partibus eduntur. Præterea Actiones sunt vel *Actiue*, vel *Passiue*, ex *Galeno, cap. 6. lib. 1. Methodi, & intro lib. 17. de vfu partium*. Ad *passiuam* rtferre licet eam, quæ tantum ad decus & ornatum comparata est, de qua *Galenus, lib. 11. de vfu partium, cap. 13.* *Actiua* dicuntur quæ à se eduntur, *Passiua* quæ ab alio petitiuntur, qualis inest motus ossibus, quæ in brachiis & cruribus sunt, mouenturque à musculis circumiectis. *Passiua* etiam dicuntur in sensibus recipientibus, ex *Galeno, lib. 2. de temperamentis, cap. 2.* In organicis siue compositis partibus quatuor partes integrantes obseruabis: Primariam, per quam actio fit, Alteram, per quam actio melior efficitur. Tertiam, sine qua non potest actio fieri. Quartam, quæ facit ad conseruationem, ex *Galeno lib. 1. de vfu part.* Idem monet in historia partium tradenda, ab iis quæ toti organo communia sunt inchoandum esse, quibus subnecti debent quæ singulis partibus eiusdem organi propria sunt. Ceterum, in discursu Anatomico alicuius partis, à conformatione exordendum esse docuit *Galenus, lib. 2. cap. 7. de vfu part.* Actionem cuiusque particulæ, & ante hanc constructionem totam exadè scire oportet, ea quæ in dissensionibus corporum apparent inspicendo ipsis oculis diligenter : Nam utilitates particularum nullo negotio inuenies, ab ipsa doctus Natura, si solum noueris exactè constructionem. Historia partis vel Actionem indicat, vel demonstra-

tiones suppeditat ad eius inuentionem, ex *Galeno lib. 8. Administrationum Anatomicarum, cap. 1.* Idem quoque scripsit *Aristoteles, lib. 1. de histor. animal. c. 6.* præcedere oportet, si methodo sunt tractandæ animalium partes, historiam singularum: hinc enim patere quibus de rebus, & ex quibus demonstrationes effici queant: & *lib. 1. de partib. animal. cap. 1.* ait debere Physicum non secus ac Astronomum primùm ea intrueri, quæ apparent in animalium genere, partesque singulas explorare, dein verò cur ita hæc sint causas reddere. Idem *Aristoteles* prudenter distinxit *lib. de hist. animal.* in quibus tantùm structura partium declaratur, à libris *de partibus*, in quibus Actiones & Vfus partium exponuntur: Eam ob rem olim ista non vno loco & tempore tradebantur, nam puer discebat domi Historiam partium omnium, in schola verò earundem Actiones & Vsum. Et quoniam in historia partium præsertim internarum, sæpe auditur origo partium, quam putaret aliquis me insciēter prætermisisse, eam ad connexionem reuoco.

Interim monebo multas inutiles quæstiones moueri de origine partium: quandoquidem, vt rectè notauit *Galenus, lib. 3. Admin. Anat.* singulæ partes similes ex materia quæ animanti subiecta est, tales à natura finguntur, quales sunt, neque cubitus ex brachio, sicuti nervus ex cerebro oritur, quippe non parum differunt cohærescere cuiquam, vel ex illo oriri. Nam quod ex aliquo nascitur, eui ipsius quædam propago substantiæ, eiusdem speciei cum origine sua esse oportet. Cæterum ordinem quem præscripsit *Galenus* in explicanda partium historia, hoc libro non obseruavi, quoniam instar *Adversariorum* istud opus subinde contextui & adornavi, in *variis Editionibus*, crescente materia, ad vsum Medicinæ tam Theoreticæ, quàm Practicæ reuocaui. Methodicam illam corporis humani descriptionem ad vsum *quædamque*, in publicis spectaculis Anatomicis, sequar & adiiciam in *Enchiridio Anatomico*.

### Finis Libri primi.





# IOANNIS RIOLANI

## ANTHROPOGRAPHIÆ LIBER SECVNDVS.

### TOTIVS CORPORIS DIVISIO.

#### CAPVT PRIMVM.

**Q**UAMADMODVM *Geographi* Vniuersum terrarum Orbem descri-  
pturi, ab eius generali diuisione incipiunt: ita nos qui Microcof-  
mum, *Hominem* intelligo, mente, & manu perlustrare intendimus,  
conuenit ab illius partitione exordiri. Vt autem Mundus diuiditur  
in quatuor partes, *Asiam, Europam, Africam, & Americam*, & qua-  
tuor magnis fluminibus à Paradiso fluentibus irrigatur vniuersa  
terra, sic omnes diuisiones Corporis humani ad eum numerum reuocantur. Inter va-  
rias quæ circumferuntur, prima est *Diocles Carystii*, (apud *Paulum Æginetam lib. 1. cap.*  
*100. Marcellus Empiricus* falso hanc epistolam attribuit *Hippocrati*.) In *Caput, Thora-*  
*cem, Ventrem, & Vescicam*: quæ mihi non videtur *Anatomica*, quum *Artus* non com-  
prehendat, sed *Therapeutica*. Siquidem hæc epistolâ *Diocles* pro fundamento consti-  
tuit, Morbos potissimum in quatuor istis cavitatibus procreari, ex humorum afflu-  
xu & collectione: atque secundum eas cavitates proponit *Antigonus Rexi* medicamen-  
ta, expurgandis & exhauriendis humoribus accommodata. Quomodo *Fernelius* in  
sua *Methodo medendi*, corpus vniuersum distinxit in *Regiones Publicas, & Primarias*,  
imitatione *Galeni*, cap. 2. lib. 1. & *Alma*, quum agit de vi purgatrice *Aloës*: & lib. 7.  
*Methodi*, cap. 21. & lib. 13. cap. 15. *Egyptii Medici*, qui pariter erant periti *Anatomici*,  
totum corpus diuiserunt in *Caput, Thoracem, Manus, & Crura*, referente *Herodoto*,  
*Introductorij* cap. 10. Thoracis nomine intelligebant corporis Truncum, qui à clavicu-  
lis vsque ad pubem extenditur. Huic diuisioni respondet ea, quam adduxit *Galenus*  
lib. de inæquali intemperie, cap. 5. vbi Corpus Humanum diuidit in *Pederis, Manus, Ca-*  
*pui, Thoracem, & Ventrem inferiorem*: quam diuisionem sequuti sunt omnes *Anato-*  
*mici*, Collum præmittentes; quod vel est pars separata, vel ad aliquam referri  
debet. At *Galenus* Collum partem esse distinctam à Thorace & Capite, variis in  
locis demonstrauit. Nam Caput vertice & primâ colli vertebrâ circumscribit. *Hip-*  
*perates* Caput collo insidete scripsit, libro de Glandulis. Thorax, antihora *Galeno*, su-  
G

pernè clauiculis, infernè nothis costis terminatur, quinetiam *Aristoteles, lib. 1. de hist. anim. cap. 7.* Collum à capite & thorace distinxit: ergo Collum diuersam partem constituit, quam *Ruffus Ephesius* in sua corporis humani diuisione diligenter expressit: In *Caput, Collum, Thoracem, & Artus.* Cùm autem Collum sit pars racheos, quæ Truncum corporis efformat; non ineptè corpus diuideretur in *Caput, Truncum, & Artus.* Trunci tres sunt partes, *Collum, Thorax, & Venter,* quæ duæ postremæ partes quia eazum, *ventres* ab *Hippocrate* dicuntur: quod ex *Galeno* comprobatur *lib. 4. Methodi, cap. 6.* diuiso quod intet collum & crura est trunco in duas capacitates maximas, superior in thorace, inferior in membrana peritonæo consistit. Id etiam aptius explicat *comment. ad part. 112. lib. 4. de Dieta acutorum.* Veteres *Thoracem* interdum ventrem superiorem appellant; alimenti verò receptaculum omne, quod à septo transuerso est, ventrem inferiorem. At nullibi legitur apud *Hippocratem*, Ventris nomine caput insignitum fuisse. Nihilominus *Erotianus* cerebri cavitates *uuias* vocat. *Philatheus comment. ad Aph. 12 lib. 1.* hanc discordiam ita conciliat, *uuias* vocant eam quæ cibis capiti partem, tum & omnem cavitatem in profundo sitam, uti cerebri, cordis, aliarumque partium. *Aristoteles cap. 7. lib. 1. de historia animalium,* maximas partes in quas secatur Corpus humanum, constituit *Caput, Collum, Thoracem, Brachia duo, & Crura duo.* Thoracem vocat aluèum illum qui à Collo ad pudenda vsque protrahitur. Idem *Philosophus, cap. 1. & 2. lib. de iuuentute,* Animalia in quatuor partes dirimit. Prima est quæ sumitur alimentum, nempe *Caput:* Altera, quæ detruditur excrementum, putà *Venter:* Tertia media inter vtramque, *Thorax* est; addit membra quæ quibuldam animalibus data sunt ad incessum, itaut hæc diuisio sit quadripartita, quam passim sequitur *libri de partibus, & generatione animal. & problemate 9. scil. 11.* vbi tres corporis partes principes esse statuit, *Caput, Thoracem, & Ventrem.* Quod expressit *lib. 2. de partibus animalium, cap. 10.* At *sub finem Physiognomiae,* quatuor corporis principalissimos locos, *Encephalon* vniue constituit, in quibus elucent signa. Principalissimus locus est circa oculos, frontem, caput, & faciem. Secundus autem circa pectus, & scapulas. Tertius circa crura & pedes, postremus circa ventrem minimus est. *Hippocrates lib. 1. de Dieta* scribit administrari vitam nostram à calore natiuo vitali, ad *impuerum* si *impuerum*, ad imitationem vniuersi, ut eadem vtrobiq; sit habitudo & proportio, *μῆκος καὶ πλάτος, & μῆκος καὶ πλάτος.* Itaque ex simplici calore, qui nostrum corpus gubernat, tres Corporis regiones constituit. In superiore calor residet, astrorum congenies in media calor consistit, Solari similis; in regione infima calor continetur eiusdem facultatis cum Lunari. Aliter *Hippocrates, libro de Insomniis,* in tres partes diuidit Corpus secundum astrorum naturam. *Astris,* exterior in corpore circuitus respondet. *Soli,* Medius: *Luna,* concanitas corporis interna. Hanc hamani corporis triplicem partitionem *Hippocrates* ab *Egyptiis* sacerdotibus hauserat, qui hominem mundo similem esse credebant, ideoque mundi tres regiones, *Elementarem, Ætheream, & Caelestem,* tribus nostri corporis regionibus assimilarunt. *Venter inferior* Elementarem regionem refert, in qua sola fit generatio & corruptio; *Thorax,* quia partes vitales comprehendit, calore vitali æstuant, *Ætheream* regionem repræsentat, *Caput, Caelestem,* quæ intelligibili natura prædita est. Sapienter igitur *Aristoteles, libro primo de hist. animal.* corporis nostri partes, tam superiores quàm inferiores, ad situm vniuersi dispositas esse prodidit. Eleganter *Leo Hebraeus, Italus, Dialogo 2. de amore,* similitudinem trium regionum corporis, cum tribus regionibus mundi demonstrat.

## VENTRIS INFERIORIS DIVISIO.

### CAPVT II.



ICTORIS & Medici in delineando corpore humano dispar est institutum. Nam qui corporum formas æmulatur, postpositis, quæ reliqua sunt, ante omnia effigiat modum Capitis, nec in alia membra prius lineas destinat, quàm ab ipsa, ut ita dixerim, figurarum arce auspiciū faciat inchoandi: At verò Medicus, qui per Anatomem, siue dissectionem rimatur structuram corporis, vnde sectionis sumit ex-

ordium inde sermonis facit initium, ideoque moris est apud nos sectionem cadaueris inchoare à ventre inferiore, quia partes quas continet citius putrent & foetent: propterea Hippocrates, *πρὸς τὸν ἀνδρῶνα* vocat. Galenus verò dissectionis alium ordinem indicauit, atque sequutus est. Nam *libris Admin. Anatomic.* incipit à manu. Respondet *Galenum libris Admin. Anatomic.* ad imitationem *libri de usu partium* composuisse, vt aperte fateatur *initio lib. 6.* sed cùm operi manum admovebat, à ventre inferiore Hippocrates inchoasse, vt manifestè docet *libro quinto capite sexto.* Memini me omnes, inquit, abdominis musculos cùm primùm simia fuerat strangulata incidisse, mox ventriculū, intestina, iecur, lienem, renes, vesicam, &c. demonstrasse. Atque hæc primo die expediebam, ne diutiùs asseruata compatrescerent, postea relicto thorace, manus aggrediebar Anatomem. Nos verò vulgatum secandi consuetudinem sequemur.

Venter, *μῆτερ*, *ἡ μήτηρ*, quod cæcus sit, *μήτηρ* quoque dicitur, quod specialius ac verius de ipso Ventriculo ciborum conceptaculo usurpatur; forsan *μήτηρ* *ἡ μήτηρ*, quod eius beneficio & esse, & viuere datur animali, vel *μήτηρ* *ἡ μήτηρ*. idem sonat, quòd *μήτηρ*, quoniam esculenta & potulenta suscipit. Tunc locus *μήτηρ*, *ἡ μήτηρ*. est hic digamma *ἔσθιον*, inde Latinum *venter*, quod nomen deriuant ab *utero*.

Venter autem inferior consideratur, prout est integer & indiuisus, vel quatenus dissectioni subiicitur, in partes membraque diremptus. In toto & integro abdomine obseruabis Substantiam, Figuram, Ambitum, & Compositionem. Ventris Substantia mollis & carnea facta est, vt liberè contrahi & distendi possit ob alimenti coctionem; constringi & arctari ad excrementorum expulsionem; dilatari ad foetus gestationem, ex *Aristotele, cap. 9. lib. 2. & cap. 10. lib. 4. de partibus animalium*, quem sequutus est Galenus, *lib. 14. de usu part.*

Ventris figura diuersa est à reliquis animantibus, quam primus indicauit Hippocrates, *sect. 3. de art. part. 47.* Homo pro magnitudine corporis ventrem habet angustissimum, à posteriori parte, in priorem, præcipuè ad thoracem. Ventris cauitas duplex est, septo Peritonæi discussa, maior partes nutritias continet, minor cauitas in imo hypogastrio sita, & duplicatura peritonæi inclusa, vesicam & partes genitales in viris comprehendit, & in mulieribus, quæ nunquam vtero gestarunt, etiam ipsam vterum complectitur, ad fundum vesicæ reflexum & adherentem.

Ambitus ventris, supernè diaphragmate, infernè ossibus ilium & pubis circumscribitur. Hæc amplitudo in tres regiones distinguitur ad doctrinæ Anatomicæ facilitatem, & partium affectuum discrimen. Regentiores Anatomici superiorem Regionem, *Epigastrium* vocant, Mediam regionem supra & infra vmbilicum tres digitos æquantem, *Vmbilicalem* appellant, inferiorem regionem, *Hypogastrium*. Primus Galenus hanc ventris diuisionem proposuit, *comm. ad Aphor. 15. lib. 2.* sed aliis nominibus expressit. Partem superiorem appellat *ὑπερμετρῆν*, Mediam *ἰσχυρὰν*, inferiorem vocat *ὑπομετρῆν*, quod videtur desumptum ex Hippocrate, in *Coacis*.

Ipsemet Galenus, *libro quinto Administ. Anatomic.* Ventrem diremptum esse scribit per lineam candidam, cuius centrum est *Vmbilicum*, atque ita ventrem in tres regiones distinguit, *Superiorem, Mediam, & Inferiorem*, in quibus dexteras & sinistras partes obseruari voluit, quas quidem propriis nominibus non appellat, sed *cap. 7.* Ventrem inferiorem diuidit in partes *Sublimes & Profundas*: *Sublimes* nominat, quæ sunt supra vmbilicum, *Profundas* quæ infra consistunt; quod videtur ex *Aphorismo 7. lib. 6.* desumptum, *dolores & tumores ventris sublimes leuiores, qui verò non sublimes fortiores.* Galenus in *comment.* dolores sublimes & profundos distinguit, membrana Peritonæo, ita vt dolores in partibus Peritonæo supericæ sint sublimes, in partibus Peritonæi ambitu comprehensis, profundi dicantur. Rursum in istis regionibus partes inferiores considerat secundum longitudinem & profunditatem ventris, quod est ab Anatomico diligenter obseruandum. *Ruffus Ephesus libro secundo*, Ventrem in tres Regiones dirimit, superiorem appellat *Stomachalem*, mediam *Vmbilicalem*, inferiorem *Hypogastricam*: quæ diuisio mihi magis probatur, quàm si superior regio *Epigastrium* nominaretur, quo nomine totus venter, vel illius partes externæ designantur à Galeno. Eleganter *Aristoteles, libro primo de historia animalium*, Ventris regiones ita distinguit. Ventris radix est *Vmbilicus*, *ἰσχυρὰν*,

quod radici subest, duplex est, & ille, *hæpar* nuncupatur. Quod vnicum est sub vmbilico *in*, cuius pars extrema pubes, *Pennis*. Quod supra vmbilicum est, *Camphora*. Huic autem & illis commune, *panis*, in parte posteriori ad cincturam lumbus, *im*, quasi *im*, æquali magnitudine, propterea quod carnes æquali pondete, figurâ & mensurâ cognatæ sunt.

Ventrem autem inferiorem constituentes partes diuiduntur à *Galen*o, in *Externas*, & *Internas*; per Externas intelligit Cutim & Membranam carnosam. Reliquæ partes sunt *Internæ*, quæ triplices existunt apud *Galenum*, Quædam destinatæ sunt coquendis & excipiendis alimentis. Aliæ sunt excrementorum conceptacula. Aliæ vacuationi excrementorum inseruiunt, retinendo vel expellendo: retinent ani & vesicæ muscoli, expellunt muscoli abdominis, & ad 3. ordinem partiū internatum reuocari debent. Accuratio est hæc diuisio partium Ventris Inferioris, in *Continentes* & *Contentas*. Quæ quidem diuisio proposita fuit ab *Anonymo Græco*, & hoc ordine distribuit, vt prima sit *Cuticula*, postea *Cutis*, cui succedunt *Adiposus*, & *Panniculus Carnosus*, tandem subnequit *Musculus*. Huic diuisioni partium *Continentium* & *Contentarum*, *Carpus* adiecit *Continentes* esse *Communes*, & *Proprias*. Videtur ista diuisio partium in continentes & contentas, desumpta ex *Hippocrate*, qui Corpus diuidit in *Continentia*, *Contenta*, & *Impellentia*, in *igida*, *igida*, & *inimura*, quamuis aliter *Galenus* interpretetur. Continentes autem sunt *Communes*, *Proprie*, & *Alienæ*. Communes sunt quinque, *Cuticula*, *Cutis*, *Membrana Adiposa*, *Membrana Carnosa*, & *Communis musculorum tunica*. *Propria* sunt tres, aliz *Carnæ*, vt muscoli decem abdominis, aliz *Membranosæ*, vt Peritonæum, aliz *Offes*, vt nothæ costæ, lumborum vertebrae, ossa pubis & ilium, atque os sacrum. *Alienæ partes* sunt muscoli lumborum & dorsi, ossibus vertebratis foris & intus incumbentes, qui licet cum vertebris parte postica rotunditatem ventris efforment, tamen ad alias partes referuntur. Porro, inferiores & nothas costas ad ventrem inferiorem pertinere faciliè probatur ex *Hippocrate*. Nam *sect. 3. de art.* iubet, vt in fractura notharum costarum, ægri liberaliùs alantur; vt distentus Ventriculus extorsum costas propellat, & *libro quinto Epid.* Mallienis, cui onustus cutrus costas intus depressoerat, fregeratque, sequuta est egro collectio puris intra fractas costas; hic vltus fuit in regione Lienis. Videtis & Ventriculum & Lienem nothis costis cingi, & sub his contineri. Quæ quidem partes *Camphora* Græcis dicuntur. Hæc vt perfectam sanitarem testentur, debent ex *Hippocrate* in *Prognosticis*, esse *molles*, *indolentes*, *agnabiles*, & *carnosæ*, propterea quæ à Medicis diligenter tactu, & respirandi facilitare exploranda sunt. Præterea scripsit *Præceptor 35. Aphorif. lib. 2.* in quouis morbo partes ad vmbilicum & imum ventrem attinentes, crassitudinem habere melius esse, multum verò extenuari & contabescere prauum; quia partes vicinæ & propinquæ, primæ pinguescunt, dum primæ fruuntur alimento, ex *Aristotele, sect. 5. probl. 4. & 14.* Quod si ventrem macrescere contingat, partes nutritias labefactari licet conicere. Ratione huius carnositatis & adipositatis externæ, ventrem ambientis, *Venter* sæpius est obnoxius abscessibus, dum instar spongiæ ebibit & excipit impuritates Hepatis secundum ductum vmbilicalis venæ, duplicato Peritonæo inclusæ, & præsertim Renum suppuratorum. Istorum abscessuum qui formantur in musculis abdominis mentionem fecit *Galenus libro quinto de locis affectis*, & exemplum affert *Stesiani*, qui passus fuerat similem abscessum: ideoque cæterni dolores abdominis diuturni & acerbissimi, diligenter à Medicis obseruandi sunt, ad dignoscendum præsentem, aut futurum in his partibus abscessum.



## VENTRIS INFERIORIS PRIMA

## Administratio:

## CAPVT III.

**D**ESCRIPTA & obseruata Ventr̃ inferioris diuisione in suas Regiones, pl̃es hypogastrii & pectoris, ne aciem scalpelli obtundant eradere oportet, deinde Vmbilicũ profunda scissione circũnabis, libro quinto admin. qui vt contexti perfectique corporis postremum opus est, sic principium est reuexendi & dissecandi: & ne in præparatione succedentium partium obliuescat, traiecit̃a acu obliqua filo religabis: postea rectam scissionem duces à media parte sterni ad cartilaginem xyphoidem, quam vsque ad commissuram osium pubis continuabis. Postea ab vmbilica scissionem aliam transversam protrahes versus lumbos. His peractis scissionibus, angulum cutis alterutrum prope vmbilicũ sinistra manu eriges, dextra verò acutissimo scalpello instructa, cutim à subiecta pinguedine separabis, donec dimidius ventris adeps compareat vsque ad mammillas, quam operationem Herophilus *diuina* appellauit: ea fieri debet auctore Galeno; libro tertio administ. scissione mediocri, qua reliquis corporibus atrectandis maxime conuenit. Scissionem mediorẽ vocat iste, quia nihil cutis insectum relinquit, nec tamen membranam subiectam incidit, sed magis expedit scalpellũ in adipem quàm in cutem demittere. Hæc administratio longa & operosa, industriũ & laboris patientem requirit Anatomicũ, memento Galeno, libro tertio, nec discipulis committenda, ne quid vitetur & laceretur, sed ab ipso præceptore perficienda est. In pingui corpore & muliebri facili separatur cutis ab adipe subiecta. Cutis ab adipe diuisa ad latera retrahetur, atque vt epidermidem ostendas, manu subtus admoda, scalpellũ acutissimũ in cutis superficiem leniter imprimet, vt portionem ibidẽ eradere queas, vel candellam ardentem cuti admodicũ, sic resoluta cuticula ignis vi, instar vesicæ abscedit.

## DE CUTICULA.

## CAPVT IV.

**G**ALENVS Cuticulam, membranam vocat toti vetæ cuti superiectam. Alibi impropiè cutis superficiem appellat, quia superficies est de essentia corporis, nec ab eo actu separari potest, nisi mentis opeta. Obiiciet aliquis, si membrana est, ergo neruosa; si neruosa, sensus erit particeps. *Carolus Stephanus* illi sensum obtrufum tribuit. *Galenus* omnem sensum ei detrahit, quoniam excrementitia vt pilus: deinde morbis obnoxia est, ac proinde actionem exerceat: quia morbus est affectus præter naturam, actionem primò ac per se ledens. Nam lepra, p̃sora, scabies, exanthemata sunt affectus huius membranæ, auctore Galeno. Turpitudines vocat *Hippocrates*, non morbos: sipe sunt abscessus potiùs quàm morbi, vt ipse declarat *Hippocrates*, vltima sententi. Pruritus, Macularum quæ cutem decurrant subiectum esse creditur, quas tamen aliũs inhxere scribit *Galenus*, propterea vesicantem esse periculosam ad eradendas & delendas istas maculas. Quamuis id olim à vetulis factitatum legatur apud Authores, vt cutis noua & splendidior renasceretur, in locum vetris exuij.

*Tollere tunc cura est, albos à stirpe capillos,*

*Et faciem dempta pelle, referre nouam.*

Vnde & quomodo generetur Cuticula non conuenit inter Authores; si fateamur esse cutis superficiem exsiccata, eiusdem erit naturæ cum cute, ac proinde spermatica erit, quod est absurdum. Dicerem potius in fœtu produci ab excrementis humidis & viscidis tertix coctionis, quæ sitin habitu corporis, & circumfusi fœti frigore condensari, ac in eam consistentiam conuerti. Multi arbitrantur non

antè, cuticulam gigni, quàm foetus in lucem prodierit. Quod ab *Hippocrate* prius obseruatum fuit, libro de principijs, extremum corporis ad aerem conuersum necessariò pellisulam induit p̄x frigido, & ventis impellentibus. Verùm docet *Galenus* libro de formatione fetus, cutim post delineationem trium partium principium, reliquis priorem conformari. Quum autem incipit nutrirì cutis, ab illius excremento vaporoso, tum generatur Cuticula, quæ partim in abortiuis foetibus conspicua est, quoties ab vniuerso corpore humoris acrimoniâ eraditur, partim in laborioso & difficili puerperio, dum infans violentè eluctatur, instar serpentis illo exuuiò spoliatur. Id apertius declarabo exemplo *Aethiopum*, quorum infantes ex vtero, cutis nigredinem secum adferunt. At nigredo illa solam cuticulam inficit, vt nuper in *Aethiops* ad Anatomen dissecto vidimus: subiecta cutis niue candidior apparebat. Ergo in vtero generatur Cuticula, & qui sine ea nascuntur, infeliciter viuunt, donec producta fuerit. Quum *Ludouicus*, Vngariæ & Bohemiæ Rex sine cuticula natus esset, eaque inundionibus enata, vel adolescens canos alebat capillos. Itaque ex alimento cutis partiumque subiectarum residuum excrementum toris instar exudans, contactu frigidioris aeris in superficie corporis instar pelliculæ concreuit. Id exemplo vlcis maligni & dyssepulorici probatur, quod deterfis sordibus si exponatur aëri, facilius & ocyus ad cicatricem perducitur cuticulæ regeneratione, quàm ope medicamentorum. Tres igitur causæ ad generationem Cuticulæ concurrunt, *Materialis*, scilicet vapor oleosus ac viscidus: *Efficiens* causa, duplex, interna, putà calor viscerum & cæterarum partium, eleuans & propellens hunc vaporem oleosum & viscidum. *Externa* est frigus externum condensans, quæ quidem causæ prout intensiores aut remissiores fuerint, ita crassior aut tenuior erit Cuticula.

Hæc omnia veterum auctoritate probari possunt, ac imprimis eleganter *Anonymus Græcus* ex *Aristotele*, libro tertio de historia animal. Cuticulæ generationem exponit. Cui libet Cuti, inquit, mucosus quidam lentor inhæret, fitque Cuticula, quemadmodum in polentis crustula, quam vetulam indigetant; neque solùm generatio eius propter externum frigus euenit, sed etiam quia lentor quidam residet, qui non potest euaporari. Sed *Aristoteles*, lib. de generat. animal. & sect. 10. probl. 29. videtur hæc referre ad Cutis generationem. Huic opinioni ad stipulat *Hieronymus Senex*, siue *Fabricius* ab *Aquapendente*, libello de animalis integumentis, & modum generationis Cuticulæ censet ex *Aristotele* elici posse, tum problem. 29. sect. 10. tum lib. 2. de generat. animal. cap. 2. & 4. vbi notat Cutim carne sicciscente produci, quomodo in polentis crustula, siue *xu*, quæ densatæ corrugatæque polentæ superficies est. At Cutis nomine etiam Cuticulam comprehendit *Aristoteles*, ideoque Cuticula ex humida & viscida vaporatione procreatur, quæ exterius siccescit, refrigeratur, concreuitque e contrario, quo pili formantur ex sicca vaporacione. Nam sicut è terra Solis calore duplex eleuatur exhalatio, humida scilicet & sicca: sic à nostra substantia, virtute caloris interni & innati duplex attollitur vapor, humidus & siccus, ex sicco pili generantur, ex humido Cuticula; & cum istud humidum sit lentum & viscidum, idcirco non potest euaporari, & in Cutis superficiem exsudans adhærescit, atque appulsu frigoris Cuti agglutinatur, ac in membranam concreuit. *Fabricius* aliquando sub vesicante medicamento duplicem Cuticulam obseruauit, exteriorem, & interiorem, ambas quidem tenuissimas, sed interiorem longè tenuiorem, quæ Cuti tenacissimè adhærescit, nec scalpitu deraditur. Fit autem ex vapore humido & viscoso, ex subiectis partibus ad superficiem per calorem euaporante, exterior verò producit ex crasso tertie coctionis excremento in ambitu & superficie adhærescente, quæ scalpitu potest auferri, nullum præbet vsum, sed ex necessitate materię ortum habet, & in pelliculam concreuit. Duplicatam esse Cuticulam voluit *Fabricius*, vt cum externis iniuriis passim sit exposita, vnâ pereunte, altera superstes ad proprios vsus remaneat, ac sufficiat. Vt Cutis rara & porosa est, sic Cuticula densa, & imperuia cernitur: eius densitatem produunt illæ pustulæ *spæ* dictæ, quarum humor per poros Cutis exudans, intra Cuticulam prohibetur: & sicuti Cuticula bene curata & exornata corpori decus & venustatem conciliat, sic pustulis exasperata, maculis fœdara, vel exusta personam de-  
decorat.

## D E C U T E.

## CAPVT V.

**E**XTERNVM corporis inuolucrum in brutis animantibus *CORIVM* vocatur, in homine *CUTIS*, quæ quoniam soli competit homini, ab *Herodoto* appellatur *αἰματιον*, referente *Pelluce*. Est autem *Cutis* commune totius corporis integumentum, quod Græcis *δύμ* dicitur, propter facilem excoriationem, vt imperitus, & temerarius ille Medicus *Manes* Hæresarcha apud *Cedrenum* & *Socratem*, in *historia Ecclesiastica*, & *Sisamnes* iniquissimus Iudex apud *Herodotum*, libro primo, vitæ suæ periculo experti sunt. Apud *Aegyptios*, grassatores viuui Corio spoliabantur, si credimus *Leoni Africano*. *δύμ* etiam dicitur quasi *δύμνα*, primâ mutatâ litterâ, quasi terminus Corporis, quia circumfensa, siue *δύμ*, vel *δύμνα*, quod vinculum seu ligamentum corporis sit. Latinis *Cutis* dicitur, quod Græcis *κνήμ* detracto sibilò, sic scuta cute obducta, vel *κνήμ*, quoniam capit & inuoluit, inde *Cutis* ex *Scaligero*. Pellis etiam dicitur, vel à pellendis iniuriis, vel quia pilosa euadit. Sed propriè *pellis* est cutis euulsa, & *Iunonialis* videtur vtrumque distinguere.

*Disimilemque suæ deformem pro cute pellim.*

Substantiam habet ab aliis membranis diuersam, qualem in toto corpore non reperias, ex semine & sanguine simul mixtis constata: ita tamen vt semini lenta sequeatur portio, quæ distendi queat, prædominetur, ex qua spermatica sudicatur.

Cùm igitur à semine ortum suum trahat, primaque partium in fœtu producat, si credimus *Galeno*, non potest ex carne siccata procreari, vt statuit *Aristoteles*, libro de respirat. c. 6. quod repetit *scilicet* 10. probl. 29. Vbi tradit cutem in brutis partem esse distinctam à carne, in homine verò, esse affectionem ipsius carnis quasi superficiem carnis exsiccata, vt in polenta aëris frigore, crustula generatur. Verum, cutis manifestè secreta est à carne, quoniam interiectam habet pinguedinem, & à subiectis carnibus facili diuellitur, quod neuiquam accideret, si carnis esset superficies exsiccata: fateor tamen in magnis cicatricibus deficiente adipe, Cutim adhærescere carni. Forsan *Aristoteles* respexit ad Cutem fœtus, & pueri recens editi, cuius cutis immediatè cohæret carnosæ membranæ sine vilo adipe subcutaneo interiecto. Multò minùs potest efformari Cutis ex arteriis, venis & nervis in extremitate corporis dilatatis, vt opinatus est *Colambus*; *Varolius* dilatationem illam vasorum ad nervos solos contrahit, quorum filamenta sanguinis infarctu oppleta, in membranam cutaneam degenerant, sicuti folia nymphæ ex tenui pediculo expanso generari solent. Huius opinionis liceret auctorem *Galenum* aduocare, qui in definitionibus Medicis, Cutim definit, corpus nervosum totius corporis superficiei exornans. Alibi, Cutem, nervum sanguine pradium appellat. Certum est Cutim, vt esset tactus instrumentum, plurium nervorum extremitates excipere, quomodo nullos habeat peculiare, vt notavit *Galenus*. Cutis, inquit *Hippocrates*, libro de humeribus, quia coniuncta nervo, caliditatem & frigiditatem patitur. Quare non est audiendus *Aristoteles*, libro tertio de hist. animal. cap. 11. Cutim sensu destituens, ac si carnis subditæ dumtaxat beneficio Cutis sentiret. Sed de Cute capitis intelligendus est, cui caro nulla subiecta est, inter Os & Cutem interposita. Ac sane Cutis capitis obtusius sentit; quia durior est, ac frigidior alia Cute. Ideoque medicamentis siccis, & calidioribus delectatur, ne calor eius exoluatur, si credimus *Fallopio*, lib. de vulncribus Capitis. Cutim fibrosam esse filamentis innumeris intertextam inde patet, quod in puerperis ubi per graviditatem nimium extensa fuit, vix aut nunquam pristinam tensionem recipit.

Quamvis crassa sit eius substantia, non constat tamen ex duabus pelliculis, vt contendit *N. Massa*, qui Cutem veram duplicem constituit, interiorem, candidam & mollem: Externam, duriorē, quas acie Nouaculæ aptè diuidi & secari posse sustinet.

Perpetuo contextu vniuersum corpus instar vestis tegit & inuoluit, ab eoque figuram mutuatur, cùm pullam habeat propriam: hic æqualis, illic inæqualis existens,

Continua est, nisi ubi meatibus naturalibus datur exitus. Ex Galeno, libro primo simplic. cap. 12. Cutis statim à primo ortu sibi continua, temporis progressu perforatur instar cribri, porosa & ubique foraminulenta, ut permittat insensilem transpirationem sudorum, & fuliginum excretionem. Falsum est quod scripsit Galenus, libro de utilitate respirationis, poros Cutis venas esse subtilissimas, quæ à crassis venis procedunt. Ratione eiusmodi porositatæ scriptum est ab Hippocrate, libro de locis in homine, interiora corporis densiora esse, exteriora verò rariora, quod etiam confirmavit libro 6. Epid. qui verò Cutem raram habent, & frequentioribus poris peruiam, ab internis minus læduntur. At densam cutem habentes magis offenduntur ab internis, minus ab externis, iudicio Hippocratis. Idem Præceptor scripsit scilicet, 6. lib. 6. Epidem. quod Cutis raritas ventris constipationem inducit, quia tali cute præditi sudore diffuunt, ideoque ficcior & seignior remanet alius, vitis autem rariorem esse cutem pilis indicat, ex Aph. 69. lib. 5.

Hæc Cutis spiracula non apparent, quia epidermidis circumiecta occaecata, in excoriata sunt inspicienda. In humida cute minus patet, quam in arefacta, quoniam absorpto humore quo madefcebat, tenuis ac pellucida euadit, ut ex ea quondam Perserum Regem usum fuisse ad fenestras referat Orisius comment. in Aphor. Hipp. ut recitat Amatus Lusitanus, Cent. 4. curat. 100.

Sed in ista tenuitate tantum robur obtinet, ut ex pelle humana Zischke Bohemi, velut ex corio belluino, Tympanum resonans confectum fuerit, uti docet Aeneas Sylvius. Pellionum arte apparata crassa & intus tomentosa euadit, similis omnino pelli ceruinæ, ex qua chirothecæ parantur, teste Amato Lusitano, loco citato. Nolque prorsus similes pelles humanas vidimus. Inter omnia coria, inquit Herodotus, lib. 4. humanum & crassum maximè, & candore splendidum. Multi apud Sythas, totos homines excoriatos, & super ligna extensos supra equos circumferunt, alij pro amictulis vtuntur.

Porrò, Cutis Actio est Tactus, cuius præcipuum organum censetur, si sensus omnes sint potius actiui, quam passivi, nam qualitates Tactiles Cutis diiudicat, & excellentius Cutis manûs.

Vfus est vniuersum corpus instar vestis amictire & inuoluere, & per accidens, commune est totius corporis emissarium, & emunctorium, ad expurgationem sordium & impuritarum tenuiorum, quæ in habitum corporis amandantur, ex Galeno, libro de causis morbi. c. 6. Adde cutem esse officiale membrum respectu pilorum, quos alit & educat. Ideoque post pilos Aristoteles agit de cute, lib. 3. de hist. animal. & ibidem notat cutem inter animalia tenuissimam habere hominem, si cum eius magnitudine conferas, quod repetit cap. 2. lib. 3. de generat. animal. Cutis verò tenuitas & imbecillitas causæ sunt, ut solus homo vitiliginetentetur, & detineatur, ut docet Aristoteles, probl. 5. sect. 10.

## DE MEMBRANA ADIPIOSA, ET CARNOSA, sive Adipocarnosa.

### CAPVT VI.

**R**IVISQVAM membrana adiposa historiam Anatomicam pertexam, pauca de Aderis sunt præmittenda, ut intelligamus & pernoscamus adipis subcutanei naturam & conditionem. Apud Aristot. lib. 2. de partibus animal. cap. 5. & lib. 3. de hist. animal. nat. & m. 1. Aderis & pinguedo differunt, quod Aderis siccor sit, & in sicciouibus animalibus generetur, ut in cornigeris, Pinguedo humidior & in humidioribus concreseat, ut in sue, quod etiam à Galeno confessum & probatum fuit; propterea ex eodem Philosopho, Pinguedo inter cutem & carnem continetur, Aderis in fine carnis semper, ideoque Pinguedo dicitur in abdomine, aliisque locis externis corporis, Aderis in Epiplois, Renibus, Mesarzo, Oculis & Corde.

Dubitare posset aliquis an Aderis dici debeat, & ad eius naturam referri, substantia illi adiposa duriuscula articulis circumiecta, & quæ in planta pedis reperitur? Adipem induratum & exsiccatum possis appellare.

Adeps pro varia partium natura, vbi concrefcit & cumulatut diuerfos obtinet v-  
fus, In nati bus ad fedendi commoditatem molle puluinar præbet: Circumfufus toti  
corpori inftar veftis calefacit, & refrigerat. Calefacit dum exhalationem caloris na-  
turi prohibet, refrigerat æftate dum externi caloris penetrationem impedit. Per ine-  
dias in alimentum facelfit.

Ex qua materia generetur *Adeps*, & à quo efficiente producatut, magna conten-  
tione certatur inter Medicos, quod agitare & componere non eft huius loci. Con-  
tentus ero monuiffe pinguedinem effe fubcutaneam, toti corpori circumfufam. Mi-  
rantur pofteriores Anatomici cur poft eleuatam cutim, *Galenus* Membranæ Carnofæ  
mentionem facit, ac fi cuti proximè fubdita effet, citra adipis interuentum: inde oc-  
cafionem arripiunt reprehendendi *Galenum*, quod fimias dilfecuerit, in quibus mem-  
brana carnofa cuti immediatè fubiaceat: fed *Galeno* non fuiiffe ignotum adipem col-  
ligitor *ex lib. 4. de vfu part.* Supra peritonæum mufculi funt magni, quibus fuperie-  
ctus eft adeps, tum craffa cutis. Adipem pro membrana haberi noluit, quia per fe par-  
tem non conftituit; alioquin adeps renibus, veficæ & oculo circumfufus, membranâ  
efformaret. Nec poteft concrefcere adeps nifi ope membranæ carnofæ, qualis eft illa,  
de qua nunc agitur, quæ fupernè & infernè adipe obducta, fuam propriam naturam  
non oftendit, nifi liquata pinguedine. Deinde fi adeps membranam peculiarem effin-  
geret, hanc foras fecum in lucem afferret, quia nulla membrana de nouo genera-  
tur. Atqui caret adipe, non membrana carnofa. Præterea, nulla membrana abfumi-  
tur, & regeneratur, vt adeps, qui per inedia in alimoniam conuertitur. Anno 1612.  
in quodam ferociffimo fure & ficciffimo, pauciffimum adipem deprehendi, mem-  
branæ carnofæ guttatim inperfum; in mulieribus femper vberior reperitur, in viro  
magis eft flauus, quàm in muliere. Itaque cum *Galeno* pro fecunda parte externa,  
numerabo *Membranam Carnofam*: Impropiè dicitur *Adipofa*, quum adeps ab ifta  
carnofa parte diuelli, fepararique nequeat. In obæis corporibus, præfertim in mulie-  
ribus, adipe multo fupernè & infernè obducta eft, & inter vtrumque adipem media  
confiftit, & manifèftè fpectatur *Membrana Carnofa*, quæ in puerulis recens editis  
manifefta eft, totaque carnea, craffitie notabili. Cùm autem membranæ Carnofa, &  
*Adipofa* funt infeperabiles, vnicam partem videntur conftituere, quæ toti cuti fubie-  
cta, interueniente adipe, *Adipofa* nominatur, alicubi affumpta carne fit *Carnofa*, vt  
in fronte, occipite, ceruice & fcroto. Alibi tantùm carnofa eft, idèoque à fe inuicem  
diuelli, fepararique nequeunt.

*Carolus Stephanus in fua Anatome*, membranam carnofam liquatæ pinguedinis reli-  
quas effe demonftrat; quoniam in obæis corporibus adipe multo circumfufa eft,  
vt nullum eius veftigium appareat. In gracilibus & emaciatis culliquata, & iam ex-  
haufta pinguedine membranâ refert. Id verum effe experieris in obæis cadaueribus,  
fi pinguedinem ad ignem fundas & colliques, videbis membranam crafiam fupereffe.

Huius membranæ vfus maximos & neceffarios, primus demonftrauit *Nicolaus Maf-  
fa in fua Anatome*. Vt fit tutela & tegmen omnium mufculorum corporis, vt diuifa  
cutis ope & interuentu huius carnofæ membranæ refarciri queat, vt fit fundamentum  
concuffui motus, dum corpus vniuerfum in rigore quatitur, ad excutiendum ali-  
quid inutile, quod in habitum corporis effunditur. Queritur cur rigores incipiant  
in mulieribus à lumbis, in viris à erurum pofteriore parte, & cubitoium. Id pendet  
ex vafis maioribus quæ incumbunt fpinæ, quales funt lumbares venæ & arteriæ, ferû  
in membranam carnofam valdè ibi fenfibilem effundentes, at in viris longius ferum  
expellitur, idèoque fenfus rigoris in cruribus & cubitis. Membranæ adipofæ *pelle-  
culam* quandam neruæ prætenfam imaginatur *Puccolaminus*, hac inductus ratione,  
quod in viuientibus vapores fanguinis subtilioris per cutis fpatacula effluant, nifi  
eos denfa quædam membrana retineret, ac cogeret: quæ tamen non reperitur, nifi  
eam extimo adipi intertextam voluerit. In Adipem abdominis tres notabiles Ve-  
næ diffeiminantur, fupernè defcendit Mammillaris externa, infernè per inguina af-  
cendit vena inguinis innominata, quæ manat à crurali ramo extra Peritonæum, Epi-  
gaftica externa vocari poffet: à lumbis emergunt quamplurimæ venæ, quas non  
poteris euidenter intueri, nifi cutim ab ea parte resecueris. Proinde fcarificationes  
lumborum ad reuellendum à partibus fuperis valde conferunt, & in nonnullis re-  
gionibus iftæ venæ fi appareant phlebotomo fecantur, fi credimus *Platero in fua A-  
natome*. Porro, membranam adipofam & carnofam fimul iunctas & vnitæ fic dete-

ges, vt in cute præstitum est, sed dum scalpello resecantur, caue ne subiectam musculorum tunicam offendas. Idcirco expedit nonnihil adipis huic loco affixum relinquere, subcutanea cuti adhærescens Latinis dicitur *Arma*. *Glossarium vetus* *Hesychius in Lexico*, *νῆσι αἰὲς ἐνυλῆ*. Querit *Aristoteles*, *probl. 4. sect. 10.* cur alia ex animantibus pinguescant sub cute, alia sub carne. Respondet, quibus densa est caro, iis inter cutem & carnem pinguedo colligitur, qui autem carne sunt rariore intra carnem pinguescant, quæ verò utroque modo se habent, utroque etiam adiposa sunt. Cuius naturæ particeps est homo, qui pinguedinem habet supra & infra panniculum carnosum instratam. Est autem cœnosa ac subflaua, quæ sub cute continetur pinguedo, multis paruulis glandulis adiposis ex adipe concreto & indurato conflatâ conspersa, vt esset totius corporis emunctorium, dum natura robusta in habitum corporis amandat excrementa. Membrana carnosâ versus lumbos carnis speciem præ se fert, inde oriri dicitur, quia dorso firmissimè cohæret. Visi sunt, inquit *Valerius*, qui cutem in dorso mouerent, aliisque partibus, in quibus hæc membrana carnosâ fibris conspersa erat.

In homine inter membranam Adiposâ, & Musculos viscosa quædam Humiditas diffusa est, sed in reliquis animalibus sub corio continetur. Hic humor viscidus & glutinosus, qui vt leui de causâ ficcatur & absorbetur, sic faciliè reparatur. Huius subcutaneæ humiditatis mentionem facit *Hippocrates libro de Glandulis*. Habent, inquit, intestina multam satietatem ex cibis, & potibus, continent præterea humiditatem sub cute, hæc totâ absorbitur similiter vt prior illa, & rarè morbos facit.

## DE MEMBRANA COMMUNI Musculorum.

### CAPVT VII.



MEMBRANA adiposâ inuersâ, spectatur alia quæ *Communis musculorum Tunica* dicitur; Neglecta fuit à *Galeno*, vel habita pro inuolucro proprio *Obliqui externi*, cui tam firmiter adnascitur, vt à subiecto musculo vix illacera diuelli queat, nisi à petito sectore, commodè tamen scalpello acutissimo dirimitur in illum regione, modò à parte carnosâ musculi incipias. Et supra thoracem & collum expansa vsque ad mentum perducitur. Istam membranam omnes posteriores Anatomi neglexerunt, vel dumtaxat obiter nominarunt. *Laurentius* quidem eius leuiter meminit, nec quid sit explicat, vt ei videatur tantum nota ex nomine. *Ranhius* partes continentis communes quinq; facit, & pro quinta enumerat membranam, quam appellat *musculorum propriam*, sed improprie. *Spigelius* eam supinè prætermisit & ignorauit, *solus Pareus* satis graphicè descripsit. Hæc autem membrana est musculorum corporis commune inuolucrum, quod à capite postico ad pedes vsque productum inuoluit, atque comprehendit omnes musculos cuiusque regionis & organi, præter cuiusque musculi propriam, ne in motu dissiliant & dehiscant, quod occasionem præberet fluxionibus serosis & flatulentis, nec tantum musculos circumdat instar vinculi & inuolucri communis, sed etiam vt sit adipis, qui totum corpus ambit, fundamentum, cui debebat potius affigi & hære, quam cuti porosâ. Propterea ibi deest, vbi adeps deficit, vt in fronte, capite & facie, quia panniculus carnosus immediate cutem tangit.

## DE MUSCULIS ABDOMINIS.

## CAPUT VIII.



Ac postremâ membranâ detractâ, Musculos abdominis conspicias. Quorum historiam & accuratam descriptionem repetes, ex cap. 33. lib. 5. & prius memoriæ mandabis, quam accedas ad examen controuersiatum. Denumero & ortu, non conuenit inter *Galenum* & *Anatomicos recentiores*. *Galenus* musculos octonario numero comprehendit:

Huic opinioni subscribunt *Vesalius*, & *Columbus*. Hic *Pyramidales* musculos viriliter expungit & explodit. *Præmius Syluius* decem epigastrij musculos proposuit, adiectis duobus paruis *Saccentoratus*, vt vocat, quos primus *Nicolaus Massa* inuenisse gloriatur, vt videre est in ipsius libro *Anatomico*, sed imperitè Penis erectioni destinauit. Attamen *Fallopius* velut se inuentos plurimum extollit, aliisque moseulis adiungit, atque ab iis vesicam comprimi potat, quod prius fuerat animaduersum à *Galeno*, lib. de dissec. muscul. & lib. 6. de Vsu part. Scribit rectorum partem inferiorem vesicæ conterminam, mingendi actioni conducere. Cùm autem *Pyramidales* musculi sint exigui momenti, si vesicæ tunica carnosa constrictoris musculi vice fungatur, Octonarius musculorum numerum à *Galeno* constitutum retinere licebit.

Propterea de *Pyramidalibus* musculis hoc monebo, eos per aponeurosim latam oblongam infra rectos demissam Peritonæo adhærescere, qua parte includit Vesicam. Ideoque dum retrahant eam partem Peritonæi, Vesicæ fundum reuolunt. Propterea animalia quibus inclusa non est Vesica duplicato Peritonæo, sed intra alucom abdominis fluitat, carent istis musculis *Pyramidalibus*, nec deuolueretur sponte, quia Peritonæo duplicato inclusa & affixa, nisi reuelleretur ab istis musculis. *Omrachos* autem in foetu continuatio est eius tendinis, qui penetrando Vmbilicum ad fundum Vesicæ se extendit, vt sustineat Vesicam in foetu & infante, cùm Peritonæi membrana tunc temporis sit admodum mollis, at edito in lucem foetu, secundum partium corporis extensionem, tendonis istius productio successu temporis effringitur. At dicit aliquis, reperiuntur ram viri quàm mulieres qui carent istis musculis *Pyramidalibus*, ergo non sunt absolute necessarij, quia *Natura nunquam deficit in rebus necessarijs*: ergo cùm sint eorum tendones affixi *Omracho* iuxta Vmbilicum in foetu, si desint, *Omrachi* filamentum adhæret extrinsecus musculus Rectis & Peritonæo.

In origine musculorum *Anatomici* dissentiant à *Galeno*; musculum Obliquum tam Internum quàm Externum, transuersis lumborum processibus hærete dicunt *Vesalius*, *Columbus*, *Fallopius*; atque musculum Rectum ab osse pubis deriuant, & quod mirandum, *Syluius Galeni* fidos interpret, à præceptore suo discessit in assignanda musculi Recti origine. Sed pro *Galeno* pognat Encheiridis Anatomica, quæ demonstrat Obliquum externum quatuor digitis distare à lumbis, internum Obliquum musculo Triangulari lumborum adhære, nec per tenuitatem nerueam ad lumbos propere: solus Transuersus à lumbis edocitur per tenuissimam membranam, quæ triangularem musculum præteruecta carnem assumit. Rectum *Galenus* à sterno prope xyphoidem emanare statuit. Sed valde torquet *Anatomicos*, quod Rectum vsque ad primam thoracis costam producat, quæ quidem productio cùm sit membranosa, si reperiatur, circa primæ & secundæ costæ intervallo carnem acquirit, quæ pro musculo separato habetur à *Galeno*, quem videre mihi aliquando contigit. Hunc etiam musculum, videlicet additamentum Recti obseruauit *Cabrolus*, vt ipse testator *offeru*. 8. Hunc designauit & obseruauit *Syluius*, duo musculi sæpe inæquales, sæpe vnici & is sinister frequentius quàm dexter, à summo sterno super pectoralis capita descendit, ad musculum Rectum.

In his musculis quædam adhuc notanda veniunt, de quibus gloriantur *Anatomici*. Obliqui descendentes digitationes serrato maiori pectinarim implexas, atque bitudinem tendonem obliqui ascendentis, primus obseruauit *Galenus*, lib. 5. *Admin. Anat.* sed duplici naturâ huius tendonis prudenter elusit *Vesalius*, quamuis omnes *Anatomici* adhuc retineant, *Galeni* autoritate decepti.



In Recto musculo recentiores Anatomici tres nerueas interfectiones notarunt, quas miror à Galeno prætermittas fuisse, cum in finia vt in homine reperiuntur; sed multa mentem & manum velociter scribentis effugiunt. Hippocrates istos nodos subolfecisse videtur, libro de internis affect. sed malè collocat infra vmbilicum. Vetat hydropicorum eam partem quæ inter vmbilicum & pubem est, ferro attingere, propterea quod multis geniculis abundat.

Galenus, libro de Venis mentionem facit *Anastomosus*, quæ fit ab *Epigastrica* & *Mammaria*, per quam Vteri & Mammarum confluxus & conspiratio perficitur: hæc tamen reicitur ab Anatomicis *Vesalis* & *Laurentius* tanquam inutilis & ridicula. At *Sylvius*, qui vteri & mammarum communionem per ea vasa fieri credidit, scribit epigastricæ oppositam esse alteram venam, quæ vteri collo numerosa sobole distribuitur, vnde fit vt lac recto tramite decurrat ab epigastrica in pudendam, quam vidit *Sylvius* in muliere puerperio mortua, digiti crassitudine parcm: hæcque anastomosis in puerperis & grauidis grandior est, atque apertior. Quinetiam obseruauit *annus Domini 1612.* in publica Anatome mulieris, præsentibus & spectantibus centum discipulis, vtramque venam, videlicet *epigastricam*, & alteram huic oppositam ac subiectam, prægrandem, iliaco ramo affixam: sed inferior hypogastricæ venæ furculo connascebatur. *Mammularis* autem interna per fissuram *Xyphoidis* traducta, euidenter apparebat *epigastrica* per anastomosim lociata, hancque communionem vasorum, postea in mulieribus semper animaduerti. Nemo igitur deinceps inficiari debet, per ea vasa, Mammarum & Vteri consensum perfici, ab vno termino ad alium, sanguinem & lac confluere. Quamuis enim in viris hæc vasa reperiuntur, ad musculorum abdominis, & potissimum Recti nutritionem, nequitiam tamen ad hypogastricas vique venas protrahuntur.

*Galenus* doctrinam de Musculis abdominis *Laurentius* labefactare tentauit, introducta noua musculorum origine. Statuit enim musculorum originem firmam ac stabilem esse debere; atqui costæ sunt mobiles, si ab his oriuntur: proinde omnes musculos ascendentes facit, & ab ossibus pubis & iliumeductos, in costas produci voluit. Luberat examen criticum hanc opinionem reuocare, vt falsitas huius opinionis magis innotescat. Imprimis fatentur *Columbus* & *Laurentius*, ad compressionem ventris primariò constructos esse musculos abdominis, respirationi conferre dumtaxat per accidens. Cuius propositionis est author *Galenus*, lib. 6. *Admin.* Anat. cap. ult. Hoc constituto fundamento, quæro cuius parti respirationis inferuiant? Respondent *Columbus*, & *Laurentius*, inspirationi & dilatationi Thoracis inferuiant. Sed *Columbus* appositè ad suam mentem & opinionem de motu Thoracis, affirmauit inspirationi & dilatationi Thoracis conferre. Nam existimat dum inspiramus, inferiores Thoracis partes dilatari, superiores comprimi: Contrà, cum expiramus, constringi inferiores, superiores dilatari. Hoc posito, malè exponit vsum *musculorum abdominis*. Nam duos obliquos externum, & internum, statuit intestina comprimere, & costas deorsum trahere, quò Thorax dilaretur: Rectis solùm id muneris assignauit, Thoracem deorsum trahendi, vt suprà dilatetur. Ergo si per inspirationem inferiores Thoracis partes dilatentur, superiores constringuntur, in expiratione contrario modo se habeat Thorax, Rectis musculis deorsum trahentibus costas, more Obliquorum: Non potest Thorax suprà dilatari, qui in actione Obliquorum costas deorsum tractis dilatabatur. Vnde patet quantum hallucinentur, qui à veteri doctrina desceunt, vt nouam introducant.

*Laurentius* inconstantior & incertior adhuc fuit ipso *Columbo*. Cum enim nullibi exposuerit, quomodo Thorax moueatur, asseuerat tamen Obliquum externum, quem à partibus infernis deriuat, inspirationi & dilatationi Thoracis inferuiant. Huic nempe Serrato maiori contiguus est obliquus epigastrici superior Thoracem comprimens, cuius in expiratione valida, maximam vim agnoscimus: Reliquos tres Obliquum internum, Rectum, & Transuersum expirationi desinunt. Qui fieri potest, vt Obliquus superior pertineat ad inspirationem, Tres alij ad expirationem, si Obliqui duo, Transuersi, & Recti ab eisdem partibus oriuntur, & in eandem partem desinant. Idem *Laurentius* affirmat Obliquum superiorem portione carnea in costas inferi, portione neruea in lineam albam desinere: illà Thoracem mouere, hæc epigastrium comprimere, quod est absurdum. Cum vnus musculus vnus sit motus, nisi diuersos habeat exortus, & diuersas fibras diuerso modo positas. At Obliqui vnico

vnicum & simplici genere fibrarum constant, quæ obliquè ab omnibus costis nothis ad lineam candidam proferuntur: Ergo vnicum habere debent motum ex *Galenî* doctrina. Ad id ex ipso *Luuentio*, quod eius opinionem destruit. Omnes musculos natura confluxit ad ventris inferioris compressionem, dum enim seorsim agunt, modò hanc, modò illam; nunc superiorem, nunc inferiorem, nunc mediam abdominis partem compriunt. At hoc exequi & præstare nequeunt, nisi à diuersis locis exoriantur.

*Fabricius ab Aquapendente* nouam de musculis abdominis opinionem commentus est, quæ non multum abluat, ac recedit à præcedenti. Existimat Obliquos duos, & Rectum ab infernis partibus nasci, Musculos Obliquos violentæ expirationi inferuire, Rectum inspirationi solum, Transuersum ad eorum compressionem conferre. Præterea, pro fundamento statuit, Costas, & earum cartilagineas cum sterno diuersa motus specie agitari, quia quando costæ euidenti motu suum feruntur, tunc temporis cartilagineas cum sterno obcurè deorsum trahuntur, & è contrà, quod persuaderi potest, tum ex facta in costis diuisione cartilaginosa, tum ex motuum varietate, tum ex musculorum in costis atque cartilaginibus contrario incessu, & fibrarum ductu, tum ex *Galenî* testimonio, qui *libro de dissect. muscul. cap. 23. & lib. 7. de usu partium, cap. 20.* affirmat in inspirationibus Thoracis, partes alias deorsum, alias sursum ferri, & rursus in expirationibus, quæ priùs deorsum ferebantur, contrà sursum tendere, & quæ utrò ante sursum ferebantur, nunc in pristinam suam sedem reuerti. Hanc veritatem ostendit Thorax ossis pennati animalis, in quo contrario modo, ut in homine, motus cartilaginū sunt euidentissimi, imò manifestiores quàm in homine.

Quæ prauo nituntur fundamento mole ruunt sua; Costæ à tergo sunt duplici articulo iunctæ vertebris, ad corpus, & ad apophysim transuersam cuiusque vertebræ, ante cum sterno articulantur per arcuam commissuram, cuius motus est admodū exiguus, auctore *Galenò, lib. de Ossibus, cap. 12.* ut Synarthrosis appellari queat. Itaque si Costæ sursum trahi, & inuicem adduci debeant in inspiratione, sternum non potest contrarium obtinere. Quia portio cartilaginosa extremæ costæ coniuncta fuit sterni, ut facilius esset costarum motus, quæ dum mouentur, sternum nuanet immobile. Adde quod partes costarum cartilaginosa circa quinquagesimum annum, vix plurimum osses euadunt; Tunc temporis collæ non possunt adduci & abduci, sed totus Thorax eleuatur & deprimitur, atque respiratio Thoracis descensu & ascensu, sine costarum abductione & adductione perficitur. Proinde senes sunt anhelii, quia segenior ad motum Thorax, tum otiantibus musculis intercostalibus. Vnde colligere licet peculiariter costarum motum non esse absolute necessarium ad vitam & respirationem, sufficere si totus Thorax cum sterni pari motu moueatur.

Expendamus nunc quibus rationibus probet & demonstret ortum & actionem musculi Obliqui descenditis. *Prima ratio.* Musculus hic utilis est, propter suam actionem, Musculi autem actio est contractio, dum verò contrahitur, abbreviatur: breuitatem tria consequuntur, extremorum attractio, fibrarum directio, & totius musculi maior facta crassities, quare dum mouetur musculus, si à costis educeretur, traheret os ilium & costas, sed os ilium est immobile: ergo à partibus inferioribus oritur, & solum thoracem mouet. Respondemus, his concessis quæ proponit tanquam verissimæ, non sequitur musculum ossa ilium mouere, est tantum adhæsiō, non infectio. Verum est actionem propriam musculi esse contractionem, quæ perficitur secundum ductum fibrarū, tumque musculum crassius fieri, & extuberare circa principium. Hoc posito musculus Obliquus descendens qui fibras habet à costis, obliquè ad medium ventrem exporrecitas, dum intumescit circa carhem versus costas sitam, cum suo pari agens comprimit hypochondria, in quibus Colon continetur laboraturum.

*Secunda ratio.* Si Musculus Obliquus descendens esset compressiui destinatus, utique crassior, carnosiorque in abdominis regione esse deberet: Atqui nequissus ac tenuis est. & membranosus. *Respondet,* quod Obliquus non debet esse carnosus in medio abdomine, alioquin inæqualitatem ac deformitatem ventri adferret: Vbi membranosus est, subiectum habet Rectum musculum carnosum, qui mole sua æquat crassitiem carnis musculi Obliqui. Deinde tendines seu aponeuroses non solent esse carnosæ, nec circa medium abdomen quidquam comprimendum erat, & ad hoc opus sufficiunt musculi Recti. Comprimitur Venter rarione Ventriculi, Coli Intestini, Vesicæ, & Vteri in mulieribus grauidis, quæ partes in hypochondriis & regione stomachali, compelluntur à duobus musculis Obliquis descenditis, &

ab aliis duobus Rectis versus suum principium ad sternum reuulsis. Vesica & reliqua portio Coli à musculis Transuersis, & duobus musculis Ascendentibus comprimuntur.

*Tertia ratio.* Valet Obliquus descendens ad expirationem violentam, vt esset oppositus alteri musculo Serrato maiori, qui confert inspirationi violentæ. Adde quod est consimilis coniunctio digitatim facta, vt mutuam sibi præstarent opem in respiratione violentissima; deinde Obliquus est vtriusque musculi Serrati & Obliqui situs, vt oppositis motibus & visibus interirent. *Respondet*, quamuis Serrato maiori Obliquus descendens sit digitatim implicitus, non est tamen ei oppositus ratione originis, quia fibræ omnes Obliqui vergunt, & diriguntur ad lineam candidam, siue ad medium abdomen, vbi terminari fatetur musculi partem membranofam, quam omnes Anatomici accipiunt protendinc. At ibi assignare oporteret principium musculi Obliqui, quæ pars mollis est, & carnosa, non ossæa, vt costæ, si esset oppositus serrato.

*Quarta ratio.* Compressio est ad aliquid excedendum & detrudendum, nempe scæces, vrinam, foetum. Quod autem compressione eliditur, id transuersè, & à contrariis partibus quasi à manu stringi debet, id quod Transuersus abdominis musculus præstat. *Respondet*, abdomen rectius comprimi à musculis Transuersis, sed hoc non destruit ortum musculi Obliqui descendens à costis.

*Quinta ratio.* Musculus Rectus ab osse pubis enascitur & exurgit, vt costarum cartilaginofas portiones enim sterno deorsum trahat in inspiratione, sicuti alius super sterno Thoracem deprimit in expiratione sternum attollendo. *Respondet*, quod isthæc musculus Rectus actio corruit ex euerfione illius fundamenti, quod proposuit, nempe costas & sternum eodem tempore diuerso & contrario motu cieri, quod falsum esse supra demonstraui.

In tanta Anatomicorum confusione super *musculos abdominis*, hoc vnum me recreat ac magis confirmat in opinione *Galeni*, quam in prima editione meæ *Anthropographia* proposui, & rationibus validissimis demonstravi: quod *Barbini*, antiquior *Anatomia professor*, in secunda editione sui *Theatri Anatomici*, opinionem *Laurentij* deleuerit, vt *Galeni* partes sequebatur, iisdem rationibus vtens quas adduxi, *suppreſſo meo nomine*. Cum tamen primus aduersus iuniorum Anatomicorum insectiam, *Galeni* doctrinam sustinuerim ac propugnauerim. *Spigelius* sustinet iisdem rationibus, quibus vix sum contra *Columbum* & *Laurentium*, Musculos abdominis, non inferre respirationi primò ac per se, ne quidem Obliquum ascendentem: sed omnes addixit abdominis compressioni, & partium in eo contentarum. Ideoque verissimam esse *Galeni* doctrinam de ortu & insertione musculorum abdominis. Itaque cum suæ quisque inuentioni faueat, & quasi fortissimum complectatur, quod ab alio dictum est, quod ipse præiudit & admonuit, inquit *Plinius*, lib. 3. *epist.* Nemoni mirum videri debet, si mihi placeat *Galeni* doctrina, incis rationibus probata & confirmata. Sed ad rem redeo.

Musculi abdominis sunt absolute necessarij ad compressionem abdominis, cum ex *Galeno*, parum necessarij sint musculi ad expirationem. Nam vt inspiratio ascensu thoracis, sic exspiratio descensu perficitur. Thorax autem gravitate sua propria, vel adscititia viscerum abdominis ab eo dependentium, deorsum fertur: ergo non indiget musculis ad eam actionem. Demum tamen aliquem conferre, solus Obliquus ascendens sufficit. Inualida est æclumbis ratio, quam instat *Achillis* opponit. Si musculus à costis eductus, in ossa pubis & ilium inferatur, quomodo partem immobilem mouere poterit? Rspodemus à costis emergere, & ossibus illis ac pubis adherere, sed lata & membranosa aponeurosi ad medium ventrem definire, per quam mouetur abdomen, quando dilatatur & constringitur in enixu, & foecum excretionis: quod fit cohibito spiritu, quo tempore thorax immotus manet, fundamenti vice musculorum actiones firmans & sustinens. Nec absurdum est musculum à parte mobili nasci, ita ut pars cui musculus in origine sua firmatur, etiam cum ipso musculo moueatur. Nam Serratus maior inferuit elevationi thoracis, & tamen dum attollitur thorax, erigitur quoque scapula. Obseruabis in musculis abdominis, exceptis Rectis, aponeurosi continuatam continuationem, ac si essent continui, & in medio abdomine neruicam & latissimam substantiam, instar Diaphragmatis in centro nerui, strictè coalescere: cum alibi musculi sint liberi, & facile separabiles. Quæ omnia confirmant *Galeni* doctrinam de ortu, insertione, & actione musculorum abdominis: sunt autem

continui, ut ambotum actio æqualis fiat eodem instanti, propterea quaniuis contrario situ positi sint à dextris & sinistris partibus, non sunt tamen antagonistæ, sed fraterni, ad vnumidemque officium consimile conspirantes.

Deiudis aduersationum rationibus, antiquam de musculis abdominis opinionem quinque rationibus confirmabo. *Prima* erit à situ musculorum. *Secunda* ab insertione netui. *Tertia* à conformatione musculi. *Quarta* ab actione deprometur. *Quinta* à numero. Insertio musculi semper opponitur suæ origini, illa verò oppositio sumitur ex rectitudine fibrarum, atqui *Obliquus externus* inseritur in medium ventrem ad lineam candidam, & altum assurgentibus ossibus ilium affixus, ergo ab oppositis partibus, nempe nothis costis oriri fatendum est. Nam si ab infernis partibus exoritur, illius origo in osse pubis, & ventre assignanda erit, ut secundum fibrarum ductum origo insertioni opponatur, quod esset absurdum. Nervus semper inseritur in caput, aut prope ventrem musculi, atque ex emanatione, siue origine nervi, caput musculi colligitur. Atqui *Obliquus externus*, & *Rectus* nervos accipiunt ab intercostalibus, ergo à supernis partibus *Obliquus externus* & *Rectus* emergunt. Reliqui duo, nempe *Obliquus internus* & *Transversus* à lumbis quosdam peruos accipiunt. Omnis musculus in exortu suo carnosior est quàm in fine, ex *Galenæ*, quod verissimum deprehendes in *Obliquo Externo* & *Recto*. Præterea, musculi qui in ossa inseruntur, in tendones desinunt: Atqui musculi abdominis prope costas & ossa pubisarent tendoniosis, sed ad medium ventrem producta membranosa aponeurosis pro tendone sumitur, ergo mouendo abdomini, non thoraci destinantur. Omnis musculus dum agit versus suum principium contrahitur; quare si omnes musculi abdominis ab infernis partibus exurgerent, in sæcum expulsionem & enixu ventrem inæqualiter compungerent. At maior vis requiritur in partibus superioribus, cum ibi fæces subsistat propter Coli intestini ad superiora revolutionem. Deinde fortis vtero conclusus, supra vmbilicū postremis gestationis mensibus ascendit, ergo opus erat duobus musculis in parte superiore abdominis. Alij duo, latera & inferius hypogastrium comprimunt, itaut vniuersique oppositum & renitentem habeat musculum: Descendenti opponitur Ascendens, *Recto* *Transversus*, sicque omni ex parte, dum pari contensione agunt musculi, simul pugnant & luctante Diaphragmate, abdomen omni ex parte compellitur vbiunque musculus adest ascendens, alius necessarii reperitur descendens, nec flexuens adest sine extendente, quia motus fit in partibus à musculis contrariis, ex *Galenæ lib. de matu musculorum*. Ergo si in abdomine sunt musculi ascendentes, debent etiam adeste descendentes. Præterea hunc suum musculorum abdominis, *Galenus lib. 7. de vñu part.* admiratur, à quibus tanquam manibus implexis interiora compelli scribit. Rectos enim musculos Transversos, Obliquos verò inter se ad angulos rectos eo modo natura composuit, quo nos ipsi cum premere atque repellere aliquid fortiter volumus, alteram manum situ contactio alteri iniicimus: Transversum intus collocauit, ut facilius cōprimeret. Nam fasciæ transversæ fortius premunt, quàm obliquæ. Quò igitur præcipua musculorum abdominis actio sit, ventrem comprimere ad sæcum excretionem, vnde resolutis istis musculis, primæ coctionis excrementa subsistunt, nec dimittit alius nisi acrioribus clysteribus sollicitata, ut in quibusdam obseruavi, sine vlla respirandi difficultate quæ adesset, si respirationi inferuient; Duos, nempe *Obliquum externum*, & *Rectum*, à partibus supernis, alium nempe *Obliquum ab infernis*, alium videlicet *Transversum* à lumbis enasci oportuit, ut agentes & versus suum principium introsum intumescences & extuberantes, ventrem æqualiter vndique compungerent.

Quod attinet ad musculum *Rectum*, qui non inseritur ad lineam candidam, sed ad ossa pubis productus: Hanc originem, progressum & insertionem sic demonstro. In brutis *Rectus* musculus caret illis interfectionibus, sed à summo sternone nascitur, quod ei similitare & robur addit. At quoniam in homine musculi *Recti* origo imbecillior est, dum ab inferna parte sterni, & cartilaginosa vicinarum costarum portione enascitur, natura superiorem partem geniculis istis roborauit, si in brutis à superiore parte nascitur, quidni in homine? quod interfectiones illæ nervosæ ab intercostalibus nervis contextæ, manifestè conuincunt.

Adde quod musculi *Pyramidales* extremis *Rectorum* partibus superiecti, manifestè demonstrant *Rectos* ab ossibus pubis non oriri. Nam quo fine *Pyramidales*? si *Recti* versus pubem tetracti & intumescences compungerent Vesicam, at tum supernè

Oriantur, ne Vesica destitueretur comprimente musculo, ad hoc officium necessarii Pyramidales destinauit musculos. At dices, in partem immobilem inseritur, fateor, non ut ossa pubis moueat, tunc temporis immobilia, sed ut se contrahens versus suum principium intorsum intumescat ad comprimendum abdomen, deinde musculus Rectus instar portitoris agit, qui dum cymbam ad portum propellit, contum affigit ripæ vel saxo, non ut trahat ad se saxum, sed cymbam ad ripam deducat. Ita natura ossibus immobilibus Rectos musculos affixit, ut abdomen comprimentes maiori contentione agerent, alioquin relaxarentur, si ab ossibus pubis exorti, sterno implanta- rentur. Nam agentes thoracem deorsum traherent, sine vlla partium internarum compressione. Quid si dicamus compagem ossium ilium pubis & ossis sacri simul iuncto- rum manifestè moueri, & Rectos huic actioni inservire. Propterea quos motus edunt seorsim, & diuersis temporibus, nam comprimunt abdomen quiescentibus & immotis ossibus pubis in expiratione forti, siue thoracis depressione. Mouent compagē ossium pubis Ilium, & ossis sacri sine compressione abdominis, quoniam ad eius motum debent omnes musculi abdominis æqualiter agere. Cæterum Recti musculi mediū abdominis spatium occupant, & secundum longitudinem ventris producentur, vt partes illas exarnes instar tomentis fouerēt. Non possum probare eorum opinionem, qui Rectum in plures musculos diuidunt, & tot esse statuunt, quot sunt intersectiones: 1. quoniam ad quoduis internodiū neruus accedit: 2. si vnicus esset contractus in fesse, non posset æqualiter omnes partes comprimere: 3. nullus talis est musculus in toto corpore, in quo tamen multi sunt longi, sine tali inscriptionum numero. Respon- deo. Quis vnquam audiuit musculos inter se ita coniungi, vt vnus ab alio exortus, in aliterū inferatur? Si ratione intersectionū diuidi deberet, Digastricus maxillæ duplex esset, Bronchii quoque ratione intersectionū in plures dirimeretur, Coracoideus ossis hyoidis in medio neruosus, duplex constitueretur, quod est absurdum.

*Corpus commentarius in Mundinum*, videtur auctor huius opinionis, qui tres illas diuisiones in Recto putat esse chordas trium musculorum, quia natura sic interfecit illis internodiis hunc musculum, ad commoditatem contractionis, quia melius contrahitur villus brevis, quàm longus. *Adr. Spiegelius, nuperus Anatomicus*, vnumquemque Rectum musculum in duos diuidit, ratione neruorum, qui in partes superiores & inferiores distribuunt, ratione venarum mammariz & epigastricæ, præterea quod duo sint musculi Obliqui ex utroque latere, sic oportebat duos esse Rectos vtrique, quorum extrema partim ab ossibus pubis, partim ab ipso sterno enascuntur, & inter se cœunt in medio, quod est carnosum. Hanc dupliciter Rectorum ideo statuit, vt demonstret musculos Rectos, dum oriuntur ab ossibus pubis inservire respirationi per accidens: dum à sterno exorti in ossa pubis producentur, isthæ cossa mouere, quod tamen prius indicaueram & reprobaueram, *libro quinto capite trigesimo nono*, sed cum Recti, vt & alij musculi abdominis nihil conferant ad respirationem, sed Recti potius ad motum ossium pubis referantur: Non erat necesse Rectos musculos geminare, quoniam integri & indiuisi sunt validiores ac robustiores ad mouendam illam ossium Ilium cum osse sacro compagem. Interim monebo, ex musculis abdominis quosdam præter actionem quam habent comprimendi abdomen, etiam compagem ossium pubis, & Ilium monere, cum musculis spinalibus supernè deorsum productis, qui sunt illorum antagonistæ. Itaque musculi Obliqui Externi descendentes & Recti, mouebunt antorsum compagem ossium pubis & Ilium inter se iunctorum; vt retrorsum mouent spinales musculi postici, facer & spinatus, cum solus quadratus non valeat ad istum motum. Vt igitur actionem musculorum abdominis ad meum sensum, rei que veritatem accominodem: Dico musculos abdominis habere actionem Communem, & Particularem. Communis est, quando equaliter agunt ad comprimendum abdomen, nec enim in eo motu seorsim agere possunt. Particularis est, quando musculi ascendentes, & descendentes seorsim agunt, illi thoracem deprimunt, hi compagem ossium pubis & Ilium cum osse sacro iunctorum agitant, sine vlla abdominis compressione. At quiescunt & immota manet ossa pubis dum musculi abdominis æqualiter abdomē contringunt, & interiora compellunt.

Porrò, si quem opinum nouitas delectat, nouam adhuc de musculis abdominis opinionem, suis rationibus stabilitam proferam. Omnes scilicet epigastrici musculos, præter Rectos, & transversus lumborum apophysibus, enasci & iulineam albam inferi, ossibus pubis & Ilium, atque collis inferioribus firmari. Quom enim origo & princi-

pium musculi petatur ab insertione nervi, omnes autem musculi exceptis Rectis nervos à costalibus & lumbaribus accipiant: non est dubium eos ab ea parte ortum ducere.

Præterea, omnis musculi insertio semper origini opponitur, ut finis principio. Sed musculi epigastrij medio ventri implantantur, ab extremis igitur partibus oppositis, nimirum lumbis orti fatendum est. Nam quum æquali abdominis compressioni inserviant, facilius & commodius ventrem inferiorem æqualiter compriment, versus suum principium collecti, & adjuvi Diaphragmate, quod deorsum expellit. Sed potius veteri doctrinæ standum, memores huius præcepti: Quum aliquid à viris doctis scriptum inuenitur, quod non multum ab optima doctrina degenerat, præstat priorē uti, ne audaces turbemus, & in opinionum confusionem adducamus, inquit Galenus, cap. 4. lib. 1. Admin. Anatomicarum.

## MUSCULORVM ABDOMINIS administratio.

### CAPVT IX.

**M**USCULOS abdominis separabis, vel ab eorum exorta versus dorsum, vel à tendinam extremis in linea candida. Vtramque administrationem Galenus proposuit lib. 5. Admin. Anat. Priorem sequatur cum à musculi thoracis ad epigastrium descendebat. Alteram præstabat quando sectionem caudaveris ab inferiore ventre inchoabat: quam faciliorem esse statuit, licet experientia & praxi quotidiana difficultatem demonstrat, sed utramque secandi rationem arduam & laboriosam esse fatetur Galenus, quia indusorium requirit Anatomikum; prudenterque scripsit, huius administrationis principium, Anatomici operis dimidium esse: quippe tota dissectio confunditur, principio male infecto. Si musculorum obliquoꝝ productiones usque ad lumbares vertebrae, atque nervos à vertebrae lumbaribus procedentes, & in eos musculos diffusos indagare velis, in corpore prono, & supra ventrem inuisa, tenuis cūte dorsi, & panniculo caruio detracto, musculum latissimum rescindes, ut facilius musculorum obliquoꝝ excursus usque ad lumbos intuearis. Primus occurrit excellendus Musculus obliquus descendens, quem videbis digitatim implexum Serrato maiori, ex linea candidis, & varia fibrarum positione, Serrati & Obliqui discrimina cognosces. Ab his digitationibus musculum Obliquum parvo & acuto scalpello separabis. Prima digitatio Recto musculo & Serrati portioni interiecta est. Secunda & tertia digitatio difficilissime separantur. Reliqua quatuor sub portione Latissimi delitebant, nec productiones carnea Serrati excipiunt. Vt igitur in conspectum veniant, portionem latissimi musculi euellere conuenit usque ad spinam positivam osis Ilium, postea quatuor illas digitationes à costis auferes, deinde à tota Ilium costa musculum rescabis. Si sacris indusorius & laboris patiens, observabis secundam, tertiam & quartam digitationem sub Serrato aliis prorepere, quam valens putat, ibique caput nervorum tendinosum acquirere, quod adheret inferno lateri costæ. Eiusmodi caput tendinosum portionem intercostales nervi recipit. Nervus enim ubi cū peruenit, in duas partes dirimitur, quarum altera in caput nervum digitationis sese infinuat: altera costæ adhaerens nervos musculi recti intersititones facit, sic rescitus musculus in alterum ventris latere reclinabitur. Interim observabis aponeurosim huius musculi, prope aspubis esse perforatam, ut Obliqui ascendentes, & Transuersi aponeuroses iuxta spinam anticam & infernam osis illi sunt perforata, ideoque stramina utriusque musculi Obliqui non sunt directè opposita, sed alternatim disposita, ne tam facile Intestinum in inguen aut scrotum deuoluatur. Hac foramina in herniis scroti effrangentur, lacerantur, aut dilatantur, quæ diligenter observanda in reductione intestini in inguine strangulati. Et si quando in inguine fiat incisio ad reducendum Intestinum, istud foramen incisione dilatare debes, ut facilius ventrem subeat Intestinum. Supra Obliquum ascendentem versus hypogastrium neuralium offendes, qui sese infinuat & introducit in apophysim Peritonæi, ut ad testiculum deferatur, quia penetrat transversum musculum: à lumbaribus nervis euasit, & est portio nervorum qui in Obliquum ascendentem & Transuersum disseminantur.

Obliquum autem ascendentem à costâ illius, cunctenaciter affigitur reflectum, ad lumbos perducens, ubi à Transverso liberabitur. Deinde sursum remeantem ab ipsi costis separabis. Hunc more primi obliqui in latus oppositum reflectere conuenit, & cum ad Musculum Rectum peruenieris, notabis duplici tenâine Musculum Rectum amplexari supra umbilicum, infra verò umbilicum simplicem tendonem sub Recto transmittere, qui tamen iuxta marginem Recti adeo cunctenaciter adhaeret aponeurosi Obliqui descendenti, ut nulla arte disiangi & diuelli queant absque laceratione. Dum tendons Obliquorum ab osibus pubis reflectantur, caue diligenter ne apophysim Peritonæi per istos tendones traducillam vulneres, atque cremasterem Musculum huic apophysi superieiliam, & tendonem Transversi subieili laeres. Cremasterem Musculum distingues colore, & consistentia. Est enim caro rubicunda, tennis, fibris rectis conserpta, internalis quodam à carne Obliqui descendenti distincta, & secundum inguinis ductum Peritonæi apophysi circumiecta, similem carnem in mulieribus inuenies, sed breviorē & angustiorē, Peritonæi productioni superieiliam. Inter Obliquum ascendentem & Transversum versus lumbos, multiplices Vena à lumbis & hypogastricu producta spectantur, sed insignes duos nervos diligenter observaui, qui præter intercostales acrunas digitationibus Obliqui descendenti inferios, ab internis duobus dorso vertebri nascuntur, & oblique supra nothas costas prærepentes, iuxta ultimam costam in carnem huius Obliqui & Transversi disperguntur.

Rectum Musculum in linea candida commodè separabis, intallis illius extremis; si diligenter & lentè rescueris illius extrema linea candida opposita, deprehendes nervos intercostales Peritonæum perforantes, ut Musculi nervosus intersectiones adeant & consistant, quæ interdum absunt, ut in quibusdam observans: sæpius duas deprehendi imperfectas supra umbilicam: tertia, si reperitur, semper directè opposita est umbilico, rarissimè quartam intersectionem inuenies: versus recti finem internè notabis Epigastricam ascendentem, & Inflammariam descendentem circa medium Musculum concurrere, & stricte per anastomosis coalescere.

Rectorum internalium vera est linea candida, à Xyphoide usque ad commissuram pubis exposita, & inceptè coalitum aponeurosum Obliqui descendenti lineam candidam vocant, quam ipsa aponeurosis suis continnate, nulla apparente linea distincta. In mulieribus gravidis cum ultimis gestationis mensibus valde distenditur abdomen, ex diuisione Rectorum, linea quedam subleuata à Xyphoide usque ad symphysem osium pubis per duos vel tres menses à partu remanet, quæ sensim obliteratur, Musculi Recti inter se iunctis & coalescentibus. Rectorum inferiori extremo paruos Musculus Pyramidalis incubat, quem curiosè diuimere oportet, unoque exemplo, videbis Recti Musculi tendonem robustissimum & nervosum osi pubis affixum. Sinister Pyramidalis sapissimè dextro brevior & angustior apparet.

Transversus Musculus Peritonæo adhaerens, non facile diuelli, hunc tamen si capias diuimere, à lumbis reflectum solis digiti leniter à Peritonæo liberabis. Ex Aristotele lumbi sunt excarnes ad flexum, ut possint moveri & incuruari ad generationem, est enim in lumbis sedes libidinis, ut demonstrat Cagnatus libro quarto variarum lectionum, capite septimo. Notandum quod tota spina supra lumbos mouetur immota, sed lumbi seorsim moventur cum osse sacro immoti dorso & femoribus, tam in recta figura corporis, quàm prona, aut supina, idque ad generationis commoditatem.

## DE PERITONÆO.

### CAPVT X.



**A**LIAS Musculis Peritonæum conspicitur, quod ita detegendum ut duplam illius tunicam queas ostendere; quod præstabis vbique, & in quacumque parte, sed potissimum infra Umbilicum, ubi nulli musculo inhaerescit. In mulieribus Membranz facilius feceruntur, quàm in viris, & in obis melius quàm macilentis. Membranas vnguibus diuelles, si sursum pergas referuatis & inoffensis vasis umbilicalibus; obseruabis quo modo Peritonæum Diaphragmati circumtensum, ligamenta superiora Hepatis, illud quæ latum ligamentum suspensorium à Xyphoide uacum, ipsamque tunicam Ventriculi efformat. Nam externa oblini Diaphragma, interna est quæ reuo-



luta fupra Hepar, Membranam ipsius Hepatis effingit, & connectit vifcus hoc cum Diaphragmate. Sed duplicatura Peritonæi manifestus apparet in sede inferiore cauitatis iliũ, vbi Vesica & partes genitales internæ viri, Peritonæo duplicato includuntur, & in Renibus qui intra eius duplicaturam continentur. Vasa quoque Vmbilicalia, Vrereres, Vasa spermatica, vena Caua, & Aorta descendens, per geminas Peritonæi tunicas traducuntur, quo fine, vt scilicet parte sui inferiore quæ pondus ventris sustinet, rupturæ minis esset obnoxium, quod euenisset si pertusum fuisset. Idcirco prudenter *Fernelius* notauit nusquam in parte inferiore perforatum esse Peritonæum: quæ fuit ipsius obseruatio elegans, ab aliis *Anatomicis* non intellecta & comprehensa. Neque Peritonæum perforatur ad Aortæ & Venæ Cauræ translationem, quia versus lumbos intra apophyses carnosas Diaphragmatis transeunt, & duplicatura Peritonæi includuntur. Sed in parte superna inguinis, Vena & Arteria crurales in femur descendentes, perforant Peritonæi Membranam externam, vt ad inguen perueniant.

Propterea intra septum Peritonæi, ex tantum partes continentur, quas alit & rigat Vena Porta: Cæteræ cum iplo Vtero in Virginibus iutra duplicaturam Peritonæi comprehenduntur, quod obseruauimus & adnotauimus in *meis Adversariis*, priusquam idem legissim apud *Fabricium*, in *Operationibus Chirurgicis*, pag. 108. Cur in mulieribus ad inguina productum Peritonæum, vt in magnis abdominis distensionibus, quæ postremis gestationis mensibus accidunt, interna portio supernæ tracta sufficeret ad incrementum Peritonæi, ideoque in mulieribus crassius obseruauit Peritonæum ab Vmbilico ad pubem, quàm in viris, quamuis id falsum esse velit *Spigelius*, sed naturæ consilium & providentiam ad vsum conceptionis non obseruauerat. Si persequaris Peritonæi productionem in scrotum delabentem, videbis vt in viris simplici constat tunicâ, quæ est extæne propago, interna finibus ossium ilium & pubis coercetur, nec ultra peruat; & si quando in osculo Intestini portio in Scrotum delabitur, Musculorum abdominis tantum aponeuroses perforatæ, vt transitum præbeant vasis spermaticis effringuntur, rarò tunicæ Peritonæi lacerantur. Sæpius obseruauit in magnis hemis scroti, ruptis aponeurosis Musculorum, Peritonæi Membranam internam intra suam apophysem relaxatam, & instar sacci distentam ac protuberantem: idcirco ad curationem herniæ reductis Intestinis, appressum latum cauterium, modò subiecta vasa non offendat, præstantius esse puto remedium *puncto illo auro* inutiles & fallaci. Castratio quæ fit per excisionem siue extirpationem Testiculi, ad curandam Osculo Intestinis, manifestè demonstrat non esse ruptum Peritonæum vndique, alioquin enim esset inutilis; & quamuis in Vmbilico, hernia *Vmbilicalis*, quæ differt ab *Exomphalo*, tam in viris quàm mulieribus, quibus frequentior est, excitari soleat, rarò tamen effringitur Peritonæum, sed tantum relaxatur. Nam vasa Vmbilicalia per duplicaturam Peritonæi traducta, ad suum quæque locum contendunt, atque Venam Vmbilicalem vsque ad fissuram Hepatis Peritonæum comitatur & deducit; si quando protubet Vmbilicus in hernia, scito tantum internam tunicam Peritonæi intestina ibi comprehendere & sistere, quia externa est in Vmbilico perforata, secus quàm in inguinis hernia, vbi interna Peritonæi tunica rumpi potest, externa integrâ, quod non tantum in adultis, sed etiam pueris recenseditis obseruauit, in quibus caecis ferro attingere istas hernias Vmbilicales, quia non possunt intus repelli intestina, nec contineri. Sarius est infantes cum tali incommodo relinquere, quàm manu tua iugulare, aut mortem accelerare. In mulieribus, apophysis illa Peritonæi tunicâ simplici contexta est, externa ad inguen protensa, vt deducat, conseruetque ligamentum rotundum vteri extra cauum abdominis productum, eaque apophysis interdum laxa est, quæ digitum possit admittere. Quando Peritonæum ex ligamentis, quæ lumborum vertebrae & os sacrum ossibus ilium committunt, à *Vesale* & *Sylvio* oriri dicitur, vel à plexu neruorum validissimo, qui Mesenterio ortum dat, id intelligendum de externa tunica: nam interna supra Renes reuoluta, vertebrae non attingit, manusque subtus traduci potest. Adde quod Plexus ille neruorum Renibus interiectus, intra duplicaturam Peritonæi continetur, ipsumque Mesenterium totum euelli potest, illa & integrâ membranâ externâ Peritonæi, quoniam Mesenterium internæ Membranæ productio est.

Postea in inguine causam inuestigabis, cut *Bubones Venerei* supra inguen, vel in flexu

inguinis nascantur: *Bubones Pessilentes*, & alij, infra inguen. Nam iuxta Penem quatuor aut quinque glandulæ, quæ sunt vera lecoris emundatoria, Venam cruralem circumstant: paulò infra quatuor illas glandulas posita est alia magna glandula oblonga, quæ materiam *Bubonis Pessilentis* excipit, quia spirituosa longius eliminatur, & per arteriam cruralem in eam glandem transfertur. Itaque decipiuntur, qui *Bubonem Pessilentem* in capite carnosu fasciæ latæ, quod oblongum est, excitari putant.

At supra inguen à Pene trium digitorum distantia, aut in flexu inguinis, *Bubo Venerens* erumpit in illis glandulis, quæ prope spinam infernam ossis ilium progressum vasorum spermaticorum, Peritonæi apophyli inclulorum firmant & iussulciunt. Nam ibi duæ vel tres glandulæ oblongæ collocatæ sunt, Peritonæi productionem amplexantes, quæ in lue venerea intumescunt, vt sæpius in strangulatis hominibus lue vcnerea fœdatis observauit.

Obiicit aliquis *Bubones Venerens* in mulieribus iisdem locis apparere, quamvis hic non pertingant, & permeent vasa spermatica, vt in viris. Sed habent ligamentum carnosum Vteri, quod per apophysim Peritonæi delapsum inguina percurrit: per illud corpus fistulosum, materia virulenta in cornubus, siue tuba Vteri concepta, vi & robore naturæ in glandulas illas amandatur.

Dum ista perpendes, obseruabis Venam illam, quæ saphenam producit à crurali infra fixam inguinis enatam, supernè remeare, duorum digitorum transuersosum latitudinem, & postquam glandulis Venulas suppeditaui, deorsum refluat. Inde cognosces *Bubonis* siue *Veneris*, siue *Pessilentis* materiam coniunctam, ferme exhauriri, sanguine copiose educto, *apertâ saphenâ*, siue meru luis Veneræ exrefluxu humoris ad interiora.

Peritonæum ex se figuram non habet rotundam, sed à partibus accipit, quas sinu suo amplexatur; atque obiter hoc interferam de partium rotunditate, quam Natura in singulis partibus quantum potuit expressit, tam internis quàm externis, quæ sunt omnes sphericæ. Sed propter apophyses, & connexiones cum aliis, spheræ perfectio vitatur, licet intus maneat rotundæ, inquit *Galenus, libro octauo de v. s. partium, capite undecimo*. Cum autem Peritonæum lumbis adhæreat, ipsumque Mesenterium producat, facilè biliosus humor scse insinuat in duplicaturam Peritonæi, vbi dolores colici à *Fernelio* descripti procreantur, nec enim in Colo Intestino consistunt, sed vel in Peritonæo, vel Membranis, quæ abdomini ventrisque partibus obtendantur, qui quidem crudissimi sunt, & admodum diuturni, quia Membranarum spatii tenuis & acerrimus humor concluditur, è quibus vix potest de trahi. Scribit *Hippocrates, Aphorif. 6. lib. 7.* dolores ventris sublimes esse leuiore: *Galenus in comment.* sublimes & profundos distinguit Peritonæo, tumque Peritonæum ad partes sublimes pertinebit.

Priusquam Peritonæum diuidatur, inguinis structuram considerabis, per quod vas spermaticum descendit ad Testiculos, & iaculatorium supernè remeare. Vtrumque per apophysim Peritonæi ad Testem traducitur, deinde Venam & Arteriam crurales obseruabis, per inguen excurrentes ad femur, ibi deprehendes motum Arterię si in aliis locis deficiat. Præterea notabis glandulas varias, in quibus generantur *Bubones* diuersi generis. Vidi sanguinisferosi excretionem per inguinis foraminulum dehiscens per tres quatuorve dies singulis mensibus in Inuene nobili Academię Regiæ Militaris. Si pus vel aqua contineantur intra capacitatem abdominis, potest perforari in hypogastrio, versus ilia, reclinato corpore, cum magna ramen cautione incidendo, ne tangatur Intestigum. In alterutro latere incisio fieri potest supra inguen, vt humor exhauriatur, vel canulâ introductâ, vel pyulco, si opus sit.

*DIVISIO PARTIVM CONTENTARVM  
in Abdomine.*

CAPVT XI.

**A**D MINISTRATIS ac demonstratis partibus Continentibus, ad *Contentas* perges, quas doctrinæ gratiâ distingues in *Nutritias*, & *Genitales*: Nutritiarum aliz sunt *Chylifica*, aliz *Sanguifica*, & earum aliz præparant, Aliz concoquunt alimentum, Aliz adiuuant coctionem, Aliz alibilem succum in corpus deuchunt, Aliz separant excrementa, Aliz transmittunt, Aliz suscipiunt, ex *Galeno, lib. 1. de natural. facult.* Quapropter ad Chylificationem præparatur cibus in ore masticatus, saliuæque maceratus, coquitur in Ventriculo: coctionem adiuuant Omentum & Pancreas, transmittunt Chylum Pylorus & Ecphyfis. Suscipiunt Intestina, Ieiunum & Ileon. Separant & conseruant excrementa Crassa Intestina, distribuunt Chylum Hepati, Venæ Mesaraicæ, in quibus præparatur, & rudimentum sanguinis acquirit. Pergo ad sanguificas.

In Hepate sanguis perficitur, perfectus & elaboratus per venas distribuitur, prius tamen suis excrementis reputatus: bilem transmittunt poti cholidoci, asseruat vesicula. Humorem melancholicum, siue sanguinis faciem defert Ramus Splenicus, conseruat Lien, Serosum excrementum Renes attrahunt & segregant, Veteres in Vesicam deuchunt, vbi coaceruatur, donec quantitate vel qualitate molesta, exitum affectet. *Genitales partes sunt duplices, Viriles & Muliebres.* Ex virilibus, Aliz materiam seminalem deferunt, vt vasa spermatica, Aliz præparant, Parastatæ circoïdes aliz vim prolificam tribuunt, Testes, Aliz semen prolificum transmittunt, Vasa eiaculantia: Aliz semen conseruant, Vesiculæ seminatig: Aliz in Vterum effundunt, Penis. Muliebres partes considerantur, quatenus vacuæ, Aut plenæ: priore modo notabis, Alias feminis materiam deferte, vt vasa deferentia, Alias semen perficite, Testes, Alias semen emittere, vt vasa eiaculantia, Alias semen conseruare, vt tubam Vteri, Alias, semen effusum excipere, vt Vterum cum ceruice. At in mulieribus fœcis præter istas partes, intra Vteri capacitatem, Fœtum cum propriis inuolutis obseruabis. Sed hæc ad *Fœtus* Anatomen pettinent.

*DE VMBILICO.*

CAPVT XII.

**R**OSTQVAM istam diuisionem apud te proposueris, discussio ad latera Peritonæi, Vmbilicum filo reniculum atrolles, vt vasa quatuor vmbilicalia comparcant, qua intra Peritonæi duplicaturam abscindita, digitorum potius cæteru quam vasa deprehenduntur. Deprehensa vasa forscie separabis & expurgabis: Memineris tamen tria esse infra Vmbilicum (cum simodi sunt arteria duæ & vniuersa medius) vnicum vas, nempe venam, Embryi nutriculum, supra Vmbilicum ad Hepatis iuram contendere. In adultis tam viris quàm mulieribus, præsertim us qua Vtero gestarunt, insigniora vasa adeo sunt exilia, & gracilia prope Vmbilicum, vt sæpe visum & contactum effugiant, imò & euanescent, ac veluti abrupta & interiticia cernantur. Hæc vasa & *Galeno* animaduersa & descripta sunt, sed illis nullum vsum tribuit fœtu excluso, quæ licet vieta & emicrita, veterique officio priuata staccescant & degenerent in ligamenta, nou tanien crediderim eorum tantam esse necessitatem, vt vno tupto, vel omnibus incisis, hominem interire necessum sit, aut deterius viuere dyspnœa fatigatum. Nam Venæ Vmbilicalis defectum supplet Ligamentum illud latum Xiphoidi affixum, quod est propago Petitonæi. Vidi in Æthiopica muliere saltatrice agilissima, Venam Vmbilicalem abruptam, & intra fissuram Hepatis reuulsam, at-

Admiratio A. Uambicæ.

que arefactam, quæ sine ullo vitæ incommodo, aut respirationis impedimento vivebat: sed ob intersectam sodalem strangulationis supplicio affecta fuerat. Quinetiam in plurimis mulieribus quæ sæpius Vtero gessauerant, Vasa tria vmbilicalia inferiora deprehendi abrupta, nec ad Vmbilicum peruenientia, quorum ad aminiculum carere potest Vescica, duplicato Peritonæo in homine solo suspensa & inclusa. Scio ad probandam vasorum Vmbilicalium vtilitatem, vulgatum apud *Ægyptios* grassatorum supplicium proferri, eos detracto corio tamdiu vivere, donec Vmbilicū carnis flex circinauerit; vti referunt *Leo Afer*, libro de *historia Africana*, & *Iul. C. Scaliger*, *Exercit. 246*. Vidi quoque *Fabricij Hildani* obseruationem in *Centuriis Chirurgicis*, de homine subito extincto, dissecta Vena Vmbilicali ex vulnere supra Vmbilicum accepto, integris & inoffensis Intestinis. Propterea possis Vmbilicum comparare istis lapidibus, qui in operibus fornicariis forficis in modum expansi, Vmbilici vocantur, *inquas ab Aristotele*, libro de mundo, cap. 6. Sic Vmbilicus apud Hebræos *Sor* dicitur, seu *Sor*, quod sit quasi catena & vinculum quo Venter sit concatenatus. Accuratio vasorum Vmbilicalium explicatio ad *Fetus* historiam pertinet.

Obiter addam Vmbilicalem in homine solitariam esse, in brutis geminam, & in hydropicis nonnunquam hiare & reeludi, quando serum in Hepate exuberans per Vmbilicum exeerit. In quadam muliere hydropica inuenta fuit fistulosa, & per eam aqua inter Peritonæum & abdominis musculos effundebatur. *Fabricius Hildanus*, libro tertio *Obseruat.* de Pharmacopœo narrat, qui sanguinem magnâ copiâ per Vmbilicum effundebat: Simile exemplum memini me legisse in *Obseruationibus Hülterij*. Carpus interdum vidit sanguinem excitare tumorem in Vmbilico, qui sanguis illius iudicio veniebat ab Hepate, per illam venam Vmbilicalem, quâ nutritur Fœtus in Vtero matris, comment. in *Mundinum*. Sanguinem stillare ex interuallis per Vmbilicum in virgine duodena vidit *Hechtsterens*, *Obseruat. part. 1.* & sub finem *part. 2.* notat in vena Vmbilicali puerorum, vermes sæpius innasci & generari, qui mortem inferre solent. Interea notabis Vmbilicales arterias non implantari iliacis, sed ad hypogastricas descendere, at infantibus Vmbilicales sub finem bifidæ adhaerent, & iliacis & hypogastricis. Crescente verò corpore, & amplificatis ilibus conexio cum iliacis abruptitur, remanente altera cum hypogastricis.

Affectus Vmbilici graues sunt, non tam proprio sensu & affectu partis, quàm viscerum nutritiorum subita affectione, ob facilem rerum noxiarum penetrationem, ideo epomphalia ad purgandum, huic parti admoventur, & reliqua medicamenta discutiendis statibus idonea, Vmbilici cauo induntur, vt celerrimè permeantia partibus affectis communicentur. Inter tormenta, quibus veritas reis extorquetur, illud solemne est, frigidam Vmbilico affundere, quo nullum grauius excogitari potest supplicium. Apud *Hippocratem*, terminus inflammationum est Vmbilicus, ratione Mesenterij, quod fere totum subiacet Vmbilicali regioni, ideoque tueri & prominere solet Vmbilicus in abscessibus ventris. Apud *Iobum*, diaboli virtus, in *lumbis*, & *puellitas eius in Vmbilico*. *Sapientissimus Salomon in Proverbiis*, cap. 3. dum prospectam spondet & pollicetur sanitatem, *erit irrigatio osium tuorum*, & *sanitas in Vmbilico tuo*. Alij volunt Vmbilicum esse concupiscentiæ signum: propterea sanitatem in Vmbilico, significare extinctam concupiscentiam. Quærit *Aristoteles*, *sect. 10. probl. 45.* cur hominum Vmbilici ampliores, cæterorum verò animalium exigui incertique fiant. Dicerem ideo brutis accidere, quod corio tenuis radiceis dente secant vmbilicum, sicque disparent vasa Vmbilicalia intus reuulsa. In foetu humano Vmbilicus nodosus est coitus vasorum Vmbilicalium, quæ filo nectuntur, ideoque foris rugosus & protuberans remanet Vmbilicus. Narrat *Plato in Symposio*, quod post primi hominis *Androgyni* dissectionem, *Apollo*, qui huius rei curam habuit, rugas nonnullas circa medium ventrem vmbilicumque reliquit, vt cicatrices quædam veteris coalitus extarent monumentum. Sed iocosa ista, vt & *Androgyni* fabulam ex *Aristophane Poëtâ* proponit. Cæterum, *Galenus libro sexto de Placitis*, veteresque Medici Centrum corporis in Vmbilico collocauerunt. *Vesalius Galeni* sententiam ausus est impugnare, nixus auctoritatē *Ferronis*, libro sexto de lingua Latina, in ossium pubis coalitu corporis medium exquisitum constituens.

Ego verò duplex corporis centrum agnosco, *longitudinis & rotunditatis*: *Longitudinis* centrum est symphysis ossium pubis; *Rotunditatis* Vmbilicus; nam si in homine resupino manibus pedibusque expansis, pedem circini Vmbilico affigas, alterumque

pedem per extremitates manuum & pedum circumducas, exactum circulum efficies, cuius erit centrum Umbilicus. Ausim etiam affirmare rotunditatis & longitudinis corporis idem esse centrum, quod æquali spatio corpus discriminat, & ex æquo metitur, modo mensuranti istam facias in corpore infantis: Nam ex *Aristotele*, Infantis partes superiores maiores sunt & longiores, contra quam in adultis: & Umbilicus in foetu usque ad quintum mensem, est iuxta symphylium ossium pubis: secundum corporis incrementa sensim ascendit ad medium ventris: deinde si foetus mortuum Umbilico suspensum teneas, videbis extremas partes æquè ponderare: quinetiam adulti perfectique corporis ponderati centrum erit in Umbilico. Nam si corpus resupinum vel pronum baculo imponas, in lateribus ponderis æqualitatem deprehendes. Ratione Umbilici, partium internarum centrum & medium *Galenus* in Renibus collocavit, quia sunt directè subiecti Umbilico: propterea Renes ambigere scribit, ita ut iis affectis, ex brachio, vel ex pede, liceat sanguinem detrahere. Alibi tamen, *libro sexto Epid. & lib. 3. de Humoribus*, in Iecore medium corporis constituit: ideoque femora supra lecut, cubiti venæ sectionem postulare, infra verò pedis. Ac sanè centrum partium internarum esse potest in Hepate, ratione Cauæ ascendentis & descendentis, quam superiectum Iecur dirimere videtur: siquidem, ut notauit *Aristoteles*, *libro secundo de Celo, cap. 13.* in animalibus non est idem animalis & corporis medium: quoddam est magnitudinis, aliud naturæ, quale est perfectius viscus. Umbilicum quoque ventris inferioris centrum esse statuit *Galenus*, *libro quinto Admin. Anat. cap. 7.* Vnde quum inferior pars subiecta Umbilico, superiorem longitudine excedit, Ilias morborum in ventre inferiore excitatur, propter cruditates ibi congestas, ut accidit in *μαλακταχτης*, gulæ & abdomini insaturabili subiugatis: quod disertè explicat *Aristoteles*, *problem. 6. sect. 1.*

## DE OMENTO.

## CAPUT XIII.

**D**ISSECTA venâ Umbilicali iuxta Umbilicum, superhæ vasa in suum quodque latius reclinabis, atque conseruabis, ut cum ad Hepar & Vescicam ventum erit, iterum demonstrari queant. Itaque aperto ventre Omentum conspicitur summis Intestinis innans. Ideo Græcis *ἐπὶ σπλῆνι*, quoniam *ἐπὶ σπλῆνι*, vel quia cauum instar sacculi nomen accepit. *Herodotus* Vascula & repositoria *ἐπὶ σπλῆνι* vocat. *Isæus* singulari numero *ἐπὶ σπλῆνι*, inquit *Pollux*, *lib. 10. cap. 1.* At *ἐπὶ σπλῆνι*, quod thecas & vascula significat, dicitur ab *ἐπὶ σπλῆνι*, ex *Etymologico Græco*. Latinis Omentum dicitur, quasi Operimentum, veteres Omenta vocabant inualucria, vnde *Macrobius* meningas Cerebri, Omenta nominauit. Vel Omentum dicitur quasi *opimentum*, à dictione *opimum*. Alij deriuant ab *omine*, quod ex eo veteres ominarentur, apud *Senecam* in *Ordispo*, act. 2.

~~~~~ non nulli ambigunt

Omenta, pingues viscerum obducenti sinu.

Rectius omentum dicitur, quasi ommentum, ab ommento, quod est supra maneo, quia manet & sinit supra Intestina: Alij deducunt Omentum ab *Omasa*, ratione adposititatis, ut *Iulius Alexandrinus*, sed præter quod voces longè distant sono, prima syllaba in Omento est longa, in *Omasa* breuis. De nomine *Epiplæ*, lege caput de *Diaphragmate*.

Constat autem duabus membranis sibi ipsis incumbentibus, quæ adipe cænofo, molli, facile putrescente, reticulatim appositæ conspersæ sunt. Ideoque *Hippocrates*, *libro de Glandulis*, *ἐπὶ σπλῆνι*, plurali numero Omentum appellauit. Sic duplicatum Omentum veram marsupij speciem exhibet, præsertim qua parte superemisset Intestinis. *Galenus* maximum inter animalia, simiæ & homini concessum fuisse scribit, *libro septimo Admin. Anat.* ob eam causam sola hæc duo animalia *Epiplæ* uel tentarij propter Omenti magnitudinem, quod in hominibus latiore spatio Intestinis superentum est quàm in brutis, *autore Galeno*, *libro tertio de vsu part.* quod non est absolutè verum.

diu illius percipias, sine ad spectabili & contrectabili tumore Lienis, plenitudo illa non Lienis sed ab ista parte tumefacta dependet, quod in *praxi* diligenter notandū.

Tertia portio Omenti, Hepatica nominatur, sese infinuat in cavitatem Hepatis, & intra se includit paruum Hepatis globum, simulque comprehendit venę portę truncum, parvo lobo instratum. Hęc portio paucis auge constat, & vtis formam refert, imputantes I Hepatis excipit, & aquam ab Hepate transmittit in portionem Omenti pendulam. De secunda portione Omenti intelligendus est *Aph. 55. lib. 7.* De tertia portione Omenti *sequens Aphorismus*, quos tamen *Galenus* non intellexit, & tanquam spuios repudiavit & expunxit.

Quarta portio Omenti, Mesenterica dicta, Colo & Ventriculo subtenfa, infernè descendens, vt vniatur Mesenterio, consimilis est ipsi Mesenterio; à quo videtur emanare, nisi quod glandulis careat, aut saltem paucas & exiles habeat, cum Mesenterio illuic primę regionis excipit, & ab alijs partibus Omenti deriuatas sordes traducit in verum Mesenterium, & Intestina crassa quibus adhærescit. Quare facta fuerit hęc portio pendula infra Colon dubitatur apud Anatomicos. Causam se ignorare ingenue fatetur *Fallopys*, nec rationem adfert sufficientem *Vesalins*, in *Examine Obscurat. Fallop.* Pendulum est Omentum, infra Coloni Intestinum, ab incremento eius partis, quę augeatur secundum corporis accretionem, ex adipis cumulo sensim ponderosior facta, deorsum retrahit Colum Intestinum ne premat transitu suo Ventriculum, est instar contrapondij. In erecto homine magis distenditur & amplificatur, quinetiam, vt absoluto naturalis accretionis termino facile augeatur propter obesitatem, ita de cretce per totum vitę decursum in natię & tabe corporis. In pueris nullum est Omentum pendulum, quod signum est certissimum hanc portionem ex nutritione accreuisse. Nullum in venatoribus Omentum reperitur, si credimus *Carolo Stephano*, propter siccitatem corporis.

Sed quid sine portionis huius pendulę Omenti sacculus, veluti marsupium productus fuit? An vt instar vtis crassam Lienis illuuiem excipiat, quę in illas Omenti venas transferatur, si quando redundet. Nec mitum si Omentū venis amplis & euentibus conspersum fuerit, quam nullas aut raras, easque exiles venulas in alio adipe vix queas deprehendere. Quapropter existimo imputitatem & illuuiem Lienis in Omentum duplicatū, multis venis scatens deriuari & coaceruari. Vtriculus aqua plenus in hydropse Lienis obseruatus, nihil erat aliud quā *Omenti duplicatura* seroso sanguine distenta. Membrana sub Ventriculo & Liene exputrecta, in morbis diuturnioribus, & in vultustate incidentibus humore differta, à *Cunco* deprehensa in mortuis, ipsum erat Omentum duplicatum, quinetiam *Salomoni Alberto*, in *Exercitationibus Anatomicis*, & libro de *Scorbuto*, triquetrum spatium, quod versus spinam inter Ventriculum & Lienem & Colon inane interiaccet, humoribus stagnare olim visum est, siue serosior & aquosior ichor eò exsudatit, seu transpirans halitus conditione loci ad ingenium illie postea redierit, erat Omenti portio glomerata iam descripta.

Propterea *Aphorismus 54. lib. 7.* perinet ad eam partem Omenti, quę iacet & consistit inter Septum, Lienem, & Ventriculum, vbi pituita multa cumulari potest, quod in multis morbis præbet occasionem, Lienem affectum suspicandi, & frustra accusandi: inde plerumque dependent contumaces Hypochondrij sinistri obstructions, quę post frequentes purgationes, aquarum *Thermalium* vsu percurantur. Propterea citatus Aphorismus magni est in Medicina momenti. Quibus inter *Ventriculum & Septum transversum* pituita conditur, & dolorem adfert, ad alterutrum *Ventrem* exitum non habens, ut per venas ad *vesicam* versā pituita, morbi fit solutio.

Sæpe obseruavi tumores abdominis prominentes versus Umbilicum, qui neutiquam fiebant ab humore intra musculorum abdominis spatia concluso, ab Omento multis humoribus sarto & sorto produci, quod est annotatum ab *Hippocrate*, lib. de *locis in homine*. Vbi vasa pinguedine vacua fuerint, & à Splene florente ac augefcente in Omentum defluerint, vt pote vicinum valde existens, & vasa habens eaque vacua, &c. Idem *Aphor. 57. lib. 7.* id aperte declarat, quibus Hepar aquā plenum in Omentū transierit, ut venę aqua repletur, & moriuntur. Fit hydrops, inquit ille lib. 1. de morbis *multarum*, neque sciente Liene, & cibibente aquam liberaliter hauritam, quam tandem in Epithoron deponit. Et lib. 4. de morbis, assensit vitio Lienis hydropem fieri. *Erasistratus*, auctore *Galieno*, lib. de *Acrida*, ex illis habuit Omentum Lieni adhaeruisse instar Mesenterij, & sordes eius viscere excipere. *Lutetia* in corpore publico secū inuentum fuit

in Epiploï ad vesicam vsque pendens membraneo quodam veluti sacco, apostema pure ibidem coaceruato distentissimum, ex *Ruffio lib. de pario Casareo pag. 121.*

Non mirum igitur, si Omenti substantia facile augeatur, & inruescat, & quamuis tenuissimum sit, in tanta ténacitate dum humoribus distentum est, insignem crassitiem acquirit, æqualem Peritonæo, vt sæpius obseruau. Vidit *Valsius lib. 5. cap.*

4 Omentum quinque librarum pondus æquasse, mortisque causam dedisse, quum tamen naturaliter vix semilibræ pondus excedat. Admirabilem Omenti crassitiem describit *Fabricius Hildanus, ex Observationibus Harpy.* In nobili adolescēte annos 19. nato, Omentum versus Umbilicum ad formam orbiculi, latitudine palmi conglobatum, multis glandulis differtum obseruau, quod totam illuuiē exceperat, Liene penè consumpto, & Mesenterio, & Pancreate putrefactis ex abscessu. Itaque propter adhesionē quas habet Omentum cum Hepate, Ventriculo & Liene, humores ab his partibus in ipsum deruari possunt. Vidit *Fabricius ab Aquapendente* Omenti marsupium vniuersum, atro crassoque humore repletum, imò statim hypochondriacos in melancholia statulenta *Dialis*, hac cavitāte concludi, & sinistra parte percipi certum est.

Denique homines quamplurimi abdomen vicissim attollendo & comprimendo, motum, imò strepitum effatu dignum excitant, qui non aliunde procedit, quàm ex flatibus intra duplicaturas Omenti conclusis, qui exsufflatione elii obstreperūt, & circum claustra fremunt, sic in equis succussatis, & illiā ducentibus, aut saltu progredientibus, ventrem resonare obaudimus, propter statim intra Omentum conclusos & obstreperentes. Nec aliunde causa *ἰσχυρισμῶν* repetenda, quàm ex flatibus intra Omentum inclusis, artificioso ventris motu collisis. Videmus quotidie quibusdam virginibus & mulieribus melancholicis splenicis, non tantum ieiunis, sed etiam saturis ventrem importunè resonare & obstreperere, inde manant fluctuationes & rugitus venteris, compressis & sublati hypochondriis; inde sunt nonnulli ventriloqui, *ἰσχυρισμῶν*. Plato in *Sophista* meminit *Euryclis ἰσχυρῶν*, & *Hipp. lib. 5. Epidem. particula 38.* mentionem facit *Polemarchi* vxoris anginosæ, circa Cor videbatur ipsi aliquid colligi, & respirabat velut i qui submersi fuerunt, respirant, & ex pectore substrepebat, velut *Engastrimythi*, de quibus vide *Scalig. contra Card. Exercit. 238. particul. 3. Fœsum*, in *Oeconomia Hippocratis*, vbi notat *Adrianum Turnebum* publicè in auditorio dixisse se vidisse nebulonem quendam, qui clauso ore ex ventre loquebatur, & ex eo magnū questū faciebat, itaque *ἰσχυρισμῶν*, ex *Galeo*, in *Exegesi*, sunt qui clauso ore loquuntur ex ventre, ac si loquerentur ex ore, vt *ἰσχυρισμῶν* dicuntur, qui è pectore loquuntur, quod accidit ratione cavitatis insignis, quæ maior est in amplo pectore, intra duplicaturam mediastini. In eo spatio Epiploï interdum vidi statim tanta copia irrepsisse in laborioso partu, ex vehemēti & longa contentione enitendi & emitendi fœtū, sæpius cohibito spiritu, vt abdomen per aliquot dies à partu remanserit, mirabili modo distentum & eleuatum cum manifesta circumscriptione transuersali iuxta Umbilicum, isque meteorismus abdominis, etiam ritè fluentibus locuis, atque superueniente fluore alui, parum fuit imminutus, sed fortibus dumtaxat calaficiis & resoluētibz discutit potuit.

Non satis intelligo, quomodo Epiploon adiposum ventriculo adnexum fuerit, an vt per inedia succus in eo collectus in alimoniam conuertatur? vti censet *Mauric. Cordens, Med. Pars. comment. in lib. 1. Hippocratis de morbis mulierum*. Epiploon, inquit, primum est, post ventriculum, cibi, si non potionis receptaculum, officina saltē prima nutrimenti, & quidem secundarij, quod quidem subministrat, rependit per iuedias longiores, vnde nimirum Ventriculus escam repetit, quasi gratiā ruminatōis, ob id pluribus venis & arteriis conspersum, quæ Ventriculo & Intestinis & Epiploō communes sunt. Hæc opinio ex *Hippocrate* de prompta est, *lib. de natura pueri*, vbi agit de lactis generatione: & *lib. de morbo sacro*, sanguinis superflui conceptaculum in Omento constituit. Ab vtero, inquit, ad mammas accedit, quod post partum puero cessurum est in alimentum, quod ipsum sanè exprimit, ac sursum mittit Omentum ad superiores partes, ab ipso fœtu coarctatum.

Existimo Epiploon Ventriculi fundo alligatum esse, non tantum vt calefaciat, sed vt instar vinculi Colon Intestinum Ventriculo & Liēni connectat: sic enim ad superiora reuinctū est Colon, vt non possit infra Umbilicū decidere. *Aristoteles*, & post eum *Galenus*, Omentum calefaciendi Ventriculi causa constructum esse scribere: idque demonstrat exemplum Gladiatoris, qui cōm magnam eius portionem per vulnus erum-

vocabulum, inde *Meſenterion*, Meſenterium ex *Aretae libro 2. acutiorum, cap. 6. ῥέον δὲ χυλόν*, quod est implico, inde morbus Intestini tenuioris, *ῥέοντες*, quod deriuatur à dictione *ῥέω*, id est, emollitio, & *ῥέον*, quod est *immo* nomen, vt ait *Aretaeus*, vel quod tangenti abdomenti videatur contingere, & *ῥέοντες* *ἀνδρῶν* dum inſtar chordarum ſidumve tenſa ſunt Intestina. Tenuia Intestina *laſtes* dicuntur apud *Plinium*, *iſta vocitate venioſaſis laſtiſus*; *laſtes* vocantur quaſi *laſtea*, quia chylo *laſtes* ſunt diſtenta, vel quod per ea labitur cibus ex *Plinio*, tamquam à lambendo, vel ab antiquo verbo *laſis*, quod eſt elicio, quia trahunt cibos è ventriculo. *Oenomaſticon vetus*, *laſtes* interpretatur Meſenterium, quia pingue, candidum & laſteum.

Antequam vltiùs progrediare, Intestinatorum viſcerumque omnium ſuum naturalem obſeruabis, vt intelligas quæ partes, quibus in cute locis ſubditæ ſint, & reſpondeant, quod non leue momentum ad medendi artem adfert. Dextrum Hypochondrium vltra cartilaginem Xyphoidem Hepat opplet, in ſiniſtro Lien conſiſtit, inter vtrumque viſcus, medius iacet Ventriculus; reliquum abdominis ſpatium occupant Intestina, hoc modo diſpoſita. Icium amplitudinem vmbilicalis regionis poſſidet. Ileon in ſilibus ſitū eſt, Colon à Rene dextro verſus Hepar & Lienem inſtar arcūs reuolutum cernitur. Hæc ſola intuentibus apparent. Nam Ecphyſis ſiue Duodenum ſub Pancreate prope ſpinam iacet, Rectum Intestinum in coxarum antrum decliue ad podicem excurrit. Hinc ſuperiecta eſt Veſica, in imo hypogaſtrio collocata, & in mulieribus Vterus Recto Intestino & Veſicæ interiectus.

Crassa quidem Intestina in homine ſuperiora ſunt, & tenuia ſepimenti modo obuallant, infra Lienem parte ſiniſtra mollis puluinariſ vice tenuia ſuffulciunt. In canibus aliſque quadrupedibus Intestina tenuia, ſunt ſuperiora: cralla verò inſimum ventris locum occupant, in homine Natura gracilia Intestina in medio locauit, & cralla in circuitu diſpoſuit, ne tenuia quæ chylum continent, & cralla quæ feces excipiant, ſibi mutuo eſſent impedimento. Equum etiam erat cralla à tenuibus ſe iungi, ne in iſta conſuſione Intestinatorum, contagæ ſæcem malè olentium chylus conſpurcicaretur, ſunt autem cralla Intestina certis in locis Peritonæo adſtriſta & reuincta, quia carent vero Meſenterio. Sed ne anguſtus aliquis vel inæqualitas quædam in illa reuolutione Intestinatorum retardaret anadoſim chyli, tenuia Intestina Natura per ſpiras & anfracſus contortſit, cralla verò per circulatæ & obliquæ inceſſum arcuatim deduxit.

Porro, Intestina dicuntur ab omnibus Anatomicis Ventriculo continuata, ſed contrarium facile conuincit, diuerſis membratarum ſitus in Ventriculo & Intestinis: quia carnoſa tunica quæ circumdat extrinſecus Ventriculum, in ipſis Intestinis eſt interna. *Fernelius* ex fibrarum varietate, quæ cernitur in Ventriculo & Intestinis, colligit gulam in Ventriculi partibus numerandam eſſe, Intestina verò minimè, ſed hæc Ventriculo connecti, nequaquam ab eo naſci & exoriri: quæ fuit *Galenus* ſententia, *lib. 4. de uſu part.* nempe Duodenum non eſſe Ventriculi partem, ſed quid aliud illi conueniam.

Semper obſeruauit quod ſcriptum eſt à *Recentioribus*, reſecta in pyloro & podice Intestina, ſepties corporis longitudinem æquare, & ſi deſit aliquid, adde Oeſophagum, à quo *Ceſius* metitur Intestina, menſuram iſtam inuenies. Interdum etiam obſeruauit non tantum ſepties, ſed etiam nouies corporis longitudinem æquaſſe. Intestinatorum longitudine *Hippocrati, lib. de corporum reſectione, & lib. de ſtructure hominis*, eſt cubitorum ſere tredecim, vel non minus duodecim. *Ruſus Ephreſus* priorem menſuram approbat. *Veſalius* Intestina metitur per vlnas videlicet quatuordecim cum dimidia; Cum vlnæ ſint variæ pro locorum varietate, qualem vlnam intelligat, non expoſuit: *Archangelus Piccolominus*, vult eſſe metienda pro totius corporis menſura, & altitudi-ne, multiplicatis pedibus per ſex, vt ſi corpus ſit quinque pedum, Intestina ſint triginta pedum palmo vno minus ſemiſſe; quod ſi corpus ſit ſex pedum, Intestina triginta ſex pedum ſunt, palmo vno minus ſemiſſe.

Tanta longitudine tortuoſo ac miro volumine diſpoſita eſt, ad perfectæ distributionis munus, ne alimentum conſeſtim elabens, gulæ, inſaturabilique abdomini nos ſubiugaret: & ne ſordido ctebrius deiiciendi miniſterio, in dignæ hominis dignitate ſeruituti manciparemur. Quæ verò animalia vnicum habent Intestinum à Ventriculo rectè ad anum protenſum, inſatiabilia ſunt, plantarum modo cibus addicta. Talis erat voraciſſimus ille diſſectus *Maniſſellus*, qui vnicum habebat Intestinum

amplissimum in S. Romani modum inflexum, sine alia vlla reuolutione. In oue Intestinatorum longitudo quindecim vlnas nostrates Parisienses adimplet. In boue plussquam duodecim corporis sui longitudinem excedit. Quare quum hæc animalia sint gulosa & insatiabilia, vide num tanta longitudo Intestinatorum homini data fuerit, vt semel aut bis in die assumpto cibo, famem sedaret, ne continuo cistare cogereetur, atque *quiescere* & *quiescere* vitam degere: vel potius ad absolutæ distributionis munus viarum comparata fuerit, vt in tanta longitudine, nulla portio vtilis alimenti fuctum venarum mesaraicarum subterfugeret. At oculus venarum mesaraicarum hiantibus & sugentibus instar hirudinum, tenuissima tantum chyli portio proleclatur, crassiore remanente, quod in breui spatio fieri non poterat.

Tota hæc longitudo Intestinatorum flexuosis gyris cumducta, licet à pyloro vsq; ad podicem sit continuata, sine vlla diuisione, tamen ratione membrana tenuioris vel crassioris, in duas partes, nempe Intestinum *Tenuis* & *Crassum* dirimitur. Rursus vnaqueque pars pro ratione figuræ, situs, longitudinis, & abundantia venarum mesaraicarum, trifariam subdiuiditur; itaut tria sint Intestina tenuia, *Ephippis*, *Ieiunum*, *Ileon*. totidem crassa, *Cæcum*, *Colon* & *Rectum*. Numerata tamen Intestinatorum apud veteres incertus est. *Hippocrates* duo tantum constituit, Colon, & Rectum. Apud *Aristotelem*, libro tertio de partibus animalium, cap. 14. quinque Intestina suis propriis nominibus designata inuenio, putà *intestinum*, *intestinum*, & *intestinum*, & *intestinum*, & *intestinum*: paulò postnominat *intestinum*, & *intestinum*. At libro primo de hist. animal. duo tantum constituit & enumerat. Ventriculo subest Intestinum simplex, flexuosum, & *intestinum*. Inde alterum latius, quod *intestinum* dicitur, vt docet *Agellius*, libro undecimo cap. 17. Quærere posset aliquis, cur *Aristoteles* scripserit feminis parrem nullam superioris Intestini ieiunam esse, aliam enim alius vt fors tulerit: Maribus autem proximè ante Cæcum aluumque omnibus est, cap. 14. lib. 3. de partibus animal. Rationem assignare licet ex *Platone*, libro sexto de Legibus, quod mulieres sint inexplebiles & voraces, ideoque comestatio virorum definita fuit à *Platone*, non autem mulierum, quoniam animal est intemperans, quod legibus regi non potest. Idem scriptum ab *Aristotele*, libro secundo de Republ. cap. 9. de mulieribus *Lacedæmoniorum*. *Hippocrates* libro de Anatome, vnum constituit, ex Ventriculo procedit Intestinum sibi simile, patuum, cubitorum non minus duodecim, in orbem per sinus conuolutum, quod nonnulli *intestinum* vocant, intelligit totam Intestinatorum continuitatem, & *intestinum* dicitur, quasi *intestinum*. Nihilominus in *Coacu* pluries mentionem facit Intestini tenuis, & in *Aphorismis*, & libro de principis nominatur Ieiunum, & *intestinum*. *Hierodotus* in *Isagoge*, & *Iulius Pollux* quinque tantum numerant, & nominant, nulla facta mentione *Ephippis*, seu primi Intestini. *Galenus* libro sexto de locis affectis, cap. 11. quinque dumat enumerat, & lib. 6. Admin. Anat. disertè notat à nonnullis Duodenum inter Intestina non numerari, quod in orbes & anfractus non sit conuolutum.

Intestina, vt Ventriculus tribus constant membranis, vna communi à Peritonæo, duabus propriis, nervosa exteriore, interiore carnosa, partim vt facultas eorum expultrix esset validior, partim vt iactura & detrimentum interioris facilius repararetur. Vident *Galenus*, multos ex graui dysenteria, etosâ iam interiore tunicâ, & regeneratâ conualuisse, propter exterioris integritatem: Ob eam solam causâ in natura Intestinatorum tunicas, contrario, arque in Ventriculo, situ disposuit. Interior duplò longior est exteriore, quia complicata, vt rugosa fiat, ad remorandum chylum, hæc rugosa villositas in facie interna Intestinatorum conspiciatur, qualis est in Ventriculo, & euidentior apparet si coquantur: In Intestino ieiuno, venæ & plicæ, siue rugositates sunt numerosiores, & frequentiores. In Ileo, spiræ & reuolutiones sunt frequentiores, plicæ rariores & distantiore, vt obseruauit *Fabricius*. Interior hæc membrana putri pituita delibuta, interdum, licet rarò, in latum lubricum siue *Taniam* degenerat, opinione *Pauli Æginetæ*, & *Acty*, vt *Thadæus Dunaus* probat in suis *Miscellaneis*, quamuis aliter sentiat *Spigelius*, tractatu de lato lubrico. Interiorem tunicam obducit crustosa & fungosa quadam substantia, ab excrementis tertiaræ coctionis genita, ne sordium præterlabentium acrimoniâ facillè offenderetur: fungitur etiam valvulæ officio ad impediendum chyli refluxum: obstat adhuc ne à sordibus extorquerentur venarum mesaraicarum oscula. Per eam veluti per sitrum à venis mesaraicis instar hirudinum sugentibus, tenuis chyli portio transcolatur, ibique fit tenuis chyli à crasso, puri ab impuro secretio.

Robur Intestinis addunt fibræ multiplices, *Recta, Transuersa, & Circulares*, quarum ope excrementa foras propelluntur, & peristalticus Intestinelorum motus superne deorsum perficitur. De motu peristaltico Intestinelorum inuerso lege *Dan. Sennertum, lib. 3. prael. Med. Galenus* tamen vnicum genus fibrarum transuersarum Intestinis tribuit, alibi plura, quam contrarietatem enodat & euoluit *Rorarius in Contradiet.* Nec tantum fibrarum beneficio facultas expultrix iuuatur, verum etiam retentrix, quidquid *Galenus* contra scripserit, vt loco citato explicat *Rorarius*. Vnde post curatam dysenteriam, erosio & consumptio Intestinelorum fibris, inuoluntarium alui fluxum succedere vidit *Beniuennius, libro de abditis morb. caus.* & hoc sæpius obseruauit. Quod confirmatur ab *Hippocrate, Aphorif. 74. lib. 7.* sed *Galenus, lib. 1. Administ. Anatomie. cap. 7.* Intestinelorum membranas vult esse fibrarum expertes, ideoque improptere membranas appellari, in Ventriculo, Intestinis, Vesicâ, sed potius tunicas esse nominanda hæc inuolucra. Imo sine fibris non haberent motum dilatationis & contractionis.

Intestinum primum quod ab ima sede Ventriculi nascitur, *Ephysis* dicitur, ab *Hermipilo Duodenum*, quoniam olim duodecim transuersos digitos longum erat, vix hodie quatuor, interdum sex digitos æquat, nec mensuram antiquam deprehendes, nisi graciliorem & angustioiorem Ventriculi partem à fundo inferne exportectam, vsque ad anfractuum principium addideris, quam sæpe duodecim digitos æquare vidi. Nâ ipse *Pylorus*, primum est Intestinum, auctore *Celsus*, quin etiam *Euffus Ephesus & Palsus*, primum Intestini exortum *pylorum* vocat, quod ex *Galenus* demonstrari posset, nisi *Euchsius in Paradoxis* obstinatè contrarium doceret. Scmel mihi visum *Duodenum*, quod à *Pyloro* vsque ad inflexionem Intestinelorum sex digitos transuersos æquabat. Istud autem Intestinum iuxta *Hepar* ad latus sinistrum contendit, & sub *Pancreate* iuxta *Mesenterium* inuestigandum.

Vbi Intestina contorqueri incipiunt, ibi *secundi Intestini* nempe *Ieiuni* principium sumitur, excipit meatum cholidocum, qui in confinium Duodeni & Ieiuni insertus, inter duas Intestini tunicas trium digitorum latitudine traducitur, perforatque internam tunicam: quidquid aliter sentiat *Euchsius in Paradoxis, & in suo libro Anat.* Ieiunum semper inanitus apparere dicunt, quod non est absolute verum. Nam sæpissime plenius deprehendi. Rubicundius est, ob Hepatis viciniam, & venarum multitudinem, ad vmbilici regionem conuoluitur, plurimis mesaraicis vasibus abundat, & amplius ac breuius existit.

Ilei principium assignabis, vbi Intestinum incipit esse angustius, & liuidius, nam hoc Intestinum reliquis angustius apparet: sed omnium Intestinelorum simul inætorum duplò longitudinem superat, paucioribus mesaraicis scatet, ad ilia & coxas vtrisque positum, in plures orbes contorquetur. Coloris discrimen inter Ieiunum & Ileum euidentius apparet in brutis, quàm in homine. Interea notabis Ieiunum parte interna rugosius esse Ileo, & in quibusdam corporibus ipso Colo, quod non apparet nisi dissectio Intestino.

Porrò *Voluulus* morbus dicitur, *ἰσχυρὸς ἀνὰ τὴν αἰσθητικὴν*, siue cum tenui spiritu quod contrahere, siue cum aspero, quod vertere, & contorquere significat. Alij ab *ἰσχυρὸς*, quod est misereor deriuant, quia cruciatus dissimili in eo excitantur, dum intorquetur, qui Voluuli dicuntur, vel *Ileon*, *ἰσχυρὸς ἀνὰ τὴν αἰσθητικὴν*, inde *Ilia*, quod contineat Ileum Intestinum. *Galenus libro secundo Meth. c. 2.* Nomen Ilei, non à parte affecta, sed à symptomate deductum esse testatur, ideoque Ileum Intestinum dictum putat, à diro illo cruciatu, qui in eo loco excitatur.

Quartum Intestinum, & crassorum primum, *Cæcum* dicitur, quod bina orificia opposita non habet, vt cætera, nam eodem quo excipit, etiam remittit orificio. Alij duo vicina foramina in orificio huius Intestini septo membraneo secreta imaginantur, vt per vnum foramen ab Ileo excipiat, & per alterum foramen in Colon traducat, quod verum in brutis deprehendi. De hoc Intestino inter *Galenum & recentiores Anatomicos* magna orta est controuersia. *Galenus* Cæcum instar alterius Ventriculi magnum describit, nulla facta mentione epiphyseos membranose, quam primus *Corpus Anatomicus* detexit, antequam natus esset *Vesalius*. Ignoscant mihi periti Anatomici, si nomen cum aliis, Appendicem, cum vera sit Apophysis ex Intestino enata. Sic *Galenus, libro de usu partium*, Cordis auriculas non epiphyfes, sed apophyses esse voluit.

Existimat *Sylvius* in fabrica Intestinelorum aliquid immutatum fuisse, & Cæcum Intestinum degenerasse in *Appendiculum* contorto lumbrico similem. Nam in multis inuenit Intestinum Cæcum, rassistie minoris digiti, & solidum, quibus ab Ileo in Colon mox stercus transit. *Nicolaus Massa* antiquior *Sylvio* Anatomicus, cur immutatum & immutatum fuerit Cæcum Intestinum, causam non absurdam proferit, quam *Corpus commentatus in Mundinum*, primus excogitauit. pag. 125. In multis, inquit, Cæcum non inueni amplum, sed eius loco *Appendicem* oblongam, quæ non reperitur in illis, quibus Cæcum amplum obtrigit. At de ortu *Appendicis*, sic philosophatur. Si puellus ab ortu suo diarrhoea laborauit, dum liquidæ sordes Cæcum præterfluunt, nec in eo cunctantur, frustratum suo officio gracilefcit, atque in eam tenuitatem redigitur. Hanc ramen *Appendicem* membranosum ueteribus notam fuisse, ex *Inis Polluce*, *Galeni* contemporaneo liquet.

Nam in descriptione Intestinelorum, pro tertio Intestino nempe Cæco, quid gracile adnexum & asutum fuisse scribit. *Ti. & inuicem* & *in uicem* & *in uicem*, inquit, *in uicem*, ergo quidem adhærens, sed iuxta dextrum lumbum iacens. Meo iudicio *Rufus Ephesius* accuratè Cæcum descripsit, ex gracili, inquit, biceps prodit exortus. Vocatur autem altera pars Cæcum, altera Colon. Nam Ileum dum Coli assuitur & implantatur, portionem Coli rurgidulam ac protuberantem tres digitos latam infra relinquit, quæ pro Cæco accipienda est. Huius cauitatis aut sæculi foramen superne non est peruium, ut in reliquis intestinis, sed membranâ quadam, nempe istâ *Valuulâ* a deo decantatâ occlusam: Vnde fit, ut quod semel in illam Coli partem, quæ pro Cæco sumitur, illapsum fuerit, per idem foramen cogatur remigrare.

Veteres autem corpora, quæ non sunt in rectum exciuiata, exca dixere, inquit *Rufus*. Isthæc extuberantia in quibusdam corporibus amplissima est, & equalis ipsi Ventriculo, nonnunquam amplior, ut multoties obseruauit ac demonstrauit; rumque Cæcum hominis Intestinum brutorum, ac præsertim Suum, Cæco assimilatur, quod notatum ab *Hippocrate* dum scribit 6. *Epid.* hominem habere *uicem*, id est, crassâ Intestina cani similia, sed maiora.

Quod si verum sit, necessum est in figura Intestinelorum aliquid immutatum fuisse. Nam in canibus Cæci appendix maior est, quàm in homine. Præterea Colon speciatim didum canes habent breuius, quàm homo, & id Intestinum reliquis est angustius, ut sit suspicio apud *Hippocratem* pro *uicem*, legendum sit, ut ista Suibus conueniant, quod confirmatur ex *Aristotele*, lib. 1. de *hist. animal.* Vbi *in uicem* uicem *uicem* similis est, quoniam ipsa lata est, sed Ventriculus humanus canino perthmilis est, paulò ipso Intestino maior.

Cæterum *appendicæ* Cæci in homine solo reperiri fatentur omnes: quum enim ex coalitu duorum ligamentorû, quæ Colon amplexantur, contexta sit, ligamentis autem brutorum Colon Intestini careat, in illis frustra queritur appendix; quam si pro Cæco cum quibusdam Anatomicis accipias, *valuula* superior erit Cæco, sicq; Cæcum Colo includetur, quare ab extremitate Ileii *valuula* terminari, principium Cæci sumendum erit, quod ab illa *valuula* orbiculari trium vel quatuor digitorum latitudinem æquat, usque ad superiorem partem Renis dextri, ubi Colon incipit. Euulsis duobus ligamentis longitudinalibus, cauitas huius portionis Coli admodum ampla & capax existit, ad excipiendum pugnum manus complicatæ: Appendix uerò membranosa enata ab ipsa portione Coli, quæ pro Cæco usurpatur, pertinebit ad Cæcum. Erit igitur hæc Appendix ueluti nodosus coitus duorum ligamentorum Coli, & eum sit exciuiata, forsân flatibus continendis, tanquam effugium aut diuerticulum quoddam extructa fuit. Falsum semper deprehendi, quod à *Baahno* & *Spicasso* notatum, scilicet in hac *Appendice* sordes Intestinelorum in foetu magnâ copâ aceruari: Nam in foetibus & infantibus recens editis semper gracilior est, quàm in adultis.

Posset aliquis existimare *Appendicem* in pueris non multum distam ab extremitate Ileii, de scitu istius portionis Coli extuberantis, quam pro Cæco accipio, retinere alimentum liquidum, putâ lac quod aluntur pueruli, ne contestim elaboratur in Colum, ideoque amplior est infantibus usque ad biennium, quàm in foetu, & reliquis ætatibus. Obseruauit sepius Cæci appendix amplitudine sua æqualem Ileoi, & Peritonæo adnecti, quando solida est, atque breuiorem esse, quando Cæcum amplius existit, longiorem, quando Cæcum angustius factum est.

secunda Theatri Anatomici, quod huius Valvulæ inuentionem illi denegarim. At-
amen coactus ex detecto plagij crimine, in *Scholionono, Varolij* verba attexit, qui Val-
uulam istam à se inuentam appositè *Hes operculum* appellauit. Sed non ante natum
Bauhinum, vt dixit *Riolanus*, cum eius scripta circa annum 1591. à *Coriæso* edita fue-
rint. Sed ille dissimulauit *Varolium* scriptis Anatomicis innotuisse in Academia *Pa-*
tauina, anno Domini 1572. vt liquet ex libello de *Meruis Opticis ad Mercuriales*, &
cinquem Mercutialis responsione ad Varolium. Eodem tempore librum suum *Anatomicum*
consignauit *Mediounano*, Secretario *Boncompagni*, Fratris Summi Pontificis *Gre-*
gorij XIIII. qui creatus fuit anno 1572. & 13. annos Pontificatum exereuit. Ex his
intelligitur Valuulam à *Varolio* inuentam fuisse, priusquam *Bauhinus* natus & notus
fuisset in Medicina. Nam à se repertam gloriatur anno 1579. & libro tertio *Theatri*
Anatomici prima Editionis, cap. 46. ingenue fatetur se per annos 1577 1578 & 1579.
Parauit auditorem fuisse *Fabricij ab Aquapendente*, deinde anno 1621. quo secundam
Editionem sui *Theatri Anatomici* publicauit, declarat se per annos 40. Anatomicis re-
bus operatum fuisse. At eodem anno 1579. *Bauhinus* Medicinæ studiosus erat, & au-
ditor atque spectator Anatomiz *Parisijs* celebratæ à *Pino*, vt ipse testatur in *Opi-*
uscula Anatomica de notis Virginitatis. Præterea, eodem anno *Salomon Albertus* publi-
cè docebat Anatomem *Peterberge*, quo tempore Valuulas venarum, & istam *Colæ* Val-
uulam detexisse primum scripto edno declarauit. Sed hoc *Bauhinus* subtrixit, quam-
uis verba *Salomonis Alberti* testatur. Ipse verò *Bauhinus* circa annum 1599. Anato-
mica scriptis mandare cœpit. Adde quod *Archangelus Piccolaminus*, Medicus *Roma-*
nus, in suis *Prælectionibus Anatomicis*, quas edidit anno 1586. mirificum naturæ arti-
ficiū ad principium Cæci collocatum, videlicet tres Valuulas reuelauit, eo fine
construās, vt remeantibus sordibus obfisterent. *Ioannes Posthius* insignis Medicus
Germanus, in *Observationibus ad Anatomem Columbi*, notat iam olim *Montpelij* à se ob-
seruatam Valuulam Cæci Intestini: at ille ibi degebat anno 1565. dum apud *L. Ioa-*
berium habitaret cum suis condiscipulis & conuictoribus, *Antonio Sarraeno*, *Ioanne*
Piduxio, *Francisco Peruiano*, viris in re Medica clarissimis & eruditissimis; ergo ante
Varolium & *Bauhinum* detecta & patefacta fuerat Valuula Cæci Intestini. Fru-
stra gloriatur *Bauhinus*, quod *Aquapendens*, & *Casseri*us per celebres Anatomici *Pa-*
tauini, in suis administrationibus Anatomicis huius Valuulæ inuentionem illi tri-
buere solebant, quoniam *Salustius Aquapendens*, libello de *Ventriculo & Intestinis*, cum
agit de ista Valuula, nullius auctoris mentionem fecit, ne quidem *Bauhini*. Quapro-
pter iniuriā non feci *Bauhino*, si huius Valuulæ inuentionem, aut *Varolio*, aut *Sal-*
omonis Alberti, aut *Archangelo Piccolamino* adiudicauit. *Petrus Paruius* celeberrimus *Anato-*
micus Leidenis, istam Valuulam *Bauhini* omnino repudiauit, vt videre est in *Centa-*
urijs Chirurgicalis Fabricij Hildani; nihil etenim inuenit præter circulum, siue anulum
membranofum limbo conspicuo prominentem extremitati Ilei affixum, qualem or-
biculum membranofum circulariter extuberantem obseruabis in pyloro: isque eui-
dentiore est, quā alter à *Bauhino* tantopere celebratus, pro cuius assertionem tanquam
pro aris & focis decertauit, præfatione suarum *Institutionum*. ideoque Valuulam malè de-
pingit instar Valuularum, quæ in Venis repetiuntur, cum sit orbicularis instar annu-
li, & in medio perforata. Elegantius depingitur, & verius in *Iconibus Casserij apud*
Spiegelium; proinde miror, quomodo ille dissentiat à pictura, verba *Bauhini* sequutus,
dum vngui similem illam Valuulam describit. Haud dubiè erratum est *Bucetij*, vel
hallucinatio.

Vt autem Valuula demonstretur, Intestina duorum palmarum distantia, infra mē-
branosā epiphyim, & suprà, religanda sunt, & paulò infra ligaturas resectā illam pota-
tionem eximes, vt Valuulam possis commodè inspicere. Incipit autem Colon su-
pra Renē dextrum, & ad eam lecoris ascendens, bilis Vesiculam tangit, inde paulu-
lum exurgens, Ventriculi fundo infernitur, cui necitur interuento Omenti. Hinc
ad hypochondrium sinistrum contendens, Lienis cauo firmiter alligatur, & inter-
dum sic hypochondrio astrum est, vt necatur ipsi Diaphragmati sub Liene, mox
descendens vsque ad ile sinistrum, Peritonæo firmiter adstringitur, vt in parte dex-
trā prope Renem, sed extremitas Coli infra Renem sinistrum, in S. Romani mo-
dum contorta, omni vinculo soluta, errabundo ductu vagatur, & interdum sine vi-
la contortione rectā pergit in anum: sed notabis firmè totum Colon inclinare & ver-
gere in latus sinistrum, vt corpus esset *inijmum*, quippe Lien & Colon pondus leco-

ris æquare videntur. Non debuit in gyros & anfractus reuolui, vt reliqua Intestina, ne in eo ductu sinuoso duriores fæces subsisterent, chylus enim tenuitate sua Intestina gracilia faciliè permeat, & ab ipsis venis celesterrimè fugitur.

Cor autem in homine solo ad superiora reuoluatur, cum in brutis totum in hypogastrio consistat, Anatomici duas rationes adducunt, vt instar sepiementi tenuia Intestina obuallaret, quod dumtaxat verum est iuxta Ventriculū, vbi supereminet, alibi Intestinis subiectum est. Altera ratio, vt alimenta quæ coctionem in Ventriculo, & Intestinis subterfugerunt, in Coli superiore parte coquantur, vt inde quidquid vtile est, & alendo corpori idoneum, in Iecur rapiatur. Qui fieri potest, cum nullas mefaraicas habeat, aut saltem paucas dispersas in illam portionem Omenti, quæ est infra Colum, & videtur esse continuatio Mesenterij, sed quamplures venas ab iis quæ sparguntur in Epiploon? Existimarem Colon ad superiora reflecti, vt fæcum calore Ventriculi coctio iuuetur.

Chymici nullam digestionem magis naturalem esse putant, quàm quæ simi calore perficitur; ob id Aristoteles Vterum inter alui & Vesicæ fordes coniectum fuisse scripsit, vt ab excrementis vicinarum partium Vteri calor augetur.

Licet quoque aliam rationem adducere, sub cauo Iecoris Colon per superiora traducitur, vt ex Vesicula in hoc Intestinum bilis refudans excreticem stimulet. Nam in homine solo Colon bilis Vesiculam contingit: præter istas rationes alias duas non aspernandas Carpus assignauit, putā, quod graue est è superioribus locis ad inferiora faciliùs descendere, ideoque fæces commodiùs traduci per Colon sic reuolutum, deinde fæces ab Omento supernè renulso emolliuntur intra Colon, cui circumiectum est Omentum. Vesalius aliam rationem profert, quod Colon Mesenterij centro non admodum vicinum esse debuit, neque id venę Portę ramos cauo Iecori proximos oportuit assumere, quum parum quod exugi deceat, amplexetur. Vt itaque grandior dexterrę venę Portę truncus breuiori ductu gracilibus Intestinis infereretur, ac breuiore via cibum in Ventriculo confectum ad Iecur transferret, Colon Intestinum gracilibus cedit, ac veluti per distantia maximè à Mesenterij centro loca procedit, atque hac etiam occasione id præcipuā suā portione, sinistram corporis sedem occupat.

Interea notabis fæces prope Iecur & Ventriculū, in elatiore & ampliore Coli parte coaceruari; cumque corpus sit perspirabile, si quando pigra fuerit aluius, stercoreis tetro foetore, & opaca nephysi, languere Ventriculū, appetitum prosterni, Cor ipsum effeminari, & Cerebrum oppleri ac opprimi. Quare nihil melius quàm enematibus aluum colluere, ad sentinam illam exhauriendam. Scitum illud Hippocratis, ventris segnitiei, & vasorum impuritatis omnium confusio, quamuis aliter Galenus interpretetur de Ventriculo. Claudicat hæc comparatio à Cicerone proposita, & à Vesalio repetita, vt in ædificiis archirecti ab oculis & auribus dominorum, quæ necessariiò tetti aliquid erant habitura auertunt, ita Natura Ventriculū, corporis culinam, eiusque fordes in demissioribus partibus locauit, procul à partibus nobilibus, septeoque separauit.

Secundum Coli longitudinem extrinsecus observantur fimbriæ adiposæ, à Liene vsque ad principium Recti Intestini, quibus conspersum humectatur & inungitur, vt facilius sit excrementorum delapsus, quoniam ibi Mesenterio cærens nullum ab eo madore, vt reliqua Intestina accipit. Vidi Colum Intestinum inter Iecur & Splenem non directè protensum, sed id S. Romani modum inflexum, & ad Umbilicum vsque prolapsum. Nullam quoque vidi eius inflexionem infra Renem finistrum. Cæcum & Colon in suo progressu certis in locis Peritonæo adherent excepta illa flexione Coli infra Renem finistrum. Sic autem Colum comprimitur ad exonerandam aluum in inspiratione, contracto Diaphragmate, & redeunte ad rectam lineam. Deuoluitur Iecur supra Colum, & à Musculis Obliquis Externis & Rectis comprimitur & compellitur ad deturbandas fæces.

Sextum ac postremum Intestinum in os sacrum deuoluitur, rectaque pergit in podicem, ideoque Rectum dicitur ab Apuleio Longano, ῥέχιν Græcis quasi ῥέχιν, quod sit exordium aliorum, vel quod instar principis retineat, vel emittat, quæ sinu suo coërret.

Totum est extrinsecus carnosum, contra naturam aliorum Intestinarum, quæ foris sunt membranosa, intus carnosa, quod eo sine factum, vt hoc Intestinum faciliùs

expellunt feces. Ista caro circumiecta musculosa est, vel potius nouum musculum recti sphincterem externum longitudinale instar vaginæ. Incilium ac vulueratum hoc Intestinum faciliè consolidatur, vt obseruat *N. Massa in sua Anat.* quod prius fuerat animaduersum ab *Hippocrate libro de hamorrh. Rectum Intestinum & secans, & resicans, & caninus, & urens, & putrescens, etiam si hac grauissima videatur, nihil leferis.* Quod dictum sit aduersus recentiores Medicos, qui vetant hoc Intestinum ferro attingere, ne inuolutaria facum exercitio consequatur, sphinctere grauiter laeso. Dum reuelles & à sua sede remouebis Rectum Intestinum, quatuor neruos eius extremo insertos obseruabis, qui hoc Intestinum valde sensibile reddunt, vt in Tensino expetitur. Partium omnium cum sede connexio *vixit Hippocrati* dicitur. Extremitas huius Intestini inferior & exterior, *Anus* siue *Podex*: dicta est *Anus*, quia circularis instar annuli, vnde Græcis quoque *ἄνους* dicitur, *Podex* etiam à pedere, vel pudore nominatur, quod pars corporis sit pudenda & abiectissima, ab oculorum aspectu remota & auersa, nam purgatio ventris visum offenderet. Podex igitur tanquam vile mancipium, naturæ ministeriis obnoxium, post tergum relegatus est, ne deforme sui præberet spectaculum; sed quantum podex vilis & despectus habetur propter foetorem innarrabilem, & sordium conceptaculum; tantumdem ab officio & vso extollitur & laudatur a *Celsi Calceagnino*. Nam ad corporis fores excubat, & quasi ianitor à natura positus, locum summâ diligentia seruat, quas verò sordes, quæ excrementa membra cætera aut alunt, aut concipiunt, fideliter euehit, atque exportat, foetoris autem ipse causa non est, qui sit natura detestatissimus, sed his sordibus, quas extrudit adscribi debet, quin eo nomine gratiam, non accusationem aut reprehensionem meretur, quod pro reliquorum membrorum salute in perpetuo squalore, ac pudore viuat, necque pudenda aut pœnitenda pars corporis exillimari debet, sine qua homo diu esse non possit. Itaque cum in rerum natura nihil sit vile & abiectum, nihil à Philosopho despiciendum, non dedignemur illius structam exactè rimari.

Componitur autem ab extremitate inferiore Recti Intestini carne musculosa, & cute, in adultis pilosa. Rectum Intestinum instar coronæ cingit Musculus orbicularis sphincter, isque duplex, quem inuestit cutis, ex arcta constrictione sphincteris. Quare dum iustus anus laxatur, fores aperit excrementis exeuntibus, iidem fores occludit, dum constringitur, atque vt facilius in suum locum redeat, musculos habet leuatores, de quibus agitur speciatim in *Myologia*, & dissecantur, dum partes genitales administrantur. Pilus autem circa podicem luxurians, nulla necessitate videtur succrescere, si credimus *Scaligero*: Attamen impedit intertriginem ex mutuo adfrictu natum.

DE MESENTERIO.

CAPIT. XV.

Vbi naturalem Intestinatorum sedem obseraueris, ipsa Intestina solis manibus diduces, vt cirræsectionem, Mesenterij positionem, eiusque naturam contemplari queas, atque vt glandulis, venis mesaraicis & arteriis conspersum est, intuearis. Vnam Mesenterij membranam ab altera diuelles: deinde Mesenterij exortum inuestigabis, quo modo ex ligamentis vertebrarum lumbalium enascitur, vel ab ipso Peritonæo ad lumbos duplicato, sicuti ex reduplicatione Pleuræ Medialinum constat.

Ac sanè membranosa eius substantiam, Peritonæi subolem esse manifestè demonstrat, Mesenterij & Lumborum sympathia, paralyseos & nothi doloris Colici mutua successio. Illius tamen duplex adhæsiō, quæ pro origine sumitur, euidenter apparet detractis Intestinis, dempta quoque Membrana interna Peritonæi Renibus superiecta, tum subtus Mesenterium, manus traduci potest. Prima adhæsiō est in dorsi vertebis supra appendices Diaphragmatis, altera in principio ossis sacri. Quod videtur animaduersum ab *Hippocrate, libro sexto Epid. sect. 4. par. 1.* Cola habet canis similia, maiora autem ex Muscolis suspensa sunt, hæc verò ex neruis à dorso sub Ventriculo, *alio in Comment.* originem Mesenterij & Mesocoli describit: conti-

num enim totum, ad vnam quandam lumborum verticem post septum transuersum positam peruenit, hæc autem sub Ventriculo est. Hanc adhesionem quæ naturam habet ligamenti, *Galenus libro sexto Adm. Anat. cap. 6. vnam vnam nuncupat.* Mesenterium *Hippocrati* *vinculum* dicitur, si credimus *Forsio, in Ocean. Hipp.* quæuis aliter sentiat *Stephanus, in correctione Lexici Hippocratici a Galeno conditi.*

Pro differentia Intestinelorum, in *Mesaram*, siue *junium*, & *Mesocolon* diuiditur ex *Galenus*, quem secuti sunt omnes Anatomici. *Mesaram* ea est Mesenterij portio quæ tenuia Intestina colligat: *Mesocolon* verò pars Mesenterij, quæ crassa comprehendit. Præterea differunt ratione venarum, quia quæ in Mesonistion distribuuntur, diuersæ sunt ab illis, quæ in Mesocolon feruntur, auctore *Galenus*. Sed inanis videtur ista distinctio, cum nulla pars Mesenterij crassis Intestinis adhæreat. Sed tantum magna portio Omenti, quod videtur nasci & produci à Mesenterio, cuius naturam & vsum æmulatur in hoc Intestino, vt capite de *Epiplois* dictum est. Adde quod *Mesaron* nomen est totius Mesenterij, æque veteres ventrem & omne Intestinum appellabant, ex quo ad hæc vsque tempora hoc nomen *Mesaram* deriuatum est, inquit *Ruffus*. Idem scripsit *Hesychius in Lexico, Galenus* Triplex Mesenterium facit, siue in tres partes fecit, *libro de Diffinitione Venarum & Arteriarum*. Ratione arteriarum quæ in varias Mesenterij partes distribuuntur, & cap. 1. eiusdem libri, agens de porta. Idem videtur statuere de triplici Mesenterio: Sed istud discrimen non potest exactè designari. Fateor equidem Triplex vasorum genus intra Mesenterium obseruari. Primum est venarum, quæ à Porta manant: Alterum arteriarum, quæ à Cœliaca produciuntur. Tertium est Nervorum, qui ex plexu nervorum stomachicorum & costalium prædeunt.

Novum & quartum genus Vasorum mesaraicorum nuper inuenit, & libello edito *proposui* *dilectissimus & peritissimus Anatomicus Gaspar Asellius*, & hæc vasa *Venas lacteas* appellat, & per eas chylum ad Hepar deferri sustinet rationibus, autoritate & experientia, scilicet autopsia: Nam non est verisimile per easdem venas chylum ad Hepar permeare, sanguinem ad nutritionem Mesenterij, & Intestinelorum reuehi, impuritates Hepatis, siue sponte, siue medicamentis vi expurgari, & præter triplicem hunc vsum, easdem venas chylum sanguificare, siue Iecori præparare. Natura, inquit *Aristoteles, libro primo Polit. cap. 1.* Vno non nisi ad vnum vitur, & nunquam tale facit qualis *Delphicus gladius*. Hæc vasa *Erasistratus* subodoratus fuerat, aut saltem adumbrauerat, dum in hædis lactantibus imi ventris, arterias lacte referas se vidisse sæpius testatur, referente *Galenus, lib. an sanguis sit in arterijs, cap. 5. & in sue lib. 7. Adm. Anat.* Idem *Galenus, libro quarto de vso partium, cap. 19. & 20. ex Herophili sententia* duplices venas in Hepate constituit, quarum aliz ab Hepate deferunt materiam in Intestina, aliz ab Intestinis ad Hepar deducunt.

Denique oculari demonstratione id *Asellius* pat. fecit, & demonstravit in canibus bene passis, & trihorij spatio à pastu secis adhuc viuentibus: quæ fusiis à nobis tractabuntur *libro septimo de Anatomia vna. Vt alius libro primo cap. 6.* reprehendit *Galenus*, qui Venas quasdam per Mesenterium exportectas, nec ab Hepate ortas inueniri scribit. *Iacobus Primerosius* ridet & eludit venas lacteas his rationibus, quod sint in visibiles, quod nullum habeant truncum: quod non desinant omnes in hepar. At commodatè ad nouam sanguinis circulationem, chyli translationem ad Hepar per venas mesaraicas ferre statuit *Haruanus*: sanguinem verò ad nutritionem Intestinelorum deduci per Cœliacam arteriam, nec imperitè id scriptum: sed cum resuat sanguis arteriosus in venas mesaraicas, sic illum deferunt, hoc eius aduersatur circulationi sanguinis.

Notabis Mesenterium ratione glandularum, quibus totum fartum & foetum est, strumarum radicem ac fundamentum esse, nec foras erumpere vnquam, nisi Mesenterium strumofum fuerit. Ideoque *Guido de Cauliac*, peritè admodum strumarum scaturiginem à Mesenterio repetit: nec sine ratione *Iulius Pollux in Onomatice*, circa Mesenterium strumam fieri notauit. De hac re vide *Philippum Ingrassiam, libro de Tumoris, pag. 229.* Glandulæ in Mesenterio eo sine conditæ sunt, vt depascant, absorbentque luxuriantem in Intestinis humorem, quem *Græci* *trachis* appellat *Hippocrates libro de Glandulis, Paralius* explicat excrementum oleosum primæ coctionis, quæ sit in Ventriculo, & Intestinis.

Exquisito sensu præditum esse Mesenterium, multoties in morbis obseruavi Nec possum

possum adduci, ut cum *Fernelio* credam, eam partem valde sensilem inflammari sine manifesto dolore, solumque grauitatis sensum habere: nam admodum sensile Mesenterium arguit nothus dolor Colicus, ab eodem *Fernelio* obseruatus, & origo Mesenterij a Peritonæo, cuius acer dolor est.

Admirabile est palmum vnum Mesenterij plusquam quadraginta palmos Intestini, plicarum in morem, siue instar plicati collarij connectere: quomodo fiat hæc connexio facilius & euidentius conspicias in Mesenterio vitulorum, & infantium.

Eleganter *Aristoteles* Mesenterij vsum declarat lib. 4. de partibus animal. cap. 4. Cum enim necesse sit, ut animalia cibum extrinsecus capiant, ex quo alimentum fiat, quod in omnes corporis partes digeratur, ideo aliquid adesse oportuit, quo tanquam radice cibum de ventre ad venas deferatur, itaque ut stirpes radicibus terræ infixis cibum inde hauriunt; sic animalibus venter & Intestina pro terra sunt, à quibus capiunt alimentum.

Quam ob rem Mesenterium existit, venas sibi inditas habens quasi radices. Caspar *Hessmannus*, lib. 2. variatum lesionum, mendum subsisse putat in textu *Aristotelis*, cum agit de Mesenterio, lib. 1. de historia animal. vbi supra Intestina, *inf. & inditas*, Mesenterium collocat: quæ verba transposita pertinere putat ad Omentum: sed cum *Aristoteles* ex animalibus viscerum Humanorum cognitionem repetendam esse dixerit, in brutis viuentibus, quæ prona terram spectant, Mesenterium alligatum dorso, iacet supra Intestina.

Cæterum, iure ac merito Mesenterium, *Medicorum Nutricula* perhibetur, cum ab eo ilias morborum oriatur, & expulsetur, quoniã sentina totius corporis ibi consistit, ad quam vndique è toto corpore illuuius confluit, & cumulat, occasionem hospitij præbente Mesenterij textura, ex duplici membrana instar sacci concinnata, innumeris venis & arteriis intertexta, frequentibus glandulis conuersa, quæ bibulâ & spongiosâ suâ substantiâ excipiunt, conseruantque corporis inpuritates.

Propterea, fundamentum, fomentum ac seminarium morborum diuturnorum, & contumacium in Mesenterio & Pancreate delitescere primus obseruauit *Fernelius*, cuiusmodi sunt febres complicatæ, erraticæ, lentæ, lumborum dolores, cholicæ affectiones, diarrhææ chylosæ, vel serosæ, ac diuturnæ, dysenterix, atrophix, languores, cachexiæ, melancholiæ hypochondriacæ, conuulsiones, epilepsix, virginum sædi colores, vomitiones crebræ biliosorum humorum, Colici dolores molestissimi, appetentia prostrata, denique abscessus varij, cuiusmodi sunt steatomata, atheromata, melicerides, & vlcera diuturna, assiduo pure diffuentia, quæ omnia ab infarctu contumaci & insigni crassitie humorum intra Mesenterium proficiscuntur, ita ut scirrhosum vel tophaceum tandem euadat non sine vitæ discrimine, quoniam istorum morborum si diu perseuerent, colophon erit aqua intercus, aut tabes, ex labefactata & destructa œconomia naturali.

De morbo Mesenterij, qui *niarum* nominatur, & *seccatorius morbus* dicitur apud *Hipp.* lib. 2. de morbis, quiue eleganter describitur tanquam *melancholia hypochondriaca*, suis ignis pathognomonicis expressa, vide *Dan. Sennertum* lib. 3. præctica sua Medica.

Mesenterid,
part. II. 2.
Medic. 9.

DE PANCREATE.

CAPVT XIV.



REICTO Mesenterio ad Pancreas te conuerstes, quod inditum fuit *Hippocrati*, cognitum *Aristoteli*, & proprio nomine, & vfu fulciendi venas designatum; corpus est glandulosum, foris subnigrum, carnis speciem præ se ferens, status albicans. In canibus magis rubet, & in brutis, quæ prona spectant. Ventriculo superiacet. At in homine Ventriculo substernitur, & à Liene vsque ad caua Hepatis exporrigitur, tres aut quatuor digitos latorum; membrana tenui succingitur, quæ in morbis humorum affluxu crassior facta, ab ipso Pancreatis corpore abscedit, ac veluti saccum quandam constituit, ut in corporibus morbo consumptis, sæpius à nobis obseruatum.

De vfu Pãcreatis magis subtiliter quàm verè disseruerunt *Ærol.* & *Pisciolem*. Quoadmodum in foetu sanguis maternus antequàm Hepar ingrediatur sordes suas, ac coenosciam

humiditatem deponit in molem carneam, innumeris venis & arteriis umbilicalibus refertam, quæ *Placenta* dicitur, ita in natis perfectisque corporibus ante Hepatis & Lienis portas, caro quædam spongiosa, glandulosa, huic fere similis, circa multa vasa concrevit, ut chylus rubefactus Hepar subintrans, cœnosa humiditate, id est cruda & pituitosa porridge repurgatur, purior in secur insuat. Quæ etiam reliquias pinguedinis cœnosa intra ventrem fluctuantis, quas Omentum & Mesenterium absorbere non potuerit, depascitur. Hinc fit, ut in corpore carnoso Pancreas totum carneosum appareat, in corpore verò pingui quodammodo sit adiposum: scriptum ab *Hipp. lib. de glandulis*, ubi cœnosa sunt humiditares, ibi sunt glandulae, *ut in natura* *ipæ. & aliæ.*

Similem usum *Piccolominus* adscribit, sed alium præterea profert, quod Ventriculi coctionem adiuuat, quæ fit elixatione in calido & humido: dum enim crudiores & humidiores sanguinis portionem exugit, vapores calidos & humidos emittit, quibus Ventriculus irrigatur, ac si in balneo Mariæ nataret.

Ego verò Pancreas in morbois ac melancholicis corporibus secundarium Lienem, siue Lienis vicarium viscus appello, quoniam ad chylum in vena Porta rubefactum, & Hepar subeuntem defacandum, Lienis vicem supplet, quando viriatum hoc viscus, ac suo frustratum officio, macrescit & marcescit, quod in multis, naturâ suâ, & corporis habitu melancholicis obseruavi, in quibus dum viverent, Lien nec tumebat, nec dolebat, sed Pancreas Hepatis molem æquabat.

Id confirmabo memorabili exemplo *Illustrissimi viri Iacobi Augusti Thuari, in Senatu Parisiensi Præsidis clarissimi præ memoria*, quem omnes Medici ex habitu corporis, vultus charactere, moribus & humoribus melancholicum iudicassent: humilibis in siue corporis temperamentum auxit, & enutritum morosum ingens ex obitu leuissimæ & charissimæ Coniugis contractus, qui virum fortem per annum attriuit, & novis, tandem eripuit. Per quadriennium quo ei Medicinam feci, conquebatur de Colico dolore circa regionem Coli Intestini, cum sensu ponderis ad regionem stomachi, dum flaret erectus, vel ambularet, at incurvus sedens vel in lecto recumbens cruribus leuiter sublati, nullum aut exiguum dolorem sentiebat.

Nec tumebant ei hypochondria, nec dolebant, etiam dum iræ attritata vel percussa. Tandem, cum annum in ista miseria exegisset, dum melius suaret, & speraret de morbi eueni, repentina & inopina gangrenosi correptus, à pede dextro ad superiora celeriter reptante, ex decubitu serosi humoris crura & tibias inflans, cum diris cruciatibus intra sex horas expirauit. Aperto Cadauere deprehendi secur induitum rotundum instar corporis sphericum, fatidum & transversum, quod præ piramida seuum referente, Pancreas amplitudine sua & pondere secur ipsum æquabat, rotundum & rhombum multis glandulis specie oui columbini differtum: Lien vero exilis & exiguus erat, ut vix vnciam ponderasset. Nuper in cadauere Heroïnæ solutis principis *ex m. m. m. annos 61. natæ*, ostendi Pancreas scirrhusum & induratum instar cartilaginis, proptereaque Liene carebat, cuius vestigium vnguis latitudine, sinistro lateri Ventriculi appressum erat.

In valetudinariis hominibus, si *Fernelius* credimus, fibrum intermittentiū, & hypochondriacæ melancholiz sedes est, & quasi publica sentina, in qua quædam confluit, cumularique humorum colluuiæ: membranis tenuibus adstringitur, ac veluti suspenditur, Hepatis lobo, fundo Ventriculi, Lienis, ne pondere suo subiecta venam Caudâ & Aortâ descendente premeret, quod sanguinis & spirituum commixturâ interciperet.

Obseruabis etiam ut Pancreas sapius simplex, interdum duplex venâ Portam & arteriam Cœliacam intra se comprehendit, utque superstratum est Duodeno Intestino, quod non datur intueri, nisi remoto ac digitis cuncto Pancreate. Inde cognoscis causam vomitionis alimenti indigesti, vel perfectè cocti, quod Intestinum actum, ac veluti constrictum, subire ac permeare non potest.

Meatus quosdam *Fallopianus* in sima Hepatis parte constituit *libello de Venis, Observat. 1.* qui in Pancreas porrecti, oleaginosum succum quemdam laeuum eructant deponuntque, quos ramen mihi nondum videre contigit. Nunc credo esse illum canalem *Virgungii*, qui obscurè uotus illi fuit, & hoc monuitram in mea *Anatome Gallica, aucta ex meo Manuscripto.*

Admirabili & notatione digna ad praxim, siue curationem morborum Abdominis in textura Pancreatis, trunci venæ Portæ, exordij Intestini, & Mesenterij hæc

in sede positi. Nam reuulso versus sternum Epiploos, & manu quantum licet sublato Hepate, paululum etiam versus inferiora dilactis Intestinis, ultra Renes, summis vertebrae lumborum incumbunt, animaduertes Pancreas, huicque immersum truncum venæ Portæ, utrumque amplexari Mesenterium hoc in loco hiucum, & velut lacerum, quoniam omni vinculo solutum. Dein videbis Intestinum Ieiunum sub trunco Portæ traductum, ac versus laeuam retortum, vt exsurgendo circa regionem umbilicalem amfractuosè conuoluatur. Inde cognoscas Pancreas obstructum, aut Mesenterium humore fardum ac foetum, truncum venæ Portæ, & Intestinum comprimere, quod chyli anadosin ad Hepar, aut intercipit, aut remouatur.

DE VENA PORTÆ

CAPVT XVII.



PANCREATIS inspectio nos trahit ad Inuestigationem Venæ Portæ; cuius truncum sismo amplexu comprehendit, vnde fit, vt multo humore Pancreas inebriatum, aut scirrhopos factum, truncum Portæ constringat, quod chyli affluxum intercipit, qui in mesaraeis sanguinis rudimentum adeptus, cum non possit ad Hepar permeare, rubifactus reuertit in Intestina, vnde sensim corpus contabescit, suo genio defraudatum.

Natura venam Portam condidit separatam à vena Caua, vt aleret & allueret omnes primæ regionis partes, quæ ad culinam pertinent: ideoque multis impuritatibus scatent & sordent, quas sanguini Cauæ permisceri non erat æquum, ne contagia sua, reliqua corporis viscera inquinarent: propterea non est verisimile in morbis sordes venæ Portæ resuere in Cauam, nisi post multiplicem venæ sectionem: quia si Portæ radices coeant per anastomosim cum radicibus Cauæ, coitus ille exiguus & exilis est admodum: longè probabilius est humorem sanguineum Portæ suis tubulis excidere, vt contactu carnis Hepatis, colorem illum rubicundum induat & excipiat.

Hæc cogitatio magni est in Medicina momenti. Adde quod *Galenus libro quarto de vso partium, cap. 13.* iniciatur & repudiat illam *Anastomosim* venarum Portæ & Cauæ intra lecur. *idem libro quinto de locis affect.* affirmat senonquam potuisse deprehendere *Anastomosim* venæ Cauæ cum Porta intra Hepar.

Nec *Falsopius* vnquam videre potuit illam *Anastomosim*, etiam si maximam diligentiam adhibuerit. Fatetur quidem *Spigelius*, venas istas intra Hepar inter se communicare, non per omnes ramulos, sed per quosdam dumtaxat, vt tenuior sanguis transcoleatur. Modum tamen inueniendi & spectandi illas *Anastomoses* explicat. Si lecur leuiter coquatur, & aquæ frigidæ immersum cultello ligneo & manibus conficetur, vel exponatur aceruo formicarum, quæ breui ex carne reddant intactis venis.

Ist hæc *Anastomosis* venæ Cauæ & Portæ intra lecur videtur primùm introducta & depicta ab *Archangelo Piccolomino*, confirmata ab *Hieronymo Fabricio ab Aquapendente, libro de Fetu, tab. 2.* Vtrumque non desunt rationes cuiusque partis. Hepatis expurgatio per Intestina & Renes demonstrat inter istas venas nullam aut exiguam intercedere communionem, quamuis scriptum *Aph. 14. sect. 6. ab hydropse detenta, si aqua è venis ad ventrem confluerit, fit morbi solutio.* Et alio *Aph. mictio nolla plurima paucam significat deiectionem.* Quæ omnia non demonstrant communionem venæ Cauæ cum Porta. Adde quod *Galenus, libro de conit. artis, cap. 17.* inter viscera nullum obstructionibus magis obnoxium esse scribit, quàm Hepar, tam ratione venarum exiliū, quæ per eius parenchyma sparguntur, quàm ratione sue actionis scilicet hæmatoseos, dum ex chylo sanguinem elaborat & conficit.

At sanguis in Porta in Cauam traducitur per ramulos vtriusque venæ simul coalescentes per *Anastomosim*, quæ vix oculis deprehenditur, quamuis admitti de-

beat. Propterea *Anastomosis* vasorum Portæ cum Caua, obsecra est, aut nulla in Hepate adulti hominis: quamvis hæc *Anastomosis* ramorum Portæ cum Caua euidenter innotescat in foetu recens edito: Nam si infusilaris venam Vmbilicalem, manifestè videbis omnes venas & arterias corporis inflari & distendi: sed cum arteriæ equè ac venæ insistentur, illa *Anastomosis* nou magis intercedit cum ramis Portæ & Cauæ, quàm cum arteriis totius corporis, quoniam vbique per vniuersum corpus venæ & arteriæ per mutuas ramulorum anastomoses inter se communicant.

Quod si venæ lacteæ ab *Astellis* detectæ & obseruatæ admittantur, haud dubiè perit illa *Anastomosis*: nam ab his venis lacteis sanguis equè distribuitur in ramulos venæ Portæ & Cauæ, nec directè à Porta in Cauam traducitur.

Præter istam *Anastomosis* venarum intra Hepar celebratam ab Anatomicis, *Galenus lib. de loc. affect. sub finem*, notauit se aliam deprehendisse *Anastomosis* venæ Portæ cum Caua mediante vase, per quod à Caua in Portam purulenta materia thoracicarum partium translata expurgari potest per Intestina. Non explicat, an isthæc *Anastomosis* fiat intra vel extra Hepar, raram tamen esse fatetur, vt rara est huius purulentæ materiæ expurgatio. Si purulenta materia à Caua in Portam traducitur, quidni sanguis purus per eandem viam meare potest? Notabis ex opinione communi per truncum Portæ triplicem humorem fluere & commiscere, pura chylum ascendentem ad Hepar, humorem melancholicum refluxum ad Lienem, & sanguinem alimentarium ad nutritionem partium primæ regionis. An tres isti motus eodem tempore, vel successiue fiant, nondum liquet, soli Deo cognitum.

Eleganter *Galenus* officium venæ Portæ describit *lib. 4. de vsu partium, & comment. ad lib. 2. de nat. hum. part. 6.* Venarum, quæ à Ventriculo & Intestinis succum ciborum in Iecur deferunt, nulla vltra Iecur progreditur, imò nec in multis secundum Iecur locis apparet, quamvis numerosæ admodum ex ea parte sint, quæ ventrem & cætera attingunt Intestina, sed in vnum locum quem *portas Iecuris* vocant omnes, coeunt; quem locum qui primus *portas* nominauit, Iecur vrbis aut ædibus amplius comparauit, Intestina ventremque agris, ex quibus instat viarum per venas multas, cibi in vrbis ædiumve portas vehuntur.

Propterea ista magna vena dicitur *οὐλὴ, ἢ ἡ τῶν ὀστέων, vel οὐλὴ τῆς ψυχῆς. Ruffo Epheso lib. 1. cap. 26.* dicitur *οὐλὴ ψυχῆς. Vena Porta* nuncupabitur Latinis, vel *vena ad portas Hepatis*, de quo nomine plenius in Hepate dicitur: huius venæ mentionem facit *Hipp. lib. 2. Epid.* dum vocat *οὐλὴ τῆς ψυχῆς, & οὐλὴ τῆς ψυχῆς. Venam* quæ ad portas, & lobum Hepatis situ est, intelligit paruum lobum Hepatis, vt altera vena Caua, *ἡ κοινὴ*, dicitur *Iecoraria*.

In historia venæ Portæ, non leuis occurrit difficultas, quam primus excitauit *Galenus, libro de venis*, vbi debeat assignari principium huius venæ. Imaginare, inquit, arboris quemdam truncum, qui parte inferiore in multas radices, superiore in numerosam ramorum sobolem findatur: hoc pacto quæ in ventrem & Intestina deferuntur venæ, proportionem radicibus respondent, truncus verò est in Hepate. Opinione igitur *Galenus*, venæ Portæ radices in Mesenterio & Liene collocare oportet, ac proinde radicatio venarum non est in Hepate.

Quod autem vera sit *Galenus* sententia, ratione & autoritate *Hippocratis* demonstratur: radices in albore dicuntur, per quas alimentum attrahitur, ac Iecur per mesaraicas chylum ad se rapit: ipsemet *Hippocrates* hunc ingressum *Portam* appellat, & cum eo tota Astelepiadarum familia, auctore *Galenus*. Inde colligitur per truncum venæ Portæ, veluti per portam, chylum Iecur ingredi: accedit quod ramus mesentericus, vmbilicalis bifidæ in foetu portionem accipit, auctore *Vesalio*. Quod verum est in canibus, non in homine: nam vt in Portam, sic in Cauam intra Hepar inferiuntur.

De vsu venarum Mesaraicarum dubitant *Cossius & Fabricius ab Aquapendente*. An chylum trahant, an solum sanguinem deducant ad nutritionem Intestinarum & Mesenterij? *Cossius comment. in Auicennam*, testatur se libellum composuisse de vsu venarum Mesaraicarum, quo demonstrat illas non attrahere chylum, sed sanguinem dumtaxat ad nutritionem partium inferiorum deferre.

Rationes quasdam proponit ibidem: sed dum legi cius libellum, animaduerti eum defendisse veterem opinionem aduersus cuiusdam noui dogmatis assertionem, scilicet per venas, quæ in Ventriculum feruntur, & per quas succus melancholicus

effundi pecthibetur, chylum exsugi, & ad Hepar rectâ deferri, sine ulla traductione per venas Heparicas. *Fabricius ab Aquapendente* huic opinioni ad stipulatur, referentem & attestantem *C. Hafmanno*, sed in casu tantum necessitatis, Hepar à proximo Ventriculo fugere chylum opinatur. *Andreas à Lacuna in Methodo Anatomica*, id subolscecerat, & satis disertè expoluit, quænam sint illæ venæ ab Hepate in Ventriculolum productæ? An separatæ à trunco Portæ, quales sunt Splenici rami furculi? An potius sunt Venulæ ipsius trunci Portæ, quæ hoc munus perficiunt, ne actio Hepatis longiore cibi expectatione langueat, & frustretur? *Astellus*, venas quas vocat *lacteas* à Mesaraicis separatas, inuenit, ad distributionem chyli comparatas, de quibus dictum est *capite de Mesenterio*, & plenius agitur in *historia Fetus*, *capite de Anatome viventium animalium*.

De distinctione & distributione alimenti ad partes corporis eleganter philosophatur *Aristoteles*, libro secundo de partibus animalium, cap. 3. Cibus in ore minutim diuisus, per Oesophagum ad Ventriculolum deducitur: Membra verò omnia Corporis ex ventre, naturaque Intestinelorum, quasi præsepi pabulum capiunt, & *ut in cæcis*, stirpes enim suis radicibus suum alimentum iam confectum ex terra hauriunt, quocirca nec excrementum quidem contrahi in stirpibus solet, terra, caloreque eius perinde ac ventre vtuntur: At animalium genus omne ferè, sed apertè quæ incedunt, quasi terram in se continent sinum ventris, ex quo vt illæ radicibus, ita hæc alioque intercedente cibum assumere debent, donec finem sequentis concoctionis faciant, Cibus enim ab ore elaboratus ventri mandatur, hinc membrum aliud capiat necesse est. Nam venæ per totum Mesenterium ad ventrem tendunt vsque, exoritur interius.

Cæterum non datur intueri vnam Portam, donec supericram Pancreatis portionem stylo & vnguibz distaxeris. Quod vix fieri potest, sine alicuius vasis laceratione. In mulieribus tamen euidentius ramificatio trunci Portæ conspicitur, & præsertim in obelis, quia Pancreas minùs durum, & partes adiacentes membranosæ faciliùs secernantur. Commodè tamen inchoabis à bifurcatione trunci, quam inuenies in confinio Pancreatis & Mesenterij. Deinde sursum progrediens trunci quatuor Ramulos hac serie dispositos inquires, quos non datur intueri nisi diuulso Pancreatè. *Prima est Gastrepiplæis, secunda Intestinalis: Infra Cystica gemelæ prodeunt, postrema Gastrica à dextera manas.* Deinde Splenici & Mesenterici rami propagines inuestigabis; *Mesentericus* in quatuor furculos finditur, *Hæmorrhoidalem, Mesentericum, Cæcalem, & Colicam*, quæ portionem Coli versus Hepar adit, & alit, reliquæ portio Coli sinistri venas habet à Splenico ramo. Hæmorrhoidalis interdum à ramo Splenico proficiscitur, tum insignem ramum Ventriculo suppeditat ad nutritionem. Inde quis posset coniecere humorem melancholicum non expurgare, vel saltem non adeo impurum & malignum esse, si Ventriculus eo nutriatur. Hic ramus toti Colo sinistro prope Ilia distribuitur, capillares furculos Recto Intestino transmittens.

Inde cognosces discrimen hæmorrhoidum *Internarum & Externarum*, vasis & effectus differentium, quod *Internæ* fiant à ramo hæmorrhoidali, *cachymia vascutrices*, *Externæ* ab hypogastrico producantur, *plethora depletices*. Solus enim hypogastricus ramus extremitatem Recti Intestini rigat. Videant Medici prouocandis hæmorrhoidibus addidit, quodnam emolumentum ex venis irritatis, & vi reseratis accedat, Num peccatur in ætri commoda, cum purissimus aut serafissimus sanguis tantum effluat, impuro in venis resistit, vt venâ brachij scilicet cognoscitur? Quare *Galenus* consilium sequendum puto, ad *Aphor. 25. lib. 4.* non esse assuescendum hæmorrhoidibus, fluorem illum esse præter naturam, nec vnquam eliciendum, nisi malum partibus aluinis insideat, vel natura sponte propellat: tumque venæ hæmorrhoidales purgant primæ regionis impuritatem, in venosis ramis Portæ restagnantem, & in partibus nutritiis, quas alit vna Porta collectam.

Quod si sanguis impurus contineatur in vena Porta, missione sanguinis vna aut altera per brachia & pedes non potest educi: quod si remigret in Hepar, traductus per illam *Anastomosis* venæ Causæ cum Porta, vel Hepar magis inquinabit, vel in istis exilibz ramulis maiores creabit obstructions. Ergo potius per hæmorrhoidas educendus sanguis, si venæ Portæ ramos exhaurire velis.

Porro hæmorrhoidales venæ ab hypogastrico prodeunt, veteribus ignotæ fuisse, atque discrimen illud *venarum Internarum & Externarum, cachymiam purgantium, &*

plethoram depleturum, priscis & postremis Græcis Medicis, indictum & ignoratum fuit. Recentiorum Medicorum ex Arabum doctrina, nouum inuentum est. Veteres tantum per hæmorrhoidales venas Portæ humorem melancholicum expurgari crediderunt, vt in finis locis ex Hippocrate docuit Fabricius ab Aquapendente, in Operationibus Chirurgicis, cuius doctrinam de venis hæmorrhoidalibus paucis complacet.

Differunt *Hæmorrhoides Interna & Externa*, ratione vasorum, quæ sunt interna & externa: Vasa hæc inter se discrepant quinque notis & conditionibus. *Prima* est ex origine, quia vena Hæmorrhoidalis oritur à Portæ ramo Mesenterico vel Splenico, & statim ab exortu suo dicitur Hæmorrhoidalis, altera suboles est hypogastricæ venæ. *Secunda*, ex insertione, quia Hæmorrhoidalis Portæ, Recti Intestini internas partes alit & irrigat, Hæmorrhoidalis Caux, in partes externasani, nempe musculos disseminatur, quia musculos, partes facultati morrici seruientes, æquum erat alio sanguine & puriore nutrire. *Tertia*, ex numero, quoniam Hæmorrhoidalis Portæ vnica est, sociamque habet arteriam à Mesenterica infra Renes prodeuentem, Hæmorrhoidalis Caux duplex est, vtrique vna, comitem habens arteriam ab hypogastrica deriuatam, inde fit, vt sanguis rutilus & serosus abano eiacularus, ab istis arteriis hæmorrhoidalibus profluat, quamuis id rarius eueniat, quia non tam faciliè inquinatur sanguis arteriarum, nec adeo exuberat, nec tam faciliè eiicitur ob crassitiam vasis & oculi. *Quarta*, ab vsu, quia per hæmorrhoidalem Portæ caochymia expurgatur, per hæmorrhoidales Caux plethora depletur. *Quinta*, ex sanguinis excreti quantitate, qualitate, & dolore; quippe per hæmorrhoidalem Portæ sanguis paucior, crassus, & niger, absque dolore vacuatur, per hæmorrhoidales Caux copiosior & rubicundior, & cum dolore effluit, cuius causa est tumor externus, qui dolorem inferet sedendo & ambulando, ex natium mutua collisione & compressione.

His ita positis & constitutis, si sanguinem ab hæmorrhoidalibus venis educere volueris, putà crassum & melancholicum, vt vena Porta exoneretur, versus coccygem & magis introrsum ad Intestinum hirudines admovebis, si venam Caux duntaxat deplere cogitis, à lateribus podicis, & versus Periaægum, ac superficie tenes sanguifugas affiges.

Redeo ad venam Portam. Ramus Splenicus quatuor insignes venas sibi mutuò oppositas emittit, & alias multiplices venas, quæ in Pancreate feminantur, *Pancreatica* dicuntur, & pro vna numerantur. Sunt potius propagines Splenicæ venæ traductæ per longitudinem Pancreatis. In primis *gastrica maior* supernè educitur, latus dextrum ventriculi perreptans, cui infernè opponitur *Epiploica dextra* in Epiploon expansa: Sequitur *Coronaria Stomachica Superior*, cingens Ventriculum: *Epiploica sinistra* inferior in Columabit: Nec tantum ad Epiploon alendum feruntur venæ, sed per Omentum ad Colum Intestinum traducentur.

Interea perpende & examina, num in reiectionibus sanguinis quæ sunt supernè & infernè, eodem tempore & momento, sanguis per venas extremas rami Splenici in Ventriculum & Colon Intestinum eodem tempore excernatur. Nam si ab ipso Ventriculo totus emanaret sanguis, qui per inferiora deiecitur; non tam præcipiti lapsu per Intestina volumina reuolutus excerneretur eodem tempore, quo vomitu reiecitur. Breuior est via per venas rami Splenici. Vbi quatuor illas venas ramus Splenicus produxit, totus à Liene absorbetur, tum ex se in latus sinistrum Ventriculi venam profert, quæ *Vas Breue* dicitur: Quod interdum crassitie & longitudine calamit scriptorij vidi à capite Lienis educitum, nonnunquam duæ vel tres venæ à Liene prodeuntes pro *vasse breui* vsurpantur: per istas venas, seu *vas breue*, vt volueris appellare, sanguis in Liene exundans per *venulum* in Ventriculum expiuit, & per Intestina eiicitur, atque in hoc affectu huic potissimum visceri prospiciendum est. In lienosis ab eo vase sæpissime copiosas & immodicas sanguinis fusque deque reiectiones emanare vidi. In quodam nobili Senatore, qui reiectione sanguinis per superiora & inferiora à Liene prodeuntis interiit, deprehendi *Vas breue* minimi digiti magnitudine latum, & in Ventriculum ad apertum. Notauit *Valuerda, lib. sexto capite quinto*, in cadauere aperto Cardinalis *de Cibo*, qui vomitu sanguinis interiecit, compresso Liene Ventriculum repleti sanguine, qui per *Vas breue* deriuabatur. Apud Hippocratem libro quinto *Epid.* qui iuxta curriculum habitabat, cum nodu sanguinem vomuisset, postmodum mortuus est, sanguinem vomens multum, à quo strangulatus est; ad Splenem vtrò & deorsum multus sanguis ipsi prodibat. Inde patet

Vas breue adaptari & hiare in Ventriculum, præsertim in hypochondriacis, quibus tumet & turgit Lien, vicissim, per hunc furculum ex alveo Ventriculi aliquid in Lienem rapi posse, testantur rugitus & murmura, quæ in Splenicis hydropotibus statim atque frigida hausta est, solent excitari. Quod significavit *Hippocrates*, libro *quarto de morbis*, Splen subærotans ex Ventriculo de potu trahit.

Ex ea communione *Vasis brevis* cum Diaphragmatica sinistra, quæ *Cauz soboles* est, cognosces, quæ viâ sanguis in lienosis per nates expurgetur, ut passim legitur apud *Hippocratem*, in *Epidemia*. Vbi refert lienosos narium hæmorrhagia superueniente levari. *Bian* splenitico sanguis è sinistra nare multus manabat, atque fratri *Aristei* vxoris sublienoso, è sinistra nare sanguis frequenter & paulatim fluebat.

Ut autem *Vas breue*, aut venulæ, quæ huius locum obtinent, compareant, Lienem vinculis suis ad costas, & Diaphragma solutum, prius tamen reuulsis Intestinis, in interiotem partem protrahes, ut connexio Lienis cum Ventriculo facilius notari queat.

DE ARTERIA COELIACA.

CAPVT XVIII.

RIVIS QUAM Intestina extrahas, Arterias quæ venæ Portæ ramos committantur, obseruabis. Tanta est venatum & artieriarum societas, ut paucissimæ venæ in toto corpore reperiantur, arteriæ coniuge destitutæ. Quia inter se communicant per venarum Anastomoses. Itaque venę Portæ ramos, duæ Arteriæ à trunco Aortæ descendentes prodeuntes conueniunt, nempe arteria *Cœliaca*, & *Mesenterica inferior*, iuxta Os sacrum enata. Supra venæ Portæ truncum arteriæ *Cœliacæ* truncus consistet, & inde persequenda illius propagatio ac distributio in Lienem & Mesenterium. *Cœliaca* in tot ramos & furculos diuaticatur, quot vena Porta; qui nominibus isdem insigniuntur, & in easdem partes feruntur. Non est igitur opus singulatim propagines artieriarum exprimere, sufficiet discrimen assignare utriusque valis; quod Arteria candidior, etasrior, & inanior appareat, quàm vena. Arteria *Cœliaca*, ut referunt omnes *Anatomici*, supra venæ Portæ truncum in duos Ramos *Mesentericum* & *Splenicum* finditur: sed habet Lien suam arteriam propriam, de qua videbis *Arantium* in *Observat. Anatom.* In hypochondriacis & inflammatoriis dispositionibus, micantis arteriæ *Cœliacæ* palpitationem supra Umbilicum appressa manu non licet manifestè percipere, quum habeat supra se posita Intestina, nisi magnum intus conceptum fuerit incendium, vel abdomen macilentum fuerit, ac depressum.

QVID IN EXTIRPANDIS INTESTINIS
obseruandum.

CAPVT XIX.

INGENIAM & veram confessionem Vesalii non possum satis laudare, qui lib. 5. cap. 8. suæ Anatomies, sincerè mouet & affirmat, in vniuerso corpore, neque molestiorem, neque difficiliorem, sibi quæ grauatiorem sessionem obocurre, quam dum inferior Omentis membrana, & caua Iecoris regit, organaque contermina sunt aggredienda; maxime verò in homine, aut animali quopiam præpinguis, ac eo sanè ut artificem quemuis licet indolentem, facile hic hallucinari existimem. Atque fateor nullum opus in tota Anatome magis implicatum & confusum, magisque laboriosum occurrere, quàm inuestigare, & exactè distinguere texturam vasorum venę Portæ, & arteriæ *Cœliacæ* intra *Mesenterium* & *Pancreas*. In vno Cadanere hæc omnia non possunt exquisitè videri.

Itaque sedulo obseruata venę Portæ & *Cœliacæ* arteriæ distributiones, quæ eodem tempore

quo, indaz autar, debent demonstrari, ob sanguinis effluuium, quod vitari non potest, intestinus sic exit pabis. Rectum Intestinum duobus locis firmiter obstringes, & intra spatium cultro refecabis, si similem ligaturam in Teiuno paulo infra pori cholidoci insertionem adhibebis, & duobus vinculis interceptum Intestinum rescindes. Convenit etiam vena Porta truncum vincire, atque arteriam Celiacam in exortu suo vinculo excipere, deinde supra ligaturas vasa amputabis, max Intestina omnia à Mesenterio sensim diuilles scalpello: relictà maiore quàm fieri poterit Mesenterij portione, ne subiectam venam Cavam offendas. Exemplis Intestinis, viscera omnia denudata se pradiant, quæ tamen ut apertius ob oculos propinquantur, sanguinem in capacitatem ventris illapsum spongiis exhauries, corpusque omne siccabis.

DE VENTRICULO.

CAPVT XX.

Ventriculus
quasi vent-
culus, quia
inflatus vim
similis est:
Graeci
μύλον, à
causa est:
quodculum
ligaturæ
ipsum ven-
triculū do-
cui Mercu-
rialium va-
rior lectio
nibus, vel
Xm m x-
m & as-
m. Vide
Eymolo-
gicū Gra-
cū, ut hoc
milia.



EMOTIS Intestinis, Ventriculus considerabis, primæ coctionis, Chyloles officinam, alimenti conceptaculum, promum condum, siue scatiginem, vnde singulæ partes escam suam repetunt, propterea dum plenus est, ab eo omnes partes trahunt, vicissim dum vacuus est, corpore fruitur colliquefcente. Er quemadmodum arboribus terra, ita animalibus Ventriculus & nutrit, & calefacit, ac frigefacit, inquit Hippocrates. Apud Macrobiū libro septimo Saturnaliū c. 4. Stomachus paterfamilias dicitur, quasi omne animal solus gubernans. Quapropter bene æstimata eius actione ad usum vitæ necessaria, inter partes nutritias principatum huic visceri deferre oportet. Nam ex Ventriculo reliquarum partium sanitas dependet, ut Ventriculus valet, ita & totum corpus, Ventriculo laboranti vniuersum corpus condolet & compatitur, ex Hippocrate libro quarto de morbis: quippe malè affectus crudum & indigestum chylum Hepati subministrat. Iecur autem primæ coctionis vitium emendare non potest, ac proinde impurum sanguinem, quo partes refici ac recreari nequeunt, generabit: sicque laboranti Ventriculo reliquæ corporis partes compatiuntur, ac veluti contabescunt.

*Qui Stomachum Regem totius corporis esse.
Contendant, vera nū ratione videntur,
Huius enim validus firmat tenor omnia membra,
Et contrà eiusdem franguntur cuncta dolore.*

Quantum autem Serenus Sammonicus Ventriculo extollit, tantumdem Plinius, lib. 18. cap. 8. eundem deprimat, & abiectissimum reddit ob ingluuiem & voracitatem, cui genus humanum fermè maecipatum est. Plurimum homini negotij Aluus exhibet, cuius causa maior pars mortalium vivit. Pestimum corporum vas inflat ut creditur, & sæpius die appellat, huc luxuria conditur, huic nauigatur ad Rhodum, huic profunda vada exquiruntur, & nemo eius utilitatem æstimat consummationis fuditate.

Quantum necessaria sit ad vitam Ventriculi actio, Menenius Agrippa eleganti a pologo demonstraui apud Liliū, libro secundo decadis 1. Tempore quo in homine, non vt nunc, omnia in vnum consentiebant, sed singulis membris suum cuique consilium, suus sermo fuerit, vt indignatas reliquas partes suâ curâ, suo labore ac ministerio ventri omnia quæri, Ventrem in medio quietum, nil aliud quàm datis voluptatibus frui, conspirasse, inde ne manus cibos ad os ferrent, nec os acciperet datum, nec dentes conficerent. Hæc ita dum ventrem domare vellent, ipsa vna membra eorumque corpus ad extremam tabem venisse, inde apparuisse ventris quoque haud segne ministerium esse, nec magis ali quàm alere, eum reddentem in omnes corporis partes, hunc quo viuimus vigemusque, diuisum pariter in venas maturum confecto cibo sanguinem.

Ventriculi magnitudo, Hippocrati, libro de structura hominis, quinque palmorum longitudinem æquat: intelligo in ambitu & circuitu, quando inflatus aut cibo distensus est: hæc tamen cerò definiri non potest, quia Ventriculus corporis magnitudinem sequitur, debet enim esse æqualis & proportionata corpori magnitudo Ventriculi, alioqui vitium addeat in magnitudine, vt cuidam accidisse memorat Galenus

Artis parva cap. 71. Venter ille adeo paruum ac rotundum habebat, ut circumscriptio propria, & videntibus & tangentibus appareret. Magnitudo ventriculi deprehenditur ex hac commensuratione, referente *Fabricio ab Aquapendente*, interuallum à clauiculis ad xiphoidem debet esse æquale intercapedini, quæ est à xiphoidi vsque ad Umbilicum, & ab eo vsque ad pubem æquale spatium requiritur. Quod si spatium quod est à xiphoidi ad Umbilicum amplius est, altero intervallo inferiori, quod est infra Umbilicum, Venter erit magnus, sin contra, parvus. Aliud signum petitur ex ore, quod si magnum est, magnum quoque adesse Venter indicio est, contra, si paruum. Vnde quibus magnum est os, ij sunt voraces & gulosi.

Venter pennatis animantibus duplex datus fuit. Ruminantibus quæ alteram dumtaxat maxillam dentatam habent, quadrigeminus. Nobis autem vnicus est, ut & animalibus vtraque maxilla dentatis; etiam si *Hippocrates* scripserit libro de arte, Corpus non vnum habere Venterculum, sed plures. Duo enim sunt qui cibum accipiunt & dimittunt, alique præter hos plures, quos norunt, quibus hæc res cura fuit. Hoc in loco *Hippocrates*, per secundum Venterculum alimento dicatum, Intestinum intelligit, quod ex eodem *Authore*, à Ventre extat Venterculo consimile, longum cubitorum non minus duodecim, ex libro de corporum resectione. Per alios Venter intelligit cavitates corporis. Nam sæpe apud *Hippocratem*, Venter seu Venterculus pro cavitare vsurpatur. Duplicem Venterculum continuatum, sed ore angusto intercisum, semel vidi in homine, semel in muliere heræ hospitij ad insigne ensis regij in oppido *Reginas*, duabus leucis à Lutetia distito, quæ anno Domini 1624. coram trecentis spectatoribus publicè dissecta fuit. In hac Venterculus erat oblongus, in medio artus, amplitudine sua æqualis Colo Intestino; eoque dissecto inueni angustiam illam Pyloro similem, in aliam cavitatem amplam definire, quæ postea in orificium crassius terminabatur, quod verus erat Pylorus, à quo Ecphyfis, primum Intestinum exordiebatur. Propterea ubi incidere in Venterculum similis conformationis, cum rescindis, ut interiorum structuram exquisitas & contempleris. Memini me legisse apud *Iasolinum*, Venterculum bifidum, Hepar quatuor lobis manifestè diuisum, Pulmonem septem lobis dissectum.

Venterculus in Abdomine collocatus est, septoque Diaphragmatis separatus à Thorace, non tantum ad respirandi libertatem, & faciliorem dilatationem; sed ne foedo culinæ nidore & halitu partes superiores inquinarentur. Medius inter Iecur & Lienem consistit, instar lebetis inter duos focos, ut ab his incalcescat. Sic *Galenus lib. 3. de natural. facult.* cap. 7. Lien & Hepar, inuicem vocat, Venterculum comparat vtiq; lebeti cuidam. Inde cognosces, an verum sit, intensum Hepatis calorem, Venterculi calorem minare. Nec tamen in eo situ medium Abdominis exquisitè occupat, quum semè totus in hypochondrium sinistrum inclinet, propter loci vacuitatem.

Quando Iecur amplitudine sua occupat verumque hypochondrium. Venterculum repellit in hypochondrium sinistrum: Tum Venterculus hypochondrio sinistro conditus & inculcatus, insignem versus Hepar emittit productionem instar Intestini, priusquam Pylorum confluat.

Quum autem cibi conceptaculum sit, ingressum & egressum habet: ingressus *Stomachus* dicitur, siue *Superius Orificium*, sedes famis & sitis, supra Diaphragma, & intra Thoracem vndecimæ dorsæ vertebæ insidet: illic assignatur, quoniam ibi desinunt nervi stomachici, quam partem admirabili textura cingunt & amplexantur. Quare cum superius orificium Venterculi laborat, ad finem dorsæ topica remedia admovebis.

Partem illam humorum congestione intumescere, & abscessum pati incurabilem, qui per biennium cibi & potus ingressum & delapsum interciperat, sæpè vidi in ægri ad mortem vsque miserabiliter contabescitibus. Morbum istum *Verrucam stomachi* vocat *Auenzorar. lib. 1. tract. 15.* ubi elegantem historiam de hoc apostemate recitat, & de alio apostemate Venterculi, quod sua lingua *Dubellati* nominat. Vidi etiam abscessus prægrandes in parte inferiore Venterculi vsque ad Pylorum, qui induratos instar cartilaginis, pugni siue manus complicatæ molem æquabat, & per duos menses continuo vomitu vsque ad mortem ægros farigant.

Egressus Venterculi *Pylorus* dicitur, sinistro hepatis lobo coopertus: idco turpiter hallucinantur, qui cartilagini xiphoidi topica stomachica adhibent, quæ leuo hypo-

Ex Anstomeli in blem. Phyllo, cap. 6.

chondtio applicanda sunt; Pylorus autem Pancreate fulcitur, & molliter excipitur, propterea *Dioles* sedem melancholicæ hypochondriacæ in Pyloro collocabat, qui continenter arderet. Id verum est ratione Pancreatis, quod est focus & minera huius morbi. *Nōnus* dicitur, quasi *νῆμα ἄνυον*, vel *νῆμα ἄνυον*, custodiens portas. ideo *porosarius* vulgo dicitur, vel ut voluit *Casaubonus in Athenæum, lib. 1. cap. 13.* *ἢ τὸν ἄνυον μῆν*, qui curamianæ habet; *ἄνυον* enim cum tenui spiritu, curam, *ἄνυον* significat, auctore *Galeno in glossis*. Proinde non ineptè *Democritus, epistola ad Hippocratem scripta de natura humana*, dum Pylorum vocat carnem, quæ Intestinatorum exitum in coxarum antro constringit, Sphincterem intelligit. Cellus appositè iuncturam Ventriculi cum summo Intestino, à Græcis *νῆμα* vocari notat, quoniam portæ modo, in inferiores partes ea quæ excreturi sumus, emittit. Pylorus autem orbiculari valvula clauditur, omnibus Anatomicis ignota, quæ magis expressa videtur, quàm altera extremitas Ilei circumdata, & adeo celebrata à *Baulino*, vt pro eius tutela tanquam pro aris & focis decertant; inferiori Ventriculi orificio affixa est, vt chylo sursum remeanti obstitat.

Ventriculus, si credimus *Hippocrati, libro quarto de morbis*, substantiâ constat membranosa, dura & densa, quippe res est valida & robusta, sicut *pellis & corium*, & peritæ ex *Lybia* iuvolis, pellibus pecorum pro vestibus utuntur, *Ventriculus autem pro sacculo & arculis*. Quare non ineptè *Celsus* membranas Ventriculi, *tergora* nuncupavit.

Talis substantia membranosa Ventriculo concessa fuit, vt in ingluvie faciliè dilataretur, & ad expulsiōnem chyli constringeretur. Sed nonnquam adeo distenditur & attenuatur diuulsis vel rupiis fibris, vt postea vix contrahi queat, pristinamque firmitatem recuperare: quæ causa est in gulosis & voracibus, diuturnæ Ventriculi attoniæ, vt notavit *Rondeletius, capite de umbilicis stomachi*, quod ex *Galeno* de promptum est *libro tertio de symptom. causis, cap. 1.* Interdum laxatus & resolutus Ventriculus, infra Viiblicum descendit, vt in quibusdam obseruatum.

Membranosa hæc substantia duabus membranis propriis contexta est, Internâ & Externâ. Externa carnosâ est & circumiecta, vt facilius excipiat & retineat instar fomenti calorem adiacentium viscerum, Lienis & Iecoris. Interea notandum omnes partes membranosas, quæ sui dilatatione & contractione moueri debent, carnosam membranam obtinuisse, cuiusmodi sunt Ventriculus, Oesophagus, Intestina, Vesica, Vterus: ideoque notabis etiam membranas carnosas, esse fibrosas, quia caro est fundamentum & culcitra fibrarum, quæ robotandis & constringendis inseruiunt partibus, quos solum vsus cum viris doctis tribuo fibris. Obiter monebo ridiculam esse opinionem, licet à *Galeno* stabilitam, quæ circumfertur de fibrarum actione & differentia, quod quædam sint Rectæ rationi destinatæ, Aliæ Transuersæ ad expulsiōnem comparatæ, quæ vel solitariæ, vel simul omnes intertextæ reperiuntur in partibus. Fallitas huius opinionis inde liquet, quod multæ sint in corpore partes, quæ absque fibris attrahunt, retinent, & expellunt, vt Ossa, Hepar, Lien, Testes, Mamæ, Pulmo, Cerebrum, & aliz partes præfatis fibris priuatæ, quæ tamen prædictas actiones exercent, quales in membranis & masculis exprimuntur. Deinde si ad expulsiōnem totij Vesica omnibus suis fibris utitur, Transuersis, Rectis, Obliquis: In ea contentione confusio fiet omnium fibrarum. Præterea cum ratione sicis, fibræ dicantur *Rectæ, Transuersæ & Obliquæ*, easdem edere actiones oportet, ergo quæ Rectæ erant fibræ, si transuersum locarentur, expellerent. Denique *Galenus* parum curauit fibras ad edendas actiones. Nam in Intestinis Rectas transuersis oppositas, esse scripsit ad robur, non ad trahendum, atque *Carpus* notauit Naturam per vnicam fibrarum actionem, omnes suas actiones perficere. *Fallopius* obseruauit villosam esse tunicam internam Ventriculi, & elixatam, similem fieri panno sericeo villosa, in Ventriculo non elixato est tantum rugosa: Villositatem instar ferici deprehendens lingue radatur. Istas membranas diuerso modo nutrirî voluit *Auicenna, libro 1. Feni. doct. 5. cap. 3.* exteriorem venis conspersam sanguine, interiorem candidam & exsanguem chylo.

Inter duas proprias membranas venæ à Splene deriuatæ sanguinem suum effundunt, quo fit, vt fundus Ventriculi potissimum parte sinistra nigricans foris & intus appareat, quod in multis subito extinctis veneni suspiciōnem attulit. Vt rami Splenici venæ sparguntur per fundum Ventriculi: ita venæ quæ ab apice Lienis emergunt lateraliter Ventriculum perreptantes, assurgunt ad partem superiorem Ven-

tricoli, quem intus nigredine quadam oblinunt, notis quibusdam tanquam poris compuncta & interstincta est. ac si veuarum oscula in eas porositates desinerent, ac terminarentur. Inde dubitare posset aliquis, cum Lien Ventriculi superfluos humores per eas porositates exogat, & eliciat, an per easdem vias Lien humorem aliquem acidulum extillat & eructet, ideoque venæ in latere sinistro Ventriculi sunt evidendiores, quam in dextro. Ventriculus rotundam figuram quadantenus oblongam obtinuit ad capacitatem, & commodiorem chyli vacuationem, cuius portionem retineret, si fuisset inæqualis & angulosa. In Quadrupedibus magis spherica est, quia doctum habent carinatum, intus concavum, à quo rotundatur Ventriculus: in hominibus vero dorsum est latum, quò fit, vt rotunditas Ventriculi in longitudinem abeat, quæ figura in homine rotundæ præstat. Qui enim rotundum habent Ventriculum, ita in passu difficulter respirant, Ventriculo premente Diaphragma, ex Galeno in *Art. parva*.

In hominibus diuersa est Ventriculi figura, modò corneam musam, seu fistulam vtriculariam refert, modò Intestinum oblongum æmulatur, versus Lienem parum extumescens, & ab ea extuberantia decem vel duodecim digitorum latitudine, in latus dextrum oblique dirigitur vsque ad Intestinorum reuolutionem. Tale in muliere Æthiopica Ventriculum ab Oesophago, non amplius & latius Intestino, multis spectantibus demonstrari, quamvis candidior & crassior existeret.

Humanus autem Ventriculus in duobus discrepat à Ventriculo butorum, ex Galeno, libro 4. de *usu partium*. In homine fundus est amplior, in brutis contractior & angustior: Pylorus in homine glandosus tuberculis caret, quæ in Pyloro butorum reperiuntur. Notat Platerus foetorem anhelitus oris interdum contingere à nimia Pylori laxitate, quum dentes sunt integri, & Pulmones vicio nullo contaminati: nam ex Intestinis continuo sursum expirant foedi vapores, quibus oris spiritus inficitur.

Sympathiam Ventriculi cum Corde refert Arretius ad Stomachum traductum per Thoracem, & subiectum Cordi, eique adnexum, libro 2. de *diuturnorum*, cap. 6. Sed ista communio atque societas fieri potest, ratione nervi stomachici, qui transeundo per Thoracem, ramulos Cordi suppeditat.

Obseruauit Vesalius, lib. 3. *Anatom.* cap. 3. In Ventriculis hominum obeforum nonnunquam reperi adipem vtriusque copiosum, sed leuem & lubricum in sinistro latere circa fundum internæ superficiæ adnatum, ob quem sæpe inappetentiâ diuturniore tales homines laborant: Non focus ac si alius quidam humor dulcis eidem inhaereret. Viuentis hominis Ventriculo insitus & congenitus est acidulus humor, qui instar fermenti per alimentum diffunditur, vt exquisitè elaboratum & subactum, facilius in chylum, liquorem cremori similem soluatur. Is humor perenniter fouetur, atque renouatur ex relicta chyli portione, vel augetur ex seroso humore acidulo, quem Lien per *Vas breue* in Ventriculum eructat, aciditate sua appetitum prouocat, & ad palatum vsque assurgens, grata & acidula humiditate, fauces & linguam irrigat: vt masticatum alimentum sic humidatum, coctionis rudimentum acquirat in ore. Itaque hic humor acidus, esurinus, tenuis, spirituosus operationes suas in ore inchoat, in Ventriculi fundo perficit, adiuvante nativo calore ipsius Ventriculi, cui datum à natura præcæteris partibus chylum elaborare: ideoque absumpto vel diminuto illo humore, appetitus languet, chylus siccior gignitur, sin acrior fuerit, chylus nimium fermentatur, inflatur, & spumescit: si fuerit aquosus & frigidus, crudiatum auctor est. Proinde Paracelsus tract. 2. de *ente veneni*, Ventriculi *Alchymistam* vocat: sic Hippocrates coctionem in lienterico fluxu proficere notauit, accedente puctu acido, qui prius non erat, *Aph. 1. sect. 6*. Sed ab eo potissimum humore chylosim fieri absolute negamus, quamvis Germanus quidam Ferrisius, id multis rationibus conetur probare, quia chylosificatio ipsius animæ opus est, quæ vitur calore nativo tanquam præcipuo instrumento ad coquendum alimentum in Ventriculo, ad hoc opus destinato, cui naturaliter insita est facultas producendi chylum.

bras seu lobos, ut supra declaravit eodem libro, agens de lobis pulmonum, non ostendit quomodo igitur, si de eadem natura. Nihilominus Hippocrates in propriis & germanis libris, de viis & visceribus Hepatis distinguit libro de Ossium natura, & lib. 2. Epid. sect. 4. alibi ne tunc à deo dicitur à visceribus: & Plato in Timæo, cum agit de bile in Hepate restagnante, fibras & intimos recessus, eumque aditum sic aspicit, alibi 3. & alibi vias n. &c. Vbi distinguit de viis à fibra Hepatis, etiam in Hepate ab extispicibus obseruabatur, quod explicat Galenus in excessu, dicitur, inquit, sacrifici vocant, ubi iuxta finas Hepatis partes ad dextram fibram Venula angusta recta nigra apparet. Videtur autem eo nomine superius Hepatis pars denotari, iuxta quam fibra inter se diuiduntur, vt exponit Galenus, in dictione *hep.* Nam apud Gal. idem sonat, quod *hep.* & vnum vocabulum per alium interpretatur. His nominibus non videtur vsus Hippocrates, nisi apud eum pro *hep.* *hep.*, restitueretur *hep.* aut *hep.*, vt *Forsius* animaduertit. De istis nominibus partium Hepatis ex Aruspicina, legendus *Celius Rhodiginus*, antiqu. lect. lib. 3. cap. 29. & *Fullerus*, lib. 5. *Miscellaneorum sacrorum*. *Eterophilus* ex Galeno lib. 6. administ. Anatom. cap. 8. Hepatis locum hiantem, in quem venæ Portæ caudex inferitur, comparabat *Hippocrates* viis, qua voce significatur locus profundus inter duas rupes, vt rectè *Andermannus* in sua versione interpretatur, atque in istum locum profundum si manum inferas, deprehendes in tres quatuorve canales diuidi, quos digiti manus subire possunt, ibi abcessus fieri, & sordes plurimæ coaceruari possunt, quæ tandem in Epiploum irruunt. Porro *Extispicum*, siue Contemplatio viscerum à iecore, more Aruspicum auspicanda est, quia caput extorum seu viscerum reputatur.

Dicuntur autem *Extæ* quasi exsecta, vel Extantia, & *Viscera* quasi vesca, quia iis optimè nutrimur; Viscerum autem numerum quibus vicerentur Aruspices, enumerat *Prophetas Gregorius*, *Scholius* in *Synesium*, non omnibus, inquit, interantices Aruspices vtebantur ad explanationem futurorum, sed solo Hepate. Viscera autem sunt septem, *Cor*, *Iecur*, *Splen*, *Stomachum*, *Pulmo*, *Duo Renes*. Velut *Scholias* *Martianus Capella* notat *Extæ* Vitalia fuisse septem, *Linguam*, *Cor*, *Hepar*, *Lienem*, *Pulmonem*, & *Duos Renes*. Viscerum vsus est præter actiones quas habent ex *Aristotele* lib. 3. de part. animal. cap. 7. ramos vasorum tanquam anchoras & clauos stabilire & extendere, vt liber sit humorum & spirituum comiteatus: Sic *Iecur* & *Lien* ad latera corporis venas maiores firmant & sistant, *Renes* venam Cauam cum Aorta continent. Quod videtur desumptum ex *Hippocrate*, libro de Oss. nat. Vbi venam Cauam firmari scribit à Renibus velut anchoris iactis, *inquit* *Galenus*. Præterea scribit *Aristoteles*, Viscera ad extremitates vasorum posita fuisse, quoniam ex fæce sanguinis per ciuius fluentis, eiusmodi carnes concreverunt. Cap. 1. lib. 1. de partibus animal. & cap. 10. lib. 3. eiusdem operis. Eleganter Grammatici *Iecur* sic appellari dicunt, quod sit iuxta Cor, id est, proximum à Corde viscus, posset etiam referri ad verbum *cupio*, id est, cupio & desidero, est enim *scilicet concupiscentia*, *hinc* dicitur etiam *hep.* à *hep.* & *hep.*, quod in gibbosum videlicet figuram erigatur, vel ab *hep.*, quod irrigare est, quia totum corpus ab ipso per sanguinem rigatur: siue *hep.* à *hep.* à *hep.*, ab eo videlicet quod latitudo causa existit, ex *Meleto* lib. de natura humana.

In Hepate parenchyma durum & rubicundum obseruabis, opifex sanguificationis, ex concreto & indurato sanguine conflatum, inde *mirum*. Erasistrati vox, quasi *hep.*, circumfusum. Proinde si sanguinem humanum è vena secta detractum in aqua decoquas, ubi concreuerit, similem deprehendes Iecoris parenchymati, tum colore, tum odore, tum sapore, tum consistentia. *Gordon*, cap. de retentione mensium, notat Hepar quantumvis assimilatur sanguini, & videatur ex sanguine concretum: Nihilominus generatum est ex primis feminibus, & album est in radice, sicut membra radicalia sunt alba, quod patet sanguine ablato & euacuato, hoc patet etiam cum est decoctum. Nec sine ratione *Varolus*, Hepar primò ex semine fieri scripsit, affusione sanguinis, dum nutritur rubescere, illud enim quod primò in Iecore formatum, est cumulus Vasorum intra membranulam quandam tantà copiâ contentorum, vt nullus sanguini locus relinquatur: ita de Liene & Pulmonibus sentiendum. Sicque *Fernelius* cum *Gordonio* est interpretandus, cum existimat ex semine parenchyma Hepatis effingi.

Iecoris amplitudinem considerabis, quæ naturaliter cartilaginem Xiphoidem paulùm peruadit, in quibusdam tam viris, quàm mulieribus visum est vtrumque hypochondrium opplere, & per ligamentum ipsi Lienì annexum, tum Ventrículus

est parvus & angustus Intestino similis, quæ causa est fluoris assidui ferme Lienterici, cum alimentum non possit retinere, quia comprimitur dilensus ab incubante Iecore. In erecto cadauere duos digitos naturaliter infra nothas costas descendit. Vidi etiam in quibusdam resupino cadauere infra costas prominens, & ad Umbilicum protensum. Hepatis superior & exterior pars gibba est, interior & inferior caua: sic *Polux Hepatis vñs & nua.* expoluit *lib. 2. Hepatis Regionem* dicuntur, quas seorsim affici posse *Galenus* decreuit, & Medici omnes consentiunt, ita vt Gibba parte laborante, integra & illæsa persilare queat altera. Inde colligunt variis ductibus partes istas seorsim affectas expurgandas esse, Gibbam per vrinæ, Cauam per aluum.

Acasæ discrimen istud cum ratione videtur à veteribus constitutum, quoniam Caua Vena ramulos suos spargit in partes superiores Hepatis, vt Porta vena in partes demissiores disseminat. Itaque humores in diuersis locis Hepatis seorsim patrare possunt, ac proinde per varios ductus expurgari ratione illarum regionum.

Intra substantiam Hepatis duplex Valorum genus obseruabis: *Ramos Portæ*, qui difseminantur per partes inferiores parenchymatis, & *Ramos Cauæ*, qui sparguntur per superiores. Deinde discissis vtriusque Venæ Ramis deprehendes, Ramos Cauæ, instar cribri innumeris foraminibus pertasos, vt facilius languinem omni ex parte exsugant: Ramos verò Portæ longè paucioribus foraminibus perforatos: quæ quidem foramina sunt extremitates venarum capillarum: At nullæ aut paruæ venæ capillares terminantur in foraminibus Ramorum Cauæ. Iude cognosces discrimina Ramorum Cauæ & Portæ, & Chylum vasis Portæ excidere, & dispergi per substantiâ Hepatis, vt contactu carnis tuber euadat, dein per poros Cauæ vndique exsugi & excipi.

Iecur supernè adstringitur strictè toti Diaphragmati per vnum continuumque ligamentum validissimum, interuicium Peritonæi, quod dum internam Diaphragmatis taciem oblinat, supra Iecur reuolutum, istud ligamentum constituit. Respectu Hepatis nerueam portionem Diaphragmatis ad robur constructam fuisse scripsit *Galenus*, id eoque non recedit à Diaphragmate digiti latitudinæ, vt referunt omnes *Anatomici*.

Septum transversum ita Hepati adnatum est, vt non facile separari queat, ex *Hippocrate*, *lib. de Ossium natura*. Nothis quoque costis affixum est ope tenuissimarum fibrarum anteriùs erigitur per ligamentum robustum latum, duplicatû, à Peritonæo productum, sed Xiphoidi cartilagini firmiter adnatum, quod supra Hepar expansum, propriam tunicam constituit à Peritonæo propagatam, nec aliam habet.

Quoniam isthæc membrana sit tenuissima, expende si verus sit *Hippocratis Aphorismus 45. diu. 7.* Iecur hominis foris continuum est sine vlla sectione, vt in brutis animantibus, quorum Hepar in quatuor lobos fissum est; parte tamen sui inferiori concava intùs vsque ad medietatem in duas fibras diremptum est, à vena Umbilicali Hepatæ subeunte & suspendente: interdum parui duo lobus venæ Portæ accumbentes, magnis duobus substernuntur, quod sæpius occurrit. Scio Veteres Medicos, in plures fibras seu lobos Hepar humanum dissecuisse. *Hippocrates* quinque notauit, *lib. de Ossium natura*, & *lib. 7. Epid.* scribit fibræ Hepatis complicatam, acerbissimum dolorem excitare, qui sedatur forti dorsi percussione. *Galenus* in quatuor lobos Hepar diuidit, *lib. de vsu part.* Attamen *libris Admin. Anat. ex Herophilo* notat, non omnibus Hepar simile datum fuisse, quia in quibusdam continuum est sine vlla diuisione, in aliis duobus lobis sectum, in aliis quatuor lobos obtinere. Nugatur *Fuchsius* dum *lib. 3. f. 1. Anatomies cap. 13.* profert ad excusationem veterum, Græcos *αίμα* vocasse omnia *αίμα*, id eoque factum, vt iidem Iecur humanum fibras habere scripserint. Ad lobum paruum Hepatis affixum est Omentum, imò lobus iste totus duplicato includitur Omento, atque circa enim locum ab Omento magna cauitas versus inferiorem Hepatis sedem efformatur, quæ refert Vtrem, vbi possunt humores magnâ copîa coaceruari, forsitan ibi sæculus constituendus ab Anatomicis iuxta Hepar deprehensus in multis morbo pereuntibus, & post obitum dissectis, de quo egimus *cap. de Omento*, ex *Cuneo & Salomone Albertis*. In ista Regione caua & concamerata ipsius Hepatis, exempto vel distincto Epiploo, supra paruum lobum intra Hepar, magna deprehenditur *Cauitas profunda* instar cauernæ, quæ ferè pertingit ad apicem Iecoris. In hanc cauitatem intrusa manu canales quamplures hæc & illæc dispersos inuenies, qui digitum possunt admittere. Haud dubiè in hac cauitate magnus humorum acervus colligi potest. Inde contumaces obstructions procreantur, si canalibus istis impactus & incuneatus fuerit humor: vel interdum Abscessus, si ad suppuratum perueniat: quæ de te dicèdû suprâ.

Ideoque Veteres Medici, cum de cauis Iecoris partibus loquuntur, procul dubio istas cavitates intellexere. Parvus iste lobus Hepatis instar fulcris molliet excipit, & falcit truncum Portæ, ad eumque finem excavatus, atque sinuosus excelsus fuit, quin etiam instar septi truncum Portæ à trunco Cavae determinat.

Prudenter scripsit *Aristoteles*, lib. 1. de *historia animalium*, Hepatis humani figuram rotundam esse, bubulo Iecinori similem. Nam in boue Iecur est continuum humanum propter similitudinem.

Observavi Iecur hominis elixatum, consistenti, colore, & gustu bubulo respondere. Non est friabile ut suillum: observavi etiam humanam carnem coctam, bubulæ consistentiam & saporem referre, quod fuerat prius animadversum ab *Alexandro Benedito*, sua *Anatomie* cap. 23. lib. 5. Propterea falluntur, qui *Iunenalis* auctoritate

Non distare putant humana carne suillam.

Quamvis id confirmatum fuerit à *Galenolib. 3. de aliment. facult. cap. 2.* Vidi etiam Iecur humanum ab anno elixatum, quod subscamnis Scholæ Medicæ asservatum fuerat, nullo modo corruptum & rancidum, sed eum odorem redolebat, qui est in recenti elixato, propterea expende *Pliny* sententiam, lib. 11. cap. 37. *Iecur in mortuis vetustatis patiens*, centum durare annos oblidionum exempla producere. Mendum suspicatur in *Plinio Turnebus*, lib. 20. cap. 23. nec emendavit. At doctissimus *Rigaltius*, partim suo pte ingenio, partim ope codicum antiquorum manuscriptorum, ita restituit hunc locum depravatam, dum legit oxyrrinehum excerpta, pro oblidionum exempla. *Oxyrrinehus* piscis est Niloticus, ex cuius adipe, teste *Aliano*, glutinum paratur indissolubile, sed glutinum istud non ab hepate formatum. Legetem potius *sextum durare annum*, vel *sextum durare annos*. Verumtamen in viventibus corruptioni facillè obnoxium declaravit *Hippocrates*, libro de veteri Medicina.

Hepar propter ténacitatem & sanguineitatem, à *visceribus* & *visceribus* abscque doloribus esse non potest, & propter has causas dolores acutissimi & frequentissimi circa eum locum contingunt, suppurationesque ac tubercula plurima. Vidi tamen in tabidis post mortem dissectis, quibus omnes carnes consumptæ fuerant, Iecur integrum persistisse, quod multi credebant eliquatum & exhaustum ex diuturno alui profuvio.

Ex *Aristotele* Iecur ad temperiem sanitatemque corporis primum confert: Est enim finis eorum quæ sunt in sanguine, & omnium viscerum, excepto Corde, sanguine refertissimum, cap. 12. lib. 3. de partibus animal. falsum est quod ipse scripsit, lib. 3. de *hist. animal.* & lib. de *respiratione*, neque ad Iecur, neque ad Lienem ab Aorta vas ullum pertendere, quod de Hepate scripsit etiam *Galenus*. Nam à Cœliaca arteria duæ arteriæ satis insignes in Hepar producuntur, trunco venæ Portæ superterense.

Præclara documenta de Iecore proponit *Aretæus*, libro 1. *diutur. cap. 13.* quæ hîc interferam. Iecur in Generatione ipsa est Lienis æquilibre, *inimè*, dextram enim in sanitatem, quàm in morbis impari. In sanitatem, quoniam principatum alimenti Iecur obtinet, siquidem venarum radicatio est, quin etiam in morbis ad sanitatem consequendam, multò quàm Lien valentior causam habet. Quare quânto ad sanitatem Iecur melius est, tantò deterius à morbis afficitur: Ex enim celerius & violentius inflammatur, & frequentius ac perniciosius abscessum patitur, & scirrho affectum, velocius atque dolentius, quàm Lien interficit.

Abscessus Hepatis expurgari vidi per Ventriculum, sed Hepar incumbens Ventriculo, quæ parte nempe caua suppuratione contraxerat, Ventriculum eroderat: sic gibbæ partis vomica interdum feliciter evacuata fuit appresso pyrotico, quia Iecur tum extumescens & saniosum, Peritonæo agglutinatur, sub musculis transuersis, quæ omnia in dissectis cadaveribus sæpius observavi. Vnde pendeat hæc societas Capitis cum Hepate, ut in vulneribus Capitis abscessus potius fiat in Hepate eorum qui intereunt, quàm in alio viscere: an satis intelligitur: an ratio ne ruorum, qui tamen exiles sunt, qui Hepati communicantur? An ratione venarum, purulentia Cerebri per truncum Cavae descendens, facilius hæret in Hepate calefacto & inflammato, quàm in alio viscere?

Multos valde torquet, quod *Aristoteles* libro 1. de *historia animal. cap. 17.* Hepar supra Diaphragma positum esse scripserit, cum sit sub Diaphragmate reconditum. *Scaliger* em restituit, & ignorantia accusat *Galenum*, quod non cognouit librarij m&

dum. Sed reprehendo in *Scaligero*, quod non animaduertit similem errorem, cum agit *Aristoteles* de Mesenterio, quod non est supra intestina, sed infra, non *in*, sed *sub* legendum erat. Sed cum *Aristoteles* descriptionem partium à Capite incipiat, deorsum procedendo ad pectus, & à pectore ad ventrem, Hepar est supra Diaphragma: quod si à partibus infernis sursum progrediare, Hepar erit infra Diaphragma: sic in animalibus prunis Mesenterium situm est supra Intestina, in resupinis iacet sub Intestinis. Alij dicunt *in* cum accusatio significare *trans* vel *extra*, eum genitio *super* vel *supra*, ideoque Philosophus recte scripsit Hepar esse *ultra* Diaphragma.

Scribit *Galenus*, lib. 4. de usu partium, cap. 13. exiguum sensum Hepati attributum fuisse, similem plantis, ut discerneret vtile ab inutuli, & lib. 3. de locu affectus, cap. 3. & 4. docet nervulum illum nequidem in parenchyma Hepatis demergi, sed in membranam tantum dispergi, ideoque solo granitatis sensu frui: attamen nervulos duos insignes venam Portam comitari vidi, & subire substantiam ipsam Hepatis, cuius dolores sunt acutissimi, non tantum ex sensu membranæ, sed etiam ipsius parenchymatis fibrosi. Istos nervulos cognoscit *Hippocrates*, lib. 2. Epid. qui à Ventriculo feruntur in Hepar, & eos suâ lingua vocat *simæ*, quod confirmatur à *Pallace*, lib. 2. *Onomatopici*. Notavit *Carolus Stephanus*, pag. 182. Ne sanguis qui elaboratur in Hepate regurgiet, facti sunt à natura quidam veluti exortus & apophyses membranarum, quæ cuiusmodi periculo ob sint, quemadmodum in Corde valvulæ ad spiritus conseruationem. Parisiis nuper observatus fuit ingens & vastus Lien cum exiguo Hepate venis circumfuso, quod Renis magnitudinem non excedebat. Similem historiam de mercatore Antuerpiano memini me legisse in *Observat. Schenckij. Vesicula* cap. 59. lib. 5. meminit Hepatis exigui, æ penè consumpti, Liene amplo superlito, quiungebatur officio Hepatis. Hepar humanum si conferatur eum lecinore aliorum animalium eiusdem magnitudinis, vastius & amplius deprehendetur, & inter homines qui sunt voracissimi, grandius Hepar habent. Narrat *Gemma Frisius* in muliere prodigiosæ ingluviæ, post obitum Hepar tantæ molis deprehensum fuisse, ut vicinas partes & vitales compresserit: id ex longitudine digitorum cognosci *Rhafis* & *Auicennas* prodiderunt: quod non caret ratione, etiamli reclamet *Auerroes*. Notavit etiam *Auicennas*, Hepatis parvitatem semper esse noxiam, non autem magnitudinem, quia nunquam, aut raro Hepar nimis amplificatur.

Quoniam Iecur est omnium libidinum cupiditatumque causa, perhibetur Iecur sedes luis Venereæ: & tamen anno 1632. dissecui in *Schola Medicis Parisi*, publicè Cadaver seorti famosissimi, in quo deprehendi cuncta viscera nutritia sana & integra absque villo vicio, cum tamen haberet cranium in diversis locis carie exesum, & Exostosis in Tibia sinistra. Sedem libidinis esse in Iecore confirmat *Achmetes* in *Onosericis*: præfæ leges nostræ statuerunt, ut adolescens filiz Pontificis nostri raptor, eo supplicio plecteretur, ut Iecur ipsius aves deuorarent: sic apud *Virgilium*, Tytius propter illicitos concubitus, quos appetierat, eadem pœnâ mulcatur.

~~~~~ *Rostraque immanis valuit adauco*

*Immortale Iecur tuodens, sacundaque penis*  
*Viscera, rimaturque epulas, habitasque sub alto*  
*Pectore, nec fibris requies datur vlla renatis.*

## DE VESICULA FELLEA.

### CAPUT XXII.



N Hepatis cauo recondita est Vesicula, substantiæ Hepatis adeo immersa & inculcata, ut inde nequeat eximi absque accurata sectione. Eius figura pyri oblongi, vel potius parui cucumeris imaginem refert: Cuius latitudo est inæqualis in utroque extremo, scilicet fundo & iuxta ceruicem. Fundus verò inferiorior respicit, ceruix ad superiora vergit, inde canalis biliaris obliquè descendit & occurrit alteri ab Hepate proficienti. Est enim duplex canalis bilem deferens, Alter amplior, latio, & longior ab Hepate educus, directè ad Intestinum Duodenum deducitur.

Alter gracilior, angustior & breuior è Cysti prodiens, ad medietatem alterius capalis profertur.

In eo canali impedimenta quædam occurrunt membranosa, quæ specilli introductionem sistunt, & iuxta orificium Velicæ exiguus sinus protuberans obseruatur, ad retentionem bilis, quæ compressione Velicæ non potest effluere, sed cû supernè reuulsâ, id est tracto fundo & compressa media parte Vesiculæ prope crucicem, bilis profluit. Conditâ fuit Vesicula, vt esset bilis fluxu receptaculum, cuius collectio & mora sub Hepate, *num sit ad vitam necessaria*, dubitari potest. Quæstioni occasionem dedit *Fernelius*, dum libro sexto *Pathologiæ* scribit, non paucos è *vanis ereptos fuisse*, in quibus non alia interitus causa comparuit, quam quod folliculus bile omnino esset exhaustus, quasi fellis coacervatio sub Hepate ad vitam necessaria foret. Veteres tamen causam diuturnioris vitæ fellis vacantem esse dixerunt, argumento ex solipedum ceruorumque genere deducto, quæ felle carent, & diu viuunt, auctore *Aristotele*, cap. 2. lib. 4. de part. animal. Philosophi sententiam sequutus *Plinius* prodidit, *fel hominum paucis non est, quorum valetudo firmior, & vita longior*. Idem testatur non omnibus animalibus fel datum, in Eubœæ Chalcide nullum pecori, carent eo quæ absinthium in Ponto vescuntur, quod verissimum putat *Discordes*, cap. de Absinthio. Ergo fellis collectio ad vitæ conseruationem inutilis, vt eleganter & copiosè docet *Aristoteles*, cap. 2. lib. 4. de part. animal. Contrâ *Nemesius* auctor Græcus, libro de natura hominis, fluxum bilem sub Hepate per se, atque per aliud reconditam fuisse scribit. Nam ad coctionem confert, & excrementorum depulsionem mouet, simulque calorem quemdam præbet corpori instar vitalis facultatis. Notauit etiam *Auicenna* bilem Hepati suppositam conferre ad robur concoctricis facultatis, sicuti ignis suppositus lebeti.

Nec absurdum est, etsi *Vesalius* rideat, fellis Vesiculam suppositam & immerfam fuisse lecori, vt bilis contactu & afflatu, lecur à putredine vindiceretur. Bilis collectionem in sua Cysti ad vitam esse necessariam id apertius conuincit, quod in hominibus suspensio strangulatis, qui dum necem ceruicibus suis impendere vident, per duos vel tres dies inediâ sese conficiunt, folliculus tamen nunquam felle vacuus apparuit, imò plenus & turgidulus. Neque in bobus, qui per duos vel tres dies fame macerantur, priusquam iugulentur, Cystum bile exhaustam inuenies. At eo temporis spatio tota bilis vacuari potuerat, quum libertas meatuum adsit, Intestino Ieiuno vacuo: sed adde quod Foetus adhuc Vtero conclusus, Vesiculam bile plenam habet.

Ex hac bile intra Vesiculam coëritâ & concretâ, calculi frequenter generantur, leues quidem, & qui aquæ immersi innatant, neque vt Renales & Vesicales subsident imo: quod si folliculus fellis exaruerit per obstructionem à lapillis innumeris ibi concretis, bilis refluâ & regurgitans in Venas, vel erysipelata, aut herpes in diuersis locis excitare solet, affectus sæpe rediuiuos, vel maligna vlcera producit, quæ vix coalescunt, vel orata sæpius recrudescunt. *Aristoteles* libro secundo de hist. animal. cap. 15. tradidit, pleraque animalia carere folliculo fellis, quod à *Galeno* confirmatum legitur, libro quarto de vsu partium, cap. 12. quia vice istius vesiculæ fellis caualiculum ab Hepate ad Intestinum rectâ deferri scribit. In quibusdam cadaueribus post obitum dissectis nullus fellis folliculus apparuit, sed Intestinum Duodenum ipsi Hepati agglutinatum erat, ad exsugendam & excipiendam bilem.

*Insula Pallas* Vesiculam fellicam in collum & fundum diuidit: Nos addemus *Meatus bilarios*, quorum Alter, qui ab Hepate rectâ fertur ad Ieiuni principium, *Hepaticum* nominabitur, facilioris doctrinæ gratiâ: Alter à Cysti profiliens, & circa medium Hepatici, affixus, *Cysticus* appellabitur. Proprios cuiusque canalis vsus intelligetis, in ista de bilis expurgatione controversia, quæ magna est inter *Anatomicos*.

*Asclepiades* volebat bilem non à sanguine in Hepate secerni, sed in ipsis venarum conceptaculis generari. Contrâ *Galenus*, meatus & ductus manifestos ad expurgationem bilis demonstrauit. Controvertitur adhuc, an directè ab Hepate in Intestinum Ieiunum feratur, vel potius ab Hepate in Vesiculam deriuetur, vbi aliquandiu asseruatur, donec sua qualitate vel quantitate molestiam pariens, in Ieiunum Intestinum eliminetur. *Galenus* hac in re dubius & incertus fuit, modò priorem, modò alteram sequitur sententiam. Nam libro quarto de vsu partium, voluit bilem directè ab Hepate in Vesicam deriuari, inde in Ieiunum expelli. Alibi statuit bilem rectâ propelli à Iecore in Duodenum. *Fallopius* in Obscruat. Anat. contendit bilem ab Hepate

Per quatuor  
viam ferat  
tor bilis ab  
Hepate ad  
Intestinum.



recto tramite ad Intestinum delabi, quod cum oppletum est copiâ chyli transeuntis, oclusis Intestini membranis, bilis exitu prohibita, restit in Vesiculam, quæ facta fuit tanquam diuerticulum ad conferuandam bilem, donec opportunè ac libere vacuari queat.

Huic opinioni *Piccolominus* subscribitur. *Laurentius* rationibus & experimentis probare nititur falsam esse *Fallopj* opinionem, sed bilem ex Hepate per meatum cholidocum à Vesicula trahi, quam postea per alium ductum cholidocum in Ieiunum amandat. Sux opinionis fautores habet *Sylvius*, *Vesalius*, *Columbus*, qui rem eandem signaris verbis attestantur. Accedit authoritas *Hippocratis*, libro quarto de morbis, qui folliculum ab Hepate bilem ipsam attrahere statuit: si alliciat, prius ad Vesiculam deferretur quàm ad Intestinum.

*Iulius Iasolinus*, *Anatomicus Neapolitanus*, nouam nec absurdam de bilis expurgatione opinionem, ex doctrina *Galenii* libro quinto de usu partium, cap. 6 & lib. 2. de natural. facult. cap. 2. de promptam proposuit, quam sequutus est *Banubius* in suis libris *Anatomicis*, etiam depromptâ figurâ, utrobique suppresso Auctoris nomine. Ille bifariam biliosum excrementum ab Hepate expurgari scribit, vel impermixtum, quod est tenue & sincerum; vel permixtum, quod est crassum & fæculentum. Vasa enim exilia ab ista Vesicula prodeuntia, inrer venæ Portæ & Cauæ radices immissa, bilem meracam exugunt, & in Vesiculam deferunt, quâ, eum ipsa Cystis aliquandiu fuerit recreata, illam respuit & effundit per suam ceruicem, in extremitatem alterius canalis cholidoci, qui Ieiuni principio insinuat.

Hic enim canalis ab Hepate directè ad Ieiunum Intestinum delatus, bilem crassam permixtam, qualis est virellina, æruginosa, isarodis ab Hepate rectâ viâ deducit in Intestinum, forsân etiam chyli in radicibus Portæ rubefacti, siue sanguificati biliosam portionem alliciat, vt alia exigua vasa bilem sinceram è trunco Cauæ fecerunt, vel ab ipso parenchymate Hepatis, quoniam ista bilis tenuis excrementum est nutriti Iecoris.

Itaque exilimo bilem crassam rectâ deferri in Intestinum, portionem verò subtiliorem à corpore Vesiculæ exugi: ibi aliquandiu coaceruari, quia necessaria eius mora & collectio, vt demonstratur, donec copiâ vel quantitate grauis, vel molesta naturæ, sponte fluat, vel compressione Hepatis expellatur. Vel dicam bilem sinceram exugi ab ipsa Vesicula parenchymati Iecoris immersâ & inculcarâ.

Trahit autem per exiles fibrulas ipsi adnatas, deinde ab ipsa Cysti in Ieiunum deriuatur. Alter verò meatus cholidocus ab Hepate in Intestinum rectâ productus, à natura fabricatus fuit amplior, ad expurgationem crassæ bilis, putâ virellinæ, æruginosæ, isarodis, quæ sæpius in Hepate etiam sanorum hominum generantur.

Duplex ista bilis suos habet vsus peculiare, nam crassa, qualis virellina sensim effunditur in Intestina, vt faciliter chyli distributionem: Altera verò, tenuis & acris, tota excernitur quibusdam ex intervallis, vt sollicitet Intestina ad sordium excretionem, & eaque bis vel semel intra viginri quatuor horas effunditur ad soluendam aluum, vacuis superioribus Intestinis, si credimus *Iasolino*, ideoque facta fuit Vesicula ad conseruationem huius bilis acris, & mordacis, quam non expediebat sensim stillare & fluere per Intestina, magno detrimento chylosoos.

Quod autem bilis crassior ab Hepate in Intestinum rectâ feratur, quinetiam tenuior ab ipsa Vesicula exugatur, hac arte deprehendi. Intrusa fistula in canalem bilarium Hepaticum intra Hepar, ab insufflato spirito potius Intestinum quàm Vesiculam distendebatur, vicissimque, quum per alterum huius canalis extremum prope Intestinum, idem præstaret, pars opposita & Vesicula intumescabant, compressæque Vesiculæ spiritus portio in Hepar confluebat, gargarisimum excitans: indito quoque tenui stylo obseruabis rectum tramite canalis ab Hepate in Intestinum sine vilo obstaculo. Id etiam deprehendes, extracto Hepate, & portione Intestini Ieiuni simul colligatis per meatus cholidocos.

Valuulas autem quas in medio canalis Hepatici fixit & finxit *Laurentius*, nunquam potui obseruare, sed egressum Vesiculæ arctissimum esse deprehendi, qui vix acus cuspidem admitteret, & ceruicem anteriorem multis rugis interceptam vidi, ne tam facilis & lubricus esset descensus bilis.

Porro, bilem ab Hepate directè traduci in Ieiunum, præter experimenra, rationibus probari potest. Si bilis ab Hepate delapsa vsque ad medium canalis Hepatici perue-

niet, vbi eum altero canali Cystico iungitur, & mutato cursu viam intraret ad Vesiculam: propter impedimenta & obitacula ex membranis oppositis, non faciliè ceruicem permearet.

Deinde per eandem viam bilis ascenderet ad Vesiculam, & ab ipsa Vesicula descenderet in Intestinum, quod commodè fieri non potest, quia ascensus & descensus bilis, vel alternatim, vel simul & semel perficitur. Non potest eodem tempore commensus bilis ascendens & descendens fieri, per angustam & arctissimam Vesiculæ ceruicem. Atque cum canalis biliaris hepaticus sit pronus & decliuus in Intestinum, si tractio & excretio simul & semel fieret à Vesicula, bilis ferme tota vacuaretur apertâ Vesiculâ, & quæ ascendit à descendente propelleretur, & eodem tempore Vesicula diuersas actiones ederet.

Quod si diuerso tempore tractio & excretio bilis peragantur, attraheret bilis in Vesiculam donec plena fuerit, postea tempore opportuno exonerabitur & effunderetur in Intestinum. Quod si verum esset, dum macstantur animalia, Vesicula inanis & exhausta inueniretur: At semper plena & turgida, & in brutis, & in hominibus reperitur.

Præterea, in homine recto, & in canali decliuo, facilius est descensus, quàm ascensus bilis. Accedit quod nulla pars per eandem viam attrahit, & expurgat sua excrementa. Adde quod non omnibus animalibus data est Vesicula, sed ductus cholidocus semper adest. Deerepitius quidam senex, inquit *Fernel. libro 6. Pathologie*, in iam mirè propensus, post decessum, sine felle, ac sine Cysti inuentus est, in cuius sede ingens calculus concreuerat.

*Andreas à Lacuna, in methodo Anatomica*, notat se interfuisse cum *Tegaulto, Medico Parisiensi*, apertioni duorum cadaverum, in quibus Vesicula tota lapillis occupata & repleta erat, nec tamen morbo regio dum viverent, affliciebantur, quod euenisset, si bilis prius ad Vesiculam transiret quàm ad Intestinum, atque hæc recta esset via.

Vidi in Episcopo *Malleacensi*, qui diarrhœa biliosissima per tres septimanas perseuerante sublatu est, intra Vesiculam felleam arefactam tres lapillos durissimos, quum tamen ad vltimum vite spiritum frequenti deiectione biliosissima vexatus fuerit. Nec aliunde fuebatur biliosum excrementum, quàm per canalem biliarium ab Hepate in Intestinum directè protensum.

Vidi etiam in iis, qui cholera morbo intra quatuor dies extincti sunt, bile totius corporis fusque deque vacuata, aridum & exsuccum secur, atque in eius cauo turgentem valde Vesiculam, quâ compressâ non stillabat, nec fuebatur bilis. At vero canalem ab Hepate ad Intestinum rectâ productus, latitudine minimi digiti dilatatus erat: inde cognoui bilem ab Hepate rectâ ferri in Intestinum, & bilis collectionem ad vitam necessariam, vsque ad vltimum vite spiritum conseruari.

Si bilis non directè fluet per canalem hepaticum in Intestinum, in medio ductus hepatici obex membranofus adesset ad interceptum defluuium bilis, vt in Cysticum deriuaretur, at nullus reperitur. Deinde Cysticus canalis, qui trahit bilem & expellit, duobus ministeriis fungens, deberet esse amplior hepatico: At semper duplo minor est, & angustior. Satis superque demonstraui rationibus, & experientia, crassæ bilis expurgationem directam ab Hepate in Intestinum sine transiitione per Cystim.

Querret forsitan aliquis cui bono, siue quo fine ista quaestio de expurgatione bilis, tam animosè deceptatur, & altera quaestio de duplici bile? Vt innotescat quibus in locis Hepatis obstructions fiant, quæ bilis vtriusque vel alterius commoda & incommoda. Nam videmus in quibusdam ictericis flauis absque febre, aut inflammatione Hepatis prægressa, deiectiones flauas: in aliis prorsus albicantes. Vnde hoc, nisi quod in ictericis, quorum deiectiones remanent flauæ, sanis similes, meatus hepaticus in radice sua non est obstructus, sicque continenter ab Hepate vacuatur crassâ bilis in Intestinum: altera bile quæ ad Cystim solum deriuari solet, intra Hepar restitane, & in venas resuente. Inde cognosces radices Portæ & radices Cauæ scorsim obtuari posse, vel simul, & prout affectæ sunt, sic per diuersas vias humores educendos esse secundum regiones Hepatis affectas.

In Canalibus biliaris, pleraque adhuc controuersa occurrunt, quæ sigillatim enodabo. Recentiores *Anastomosi* porum biliarium Hepaticum, qui in Intestino leiuo

distribuitur, duplicem interdum obseruauit. *Sylvius* raro geminum, sæpius simplicem esse scribit, *Fallapius* bis terve bifidum in Intestinum interi vidit. Sæpius deprehendi ab Hepate emergentem bifurcatum, mox tamen illius binis ramulis in vnum coalescentibus, sed nunquam vidi eius extremum bipartitum Intestino insinuari. Forfan tertius porus bilarius, quem in Ventriculū ferri supra Pylorum *Galenus* & alij notant, portio est huius porij hepatici, quando bipartitus est. Verumtamen ductus ille, qui in Ventriculū dirigitur, ab oculatissimis *Anatomicis* raro fuit obseruatus.

Nec pauci credunt naturaliter dari posse. *Galenus libro 6. Adm. Anat. cap. 12.* canalem felleum hepaticū, exiguum de se ramum supra Pylorum Ventriculo offerre scribit. Idem *lib. 2. de Temperamentis, cap. 6.* meatum illum in alijs geminum esse tradit, & in quadrupedum dissectionibus perquirendum, atque portionem esse porij bilarij hepatici. Eundem canalem ad Ventriculū in quibusdam dari probat, *cap. 74. artis parua. Martinus Akakius in comment. ad hunc locum*, notauit hunc canalem in quibusdam animalibus naturaliter dari, cuiusmodi sunt falco, accipiter, & id genus rapaces aues, quæ crudis carnibus vescuntur.

Hæ enim cum maiore calore ad coctionem desiderent, natura meatum qui à Iecore ad Ventriculū bilem deferret, finxit. Attamen obliuiscit negat *Apenterius* in rapacibus animalibus hunc canalem reperiri, quem in lupo & vulpe nancisci non potuit.

An in cane & felle reperiat diligentius inquirendum. Probabile est *Galenum* in brutis canalem, qui bilem in Ventriculū eructat obseruasse, inde coniecturā quadam similem structuram in hominibus quibusdam adesse sibi persuasis, cum videret homines pituitosos meram bilem frequenter euomere, vt demonstrat in *Arte parua*, exemplo cuiusdam, qui cum habitu corporis esset pituitosus, quotidie ismen bilem pallidam euomebat. Hunc *lib. 2. de diat. acut. part. 29.* Paulū Rheorem nominat, & latius rem istam exponit. *Nec sunt sapientia non temere credere*; propterea dubito, si fidē *Carolo Stephano* debeam adhibere, qui testatur in multis corporibus se vidisse duos canales excretorios à folliculo felleis, per quos bilis flaua excerneretur, quorum alter in Ecphysem prope Ieiunum Intestinum mittebatur ad facilem excretionem, alter qui priore minor est, in fundum Ventriculi inferebatur paulò supra Pylorum: atque hoc est, quod notauit *Galenus, libro 1. de alimentor. facult. cap. 1.* quosdam inueniri, qui minori negotio bubulam carnem quam saxatiles pisces conficiant, quod accidit ob peculiarem constitutionem, quā quibusdam hominibus bilis à Iecore ad Intestina defluens in Ventriculū regurgitat. Inde fit, vt quidam ieiuni bilem flauam putam euomant tertio quoque die, aut etiam quotidie.

Vidit quandoque *Nicolaus Massa* tertium meatum cholidocum in stomachum protensum, affirmat quoque *Cabratus* se vidisse potum Cholidocum iuxta Pylorum insertum, qui perpetuo vomitus biliosos in homine dum viueret, excitauit. *Vesalius* semel hunc furculum, siue propaginem porij bilarij hepatici Ventriculo distributam obseruauit. Nullam, inquit, vel minimam bilis Vesiculæ meatus portionem in Ventriculū porrigi animaduerti, præterquam in viro Pontificis triremum remige, ille meatum hunc in duas dissectum propagines obtinuit, quarum minor graciliore Ventriculi fundo inferebatur: Hunc tamen vomitionibus non fuisse obnoxium, ne quidem in maximis procelis nauseā tentatum fuisse, testiui à commilitonibus remigibus.

Hic autem furculus bilarius in Ventriculū transmissus, nunquam à *Columbo* fuit obseruatus, etiamsi maximam diligentiam adhibuerit: Neque dari posse putat, quia coctionem chyli inireturbarer, imò erudum alimentum in Intestina præcipitaret. *Galenus, vel alius author libri de Anat. viuar.* tradit Vesiculam bilariam tres habere canales, quorum vnus dirigitur ad fundum Ventriculi, quò transfertur bilis ad digestionem robotandam; alter ad Ieiuni principium exporrigitur, tertius bilem ab Hepate fugit.

Attamen *Galenus, libro 1. de Vsu part. c. 4.* pertinaciter inficiatur hunc meatum ad Ventriculū naturaliter dari posse, quoniam bilis suā acrimoniā Ventriculi tunicas eroderet, continuū cardialgiā perpetuūque vomitū cieret, atque chylosim perturbaret. Potest quidem bilis exundans & exuperans ab Intestino Ieiuno in Ventriculū regurgitare, si porus bilarius in Duodenum inferatur.

Id aperte significavit Hippocrates lib. 4. de morbis. Trahit, inquit, folliculus in Hepar quidquid isthic biliis inest, & si de repente multa bilis fiat, homo Hepar dolet, & de ventre copiosior sit, hoc enim contingente procedit de veteri bile propter multitudinem ad Ventriculum.

Controuertitur adhuc de loco insertionis meatus cholidoci. An Duodeno affigatur, vel Ielano. Fuchsius in libro suo Annot. ex Galeno, demonstrat porum cholidocum Duodeno inferi. Fallopius ad Duodeni principium produci scribit. Columbus ad Ieiuni summitem, & scilicet Duodeno insinuari non procul à Ieiuni principio. Ego verò semper inueni porum cholidocum in confinio Duodeni & Ieiuni affixum, sed digiti longitudine oblique traduci inter duas tunicas Intestini, quarum interna perforatur ad bilis euacuationem.

Nullæ sunt valvulæ membranosæ in extremitatibus ductus, quamvis duas apponat & præficiat *Vesicular*, quas etiam *Sylvius* admittit, dum geminam membranam pori bilarij oculum claudentem ab ile cuerti scribit. Sed membranæ internæ chyli transeuntis impetu compressio, dum altè applicatur, egressum occludit & obturat, dum inanitum est Intestinum ab altera sœdit dehiscens, ut affluentem bilem sinat elabi. *Galenus* scribit libro 4. de *usu part.* porum cholidocum eo modo penetrare & subire membranas Intestini, quo veteres Vesciam.

At ij obliquè inter geminas Veficæ tunica traducuntur, nec vilas appendices membranofas in extremitate fua habent. Intra cyfticum ramum biliarium iuxta corpus Veficulæ, valvulæ continentur, non in medio ductu, vt opinatur *Laurentius* : funt potius rugofitates, quæ bilis femel elapfæ refluxum impediunt.

## DE LIENE.

## CAPUT XXIII.

**S**PLEN cum Græco *σπλην* cognationem habet, vel *σπλην* dicitur, *σπλην* & *σπλην*, quod facies sanguinis attrahat & absorbeat, vel quasi *σπλην* quia *σπλην*, sordes excipit, vel à dictione *σπλην*, quod est *σπλην*, est enim impurorum humorum Hepatis receptaculum. Dictio Latina *Splenis* à Græco defluxit, propterea *Fernelius* malè dictum putat *Splenem* à *supplendo*. Rectius *Isidorus* *Splenem* à *supplemento* nominatum scribit, quia ex contaria lecoris parte positus est, ne vacua existeret. Ex *Splenis* figura linearem oblongum *Splenium* dicitur, apud *Martianum lib. 10.* *Splenium* mentum reperies. Lien etiam vocatur, quod liberet multis ærumnis & ægitudinibus, dum suo fungitur officio, vel quod ligatus sit cæteris visceribus: quorundam opinio Lien derivatur à dictione *λιν*, quod sit lævis, politus, mollis, Gallis *Ratte* dicitur, à dictione *Ratis*, quia Lien rarus & spongiosus est, ac veluti retiformis internè.

In Lienē considerabis parenchymalaxum & fungosum, innumeris venis & arteriis præditum, idcirco inflammatum palpare deprehenditur, regioni Lienis apposita manu, æterque percipitur intra se volitantis alicuius subsultum. *Ex Hippocrate lib. 4. de morbis.* Caput & Splen maximè sunt morbis obnoxia, ægrotant ab insito humore scepius furit, & ab influente, quia sunt partes venosæ, & maximè cauz.

Præclarè *famulus* Præceptor de Splene philosophatur. Vena in Splenem inferitur iuxta caput, quod in crassitudine ipsius consistit, inde verò internas Splenis partes subit, ipsaque venulas sanguinolentas instar aranearum telæ intertextit, hic vero totas ex Omento eleuatur, venalis ex seipso sanguine plenum ipsum reddens : ex *Hippocrate libro de Offiis Naturæ*.

Quo in loco tria notabilia: Caput Splenis ubi collocandum, substantiam Lienis, qui sex:tas ubi miltat iniquum quatuor, & Omentum sanguinem habere à Liene. Quod si Lien venis & arteriis confusus sit, cur in tota eius substantia formam venæ & arteriæ vix agnoscas, sed fibras potius quam vasa? Propter scriptis Hippocrates libro de principiis, Splenem mollem esse ac fibrosum.

Ac fanè parenchyma Splenis molle est, & dum manibus atteritur, facile colligitur, clixatum tartaro sen facci vini rubri prorsus simile; typicâ & tenuissimâ membra

bram, vt Hepar succinctum, quæ tamen non videtur producta à Peritonæo, quia nulla continuïtas Peritonæi supra Lienem reuoluta obseruatur, vt in Hepate. Ideoque Lienis parenchyma, siue crudum, siue coctum Hepati dissimile prorsus existit, ex *Galeno, libro de atrabile*. Huius enim visceris sapor, licet elixi, acerbum quidpiam habere videtur, neuiquam Iecori simile. Temperamentum Lienis, ex *Hippocrate libro de principiis*, calidum est: In constitutione Lienis, inquit, calidi plurimum, frigidum minimum remansit, quantum sufficiebat ad glutinosum cogendum.

Lienis pars summa & crassissima ex *Ruffo, & à Polluce*, Caput nominatur. *Hippocrates, libro de Ossium natura, & lib. Epidem.* in Liene Caput, & Caudam obseruat. Interdum vidi Splenis Caput crassum & rotundum, Caudam vero gracilem. In singulis ferme hominibus occurrit Lienis diuersa Magnitudo, & Figura, variusque Color. Hoc enim viscus faciliè augetur & intumescit. *Vesalius* tam grandem vidit Lienem, vt Ventrículo operiret, & ad Iecur pertingeret ipsi adnatum.

Scribit *Aetius lib. 10. cap. 7. & 16.* iu Lienosis adco increfcere, & distendi Lienem, vt interdum longitudine sua ad inguen perueniat, & latitudine Iecur contingat: quod etiam ab *Aræto* obseruatum, *lib. 1. Chronic. cap. 14. & in Plauti Curculione act. 2.* Capadox Ieno conqueritur de magnitudine Lienis.

Nunc tam quasi Zonâ, Liene cinctus ambulo,

Geminus in ventre habere videor filius,

Nel metuo, nisi ne medius disrumpat viscer.

De Lienis magnitudine celebratur *Hippocratis* sententia, *libro de locis in homine*, confirmata à *Platone in Timæo, & à Galeno, lib. 2. de nat. facult. c. 9.* Quibus corpus floret, his Lien minuitur, quibus verò id viscus magnum & tumens augetur, his corpus gracilescit, & cacochymum redditur.

Vnde illa insignis comparatio Lienis cum fisco regio, olim à *Traiano* proposita, vt refert *Dien*, vt crescente fisco regio singulorum priuatæ opes minuuntur, sic amplificato Liene priuatæ opes singularum partium corporis decrefcunt. Ex magnitudine Lienis *Scelatyrbæ*, siue *Stomacæ*, vulgò *Serbutus* nascitur, descriptus ab *Hippocrate lib. 2. Prorrhæ.* Quibus Lienens magni sunt, iis gingiuar vitiantur, & os graue olet, quibus autem Lienens magni sunt, neque sanguinis eruptiones contingunt, neque os graue olet, ij in tibiis mala vlcera habent, & nigras cicatrices.

De quo morbo *Reusnerus* libro peculiari, & nuper eruditissimus *Daniel Semmerus* cum aliis auctoribus quos suo *Censure* comprehendit, copiosè tractarunt.

Paruitas Lienis tam in vitio est, quàm ipsius magnitudo: Nam, vt docet *Avicenna*, Magnitudo Splenis perducit ad debilitatem Hepatis, & hydropem duas ob causas: Vna est, multitudo eius quod extrahit ab Hepate, & remouet virtutem eius: Altera est cum debilitate virtutis Hepatis secundum semitam, quæ à contrariis est, & quod prohibet ipsum generare bonum sanguinem, & c. Semper tamen minor Lien præferendus est maiori, nisi admodum sit exiguus. Ex *Aristotele lib. 3. de historia animal. cap. 16.*

Tumor autem Lienis medicamentorum vsu tutius imminuitur, quàm partis verberatione, nam ex contusione metuerem suppuratum, quamuis apud *Italos* hoc modo atteri & consumi Lienem fama sit. Ideoque supersticiosa est, & incredibilis, Lienis duriæ veluti scirrhusi emollitio & resolutio, per externam verberationem & percussionem, quam *Cardanus lib. 8. de varietate, cap. 44. & in arte curandi parua* commendauit. Hanc operationem vt valde periculosam, *Fabricius ab Aquapendente* damnavit in *Operat. Chirurgæ.* In brutis eandem ac parem magnitudinem Lienem semper seruare nonnulli scripsere, simiæ tamen perexiguus est, ac fere nullus. Oues quoque paruum & exilium habent Lienem, sed homini largior, crassior, & ponderosior datus est. Quadrupedibus quidem maioribus, vt bobus longior est, solex aut vestigio pedis haud absimilis, vel etiam linguæ bubulæ assimilatur, vnde *linguæ sum viscus* dicitur. Et quamuis complicetur bonis Lien, crassitiem & pondus humani nunquam æquabit. Humanus Lien angustus & longus est, suilli Lienis facie, inquit *Aristoteles, lib. 1. de hist. animal.*

Quod attinet ad colorem, subliuidus apparet, calidis animalibus niger est, vt canis, frigidis & humidioribus vt sui magis albicat. Lien Iecore semper nigrior apparet, præsertim in calidæ sicæ temperaturæ animalibus, qualia sunt ea omnia, quæ dentes perisurati infertunt iunguntque. Sicuti contrà, omnia temperaturam frigidiorera

naſta, vt ſucs, Lienẽ ſunt non admodum nigro. Nigrior autem bobus Lien, etſi ſecundum naturam ſeſe habeant, ſed vbi conſenuerunt, multo nigrius euadit, ex *Galenico, libro de atra bile*. Quot ſunt homines ite ſunt differentes Lienis figuræ, modò longæ, modò quadratæ, modò rotundæ. Vidi ſæpius Splenem cauum antrorſum ſemis aut ſeptenis digitationibus fiſſum, ſuæque cavitæ arcuè Ventrículum per ſuas digitationes amplexantem. Vidi etiam bipartitum viſque ad faſtigium. *Ariſtoteles, libro 3. de partib. animal. cap. 13.* docet in cornigenis rotundum eſſe Lienem, in multiſidis longum, in ſolipedibus medio inter hos modo ſe habere. *Hippocrates libro de Anatomicis*, veſtigio pedis humani Lienem ſimilem eſſe ſcripſit. Diaphragmati per tenuia ligamenta alligatus eſt, quibus relaxatis propendit, ſiquæ *ſunt*: hoc quum accidit pedes & genua calent, naſus & aures frigent, authore *Hippocrate*: facile ſua ſede dimouetur Lien & procidit, quia non ſuccingitur membrana comuni à Peritonæo, vt Hepar, nec dependet à Diaphragmate. At in bene habito & ſtorente corpore, infra vltimam coſtam non deſcendit. Ruptis ligamentis viſus fuit in muliere Pariſienſi ad hypogaſtrium prolapſus ſupra Vterum, qui per biennium molæ ſpecie Medicos ſeſellit, tandem ſato functâ ægrâ, tumoris illius cauſa pateſcãta fuit aperto cadauere. In nobili viro eo modo prolapſum Lienem ad hypogaſtrium noſauit *Cabralius*. Anno Domini 1645. vidi in *Domina Comitſſa de Boizeen*, Illuſtriſſima muliere, Lienem prolapſum in hypogaſtrium per duos annos: Primo anno reuoluebatur & reducebatur in ſuum locum, & poterat ligaturis in ſua ſede contineri, ſed tandem neglectâ iſtâ reſpoſitione, tam firmiter adhæſit Vtero partibusque vicinis, cum tanto incremento, vt æquaret pondus decem librarum: tandem illi mortem attulit: aperoit cadauer *Simæon Pompernel* Chirurgus peritiſſimus. Vidi in Abbate nobiliſſimo familiæ *d'Antraignes*, mirabilem Splenis formam, hic quum tremulos ac continuò palpitantes habuiſſet pedes per duos meſes, tandem ſuperueniente ſtupore totius corporis interiit. Aperto cadauere, obſeruauit Lienem exactè quadratum, trium palmarum latitudine, & æquali longitudine, craſſitiæ quatuor digitos æquantem, & vndiquaque cartilagineâ ſubſtantiâ incruſtatum.

In *hypochondrio ſiniſtro* Lien conſiſtit, nonnunquam tamen cum Iecore locum permutat, ſed prodigioſè, inquit *Plinius poſt Ariſtoelem lib. 3. de hiſt. animal. cap. 13.* & *lib. 4. de generat. animal. cap. 4.* Ac ne quis putet in brutis tantum id eſſe animaduertitum, *Herapophilus* etiam id obſeruauerat, ſi credimus *Galenico, lib. 6. Adminiſt. Anatomicæ. cap. 8.* Quod à *Cornelio Gemma* in homine, & à *Talentionio* obſeruatum.

Quod ſpectat ad numerum Lienis, *Cabrolus Obſeruat. 15.* duos Splenes ſuis vaſis ſe-orſim præditiſ vidit: Tres quoque Lienes *Fallopius obſeruauiſ. Et Ariſtoteles* numerum duplicem annorauit *libro 4. de generat. animal. cap. 4.* Cæterum Lienis Arteria notatione digna eſt, tam ratione originis, quàm figuræ & vſus: Nam enaſcitur ab Aortæ deſcendentis trunco iuxta Cœliacam arteriam obliquò & flexuoſo ductu, verſus Hepar iuxta dorſum repens, multis ſinubus tanquam nodis turgidulis intercepta, mole ſua venam Splenicam æquare videtur, ſed propter viarum ambages longior exiſtit: Hanc arteriam *Lienalem* vocat *Arantius*, & primus eleganter deſcripſit.

Apud *Spigelium* in figuris *Iulij Caſſerij* depingitur muta Anaſtomofis Lienalis arteriæ anfractuofæ cum vena Splenica, priuſquam ingreditur parenchyma Lienis. Meritò quaeritur, quare natura Lieni peculiarem arteriam adeo inſignem à trunco Aortæ prodeuntem ſuppeditarit, cum Iecori viſceri ampliori atque calidiori ad ſanguificationis opus talem denegarit, etenim quæ Iecori datur, exigua eſt, & à Cœliaca deriuatur? An id à natura factum, vt Lienis calorem, qui copia humoris aquoſi, quem è Ventrículo exſugit, obrueretur, foueat? An potiùs, vt per euſmodi canalem ſeroſus humor in Lienẽ exuberans, in Aortam deſeratur, inde ad Renes per Emulgentes arterias? Exiſtimat *Arantius* hanc arteriâ peculiari Lienem donatum fuiſſe, non ſolùm vt vitalis ſpiritus copiam Lieni ſuggerat: Verumetiam vt craſſiorem, & à calore exuſtam ſpirituofam, & in Aorta contenti materiam, in Lienem craſſis humoribus deſtinatum, quaſi euomat, ac expurget, amplaue obid & ſinuofa effecta, ne cum craſſiorem & ſæculentum ſanguinem, & ſpiritum deferat, facilè obſtruetur.

Vaſa per Lienis parenchyma diſperſa non ſunt adeo manifeſta, vt in Hepate, & cum ad Lienem peruenire, in duos ramos ſcinduntur, qui in duas Lienis extremitati-

tates inferuntur, priusquam Lieni immergantur, rursus quilibet in duos ramos fin-  
ditur.

*Hippocrates libro 4. de morbis*, eleganter docet Lienem sese exonerare per quatuor  
vias, putà per *Os, Nares, Vrina meatus & Podicem*. Atque per os vomitu recitatur san-  
guis emanans à Liene, per *Vas breue* in Ventriculum effusus, vti docui *supra, cap. 17.*  
Per nares expurgari Lienem hæmorrhagia, *Bionis* exemplo demonsttraui *ibidem*. Per  
Podicem, Hæmorrhoidibus fluentibus Lienem expurgari demonsttrabo, quod pri-  
mus ductilis inlocis indicauit *Hippocrates*, confirmauit *Galenus*, sed per quam viam  
deriuetur humor dubitatur. An per ramum Splenicum ad Portam refuatur, & ab ea  
in Cauam transferatur, si quæ inter hæc vasa, *Anatomosis* intercedit, vt per Emul-  
gentem euacuetur? An potius breuiore via, à Cœliaca io Aortam decurrat, inde per  
Emulgentem arteriam in Renes abeat, quam viam primus notauit *Syluius in sua Ista-  
goge, lib. 3. cap. 7.* vbi faciem sanguinis in Renes per arterias ab Aorta supra Renes na-  
tas, potius quàm per Portam & Hepar & Cauam expurgari scribit. Quod est contra  
*Galenum*, qui *lib. 3. methods, cap. 16.* negat per Renes humorem melancholicum ex-  
cerni, defectu conuenientis itineris. Vt hunc locum emendet, vel excuset, valde la-  
borat *Marcellus Donatus, hist. mir. Med. lib. 4. cap. 9.* *Syluius* breuiorem viam à Liene  
ad Renes in quodam vidit. Nam à vena Emulgente rami tres insignes ad Lienem fe-  
rebantur.

Vasa, vena & arteria Splenica, quæ ad Lienem producantur, obscurè disseminan-  
tur per Lienis substantiam, sed in ipsius cauo terminantur, nec vltra peruadunt: pro-  
pterea plexum illum arteriarum, quem *Anatomici* quidam in Liene imaginantur, vix  
licetprehendere, neque tubolos venarum & arteriarum in Lienis carne, vt in He-  
pate reperies. Certum est *Ætærius* in Lienis substantiam dispersi, propterea miror ab  
*Aretæo* scriptum fuisse, Lienem Viscus esse rarum, & sensu carens, etiam per sanitat-  
tem, *libro 1. Chronic. cap. 14.*

De Liene ista litteris consignauit *Serenus Sammonianus*.

*Splen tumidus nocet, & risum addit ineptum,  
Vt mihi sardois videatur proximus herbis,  
Irrita quæ miseris permiscuit gaudia satis.  
Dicitur exsiliis faciles auferre cachinnos,  
Perpetuoque auro frontem præstare feneram.*

Potestne tutò Lien eximi, vt eo exempto felicior vita succedat? Veteres in Liene  
peculiare cursus impedimentum notarunt. Quamobrem Cursoribus inuritur, quin  
& per vulnus etiam exempto Liene viuete animalia tradunt, ait *Pün. lib. 11. cap. 37.*  
Turcis quoque Cursoribus Lienem inuri narrat *Ruffetus*, idque verum esse audiuit à  
quibusdam, sed modum nunquam rescire potuit *Nicolas in suis peregrinationibus O-  
rientalibus*: quinetiam vidit in quibusdam ad hypochondrium sinistram lauciatis,  
Splenem corruptum feliciter extirpatum. *Trallianus libro 2.* narrat à securatum mi-  
litem, cui tota Lienis regio barbaricis ferramentis candentibus vstulata erat. *Flud*  
Lienem canis à perito Chirurgo exemptum vidit per incisionem, superstitere adhuc  
cane, & *Leonardus Fiorauantius* testatur nobilissimam feminam Liene grauitè, imò  
lethaliter affectam, & ab omnibus Medicis derelictam, Liene extracto ope Chirur-  
gì conualuisse. *Credat Indans Apella, non ego.*

Prudenter *Calius Aurelianus lib. 3. cap. 4. tardarum passionum*, admonuit Lienem  
excindendum vel aufertendum, voce quidem dictum fuisse, non officio comple-  
tum. Cum vltio, ex eodem, sit periculosa, nec fieri possit sine vulnere Peritonzi, quod  
ignis vi vexatum, propter neruofam substantiam, mortem adfert. *Apertus, lib. 1. Ve-  
terinaria, cap. 40.* Nonnulli in equis Lienem vrendum præcipiunt, quod nobis non  
placeat: quippe eùm visceris huius sedes fenestrata videatur, candens ferramentum  
sub carne repens, fallit, ac vrente vi grassabitur.

Non me latet *Fallopium, libro de vuneribus, cap. 11.* Lienis vulnerati periculum ad  
magna vasa tupta restrinxisse, quamuis *Tagautus & Hieronymus Fabricius*, omnia Lie-  
nis vulnera lethalia esse scripserint. Veteres quidem in antiquis Lienis affectibus  
hypochondrium sinistram vrebant, sed non ad Lienem vsque ferrum adigebant: eu-  
iscemodi vstionem passim commendat *Hippocrates, à Paulo Ægineta & Albucafi* de-  
scribitur.

Faciliùs crederem cum *Aretæo*, Lienem naturâ suâ dissolubilem, medicamentis  
minui



minui & consumi, quod asplenio, aquâ fabrorum, & tamarisco fieri memorant. Sed qui Liene priuantur, postea deterius & infelicius viuunt, quia sanguine crasso & impuro corpus alitur; tantum abest, vt sint agiliores, & ad omnes corporis actiones alacriores.

Lienis actio dubiam coniectationem habet, non tantum inter veteres Medicos agitatam, sed etiam à Recentioribus renouatam. Nonnulli Lienem prorsus inutilem esse iudicant, & ex antiquis primus *Aristoteles*, lib. 3. de partibus animal. Lienem per accidens necessarium esse statuit, quo modo alui & Vesicæ excrementa: ex quo fit, vt animalibus quibusdam deficiat, magnitudine, vt volucris nonnullis, quæ Ventriculo sunt feruido, cuiusmodi sunt columbus, accipiter, miluus, quorum excrementa in pennas abeunt. Idcirco animalia, ex eodem *Aristotele*, quæ nullis aut exiguis Pulmonibus prædita sunt, nullo vel exiguo poru indigent, eam ob rem nullum aut exiguum Lienem possident. Animalia verò quæ Pulmones habent amplos, sanguine calidior prædita sunt, ideoque largè potare coguntur, ad temperandum feruorem sanguinis, quo plurimo Pulmones aluntur. At superfluum & redundans serum ex ipso Ventriculo secerit, & exfugit Lien in istis animalibus magnus.

*Erasistratus Medicus* ex *Aristotelis* filia oriundus, auctore *Plinio*, qui florebat xvo *Theophrasti*, cuius fuerat discipulus, auctore *Laertio*, & qui Anatomen collapsam, ac pene sepultam erexit, ac instaurauit, testimonio *Galenus*, aui sui *Aristotelis* opinionem lequutus. Lienem per accidens tantum necessarium esse sustinuit, quamuis *Galenus* ex profisso *Erasistratum* infestat, libro de atra bile, frustra conditum Lienem ab eo propositum fuisse prodiderit. Quod à *Russo Ephesio* pronunciatum obseruo, qui *Ignantum membrum* vocat, nullo fungens ministerio: id autè propositum fuerat à *Democrito*, in Epistola de Natura humana.

*Erasistrati* sententiam Præceptoris emollientes, ac veluti excusantes, Lienem animalibus à natura tributum fatentur, vt eliquatum è cibis succum præparet lecori, ad frugi sanguinis generationem: deinde Omentum veluti Mesenterium quoddam fecerunt, chylum autem ex ipso Ventriculo Lienem exfugere. Quibus ita respondet *Galenus*, cap. 7. libro de atra bile, eos ignorare venas ex omnibus Intestinis, non è solo Ventriculo suum alibilem referre, atque Lienem alendo prorsus ineptum esse, cum Hepar sit edule & vescum. Nam in temperaturis calidis, sicis quæ animalibus Lien niger obseruatur, vt nullo modo comedi queat, insuibus verò, etsi non pariter ac lecor ad esum suauis sit, non tamen cibo ineptus est: In Leonibus autem & Leænis, & Pantheris, & Leopardis, & Vrsis, & Lupis, qui eorum carnibus non insuauius vescuntur, abstinent à Liene tanquam non esculento: Quare si iis quæ comeduntur & bibuntur primus fruiat, eum maximè vel lecore ipso ad vsum edendi apriorem & suauiorè esse oportere.

Propterea non est verisimile Lienem lecori succum præparare ad sanguinis purioris elaborationem. Verùm *Erasistratus* quem Lieni vsum adstruit, emulgendipotum superfluum ex ipso Ventriculo, ab *Hippocrate* mutuatum erat, cuius scripta adeo venerabatur, inquit *Galenus*, vt ea per vrbes Græciæ publicè decantaret. Summus ille Dictator *Hipp.* actionem Lienis tribuit, humiditates superfluas, quæ coctionem alimentis in Ventriculo interturbarent, ebibere, & in se recondere. Nec ab ea opinione recedit *Aristoteles*, quam pluribus rationibus confirmat *Rensuerus* libro de Scorbuto. *Galenus* primus voluit sæcem sanguinis, nempe crassum & sæculentum humorem, qui dicitur *melancholicus*, à Liene prolectari & absorberi.

Inter Recentiores *Vesalius*, censet Lienem instar alterius Hepatis opitulari ad sanguinis confectionem, sed quomodo id fiat, non exponit. *Varolius* clarius id officium declarauit, videlicet crassiorem & fordidiorem chyli portionem ad truncum venæ Portæ delatâ, per ramum Splenicû à Liene trahi & exugi, quam insita proprietate in sanguinè alterius speciei conuertit, multis partibus nutritis idoneis & accommodatis.

Hanc opinionem sequutus videtur *Bauhinus*, multisque rationibus probauit, *Plinius* verò edito eleganti libello de Liene, huius visceris aliam actionem profert, quam tueur & mordicus retinet. *Rossius* lib. de vñ Anatomiam vaserum Cordis, à *Rondeletio*, vtriusque communi præceptore olim in *Monspelienfi* Academia publicatam fuisse testatur. Inter tam varias & discrepantes doctissimorum Medicorum sententias de Lienis officio, non ausum *Palemonis* vires agere.

*Non nostrum inter vñ tantas componere lites;*

*Et vitula in dignus, & hic.*

Cuiusque opinio probabilibus nititur argumentis, quæ sigillatim conuellere, & laboriosum opus est, ac inuidiosum, atque receptam in scholis *Galeni* opinionem improbare nefas esse videtur. Sed cum ipse *Galenus* ab *Hippocrate* & *Aristotele* dissentire non vereatur, cur nobis non licebit meliorem sequi & amplecti opinionem? quum magnitudo nostræ professionis vnicuique liberum permittat arbitrium.

Quare ut exordiar, inepta est prius *Erasistrati* opinio, dum nullam aut exiguam esse Lienis necessitatem putauit; forsan his adductus rationibus, quod exempto Liene viuant animalia, siue ferro excindatur, aut medicamentis consumatur: quod etiam plures sine Liene inuenti fuerint, qualem mulierem vidit *Hollerius*. Non est verisimile ablato aut consumpto Liene, hominem æquè bene viuere, nec Lienis extirpatio per vulnus tentari potest sine certo vitæ discrimine, nec facilius illius consumptio per medicamenta, etiam hoc fieri posse à Veteribus proditum fuerit.

Præterea, *Natura nihil facit frustra*, ut passim docet *Aristoteles*, nihilque in fabrica corporis humani fortuito occurrit. Naturæque potentia ad plenum approbat, nihil ab ea sine aliqua occultiore causa gigni, ait *Plinius*, lib. 11. cap. 3. Quum autem *Galenus* variis in locis *Erasistrati* errorem demonstrauerit, præsertim lib. de atra bile, & validis rationibus confutauerit, verbum non ampliùs addam. Probabilis est *Erasistratorum* opinio, quæ cum *Hippocrate*, *Aristotele*, & recentioribus Medicis consentire videtur, ut postea demonstrabitur. *Galeni* opinio nititur autoritate *Platonis* in *Timæo*; proximus Hepati ad sinistram locatus est Lien, ut Hepar semper clarum reddat, & instar speculi nitens atque perspicuum efficiat, vel instar spongiæ sordes Hepatis ebibat. Vtrumque significat *συναντήρ*, nempe speculum & mantile. Idcirco, quando sordibus lecor abundat, Lienis raritas eas combibit, cum membrum hoc concuum sit & exangue: unde purgamentis impletum excrescit, tumetque sanie, ac tursus cum mundatum corpus est, restrictum in seipsum confidet.

*Galeni* sententiam *Franciscus Plinius* multis rationibus destruxit, quibus *Laurentium* non satisfecit. Alias quoque superpondij vice adiciam. Lien non potest humorem melancholicum crassum, viscidum, glutinosum, ab Hepate trahere, quia nimis diffusus, quia mollis & spongiosus; vis autem attractrix in dura & sicca substantia robustior: eoque sine attraheret melancholicum humorem, si sanguinis excrementum, ad nutritionem: at nulla pars nutritur excrementis. Non potest Lien excipere crassum & lutulentum humorem melancholicum, quia deest cauitas, ut in folliculo fellis, nec sanguis in Liene reperitur ab eo dissimilis, qui in Hepate continetur.

Quod si recipiatur in Liene, humor melancholicus cum sit paucissimus, biliosus verò copiosior, ex *Galeno*, libro 3. de *Vsu partium*: quæro cur Natura receptaculum humoris melancholici amplius & capacius effinierit, quam bilis flauæ folliculum? Non potest humor melancholicus ab Hepate ad Lienem commodè deferri, quia nulli sunt ductus ei peculiare, qui ex Hepate humorem exugant, ut extant ad eliciendam bilem flauam. Nam ramus Splenicus vena est non radicata in Hepate, sed quatuor digitis ab eo distans: Deinde, cum sanguis intra Hepar perficiatur, quomodo eius excrementum crassum per radículas capillares Portæ remigrare potest?

Quod si in truncum Portæ refluat, per eius caudicem triplex humor naturâ distinctus excurreret, chylus ascendens, sanguis ad Intestina refluus, & humor melancholicus ad ramum Splenicum abiens: quod fieri non potest sine humorum confusione.

Porro, cum fateantur omnes Lienem melancholico humore non nutriri, quò transfertur & ablegatur? Respondent in Ventriculum & Intestina amandari per ramum Splenicum. At non videmus illas humoris atrii vacuationes in sanis corporibus etiam melancholicis, neque Natura solet excrementa sua à parte ignobili ad nobilem expurgare. Vultus illa quàm *Græci*, ad excitandam appetentiam, & *Arabes*, ad roborandum Ventriculum ingerantur, multis non placet.

Quapropter Lien non potest esse humoris melancholici sedes & vasculum, quia sanguini permixtus in nutritionem partium solidarum impenditur: potissimum Autem generari scripsit *Hipp.* lib. 6. *Epid. sect. 2. c. lib. 1. de nat. humana*. Dum autem à sua natura degenerat, ut in quibusdā carcinomate vicerato sublati vidimus, sanguis adustus efficitur, & in capillamenta conuersus intra venas spectatur, cum insigni labe lecoris, sed exiguo, aut nullo Lienis vitio. Quod certissimum est indicium, Lienem hu-

moris melancholici, siue naturalis, siue contra naturam affecti, non esse conceptaculum.

Primus *Galenus* auctor est ac fabricator huius opinionis, cum apud *Hippocratem* nullibi reperitur, Lienem esse spongiam, & emunctorium humoris melancholici crassi & feculentis, quem ipse *Hippocrates* massæ sanguineæ permittum esse voluit. Sanguis autem per varios gradus adustionis, atræ bilis naturam concipit & induit, dum quod est in bile & sanguine tenuissimum exsiccat, crasso restibili, quod per adustionem in atram bilem degenerat, ex *Hippocrate libro de aëre*.

Qui verò in Lienem continetur humor, ex eodem auctore, tenuis & serosus perhibetur, *in viis & excrementis, lib. 6. Epidem. sect. 2. part. 41. 42.* scribit etiam *Aristoteles, sect. 9. Probl. 5.* Splenicum sanguinem esse aquosum.

Quod si excrementum illud atrum facis vini simile quotidie secerneretur à sanguine, & Lienis ergastulo coaceruaretur, ut bilis secreta & suo folliculo excepta, continenter fluit per vrinas & deiectiones, sic humor ille niger melancholicus, suæ naturæ quædam vestigia proderet in deiectionibus, vrinis, vomitionibus spontaneis, vel coactis, atque in disiectis eaductibus in parietibus Ventriculi, vel in parte aliqua Intestinatorum denigratio quædam obseruaretur, ut in bilioso humore cernitur, si humor iste ater, vel in Ventriculum, vel in Intestinum deflueret. At cum in febribus ardentibus, vel aliis morbis malignis bilis atræ effunditur, vel sanguinis adustio summa significatur, vel alicuius visceris corruptela, cuius liquamen nigrum pici simillimum reicitur.

*Vltimus diligens & feruidus est in refellenda Galeni-opinione, sed frigidus in sua confirmanda.* Nam ut probet Lienem sanguinis arterialis officinam, docet arteriosum sanguinem spiritu & humore constare, spiritus materiam, aerem in Pulmonibus præparari, priusquam ad læuum Cordis Ventriculum accedat; ideoque humorem patii elaboratione indigere, quæ fit in Liene venis & arteriis innumeris frondosè implicito. Si quidem Notata nunquam istos plexus efformare solet, sine alicuius præparationis maxima necessitate.

Præparatus autem sanguis in Liene, per ramum Splenicum arteriosum in Coeliacam, ab ea in Aortam transfertur, inde ad sinistram Cordis sinum deuehitur, ubi aëri permixtus nouum corpus conflat, arteriosque sanguinis naturam acquirit, nec ingressum tres valuulæ sigmoides vestibulo Aortæ affixæ impediunt, sed assatim irruenti sanguini tantum obstant metu suffocationis. Deinde symptomata quæ Lienosis accidunt, Cor ipsum appetere & lacessere videntur, ac præsertim palpitatio Lienosis admodum familiaris, quod nec *Plantus* ignorauit,

*Cor lieosum opinor habeo, iam dudum palit,  
De labore pectus tundit.*

Verùm si sanguis arterialis in Liene præcoctus ac præparatus, per illas vias modò designatas ad Cor assurgat, & per easdem sanguis arteriosus perficere coctus ad tugacem partium vtilitatem conseruandam defluat, coctus & perfectus sanguis arteriosus cum incocto & imperfecto permiscebitur & confundetur. Deinde cuprem istos plexus venatum & arteriarum in Liene mihi demonstrari, cum nullos adhuc deprehendere potuerim, quamuis *Vesalius* venas multas & arterias in Liene inferi statuatur, nullæ tamen perinde ac in Iecoris & Pulmonis corpore per substantiam ipsius dispersæ animadueruntur, nisi perquam admodum raræ, & quæ graciles. Adde quod animalia sanguinea quæ Pulmones nullos aut exiguos habent, carent Liene, aut exiguo prædita sunt, ex *Aristotele*, atqui sanguinem habent arteriosum: Vbi præparatur in illis sanguis arteriosus? quo solo argumento tanquam *Achille* destruitur *Vltimus*, & *Caroli Pajonus opinio, de Lienis vtu, libro de morbis à sero*.

Nunc autem legitimè Lienis officinam exponamus, quod est *hematosis opitulari*. Id autem diuerso modo exponitur. Nam *Hippocrates* existimauit Lienem superfluum à Ventriculo humiditates absorbere, ut chylus facilis coquatur & crassescat, ex quo laudabilior sanguis procreatur in Hepate, tum verò ut feruidus & halituosus Cordis sanguis in arterias diffusus, sero temperetur, quod arteria lienalis refundit in Aortâ. Ideoque sanguis arteriosus sero multo abundat, non tantum ex se productus, sed etiam à Liene refo. *Hippocratis* sententia probabilis mihi videtur, multisque rationibus stabiliri potest. Ipse *lib. 4. de morbis*, Lienem, *fontem aquæ* vocat, cuius affluxu augetur & intumescit: Quod repetit & confirmat *lib. de genitura*, ne quis hunc librum

quantum de morbis tanquam spurium repudiet. *Eodem lib. & lib. de diata acut.* humorē melancholicum *ihos*, aquam vocat, & *ihosia* appellat, *lib. 4. de morbis.* Addit *ibidem*, ubi homo bibit amplius quam par est, Splen aquam à Ventriculo exfugit, quam excernit in Vesicam, & si subsistat, dolores excitantur, & Splenitici fiunt. *Sub finem eiusdem libri* clarius suam mentem exponit.

Procedit porus in Ventriculum, & ubi expletus est, Splen de ipso suscipit, & distribuit ad venas & Omentum, &c. Dum autem ægrotat, ait *ibidem Hippocrates*, vel humores sponte feruntur ad ipsum, vel trahit per venas, quas habet cum Hepate communes. Etenim notavit in *Epid.* transumptiones humorum fieri in hypochondriis, ubi *Galenus comment. ad part. 28. sect. 2. lib. 6. Epid.* notat transumere & recipere Lienem ex Hepate, & vicissim Hepat ex Liene. Splenici morbi quatuor descripti ab *Hippocrate* ortum ducunt ab aliis humoribus assumptis à Liene, quibus turgescit, & præsertim ab olerum crudorum esu, & ab aquæ potu: Splen autem non valde magnus efficitur, sed durus, & ad viscera allabitur, & adhærens fugit.

Confirmat hanc doctrinam de morbis aquosis Lienis ipsemet *Hippocrates in Coacis*: in longis febribus erraticis tenuium vinarum mictus, affectum Splenem indicat.

Præterea fluxiones omnis generis, quarum causa materialis est serum, invadunt, infestantque potissimum sinistras partes, secundum rectitudinem visceris. Propterea constat experientiâ in omnibus nephriticis, frequentiùs dolere Renem sinistram, quia Lien sero multo turgescens, sese exonerat in Renem vicinum sibi sita respondentem. Vnde ex urinae profluvio lapilli in Rene dolorificè dimouentur. Lienem autem multo sero scatere hinc liquet, quòd melancholici sint magni pusilliores, & copiosè mungant. Medicamenta quæ Lieni conducunt, debent esse hydragoga, ex *Hippocrate, lib. de locis in homine*, atque per Renes Lien exoneratur, inde fit, ut omnes ferme morbi contumaces Lienis, perirrhæa solvantur, quæ vacuatio sue sponte facta, siue arte suscepta, spleniticis salutaris existit apud *Hippocratem*. Inde causa patet *Aphorismi ultimi lib. 4.* Mictus noctia plurima si fiat, paucam deiectionem significat.

Melanagoga, ut Elleborus, serosos humores trahunt; & ratione feri in Liene stagnantes, non tam facile inflammari potest, ut Hepar, ex *Hippocrate*. Sceleritybe, siue Scorbutus, aut magni Lienis *Hippocratis*, ex aquis palustribus corruptis generantur, *libro de Aeribus & Aquis*.

Nulla pars ab immodico aquæ potu magis læditur & intumesce, quàm Lien, qui dum imbecillitate laborat, sanguine aquoso & tenui vniuersum corpus scatet, quia serum à Liene non abso. betur, ideoque lienosis nihil magis prodest, quàm potus, & præsertim aquæ parsimonia.

Vitio quoque Lienis hydrops nascitur. *Ctesiphon* spleniticus factus est hydropicus, apud *Hippocratem in Epid.* Sed quomodo producatur hydrops à Liene ipse docet *lib. 2. de morbis mulierum*. Si mulier aqua intecate laboravit, Splene ipsius magnus & aquosus exsistente, si Splen aquosus, ab hac affectione, quam febris habuerit, & non dimiserit hominem, & sitis ipsum corripuerit furis, & biberit, ac non renouerit. Nam quod in Vesicam penetrat, per urinam exciuitur, reliquum verò Splen capit, abstractens à Ventre ad seipsum, ut quitatus est & spongiformis, & secundum Ventrem situs. Et si his sic habentibus non exardat, neque alium laxetur, ab hoc Splen attollitur, & hoc magis, si aqua fuerit potus.

Vnde verò procedat aqua, & per quam viam in Liene cumuletur, & quâ viâ vacuari possit, declarat *lib. 4. de morbis*. Nunc verò dicam de aqua, quomodo, & cur copiosus fiat in corpore, & quomodo Splen trahit in seipsum. Adfero autem vbi homo bibit amplius, & corpus, & Splenem aquam ad seipsum trahere ex Ventriculo: & si plus traxerint, quàm oportet, statim hominem adflegi: Atque hoc ita fieri intelligunt, quicumque homines splenitici existunt. Postquam autem traxit Lien, optimum est, si vetus aqua, qua in Splene intrat, ad Vesicam aut Ventrem excoletur, & per hoc expellatur: nam per supernas regiones non purgatur aqua de Splene, nisi quantum eius in vasis tunc, qua de Liene procedunt. Verum ad Ventrem & Vesicam depurgatio fieri potest, &c.

Doctrinam *Hippocratis Aristoteles* expressit atque retinuit, *lib. 3. de partibus animalium, cap. 7.* Iecur & Lien adiuvant cibi concoctionem, sed Lien humiditates superfluas diuerit & astrahit ex Ventriculo, & concuere eas potest, ut qui sanguineus sit. Quòd si plus extremi ignis sit, parumque caloris habeas Lien, corpus præ alimento immodico languescit, & propter consuetudinem hoc humoris sape accidit, ut lienosis ventres præduri efficiantur, quomodo iis, qui

*supra modum mingunt ex diversis humoris.* Subiungit, Animalibus quibus Palmones magni sunt, & multum potus desiderant, magnum inesse Lienem: is verò quæ Pulmonibus carent, nec multum potus requirunt, exiguum, aut nullum Lienem datum fuisse. Qui octo vel decem libras aquarum medicatarum ebibunt, quas intra tres vel quatuor horas continenter meiendo excernunt, per quos ductus ram citò feruntur ad Renes? An ab Intestinis per mesaraicas venas ad Hepar traducuntur, ab Hepate per venam Cavam ad Renes decurrunt? Hæc via longa est, & nimis ambagiosa: Breuior est, magisque recta, si aqua ex Ventriculo per *V. du breue* à Liene rapiatur, inde per arteriam Splenicam, mox à trunco Aortæ per Emulgentes arterias ad Renes deriuatur. *Aristoteles* sententiam sequitur *Alexander Aphrodisius*, *sectione 2. Problem.* 44. qui affirmat Lienem, aquam copiose potam & huiusmodi in febribus ardentibus, ab ipso Ventriculo exfugere.

Magna pars iuniorum Anatomicorum fatetur Lienem hæmatosi inservire, & interduum vices Hepatis laborantis supplere. Id trepidè, & satis tepidè *Vesalius* in *sua Anatome* significavit. *Nisi* multorum modò metuerem calumnias, quas hæc sententia non mediocri mea mala experiri sum, nimis graves, bene mihi argumenta non deficerent, quibus vulgatam omnibusque nunc persuasissimam de Lienis munere sententiam inturbarem. Sed nihil audent definire, nihilominus initio capitis multis exemplis demonstravit, in hydropè, aliisque affectibus, qui ab Hepate manare creduntur, Lienem vitium deprehendisse, sano & illæso Hepate. Audacior factus libro de *radice China*, multis historiis probat Lienem, diu Hepatis officio functum fuisse, cum esset scirrhosus, ac veluti lapideum lecur, Lien verò mollis, floridus, & integer existeret. *Pierius* in *sua Anatome*, & in *questionibus med.* 33. existimat Lienem potius sanguinis elaborationi conferre, quam humorem melancholicum attrahere, & concoquere: quod etiam innuit, & calculo suo approbat *Piscalaminus* in *praefat. Anatomicis*. Idem probat & tuerur *Spigelius*, in *sua Anatome*. *Fernelius* ab hac opinione non recedit, cum scribit Lienem visum fuisse aliquando mole & magnitudine sua lecur superasse. Quod adhibitorum Medicorum sententiâ exilumatum fuit, *lecur ad sanguinis confectionem optulari*.

Hæc opinio veterum testimoniis roborari potest. *Aristoteles* Lienem, Hepar aduterinum, *σπλην*, & *σπλην* appellat: unde fit, ut animalia quæ Liene carent, Hepar bipartitum habeant, ex *Aristotele* lib. 3. de partibus animal. cap. 7. Verum illi modum & artificium non expresseant, quo Lien vitur ad sanguinis elaborationem: neque enim crediderim parum cum Hepate virtutem obtinere, quia utrumque parenchyma, siue crudum, siue coctum, & substantiâ, & colore, & sapore longè dissimile existit.

*Varolius* proprium Lienis officium designavit, videlicet crassam & sæculentam chyli portionem ad portas lecoris aduectam per ramum Splenicum exugere, & absorbere, quam insita virtute subigit & attenuat, sibi que ad nutritionem assimilat: residuum in Ventriculo & Intestina regerit. Sed in eo fallitur, dum sanguinem arterialem in origine sua à venali differentem statuit, illum ex puriore chyli portione per Coeliacam arteriam in Intestina diffusum raptâ, & in Aortam deriuatâ, in Corde fieri putat. Atque in isto progressu, huius chyli portionem crassiorem per ramum Splenicum arteriosum in Splenem divertere, quasi Lien per venas Splenicâs crassiorem chyli portionem raperet, ut purior & defæciator Cordi tradatur.

Sed non est verisimile chylum in arteriis contineri, succum à sanguine arterioso protius dissimilem. *Galenus* libro 3. de facult. nat. cap. 15. notat arterias quando dilatantur, spiritum, ac tenuem sanguinem trahere, eius verò qui in ventre & Intestinis est succi, aut nihil, aut omnino per exiguum, quantumvis exquisitissimè confectum. *Bauhinus* *Varolij* opinionem aliter explicat, videlicet Lienem, chyli partem crassiorem & terrestriorem in venis mesaraicis, iam alteratam & sanguinis rudimentum adeptam, ex venarum mesaraicarum trunco, antequam chylus ad Hepar feratur, ingenua sibi facultate, per ramum Splenicum ad se allicere, quò postea facilius Hepar chyli partes meliores attrahat.

Sic Lien optulari lecori verè dicitur ad sanguinis confectionem, quatenus sanguinem sui generis conficit, vel quatenus crassiorem succum ad generationem purioris sanguinis parum idoneum auertit, ut perfectior fiat in Hepate sanguificatio. Nec absurdè proposuit *Anthor* libelli de utilitate respirationis, Lienem similiter atque

Iecur, chylum ab Intestinis attrahere, eaque propter, Iecur sinistrum ab *Aristotele* appellari, qui primus de *usu Lienis* accurate scripsit.

Hunc autem Lienis usum manifestè probat, Magnitudo Lienis homini maior, quam cæteris animalibus, quibus longitudo Intestinatorum amplior: unde fit, ut in brutis animantibus chylus ex vno, simplici que cibo confectus, per Intestinatorum orbes reuolutus, exactè subigatur & attratur, minusque scatet terrenis excrementis. At in homine, chylus ex vario multiplicique alimento constat, difficilibus coquitur, crudus in Intestina delabitur, moxque à Mesaraicis exugitur, crassus adhuc sordibus abundans, quas Lien allicit & absorbet, ut defæcatus tenuisque chylus Hepati distribuatur. Lien autem chyli portionem sæculentam insita facultate in sanguinem sibi proprium conuertit, quo cum fuerit expletus, reliquias Ventriculo, Colo Intestino, & Omento suppeditat ad nutritionem, quas quidem partes sanguine feruidiore nutrirı conueniebat: Ventriculus enim membranofus calido sanguine irrigandus erat, ad conseruandum illius temperamentum, quod frigidiore potu & cibo infringi ac debilitari poterat: fouetur quidem accubitu duorum viscerum Lienis & Hepatis: sed calor quem impertinnet, non ita recreat ipsius Ventriculi substantiam: Colon Intestinum crassarum sordium conceptaculum est, cuius calor obrueretur, nisi feruido sanguine aleretur. Omentum crassam & cœnosam Splenis illiuiem excipiens consimili sanguine nutrirı debebat.

Obiciet aliquis, si Lien opitulatur hæmatosi, sanguinemque conficiat ad hoc opus suapte natura, vel per accidens destinatus, qui in Liene sanguis elaboratur ex crassa & impura chyli portione, crassior & impurius erit altero sanguine, qui in Hepate gignitur, quia suis sordibus non est expurgatus, ubi enim refundet bilem excrementitiam: ubi reiciet humorem melancholicum: hæc me dubium & anxium tenent, nescium in quam partem inclinare debeam.

Nec melior & probabilior hæc opinio, licet ex plurimis constata, quia continet multa absurda, quæ declarabo post eius explicationem.

Lien ex Ventriculo chyli tenuiorem portionem per aspectabiles, & occultas vias exugit, lutulentam & sæculentam ex Pancreate per ramum Splenicum rapit. Sanguis Arteriosus per Arterias Cœliacas effunditur in id viscus: Ex permissione triplicis istius humoris, constat noua species sanguinis, quæ Lienem, Ventricolum, & alias partes Ventris inferioris cum altero sanguine Venæ Portæ, fluente ab Hepate nutrit. Excrementum per arterias defertur ad Renes.

Videamus nunc absurda.

1 Cum Hepar sit primarium viscus hæmatopoëticum, Lien secundarius, ut Lien primus trahit tenuiorem chyli portionem ante Hepar, cumque sit bibulus ac spongiosus, per vias aspectabiles ac occultas sese ingurgitat, priusquam Hepar fruatur chylo, qui per Intestina deuolutus, transit per venas lacteas usque ad Pancreas, inde in Iecoris cauum defertur. Obtinebit igitur Hepat crassiorem chylum, quem non potuit Lien abligurire.

2 Quomodo Ramus Splenicus transiens per Pancreas, exuget crassiorem chyli partem, si chylus sit inclusus venis lacteis, quæ repunt per Pancreas, tanquam puluinar necessarium ad eas recolligendas, quamuis aliz aliorum descedentes adeant Iecur.

3 Ergo vena Splenica, destinata erit deferendo chylo instar venarum lactearum, quæ nullæ ad Lienem pertingunt.

4 Nec arteria Cœliaca ad Lienem perueniant, ideoque non possunt vehere sanguinem arteriosum, neque reuere sordes.

5 Rectius fuisset asseruere crassiorem chyli partem deduci ad truncum Portæ, inde per ramum Splenicum vi attrahente Lienis, deriuari in eam partem.

6 Nam si ex Pancreate chylum sugit Lien, ex venis lacteis emulgebit: at illæ non effundunt suum liquorem in substantiam Pancreatis.

7 Quomodo partes omnes aluiuæ regionis sanguis lienosus nutriet, scilicet Pancreas, Omentum, Intestina, Mesenterium, Anum, quia non potest distribui Intestinis, & Mesenterio, nisi decurrat per ramum Mesentericum.

8 Si alteri sanguini mananti ab Hepate permisceatur, isthæc confusio erit petuicia, impuri sanguinis cum puriore.

9 Quæ portio per *Vas breue* tribuetur Ventriculo erit inutilis, cum habeat alias venas a tronco Portæ prodeuntes.

10 Præterea, *Vas illud Breue* est de genere earum viarum quæ sunt aspectabiles, vel occultæ, ergo Lien non trahet potulentam, & aquam portionem chyli, & per eandem viam refundet sanguinem Ventriculo. Nec Splenicus ramus crassiores chylum ducet, & reducit sanguinem deorsum.

11 At, quomodo occultæ viz, soli naturæ cognitæ, sint explorandæ non citralacerationem, non explicatur: An per Lienis aut Ventriculi lacerationem? An per diuulsionem vtriusque partis?

12 Quænam sint aspectabiles non indicatur.

13 Quod si melancholicus humor excrementitius, vr biliosus constituatur, quod se recipiet? quia chylus occupat Lienem. Foran dicer cum *Hofmanno*, ex illo crasso chyllo generari in Liene: Ergo melancholicus humor erit excrementum dumtaxat illius sanguinis, qui gignitur in Liene, aut totus sanguis lienosus erit melancholicus.

14 Ergo Lien sedes erit humoris melancholici, cum non habeat conceptaculum proprium, vr biliosum excrementum.

15 Ergo impurissimus & valde perniciosus erit nutriendo corpori hic sanguis deterior, quam si prodiret ab Hepate, ratione loci, & originis.

16 Ac proinde naturæ nostræ infestissimus, vr nemo inficiabitur, qui cõsiderarit maleficia. 17 Quomodo ab humore melancholico morbi & symptomata prognata explicari possunt, & eorum curationes demonstrari, si sanguis qui in Liene concoquitur, continenter impendatur in nutritionem partium aliuinæ Regionis. 18 Si ex fæculento & crassiore chyllo gignitur sanguis peculiaris in Liene, sequitur necessariam esse istius humoris generationem, quam veteres dixerunt excrementitium, fecerni ab Hepate tanquam malignum, ineptum alendo, sed in Liene loco peculiari præparatum, aptiorem reddi nutriendis partibus vicinis, addo permixtum arterioso distribui Ventriculo ad eum roborandum, & appetitum acuendum. Itaque si localem haberet generationem in Liene, erit materia febris quartanæ, habebit motum suum quarto die, iterum producet, scorbutum, dysenteriam ab atra bile, fluxum sanguinis lienosum instar hepatici. Denique natura suum hostem internecinum procreabit, ex chyllo lutulento & fæculento, qui debet naturaliter remanere in intestinis tanquam reiectæneus, fecalis & stercoreus. 19 Quis vnquam tales audiuit, aut finxit ineprias, præter *Hofmannum*, qui nostrâ Physiologiam Medicam euertit, ad curationem morborum necessariam, aut nouam condere debet Pathologiam, & Therapeuticam.

20 Sic enim peruertitur doctrina veterum de sede humoris melancholici, de curatione, & mutua Lienis ac Iecoris inter se communicatione.

21 Itaque quorū sunt morbi Hepatis, tot erunt cõsimiles assignandi Lienis, & diligenter partes affectæ erunt distinguendæ.

Coactus fui proponere, & examinare omnes opiniones *Recentiorum Medicorum de alime, & vsu Lienis*, vr quæstionis veritas effulgeret, magisque innosceret. Operter, inquit *Hippocrates, libro 4. de morbis, ad opiniones fortiter inherentes multa argumenta adducere, si quis vellet audientem à priore sententia adducere, & convertere, ut suis verbis fidem adhibeat.* Tandem in eam adductus sum sententiam, ne desisterem ab antiqua opinione verissima de *vsu Lienis*, ipsum Lienem esse emundatorium Hepatis, reconditorum crassioris sanguinis, ac proinde opitulati ipsi Hepati, dum talem humorem ad se rapit: Quinetiam chylosi inferuire, dum ex Ventriculo superfluum humorem exsurgit, vr melior fiat chylosis & consistentiæ crassioris chylus. Superfluum hic humor per arteriam splenicam in Aortam deriuatus, ab emulgentibus arteriis rapitur, deductus in Renes, & Vesicam, sicque *Hippocratis & Aristotelis* conformis opinio conciliari potest cum *Galeno*, quia istud officium emulgenti liquorem superfluum ex Ventriculo, non impedit crassioris sanguinis conseruationem in eodem viscete. Cum enim Vena Porta sit distincta à Vena Caua: & intra Hepar ex chyllo sanguinis elaborati, tenuior ac putior portio transferatur in Cauam, impurius traditur per Venam Portam partibus aliuinæ regionis alendis. Cum autem sint quamplures, natura parauit reconditorium sanguinis, & emundatorium alterum Hepatis, Lienem, ex quo tanquam Promocondo, si deficiat sanguis in Hepate, vel in tronco Venarum Mesaraicarum eadem repetitur. Sanguis vrò lienosus, quia limosus & crassus, alterius san-



guinis arteriosi affluxu, & permixtione attenuatus, & auctus, aptior fit nutriendis partibus aluinæ regionis, & refluus in Hepar, quandiu integer est, ipsum lædere non potest.

Quod si lecur priuetur suo officio, vel per insignes obstructions scirrhosas, vel per omnimodam atoniam, eius officium supplere potest Lien, & solus hæmatosi inferuire. Tum deducto chylo per Venas Mesaraicas, & per Ramum Splenicum ad Lienem, oriantibus venis lacteis obcuratus, sed in eo statu summe perturbatur Oeconomia naturalis, nec diu stare potest, nisi partes istæ officiales in integrum restituantur.

Queret aliquis curiosus, *quomodo sanguis à Liene solo elaboratus, possit distribui trunco Venæ Cava, & Portæ?* Facilis est responsio, si à trunco Venæ Portæ canalis in truncum Venæ Cavae deferatur *Galenus* cognitum, nondum à me deprehensum, quia forsan sedulo non inuestigavi.

Si desit, per arteriam lienalem deriuabitur in Aortam, dein in Cavam per mutuas anastomosis utriusque vas.

Cursus sanguinis à Liene in Venam Portam per easdem venas vchentes chylum perficitur.

Hoc posito fundamento, quod Lien sit confors & consocialis hepatis, directe oppositus, & situs in hypochondrio sinistro, non tantum ad æquilibrium corporis, sed potius ad mutuum officium cum Hepate, ut ipso deficiente Lien operi succederet in casu necessitatis: Assuero tamen quotidie & naturaliter chylosi & hæmatosi inferuire.

Atque sic explico officium valde litigiosum & intricatum, ac perperam explicatum ab iis, qui non considerant omnes opiniones Anatomicas de *Actiōe & Vsu partium*, reuocandas esse ad usum artis, qui dignoscitur ex constitutione naturali cuiusque partis.

Cum igitur in praxi medica nil frequentius occurrat, quam maleficia humoris melancholici in Liene, vicinisque partibus coerciti, & innumeri morbi, & symptomata ab humore melancholico oriantur, atque curationes humoris melancholici sint distinctæ ab aliis humoribus, remedia etiam Melanagoga diuersa, reicere humorem melancholicum à Liene, ut noua Lienis actio introducatur, nonne est veterem Medicinam planè destruere, sine demonstratione alterius actionis ad melius medendum vtilioris.

Quapropter audaciter affirmo, *Lienem ex chylo nequaquam elaborare sanguinem, quandiu valet, & integrum est Hepar*: Naturale est reconditorium, siue Promus condus sanguinis elaborati in Hepate, sed potissimum crassi, terrestres, & melancholici, qui ibi asseruatur ad vsus necessarios, vel ut attenuatus ex permixtione arteriosi nutriat partes aluinæ regionis cum altero sanguine Venæ Portæ: vel ut refluat in lecur, si eo indigeat: atque Lien id agit, quandiu isthæc viscera sunt integra & sana, non debet autem ingurgitari, & nimium repleti sanguine, alioquin depauperantur, & contabescunt partes aluinæ regionis, totiusque corporis, ut scriptum est ab *Hippocrate*.

Arteria Lienalis extra Pancreas eiecta, magnæ naturæ providentiæ, non potest tam facile obstrui, ut Splenica Vena, Arteriæ Mesaraicæ, & Venæ, sed liberum habet comeatum, ut sanguinem arteriosum suppediet Liene, etiam interceptis omnibus viis, quæ feruntur ad Lienem, atque hauriat superfluum liquorem è Ventriculo.

Imò, sanguis ille arteriosus perumpit vias inuias, sibi que aditum facit vsque ad Hepar, & resoluendis obstructionibus inferuire potest instar Tartari Vitriolati. Quin etiam iuxta Lienem per ramum in Ventriculum insinuat, serum quoddam chyloso fermentatum suppeditare potest.

Per hanc determinationem facile destruuntur omnes opiniones nouæ, de *Actiōe & Vsu Lienis*, quoniam omnes earum probationes sunt imperfectæ, ideoque Sophisticæ, nec ad meliorem usum medendi referri possunt.

## DE VENA CAVA.

## CAPUT XXIV.

**P**OST explicationem Lienis, commodè demonstratur Venæ Cavae distributio: Vena dicitur, quod per eam aliquid veniat, siue quod sit via quædam. *quæ* Græcis, *ὅτι ἐν πύκι*, quod est redundare. Venas autem ab Hepate tanquam à fonte repetere oportet, quamvis *Hippocrates lib. de locis in homine*, venarum initium à quavis parte sumi posse prodiderit, ac proinde à venis Capitis exorditur. Ex hoc loco illustratur obsecutus alter *Hippocrates, lib. 2. de natura humana*. Venarum è Capite fontes & *ὅτι ἐν πύκι*, scilicet paria quatuor emanant.

Hic liber *Platonis* testimonio germanus est *Hippocratis* fœtus, licet hunc locum *Galenus* vitiosum esse censeat. Aequè difficilis est loci altcrius interpretatio apud *Galenum, lib. 4. de usu part.* dum scribit, Pancreati & Ventriculo venas offerri in Iecur non terminatas, id est, quæ sanguinem à Iecore non mutuuntur, sed à Lienē, ut interpretor. Vena Cava, quamvis venæ Portæ supposita sit, vulgò tamen dicitur à parte gibba Hepatis emergere, ut Porta à sima parte nascitur: quod intelligendum de radicatione, & ramorum intra Hepatis substantiam traductione.

Nam vena Porta radices suas in partes inferiores Iecoris transfert, Cava verò radices suas ad partes superiores Hepatis traducit. Venæ Cavae ramos per Iecur dispersos, cribri in modum perforatos esse diligenter observabis.

Quamvis autem Cava diuidatur in *Truncum Superiorem, siue Ascendentem, & Truncum Inferiorem, siue Descendentem*, est tamen vnicus truncus à diremptu Iliaco vsque ad subclauiam diuisionem continuatus, peruius, & patentissimus, ut manifestè cognosces immisso & traducto bacillo digiti minoris crassitie. Id annotatum ab *Aretæo, lib. 1. acutorum cap. 8.* animaduerto. Venæ Cavae continuitatem à Corde vsque ad spinam prope coxendices obseruabis, si lamellam traicias à superiori parte iuxta Cor, vsque ad partes inferiores spinæ, quod etiam priùs declaratum fuerat ab *Aristotele, lib. 1. de hist. animal.*

Magnæ venæ Iecur adnexū est, cum arteria nulla ei coniunctio intercedit: Transmeat ipsū venā à maiore illa producta, qua parte Iecoris Porta appellantur, sed clariùs *lib. 3. de hist. animal.* infra Cor maioris venæ pars suspensa transmeat septum transversum, hæretque tum Aortæ, tum Spinæ. Hinc fertur ad Iecur vna brevis, sed lata à qua multe minoraque in Iecur sparguntur. Truncus ille cauam Hepatis partem perrepans, dumidia sui parte parenchymati affixus est, & circa apicem parenchymatis è trunco insignis ramus exurgit, qui subintrans Hepatis substantiam in duos ramos sectus, mox quilibet in tres vel quatuor diuisus, quoquoersum distribuitur.

Truncus Venæ Cavae infra Hepar profert primū *Adiposam*, quæ in sinistro latere, interdum ab Emulgente producit. Frequentiùs in dextro latere ab Emulgente prodit, interdum geminatum vidi. Sequitur *Emulgens*, quam sæpe duplicem & triplicem, dextrā potiùs parte, quàm sinistrā obseruavi. Ab Emulgente ramulus profertur ad illam glandulam magnam Reni superiectam. Hunc ramulum repere & assurgere ad Lienem quispiam existimaret, eundemque esse, quem *Sylvius* à Splene ad Emulgentem protensum vidi.

Emulgens vena inferna & postica sui parte, insignem rāmum in lumbos profert, ad quem interdum furculus venæ Azygi parte sinistra producit. Nam in parte dextrā rami ab Azygo descendens, maior portio, vel tota trunco Cavae insinuat in Renes: Inde cognosces an via illa *Expurgandi puris in pleuritide suppuratâ, à Fallopio* notata sit vera. Nec leue emolumentum sperare & expectare oportet in doloribus nephriticis, appresso cæterio ad regionem Renis affecti, quod *Sauonarola* summo opere commendat. Vidi insignem venam ab Emulgente natam supra musculum Psoam proripere ad Rectum Intestinum, quamvis adesset hæmorrhoidalis à Splenico ramo producta. *Spigelius* notat Emulgentes venas *Valvulam* intra se habere, quæ feri in Cavae truncum regressum impediat: quod fuerat priùs à *Vesalio, in Examine*

*Observationum Fallopy* notatum. Si non vera valvula, saltem quid simile valvulae in istis venisprehenditur. *Spermaticas venas*, tam in viris quam mulieribus geminas, saepius in dextro, quam sinistro latereprehendi, idque in libidinosis ob adulteria suspensis ac strangulatis. *Dextra spermatica* maior & amplior est sinistra, quia sanguine calidiore turget, ut notat *Galenus*, libro 14. de usu partium.

Venam dextram Spermaticam aliquando ab Emulgentre dextra nasci, cum *Galenus* saepius observavi. Idcirco non imperiù *Aristoteles*, venas istas à Renibus derivat, quia forsan ab Emulgentibus prodeuntes observaverat.

Interea notabis materiam purulentam Renum, tam in muliere quam in viro, per venas illas Spermaticas expurgari, in muliere per Vterum, in viro per Renem, dum lentum defillat ab inguine virum, more gonorrhææ virulentæ. Præterea observabis venas Spermaticas in progressu suo plures ramulos vicinis partibus impertire. Vnde cognosces, non alium sanguinem ad Testes affluere, quam eum quo reliquæ partes corporis nutriuntur. Vidi etiam tres ramulos à Spermatica sinistra iuxta eius originem enatos, qui in spinalem medullam decinebant, inde coniicio non absurdum esse *Hippocratis* sententiam, videlicet materiam Spermaticam à Cerebro per spinalem medullam ad Testes confluere. Sed nondum observare potui, nec verum puto, quod eruditissimus *Ludovicus Duretus*, in suis emendationibus in *Hollerium*, annotavit, interdum in mulieribus exortum venarum Spermaticarum inveni, ut sinistra Spermatica à Trunco, dextra ab Emulgente prodeat, contra Naturæ legem: idque in viuis dignosci posse, si mulier prægnans incipiat progredi crure sinistro, & manus sinistra frequentius utatur.

Spermaticis succedunt *Lumbares tres* vel quatuor, solitariae & inconiugatae, quæ non apparent, nisi Trunco Cauæ inuerso aut eleuato, in musculos lumbares, spinalem medullam, & rachitis musculos abeunt, occurruntque per Anastomosis venis, aut arteriis, quæ ab imo cerebro ad spinalem medullam descendunt, quam usque ad lumbos perperant. Per hanc vasorum communionem Cerebri spiritus, vel aliquam materiam ad partes Spermaticas defluere crederem. Per has venas, ut per ramulos Aortæ, materiam serosam in spinales musculos, & in ipsam medullam deferri certum est: Vnde lumborum dolores contumaces, & diuturni atrocissimi qui degenerant in Paralysem aut Paresem, vnde tetanus, lumborum grauitas, & frigiditas. Sacra vena ut plurimum à diremptu Trunci emanat, nonnunquam ab Iliaco ramo, tumque duplex existit.

Vbi ad principium Ossis sacri Truncus peruenit, in duos ramos à situ dictos *Iliacos* dirimitur: semel tamen vidi Truncum venæ Cauæ descendentis supra Renes bifurcatum, & ab illo diremptu venas omnes Trunci geminas prodiiisse. Ab Iliaco ramo profluunt *Hypogastrica*, *Muscula*, *Epigastrica*, & *Pudenda*. Hypogastricam saepius in latere sinistro geminam observavi. Hæc amplissima est, partesque quamplurimas alit & irrigat, nec ambitu & cavo hypogastrici coarctetur, sed supra obturatorem internum delata, iuxta spinam Ossis Ischij in glutinosos musculos, & Renem disseminatur.

*Hypogastricæ* distributio in muliere maior est, quam in viro, propterea copiosiore sanguine abundant in his locis. *Muscula* prope ilia ab Iliaci postica parte nascitur, & in musculus Iliacum & extremitatem pfoæ absumitur. *Epigastrica* à crurali ramo Peritonæo egressa proficiscitur iuxta inguen, & ad Rectum Musculum ascendens, per anteriorem eius partem ad Umbilicum usque defertur, vbi per Anastomosis mammariæ internæ iungitur. At in mulieribus *Epigastrica* duplex est.

Nam præter eam quam modo descripsi, altera est interna, externæ directè opposita, quæ ad collum Vteri fertur. Vidi aliquoties vni hypogastricæ prope Vterum: per hunc ramulum læ ab Epigastrica recto tramite ad Vterum decurrere, & vicissim sanguis ab Vtero ad mammæ refuere potest. *Pudenda* iuxta Renem ab Iliaco ramo egreditur, & in corpus Renis disseminatur. In inguine ex Crurali, *Vena inguinis* nascitur, in musculos Obliquos, & adipem abdominis expansa.

## DE AORTA DESCENDENTE.

## CAPVT XXV.

**I**N quot venas Truncus descendens Cauæ dirimitur, totidem ex se promittit arterias Truncus Aortæ descendens, penetrato Diaphragmate intra cauum abdominis, primùm Splenicam, dein *Celiacam* proferit, cuius est ampla distributio. Succedunt *Emulgentes* arteriæ, quæ in Renis cauum abeunt. Sunt grandiores quàm pars est ad viuificationem tam exiguæ partis, ideoque *Galenus* ab his aquositate arteriosi sanguinis expurgari iudicauit. *Spermatica* supra venas eiusdem officij exoriuntur, & super Cauam traducuntur. Exiles sunt, & statim ab exortu se immiscet & confundunt cum venis *Spermaticis*. Sinistram ab Emulgente natam sæpius in mulieribus vidi. Dextram etiam in viris ab Emulgente proficisci. Interdum vtrique *Spermatice* deficit, quod sterilitatem adfert in bene compositis corporibus, quæ partes genitales optimè conformatas habent, fortiter arigunt, semen excernunt, sed infecundum, quia vitali spiritu destitutum. Prope Os Sacrum nascitur *Mesenterica*, cuius portio in Mesenterium diffunditur, altera in Os Sacrum dispergitur. His obseruatis, forscè diuides iuxta Os sacrum, Truncum Aortæ Descendentis, vt intueatis innumeras arteriolas, quas Spinali medullæ, & musculis lumbaribus suppeditat. Inde discas materiam ferofam influere posse in hos locos ad excitandam Paralytici partium inferiorum.

## DE RENIBVS.

## CAPVT XXVI.

**D**EMONSTRATA & explicata venæ Cauæ & Aortæ descendens distributione, ipsa partium series nos ad Renes accersit, quos inuenies iuxta vltimam costam Lumbis accumbentes, & intra Peritonæi duplicaturam reconditos: ideo non datur eos intruere donec superiectum Peritonæum vnguibus laceraueris, tum apparebant inuoluti membranâ adiposâ, quæ, ex *Aristotele*, *diuina* dici posset, & nihil est aliud quàm ipsius Peritonæi duplicatura. Quamuis sic inclusus teneatur Ren, potest tamen à situ suo dimoueri & luxari, itaut fluat in abdomine, liquata pinguedine, vel cùm in molem magnam attollitur & extumescit, vt in quibusdam obseruatus fuit alteruter Ren ad Os Sacrum deuolutus.

*Franciscus Pedemontanus*, qui continuauit *Grabadini*, id est, *prædicam Mesaci*, mentionem facit *dislocationis Renum* & *Vesicæ* quæque remedia proponit ad curationem eiusmodi morborum. Verum quidem est luxari Renem, sed dubitatur de *Vesicâ*, quæ firmiter affixa est, & inclusa duplicato Peritonæo.

Causa luxationis Renis potest esse violenta & diuturna tussis, quæ perennitet exagitant Diaphragma, eius extremitates, quibus incumbunt Renes, possunt alterutrum Renem sua sede dimouere. Ren dexter magis obnoxius est luxationi, quia maior ob viciniam Iecoris, liquata pinguedine, quæ ipsum glutinis instar lumbis affigit, faciliùs deuoluitur.

Interdum Ren dum extuberat supra modum versus Umbilicum prominet, quod scirrhusum Mesenterij æmulatur.

Obseruabis diligenter a dipero Renibus circumfusum, qui non tantum instar fermenti, sed etiam Emunctorij & Spongiæ modo comparatus est ad excipien dasordes Renum, inde Morbosa Græci *σπινθηρ* vocant, quociens Renes vndeque pinguedine obuiuntur. Hoc malo magis afficiuntur animalia, quæ sero pinguescunt, maximè autem ouis, vt etiam inecreat. In causa est pabuli vbertas, qualis in Leontino agro Siciliæ. Itaque non nisi, vbi appetit serum diei, educant pecudes in pascua;

Renes à  
pne, quod  
est diffusio  
e, pro  
ipso.  
Vnde re-  
nes dicunt  
pne, quod  
pne ab his  
phicant  
hæmorrhoides  
sunt, quod non  
placet La-  
dano,  
nec  
ex a  
duq  
m, à  
spongiæ  
Renem à  
sua & p  
qua p  
Renes sunt  
humidi flui-  
di.

quo minùs capiant cibi, ex *Aristotele*, libro 3. de *historia animalium*, & libro 3. de *partibus animal.* cap. 9. addit, cum ceteris animalibus Renes habere pingues proficiat, & plerumque totos obesos habeant, ouibus hoc lethale est, quamobrem hominibus etiam qui vitio Renum laborant, quamquam pinguescere iuuat, tamen si pingues admodum efficiantur, dolores profecto accidunt lethales. Itaque humore statumque intercluso celeriter præ syderatione intereunt. Namque per Venam & Aortam, statim virtutum ad Cordis sedem transfuehitur: meatus enim ex iis Venis ad Renes continui perpendunt.

Præusquam adiposam tunicam detrahas, in superiore parte Renis magnam Glandulam ab *Eustachio* primùm descriptam inquires, quæ ab Emulgentem furculum acquirit ad sui nutritionem. In oue Reni exiguo consimilem deprehendi. In homine depressam & planam, quæ nullam Renis formam præ se ferebat. In pueris etiam inuenitur: illic appositam puto ad firmendam diuisionem retiformis plexus neruorum, qui à costali & portione Stomachici inter duos Renes efformatur. Inde consensus & sympathia Renum, cum Ventriculo, itaut laborantibus Renibus vomitus frequentius accidat, quàm aliis partibus affectis, quæ neruos vt Renes à Stomachico accipiunt.

Iisquæ praua diathesi affectis, vel corruptelam patientibus *venæ* æque fatigat Ventriculorum, ac si Hepar ipsum esset in vitio, ratione sui parenchymatis carnei, in quo residet facultas naturalis, cuius pars præcipua est appetentia.

Ex situ Renum intra duplicaturam Peritonæi, notabis integrâ & illasâ abdominis capacitatem, Renes vulnerari & incidi posse, quod certissimum indicium est, *Nephrotomiam* securè administrari posse, de qua *Serapion in praxi*, thess. 4. cap. 22. & *Amicennas lib. 3. Fen 12. tract. 2. cap. 18.* qui operationem istam improbarunt. Abfcessus quoque musculorum abdominis, qui fiunt in imo Hypogastrio, antroorsum vel retroorsum, vel etiam in interfemineo, sæpiissime accidunt ex suppuratone Renum, transfusâ & delabeute purulentia intra duplicaturam Peritonæi, vt à nobis multoties obseruatum fuit in apertione cadauerum post obitum.

Renes geminos Naturam condidisse dicunt, non tam ad æquilibrium corporis, quàm actionis suæ continuitatem, ne vno præpedito & obturato, cessaret humoris serosi profusio: non semel tamen obseruauimus monitus à *Fernello*, vno Rene obstructo alterum inutilem & vietum reddi, propriaque actione destitutum, vrinæ fluxum intercipere, quod confirmatur à doctissimo *Ludouico Dureto*, commentario in *Cœcias*, pag. 539. atque id mirum videri debet in Renis vnus afflictione sustinere vrinam, vel mixturam stillatim ægrè transmitti, cum ita comparata sit ratio amborum Renum, vt cessante vno, alter officium suum faciat; sed magna vis est sympathiæ in societate officij, propterea ex sympathia Renis alterius crebrò & parè vrina ab egro emittitur, nam occupati calculo & inflammati cessat officium, & quibus Ren socius elanguet effectus & frigidus, iis in sæua nephritide vrina supprimitur, vt nuper obseruatum in Illustrissimo Præfide Vido *Fabro Pibracis*, Iurisperitorum eloquentissimo. Eleganter de ista actione emulgentis serum in vtroque Rene abolita, disserit *Ludovicus Mercatorius*. Eam fortiuntur Renes inter se connexionem, eam etiam in substantia similitudinem, vt facile sit coniecere altero affecto, alterum quoque eundem affectum passurum.

Actio autem communis est vtrisque simul, non alteri soli: nam licet duo Renes eidem muneri facti sint, non ob id quod alter eorum efficere potest, quod duo: itaque ambo necessarij existunt ad eam validam actionem perficiendam. Ex *am* Renum non amplius serum trahentium, *Leucophlegmatiam* generari credidit *Fernelius*, quod est verisimile, serum refluum non regredi in Hepar, sed in ambitum & habitum corporis diffundi. Nonnumquam vidi Rene attrito vel pertuso ab asperitate calculi, serum in capacitatem abdominis exstillare, etiam in lumbos, femora & tibias effundi, quæ mole ferme corporis Truncum æquarent, exitu per fonticulos imis Lumbis procurato, vacuatum fuisse ad tempus, sed tandem è viuus ereptos ægrotantes.

Interdum etiam sine vlla Renum obstructione vrinam supra Renes intercepti obseruauit *Carpus in sua Anatome*, quippe vitiatò & exsoluto parenchymate Renum, facultas eorum attractrix aboletur: Ita suppressione vrinæ supra Renes interit *Polemarchus d'Ornano*, anno Domini 1626. ex atonia Renum, sine vilo calculo in vesicâ, & vtroque Rene, fed ambo Renes erant penitus effecti & exsoluti.

Ren dexter in animalibus minus pinguis ex *Aristotele*, quia altior & propior Iecori,

ac proinde à calore soluitur pinguedo. Interdum in habentibus ventrem impensè prominentem, & vitiatum costarum ductum, vnum & maximum Renem multoties vidit *Fesilius, lib. 1. cap. 10.* De Rene vnicò mirabili exemplum leges apud *Carpum in Isagoge Anasmi*, & aliud in *comment. ad Mundinum*. Exemplum aliud Renis admirabilis exstat apud *Botalium, sub finem libri de Catarrho*: Et *Catolus, Stephanus* de vnicò Rene, & duplici Rene in vtroque latere cum geminis Emulgentibus exempla profert in *sua Anatomia*, quæ idcirco propono, quia non reperiuntur in *Obseruat. Skenckii*. Anno Domini 1628. mense Decembri, in publica Anatomie cadaueris virilis, inveni vnicum Renem amplitudine suâ duos æquantem, supra spinam collocatum. Figurâ suâ æmulabatur formam Cordis, qualem pingitur in chartis quibus luditur, cuius conus deorsum vergebat, cornua sursum erecta erant, ex vnoquoque cornu manabat Vreter, sed sinister solitarius erat, & à parte exteriori & gibba cornu proficiebat, dexter verò ab vtroque cornu emanabat. Emulgentes venæ & arteriæ à parte anteriore trunci, non à lateribus educebantur, & in cornu cuiusque lateris extrinsecus inferebantur. Quælibet vena Emulgens statim ab exortu bipartita erat. In cornu sinistro cum diuiserem Vreterem, carunculas deprehendi ad finem Vreteris, in dextro cornu nullas potui obseruare. Eandem figuram, aut saltem propè consimilem obseruabis, quando vnicum Renem offendes.

In Renibus inæqualem situm obseruabis, vt in homine, Ren dexter depressior est propter Hepatis magnitudinem, sinister altior propter loci vacuitatem, secus in brutis animalibus, Ren dexter elatior est, intra fibras Hepatis absconditus. Sæpius tamen Renes altitudine æquales deprehendi, nonnunquam dextrum superiorem sinistro, sub Hepate prope Diaphragma collocatum. Quod si ad excusationem vel defensionem veterum aliquid proferre liceat, dicam illos exortum & longitudinem venarum Emulgentium considerasse. At sæpe dextra Emulgens altius oritur quàm sinistra.

Adde quod sinistra Emulgens duplò longior est dextrâ, ideoque Ren dexter propius accedit ad venam Cauam, sinister remotior est, ac longius distat à Caua: quam Renes vtriusque positi velut anchoræ firmant, authore *Hippocrate*, quem sequutus est *Aristoteles, libro 3. de partibus animalium, cap. 7.* De altitudine inæquali Renum descendit *Galenus Iulius Alexandrinus, notis in lib. 5. de vsu partium, & Fuchsius lib. 3. Anatomies c. 20.* Cum Lien de missiùs quàm lecar descendat, verterque autem Ren venæ Caus, quâ sub lecoris corpore ducitur vicinus esse contendat, meritò dexter sinistro plerumque elatior est, non rarò tamen etiam sinister dextro elatior obseruatur, in iis præcipuè, quibus Lien minor & lecar maius obigit.

Disant inter se quatuor aut quinque digitorum intervallo. Nonnunquam propinquiore sunt, tum à vasis, quæ in Renem sinistram inferuntur propagines ad dextrum Testiculum in masculis, ad dextram verò matricem in mulieribus producuntur, vt notauit *Galenus, lib. 14. de vsu part. cap. 7.*

Figura Renum in homine varia est, nec tam eleganter phascolum exprimit, vt in brutis: Renes Cordis formam habent ex *Hippocrate, lib. de Osium natura*, Ventriculos enim habent, & Cauam sui partem ad Venas magnas directam: Idem lib. de corporum refectione ait, Renes inter se colore similes, malorum speciem præ se ferunt, ex versione *Fesii*. Sed interpretatio vocis *ἰσχυρῶν*, reprehenditur, quia *ἰσχυρῶν* denotat tractum. *Suidas in Lexico* notat *ἰσχυρῶν* significare *ἄσπετον*, ideoque ista vox denotat Renes eundem in situ tractum, eandemque habere figuram, sic vniones filo in orbem collecti dici poterunt *ἰσχυρῶν*, quorum in candore, luore, magnitudine, orbe, pondere exactus est responsus, ex *eruditissimi Salmasti* interpretatione.

Renēs ex *Aristotele, libro 1. de historia animalium*, similes sunt bubulis, id est, vitulinis, quod eleganter explicat *Rondelet, libro 1. de hist. pisc. cap. de Renibus*. Tales in puerulis obseruantur. Addit *Philosophus*: meatus, videlicet Venam & Aortam, in Renem corpus absumi argumentum est, quod non penetrant, quod neque sanguinem intus habent, neque concretionem. Reprehenditur à *Scaligero in comment.* quod in dissēctis corporibus, sanguinis trombi, & arenæ, & lapides inueniantur. Sed hæc omnia sunt contra naturam.

Vt autem Renis interior structura compareat in brutis, Renem gibba parte se-

interiorem cavitatem, quæ *Peluis*, siue infundibulum nominatur, inspicias: non est simplex cavitatis, sed gemina sibi inuicem iuncta, ut ab vna in aliam transitus fiat, prima *Interniculum* seu *Cribrum*, secunda *Peluis* dicitur, quæ cavitates manifestè apparent in Rene canino, cuius prima cavitatis instar cribri perforata est. Istud Cribrum veteribus notum fuisse patet ex *Aretæo*, lib. 2. *Chron. cap. 3.*

Renes naturâ suâ glandulosi, sinus habent exiguos ad lotium excolandum, cribrorum instar foraminibus peruios, *apud Aut. Ruffus Ephesius lib. 3. cap. 12.* Causis Renum partibus membranulæ sunt, instar cribri foraminulis plurimis pertusæ; *ut 3 & 6 in una ipsius typum, utrumque habet infundibulum.* In homine Ren maiori artificio exstructus est, *Peluem & Cribrum* faciliè deprehendes, si Renem Parte sima secueris. Nam ampla cavitatis Vreteris in suo exortu intra Renem Peluis est, vel infundibulum. Foramina verò quinque, vel sex, septemve, quæ reperiuntur in fornice Peluis, constituunt Cribrum. Singula hæc foramina producunt alia duo, quibus artificiosè resectis, apparent Carunculæ Papillares.

Vt autem Carunculas & Tubulos destillantes urinam in peluem commodè intuearis, in sectione sic procedes. Renem parte sui caua secabis, prius per Vreterem introducto stylo crassiore, & supra Vreterem sectionem duces vsque ad cauum Renis, tum videbis quinque vel sex foramina, quæ sunt fistulæ vrinariæ, productæ ab ipso Vretere, quibus accuratè discissis, offendes nouem aut decem Carunculas, siue extremitates carneas acuminatas, in quibus fit secretio sanguinis à fero, quod ab iis veluti lac è papilla exsudat, & in ramulos, siue fistulas vrinarias nouem vel decem Vreteris destillat, eomodo quo lixiuum per angustum dolij foramen stipulâ obturatum. In Rene magno plures tubuli & carunculæ quàm in paruo reperiuntur: nani in magno Rene notauit duodecim carunculas, & totidem tubulos.

Sunt autem istæ carunculæ in extremis duobus Renis collocatæ, quatuor aut quinque in vtroque extremo, & binæ semper simul iunctæ; duæ vel tres in medio Rene collocantur. Eleganter scripsit *Hipp. lib. de Ossium nat.* per Renes, aquam percolari, quia spongiforme est eorum corpus: & *lib. de Glandulis*, notat Renes habere glandulas, quoniâ multa humiditate replentur. Maiores verò hæc in parte sunt, quâ aliz glândulæ.

Primus inter Recentiores Anatomicos *Carpus* agnouit istas Carunculas Papillares, & eleganter descripsit *comment. in Mundinium*, ex quibus simul conglobatis instar racemi, infantium Renes efformantur, quales sunt Renes vitulorum terrestrium. Deinde, progressu ætatis ex aspersione sanguinis, carnosum integumentum circumiicitur, quod læuem ac politam Renis superficiem reddit: propterea in dissectione per dorsum Rene, carnem subliuidam, minimi digiti crassitie, corpus Renis ambientem obseruabis, alteram internam rubicundiorẽ, ex glandulis illis simul vnitis concretam, quibus Ren pueruli constabat.

Glandulæ autem intus collocatæ fuerunt, ut serosa excrementa faciliùs traherent & secernerent. Quum enim actio contactu perficiatur, quo plures erunt partes ad imutationem alicuius rei, cò faciliùs eiusdem rei fiet immutatio, atque tota actio celerius absoluetur. Quare serosus sanguis in plures veluti Renes distributus, quemadmodum chylus in omnes Hepatis particulas deriuatus, & aer in omnes Pulmonum arterias sese insinuans, minore opera vincitur, immutatur, segregatur: ideoque scribit *Aristoteles*, lib. 3. *de part. animal. cap. 9.* morbos Renum curatu difficiles esse, propterea quod multi sint tenui.

Debetne Aphorismus 76. lib. 4. de istis carunculis intelligi? quoniam *Hippocrates* in Renibus multas glandulas collocat, *lib. de Glandulis. Helicæ* similes carunculas excretas vidit in ulceratione Renum, quas *Galenus* videtur agnoscere, *lib. 6. de loc. affect.* etiam in *commentario Aphorismi citato* neget se vidisse veras carunculas, sed tantum grumum sanguinis, qui speciem carnis referebat.

Priusquam Renem parte sima diuidas, videbis arteriam, inter venam & Vreterem, medium locum occupare, ut sua pulsatione sanguinem in Renes introducat, & lotij descensum acceleret. Deinde, animaduertes venam & arteriam cum ramis fistulosis nouem aut decem Vreteris non coalescere per Anatomosim, quod explorabis aquâ calente per Vreterem iniectâ, aut spiritu insufflato, quæ per Renis substantiam diffundi, nec vlllo modo in vase refluere videbis. Inde cognosces urinâ per Renis carnem & carunculas percolari, idcoq; *Sylui* opinionem obscuram quidem, falsam esse, dum



scribit, Renis secernit vase duro, crasso, ex iisdem renalibus conftrato, in ipsam carnem virimque diuiso, ramis primum binis, deinde sæpius septenis æqualibus, dimidio sui exteriori carni Renum connatus, interiori liberis, tandem ad gibbæ Renum partis medium coalescentibus.

Notauit *Galenus*, libro 16. de usu partium, capite ultimo, magnas arterias Renibus datas fuisse, non solum nutritionis & viuificationis causâ, cum Renes sint exigua membra, quibus sufficiebant paræ arteriæ: Sed maguas idcirco obtinuisse, vt Cor genusetque arteriosum ab æquositate & bile repurgaret. Denique in humanis cadaueribus notabis magnam Renum dissimilitudinem in magnitudine, figura, & colore, contrâ in brutorum Renibus semper eandem conformationem, & valorum dispensationem obseruabis.

Renes sunt Vix Publicæ ad expurgandam illuuiem & impuritatem sanguinis intravenam Cauam conclusi, quæ neutiquam remeat in Iecur, quando patent viæ, idcoque vbi contumaciter obstruuntur canaliculi Renum, siue à lapillis, siue ab aliis humoribus, suppressa illuuiis in Hepar resluit, vbi abscessum parit, vel in Ventriculum regurgitas serum, singultus molestissimos producit, vel nauseam, aut vomitum, quæ symptomata ægrum tandem miserè conficiunt. Et cum apparent, labem insignem, vel corruptelam ipsorum Renum significant. Propterea, in eiusmodi affectibus diligenter oportet expendere vrinas, an sint nephriticæ, & si æger ante morbum crassas & sæculentas effunderet, quia si postea vrinas tenues diu æningat, portione crassa resistente, doleatque Iecur, metuendum à suppurato. Itaque Naturam hic liceret accusare, quod Vias illas Renum Publicas, nimium angustas effinierit, ac proinde tot incommodis obnoxias. Sed erat necessaria hæc angustia tubulorum papillaribus carunculis obturatorum, vt sanguis à sero secerneretur, alioquin cum sero effluxurus.

Renes conferre ad elaborationem seminis non est probabile, vt sustinet *Dap. Semnerius*, lib. 1. præf. rationibus non satis validis. Fateor quidem ad libidinem conferre, dum incalescunt. Eleganter *D. Augustinus*, in narratione in Psalm. 7. rectè temporalium & terrenarum regum delectatio Renibus tribuitur, quia & ipsa pars est inferior hominis, & ea Regio est, vbi carnalis generationis voluptas habitat, per quam in ærumnosam & fallacis lætitiæ vitam, per successionem prolis natura humana transfunditur.

De consensu Renum cum superioribus & inferioribus partibus, lege consilium *Dalishij* viri sub finem Consiliorum *Fernelij*, in folio, editionis *Lugdunensis*, quæ in aliis non extat.

## DE VRETERE.

### CAPVT XXVII.



**E**SI MA Renis parte producitur Aquæ ductus, urinam in Vesicam deferens, & Vreter nominatur, vnde ab æquo urina, quod est urinam traho, vel urina, quod est meiere, inde Vreter & Vrethra, quod nomen *Hippocrati* in *Cœcis*, confunditur cum Vretere: Vocatur etiam *uriductus*. Substantiam nactus est similem Vesicæ, auctore *Galeno*, & ab ea nascitur, nam cum integer à Renibus separari queat, inde produci non potest, vt existimauit *Hipp.* lib. de Officij natura, nisi ratione inhxætionis, quamuis primo intuitu exanguis appareat, vt Vesica, & ob id vena alba dicatur, ab *Arist.* lib. 1. de hist. anim. Tunicarum tamen numero, contextu, & fibrarum naturâ plurimum à Vesica discrepat. Nam simplici constat tunica, fibræque tantum rectas habet, Vesica carnosa est, & duplici constat tunica. Nescio cur *Hippocrati*, lib. de corp. refect. ductus vrinarij dicantur *in ætudu*, obliqui tendentes. *Cornarius* & *Fascius*, obliqui ac formâ triangulares, interpretantur, illi quia propter vacuitatem non sunt exactè rotundi, & propter incumbentium Intestinatorum compressionem, ferme triangulares apparent. Vt in Renibus virorum & mulierum nullum discerni obseruatur, sic etiam in Vreteribus, idcoque decipiuntur, qui aliter formatos esse & progredi in mulieribus, quàm in viris scribunt.

In Anatome hominis lue venerea laborantis, qui infimi ligno lignum sanctum, siue guaiacum redemerat, hoc est, ad curationem, infelicem arborem elegerat, dum anno Domini 1611. mense Martio in ædibus meis dissecaretur; observaui in utroque Rene binos Vreteres geminasque cavitates, medianā membranā differetas: Vreteres in Vesicam diuersis locis inferebantur, alter iuxta ceruicem, alter in fundum Vesicæ deferrebat: omnes erant fistulosi, æqualiter magni.

Aliud præterea mirabile in partibus vrinariis animaduerti. Ren dexter tres recipiebat Emulgentes venas, Reu sinister vnicam habebat, quæ geminam adiposam prodecebat, ambæ Spermaticæ ab Emulgentibus emanabant. Non ica suspensum & insolens, quod *Salomon Albertus in suis Observationibus Anat.* rectat, id quia nostræ narrationi optime quadrat, vtriusque etiam chartis inferetur. In cadauere strangulati hominis cernere erat tres venas Emulgentes, & dextro Causæ latere, serie quadam, sed ex aliquo intervallo prodeuntes: sinistra Emulgens vnicæ erat, ab Emulgentibus vtraque Spermatica proferebatur. Hinc peti posse videntur causæ, non solum vberioris in isto homine seminis proventus, & auiditatis exercendi venerem prope inexhaustæ, quæque vix satiari posset, super qua paulò ante supplicium questus fuerat; ingenuè pernegans se vllò vnquam præter hunc invita morbo diuexatum fuisse: sed & *inimici* perpetuæ, cui solum habilis à natura erat, nunquam enim marem procreant; neque in coniugio, neque in adulterio. Noster homo totus erat in venerem patris, & ob *irigantiam*, quum tres viuentes haberet vxores, strangulatus fuit. Sic inclusi non sunt conspicui, etiam remotis Intestinis, ideoque veteribus ignoti fuisse. *Asclepiades* negabat existare meatus vrinarios à Renibus vrinam deducentes, sed per coapurationem serum permeare corpus Vesicæ, ibique concrelescere, & in vrinam verti, quæ fuit opinio *Heracliti*, vt notat *Aristoteles*, *Probl. 6. sect. 13. Lactantius lib. de Opificio hominis, cap. 11.* progressum vrinæ à Renibus ad Vesicam eo modo, quo *Asclepiades* exponit. Sic *Arnobius* Vesicam appellat *saccati humoris obscurissimam seriem. Lactetio, lib. 4. Vrina saccati corporis humor* dicitur.

Ad nostram historiam proximè accedit exemplum à *Carolo Stephano* propositum. Vidit in humano cadauere vtrumque Renem non iam amplius seruasse mandragoræ seminis figuram, sed duas habuisse cavitates, veluti crenas quasdam in sui parte interiore, quæ ad Cauam est venam, quarum vtraque crena porum vnum vreticum emitteret, quasi verò duplicem Renem in vna & altera corporis parte iudicare posset: ab utroque enim Rene duo admodum conspicui Vreteres prodibant, neque ij quidem minores aut tenuiores, quàm qui soli in alijs corporibus conspici solent, qui tamen circa os Pubis, antequam Vesicam ingrederentur, in vnum coire conspiciabantur. *Fallapius in Observat. Anat.* similem Renum fabricam obiter recitat.

Præquam discedas ab Vretere, obseruabis diligenter eius angustiam, quæ maxime cum cruciatu dilatatur in descensu calculi, qui si grandior fuerit, vi protrusus & expulsus subsistit in Vretere, magno ægri damno & periculo. Idcirco nunquam temere positum lapidem mouere oportet, quia in cauum Vreteris prolapsus, si nequeat descendere, remigrat in Renes. Quod si Vreteri per aliquot dies incunatus fuerit cum suppressione vrinæ, quæ certam moram portendit, licebitne lumbos aperire, quæ parte magis doleant ac tument, ad extrahendum calculum, vt consulit *Ruffinus, libro de partu Casareo.* Opus periculosæ plenum alex, quod non potest administrari sine vitæ dispendio, quamuis Vreteres duplicato Peritonæo includantur.

## DE VESICA.

### CAPVT XXVIII.

Vesica quæ  
si vesica,  
quia vena  
distendi po-  
test.  
necesse est  
in videri  
in corpore.



ESICA non omnibus animalibus data est, sed iistantum quæ Pulmonem habent sanguineum, quæ verò calidiori sunt Pulmone, ampliorum Vesicam obtinuerunt, quam ob causam Vesica hominis, proportionem quàm cæteris animalibus amplior existit. Propterea scriptum ab *Aristotele, libro primo de historia animal.* Vesicam humanam esse admodum magnam.

Hæc autem amplitudo spectanda est, dum inflatur aut impletur, facillè autem dis-

tendi & amplificari Vesicam ex lusu puerorum cognoscere, solent, inquit *Galenus*, pueri acceptas suam Vesicas spiritu implere, ac iuxta ignem super ciueres sic eas conficere, ut incalcescant, nec tamen lædantur, estque is lusus in Ioniam, & in aliis gentibus non paucis persequens.

quod con-  
fueret vri-  
nem.

Accidunt verò inter fricandum, versus quosdam numerofo & cantu & 1ythmo, suntque ea omnia verba, *adheratio Vesicae ad incrementum*. Vbi verò illis abunde videtur extensa, rursus inflant, ac magis distendunt, & iterum sificant, idque subinde fastidiant, quoad ampliata Vesica satis augmenti accepisse videatur. Quando ita distenditur in videntibus ex copia urinae, ichuriam siue omnimodam urinae suppressionem saepius accidere vidi, quia non potest Vesica in tanta laxitate fibrarum, & distensione membranarum sese contrahere ad excernendam vriam, prupterea immisso cathetere fistuloso vacuari debet.

Eleganter *Aristoteles*, libro 3. de *historia animal*. Vesicam esse membraneam scripsit, sed alio genere membranæ, quia distendi potest. Carnosam tunicam Vesicæ *Fabricius* ab *Aquapendente* pro musculo expellente lorium demonstrabat, quia fibris carnosus & sanguine conspersa est. Quod confirmavit *Spigelius*, ideoque si nimium distendi & laxari has fibras contingat, vrina supprimitur, quia non potest expelli ab ipsa carnosa tunica, vel potius musculosa.

Idem *Fabricius* pyramidalium musculorum tendones graciles ad Umbilicum peruenire putabat, ut fundum Vesicæ Peritonæo inclusæ deprimerent in mictione, quod est verum in foetu, & infantibus, non in adultis, sed infra Rectos muscoli Pyramidales demittunt communem tendonem furcam & membranulam, qui Peritonæo affixus, qua parte includit Vesicam, potest mictioni inservire, dum fundum retrahit deorsum, & ipsam Vesicam compellit: Atque ut nimia Vesicæ distensio supprimit urinam, sic eiusdem restrictio ab ulcere stranguriam immedicabilem adfert, dum extendi & dilatari nequit. Saepè in laborioso partu adeo distenditur Vesica, ex retentione lotij, dum Fœtus in orificio Vteri diutius hæret, ut post eius egressum Vrina fluere nequeat, & eâeductâ per cathetrem, summa postea remaneat imbecillitas, ischuriz lethalis causa.

Præterea, Vesica hominis situ & textura differt à Vesica brutorum: nam in homine pendula est, Peritonæo duplicato inclusa, ac veluti extra Peritonæum eiecta: idcirco proprium ac separatum ventrem constituit, quem intellexit *Ducles* in sua diuisione corporis humani: nec apparet secantibus, nisi detracta interiore tunica Peritonæi: at in brutis, Vesica intra Peritonæi capacitatem laxa, omni que nexu soluta fluitat & oberrat supra Intestina, tantum per ceruicem Intestino recto adhærens. Sed in homine ob rectam corporis figuram sublimis appenditur, ne incumbendum Intestinatorum pondere comprimeretur: ita fundum in ceruicem deuolutum ischuriam adferret, sicque exponenda illa dislocatio Vesicæ propolita à *Francisco Pedemontano*, in *supplemento practicae Meisuri*. Talem vidi relaxationem Vesicæ in hominibus & mulieribus, qui non poterant mingere, nisi manu releuato imo Hypogastrio. Ex illo situ cognoscere *Cystotomiam* in imo Hypogastrio perfici posse ad extrahendū calculum, ut in Perinæo cum vulnerati & incidi queat Vesica, illæsa & integra Veneris capacitatem, ut pluribus docet *Rossius*, libro de *partu Casareo*. An tamen equè commode & securè, dubitare licet, quamuis singulari Dei beneficio, in hominibus, ex alui sinu extet Vesica, ut sic exposita superne iuxta pectinem, & inferne in perinæo leuari possit, in hominis solatium & ischuriz curationem, quando non potest introduci catheter in Vesicâ, quidni potest pertundi Vesica in imo Hypogastrio intra duos musculos Rectos, iuxta os Pubis, digiti distantia, vel sine cathetere conductore, perforari Perinæum vsque ad Vesicam, ex sententia *Herculani*, capite de *difficultate mendi*.

*Zechlin* in *Consiliis*, senibus, ubi non licet tentare lapidis extractionem, Perinæi sectionem consulit tanquam emissarium continuum urinae absque dolore aut leui: Aut introducitur cannula argentea, quæ claudetur indito pessulo, donec cupiditas mendi cogat remouere, quod à Medicis Parisiensibus iam à centum annis scio factitatum fuisse.

Hominis Vesica extrinsecus adipe multo circumfusa est, quo priuata est brutorum Vesica. Chymistæ Germani, ac præsertim *Conradus Runtad*, in *Medulla destillatoria*, ad obtinenda vasa quæ continent essentias aromaticas odoratissimas, commendant præ cæteris inuolucris, vesicas suillas tanquam densiores.

Hominis Vesica interdum intus saccum siue foueam habet, extra capacitatem, infernè protuberantem, in qua sæpe grandiores lapides nidulantur & latitant, qui immisso cathetere detegi, ac deprehendi non possunt. Quod spectat ad texturam seu compositionem Vesicæ, simplici constat tunica nervosa, auctore *Galeno*, sed duas inuenio, Internam nervosam, Externam carnosam, cui circumiecta est duplicatura Peritonæi, quæ pro Tertia communi accipi debet. Cervix carnosæ est, propterea incisa & vulnerata coalescit, non autem Vesicæ corpus, ait *Galenus*, ex doctrina *Hippocratis*: eam ob causam exitum huius *Fernelus*, Vesicam non inflammari, sed tantum cervicis Vesicæ musculum, siue ipsam cervicem quæ carnosæ est, muscoli sphincteris circumiectu. Et quia netuea est Vesica, frigidissimam esse scripsit *Hippocrates*, crudisque delectari. Ex temperamento frigidus, colligitur, cur in affectibus Vesicæ, veterinus accedat, ut soporosi intereant ægri, ut docuit *Hippocrates*, lib. 8. *Epid.*

Memorabilis est *Aretæ* sententia de Vesicæ dignitate. Difficiles in acutis morbis dolores patitur, cum ab aliis vicium participat. Sed difficiliore magisque mortiferos, si per se laborare inciperit: quandoquidem omni corpori, & nervis, & menti labem communicare valentissimè potest: quippe Vesica nervus frigidus albulque est, ab innato calido longissimè distans, proximè verò externo frigori exposita.

Magnus est Vesicæ cum Renibus consensus officij communione, & substantiæ membranosa sympathiâ per Veterem, videmus enim in pluribus ægris strangurias urinas Renibus affectis, sine vlla Vesicæ affectione, propter Renum & Vesicæ consortium, ut in iis qui Renum lithiasi laborant, Vesica vacua, attestante *Hippocrate*, libro de internis affectionibus. Imò in quibusdam morbis eodem referente, urinx stranguriæ non nephriticæ obleruantur, lib. 1. *Epid. scil. 2. part. 1.*

Rara est Vesicæ prava conformatio, quæ tamen accidere potest, & diligenter notanda in explorando calculo, si quando presentibus omnibus signis parhognomonicis calculi, cathetere non deprehendatur. Nam in quibusdam duplex Vesica fuit inuenta, aut saltem Vesica, septo membranæ in duas cavitates distincta. *Valerius Cæster* in virgine 35. annorum duplicem Vesicam inuenit, utramque lotio plenam, sed vnicâ Vetricibus prædita positionem urinx in alteram exonerabat.

Narrat *Bambinus* in cadauere Principis Onolsbacensis, Vesicam quasi septo in duas partes diuisam obseruatam fuisse, & nuper in cadauere doctissimi *Isaaci Casauboni*, veluti duplex Vesica deprehensa fuit, Vesicæ sacculus quidam appensus erat, in quo lapsi stabulabatur: an duplex septum Vesicæ, quod in calculosis deprehenditur, fiat à dilatato Vetere intra duplicem tunicam Vesicæ? An ex adnato & amplificato lapide ibi consistente tan lapis ita conclusus extrahendus, dilaceratâ Vesicæ tunicâ, opus periculose plenum alæ? satius esset sic hærentem calculum relinquere.

Intra vrethram, supra carunculam, extremitates vasorum, ciacularium claudentem, membranulam instar valuulæ circumfensam, ad orificium colli Vesicæ deprehendes, quæ seminalis humoris refluxum in Vesicam prohibet vel ne circa locos istos guttulæ seminis hæreant; hæc membrana obseruanda introducto stylo per Vesicam, non per vrethram, ne dilaceretur, eaque facili effingitur immisso cathetere in Vesicam, aut cereolo ad curationem carnositatis, quin etiam facili potest fieri in gonorrhœa virulenta: hanc sæpius publicè demonstravi, in aliis non potui deprehendere, quia disrupta fuerat ab istis causis, quas commemoravi, perquirenda in pueris & mulieribus.

Quamuis Vesica situ & figurâ suâ lagenâ inuersam referat, non potest tamen urina excerni pro nutu & arbitrio, nisi tota Vesicæ substantia laboret, & annitatur ad expellendam urinâ, quod vidimus sæpius accidisse in omnimoda urinx suppressione, quæ per 30. aut 40. dies cathetere introducto in Vesicam bis in die educebatur. Quod symptoma non enascebatur a paralyfi Vesicæ, alioquin inuoluntariè lotiam effluxisset, sed potius ab eius torpido sensu, quæ non percipiebat acrimoniam urinx, quamvis dolorem sentiret ex summa distensione, quippe nervi corporis Vesicæ differunt, ex *Galeno*, à nervis colli Vesicæ. Simile exemplum extat apud *Galenum*, libro tertio de locis affectis, cap. 4. Vel potius existimarem primo quoque tempore distentam & laxatam Vesicam ex copia urinx, non potuisse constringi ad expulsionem sequentibus diebus, remanente eadem laxitate Vesicæ, eandem ischuriam perseuerasse, donec tonus & robur Vesicæ restitutum fuerit, si nervi corporis sunt distincti à nervis cervicis, & musculosa tunica Vesicæ expellat, sphincter latus constringat: sunt differentes mo-

tas variusque muscoli, quos considerabis in actionibus Vesicæ, quia collum Vesicæ, & corpus eorum possunt affici.

Vrinam supprimi à Paralyfi Vesicæ, atque etiam obtuso eius sensu, probat memorabili exemplo *Trincavellius*, libro 10. *practica*, cap. 8. Refert etiam *Ludovicus Duretius*, annotationibus in *Hallerium*, quendam ischuriâ ex resolutione Vesicæ interiisse. Sæpiissime aperti cadaveribus eorum, qui ischuriâ interierant, inuentæ carnes spongiosæ, iuxta orificium internum Vesicæ, adnatæ: interdum calculi ibi hærentes. Quando igitur adest dolor cum meiendi desiderio, suppressâ tamen vrinâ, suspicari licet istam excrescentiam fungosam, vel lapillum in orificio hærentem, vel orificium Vesicæ callosum, quod non potest dilatari, vel glandulas prostratas tumefactas, vel scirrhosas, quæ omnia in variis corporibus obleruavi.

## NECESSITAS ET UTILITAS PARTIVM

*Genitalium demonstratur, quas duplices esse oportebat  
sexus distinctas.*

### CAPVT XXIX.



**E**MENSIS ac petulstratis partibus nutritiis, ad Genitales te conferes, quas non consimiles viro & mulieri Natura dedit, sed unicuique proprias, vt mox demonstrabo, si prius earum necessitatem & utilitatem paucis exposuero.

Vt melius est esse, quàm non esse, ita præstat semper, quàm ad tempus esse. Quia autem Natura suum opificium immortale reddere non posset, ratione materiz eaducæ, variisque alterationibus obnoxiz, subsidium quoad potuit ipsi ad immortalitatem parauit, inslar sapientis cuiusdam Urbis Conditoris, qui non modò studet suam Urbem in præsens tempus populo frequentare, sed prouidet quo pacto in omne tæuum, aut saltem diutissimè conseruetur. Nulla tamen adeo floruisse memoratur, vt non dies ipsa Conditoris memoriam deleuerit. Naturæ verò opificium multis annorum millibus iam constitit, atque in posterum statit, quia mirabilem artem inuenit, qua in demortui animalis locum, nouum aliud succenturiat, beneficio generationis, quæ vitæ brevis vicem supplet ad immortalitatem: quapropter immutabili æternitate continuantur videntium ortus & procreations. Vt quod singulari substantiâ seruari nequit, specie saltem persistat. Ex *Aristotele*. Animal enim naturâ & origine mortale, conatur relinquere sibi simile, & idem specie in suum locum sufficere studio immortalitatis, inquit idem, cap. 4. lib. 2. de anima. Vt hoc opus perficiatur, necessaria fuit sexus distinctio, maris & feminæ copula, quod mihi restat probandum.

Fabulatur *Plato* in *Symposio*, initio mundi nallum sexus discrimen inter homines apparuisse, quia tum omnes *Hermaphroditi* erant, sed ob fastum & arrogantiam Deû, hominem in duas partes, virum scilicet & feminam dissecuisset, & vtrumque sexum à se inuicem ita disceuerisse, vt alter sine alterius adminiculo, nihil quidquam ad sui conseruationem moliri aut præstare posset. At *Sacra Littera* docent, Deum ab initio mundi masculum & feminam formasse, quos stabili connubio coniunctos, ad speciei propagationem conspirare voluit: propterea vtrique Veneris igniculos iniecit, quibus ad hoc opus accenderentur. Varias etiam unicuique partes concessit, ex quibus sexus necessitas & discrimen intelligitur.

*Diuisit natura mares, pars vna puellû,  
Vna viris genita est.*

Quod apud *Aristotelem*, libro 4. de generat. animal. *Empedocles* pronunciauit, *αὐτὰ διὰ τὸν πόρον τῶν αἰσθητικῶν, ἢ τῶν γεννητικῶν*. Quoniam aliquid eodem modo constitutum, formæ & materiz rationem obtinere non potest, non licebat homini vtramque naturam induere, agere simul & pati. Quod si ita contigisset, duplex in vno eorum naturæ temperies adfuisset, calida scilicet & frigida, quod est absurdum, quandoquidem vnius corporis vnica temperies natua.

Præterea, cum ad prolem necessaria sit duplicis humoris excretio, feminis & mensuræ, utrumque à mare abunde suppeditari non poterat. Quia color vitilis abundantem sanguinem absumit & depascitur, nihilque inutile & superfluum relinquit: si quæ sint tertiæ coctionis excrementa, vel ob raritatem corporis expiant, vel in pilos conuertuntur. Quod verò narratur de vitis mulierosis, qui singulis mensibus, statisque periodis, quemadmodum mulieres, mensura patiuntur: id verum esse fateamur in morbois, præsertim *Atelanchelitz*, qui per hæmorrhoidas singulis mensibus crasso & faculento sanguine repurgantur: Sic nonnullis per Penem certis temporibus sanguinem copiosum effluere obseruatum est. Sed huc iam & insolens habetur. Id tantum naturale dicitur, quod sit semper, vel ut plurimum. Necessaria igitur fuit femina, quæ locum & materiam generationis præberet. Proinde ridicula *Chrylippi* sententia, qui Naturam sic virilem sexum exornasse censuit, ut feminam adiungeret tanquam appendicem, ut pavoni caudam.

Nec minore contumelia *Aristoteles* feminam, mare imperfectum appellat: vel ut loquuntur barbari Philosophi, animal occasumatum, accessorium quid. Iniquior adhuc fuit dum feminas, *Manstra* vocat, *Prenuaticiones Naturæ mares cogitantes*: Nos existimamus Naturam in feminæ non minus, quàm maris generationem intendere, omnis siquidem rerum naturalium perfectio, ex line petenda est, at feminam ita formari necesse fuit, alioqui nulla foret animalis generatio: Ac sanè perfectio quædam est speciei *Femineitæ*, quia sexus non nili in speciebus perfectis distinctus est, quem licet *Theophrastus* & *Plinius* in Plantis agnoscant, contra mentem *Aristotelis*, id potius imaginatione, quàm rei veritate ducti pronuntiarunt.

Sed quibus notis uterque sexus distinguetur? *Aristoteles*, libro 5. de generat. animal. cap. 1. & libro 7. de hist. animal. cap. ult. existimat feminam à mare differre tantum virtute, quod facultas virtusque diuersa sit. Mare enim definit, quod in alio generare potest: feminam, quod in seipso, agendi tamen principio aliunde mutuo. Situ quoque discrepant, ut videre est in partibus quibusdam, ad congressum & procreationem accommodatis, in quibus tamen exigua differentia est, ut in *ovariis*, quibus partes genitales abesse sunt, videre licet. *Aristoteles* opinioni subscribit *Galenus*, & partes genitales viri & mulieris situ tantum differre asseruat: quod nimirum in viris robore caloris partes genitales foras propellantur, in feminis caloris imbecillitate intus subsistant.

Peritiores *Anatomici* diuersam partium in utrisque structuram agnoscunt, in figura, numero, & magnitudine. Carent enim mulieres *Epididymide*, *Prostatibus* glandulosis, & illis *Vesiculis*, in quibus semen asseruatur. Vasorum præparantium diuersa diuicatio, & calamentum dissimilis infectio, denique dispar est figura *Testium* mulierum. *Iuudi* & *Ceruici* *Vteri* cum *Testibus* virilibus. *Scroto* & *Pene*: & quoquomodo Vterum inuertas, nunquam Penem & Scrotum efformalis.

Quod verò obicitur de feminis in mares mutatis, falsum non ausim affirmare. Sed dicam liberè quid de veritate huius rei sentiam, *Galenus* autoritate fretus. Ad membrorum fabricam, eorum præsertim quæ sinus aliquos & ventriculos habent, Natura duobus instituentis vitur, ære & igne, horum enim est corpora distendere, producere, & exficcare: hæc si foras expirauerint, materia tuis & indigesta remanet: cum igitur cauum aliquod corpus Natura molitur, totum prius exteriorem cucutit, ceu septum validum formare consuevit, deinde, ubi formæ delineatio intus fuerit expressa, vniuersi spiritus impetu obductum septum perumpit, & formatum membrum foras expellit: quod si in isto conatu languerit, membrum imperfectum relinquitur.

Idem in generatione maris obseruabis, membra genitalia primò intra abdominis membranam descendi, deinde robore caloris natiui foras erumpere, alioqui caloris imbecillitate intus remanere, quemadmodum talpæ oculi intus delineati foras à Natura propelli non potuerunt. Itaque fieri potest, ut vitiatæ partium genitalium formatione, ut Pene breuiori, & penitus in timore condito, vel *Testibus* non apparentibus, mares pro feminis ab imperitis habeantur, & in eo sexu ad pubertatem usque viuunt: donec iuuenili tandem ardore, aut vellemitis exercitatione, deorsum in Scrotum propellantur. *Testes* autem intra cauum abdominis ad pubertatem usque latere, probat *Mart. Rulandus*, duabus historiis, cent. 5. curat. *Chymicaram*. Amb *afus Parus* exemplo singulari confirmat, & in nobili viro *Argentio* post mortem aper-

to cadauere obseruatum fuit. Noui virum nobilem, qui numerosam prolem à lætissimâ conioge suscepit, cùm tamen habeat dextrum Testiculum in inguine latentem, qui Herniz specie Medicos & Chirugos scellit.

Sed impossibile cõtendo perfectam mulierem mutato sexu in virum degenerare, nisi fortè, ementito corporis virilis habitu, propter barbæ exortum similis viro dicatur, quemadmodum *Hippocrates* scripsit lib. 6. *Epid.* de duabus mulieribus, *Phæusa* Pythæ vxore, & *Larissa* Gorripi coniuge, quæ propter suppressos menses, voce & barba tenuis in viros degenerarunt. Ob eandem causam *Aristoteles* libro 3. de *historia animal.* in terra Caria mulieribus Sacerdotibus pilos in mento nasci scribit, fieri etiam potest, vt quædam viragines, animo & robore corporis viros imbelles superent, sed non inde sequitur habere partes generales viri. Sic *Aristoteles* scribit generosas Gallinas ex parta semel de Gallo victoria, mares superuenire coiru: crista & calcaribus in morem Gallorum enatis: & miratur *Linus* tanquam portenum, Gallinam in matrem, & Gallum in femioam degenerasse. *Impossibile igitur seminarum in mares mutatis.* Indeque concludamus, necessariam fuisse sexus distinctionem, eamque in diuersa partium genitalium structura consistere.

## DE PARTIBVS GENITALIBVS VIRI.

### P R Æ F A T I O.

#### C A P V T XXX.

**N**ATVRA in formatione nostri corporis, partes, quæ speciem & formam honestam erant habituræ, posuit in preparulo, quæ autem ad Naturæ necessitatem datæ, aspectumque deformem erant habituræ, eas coartavit, atque abdidit. Hanc Naturæ tam diligentem fabricam imitata est hominum verecundia, quas enim Naturæ partes occultavit, eandem omnes qui sana mente sunt, remouent ab oculis, quarumque vsus sunt necessarij, eas neque partes, neque earum vsus suis nominibus appellant, quodque facere rute non est, modò occultè, id tamen dicere obscenum est. Itaque nec aperta actio rerum illarum petulantia vacat, nec oratio obscenitate, iudicio *Tully*, lib. 1. de *Officiis*, ideoque cùm homo solum sit animal natum pudoris ac verecundiz particeps, non mirum; si *Socrates* Philosophiæ moralis summus Præceptor, & longo post annorum intervallo, *Antanius Iulianus*, Romæ Orator insignis, de *Amore* sermone habituri, in publicum velata facie prodierit, vt significarent hanc materiam inter castos & pudicos homines non sine pudore tractari. Si vereres Philosophi verbis tantùm exprimere *Amoris* naturam erubere, possumne honestè ac inuerecundè non tantùm verbis enarrare *Amoris* sedem, & incunabula, id est partium genitalium structuram declarate, sed etiam obiectare partes illas, quas pudor communis, & naturalis verecundiz lex iubet abscondere, quas inter aures castas, sine venia nefas est, ac sine honoribus appellare præfatis: quia pudenda à pudore dicuntur, pudor à pudore, cùm sensus auertitur à pudendis, quorum ante peccatum hominis non pudebat, inquit *Diuus Augustinus*, lib. 14. de *Ciuitate Dei*, cap. 17. Nam sicut scriptum est in *sacris Codicibus*, nudi erant, nec confundebantur, non quod eis sua nuditas esset incognita, sed turpis nuditas nondum erat animaduersa. Sic Græcis *αἰσχύνη* dicuntur, *αἰσχύνη* à *αἰσχύνω*, *αἰσχύνη* à *αἰσχύνω*, quoniam denudare & nominare illas partes verecundamur. In *sacra Scriptura*, *Genesius* cap. 9. reprehenditur *Chamus*, quòd patris sui *Noachi* pudenda detexerit, ob idque maledictis affectus: Contrà, benedicti filij, qui partes illas contexerant. Nos verò ex iisdem primis parentibus prognati, consanguinei nostri pudendas partes reuelamus, quas, si credimus *Auenarij*, lib. 2. tract. 6. cap. 1. vir probus & pudicus non debet adspicere. Accedit quod *Aristoteles* sub finem lib. 7. *Polit.* omnem verborum obscenitatem & turpiloquia, è ciuitate eicienda esse præcipit his verbis. Dent igitur operam magistratus, ne qua sit, vel statua, vel tabula picta, quæ tales actiones imitetur, nisi fortè in templis, quorumdam talium deorum, quibus lex lasciuia atque irrisiõnem subobscenâ attribuit. Quod



memorable præceptum copiosè & eleganter confirmatur à *Clemente Alexandrino*, lib. 3. *Pædagogi*, cap. 6. Omnino abstinendum est à turpibus auditionibus, & verbis, & spectaculis, sed multò magis à factis turpibus. Mundos esse nos oportet, tam in ostendendis & nudandis aliquibus partibus corporis, quas non deceet, quàm in contemplandis secretioribus partibus, &c. Quid igitur agam? istalne partes silentio inuoluam? Quas tacitas *Scaliger* mauult appellare quàm pudendas, quoniam de his tacere magis præstat, quàm pudendum aliquid proferre.

An pudicos pictores & statuarios imitabor, qui si picturam quampiam, aut statuum partibus omnibus delineatam fecerint, iis quæ intuentium oculos præ pudore possent offendere, velum obducunt. Verùm non patiar nostram Anatomen imperfectam exire; malimque minus pudicum *Opus* nostrum *Anatomicum*, quàm mutilum & mancum videri. Scitum est illud, omnia munda mundis esse. *Amo quidem verecundiam, sed magis libertatem loquendi.* Nam summa dementia est, quæ turpia sunt nominibus appellare suis. Ac sane latrocinari, fraudare, adulterari re turpe est, sed dicitur non obfcoenè. Liberis dare operam re honestum est, sed nomine iudicatur obfcoenum. Abite hinc casti, si non deceet vos impudica audire verba,

*Triste supercilium durique seuera Catonis*

Ex Martiale.

*Frons, & aratoris filia Fabricij,*

*Et personatus fastus, & regula morum,*

*Quidquid & in tenebris non sumas, ite foras.*

Aggredi enim quæque sine vlllo pudore debemus, inquit *Aristoteles* in re simili, libro 1. de partibus animalium, cap. 5. cùm in omnibus Naturæ numen, & honestum pulchrumque insit ingenium. Liceat igitur præstationem Priapeorum hic vlurpare,

*Carminus incoemptus lufus lætæque procæci,*

*Conueniens Latio pæne supercilium.*

*Non soror hoc habitas Phœbus, non Vesta sacello,*

*Nec qua de patrio vertice nata dea est:*

*Sed ruber horrorum castus membrofior aquo,*

*Qui testum nullis vestibus inguen habet.*

*Aut igitur tunicam parti prætende tegenda,*

*Aut quibus hanc oculis adspicias, ita lege.*

Quisquis ad has litteras impudicus accedit, culpam refugiat, non Naturam, facta deuiet suæ turpitudinis, non verba nostræ necessitatis, inquit *Diuus Augustinus*, libro 14. de *Ciuitate Dei*, cap. 27. elucet enim, vt *Plutarchus*, libro de *Amore proli* scribit, ex *Erasistrato*, in omnibus rebus naturalibus accurata artificiosaque Natura, sive potiùs Creatoris diligentia, industria, quæ nulla oratione satis explicari potest, quomodo perfecit eas partes, quæ ad humani generis propagationem pertinent.

Prisci Philosophi cùm viderent nostræ generationis principium ex Pene humani generis fatore dependere, hanc partem veluti corporis principem ac nobilissimam venerati sunt. *Plato* in *Timæo* virtutem virorum generatricem genitali membro insitam tanquam animal quoddam esse scribit, propriumque habere motum, rationis imperio sapissimè rebellem. *Ti* cùm genitalis membri arrectio, bestia est illa, de qua *Matreus* conquerebatur, dicens animal se alere, quod seipsum absumeret, vt explicat *Cassianus*, comment. in *Athenæum*, *Platonis* locum imitatus *Aristocles*, libro de animal. motu, cap. vlt. genitale membrum animal appellat, quoniam ex illo velut animal quoddam genitalis feminis virtus prodit, quæ cùm sit *Ætherea*, elemento stellarum respondens, membrum hoc genitale cui tota est insita, præstantius reddit. Nec mirum si rudis & infana verustas huic parti diuinos honores attribuerit. Nam à superstitionis *Romanis* sub nomine *Fascini*, inter deos relata fuit, eò quod fascinum siue maleficium depellere, & in authores relicere crederetur.

Antiqui Pudendorum humanorum imagines appendebant collo aduersus fascinum, vt harum rerum intuitu elideretur vis maligna oculi noceere cupientis: Nee dubium, quin eandem ob causam *Romanis* olim moris fuerit Pudenda pro amuletis è collo puerorum suspendere, ex *Varrone*, libro 6. de *lingua Latina*: ab *Horatio* & *Anthore Priapeorum*, Penis virilis appellatur fascinum. Ad hoc propositum multa profert ex *Iudæis*, *Samuel Petitus*, in *Miscellanæis*. De laudatione Penis, leges *Pœmæ* admirabile *Petri Bombi*, *Cardinalis*, in sua *Pœsi*, *Veneriæ* & *Basilæ* edita.

Illam superstitionem *Romani* ab *Ægyptiis* hausserant, qui primi coluerunt illam,

ex qua nascimur omniſparentem, quam ſanctus Numa *Menſulam* vocabat. *Mart. lib. 1. Bibl. lib. 4. Diodor. Sic.* narrat Pudenda non tantum apud *Ægyptios*, ſed apud alios quoque non paucos, in myſteriorum ritibus religioſè haberi, quoniam ab his generatio animalium emanaret. Ac Flamines, qui à patribus ſacerdotia accipiunt, in *Ægypto* iſti Deo piſſimum iniciantur; *Panes* etiam & *Sayri* eandem ob cauſam in veneratione ſunt apud homines. Quocirca etiam imagines ipſorum in fanis plerique dedicant arrectis ita membris, vt hirci naturam imitentur: Hircum enim ob Genitale membrum, inter Deos retulere, quomodo apud Græcos honorari *Priapum* etiam perhibent, quia hoc animal in venere eximiè propenſum, ideoque hac ſignificatione gratam Diis mentem, pro fecunditate gentis ſuæ teſtiam voluere. Idem *Diodorus libro 4. Bibliotheca*, cur ab *Ægyptiis* *Priapus* coleretur, hanc adfert cauſam, quod *Titanes* olim *Oſſim* trucidarint, diſſectoque in æquales partes corpore, ſuam quiſque tranſſulerit, ſolis pudendis, cum nemo tollere dignaretur, in fluuium proiectis. *Iſſi* verò poſt accuratam de eæde viri inqueſitionem, ſumptumque de *Titanibus* ſupplicium, corporis ſegmenta iterum ad corporis humani effigiem conſormata, ſacerdotibus ad ſepulturam tradidit, *Oſſimque* pro Deo coli iuſſit, tum *Penem*, qui ſolus non erat receptus, diuino adſciendum cultu, in Templo arrectum conſecrauit, quem Deum nonnulli *Thyphallum*, alij *Typhonem* nuncupant. Nec ſolum in templis vbius cultus huic Deo exhibitur, ſed etiam in agris & villis, vbi vinearum horitorumque cultodiæ præſectus eſt. Eorum exemplo Romanæ mulieres velatæ, togis prætextis huic parti ſacrificare ſolebant, Aſino immolato,

*Nata Suburana inter Telethufa puellas,*

*Quæ puto de qualiſlibet libera ſcila ſuo eſt:*

*Cingit inaurata Penem tibi ſanctæ iurana:*

*Hunc Pæthice ſummi naminis inſtar habent.*

In Priapo.  
pen.

In oppido *Launio* vnus *Libero* totus menſis tribuebatur, cuius diebus omnes verbiſ flagitioliſſimis vtebantur, donec illud vnum membrum per forum tranſuectum eſſet, atque in loco ſuo quieſceret. Cui membro inhoneſto, matrem familias honeſtiſſimam, palam coronam neceſſe erat imponere. Nec ſolum vt infantium cultos, verumeriam vt Imperatorum tutela inter ſacra Romana à *Veſtalibus* colebatur; & curruſ triumphantiſſum ſub his pendens defendebat medicus inuadit. *Plinius lib. 21. cap. 4.* Oraculum *Apollinis*, quem Poëtæ caſtrum & impollutum appellant, à *Metymneis* conſultum, eos reſponſo ſuo ad *Bacchi* præſentium adorandum hortatur, referente *Theodoro, ſerm. de oraculis. Indi* alioquin in corporis cultu valdè negligentes, ſiſtula aureâ Verpum incluſum exornare ſolent, cum reliquis corporis partes nudas habeant. Inſana fuit apud *Aſſyrios* Pudendorum virilium veneratio, teſte *Pſolomeo, lib. 2. Tetrabibl.* De iis qui Trigono ſubiiciuntur nitripolitico, *Aſſyrius & Perſis*, inquit, ſacra ſunt membra generationi deſtinata, ob Solis, Saturni, & Veneris aſpectus, qui ſeminales ſunt. Ad ritum patrium Pudendis ſacrificaffe, ſpurciſſimum illum pſeud'Antoninum reſert *Xiphilanus*.

Aug. lib. 7.  
de Ciuit.  
Dei, cap. 17.

Narrat *Linſchotus in Itinerario, Caffres, Aethiopia* populos ad oram maritimam, quæ ad *Caput bonæ Spei* porrigitur, inuicem variis bellis occupari: Victores victis caſis & captis Pudenda reſcindere, quæ reſiccata Regi in reliquorum Procerum præſentia offerunt hiſce moribus: Pudenda in Os aſſumunt ſingulatim, atque ad Regis pedes ea expuant, Rex collecta ac ſublata in Regium munus victori reſtituit, quæ victor filo connexa pro monili, ſponſæ ſeu vxori ſuæ de collo ſuſpendit: Sponſa hoc habitu incedens in tantum attollitur, vt ſe vel totius mûndi Regiam, aureo vellere inſignem ctedat.

Porro, veterum profanos ac nefandos ritus prouuli, non vt Ethnicorum infaniam laudarem: ſcio enim Iudæos Geolphegoros ignominie ſimulacro (quod *Priapum* Latini vocant) *Mabutarum* de more ferentes ſacra, grauiffimi numinis irâ in ſe conſcitâ, horribiles pœnas dediffe. Volui tantum honores olim partibus genitalibus attributos demonſtrare, ne quis ſcedam & inhoneſtam cenſeret, partium genitalium curioſè perſcrutatam ſtructuram. Quæ in ſacris Literis non ignobilia reputantur membra, nam *Deuteronomij cap. 25.* Sancta perhibentur Verenda, quæ ſi ſemina corripuiſſet, abſque vlla venia illi manus amputabatur. Quoniam, lex ait, genitalibus vim intulit, quæ priuato cuique data ſunt, non ad bonæ valetudinis tutelam, ſed Reipublicæ aut generi conceſſa, quibus animalis æternitas inſtauratur. Sic apud Gal-

los crimen læsæ maiestatis est, partes genitales Regis inhonestè attredare, de quo Exemplum extat memorabile apud *Aubignum in Historia sua, de Valandrino*, qui partes illas Regis *Caroli IX.* inhonestè tetigerat. Olim etiam à sacris arcebat *Eunuchus*, tanquam imperfectus Homo, ut habetur *Deuteronomy cap. 23. Non intrabis Eunuchus attritus vel amputatis testiculis, & absisso veretro in Ecclesiam Domini.* Interrogatus *Tus Carmotensis*, Consulit Abbati, ut Monachum qui se castrauerat propter *Epilepsiam*, prius atque destituit suis officiis Ecclesiasticis, quia non fuerat à Medicis electus. Castratio olim apud veteres, symbolum erat ingrati animi erga parentes. Propterea si credimus *Poeta Lucetio*, sacrificuli *Cybeles*, communis deorum & hominum parentis, omnes erant castrati, ut significarent, qui parentibus iniuriam faciunt, hac parte mulcandos esse. Gallos attribuunt, quia numen qui violarit Matris, & ingrati genitoribus inuenti sunt, significare volunt indignos esse, *viam progeniem qui in auribus luminis edant.*

Nos igitur istas partes velut indecoras auersabimur? Nos in earum mentione erubescimus? in quibus Deus qui cuncta fecit & condidit, gloriatur & exultat, testimonio *Theodoretus* insignis Theologi. Videns Deus omnia quæcumque fecerat, esse valde bona, primo Parenti sociam & adiutricem feminam creauit, huiusque copulæ his verbis benedixit. *Crescite & multiplicamini, & replete terram.* Quæ oratio ad genitalia membra pertinet, quæ in magnum mysterium quis dubitet attributa? Vnde præstante Deo hominis reparatio fecunda procedit, ait *Cassiodorus*. Detestabilis *Scueria* *horum*, ac impia deliratio fuit, qui humani corporis alteram partem esse Dei statuebant, alteram diaboli: Nam quod ab Umbilico iorsum porrigitur, diuinæ molitionis opus esse, quod infra Umbilicum est, à *Cædæmonæ* conditum volebant, quia inde libidines, & obscenitates emanant: sed illam insaniam solidè confutauit *Epiphanius lib. 1.*

Pudeat nos à mulieribus, quæ castitatem præ se ferunt doceri, *Genitalia membra vidisse gratius ac iucundius habent, quam reliquis corporis partes perspexisse atque contempsisse*, uti testatur pudicus Philosophus *Aristoteles, cap. 5. libro 1. de partibus animalium.*

In Preca.  
Tota.

*Nimirum sapiunt, videntque magnam  
Matrona quoque mentulam lubenter.*

*Ceres* cum filia suæ absentiam lugeret, non potuit adduci à *Baubone*, ut cibum vel potum sumeret, nisi partibus illius genitalibus inspectis, quibus mirum in modum oblectata fuit. Prudenter apud *Luiprandum Diaconum, lib. 4.* pudicissima femina gemebunda, & in terram procumbens à *Theobaldo* postulauit, ut maritum, teum facinoris perpetrati, quauis alia quam adeo nobili corporis parte mutilaret. Elegans est historia ac memorabilis apud *Plinium Iuniorum, lib. 6. epist.* Maritus ex diuturno morbo circa verenda corporis vlceribus putrescebat, vxor ut inspiceret, exegit, neque enim quemquam fidelius iu licitarum possetne sanari. Vidit, desperauit, hortata est ut moreretur, Comesque ipsa mortis, Dux, imò & exemplum, & necessitas fuit, nam se cum marito ligauit, abiicitque in *Lariam Lacum*.

Caueat quisquis hanc partem neglexerit, ne *Lampascenorum* calamitatem experiat, quibus ob expulsum *Priapum*, dirus genitali membro morbus immixtus fuit.

Sed ne diutius insilam in huius partis laudatione, coronidis loco adponam *Artemidori* sententiam. *Pudendum simile est parentibus ab seminarium rationem in ipso conueniam, liberis verò quod etiam ipsorum liberorum causa existit, & amica, quia ad res venereas aptum est, fratribus & consanguineis, quoniam totius domus & familia ratio ex Pudendo dependet, robori autem & corporis virilitati, quia ipsum horum causâ existit, quam ob rem virilitas à quibusdam appellatur. Orationis & disciplina velut præcipuum omnium membrorum, quia fecundum est velut oratio. Equidem cum aliquando in *Cyllene* essent, *Mercurij* statuas vidi, nihil aliud quam Pudendum naturali quadam ratione subrepsit. Insuper simile est opulentis & possessionibus, eo quod vel intendi vel remitti, præbere & exornare possit. Consilii autem & arcantis, quoniam consilia & pudenda *vidæ* *Græcis* appellantur. Paupertati etiam, seruituti ac vinculis, quia necessarium vocatur, & necessitatis symbolum existit. Denique dignitatis ac nominis auctoramento, utendum enim & auctoramentum appellatur.*

Nunc admirabilem partium genitalium conformationem intueamur, quam nobis

bis licet potius admirari, quàm verbis satis dignè explicare: quamvis enim multò sit facilius rerum omnium ortus explicare, quàm res ipsas construere: verba tamen nostra sunt sapientiæ eius qui nos condidit inferiora, ut ne quidem exponere possimus, ea quæ nullo negotio condidit.

Postquam igitur admirati fuerimus cum *Galeo*, & verbis summi Architecti in hoc membro còdendo solertiam assequi non potuerimus, ad partis dissectionè transfundendum erit. Sed in demonstratione huius partis non imitabor *Elesine Cereis* impositores sacrificulos, qui postquam per quinquennium, anxios & anhelabundos aduenas epotas, magni alicuius oraculi cognitionem expectantes, & rei cuiuspiam diuinæ maiestatem quandam videre gessientes reliquissent, simulacrum virilis membri tot integumentis tandiu coopertum, tandem reuclatum ostendebant. Nos verò non effigiem genitalis membri, sed prototypum, multis quidem integumentis obuolutum, sed reiectum & denudatum, tam apertè conspiciendum vobis offeram, ut moræ & expectationis non quinquennis, sed horariz nunquam vos tædere ac pœnitere possit.

Sed dum partium Genitalium conformationem admirabilem diligentius persequor, vereor ne *νυμφεύς* dicar, ut *Aristides*, *Pausanias*, *Neophanes pictores*, quiddam scorta & meretrices venustè pingerent. *Atheniensis* cum honorè habere vellent *Harmodio & Aristogoni*, sceleratissimis & impudicissimis hominibus ob tyrannicidium, nec scortum illis familiare occultare possent, animal numine eius fecere, nempe *Leenam*: atque ut intelligeretur causa honoris, in opere linguam addi vetuere. Sic ego partes illas pudendas, quas multi non satis verecundè demonstrari, nec satis pudicis verbis exponi posse putant, optarem manu potius designare, si veterum *νυμφεύς* intelligeretis, quàm linguà vobis enarrare. Quod si quibusdam videtur *lascia pagina*, *vita tamen probæst*.

Potè succurrit mihi, olim apud *Romanos*, pudicissimam feminam matronarum electam ex centum præcipuis, quæ simulacrum *Veneris ex Sibyllinis libris* dedicaret: & in *Libris* sacris honestam matronam Pudenda virilia coronare solitam, spectante multitudo. Ira spero me nec impudicū aut flagitiosum à vobis habitum iri, ob accuratam partium Genitalium explicationem, eum mei muneris, & rei vestræ sit, ut partes illas quæ crebrò Veneris morsicantibus aculeis infestantur, accuratè persequamur.

## PARTIVM GENITALIVM VIRILIVM enarratio.

### CAPVT XXXI.



**P**ARTES Genitales viri ab usu & officio semen præparandi, conficiendi, & conseruandi, sic distribui possunt. Quædam partes feminalem materiam deferunt, quales sunt *Vena & Arteria Spermatica*, quæ constituant *Vasa Spermatice Differentia*. Aliæ semen præparant, ut *Parastata Crisoides*. Aliæ semen elaborant & perficiunt, ut *Testes cum Epididymide*: Aliæ confectum semen reuehunt, ut *Vasa Eiaculantia*: Aliæ semen conseruant, ut *Vesicula Seminaria cum Prostatis*. Aliæ semen emittunt & eiaculantur instar Syringæ, ut *Penis*. Sed ratione situs, Partes Genitales diuiduntur in Externas, & Internas. Externæ sunt, quæ foras prominent & propendent, ut *Penis & Testes cum Scroto*: Internæ reliquæ, intra ventris alucum latitant. Partes autem externas priùs obseruabis, quàm ad internas deuenias, ordine sectionis ita postulate.

Imi ventris pars inferior *Pubes* dicitur, quasi *πύξ*, vel quasi *πύξ*. At verò *πύξ* ab *πύξ*, quod est delecto, ut notat *Etymologicum magnum Græcum*. Pubis latera, inguina, Græcis *σούκιον*, à *σύν* particula augendi, quæ valde significat, & *σύν*, quod est ascendo, quia de re consule *Etymologicum magnum*. Sacculus Testes comprehensens *Scrotum* dicitur, à dictione *Scortum*, quod pellem denotat. Vnde & prostantes mulieres, quæ pelliculam vuluæ exercebant, *Scorta* dicebantur, quasi nihil aliud præterea essent, Græcis *ἰσχυρία*, *ἰσχυρία*, & *ἰσχυρία* à *ἰσχυρία* à *ἰσχυρία*, ex *Etymologica*. Pars à radice *Scroti* vsque ad Podicem exporrecta, *sternum*, à verbo Græco *στένω*, quod est *στένω*, circumduo, quia pars hæc perpetuo sudore madet. Malè redditur Lati-

nè *interfeminum*, quod nomen apud *Celsum*, puræ Latinitatis auctorem, significat partes genitalis muliebris, vr docet *Theodorus Dammus in Miscellaneis Medicis*. Apud *Aristotelem* latius patet nomen *αἰσθησις*, cum scripsit, *lib. de generat. anim. cap. 2*. Maris partes sunt, *αἰσθησις* *αἰσθησις*, & *αἰσθησις*. Partes omnes istæ *Pubes*, *Scrotum*, & *Penis* usque ad circuitum podicis, pilis luxuriant: quos nulla utilitate ac necessitate illic fructicare quispiam existimaret, nisi *Theodoretus* moneret, tum erumpere cum naturæ verecundia partes illas occultare iubet. Ad velandas igitur partes Genitales pilos Natura produxit. Sed *Hippocratis* doctrina est, pilos ubiunque sunt glandula, enasci: at in *Inguine*, *Scroto* & *Perinas* plures glandulæ sunt collocari: ergo necessariò pili in illis partibus emergunt. Vbi cœnolæ sunt partes & humectæ, inquit ille, *libro de Glandulis*, ibi etiam glandulæ reperiuntur, cuius signum est, quod ubi glandula, ibi etiam pili: Natura enim facit glandulas & pilos ad eundem usum, illæ quidem quod influit, suscipiunt, pili verò ex glandulis opportunitatem habentes nascuntur & angescunt, colligentes id quod in extremitate redundat, ac effluunt.

Part illa prominens, quæ *Virga virilis* dicitur, multis nominibus designata fuit à veteribus Latinis & Græcis. Apud Latinos *Mentula* dicitur, à dictione Græca *μῆν*, ex *Scaligero*, vel quasi *μῆν*, index & nota sexus: *Mure*, *Fascinum pedale*, *colectæ cuspis*, siue *Capulum escorum* nuncupatur, & *Colas* à Græco *κόλα*, unde *canis*, & *Coles*, Testes ipsi, quos Latini à *Lana* etiā *Lanuvius*, & *Cliternius* à *Clitride* dixere, vt avertentent à turpitudine vocem nimis frequentatam, vulgò tamen *Penis* dicitur à pendendo, vt nonnulli existimant. Sed *Tullius lib. 9. epist. 22*. aliam nominis originem profert, *Caudam* antiqui *Penem* vocabant, ex quo est propter similitudinem, penicillus, at hodie *Penis* est in obscenis. Veteres *Veretrum*, & *αἰσθησις* vocabant, inde *Satyrus*, qui veretrum habet immanc: Alij deriunt à *μῆν*, quod est gaudeo & ideo, inde *αἰσθησις* formatur, à quo *Satyrus*, & herba quæ venerem stimulat *Satyrum*: Barbari *Veretrum* vocant, ynde nostra vox Gallica turpicula, *Vit* deducta.

*Penis* terminatur magnâ glandulâ turbinatâ, quæ *balani* dicitur, quod glandis similitudinem præ se ferat: tria nervosa corpora *Penis* comprehendit, & supra ea eminet, vt infernè reuolutum *Præputium* in coitu infra illam eminentiam se recondat, sic æqualis redditur moles & crassities *Penis*, sine vlla inæqualitate & asperitate: fungosa est balani substantia, vt in coitu incalescens intumescat cum toto *Pene*, in ea fici & verrucæ germinant ex luc venere, quibus medetur pulvis *Salinis sicca* inspersus. Reuolutio iterata *Præputij* supra *Balanum* in coitu, magnam delectationem mulieribus excitat, eam ob rem in Orientis regionibus, *Turcia*, *Iudæa* & *Arabia* femine, *Christiano* seruorum consortio magis delectantur, quàm aliorum concubitu, quibus relictum *præputium* fuit, teste *Fallopio, lib. de Decoratione*: & *Frangoso, in sua Chirurgia Hispanica*. Quomodo decartatum *præputium* refarciri queat, docet ex *Galeno* idem *Fallopius* lococitato.

Pellis illa *Balanum* tegens *Præputium* dicitur, quod præ pudendis existat, quasi *αἰσθησις*, non à *præputando*, nam & syllabæ modulus refragatur, & prius ei parti id nomen imposuerunt Romani, quàm scirent à Iudæis eam præsecari solitam.

Nomen apud Græcos vltimè negat *Aristoteles*, quoniam *αἰσθησις* significat communem partem huic pelli & glandi. Attamen *Pollux* *αἰσθησις* vocat pellem supra *Balanum*, summum pellis *αἰσθησις*, quod nomen apud *Hippocratem* vsurpatur pro tota pelle, siue *Præputio, lib. 6. Aphorif. & lib. 4. de morbis*.

Adhæret *Præputium* *Balano* interna tantum parte, ope tenuissimi vinculi, quod in foramine *Balani* terminatur. Hoc si breuius fuerit, *Hypospadiæ* facit, dum *præputij* depressionem impedit. Ab extremitatibus nervorum constari quidam volunt. *Carolus Stephanus* ex tendinum musculorum *Penis* & nervi complexu, emergere veluti filamentum quoddam duplex scribit, ac ipsius glandis coronæ, parte inferiore ad *præputium* extremum usque tendere, quod non solum illic procurrit, sed per rotam glandis superficiem distribuitur, sed à prima conformatione sic productum puto.

Ad medium glandis, siue *Balani*, interna Cavitatis est maior, quàm in duobus extremis, in qua semen putridum, & acerrimum ex gonorrhœa virulenta subsistit, quod magnam molestiam & vredinem mentibus excitat, itaut cogantur *Pene* in lac tepidum demerso meiere: aut fistulam plumbeam vel argenteam intra *Balanum* inferre. Ratione huius cavitatis maior acrimonia percipitur sub finem mictionis in gonorrhœa & calculo.

Cæterum, *Penis substantia* neque ex cartilagine, neque ex carne conflata est, sed ex propria conuenienteque substantia formata fuit, vt in feminis ciectione extendi laxarique posset. Quam enim turpe & scedum foret, quamque rebus agendis alienum, attrecto Pene semper esse, Satyrorum instar: Quam verò incommodum ad res venereas peragendas, eundem semper laxum & stæcidum gestare: ergo intendi & laxari oportebat, quod venustè, licet obsecrènt Martialis amatix suæ indicauit.

*Stare subes nostrum semper tibi Lalia penem,  
Crede mihi non est Mentula, quod digitus.*

Ad eum vsum & actionem Penis ex tribus corporibus nervosis & ligamentosis confectus est. Duo sunt latetalia, quæ *ligamenta Peni* dicuntur. Tertium corpus nervosum & fistulosum duobus illis subtensum, est Vrethra. Interior cauitas ligamentorum spongiosa est, ac fibrosa, pluribus venulis, & arteriolijs, & nervulis intertexta instar retis, vt sanguis spirituosus ibi collectus, cæstro veneris incallescens, partes illas inflare & extendere queat. Ideoque sanguis ibi collectus niger crassiusque est, vt celerimè in spiritus conuertatur.

Huius sanguinis expressione facta, non amplius rubra, vel nigra, sed penitus alba & neruca ligamentorum substantia apparebit, præsertim quoties decoctam inspexisse placuerit. Idcirco Penis eleganter Moly Homericæ *Odyssea lib. 12.* decantato comparatur ab auctore *Preiæperum*, cuius nigra quidem radix est, sed *flus lacteus* exit, id est semen.

*Hinc igitur radix, de qua flus lacteus exit,  
Quam cum Moly vocant, Mentula Moly fuit.*

Hoc loco mirari subit, quomodo hæc duo ligamenta lateralia Penis, quæ nullâ habent communionem cum locis in quibus reconditur semen, quia distant à Vesiculis seminarijs, Testibus, & vasibus spermaticis: nihilominus semen catulliens in genitalibus locis, etiam distenta extrudere queant. Ac sanè si semen suo pte impetu exiliat, vt in exoneitogmo, nihil conferunt ad seminis ei aculationem. Sed in constrictu Penis incalcescentis, Vretham illis interiectam, & simili substantia præditam calefaciunt, quæ cum extremitates vasorum ei aculantium admittat, & accumulantes atque agglutinatas excipiat vesiculas seminarias, non est mirum, si semen Penis constrictu, partim exsuctum & elicatum, partim suo pte impetu elisum violenter erumpat.

In membro virili cum dicitur, pendula virgæ pars à *compensibus* à quibus, vt *Pollux* exponit: *Ruffus Ephesus* quoque cum vocari scribit, ut in quibus *se videtur*, hoc est partem pendunt pendulam & prominentem. At *Umbra*, & *obscura*, & *viridis* quædam, vt *Pollux* addit appellari partem ei subiectam, quæ non proppendet, ut *in compensibus dicitur*. Ex *Ruffo Epheso* & *Polluce*.

Possit aliquis ex *Aristotele*, in Pene duplicem meatum constituere, vnum semini, alterum vrinæ traiciendæ dicatum, quod fecisse videntur *Arabes*, vt docet *Vesalius*, & similem conformationem in quodam obseruauit. Sed si probè intelligatur *Aristoteles*, duplicem quidem scissuram admittit. Vnam supra, quæ est vrinæ emittendæ destinata. Alteram infra, quæ est semini traducendo dicata: & ista duo foramina intra Vrethram continentur. Sic ille *lib. 1. de hist. animal.* Ad vesicæ collum adnexum est veretrum altero foramine, quod extrinsecus videtur peruium, alterum paruum est paulò infra, quorum hoc quidem ad Testes, illud ad Vesicam nervosum atque cartilaginofum tendit, quod est Vrethra.

Notabis ab vno tubere Isehij ad aliud, *Transuersum ligamentum* protensum esse, positum ad radicem & exortum musculorum ac celeratorum, quod non tantum præbet firmam originem illis mûsculis acceleratorijs, & externis eleuatorijs ani, sed etiâ sustinet & amplexatur corpus Penis, qui etiam interuentu durissimi ligamenti firmiter adstringitur cauo, siue fissuræ, iuxta coalitum osium Pubis. *Testes sunt glandulosæ acrolati spongiosa corpora*, semini conficiendo destinata. *Celsus* tamen *lib. 7. cap. 18.* scribit Testiculos simile quiddam medullis habere, quia sanguinem non emittunt, & omni sensu carent, dolent autem in ictibus & inflammationibus tunicæ, quibus ij includuntur. Ego verò *fibrosam esse substantiam* Testiculorum sic deprehendi.

Cum sæpius Testiculi putrefacti substantiam digitis distraherem, eam instar retis in fibras multiplices admodum duiles semicubiti longitudine producebam. Iis autem fibris tenuissimis, lineam fibrosam inseparabilem à Testis tunica, atque circa adhæsum Epididymidis, & in extremis huius corpusculi intra Testis tunicam obseruabam, atque

Poros quinque vel sex, per quas seminalis materia à Parastata Cirfoide in Testis substantiam illabitur, & elaborata inde exfugitur, vt traducatur in Vas Eiaculatorium ab Epididymide productum.

Quamuis Testes videantur æquales mole & magnitudine, & quoad situm æqualiter suspensi teneantur ad æquilibrium, vnde *Athenæus* à Græcis à *Plinio*, Pares dicuntur, Naturâ tamen comparatum est, vnumquemque Testes inæquales, hoc est alterum alto maiorem, & vasa etiam maiora & semine turgidiora habere: Vt plurimum sinister talis est, qui destinatur generationi feminarum, quas natura magis intendit.

Notauit *Galenus*, Testiculum sinistram esse naturâ frigidiorē, vel, vt *Aldus legit*, varicosiorem dextro, ob eamque causam Scrotum quo inuoluitur, laxius esse; inde colliges sinistram Testiculum magis propendere.

*Aristoteles*, lib. 1. de generat. animal. cap. 4. Testes extra septum Peritonæi, & cauum abdominis eicctos esse scribit, castoris vitæ causâ: forsan etiam foras exiliere, vt femorum confictu magis incallescere, potentiusque seminale humorem exfugeret. Adiungo sic eicctos & pendulos Testes, atque vasa spermatica, tam deferentia, quàm eiaculantia supra Pubis ossa traducta, in viris magis proritare Venerem, dum in congressu maris & femine mutuo affictu, mollique ossium pubis concussione, genitales partes agitate incallescunt, quod non accidisset, si intra cauum abdominis fuissent absconditæ.

Testes autem dicti sunt, quod testentur vixilitatem, vnde iocus *Plantii in Curculione*, Quidquid ames, amo testibus presentibus: & apud *Auctorem Presaporum*, Magnus testibus ista res agitur: Vel potius Testes dicuntur, quod mortem & salutem ægotantium testari videantur. Nam relaxati & oblongi moriturum, adducti & contracti seruatum iri aiunt, quod verissimum esse, & à se pluries obseruatum asseruat *Carpus*, comment. in *Mundinium*. Poma etiam amoris nominantur à *Poetis*. Sic de Testibus interpretor locum insignem *Plantii in Amphitrone*, act. 2. Sc. 2. vbi loquitur seruus *Sofia Alcmena Hera sua*.

Enimvero pręgnanti oportet & malum & malum dari,  
Vt quod obradat sis, animo si male esse occuperis.

Omnes hunc locum de malo granato interpretantur, sed videtur potius de vsu Testium intelligendus, quia variis in locis docuit *Hippocrates*, grauidis vtilem esse Venerem, imò ad facilitandum partum plurimum conferre.

Et eodem sensu interpretandum Distichon hoc in *Presapeis*.

Quod mouear non est, quia si furaberis ipsa

Grandia mala, tibi brachica mala dabo, id est, parua.

Consimile & elegans extat alterum Epigramma xv. de penis, quæ significant Testiculos, quæ Græcis *ἰσχῆρ* dicuntur, *ἰσχυρ* enim est, quæ dux populi, quasi animalia testiculos habentia sint duces totius gregis, vt *Vir gregis ipse caper, ex Virgil.* Vel quod illi *ἰσχυρ*, appetitum suggerant, vel quasi *ἰσχυρ*, hoc est accessus, *ἰσχυρ* enim quod genitale semen in eos perueniat, ex *Melesio*.

Admirabilis est, & vix credendus nisi oculatis testibus, Penis & Capitis consensus, quem aliquot exemplis probat *Alexander Petronius*, lib. 2. cap. 17. de morbo *Italico*. Magnus Penis durum & stolidum ingenium ostendit, asinino simile, quod genus animalis magno mutone præditum est. Ad formam nasi, Penis magnitudinem cognosci asseruat *Physiognomonis*: & *Aristoteles*, lib. 1. de hist. animal. cap. 9. notat quandam esse proportionem faciei ad totius corporis partes, & sibi inuicem correspondere in corpulentia vel gracilitate. Ideoque Nasus correspondet Peni, quibus longas & crassas, eadem Penis forma. Nasuti apud *Lampridium* viriliores, ac veneri aptiores censentur. Ille in vita Antonini Heliogabali, quem scribit fuisse extremi luxus ac nefarie libidinis hæc habet, Subactarius vel emissarius innumeros collegit, ac Nasutos vocabat, quibus ad libidinem exercendum scelestissimè utebatur. Apud *Ezechielum* cap. 23. impudica Ossa infanivit libidine super concubitum *Aegyptiorum*, quorum carnes sunt, vt carnes asinorum, & sicut fluxus equorum fluxus eorum, id est, Verenda tam grandia habebant, vt equorum & asinorum æquarent deformitatem.

Ex *Hippocrate* eleganter *Laurentius*, post delictissimum *Duretum*, in *Coacis*, mirabilem Testium, & Pectoris in Viris, mammarum & Vteri societatem animaduertit, sed quomodo fiat istud consortiū & commercium non satis accurate docet: opinatur enim in viris, partim ratione costalis nervi fieri, cuius portio manifesta ad Testes defertur,



partim ratione extremitatis *ἐκτετακται*, quæ in renalem aut spermaticam definit, quod non est verum: sed scopum non est allequutus, quoniam eo modo fit in viris ac in mulieribus isthæc sympathia.

Idcirco credo per communionem Mammariz & Epigastricæ, quæ iuxta Podendum oritur perfici, nec repudio communionem illam nervi costalis, qui utrimque ramulum delatum secundum longitudinem Peritonæi superne adhærescentem, & apophysin Peritonæi comitantem, Testi suppeditat, quoniam videmus in amputatione Testis in castratione, convulsionem inchoare à *γυναικίᾳ πάσῃ*, qui ratione muscoli latissimi totum collum obvolvuntis, & ad faciem pertingentis accedit, auctore *Galenus*: at hic nervulos habet à recurrente. Forsan affectio Testiculi, quæ partibus omnibus peræque communicatur, magis effulget in Thoracis partibus, ratione motus illius coacti, qui per tussim excitatur, quia tussis non tantum à Pulmonibus affectis oritur, verumetiam à partibus Thoracis, putà à musculis intercostalibus, & pleura, quæ nervos habent à costali.

Historia partium Genitalium internarum multis difficultatibus intricata est propter auctorum inter se discordiam. Imprimis non convenit de *Tunicis Testicularum*: quinetiam de *ipsarum usu* inter artifices dubitatur. In *Parastatis & Prostatis* magna est Anatomicorum ignorantia. De *Vesiculis seminaris* insciter agunt. Quæstio de *Tunicis* consistit in numero, & appellationibus. Quod atinet ad numerum, *Vesiculus* quatuor Tunicas agnoscit. *Columbus* quintam addidit, si veterum autoritate certandum, *Galenus* tres proposuit *Oschæon, Dartion, & Erythroidem*. *Rufus Ephesius* quatuor admittit, & in Communes atque Proprias distinxit. Communes facit *Oschæon & Dartion*. Proprias, *Erythroidem, & Nervæam*. *Paulus Ægineta* libro 5. internario numero consistit: fatetur tamen *Erythroidem* in duas partes dirimi posse.

Semper 5. Tunicas demonstro, 2. Communes, 3. Proprias. Prima *Scrotum* dicitur, ex cuticula & cute constatur, parte sinistra laxius est. Idcirco sinister Testiculus magis propendet, ex *Galenus*, lib. 14. de *Vsu part. cap. 7.* Secunda *Dartion* nominatur, panniculi carnosus productio est. Improprie hoc nomen tribuitur ei tunica quæ Testem immediatè cingit, quia non potest excoari, & est contra mentem *Galenus*. Nam *ἀπὸ τοῦ* dicitur *τοῦ τοῦ*, excoriare, quod sit separabilis, vel à *δύο*, quod est cubare, quasi Testes cubare videantur intra hanc tunicam. Vel *ἀπὸ τοῦ τοῦ* dicitur *τοῦ τοῦ*, quod sint extra pelliculam, tanquam separatæ membranæ, ex *Meletio*. Ex propriis Tunicis prima *Erythroides* dicitur, dilatatio est cremasteris musculi, ortum dat herniæ carnosæ: quæ non potest perfectè curari nisi avulso Teste: *ἀπὸ τοῦ τοῦ* autem dicitur, an quia *ἐρυθρὰ*, rubra, an potiùs ab *ἐρυθρὰ*, quod est *αἷον*, à ferendo subsidio? vel à latitudine: nam *ἀπὸ τοῦ τοῦ* & *ἐκ τοῦ τοῦ* à *ἐρυθρὰ*, quod latum significat. Secunda *Elythroides*, quod glandis calicem repræsentet, productio est Peritonæi. Tertia *Nervæa* nominabitur cum *Ruffo*: à quibusdam *Albuginea* dicitur, Testem immediatè succingit, nec ab eo separatur, nisi mollis aut patris fuerit Testiculus.

In usu & actione Testium à *Galenus* reprehensus & irritus fuit *Aristoteles*, quod existimavit Testes tanquam pondera telis textorum appensa, sic vasisspermaticis adiunctos fuisse, ac proinde nihil conferre ad generationem seminis. Sed *Aristotelis* mens ea fuit, Testes non dare formam semini, sed dumtaxat materiam seminale à Corde iam imprægnatam virtute genituali, excoquere & perficere, ergo in Testibus fit akeratio materiz, non substantialis ac formalis mutatio, semen autem in Testibus coneoqui docet *Aristoteles*, 1. de generat. animal. cap. 6. cum agit de piscibus: semine iis non est paulisper concoquendum cum coëunt, ac pedestribus & viuis paribus, quia non habent Testes materiam seminis præparantes: Meatus anfractuosis prope Testes contineri declaravit eodem capite. Anfractuosi meatus pars altera sanguinea est, qua recipitur materia seminis. Nonne dicit aliquis, seminis generativa facultas dependet à Testibus, si seminis materiam excoquant: id verum esse fateor ratione materiz, non facultatis, quæ defluit ex *Aristotele* à Corde: sic semen eorum qui Cor habent calidius, mares procreat, si frigidius feminas, ex *Aristotele*. Imò per se stare non possunt Testes absque calore influente à Corde.

Concedimus etiam spiritum illum genitorem, qui à Corde emanat in Testibus etiam aliquid acquirere, ut fiat prolificus, sicuti à cerebro spiritus Cordis animalitatem accipit ad sentiendum: etenim agnovit *Aristoteles* Testibus exsecis habet corpus mutari in Spadonibus, quoniam parvæ partiæ corruptæ aut sublatae magnas

Mens Aristotelis, sic explicatur à Cocconi.

in corpore mutationes sæpius pariunt, libro 4. de generat. animal. cap. 4. Cùm autem animaduerteret *Aristoteles* plurima animalia semen effundere sine Testibus, cuiusmodi sunt pisces & serpentes, in piscibus vero meatus semine candido referti teporianantur, iudicauit Testes non esse absolute necessarios generaliter loquendo, sed comparatos ad conseruationem seminis, ne statim egrediantur. Ideoque anfractus & reuolutiones vasorum circa Testes paratæ sunt, ne libido celestiter excitata citò deficeret, quod quidem noceret in generatione perfectorum animalium.

Sed præter actionem illam perficiendi feminalem materiam, habent etiam Testes vsum pondere suo, dum in eiaculatione seminis distendunt & retrahunt vasa spermatica: ideoque hunc vsum obtinere, non quatenus prolifici, sed prout sunt penduli & ponderosi: dum enim semen feruidum & catulliens æstu veneris percitum in coitu, impetuosè profilit Testibus, non posset commodè traduci per istas reuolutiones vasorum spermaticorum, nisi firmarentur & stabilirentur, ac veluti retraherentur pondere Testium, ideoque ratione suspensionis tanquam pondera telis textorum appensa, conferunt ad eiaculationem seminis.

Facile probatur ex *Hippocrate* Testes foecundos esse, & ad seminis generationem conditos esse: Nam ad maculeam vel feminæ prolem habendam, alterutrum Testem ligandum esse scripsit, libro de superfetatione, & lib. 6. Epidem. Hircine incipiens vter Testium foris apparuerit, si dexter masculum, si verò sinister, femellam portendit. Atque vt lib. de genitura, semen per medios Testes deferri notauit: proinde verè scribit *Democritus*, in epistola ad *Hippocratem*, Testes foecundos esse, & ad generationem comparatos fuisse.

Non insitiantur Anatomici, Testes ad elaborationem seminis conferre: sed quæstio est, si per contactum *Physicum*, aut *Mathematicum*, semen ab ipsis elaboretur, quia Testes nulla cavitæ præditi sunt, nec vasa spermatica deferentia intrò subeunt. *Fernelius*, *Fallapius* & *Columbus* feminalem materiam Testis substantiam non ingredi affirmant, sed tantum epididymidi vas deferens continuari: contrarium tamen docet *Wier*. Testes enim quum sint laxi & caernosi, humorem feminalem excipiunt, quia etiam dissimilis substantia vas Deferentis & Eiaculantis manifestè docet, eiusmodi vasa non esse continua.

Itaque satendum semen in vasis Deferentis extremitate præparari, in ipsa Testis substantia elaborari, in vasis Eiaculantibus perfici. *Corpus comment. in Mundum* docet seminis materiam à Teste admitti, elaborari, postea traduci in vasa Eiacularia, pag. 181. de qua quæstione copiosè tractauit *Ingrasius comment. 52. in artem paruum Galeni*. Miror quomodo *Spigelius Anatomicus* opinioni *Fallapij* fauere voluerit, scripseritque feminalem materiam non ingredi Testem, sed per epididymida traduci. Testis substantiam glandulosam dumtaxat serosum humorem excipere.

Vas autem Spermaticum deferens non tenero circumiectu lambere & perreptare Testiculum, sed intrò subire ac penetrare, humoremque feminalem in ipsum demittere, apertè demonstrat historia, quam *Dodonæus* recitat. *Anglus* quidam Testis dolore intolerabili diu vexatus, frustra tentatis omnibus remedijs, maluit sibi amputari Testem integrum & incorruptum, quàm diutius vitam in tormentis trahere: extractum Testem cùm adhuc calentem per medium difficaret *Dodonæus*, in faciem ipsius erupit, & profiliit semen.

Ego verò in Testiculo dextro ter hydrocelem vidi; aquosus humor internerueam tunicam & elytroidem continebatur, euidentes erant tres aut quatuor propagines vasis Deferentis, intra Testem vitiatum, & sanguine sanioso refertum dispersæ.

Equidem fateor in Testibus sanis ac integris virorum, semen nullum aut exiguum seruari, in Testibus mulierum abundantius reperiri, quamuis serosum: nihilominus affirmarem feminalem humorem Testis substantiam intrò subire ac permeare, vt ibi foecunditatis sigillum & characterem acquirat: sed cùm sit tenuissimas & spirituosus, post mortem dissipatis spiritibus, nullum aut exiguum in Testibus superesse. Quod si Testem exactè diuidas per partem insertioni vasis Deferentis oppositam, exigua foraminula inuenies, per quæ feminalis humor subit & ingreditur Testiculi substantiam: & si digitis parenchyma Testis atteras, tres aut quatuor furculos à vase Deferente prognatos è directo insertionis offendes.

Egregius feminis non est ita euidentis: sed obseruabis Epididymida, corpus supra-



tatione vasis Eiaculantis eiusmodi cellulæ generantur. Tres sunt vel quatuor setatim dispositæ, tanquam apum alveatæ, ita ut ab una in aliam transitus pateat. Inter Rectum Intestinum, & Vesicæ cervicem latitant, innumeris venulis & arterioli capillaribus cooperitæ. Si semen contineant, cur innumeras venulas & arteriolas extrinsecus implicatas habeant, iure quæri potest. *An ad nutritionem? An potius ad humoris oleosi generationem?* quem necessarium esse statuit *Galenus* ad lubricandum & irrigandum Vrethræ meatum, ne urinæ acrimoniam lædatur. Cuius humoris defectu stranguariam exortam vidit ipse *Galenus*, ut memorabili historia docet, & in aliis observavit *Alexander Benedictus*, & ego pluries in aliis vidi & annotavi, edoctus à *Galenio*. Ideoque in Vesiculis oleosus humor continetur potius quam verum semen.

Quapropter etsi Testes exsecti fuerint, humorem tamen seminale infœcundum, qui partes genitales titillet, in Vesiculis & Prostatis posse generari non dubito: qualem effudisse multos innumeris historiis comprobatur. *Smetius in Miscellaneis pag. 545.* narrat de quodam maniaco, qui cum ambos Testiculos sibi extraxisset, ubi mens sana in corpore sano restituta fuit, maritale debitum vxori persoluebat cum seminis profusione, ut antea, quod ipse & coniux candidè confessi sunt. Similem historiam adducit *Jacobus Fontanus, Professor Aquensis regius, in sua Physilogia*, de quodam nobili, cui cum uterque Testiculus catapulta euulsus fuisset, nihilominus ex pudica vxore filium suscepit, quod non crediderim. Memorabilis est historia quam recitat *Abrahamus*, de quodam milite salacissimo, ob adultetium suspensio, & publicè dissectio, in quo nulli Testes inuenti, quamvis vasorum spermaticorum conformatio perfecta cum semine candido adesset. In quodam adolescente annos 5. nato quem in Scholis publice fecabam, vnicus aderat Testiculus, isque sinister, marcidus ac vitiosus; dextri pet castrationem, aut per punctum aureum exempti nulla erant indicia, quia nec in scroto, nec in inguine vlla cicatrix apparebat, sed intra scrotum Vasa Deferentia & Eiaculantia continuata erant, & extenuitas Eiaculatorij dexteri æqualis erat sinistro, semine quoque turgebat cum Vesiculis Seminariis adnatis.

Quum igitur duplex *Humor Seminalis*, nempe *Prolificus*, & alter *Salinalis infœcundus*, in partibus genitalibus contineatur, quibus in locis residendi explicandum. Forſan putaret aliquis Humorem Salivalem in Vesiculis seminariis afferuari, quia flavescens in illis reperitur: Prolificum vero in glandulis Prostatis colligi, ex quibus candidus profluit; diversis quoque locis in Vrethram excernuntur. Nam Vesiculæ suum humorem per foramen carunculæ obturatum expuunt & eructant. Sed infra carunculam tria sunt utrimque foraminula, per quæ prolificus Humor à Prostatis expressus transiit. Vel salivialis humor spermaticus, excrementum est serosum ipsius seminis, dum in locis genitalibus catulliens regurgitat. *Aristoteles, libro 10. de historia animal* præter feminalem humorem prolificum, quem attribuit mulieribus, etiam alium effundi in locos muliebres scribit, qui est exsudatio eius loci, sicut saliva, quæ tunc exceptis cibis, tum inter loquendum solet euenire; ut fusiis *ibidem* explicat, ac sane qui in Vesiculis coërcetur Humor seminalis, videtur excrementum esse veri seminis prolifici, quod in Vasis eiaculantibus spirituosum & ærium, ut in ipsis Testiculis continetur. Uterque tamen humor in coitu effunditur, simulque miscetur & confunditur, ut verum semen tanquam animatum corpus, habeat unde nutriatur, & concorporetur. Nam ex *Theophrasto, libro 1. de Causis plantarum*, semina omnia aliquid in se alimenti continent, quod una cum generandi principio natura profundit, sicut in ovis, &c.

Neque probabile est præstantissimum Animal, Naturæ miraculum, Hominem intelligi, ab excremento Testium (si semen tale sit) generari. 1. Semen ærium & spirituosum inter Urinæ & stercoreis vtres, tam male locari. 3. Iuxta foramen Vrethræ carunculæ obturatum, spiritus seminis exhalare posset, ideoque innumere illæ venulæ, vel potius arteriolæ, quæ vesiculas seminarias circumdant, videntur ad conservationem & generationem istius feminalis humoris excrementitij comparatæ. Adde quod Eunuchi feminalem humorem emittunt serosum & infœcundum. Nam mulierum sunt Amatores maximi, ex *Terentio*. Id confirmat *Martialis, lib. 6. Epigr. 67. Juvenalis Satyra 6.* Eunuchorum amores, & cum iis mulierum oblectationes, eleganter describit. Ideoque Turcarum Imperator caudam salacem radicibus demere iussit viris custodibus sui famosi lupanaris, quod *Serrasi* vocant, cum animadvertetet ea parte adhuc eos uti libidinosè cum suis pellicibus, teste *Julio Cesare Scaligero*,

contra Cardanum, Exercit. 104.8. Non sine ratione Hipp. coitum naturis pituitosis conferre scripsit, quia plurimum excrementi simul cum vero semine profunditur. Interea notabis in Vesiculis Seminariis & Prostatis sedem esse gonorrhœæ virulentæ, & ratione situs earum partium quæ in Perinæo consistunt, equitatione longa, vel succussatione ab equo, gonorrhœam virulentæ perfunilem excitari, sed quæ breui per-  
sanatur.

Et ex cognitione situs earum partium discies, ex *Rondeletio*, ubi topica remedia tam interna quàm externa, ad sistendam gonorrhœam admoveeri debeant. Situs autem istarum Vesicularum & Prostatum, facit, inquit *Rondeletius*, ut qui alio sunt sic-  
ciores sint libidinosiores, & huic morbo magis obnoxij, facitque, ut si tales venere abstineant, etiam alui excrementa retineant, & difficulter dura reiciant. Facit etiam ut si glandulæ ipsæ & partes laxentur, exonerenturve aliquantulum, vel cum medi-  
tantur excretionem seminis ob mulierem præsentem, cogantur prius alium exone-  
rare quàm concumbant, facitque vesicæ tumor, ut hæ partes in meatum vrinarium non possint semen emittere, comprimit enim à superiore parte meatum.

Ex situ Vesicularum Seminalium indicare licet Scytharum sterilitatem, & coeundi impotentiam, non aliunde ortum habuisse, quàm à resiccatione Vesicularum sem-  
inalium, ex alia equitatione, non autem à sectione venarum pone aures, vel mor-  
bo coxendico, ut narrat *Hippocrates*, libro de *Aëre & Aquis*, &c. Inde obseruabis Cystoromiam, quæ administratur ad eruendum Calculum grandio-  
rem, eos pleu-  
que reddere ad Venerem inualidos, aut infecundos qui scdij fuerint, ob laceratio-  
nem ~~venarum~~, Vasa-  
Eiaculantium & vesicularum seminalium lateris dextri &  
sinistri.

Demum ex situ vesicularum seminalium, quæ sunt supra Rectum Intestinum po-  
sitæ, benignè interpretaberis *Aristot.* Problema 27. scilicet. 4. quod repetit, cap. 10. 1. 1. de  
*generat. animal.* De seminis excretionem contra naturam in iis, quibus intercepta com-  
munis via per Penem, tum enim ex semine ibi putrescente erodi potest Intestinum, &  
qua datâ portâ semen effluet. Ideoque non adeo impudicus & flagitiosus censeri de-  
bet *Aristoteles*, quasi posticam Venerem suaserit, vel huius flagitij causas naturales  
pretulerit.

Præterea notabis facilem castrandi modum sine vlla sectione, si pyrotico escha-  
rotico vasa spermatica, tam deferentia, quàm eiaculantia in productione Peritonæi  
inclusa, in inguine supra ossa Pubis comburantur: cauendo diligenter ne penetres ad  
vasa cruralia, puta venam & arteriam subiectas, quibus erosus mors ineuitabilis con-  
sequeretur, sic enim intercisus vas, Testiculus sensim marcescit, & exsiccat, suo  
pabulo defraudatus.

## GENITALIUM. PARTIVM VIRILIVM

### Administratio Anatomica.

#### CAPVT XXXI.

**I**n administratione partium Genitalium sic procedes. Cutem in inguine, scro-  
to & pene separabis, & quia cuti tenuissimè adhaeret, Panniculus carnosus,  
qui Dartos in istis partibus nominatur, simul cum cute eximetur, sed max à  
cute curiose rescabatur. Deinde, productionem Peritonæi per inguina in  
scrotum deorsum insuere, ut extrinsecus fibris carnosus confersa esset, vel po-  
tius obvoluta membrana carnosa, qua manus ab expanso cremasterem. Intus continet vas de-  
ferens ex arteria & vena spermatica simul implicatis contextum, ad Testiculum descendens:  
& Eiaculatorium à Testiculo ad inguina remeans. Interea notabis insignem neruum à lum-  
bis prodeuntem, qui comitatur Vesterem, & cum vase spermatico deferente sese infundat in a-  
poplysium peritonæi, ut Testi communicetur. Alter neruus reperitur in administratione mus-  
culorum abdominis, à Lumbis exortus, infra umbilicum per inferiores partes musculi Obli-  
qui Ascendens obliquè ad inguen deducitur, & in cremasterem & apoplysium peritonæi ablu-  
tescit. An ratione huius nerui vel alterius, spasmus cynicus nono die accidit in euul-  
sione Testis? quod signum est lethale.

Postea conveniunt tres proprias Testiculū tunicas solis digitis lacerare, atque diducere. Prima est Erythrois, cremasteris propago. Secunda Elythrois, peritonæi productio. Tertia Nervosa reliquis densior, in Testiculū mollioribus & vitiatū à carne Testis præsum abscedit.

Detrahit tunicā obferna insertionem Vasis Deferentis, quod quia variōsum prope Testem, Parastata Cistoides appellatur. Epididymidis naturam expende, atque Vasis Eiaculatoriū ortum ab Epididymide, & ascensum ad inguina, inde per declivē coxarum ad Vesicā ceratē descendentis, quem progressum natura fecit, ut semen per ascensum & desensum in illarū spiritus vini sublimatum, purius & perfectius existeret.

His peractis quatuor penis musculos innestiga, quos intra femora prope scrotum invenies, detrahit prius adipē copiosū superiectū, duo sunt Recti Acceleratores à Sphinctere ani prodeuntes, qui Vrethra incubant, duo Obliqui Ereectores altius demersi, lateraliū pudendi ligamentis superiensi, à tubere Ischyj supra priores enascuntur.

Post administrationem musculorum, structuram Penis examinabis, cutē & darto convegitur, ex tribus ligamentis canerosis & fistulosis concorporatur, quorum duo lateralia ad erectionem Penis inferuntur, tertium illis substratum Vrethra nominatur, canalis seminis & urinae: innitē simul tria ligamenta, terminantur ac velati umbone copulantur, appositionē Glāndula intus nigricantis, ut augeri & impuui possit: Balanus dicitur, cutē tegitur meabili, quā facili denoluitur & reducitur, Præputium appellatur: quod cum fiat ex cutē reduplicata, duplici constare tunica notabis; nec dum in phymosi secatur, externam membranam intus attingas.

Præter duo ligamenta lateralia, Tertium aliud latum & candidum, ac veluti carnosum transversum duobus illis superiectum est, quod à superius partibus symphyseos Osium pubis evatum, sulcri modo, Vrethram, & duorum ligamentorum iuncturam sustentat, quale etiam in muliere reperitur ad Cunnū elevandum. Vnumquodque ligamentum refectas, ut quod intus quoniam nectatur, inspicias. Internam cuiusque substantiam fungosam ac fistulosam, atque sanguine referant videbis, Vrethra confimilis est substantia. Inde colliges non produci à Vesicā nervosa & candida: quin etiam cutē Vesicā separatur, & abscedit ab Vrethra, quā nigror est prope Vesicā, quā in medio ductū. Falsum est in membrana interna Vrethra quosdam veluti circulos observari, ad similitudinem eorum, qui in aspera Arteria sunt, quorum beneficio contrahi & extendi posse credunt.

Molti dubitant, si carnositas in toto Vrethra ductū generari queat, quoniam in diffectū cadaueritū nulla talis hyperarcasī unquam apparuit. In Vene ad radicem usque ligamenti lateralis utrimque bius insignes nervi contiguos & coherentes invenies, quorum unus circa medium Penem in cutem absorbitur, alter ad balanum usque protrahitur, enascuntur ab Offe facto.

Circa radices eorundem ligamentorum plurimas venas & arterias infirmas ab hypogastriis derivatas reperies, quæ in ipsa ligamenta abeunt & oblesciunt, ut si; quin etiam illis suppediunt, eorum tamen vasorum portiones & notabiles Penis corpus lateralius perrepantes, inter geminos nervos media consistunt. Ut autem vasa Penis tam nervi, quā vena & arteria compareant, ligamenta lateralia ab Osibus separabis.

His administratis ad anum descende. Cuius musculos in viris & in mulieribus novem perquiras, ut describuntur in Myologia, & dissecantur in Myotome: lenatores sunt sex externi, duo à tubere Ischy enati, alij duo laterales & lattores, qui intus delitebant: Tres sunt Circularis, Sphincter externus casianus, & alter internus carnosus atque latus, tertius oblongus infra vaginā, totum Rectum Intestinum foris amplexatur. In mulieribus sapius obferna musculum levatorem à cœcyce ad Sphincterem productum, ne in violento exitu precipitatus anus. Alter est parvus & acuminatus supra acceleratores extensus, qui recellit Pedicem.

Inde recurre ad Ossā pubis, quā adactō tenuissimo scalpello, non nonacula, ob dorsū crassius, per medium cartilagineus commissurā disjunges, ipsiq; femoribus magnā vi distrahis, per patentissimum illam litatum, Rectum Intestinum, Vesicā, Penem, simul ac iuncta radiciū extirpabis: excipias, lota, super liatēum nitidam extensa, membranam examina. Vel si lubet singula in suo sinu observa, prius tamen reculā membrāā internā peritonæi, quæ partes spermaticas contegit duplicatā peritonæi conclusas. Idcirco viri, corrupti seminis retris vaporibus non ita crudeliter insistantur ut mulieres, quia Testes & Vasa Spermatica, ubi semen afferunt, extra cauum Peritonæi continentur, septoque membrano separantur.

Imprimis Eiaculatoris Vasis extremitatem varicosam tribus vel quatuor cellulis distinctam notabis, Vesiculas feminarias vocant Anatopici. In his humor oleaginosus stanscens in-

cluditur. Postquam Eiculatorium ita reduplicatum Vesciculas istas effluxit, ad basim colli Vesicæ profertur, nec cum suo pari vicinò coalescit, & confunditur, sed tantum iungitur, sic iuncta duobus glandulis abundatur, quæ Prostatæ dicuntur. Aride sunt & exsiccæ in quibusdam, in aliis semine turgentes videntur. Intra suam glandulam unumquodque vasculum Eiculatorium traducitur, inde sit, ut humor seminalis qui à Prostata elusa & compressa exsudat, albus sit, qui verò e vesiculis feminariis, flavus appareat, quoniam post obitum in his glandulis melius semen asseruatur, quàm in vesiculis, ubi ratione sitas faciliè corruptitur, vel dicere in istis vesiculis seminaris dumtaxat oleaginosum humorem accernari, qui quotidie sensim effunditur ad irrigandam Vrethram, & cum semine profuit ad eius nutritionem.

Post glandulas illas intra Vrethram, Eiculatorij utriusque orificia adposita est Caruncula, quæ instar valvulae utrumque orificium claudit, ne urina in Vrethram effusa resinat in vasa seminaria, vel ne nobis inuitis semen effundatur. Hac ab ignavis Chirurgis cathetere deprehensa cum renisâ, pro carnositate habetur, quæ causticis erosa & consumpta, perpetuam parit gonorrhœam. Infra & iuxta Carunculam utrimque tria vel quatuor foraminula indagabis, per quæ semen à Prostata in Vrethram exprimitur. Prostatis spinulicerem tenuissimam & latissimam Vesica circumiectum observabis. Vi autem Caruncula, foraminula Prostatae, & urina egressus inspiciantur, Vesicam aperiet, & discipula eius cervice cuncta hac apparebunt.

## IN PARTES GENITALES MULIERIS PRÆFATIO.

### CAPUT XXXIII.



VIT Romæ pictor celebris Arellius, ante Diuum Augustum, nisi flagitio insigni corrupisset artem, semper allucius feminæ amore flagrans, & ob id Deas pingens dilectarum imagine. Itaque in picturis eius scorta numerabantur. Vereor ne idem mihi obiciatur, atque probro & dedecoti vertatur; quod ego satis in arte Anatomica spectatus, quam à triginta annis operosè ac studiosè tractavi, Mulierum tamen Anatomias oblectari non desinam. Cadaver viri nostrum Theatrum Anatomicum aperuit, huic feliciter & opportunè succedit Muliebres, ut ex hoc coniugio Anatomico viri & mulieris, partium Genitalium discrimina cognoscatis. Quod quidem spectaculum vobis, non sine lascivia verborum potest exhiberi; vobis inquam castis & pudicis iuvenibus, quibus non licet, nec decet impudica audire verba: forsan etiam periculosum nudam Venerem adspicere. Nihil enim est tam pronium ad libidines, quàm ea quæ vel natura abscondit, vel disciplina velavit membrorum operta nudare. Flagitij principium est nudare inter ciues corpora, inquiebat Ennius apud Ciceronem, lib. 4. Tuscul. Quod Romule lege prohibitum erat: sic contra Solem Lunamque nudari nefas, ex Symbolo Pythagorico. Quamvis Plato, lib. 4. de Republica iusserit priusquam nuptiæ contrahantur, à Medicis & obstetricibus mares nudos observari, feminas quoque ad pubem usque nudas inspicere: hunc ramen morem tanquam indecorum & impudicum Iustinianus Imperator abrogavit. Inscius Aëxon à canibus discerpitus fuit, quod nudam sine veste Dianam vidisset, Terebias cæcitare plectitur, quod Minervam nudam inspexisset, teste Propertio, lib. 4. Candaules Lydorum Rex, quod uxorem suam nudam spectandam præbuisse Gygi, amico suo singulari, vitâ priuatus fuit ab ipsa vxore, quæ ad hoc facinus adegit ipsum Gygem, quoniam mulier depositâ tunica simul & verecundiam exuir, ex Herodoto lib. 1. Sed porissimum nuditas partium Genitalium apud omnes gentes ignominiosa fuit. Adam erubuit cum se vidit nudum, & noluit in conspectum Dei prodire, Genes. cap. 7. Apud Prophetam, Deus minitatur hanc ignominiam populo suo. Reuelabo pudenda tua, & ostendam gentibus nuditatem tuam. Sic apud Homerum, Ulysses Theritæ minitatur verbera, & nuditatem, aululis pudendorum velaminibus. Apud Milesios, virgines quæ se suspensio necauerant, nudæ exponebantur, quod à tali scelere detererentur: Barbari in Christianarum mulierum supplicio, quo grauior esset infamia, partes eas detegi & nudari iubebant, quas naturalis pudor abscondi voluit, referente Nicephoro, lib. 7. cap. 8. lib. 10. cap. 9. Apud Ovidium Metamorph. lib. 13. Polyxenz in sacrificio occisæ,



*Tum quoque cura fuit, partes velare pudendas  
Cum caderet, castique decus seruare pudoris.*

Idcirco, inquit *Diuus Ambrosius*, lib. 1. *Officiorum*, indumentis operiuntur hominum genitalia, ne deformia visu, obrutum aciemque perstringant oculorum inuentium.

*Quis furor est quæ nocte latent in luce fateri,  
Et quæ clam facias, facta referre palam:  
Ignota meretrix corpus inuoluta Quiriti,  
Opposita populum submonet anisæ ferâ.*

Amo quidem callitatem & pudicitiam, sed magis libertatem dicendi & docendi, cum in re ipsa nullum sit turpitudinis flagitium, sed in abusu. Perfatum mores inhumanos detestor, apud quos nudum hominem inspicere grande nefas erat, ac sæua morte piandum. Sic apud *Lydos*, & ferè apud cæteros quosque barbaros, magno probro fuit virum etiam nudum conspici, teste *Herodoto*, lib. 1. *Spartatarum* mores erant humaniores, qui hospitibus & aduenis nudas virgines ostendebant, vt earum pulchritudinem laudarent, & admirarentur. *Cato*ne præfente & sedente negatur populus permisisse sibi postulare Florales iocos nudarum meretricum. Non inret igitur *Cato* Theatrum nostrum, aut si intrauerit, spectet, ait *Martialis*, *Præfatione* lib. 2. *Epigrammatum*.

*Necnon lasciuæ Floralia lata theatri,  
Et spectare volunt, qui voluisse negant.*

Quidni igitur *Apellis* industriam æmulabor: qui Venerem suam Anadyomenem in Eleulinarum pancgyri, spectante vniuersâ Græciâ nudam ostendit. Nec me mouet, & ab hoc opere reuocat contrarium *Praxitelis* factum, qui suam Venerem velata specie pinxit, quam Cōi seuerum id ac pudicum existimantes, nudæ Veneri optione prætulerunt: Nudam Gnodij emerunt immensâ differentiâ famæ.

Xeuxis Agrigentinis facturus tabulam, quam in templo Iunonis Lauinix publicè dicarent, virgines inspexit eorum nudas, & quinque elegit, vt quod in quaque laudatissimum esset, pictura redderet. Nec ego possum mulieris structuram indagare, nec Anatomen verbis enarrare, nisi nudam mulierem primus videam, vobisquæ spectandam exhibeam. Sed Nicia Atheniensis industriam imitabor, qui diligentissimè mulieres pinxit, lumen & vmbas custodiendo; sic in explicatione partium Genitalium castis & pudicis vtat verbis.

*Nuda recede Venus, non est tuus iste libellus,  
Disce verecundo sanctius ore loqui.*

Modestiam Liuiæ imitari decet, quæ nudos homines à pudica muliere pro statuis haberi dixit, *Dione* referente lib. 10. Sic vobis nudæ mulieres debent esse pro statuis, nec earum conspectu libido commoueri, vt de vobis dicatur, quod *Terenius* de adolescente præfentiâ Chryseidis nihili commoto, inquit, spectatum fatis putabam. Ac sanè, quæ lasciuæ & turpicula sunt, eum qui bonâ institutione præmunitus est, offendere nequeunt, ait *Aristoteles*. Hoc igitur spectaculum vobis omnibus vti spero gratum & iucundum erit, quia nemo est adeo stupidus & hebes, qui mulieris partibus genitalibus inspectis, voluptate quadam animi non perfundatur, dum intuetur sui ortus incunabula: ipse mulieres, vt refert *pudicus Philosophus*, lib. 1. de part. animal. cap. 5. gratius & iucundius habent, Vnicam particulam, id est, Penem viri inspicere, quàm reliqua corporis membra contredare. Quidni de viris dicendum, delectari magis intuitu vnius particulæ, quàm totius corporis muliebris? Quin etiam, ferocissimæ belloz inspectis genitalibus mulieris cicurantur atque demolcentur. Narrat *Leo Africanus*, lib. 9. *historia Africana*, mulierem, si forsan occurrat Leoni furibundo, non alia arte se tueri, quàm si partes suas genitales nudas ei ostendat, quibus inspectis, leo intactam relinquit, & aliò se conuertit: Ac si sacrarium generationis humanæ veneretur.

Nec tantum in partibus verendis, quasi reuerendis est admirabilis Mulier, sed in toto eius corpore diuini Opificis elucet industria, dum mulierem voluit procreare viro præstantiorem & excellentiorem. Aspice muliebris corporis formam ac elegantiam, & compara cum virili: si totam compagem à vertice ad cales curiosè perlustraueris, non dubito, quin muliebre corpus longè præstantius & formosius virili inuenias & fatcaris. Habet enim mulier corpus delicatissimum, carnem tenellam, cutim poliâ  
cum

cum luciditate nigram, caput rotundius, sed ad sphaeræ oblongæ figuram propius accedens, eleganti cumulo pilorum subrilium & splendentium exornatum, quos cum intueris crinitæ stellam dices, aur sylvam non caduam noctu lucentibus vermibus, aut igniculis scintillantibus referam, in cuius ramis nidificant Cupidines, & sub quorum umbra Venus mille modis Amatoris iterius distinet. Cum capillis color gratus, & nitor splendidus illucet, & contra Solis aciem vegerus fulgurat, vel placidus renitit, & in contrariam parrem grarum variat aspectum, nunc vir aurum coruscans, in leuem mollis depromitur umbram: nunc coruina nigredine cæreole columbarum bosculos æmulatur: Vel guttis Arabicis obundus, & pectinis arguti dente tenui discriminatur, & pone verum coactus, amatoris oculis occurrit ad instar speculi, reddit imaginem gratiorem. Quam vultus venerabilis & formosus in Muliere. Ibi verum amoris phyltrum, ibi Veneres & Charites modestissime sedent, & nitidissime resplendent, ac nidulantur, cuius obtutus vivificat dum hilaris, encarat dum iracundus. In eo *amabile Platonis* coniunctur. In vultu frons polita, nullis rugis arata, pulcherrima cæli capitis plaga, amœniter frondens, dum exporrecta & serena, cuius frontispicium imperiola amoris palæstra, maiestatem diuinæ auctoritatis præ se fert. Supercilia frontis terniini, sunt Cupidinei arcus miræ arte ducti, unde sua tela eminens & cominus Deus iste iaculatur, & in iis pars animi dum annuit, vel renuit. Oculi duo sunt Soles in orbibus suis fulgentes instar nitidissimi adamantis in annulo, quibus illucere, & illudcere solet amor, dum nobis diem & tenebras faciunt, aur parula elatione, aut resudineæ coniuventiâ.

Sunt etiam Amoris hami illecebræ faces, ardentia specula, interdum spicula transferenda tuentibus hirsquis. Oculi subperuli nigellis pupulis quandam hilaritatem significant animitus, suauiter aperti momento in lantos sanant, clausi sanos insanire cogunt. Quid non valent Mulieris oculi? quid non agunt ridentes? quid non angunt ludibundi? Eos cum osculamur ipsum animum videmur attingere. Auriculæ non ita grandes & irrestæ, nec tam facile rubescences ex stupiditate vir in Viro, dependentibus margaritis decoratæ, quàm suauiter titillant Virorum sensus. Si quetulas amantium voces hauriant, quàm duriter feriant vsque ad amentiam, si ad eas obscuræ erint.

Nasus non minor pars formæ, quàm affabre compositus & gratus, si subdole irrisioni non seruiat, huic fragrantiores & pulchriores flores nati sunt, ac destinati. Genæ sunt geminæ rosæ pudoris, necnon pudicitie testes, imo cordis & animi assertores fideles, indices veritatis, & ingenuitatis altrices? Insuper eas hilaritatem, risumque indicantes Buceæ, faciem gratissimam efficiunt, si gelasium adsit. Os consecratum Veneri, nobilis illa rima, riuus amoris & dulcedinis, unde oscula & oracula fluunt, & ubi mutua & tacita sit animarum inter se communicatio, auræ vitalis interuentu more columbarum, ex quo, & in quo verba, risus, cantus, suavia, lepores, & amores oriuntur. Clauditur paribus corallinis ramis, nempe labus sine labe, quæ folia & fragrantiam rosæ referunt. In ore geminus gemmarum chorus, dentes nivei, & minutuli continentur: quorum moriunculæ venæ expertes, nunquam lædunt, sed ludunt amabiliter.

Lingua feminæ brevis & volubilis, animæ interpres, & internuncia, quàm suavis, si consonans & fidelis. In eius potestare mors & vita. Enecat, si respicit abscondita, exhilarat, si exserta columbatim osculerur. Mentum, pulchra & eminens illa meta stadij & circi faciei ornamentum. Index stabilis capillitij, si bifidum, sigillum amoris, digitulo impressum, vulnus pulchritudinem absolvit.

Sequitur Collum, Capitis eburnea columna, colenda pars, oblonga, instar collis leniter assurgens, & rotundior quàm in Viro. Collum sulque deque splendens, splendidiâs euadit, si monilibus excolatur. In Collo vox formatur, quæ magnam pulchritudinis partem perficit, ipsa præcipuam vultus partem in se habet. Agnosceamus eam priusquam cernamus, non aliter quàm oculis. In muliere quàm amabilis & iucunda, acuta & arguta Vox, ex angusto larynge suavi modulamine resonans, quàm si audieris, aurium cantus & musica instrumenta displicebunt. Ecce quantum ciet mulieris vox efficax & flexanims, philomelæ dulcedine feroces animos mulcet, iucatos Sirenum cantu submergit, quænetiam saxa mouere valet, instar Orphei.

Spatulæ expansæ, & brachia alabastrina sunt alæ Veneris, quas dum alacriter pandit, Veneris alitem cerneret, quorum plexus, itud amplexus, religiosum nexum

esse fati cogimur. Manus elegantes in digitos longos & teretes extense, quàm suavis-  
sime & mansuetè tactu suo, quibus manubz quæruntur. Earum mancipio si quis  
mancipatus fuerit, nunquam posthæc manu missionem quæret, nec inueniet.

Manus ipsos manes mouent, Musica pulsantes instrumenta, & à quibus om-  
nia bona manant: nec sine ratione, Physici rerum subtilium indagatores, in mani-  
bus putant abstrusam & reconditam vim atque illicium Amoris. Iugulum pectoris  
exordium, torundum & arcuatum, quàm delectabile, viros fortes subiugat, sibi que  
iungit, & interdum iugulat, dum lati clauium seu fibulæ morfus clauas nobis ex-  
cipit. Amplum in Muliere Pectus, Amoris pactum venerandum si patulum, sicut He-  
lenæ ad pacandam *Menelai* ferociam, ac proinde delicias nostri aspectus, molli-  
ter excipit Vbera, tubera pulcherrima, fontes amœnissimos corporis, & humani  
generis educatores, à quibus lac, vel porius nectar, & ambrosia Deorum aliquando  
stillat.

Ibi Vallis amœnissima, è duobus monticulis nineis composita, semiglobuli fo-  
roriantibus, qui *Poma amoris* constituunt, pro quibus in Helena inter Deos dissidium,  
atque decennale bellum Troiæ susceptum. His insita pulposa fraga, Papillas dicunt,  
quas dum molliter palpat, Mulieribus amoris palpum, & viris cordis palmum  
excitant. Vnde *Poma hæc* fruticant, & extumescunt ex horto Adonidis, spuma Ve-  
neris rigato, Matrix vocatur, diuinissima fauissa, quæ Naturæ thesauros condit &  
promit. Cuius vestibulum mollis herbæ lanugine circumseptum, intus flore virgi-  
neo Caryophyllato obuallatur, cuius etiam custodia Nymphis commissa, vt esset  
nobilissimum Hymenæi domicilium, & casti amoris Cunæ. Ideoque cisthus verè  
cisthi fragrantiam spirans & redolens, ni contaminatus, & conculcatus.

Nec mirum, si *sunt ante Helenam cunni* terribilis belli causa, quia medio de fonte le-  
porum, surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angit. Clunes feminis decenter con-  
globatz sunt, ampliores sed formosiores, nec tantum quietis sedes, verum etiam pul-  
chritudinis, ac proinde *Cercidas Poeta*, Venerem & puellas Athenicas *apocryphe* ap-  
pellat.

Pes, basis corporis, structuræ artificio & pulchritudine ipsum Solem superans, si-  
ste gradum, & sustine Mulleris molem argenteam, vt contemplari, admirari, ac ve-  
nerari liceat: tibi marmoreæ columnæ candidæ superstant, femina dicatur per ex-  
cellentiam, quia feminis eximia, quibus superimposita est diuina compages cor-  
poris, etiam pes exiguis in Muliere vim & illicium amoris in se continet, in quo non  
minus, quàm in vultus pulchritudine, olim Romanæ Mulieris gloriabantur.

Ex hac pictura formosæ Mulieris, facile est intelligere, quantum dignitate & no-  
bilitate muliebri corpus Virili præstet: Ideoque *Momus*, qui reprehendebar in opi-  
ficio hominis, quod fenestrarum non fuisset pectus, cum diligenter inspicisset pul-  
cherrimum Veneris corpus, agnouit diuinum opus, nihilque reprehensione dignum  
inuenire potuit præter sandalias crepitantes. Idcirco

*Pulchrius in toto Deus Optimus ordine rerum*

*Plasmate femineo non fabricauit opus.*

Omnes autem partes formosæ Mulieris in his versibus continentur, apud *Ioannem*  
*Neufanum*, in *syna Nuptiali*.

*Alba cutis, niues dentes, albique capilli,*

*Nigri oculi, cunni, nigra supercilia:*

*Labra, gena, atque ungues rubri sine corpore longa,*

*Et longi crines, sit quoque longa manus:*

*Sintque breues dentes, auris, pes, pectora lata,*

*Et clunes, dissenti ipsa supercilia:*

*Subiles digiti, crines & labra puellæ,*

*Parus sit nasus, parua mammilla, caput.*

Itaque nullum in tota creaturarum specie spectaculum adeo mirandum, neque  
miraculum perinde spectandum, atque corpus muliebri, vt nemo nisi cæcus & in-  
mensus audeat inficiari, Deum ipsam quidquid pulchritudinis capax est mundus v-  
niuersus, in Mulierem simul coniecisse, vt ob id, illam omnis creatura suspiciat, &  
multis nominibus amet, ac veneretur, vsque adeo, vt vsu venire videamus, quod  
incorporei spiritus, dæmonesque Mulieres sæpissime adentissimis auoribus deper-  
eant, quod non est fabulæ opinio, sed multis experimentis nota veritas.

Munditæ & puritatis ipsius Mulieris, vel hoc euidentiſſimum argumentum eſt, quod Mulier munda ſi abluatur, nunquam aquam inſiciet & inquinabit. Vir autem quantumcumque abluatur, quoties de nouo abluatur, toties turbat aquam, & inſicit, ſi credimus *Cornelio Agrippa*.

Mulieris nobilitatem & excellentiam declarat origo & creatio: Deus cùm fabricaſſet Euam, id eſt vitam, in iſto & vltimo opere conqueſcit, quaſi nihil excellentius haberet procreandum: quia erat poſtremum opus Dei tanquam perfectiſſimum, ſine quo mundus fuiſſet imperfectus: Idcirco Mulieri omnis creatura meritò ſubiicitur & famulatur, tanquam mundi Reginæ.

Præterea, *Eua* prima patens creata fuit in Paradifo, *Adam* in agro extra paradifum: Molier *Eua* ex coſta viri, *Adam* ex gleba terræ: Mulier velut Regina orbis introducta eſt in Paradifum, tanquàm in Regnum ſuum. Propterea reſurgent Mulieres in proprio ſexu ad angelorum ſimilitudinem, vt illis promittitur in nouo Teſtamento, *Lucæ 20. Matthæi 22. Marci 12.*

Atque hæc ſatis de præſtantia corporis muliebris. Venio ad Anatomen.

Cùm partium muliebrium ſtructuræ demonſtrari nequeat ſine diſſolutione & diremptu partium, id opus obire non auiſim, nec debeo, niſi veſtro conſeſſu frequenti ſtipatus, vt ſecurus ſim ab inſidiis & iniuriis mulierum, quæ mihi parem necem intentarent, quam expertus dicitur *Orpheus*: qui cùm linguâ tantùm peccaſſet, ab illis tamen miſerè fuit diſcerptus. Non igitur ſine cauſa odium & furorem mulierum reformido, dum eas partes palam oſtendo, quas Natura occultare voluit in viuentibus & mortuis, pudicitie muliebris, etiam in deſunctis adeo ſollicita, vt deſunctarum feminarum corpora prona ſiutent in aquis, inquit *Plinius*. Quòd ſi ſola demonſtratio nudi corporis inuiſum me reddere poteſt, quantò magis læſio & laceratio locorum muliebrium, quibus ortum noſtrum debemus.

Iudicauit *Ariſtoteles* in *Probl.* iniquius eſſe Mulierem, quàm Virum occidere, ſic multis videbitur iniquior in Muliere, quàm in viro adminiſtratio Anatomica. Nam in omni animalium genere nunquam mares in feminas ſuæ ſpeciei ſæuiunt, & exardeſcunt: *parci cognatis maculis ſimilis fera*: ac proinde non eſt æquum nos rationis & humanitatis participes cruentas & ſacrilegas manus in corpora mulierum iniicere. Sed iſtis molierum amatoribus paucis ſatiſfaciam, ne tanquam inhumanus & *peruicax* ab illis audiam. Nunquam ego muliebri corpus inuiſum & exoſum habui, neque in dedecus & contemptum ſexus muliebris Partes Genitales anatomicè ſectas demonſtravi, ſed intus & in cute probè notam habere Mulierem deſideraui, quò faciliùs illius affectibus proſpicere atque medicari poſſem. Idem conſilium & inſtitutum fuiſſe omnibus Anatomicis opinor: ac proinde Mulieres nobis itaſci non debent, neque noſtrum ſtudium Anatomicum, quod ad earum vtilitatem dirigitur, improbare: Neque deinceps conqueri apud *Soranum*, de Medicis, qui ſunt valde ſolliciti in dignoſcendis & curandis Virorum affectionibus, negligentes admodum in morbis Mulierum inueſtigandis atque medicandis.

### Monitum ad Lectorem.

**I**uueniles iſtas Præſationes, quas habuit Clariffimus Author in Anatomia, dum Exemplar manuſcriptum ad Editionem relegerem, quamuis deleſas ab Authore retinui, quia indicans pudico Lectori non ingratis fore propter elegantiam & variam lectionem. Sic Muſa Socratis pudica ſerſis iocofa miſcebat: & in libris Caſuiſtarum maiores obſcœnitates conti-  
nentur, quæ quotidie leguntur ab omnibus, etiam idiſiis.

G. P.

*DISCRIMEN CORPORIS MULIEBRIS  
& Virilis.*

CAPVT XXXIV.



OTVM est omnibus muliebres corpus differre à vitili, formæ externa specie, & procreandi actione, sed pauci examinarunt in quibus discrimen illud consistat, Omnes enim fatentur corpora inter se discrepare in partibus tantum externis: si demas partes pudendas, nullum in partibus internis discrimen apparere putant, quæ sunt vtrique planè conimiles & conformes, exceptis partibus genitalibus.

Primus *Aristoteles* partium externarum differentias in mare & femina proposuit, libro 4. de *hystoria animalium*, capite ultimo: quod in omni genere animalium partes superiores & priores maribus sint potiores, validiores, & aptiores, in feminis partes inferiores & posteriores sint robustiores: quod verum deprehenditur tam in hominibus, quam cæteris animantibus pedestribus, quæ animal generant: addit, femina infirmior minusque nervosa pilum habet tenuiorem, carnem humidior, genua pleniora, crura tenuiora, & pedes elegantiores. Idem *Philosophus* in *Physiognomonica*, latius extendit & accuratius expendit discrimen maris & femine: in vnoquoque genere femina est mare minoris capitis, & angustioris faciei, & subtilioris colli, & imbecillius pectus habet, & minorum est laterum, femora verò magis carnosæ maribus, genua mollia, & crura subtilia, pedes verò pulchriores, & formam totius corporis molliorem, quam fortiorem.

Nos verò demonstrabimus mulierem & virum non tantum differre in partibus externis, verum etiam internis. Ac in primis considerabimus Mulieris corpus integrum, dein singulas partes inter se comparabimus.

Mulier Latine dicitur à mollitie, quasi mollior, vel quasi molliens & mulcens virum, si credimus *veteri Vocabulario*: vel à Græca dictione *μῆτις*, quæ laborem significat, quod Mulier sit laboribus & doloribus onusta. Græcis vocatur, *μῆτις*, quod est generare: vel *μῆτις*, quasi *μῆτις*, ex *Placone* in *Times*. Femina etiam dicitur à foetu, vel à femore, quia foetum parit, & femina habet pulcherrima.

Substantia Mulieris, siue habitus corporis differt à vitili: scripsit enim *Hippocrates* libro de mul. natura. Mulierem ratiore carne præditam esse, id est, laxiores & molliores habere carnes. Sic ille libro de Glandulis. Mas plenus est, & velut pallium densus, ita videtur tangenti: femina verò tara, & laxa, & veluti fluida, & ita videtur tangenti.

Mulier quoque pinguior viro, ex *Galeo*, libro 2. de temperamento. partim propter temperamenti frigiditatem, partim propter vitam otiosam & sedentariam: ideoque cum olim cremarentur cadauera, decem virorum cadaueribus, vnum muliebres addebant, quod pinguedine sua ignem accenderet, refertente *Narrabius*. Quinetiam ob frigiditatem corporis, Mulieri vasa sunt minora & angustiora, ac obscuriora, si Mulier adiposa fuerit.

Constat temperamentum Mulieris esse frigidius temperamento viri, quamuis inter auctores, hæc quæstio animosè disceptata fuerit. *Hippocrates* frigidiorē temperiem assignat Mulieri. *Parmenides* Mulierem viro calidiorē sustinebat, & adversus eum disputavit *Aristoteles*.

Origo Mulieris repetenda à semine, & à menstruo, sed semen ex quo generatur Mulier est frigidius, & humidius, debilius, minusque elaboratum: semen verò ex quo mas generatur, est calidius, siccus, fortius, optimeque coctum, teste *Hippocrate*, libro de Genitura, & *Aristotele*, lib. 1. de generat. animal.

Sed in ortu Mulieris ex semine considerabis præter materiale principium, efficiens quoque diuersum, nempe formatricem facultatem in Muliete debiliorem

& animam huic superuenientem, & corpus informantem in Muliere ignobiliorem, si credimus Philosophis & Theologis quibudam. Itaque eam materia & efficiens sint diuersa in mare & femina, quid mirum, si videmus feminam tardius conformari, celerius moueri, & absolui, alio modo iacere in vtero, & diuersa corporis inuersione egredi, & prodire in lucem, vt declaratur in *historia Fetus humani*?

Situs partium, totiusque corporis Idem in Muliere ac in Viro, exceptis partibus genitalibus, quæ in Muliere intus latent, in viro extrâ prominent.

Quantitas, siue magnitudo corporis, si consideretur iuxta omnes dimensiones, minor in muliere, quàm in viro deprehenditur, ideoque proceritate, & amplitudine corporis Mulier Viro cedit, ex *Aristotele, libro de historia animalium, capite ultimo*. Numerus partium verarum idem in Muliere ac in Viro, si spectemus Ossâ, musculos, vasa, viscera: discrimen tantùm apparet in partibus genitalibus, quas vnique proprias, & numero differentes Natura dedit, atque distinxit.

Figura corporis erecta in Viro & Muliere consimilis, si barbam detraxeris, venustior tamen in Muliere formosa, quàm in viro formoso. Differt etiam figura corporis muliebris ratione mammarum, & partium genitalium, quinetiam pilis caret pectus, Venter, & Podex, vbi plurimùm incommodare solent.

Color corporis, frequenter candidior in Muliere. Viri sunt nigriores feminis, ex *Galeno*, quia calidiores. Calor verò adustus gignit humores. Scribit *Aristoteles*, Mulieres esse *propiores*, venustiores & lauiore: rationem subiungit, quia excrementum omne in menstrua confluere solet.

Corpus muliebre, naturæ lege, communionem habere debet cum virili ad procreationem, quæ est actio Mulieri & Viro communis, sed *mas in alia generat, femina in seipsa*. Ad eam actionem perficiendam Mulier habet semen proprium, & sanguinem redundantem, cuius euacuatio singulis mensibus facta, *Menstruum* dicitur. Inter animalia soli Mulieri conuenit, & vaccæ interdum accidit, ex *Aristotele*.

De semine muliebre dubitatur inter *Aristotelem & Galenum*. Ille Mulieri denegat vim actiuam, sed tantùm passiuam concedit, dum ad constituendam molem & corporaturam substantiæ solidæ & carnosæ concurrat. *Galenus* verò ei vim actiuam & passiuam tribuit, quod diffidm non vacat, nec decet hic agitare & componere, contentus dixisse Medicos fauere ipsi *Galeno*, quamuis *Aristoteles* opinio non sit penitus improbanda & reiicienda, quam demonstrauit *Cremoninus, libro de semine muliebri*. In ista generali actione aptitudo diuersa est: Nam Mulier, vbi incipiunt erumpere menstrua, donec cessarint fluere, idonea est generationi: at quibudam 13. ætatis anno, vel 14. efflorescunt, cessant 45. aut 50. anno, proinde hoc annorum decursu aptitudinem habet Mulier ad generandum. Vir autem tardius incipit generare, sed usque ad 80. ætatis annum, & vtrâ potest generare, vt exemplis innumeris probare possem.

Præter istam actionem officialem, quæ posita est in propagatione speciei, Mulier vt etiam Vir, habet suam actionem propriam, scilicet *Vitam*, in diuiduum quodque respicientem, quæ consistit in hyparxi trium facultatum, Animalis, Vitalis, & Naturalis: In quibus autem vita mulieris differat à vita viri, per istas facultates excurrendo, breuiter examinabo.

Certum est Mulieres breuioris esse vitæ, Mares verò viuaciores, & longioris vitæ: rationem assignat triplicem *Aristoteles, libro de Longitudine & breuitate Vitæ*, quia calidiores minùs abundant excrementis, & humidum pinguius, vniuosi, magisque coctum habent.

Pergo ad examen facultatum. Animalis diuiditur in Principes & Ministras. Principes sunt tres, *Imaginatio, Ratiocinatio, & Memoria*. Ministræ sunt duæ, *Sensus & Motus*. Sed imprimis scire conuenit, Cerebrum Mulieris esse frigidius & humidius, Viri Cerebrum calidius & siccus. Laudatur ab *Heraclito*, anima prudentior, quæ in sicco habitat Cerebro.

*Vt corpus tenerum, sic mens infirma puellâ,  
Fortius ingenium suspicor esse Viris.*

Itaque Imaginatio in Viro excellentior, quàm in Muliere: vnde & intellectus præstantior, & ratiocinatio melior & perfectior, quia in Viro omnia sunt perfectiora,

quàm in Muliere, quæ est ex *Aristotele*, imperfectio quædam. Sed duabus rationibus ex *Aristotele* petitis, nostram propositionem confirmabo. *Iste lib. 2. de partibus animal.* scribit: *Quibus est sanguis tenuis & purus, his intellectus subtilior*: at sanguis Viris est tenuis & purus, quia attenuatus & defæcatus à calore. 11. Ratio peritur ex *Philosopho*: quicumque pollent tactu, pollent ingenio: Viri pollent tactu magis, quàm Femine: quod sic probatur: qui sunt *parantissimus* tactu pollent: Viri sunt tales, quia eorum mollities est ærea, mediocriter sicca, Feminis mollities carniæ est aquea & pituirofa.

Si Viri sunt ingeniosiores Mulieribus, sequitur etiam eos plus valere memoria, est enim *recordatio, ratiocinatio quædam, ex Aristot. libro de Memoria*: ubi norat *cap. 1.* eos, qui tardo heberique sunt ingenio, memoriâ carere, hos enim humidiores esse, quàm par est: proinde cum Viris sit siccus Cerebrum, animi motus erunt celeriores, præstantior erit memoria: Cum autem *mores animi sequantur temperamentum corporis*, ut probavit *Galenus, libello integro*, certum est Virum & Mulierem moribus differre, ut docet *Aristoteles, libro 9. de historia animal.* & passim apud Authores, mores Mulieris describuntur peculiaries, quos percensere, & accusare non est mihi animus, quia vnicuique sunt suæ virtutes, suæ vitia, *quisque suos patitur manes*.

Succedit facultas Vitalis, quæ consistit in *respiratione & pulsu*: Cum autem respiratio sit comparata ad caloris refrigerium, sequitur & maiorem & velociorem, & crebriorem esse in illo sexu, qui calidior est, qualis est masculinus: deinde cum ratio sit corporis habitus in Viris, maior sit spirituum dissipatio & iactura, qui sunt refarciendi per frequentem & celeriores respirationem.

Respirationi proportionem respondet pulsus, authore *Galeno, lib. 1. de Respiratione, cap. 5.* Indiget respiratio Cor ad perennitatem pulsus in seipso & arteriis: ergo, si respiratio maior, frequentior & celerior in Viris, pariter & pulsus erunt consimiles. Scribit *Galenus, libro de Pulsibus ad Tyrones, cap. 1.* Viros pulsus habere longè tum maiorem tum vehementiorem: Quibus de causis, ob caloris abundantiam, robor facultatis maius, & habitum corporis non adeo gracilem, nec adeo obesum, ut in Mulieribus, quibus magis ardeantur & comprimuntur arteriæ: Cum autem vox, respirationis & pulsus consuetudina sit, quia pender ab exsufflatione, & robore facultatis ærem exsufflantis, id est, pulsu Cordis, certum est voem maiorem fortiores adesse Viris, quàm Mulieribus, quia vir calidior, habetque facultatis mouentis robur maius, & guttur amplius, validius insuper ærem extrudit. Ideoque rationi consentaneum, maiorem vocem convenire Viro, quàm Mulieri, quæ frigidior & debilior, & guttur nacta est angustius, minusque validè inspirarum ærem expellit.

Superest facultas Naturalis, quæ triplex est, *Nutritrix* scilicet, *Accretrix*, & *Procreatrix*. In Viris nutritrix, multò est validior, quàm in Mulieribus, quia viri sunt calidiores, calor autem coquit, & per consequens nutrit. Hinc videmus viros magis appetere, & plura ingerere, & assumpta citius ac felicius digerere & concoquere, quàm feminas: quamvis enim sanguis in Viris parcius, quàm in Mulieribus: non inde sequitur magis vigere facultatem nutrientem in Mulieribus. Huius redundantis sanguinis quadruplex causa traditur, *Temperamenti frigiditas, habitus corporis densitas, quæ per spirationem impedit, vita ignavia, & prolis necessitas*.

Quod spectat ad facultatem Accrettricem, ea vegetior & fortior in Maribus, quia ocyus formantur in vtero, & extra vterum magis augentur in omni dimensione quàm femine: scribit *Aristoteles, libro 7. de historia animal, cap. 5.* Feminam in vtero tardius, quàm Marem, perfectionem omnium partium recipere, sed extra vterum celerius quàm Marem & accrescere, & ætate florere, & senescere. *Idem repetit 4. de Generat. animal, cap. 6.* Causa verò cur Mulieres citius ad vigorem & ad senectutem perveniant, est ipsa debilitas, *à sima*, teste *Aristotele*. Omnia minora ut in arvis, sic Naturæ operibus citius ad finem perveniunt: Vnde isthæc debilitas? à debilioribus vitæ principiiis. Crescant ergo citius, quia finem habent propinquiorem.

In facultate procreatrice euidens est inter Marem & Feminam discrimen. Femina quia cirlus interit, citius quoque ad generandum apta est, atque disposita. Ipsa ad procreationem concurrir activè & passivè: excipit semen viri, & ad actum promouet, fovet, & enutrit. In actione procreandi Vir magis debilitatur, quàm Femina, quia semen emittit, & spirituosius, & copiosius, femina semen frigidius & paucius



suppeditat. Ideoque scripsit *Hippocrates*, libro de *Genitura*, Marem in actione procreandi maiori voluptate affici, quàm Feminam. Aliar tamen censuisse Tiresiam, testatur *Ovidius*, libro 3. *Metamorph.*

Vr vita Viri & Mulieris ab iisdem causis salutaribus fouetur & conseruatur, sic ab iisdem causis morbificis læditur & destruitur: ideoque Vir & Mulier iisdem morbis sunt obnoxii. Suos ramen vnusquisque habet peculiare morbos, qui vel vniuersum corpus infestant, vel partes genitales vexant, & impetunt. Femina, inquit *Auscenna*, lib. 1. *Can. Fem. 1. doct. 4. cap. 3.* ob temperamenti frigiditatem, & exercitiorum paucitatem pluribus abundat excrementis, quàm Vir, qui calidior & siccior, & laboriosior, & habito corporis rariore donatus. Deinde, Femina ob infirmitatem corporis ab externis iniuriis, causisque morbificis facilius læditur quàm Mas. Norauit *Aristoteles*, lib. 1. de *Generat. animal. cap. 13.* & lib. 3. de *hiss. animal. cap. 19.* Feminas non esse ita obnoxias morbis à sanguine, vr sunt Viri, quia sanguinis quantitas superflua per menstruas purgationes minuitur, & qualitas praua simul cum menstruo expurgatur: quod si contrarium accidar, necessum est vitium vel defectum esse in purgationibus mensuris. Mulier ex *Hippocrate* Podagra non laborat, *Aphorism. 4. feci. 6.* nec calculo vesicali perinde, vr Mas infestatur, propter breuitatem, & amplitudinem, & rectitudinem Vrethre.

Præter morbos communes Mulieri & viro, sunt etiam vnicuique proprii, qui dumtaxat in Virum aut Mulierem cadunt. Mulier suos patitur morbos in locis genitalibus & mammis: Vir suos etiam habet peculiare morbos in partibus genitalibus, quales in *libris Præfatus Medicorum* inuenies: eos non est opus sigillatim per censere, cum exeat magnum de morbis Mulierum volumen, & ex prof. flo de iis summus Medicing Dissator scripserit. Itaque absolurè comparando mulierem cum Viro, ipsam Viro morbosiorẽ deprehendes, propter corporis imbecillitatem, & humiditatem, excrementorum abundantiam, vitam otiosiorẽ, & densiorem corporis habitum minus perspirabilem.

Nunc superest partes, tam externas, quàm internas Viri & Mulieris inter se comparare, vr discrimina notentur & obseruentur.

Mulieris caput minus & angustius quàm in Viro: Cerebrum frigidius & humidius, minoreque quantitate, ex *Aristotele*, libro 2. de *partibus animalium, cap. 7.* vbi rationem assignat. In Muliere pilus tenuior, mollior, ac splendidiior: non caluiscit Mulier, aut rarò, niũ vitium aliquod insigne totum corpus, vel caput labefactarit. Facies ita Muliere pulchrior, & venustior quàm in Viro: est etiam facies glabra & depilis, ac in merbis: rarum & insolens si in mento pili erumpant, aut barbara fiat Mulier, vr in *Ceria*, mulieribus, sacerdotibus, & aliis, quibus præter naturam hirsutum euasit corpus, & barba prodit, vr *Phaetusa* apud *Hippocratem*, ob defectum menstruum & suppressionem diuoratur.

Collum mulieris est rotandius, tam in superiore parte, versus mentum, quàm inferiore versus clauas, & humeros: Nullæ enim foueæ in iugulo apparent, nec supra humeros, vr in Viris. Structura pectoris amplior & elatior, vr sedem præbear mammis excipiendis, & rite collocandis, angustior in hypochondriis.

Mammæ in Mulieribus aliter conformatæ, sunt enim rumidiores & ampliores, glandulosæ, in eis papilla rubicundiior magis proruberat, & circularis areola cui dentior: Mammæ etiam lac suppeditant certo tempore ad nutritionem infans.

Abdomen Mulieribus larius & amplius in regione hypogastrica, ideoque Nates ampliores habent ob latitudinem maiorem Ossium Ilium, & hæc omnia ampliora ad fœtus gestationem commodiorem: quamuis pubis circumferentia in Muliere sit pilosa, non excurrat pilus ad podicis ambitum vr in viro, qui podicem habet pilorum segete cinctum, & coronatum. Non habet Mulier pectus villosam, neque ventrem, denique vniuersam corporis cutem glabram obtinuit. Manus sunt longiores & angustiores Mulieri, sed nulla est ambidextra, ex *Hippocrate*, pedes breuiores & elegantiores habet.

Quod spectat ad partes internas Viri & Mulieris, certum est prorsus inter se differre partes genitales vtriusque, nullamque analogiam inrer se habere, quidquid *Galenus* fecos scripserit, vralibi dicam. Etiam in quibusdam partibus, quæ sunt Viro & Mulieri communes, discrimina quorundam obseruantur, cum sint Mulieres pinguiiores Viris: illis panniculus adiposus magis conspiciendus est: sub musculo Recto

anastomosis Mammariz & Epigastricæ venarum evidentior in Muliere, quæ habet aliam venam peculiarem Epigastricæ externæ oppositam: hæc ad Vterum cum hypogastrica fertur: musculus cremaster aliter conformatus est: Peritonæom aliter constructum in Muliere: nam crassius & robustius parte inferiore ad Fœtus gestationem, & productionem Peritonæi geminæ ad inguina excurrunt, ut ligamenta Vteri rotunda deducant: hepar amplius, vergitque ad hypochondrium sinistrum in Muliere, quia thoracis partes infernas angustiores habet.

Falsum est Mulieres carere Ieiuno Intestino, etiam si traditum ab *Aristotele*, nisi propter earum edacitatem & ingluuicem, nullum in eis dari vacuum Intestinum crediderit.

Rarius reperitur in Muliere parvus ille musculus, qui Psoæ incumbit, & secundum eius longitudinem extenditur: *parvus Psoæ* dici potest ad robur femorum augendum Viris additus. Vesicæ cervix & Vrethra aliter conformata in Muliere, quia brevior & latior, caretque musculis urinam accelerantibus.

In Muliere podex proprium habet musculum à coccyge enatum, qui deest in Viro. Notæ virginittatis & castitatis in Feminis reperiuntur in pudendo Muliebri, quæ nullæ sunt in pene vitili. In pectore Cor mollius & adiposius Mulieri, quàm Viro, & intra Pericardium serum copiosius.

In collo larynx minor & angustior, Thyroïdes cartilago minùs protuberat, rima glottidis angustior, ideoque vox Mulieribus gracilior, & glandulæ inferiori parti Thyroïdis accumbentes maiores in Muliere, quàm in Viro.

In reliquis partibus consimilem structuram obferuo, nec in femore reperio musculum illum descriptum & assignatum Mulieri à *Hauhino*. Sed manifesta sunt in Ossibus Viri & Mulieris discrimina, quæ in *Osteologia* accurate propofui & examinavi: quinetiam in ipsa Muliere pro varia corporis constitutione discrimen non leue cernitur, quod accidit in triplici statu corporis: aliter enim conformatæ sunt partes genitales & mammæ in virgine vsque ad eruptionem menstruorum: aliter in Muliere sæpius Virum passâ. aliter in prægnante & puerpera per octo dies à partu: nam in virgine iuuenula pubere aut accedente ad pubertatem, scilicet ætatis anno decimo, obseruabis in pudendis partibus manifestas notas virginittatis, angustiam cunni, id est, orificij labiorum cum tensione membranæ inferioris, partes labiorum neccitatis, nymphas exiles, planas nec tuberosas cum ligamentosa membranula (frænulum diceret) parte inferiore nymphas copulante, deinde carunculas, siue carnositates rugosas, tumidiore & rubicundiores pro ratione ætatis prouectioris inter se fibrillis quibusdam arcu connexas, siue cocutes, quibus deficientibus *Hymen* apparet. Paulò supra earum locum naturalem, aperto ventre spectatur Vteri corpus auellanz nuci magnitudine reflexum & adstrictum fundo Vesicæ: Testes sunt admodum exigui, tuba exilis, lata ligamenta eleganter extensa & expansa instar alarum vespertilionis, quem sic apprimè referunt in eætatè, nam corpus Vteri caput vespertilionis, & lata ligamenta patula & expansa alas repræsentant. Cervix siue sinus muliebris multò latior & amplior corpore Vteri, quò possit virilem Penem recipere.

Inde licet intelligete etiam virginem decennem, siue duodecennem posse Virum admittere, nec vim pati, nisi in vestibulo pudendi propter dilatationem carnositatum: mammæ rarò extuberant ante exortum menstruz purgationis, & in papilla areolæ circueus angustior est, quàm in aliis Mulieribus. At in muliere, quæ menstrua patitur, sæpiusque coitit, orificium cunni magis patet, membrana inferiorum labiorum paulò depressior, nec erigitur, & tensa spectatur, nisi latè diuarcatis cruribus, ligamentosa membranula nympharum fermè obliteratur & discinditur, tanquam frænulum præputij in Viris, sæpius coeuntibus cum arcu Muliere.

Carunculæ, siue carnositates sunt magis attritæ & difiunctæ, minùs rubicundæ, si desint, hymen quoque deficiet, coitu crebro dilaceratus. Sinus muliebris, siue vagina pudendi amplior, & orificium interius magis protuberat intra cervicem: Vterini corporis moles æquat nuci iuglandis integræ magnitudinem, & difiunctum à Vesica incubat Ossis sacro: Mammæ magis extuberant, & fororiantes euadunt, Circulus papillæ magis latefcit & amplificatur, & hæc cernuntur in Muliere, quæ nunquam concepit, si adiungas lata ligamenta expansa alas adhuc vespertilionum referre, & reliqua interna similia esse in Virgine, nisi quod paulò sint grandiora pro mole corporis & ætatis gradu. In Muliere prægnante ex primo conceptu nullum discrimen

apparer in partibus genitalibus externis, nisi instante partu, sed in ipso partu, & post partum propter summam istarum partium dilatationem tum oblirentur rugosæ carnositates, & tensio membranæ labiorum inferiorum ita relaxatur, ut postea tendi nequeat illo artificio adhibito: Itaque laxitas, scaturæ signum est certissimum. Secandum fœtus incrementum vterinum corpus distenditur, & partes spermaticæ, & reliquæ vterinæ sunt eo modo constitutæ, quem descripsi in *historia Fetus*, ubi Le-gorem remitto.

Mammæ sunt grandiores, ampliores, areolæ circulus latior & colore viuidi-or, siue nigricans, siue rubicundus fuerit, pro ratione discreti sexus in Vtero, tandemque lactis fontes euadunt; sed in pariente & puerpera obseruabis ossibus Pubis interie-ctam cartilaginem molliorem, magisque dilatatam, & in medio perforatam, ut Venu-lam excipiat ad humectationem huius loci, ideoque videbis vnum crus eleuatum alteri supereminere, arque manifestè moueri. Idem de commissura Ossis sacri cum Ossibus Ilium inuenies, & Ossa isthæc scalpello tenuissimo separabis in puerpera re-cens trixa, alio tempore inseparabilia in muliere, multò magis in Viro, nequidem in infante.

## PARTIVM GENITALIVM MVLIERIS

### Enarratio.

CA. VT XXXV.



Pvò Romanos olim mulieribus nefas erat *Bona Deæ* operta detege-re. Capitale viris hæc mysteria vidisse, ut suo damno nobilis Romanus expertus est. Nihilominus audacior ego,

*Femineæ loca clausa Dea, fonteque piando  
Demonstro, & nullis sacra vetula viris.*

Partium genitalium Mulieris historia hæcenus ignorata fuit, ab omnibus Anato-micis perperam explicata, & negligenter inuestigata, quam prout sæpius in multis Mulieribus obseruavi, ac publicè & priuatim demonstraui, enucleabo. Quemad-modum semen infructuosum remanet, nisi terræ conuenienti mandatum fuerit, ita semen virile nihil ex se produceret, nisi loco accommodato exciperetur & conserua-geretur. Ad eum finem Natura Vterum fabricauit, in quo vtriusque seminis miscella infra ipsius partem virtute fuscitur, & ad actum promouetur. Opus admirabile, & tanquam ab animali quodam profectum. Sic enim Vterum appellat *Aretæus libro 2: Acot. cap. 11.* Viscus prope animatum, & velut animal quoddam in animali. *Epicurus* existimabat ut ouum, sic Vterum ante animantes extitisse, vt essent in quo surgerent & crescerent, auctore *Censorino, lib. de die natali*. Hanc ridiculam opinionem proba-uit *Epicureus Poëta, lib. 5.*

*Crescebant Vteri terra radicibus apti;  
Quos ubi tempore maturo pascebat ætas  
Infantum, fugens humorem auræque petiscent,  
Conuertebat ibi natura foramina terra,  
Et succum venis coquebat fundere apertis  
Consimilem lacti.*

Vterus autem non à tellure suum ortum duxit, sed à semine in prima partium con-formatione, Deus enim Hominem, feminam & marem perfectos, ut reliqua anima-li creauit. Telluri quidem comparatur, propter consimiles actiones quas in gene-ratione hominis exercet. Quare *Lucretius, lib. 2.* partes Genitales Viri & Mulieris *Vomerem & Solem* vocat. Et *Plutarchus* viri & mulieris coniugium *μῦλον αἶμα* ap-pellat. Ad hoc eleganter alludit festiuus Poëta *Martialis, lib. 7. Epigr. vlt.* *Milo domi nam est, &c.* *Dissepes* in adulterio deprehensus, ecquid ageret interrogatus, inuere-cundè respondit, *αὐτὸν ὄρνιθον*.

Potè, Vterus variis nominibus apud Græcos appellatur, nunc *ἄρσεν, ὄρνιθ, μῦλον*, quorum explicarionem tradit *Oribasius, lib. 24. Collect. & Moschus in Gynac.* Sed *Arri-stoteles, lib. 3. de hist. animal.* Cernicem vteri *μῦλον*, vocat, & *μῦλον* & *ὄρνιθον* & *ἄρσεν* ὄρνιθον.

*Notes.* Quæ duo rem eandem significant, nempe veram Vteri cervicem, ne quis putet sinum muliebrem, seu vaginam virilis pudendi intelligi: Nam ex *Aristotele, libro 3. de historia animal.* cognoscere in quibus, quem habent mulieres, similem esse Peni, à quo calefit feminis excretio ad conceptum.

Ad exculationem *Aristoteles, Galenus* notat in *Exegesi*, quod *μῆτρα* apud *Hippocratem* significat inuolucrum & operculum testis, & apud *Hesychium*, Diadema. Nescio, unde *Nicolans Massa* explicatus fuerit, *μῆτρα* significare vasculi quoddam genus, id-eoque maticem non vocari à dictione *μῆτρα*, quod matrem efficiat. Apud Latinos *Matrix* nuncupatur, quia fouet foetum intra matris: *Vulua* etiam dicitur à *voluendo*, id est, inuoluendo, vel à *volendo*, quia vult & desiderat generare. *Vulua*, inquit *Festus*, omnis capacitas, inde corrupta vox *Vulga*. *Locus* etiam dicitur Latine, quoniam sit recessus quidam in sinubus, hoc enim priscum vocabulum apud Græcos *ὄχη* significat. Vterus vetò dicitur ab *vtre*, quasi vtricusulus. Nam apud *Virgilium & Celsum*, vterus pro cauitate ventriculi & ventris sæpius vsurpatur: vel Vterus dicitur, quoniam sit *ὄχη*, *σῆμα*. *Æolicè*, quasi alter venter. Vterus in feminis *laci* vocatur, in reliquis *Vulua*, inquit *Plinius*.

His præfatis, accedo ad Vasa Spermatice Deferentia, quæ ex vena & arteria tenuiore & graciliore constata, intra duplices lati & lateralis ligamenti Vteri membranas præducuntur, & prope Testiculum in duos ramos finduntur, quorum vnus trifidus aut quadrifidus in Testiculum abit: Alter ramus infra Testiculum in tres surculos scinditur, quorum vnus ad fundum Vteri pertingit. Alter tubæ Vteri, & ligamento rotundo distribuitur: Tertius surculus Vteri latus sub membrana communi perreptans, prope veram Vteri cervicem definit, venis hypogastricis etiam innuatus.

Nondum perfectè sum assequutus, quo sine Filamentum neruum in intra Tubam Vteri contineatur, quo modo semen exsugatur, & in se recondat. An potius ibi collocatum ad robur, & fulcimentum cauitatis, quæ sæpius in sese consideret, flaccescens membranosum vasculo? Istud filamentum latius est intra Vterum, dum ipsius substantiam penetrat. Admiratione dignum, & sæpius à me obseruatum, quod etiam animaduertit *Arantius*, sed obscurè proposuit, venas spermaticas in se admittere arterias hypogastricas, Vteri latera perreptantes, vt arteriosum sanguinem simul cum venoso ad Vterum deferant. Priusquam ligamenta lata vteri diuellantur, & aliquid effringatur ex vasis spermaticis, Venam insinabis, vt eius triplicem diuisionem simulque arteriæ possis intueri. Venæ spermaticæ in muliere prægnante & puerpera sunt triplo ampliores quàm in vacua, vt sanguinem deferant Foetus, & expurgationem post partum. Ergo semen non continent tunc temporis, quia cum sanguine confunderetur.

An venæ spermaticæ nutrant Vterum & foetum, simulque materiam seminis deferant, examinat *Carpus comment. in Mundinum*. Ab extremitate inferna Testiculi, vasculum durum, candidum, & gracillimum, vt paruus digitus longum enascitur, quod Vteri fundo prope tubæ insertionem implantatur, Ei aculatorium est Vasculum. Sed intra tubam Vteri, corpusculum aliud nouum oblongum & candidum continetur, quod ipsius Ei aculatorij continuatio est, in fundo vteri simul iunctum, cum extremitate Ei aculatorij semen in cauum Vteri effundunt, & ex sua radice producant exiguum & gracillimum surculum valde anfractuosum, qui lateraliter perreptans Vterum, ad veram Vteri cervicem producit. Per hunc Canaliculum in gauidis semen externi probabile est.

Hunc meatum primus obseruauit *Fernelius*, ex *Herophili* sententia, notauit *Varolinus*, transcripsit *Laurentius*. *Fernelius* verba sunt loquentis de Vtero: Alij vetustissimum *Herophilum* sequuti, è Testium inuolucris iter esse censuerunt in nervosum Vteri cervicem, tum in capacitatem Vteri vias duci volunt, quorum ego sententiæ subscribo. *Idem lib. 6. Pathologia*, cum agit de gonorrhœa mulierum, ait semen profluere, non ab Vteri capacitatem, sed è vasis spermaticis in Vteri cervicem.

Hoc in loco disputat *Galenus aduersus Herophilum*, de illo ductu sistit, qui semen è Testiculis ad collum matricis deducit. Miratur *Hofmannus, pag. 327.* cur *Laurentius* dicat istum tamum se primum descripsisse, cum à *Galeno, libro 14. de vasa partium, cap. 11.* prius animaduertus fuerit: & *Aristoteles, libro de historia animalium*, iuxta *Os colis*, id est, orificij interni constituit porum per angustum, paruum, per quem tanquam

per nares, matricem *Similis seu rubrum videtur. Scaliger* restituit *anipum*, quoniam *anipa* per eum canaliculum eicitur, & ad utrumque vsum feruire potest, nec repugnat dictio *anipum. De hominis libro de Piscibus*, exemplo Delphinorum & Marfuinorum femellarum, ut in cæteris animalibus femineis terrestribus obseruauit semen per canalem deduci, & effundi in cervice Vteri, moxque ab Vtero aude resorberi. Vidi sæpius intra Tubam Vteri semen candidum, vacuis & exlocis Testiculis. Intra Vteri cavitatem ad latera conspiciuntur foraminula, quæ sunt extremitates vasis eiacularis semen.

Ex superiore & laterali fundi parte, vtrunque dependet Membranosum corpus rubicundum, ac veluti carneum Testi circumplicatum, fistulosum est, & in eo tres aut quatuor cellulas discretas, ac semine candido plenas inuenies, & quas mois semine turgeat, huius tamen corporis extremitas non est clausa, nisi concidentibus in sese simbris huius extremitatis, quæ lacinata est, tanquam à foricibus erosa. Vltra cellulas circa medium huius corporis fistulosi, si rescindatur, rotundum ac durissimum & neruosum illud vasculum inuenies, quod Vteri lateribus affigitur; per id semen exsugit, & in Vteri cauum transferri credemus. Nam intra Vterum Poru duo vel tres deprehenduntur, quos vasis Eiacularis huc desinentis extremitates esse certum est. *Fallopio, in Obseru.* hoc Vasculum *Tuba Vteri* appellatur, & dubitat in *Inst. Anat.* num duo hæc corpora spiraculorum aut caminorum vicem gerant, per quos Vteri fuligines intra abdominis cavitatem exhalent. Sed in mulieribus non prægnantibus facilius est exitus per apertum Vteri ostium. Iure dubitaret aliquis, an per istos canales Fœtus intra Vterum respirare queat, vel potius fuligines in prægnantibus euaenunt. *Tuba hæc Vteri* eleganter descripta fuit à *Ruffo Ephesia*, & Parastatam varicosum appellat. Feminas, inquit, varicosis affessoribus carere *Hætophila* existimauit, nos vero in pecudis Vtero Testibus nata vascula, atque vtrumque varicis instar reuoluta conspeximus. Hæc autem in Vteri cauum perforatum subibant, è quibus mucosus quidam Humor, si quis exprimeret, emanabar, magnaque erat opinio hæc seminarios esse canales, & eorum generis, qui *Varicoli* nuncupantur. Interea notabis in Mulieribus, dum hysterica suffocatione crudeliter torquentur: Num ista vexatio procedat à semine corrupto, & extra cornua Vteri effuso in cavitatem abdominis, quod putrescendo tamdiu Mulieres excruciat, donec consumptum & siccatum fuerit: at in Viris semen conclusum vesiculis seminariis etiam putrescendo, istos graues affectus producere nequit, quia extra Peritonæi cauum eiectione sunt, & duplicatio Peritonæo cum Vesica vniaria incluse.

Testiculus muliebris latis & membranosis Vteri ligamentis includitur, latitudine duorum digitorum ab Vtero remotus, & illud integumentum Communem constituitunicam à Peritonæo natam: Aliam adhuc habet Propriam, quæ immediatè Testis substantiam cingit. Ex quinque vel sex vesiculis simul conglobatis contextus est, quibus apertis magno cum impetu serosus humor erumpit in taciem secantis, nisi sibi caueat. Quod *Gunterus Andernacensis, in suo libro de veteri & noua Medicina* annotauit. Quo sine humor ille continetur? An ad titillationem? An siuilis est humori saliali & oleoso, qui perfundit Vrethram in viris? quem in mulieribus etiam necessarium *Galenus* iudicauit. In virgine triginta annos nata pallidis coloribus diuexatà, & quæ repentina & inopina morte sublata fuit, inueni Testiculum unistrum pugno maiorem, intus humore seroso & subauro refertum, foris veto sanguine suffusum. Duas consimiles historias profert *Fesalius, lib. 5. Anat. cap. 15.* De hydropse Testiculorum muliebrium exempla reperies apud *Schenckium in Observationibus.*

Muliebris Testiculus nullo Cremastere musculo suspenditur, sed à ligamento lato firmatur & coninetur, quamuis *Soranus* illum admittat. Nonnulli, inquit, inter quos est *Chius*, vident æquales Testium appendices, quæ Cremastere dicuntur, Testiculis committi, id quod non propriis oculis intui in muliere, cui intestina in scrotum descenderant historiz mandauimus, in qua cum Chirurgiam excercemus, Testiculus antè cecidit, laxaris videlicet vasis ipsum continentibus, & cum iis Cremastere prolapsa. Quidquid *Soranus* dixit nullus Cremastere musculus in mulieribus reperitur, nisi cum aliis Anatomicis, *Fesalio & Fallopio*, accipias rotunda Vteri ligamenta, quæ tamen nulla ex parte Testiculos attingunt, sed ab ipsius Vteri fundo enascuntur. In mulieribus nullæ sunt Prostatae, quamuis *Galenus, libro 2. de semine, cap. vlt. & lib. 14. de vasa part. cap. 21.* illos admittat, sola magnitudine à virili.

bus differentes, Vteri, inquit, ceruici accumbunt, & eundem atque in maribus vsum præstant, humorem enim continent, qui venerem excitat, & in coitu titillat. Tum effluit mulieribus, cum in coitu vehementius oblectantur, & qui concumbunt cum circa penem effundi percipiunt. Denique leniore suo instat, olei meatum humectat, ne exsiccatu concidat, prohibeatque lotij & feminis excretionem. Solus inter Anatomicos recentiores *Piccolaminus*, Prostatas mulieribus attribuit, sed hoc illi parum in rebus Anatomicis exercitatio condonandum. Non video quid pro glandulosis prostatas accipi debeat, aut vsum habere possit. Apophyses membranoæ ex lateralibus & supernis Vteri partibus emicantes, dimidij circuli reuolutioni similes, ut inquit *Herophilus*, à *Dinde* Cornua vocantur, quia cornubus exorientibus animalium assimilantur.

Quid autem pro Cornubus accipi debeat, nondum apud Anatomicos definitum est, quia nihil extra Vterum figuram cornuum, ut in brutorum matrice refert. Si credimus *Ruffo Epheſio*, Cornua Vteri nihil sunt aliud quam ipsum exterius sustententia vasa, vel potius ligamenta. *Fernelius* pro Cornubus videtur accipere membranosam illam apophysim pendulam, quam supra dixi, Tubam Vteri à *Fallope* vocari. Adstringitur, inquit *Fernelius*, necitatque Vterus coxarum Ossibus validis ligamentis, quæ ad illius Cornua pertingunt. Sic enim appellantur ingentes processus, qui curuatis cornubus similes, vtriusque ab Vteri introitu sursum ad ilia coxarumque Ossa incuruati retorquentur. Ac sanè si Cornuum Vteri vsum, ex *Galeno* repetamus, in quibus semen contentum in Vterum expellitur, nulla pars pro cornu Vteri accipi debet, quàm Tuba Vteri: quæ videtur eiusdem naturæ & substantiæ cum Vtero, quia mediocriter carnosæ est, in qua, quod est mirabile, fœtum humanum concipi fuit obseruatum: Decem sunt anni iam elapsi, ab eo tempore quo hæc scribo, quod Chirurgus *Parisiis*, presentibus Medicis in mortua muliere dissecta, pusillum fœtum optimè conformatum in Cornu dextro Vteri inuenit: similem fœtum à sexaginta annis in iisdem vasis, *Parisiis* visum fuisse, à Chirurgis fide dignis mihi narratum est.

Sed recens habemus exemplum de lottice linteorum Cubiculi Reginæ, ab aliquot annis, in eius corpore inuentus Fœtus pollicis longitudine, & crassitie bene conformatus, intra Vteri cornua locatus, qui dolores adeo crudeles per quatuor menses excitauit, ut tandem vitam cum morte commutarit, mense grauiditatis septimo. Id rescui ab eruditissimis Doctoribus *Parisiensibus*, qui apertioni cadaueris interfuere, D. D. Petro Seguino Scholæ nostræ seniore, Primario Reginæ Medico, & P. Yuelin Medico ordinario Regis & Reginæ Dum hæc excuderetur, rogatus D. Yuelin historiam à se descriptam mihi dedit, & fœtum quem adhuc seruat, ostendit. Anno salutis 1638. die 8. mensis Maij. Ista Lotrix diluculo violentis conuulsionibus tentatur & distortetur, accersitus D. Yuelin accessit, imperatque venæ sectionem, ne ex illa violenta distensione vas aliquod effringeretur in isto corpore plethorico. Venæsectio dilata fuit in aduentum Primarij Medici Seguini, inter moras expirauit. Apertum fuit cadauer iussu D. Yuelin, discisso abdomine statim effluxit magna copia sanguinis effusi in capacitatem, per spongiam exhausto sanguine perquirat partes genitales, in conspectum venit Tuba Vteri supra modum tumefacta in sinistro latere, eaque aperta deprehensus fœtus bene conformatus, plusquam bimestrus, inuolucro carneo obuolutus, quod secundinam referebat. Istud prodigium Reginæ, totique aulæ Regis demonstrauit.

Hunc locum intelligere puto *Marquardum*, dum in sua practica empirica narratse vidisse molam genitam extra Vterum, iuxta ipsius fundum in vasis spermaticis. Exemplum simile Auarici Biturigum ferme ab annis triginta obseruatum fuit. Id prout à doctissimo illius vrbis Medico *Mercero* descriptum est, apponam. D. *Cantia*, D. *Azardi*, Quæstoris Regij vxor, non minùs animi, quàm corporis egregiæ formæ præstans, annos vnum & triginta circiter nata, coniugem Lutetiâ, vbi per multis menses commoratus fuerat, redeuntem hilariter excipit. Ex mutuo complexu grauida fit. Per quatuor mensium gestationis tempus nihil præter solitum graue, nihil molestem, vnde conqueri posset, sensit. Vnum hoc adfuit, quod paulò supra regionem inguinis dextri, rumor quidam cum duritie oui, vel pugni contracti magnitudine tactu perceptibilis cum aliquantulo dolore, quem & coniugis manibus sæpe contrectandum exhibebat, apparuit. Rarè aderant cardialgiz, nulla præter consuetu-

uetudinem corporis, & membrorum, quæ solent grauidæ conqueri, lassitudo: neque hæc im prægnatio quæ octaua fuit, tot enim foetus gestauit, villo ab aliis dissimilis modo videbatur. Die secunda Ianuarij anno supra sexcentessimum decimo quarto, mense quarto à conceptu, circa vesperam dolore ad pubem grauissimo torqueri cœpit, frequentes adfunt cardialgiæ, interdum etiam lipothymix, de imi ventris & cordis iugulum vsque pertingente dolore conqueritur.

Vocatur Medicus, hysterica symptomata suspicatur, quid enim aliud (eum nihil de tumore circa dextrum inguen comparere audisset) coniecere potuisset? Vacuata aluo, quæ ad hystericos affectus conducere videbantur, præscripsit, ex quorum usu paulo melius habere visa est. His ad mediam vsque noctem peractis, obstetrici, quæ si forte periculum abortus accideret, vocata fuerat, tota res commendata est. Quod reliquum fuit noctis, etsi cum pubis dolore & cardialgia, placidiùs tamen transactum est, vsque in horam quintam matutinam sequentis diei, quæ instante exacerbatis doloribus & fractis viribus fatis decessit. Aecersitur illico Chirurgus, qui dissecto Vtero exitum foetui sacri Baptismatis fonte abluendo præberet.

Quod iussum esse exequitur. Dissecta ventris infini regione, in ipsius cauitate libras non minus quam sex conereti sanguinis, cui intestina innatabant, comperit, unde is profluxerat, miratur, in dextro latere foetum è latebris, quibus inerat disruptis egressum, Vterum eas esse reputans videt, & eam causam effusi sanguinis vt erat, suspiciatur. Foetus, siue is vitalis, siue vitæ orbatus, namque id incertum est, quinque pollices & uncias magnus, feminei sexus partibus omnibus bene & distinctè efformatus; & probe enutritus, vracho ad Umbilicum & secundinas, quæ nullæ citra tunicam amnion conspicuæ apparebant, suspensore perptus est. Interea rursus vocatur Medicus, & quæ Chirurgus nota uerat, & quæ multi vtriusque sexus præsentem inspexerant, audit. Placet res omnes propius scrutari: Renes, de quibus alius conquesta mater fuerat intueri: hos ambos mole ampla & longitudine præter solitum immensâ, sanos tamen, quibus nihil vitij, nec morbi inesset, considerat.

Vteretres dum scrutatur, sinistrum Testem mole, vt solet exigua conspicit, dextrum dum perquirat, in quo & valis Ei aculantibus, & dextro Vteri Cornu antea Foetus conclusus contabatur, omnia lacera animaduertit, ipsius Testis glandulosam substantiam diuissam & sparsam videt: Vasorum spermaticorum membranas laceras ad Cornu Vteri vsque dextrum intuetur: Vterum inuestigat, quem sanum, integrum, rugosum, & vacuum, qualis in non prægnantibus esse solet, pugni contracti magnitudine, in quo dissecto leue quoddam molæ rudimentum esse contemplantur. An via quædam ab Vtero in Cornu dextrum, & vasa spermatica, qua Foetus vel semen eò ferri posset, conspicua esset, perquirat. Nullam aliam præter vasorum anfractuosa vt solent esse ductus, conspicit. Foetum tam arctis receptaculis, quibus contineri non amplius poterat conclusum, vel mole corporis, vel motu lacerationis eiusmodi partium, & sanguinis per imi ventris capacitatem effusi, effluxus causam conlicit.

Cæterum, data occasione Testium, & Cornuum Vteri, paucis examinabo, *An Mulier semen habeat proprium, prolificum, necessarium ad procreationem.* Id demonstratur ex valis seminalibus, quæ materiam seminalem præparant, & ex ei aculantibus, quæ semen elidunt. Præterea, ad hoc opus habet Testes, appetitum venereum, siue titillationem ad Venereum, imò delectationem maiorem in emissionem seminis, intra cauitatem Vteri & eorum: quinetiam extra orificium Vteri in salacibus, quæ peperere, laxamque habent vaginam impetuosè erumpit saliendo. Nonnullæ Mulieres admodum libidinosæ, ad conspectum & colloquium Viri formosi vel amati semen suum effundunt cum ei aculatione: Itaque certum est, absque semine muliebri, in congressu mutuo Viri & Mulieris nullam fieri conceptionem. Præterea laborant Mulieres ex semine corrupto, retento, suffocationibus & strangulationibus vterinis, horrendis conuulsionibus, eaduo ex Matrice: quinetiam patiuntur gonorrhœam ex laxitate meatuum seminalium, ipsamque gonorrhœam virulentam.

Qui contrariam tuentur opinionem, proferunt aliter conformatos esse Testes in Muliere, quam in Viro, sunt enim ex pluribus vesiculis conflati, quæ conseruant serosum humorem, non candidum, vt in Viris: Earum Testes carent Epididymide. nec reperiuntur in partibus genitalibus parallæ & prolatæ, vt in Vi-



ris: ideoque cum careant Mulieres isto partium feminalium apparatu, qui requiritur ad productionem feminis, ut in Viris, earum semen non potest esse fecundum & prolificum. Serosus humor ipsarum Testibus ingeneratus ad titillationem dumtaxat, comparatus est, & si credimus *Cremonino*, ad incrementum Vteri impenditur in conceptione dum distenditur, & crassescit, quod est absurdum.

*Cremoninus* putat multum fauere opinioni *Aristotelis*, dum ait sanguinem non quemlibet concurrere pro materia ad conceptionem, sed excrementum ultimi alimenti ad hoc opus determinatum, *quaro ubi reconditum?* An in venis hypogastricis, venis vel arteriis. Cum sit duplex sanguis, venosus, & arteriosus, qualis erit, si in locis genitalibus contineatur, grauiter peccant Medici contra Naturæ institutum, si per Venæsectionem præripiunt istum sanguinem genitalem & prolificum.

*Aristoteles* auctor est feminis infœcundi in muliere, dum sanguinem menstruum pro semine substituit, habuit multos Assēclas, qui eius opinionem multis rationibus confirmarunt, quas non repeto, quia solertes & argutas, magisque ingeniosas puto, quam vetas: hoc vnum illis oppono: Cum semen tam virile, quam muliebri sit à toto deciduum, ratione spirituum ex quibus conflatur spiritus genitor, qui partum omnium ideam refert, & in se complectitur: Idcirco virile semen solum marem procreabit, quia non habet in se ideam corporis muliebris, ac proinde necessario admittendum alterum semen muliebri, quod ideam partium vniuersi corporis muliebris continet ad formandam feminam.

At dicet aliquis. Duo entia, siue duæ animæ Vegetatiuæ non possunt seorsim existere intra Vterum, vel simul vniri ad constituendum masculum foetum vel feminum: fator, sed imbecillius semen subiicitur, & manipulari fortiori: tumque anima vegetatiua alterius feminis, siue facultas formatrix alteri semini insita, suffocatur atque deperditur, materiaque feminalis cum altera coit, & concurrit ad formationem corporaturæ, siue productionem filamentorum, ex quibus delineatur vniuersum corpus instar retis, priusquam affluat sanguis mensurius ad replenda spatia & compingenda. Sic pictores prius lineamenta ducunt corporis, quam inducā colores. Forlan addet alius: si mulier in se habeat materiam & efficiens, generabit absque semine virili, quia non habet materiam sufficientem vel conuenientem, vtraque requiritur confocialis. Quid si dicerem cum *Valerio*, mulierem solum in se posse concipere foetum, sed imperfectum, quales fuerē, qui reperti in cornu Vteri.

Si quis obieciat illum serosum humorem in Testibus mulierum inutilem esse. Respondendo non alium à Viro suppeditari, & ex vtriusque miscella fingi & formari foetum, nam in tota illa massa feminalis humoris vnica particula, licet exigua, totam virtutem procreatricem in se continet, ut in ovo chalaza, & in seminibus particula quædam, materia feminalis pro subiecto, in quod agit, habetur. Ideoque Empedocles semina comparabat ouis, ut est apud *Theophrastum*, lib. 1. de hist. plantarum. Isthæc particula feminis in Viro profuit à Testibus, in mulieribus à cornubus Vteri, ubi candidum semen reperitur, sed paucum, ut in Testibus Virorum.

Præterea, semen muliebri, ut plurimum fortius est, & calidius virili, quia melius fouetur & conseruatur, quam virile, in Testibus foras propenditibus, siue in proflatis inter fordes lotij, & stercoris latens iuxta suum egressum: ideoque spiritus genitor Viri, si in hoc postremo loco contineatur, in tētine funym & longa, foras exsilire & evanescere potest. Muliebri verò semen longè distat à partibus externis, & meliorem habet situm & sotum ad sui conseruationem.

Menstruus sanguis non potest esse reliquæ ultimi alimenti, quia vena spermatica & arteria in Mulieribus, ut in Viris, in progressu suo propagines emittunt ad nutritionem partium, quas percrepant: Iste verò sanguis non appellat ad Vterum, nisi iam ductis filamentis & staminibus corporaturæ foetus, atque instar stœbes filamentis agglutinetur, & adhærescit. Id obseruare licet in abortu vnius mensis, vel 40. dierum, ubi foetus totus candidus, ac membranofus conspicitur.

Itaque propter prædominium muliebris feminis supra virile, frequentius semellæ quam masculi generantur, & si gemelli formentur diuersi sexus, vtrumque semen æquali potestate fuit: si eiusdem sexus ex semine diuiso, eadem facultas formatrix, finxit gemellos. Vtinam non excidissent ab ore & calamo *Cass. Hofmanni*, quatuor istæ Conclusiones descriptæ sub finem libri de Generatione Hominis, valde confusi: Semen non habent omnes femina. In iis seruunt Vasa alendis tantum partibus feminalibus. Qua

*habent, non semper emittunt, cum concipiunt. Quæ emittunt, non in Vterum, sed foras præiiciunt. Quas singulas refutandas relinquo petitis scortatoribus, qui lupanaria frequentant, qui sunt Hofmanno peritiores.*

His à me ita positis, Medici stare debent opinioni *Hippocratis & Galeni*, nempe mulieres semen foræ tandem producere, quod ubi prædominatur virili, femellæ procreat: Vtriusque tandem seminis concursus & coitus necessarius esse, nec vnum absque altero quidquam perfectum moliri posse: ac proinde meritò queri potest, An in diuortio Matrimonij par esse debeat ratio Mulieris ac Viri? Nam Vir iudicatur ineptus ad generationem, nisi habeat arrectionem, introductionem in sinum muliebrem, & eiectionem seminis: ideoque, si mulier careat eiectione seminis, haud dubiè sterilis censenda, & prorsus infœcunda. Cognosces eiaculationem seminis ex voluptate infuscatione lumborum & partium pudendarum perfusione. Sed astuta & versipellis Mulier, quæ recusat diuortium, ista simulabit, nec faciliè potest deprehendi; quia dicit se nihil emittere, nisi post actionem Viri. Quapropter isthæ causa diuortij ex parte Mulieris in familiis dumtaxat principum concedi potest, quibus proles est necessaria, non autem in vulgaribus familiis, quia multi hac de causa suas vxores lubenter repudiarent.

Locus hic postulat, vt quæstionem Anatomicam à paucis discussam examinemus, si mulier castrari possit. Id olim factum fuisse litterarum monumenta testantur. *Athenæus lib. 12. Diogenes lib. cap. 3.* auctor est *Xanthum* litteris mandasse, *Andramytm*, Lydorum Regem, feminam primùm castrauisse, quibus Eunuchorum loco utebatur. Eiusdem sceletis ab *Hesychio & Suida*, Gyges accusatur. Et in Arabia gens est, *Creephagos* vocant, teste *Sirahone, lib. 16.* quibus nedum viri, sed & mulieres Iudaicè excindi solebant, quo exemplo aliquando mulieres in *Egypto* excindebantur. Circumcisio illa fiebat per Nymphotomiam, si credimus nobili Gallo, *D. des Hayes de Carmesman, in sua peregrinatione Orientali, tractatu de religione Turcarum*: sed longè differt à Castratione, quæ per seieiebatur exemptis Testiculis, vel detractò Vtero: utroque modo mulieres in maximum vitæ discrimen adduci certum est. *Galenus, lib. 1. de semine, cap. 15.* scribit in Asia, superioribus regionibus vsque ad Cappadociam, Suiibus testes extrahi: quod non pari securitate administrari potest in Mulieribus, ob fedem in qua collocati sunt, & connexionem quam habent cum aliis partibus. Nam vtrumque ille secare necessum esset ei, qui feminas castrare voluerit, opus periculosa plenum alea. At maius periculum imminet Vtero detractò, cù hoc feliciter cesserit cui-dam pecudum castratori, qui filiam adulterij suspectam Vtero violenter extractò more pecudum castrauit, vt deinceps ad prolem inepta foret, teste *Vaiero*.

An quemadmodum infibulatis naturalibus equarum, quas concipere & parere nolunt, ferreis nimirum circulis ordine tractatis, quibus naturalia clauduntur, ita Mulieres olim castrabantur? Sic enim veterem Mulierum castrationem interpretatur *Dalecampius, Notæ ad lib. 12. Athenæi*. Et eodem modo *Zelotypos Italus* vxores à rivalibus consecrare audio.

Connectitur & alligatur Vterus partibus vicinis, Recto scilicet Intestino, & Vesicæ per suam tantùm ceruicem: Nam corpus Vterinum partibus istis non adhæret, neque Vesica ipsi Vtero incubat, quia sublimis appensa est, dumtaxat collo suo mediani Vteri ceruicem tangit: & quamuis arctò ligata sit Recto Intestino, non est tamen medianus paries vtriq; communis, quia ceruix Vteri à Recto Intestino sine vlla laceratione separari potest.

Corpus autem Vteri, quamuis ad latera & antroorsum moueri queat, tamen ligamentis quatuor in sua sede sistitur & retinetur. Duo superiora lata & membranosa sunt eminentes Peritonæi produções, quæ lateraliter & infernè connectunt Vterum, itaut quatuor dici queant; quod animaduertes eleuato Vteri fundo. Tum enim expansa nauigiorum vela referunt, quibus comparantur ab *Aretæo lib. 2. Chron. cap. 11. & lib. 1. de curat. acutarum, cap. 10. inuicè vtrūq; scripta*. Nec ineptè *Iulia, Augusti filia*, Vterum, Nauim appellabat, quæ securiùs & meliùs nauigat, dum est onusta.

Inferiora ligamenta mulieri tantùm propria, rotunda sunt, ac fistulosa, sanguine referta, extrinsecus carnosâ, prodeuntque à lateribus fundi, & supernè ad inguina remeantia per apophysim Peritonæi, quæ in Mulieribus, vt in Viris simplex est, traducuntur, Cremastere musculo obuoluta, & in inguine supernè & infernè glandulis fusculis, ibique membranæ modo dilatata, portionem Clitoridi communicant, re-

liqua in adiposam femoris interni membranam expanditur, quam diffecando ad genu persequi licet. Inde causa reddi potest, cur primis gestationis mensibus Mulieres de dolore femorum interiorum conquerantur. *Author Anatomiæ virginum* inferiora ligamenta ad pedes usque produci non absurdè scripsit, sed nugatur, dum superiora ad mammillas & oculos ascendere tradit.

Istud ligamentum Vteri non tantum retinendo Vtero designatum est, sed quia fistulosum, instar canalis, deuchit ad inguinis glandulas superfluos partium Genitaliū humores: inde fit, ut in quibusdam hysteriis virginibus atque Mulieribus inguina tumeant, interiora femora doleant, conuulsis eiusmodi ligamentis, quæ humore distenta breviora sunt, & erigendi corporis atque extendendi femoris commoditatem impediunt. Sed ubi partes feminales lue venerea sunt inquinatæ, si robustæ fuerint, virulentum humorem per hoc ligamentum fistulosum in glandulas inguinum, Vteri emunctoria transmittunt, in quibus bubones venerei, ut in viris excitantur, quod à nobis sæpius obseruatum: habet etiam Vterus ligamenta parua, siue connexiones fibrosas ad Vesicam & Rectum Intestinum.

Cum igitur Vterus sit in suo situ firmiter alligatus, non est verisimile in præfocationibus hysteriis ad Vmbilicum ascendere. Crederem potius motum illum oberrantis & conuoluti corporis, quod hysterice mulieres sentiunt circa Vmbilicalem regionem, proficisci non ab Vtero ad eas partes elato, sed à Testibus, & Tuba Vteri. Quæ enim Testes sunt penduli, & corpus Tubæ fistulosum, laxum & vagum, simul voluari possunt per Hypogastrium, & tracta ad Vmbilicum vsque affurgere, dum semine putri turgent, cuius orgasmo & impetu, huc & illuc violenter agitantur. Nam Vterus etiam vi magna supernè tractus, vix supra Os sacrum efferri potest: quippe præter quatuor ligamenta quibus firmiter adstringitur, etiam Recto Intestino, & pudendis partibus externis adnascitur & coheret. Quas quidem partes, nempe pudendum & podicem dolorificè retrahi & conuelli oporteret, si ad Vmbilicum vsque Vterus ascenderet.

Præterea dubitari potest, *An Vterus sponte, aut vi ad Hepar affurgat?* Si sponte, non potest motu proprio eò ferri: si supernè vi quadam rapiatur, necessum est partibus superioribus adesse conuulsionem, non Vtero, qui tum à supernis partibus attrahitur ratione nervorum: tumque Cerebrum ipsum conuulsionem patietur: Nam rarò conuulsiones adfunt in hysteriis affectibus. Eleganter *Valesius, comment. ad particulam illam lib. 7. Epidem.* plurimas Vteri affectiones status facit, signum sunt ructus & strepitus circa ventrem & lumborum tumores & dolores circa renes, & coxas. Probat etiam Vterum non moueri sua sede, neque oberrare in hypogastrio: propterea dum flata vasa spermatica, locorum muliebrium venæ & arteriæ hypogastricæ turgent & distenduntur, vapor seu flatulentus spiritus per venam cauam sensum conuulsionis inferet Hepati, premetque diaphragma: si vterius feratur, & ascendat ad pulmones, præfocationem pariet, & fauces strangulabit, si Thymus Venæ causæ subiectus intumuerit: si in Iugulares effundatur, collum intumescet, & attonitæ reddentur feminæ.

Quod si obiciat Testes & fistulosum Tubæ corpus minora esse, quàm ut possint tumorem illum rotundum efficere, siue corpus illud magnum conglobatum, quale tactu deprehenditur æquare. Respondebo me in hysteriis virginibus deprehendisse Testes pugno grandiores, seroso semine turgentes; quinetiam Tubam Vteri amplificatam & valde dilatatam. Quapropter *Galenus* sententiæ subscribo, Vterum non per se moueri, sed dumtaxat eius appendices plenitudine distentas huc & illuc circumsferri, quod ipse cumulatius demonstrat *lib. 6. de locis affectus. Quamuis Hipp. lib. 3. de artic. & lib. 1. de morbis mulierum* asseueret, Vterum aridum & siccū, suoque genio defraudatum ad Hepar gratiosi humoris fontē excurrere, ut humectetur. Cui etiam suffragatur *Fernel.* qui sæpe tactu deprehendit instar globi cuiusdam in Ventriculo efferri, eumque grauior opprimere, manu depressum in propriam sedem propelli. Quod non magis alienum videri debet quàm eiusdē prolapsus, quo totus ferè procidit. Nuper vidi in muliere 15. diebus à partu strangulata, Vtrum in dextrum latus inclinatam, & firmiter adstrictum; ligamentum latum dextri lateris brevius erat sinistro, marem enim ex fœra. An eo modo constitutus in iis, quæ mares potius, quàm feminas generant?

Venæ hypogastricæ cervici Vteri implantantur, inde ad orificium internū extrinsecus & orbiculatim distribuuntur, neque per Vteri substantiam disseminantur, sed per tubulos & cauetulas sanguis quoquoersum distribuitur, ideoque notabis *Cory-*

*ledenas* non esse extremitates venarum & arteriarum in Vterum definitum. Rectè igitur *Carolus Stephanus* affirmavit venas & arterias matricis substantiam ingredientes, proprias tunicas cum primum implantantur amittere, & in primam Vteri membranam consumere. In ipsa tamen matricis substantia ductus & canales anfractuosis reperiuntur, quales in spongiis videntur, latiores & ampliores inter utrumque parietem, quam in extremis. Inde expendes, si venæ & arteriæ per Vteri longitudinem possint extendi, dum dilatatur in amplitudinem usque ad octavum mensiem.

Ex hac venarum Hypogastricarum per cervicem distributione cognosces, menses in mulieribus, tam vacuis quam prægnantibus per cervicem evacuari. In quibusdam vidi per cervicis venas menstrua profluere, fundi cavitate nullo modo humectata, in aliis etiam per Vteri cauum sanguinem stillare, sed copiosior è ceruice fluebat.

Consensus autem Vteri cum Licne intercedit per venas hæmorrhoidales, quæ cervici Vteri & Recto Intestino distribuuntur: inde fit, ut hystericae sint spleniticae & melancholicæ, vicissimque spleniticae evadant hystericae. Spermaticæ Venæ etiam Vterum irrigant, & ad cervicem usque producuntur. In gravidis digiti parvi crassitie pares sunt, ut in gravidis & puerperis post obitum observavi. *Valerius* in muliere vacua nunquam vidit capillares venas Vteri intumescences, ne quidè fluentibus menstruis: ideoque negat per cavitatem Vteri menses fluere: quod prius à *Vesalio* dictum & probatum fuerat copiosè, *Lib. 5. cap. 15.* Itaque statuendum menses in mulieribus per Vteri cervicem, seu Vaginam manare, quia pars isthæc carnosæ & venosa est: in brutis, quia collum est membranofum & exsangue, per Vteri cavitatem fluit. Credo tamen etiam per cavitatem Vteri, sed in gravidis solum per collum Vteri fluere sanguinem. Inde cognosces sanguinem à partibus supernis per spermaticas ad Vterum deferri, nec alio sanguine, quam quo nutriuntur omnes corporis partes, semen constare.

Arteria insignis ab Hypogastrica in cervicem Vteri propagatur, cuius furculus intra duplicem membranam, corpus Vteri anfractuose pætreptans, ascendit ad Testiculum. Anfractuosus est, ut in graviditate dum supernè augetur Vterus, sine ruptura extendi queat. Varicosior est in mulieribus, quæ Vtero gestarunt, & in prægnantibus evidentiùs apparet. Norabis arterias, non ad interiora Vteri penetrare, nec hiare in Vterum fluentibus menstruis, neque vniui placente, quia in partu post secundinæ exclusionem ex arteriis profusus sanguis, in vitæ discrimen adduceret parturientes, propterea puerperia fluunt, non cum impetu necessarium, nisi vas aliquod arteriosum resecratum fuerit. Observabis etiam ex venis Pudendi hæmorrhoides in mulieribus excitari, quæ intumescences fluunt, vel in marifcas, aut sicus degenerant, quamvis rarus sit hic affectus, *Atii* iudicio, quem tamen proposuit *Majichius, Mercurialis* confirmat, & quotidiana testatur experientia.

Corporis Vterini figura orbicularis & oblonga est, pyro maiusculo similis, antè & retro compressa. *Soranus* Vterum medicæ Cucurbitæ comparat, quæ cum in fundo exactè rotunda sit, nullo modo inuersa.

In *Vesalii & Recentiorum* picturis reprehendo, quod Vteri fundum externè in cavitatem phialarum vitrearum modo inuersum exhibeant, cum talis inuersio nulla sit, nisi fortè quibusdam acciderit ob mollitiem fundi, quoniam ea pars ligamenti non sulcitur. Internè tamen fundus, Phialæ vitreæ modo prominèt, & in quibusdā magis exuberat. Sed in virginibus corpus Vteri non exactè rotundum apparet, sed antè & retrò compressum, quia reuulsum est ad Vesicam cui adhærescit. At in iis, quæ peperere, rotundum evadit, quia tempore graviditatis æqualem ubique crassitiem assequitur, quam post partum iuxta suam molem retinet, & conseruat. Vesica non incubat Vtero, quia sublimis appensa est intra duplicatam Peritonæi, dumtaxat collo suo tangit cervicem Vteri: In muliere puerpera corpus Vteri Offi Sacro incubat, imi ventris locum medium occupans: quod si in alterutrum latus inclinet, claudicationem adfert, ex *Hippocrate*, quod notandum in Mulieribus claudicantibus, ex suspecta *Ischiade*, siue notha, siue vera.

A partibus internis Vteri, quæ intra Peritonæum continentur, ad externas quæ sunt in pudendo collocatæ, me conféro. In pudendo plurimæ partes citra dissectionem apparent, ac primum pars superior pilosa pubes dicitur, *Finnus*, ab *Aristotele*, & *Pandion*, à concussione, quod in concubitu hæc pars maximè quatitur: *Tab. vocat.*

tur ab Hippocrate, libro 2. de morbis mulierum, vtenotat Galenus, in *Methodo*. Latinis antiquioribus *Natura* vocabatur *Pudendum muliebre*: vnde Varro ait, Nutrices naturam dicunt, quæ feminæ sunt: dicitur etiam *puta* & *putilla*, quasi *parva puella*, à parte quæ femina est. Inde Italicum nomen *putta* & *putiana*, & Gallicum deductum putarim. Huius lanuuium *putti*, pudendi barba, vt plurimum flauus est coloris, & in mulieribus ex frequenti coitu magis crispa quam virginibus. Sæpius sequitur, & refert colorem capillorum: in ruffis pilus hic ruffus est: Vidi in quibusdam quæ capitis pilos candidos habebant, etiam lino candidiores, in aliis quæ nigricantes pilos præ se ferebant, ruffum. Incipit erumpere feminæ, vt mari anno 14. cum ratio firmior, inquit Theodoretus, *serm. 3. de Providentia*, vitium à virtute discernit, quasi tegere volens natura velamentis naturalibus eas corporis partes, ob quas homines erubescere confueverunt.

Rima pudendi *cunni* vulgo, non à cunei impressione, vt quidam ineptè scripsere, cum sit nomen Græcum *κύννη*, à *κύνω*, quod est concipere, *κύνω* foetus, & apud Hesychium, *κύννη* significat *puerum*. Dicitur etiam *κύννη* à *κύνω* & *κύνω*, ex fissura, forsan etiam quod inter homines multa pariat schismata & diuisiones, nam, teste Horatio,

*Fuit ante Helenam cunni scelerissima belli Causa.*

Socratem fidibus ludere docuit nobilissimus fidicen, is *Cunni* vocatus est, num id obscœnum putas: ait Tullius, *lib. 9. epist. 22. In veteri Glossario Latino-Græco*, *cunni*, *κύννη*, ideoque facetissimè lusit Ansonius in Grammaticum, qui lugebat mortem Sepiasariæ: Monet enim vt caueat, ne Cysithum herbam lanuginosam, & Cysithum pudendum muliebre, eiusdem odoris esse putet,

*Qui legitur flores & humi nascentia fraga*

*Frigidus, è pueri fugit hinc, latet anquis in herba.*

Scissura cunni in virginibus triplo maior est foramine caruncularum, & duplo maior fissura nympharum, longa est rima vt canal modo. Penem in fossam dirigat. In iis quæ pepererunt maior est, in virginibus tantum patet, inquit Soranus, quantum externum auri orificium. Vtrinque rimam ambit carnosum corpus adipe multo confectum, cui subiectus est musculus à sphinctere podicis ad inguina protensus, quem mouendis & constringendis Pudendi labris destinatum puto, potius quam clitoridi. Circuitus ille, *genitalis muliebris ambitus* à Celso dicitur, ab alijs *vulva Labra*, Græcis *κύννη*. In *glossario Isidori*, *Cadurda* dicuntur Labra pudendi muliebris, quia sunt cardines ostii pudendi. Labiorum inferiorum cutis ligamentosa *Frænum labiorum* dicitur, in virginibus tensum, in puerperis valde relaxatur, quæ cutis laxitas summaque depresso partus iam facti signum certissimum. Sed huius membrana tensio & erectio potest deprehendi, indito digito, vel paulum diductis & diuarcatis cruribus.

Post labra intus progrediendo vtriusque occurrit alata, ac veluti cartilaginea Membranula sæpius carnosæ, Cristæ pullorum similis, *κύννη* Græcis dicta: longa est digiti internodio, pro ratione ætatis crassitie & magnitudine inæqualis, in virginibus vsque ad decimum sextum circiter annum tenuis est, nec multum lata, adultioribus, præsertim quæ peperere, vel virum passæ sunt, crassior, & latior euadit communiter vix æquat minimi digiti latitudinem, semper inferiore sui parte est acuminata, supernè lata, neque naturaliter descendit ultra labiorum partem dimidiam. Hanc partem cristatam haud dubiè Iuuenalis intellexit iis versibus, quos *Creticus* omnes nondum intellexeret.

*Callidus & Cristæ*, id est, Nymphæ Cristæ, *digitus impressit Aliptes*

*Ad summum domina femur: exclamare coegit.*

Lucem addidi secundo versiculo, dum pro & restitui *ad*, & post femur, adieci comma: quia Crista Nympha ad summum domine femur est collocata & abscondita, quam ubi Aliptes attigisset, coegit dominam exclamare.

In nonnullis mulieribus eiusmodi nymphæ in tantam molem & magnitudinem excrescunt, vt pudorem deformitatemque inducant, quarum Chirurgiam tradit *Paulus Aegineta*, *lib. 8*. Eas olim Aegyptij nupturis virginibus antequam promitterent, rescare solebant, vt docet *Galenus in Introductorio*. Quod adhuc apud Abderitas seu Presbyteri Ioannis gentem ex lege Hebræorum obseruatur, vti narrant *Paulus Iamnicus*, *libro 3. sua historie*, & *Bellonius Obseruat. lib. 3. cap. 28*.

Intra Pudendi labra sunt appositæ Nymphæ, vt lymphis præsent, id est, vrinam ef-

fluentem diuigant, ne in cavitatem cervicis deflillet: idcirco Vteri cervix lotio non rigatur, quemadmodum apud Paphos celebre fanum Veneris erat, in cuius quandam aream non impluebat, inquit *Plinius, lib. 2. cap. 96.* In virginibus videntur instat ligamenti, suspendere, ac veluti constringere & coarctare cunni, siue hiatus externi partem inferiorem, quod percipies indito digito, & extorsum reuulso. Superne angulo acuto iunguntur, ubi productionem membranofam corrugatam instat præputij clitoridem vellicentis constituunt. Vidi in quibusdam nymphas sæpius defuisse, carunculas obliteratas, exceptâ illa quæ tegit & ambit orificium externum Vrethræ. Post Nymphas quatuor *Caruncula myrthoides*, siue triangularis apparent, virginibus tumidæ, elatæ & rubicundæ, quibusdam membranulis ita coeûantes, ut in vestibulo orificij propter basim latiore extorsum vergentem, foramen exiguum intorsum relinquant, quod minimus digitus vix subire possit in puella decenni, sed in adolescentula quindecim vel sexdecim, aut viginti annorum, minimum digitum admitteret, interne sensim angustius redditur, propter earum extremitates iuicem conseratas. Parte exteriori & latiore membranulis constrictæ ac reuinctæ, circulum membranum efformant, quem in virgine quindecim, aut viginti annorum, digito penitus intruso deprehendes. Idcirco referunt Obstetrices vinculum interius duriusculum intromisso digito offendi, *Chordam* idiomate suo vocitant, quo præsentè virginitatem certam esse & indubitatam affirmant: rumpi ac resoluti in prima coitione, quæ acerrima est, inquit *Terentius, in utroque*, amor dulcamatur: quoniam in primo congressu voluptati mixtus est dolor.

Ita constitutæ & compositæ Carunculae caryophylli nondum perfectæ explicati figuram expriment, quarum anterior & superior Velicæ orificium tegens, cæteris amplior est, & in virginibus usque ad quindecim annos totum ferme foramen occludit, aliis supereminens bifida est, ut Velicæ cervicis finem intra se suscipiat. Altera inferne posita est, reliquæ duæ laterales sunt: Omnes simul iunctæ, Vterum ab aëre & externis corpusculis defendunt, & in coitu maris pudendum titillantes veneris, ardorem suscitant & accendunt.

In muliere quæ non concepit, magis integræ remanent, quàm in ea quæ Vtero gestavit. In muliere parturiente & puerpera post enixum per quinque, sex vel septem dies sunt omnino obliteratæ, ex magna pudendi distensione, nec earum apparet vestigium, nisi constricto pudendo, & ad naturalem formam reuerso. Inde cognosces carnosas illas eminentias, quæ pro Carunculis accipiuntur, non esse verè Carunculas in vestibulo Cunni appositas, quoniam in magna Cunni & colli Vteri distensione quæ fit in partu, suam figuram & molem seruant, vel saltem earum vestigium aliquod remaneret.

At in partu & post partum nullæ sunt: Nec earum vllum vestigium apparet, nisi dum Cunnus constringitur & coarctatur. Ac sanè si essent veræ Carunculae ibi applicatæ, parturientibus magno fuissent impedimento, quoniam asperitate & inæqualitate sua, cum sint quatuor in circuitu Cunni collocatæ, egredienti foetui tanquam obices obstitissent. Imo in quibusdam mulieribus publicè dissectis longissimè à partu, & aliis annos 50. natis, nullas animaduertere potui Carunculas, excepto Tuberculo Carnoso, quod tegit orificium externum Vrethræ. Idcirco eiusmodi carnositates, siue Carnosa Tubercula, quæ pro Carunculis vsurpantur, ex corrugatione carnosæ vaginæ Pudendi constantur, ut pars illa externa angustior ipsâ vaginâ, in partu quæ dilatari possit.

Propterea peritior factus in rebus Anatomicis, commentum *Seuerini Pinæi Chirurgi Parisiensis*, de istis Carunculis Hymenem constituentibus, vanum & fictitium esse deprehendi. Non iustior tamen illam angustiam Cunni interioris, quæ fit ab illis carnositatibus, ex reduplicato collo Vteri aliquid conferre ad dignoscendam virginitatem, & ex illis disjunctis carnositatibus attritis in primo coitu, supra vigesimum annum, præsertim in ætate virginibus, sanguinem stillare posse. Inde pendet veterum Medicorum & Arabum Hymen, ut mox explicabo ex *Arabibus, & Sorano, Græco.* Cæterum, inter Anatomicos ante *Seuerinum Pinæum* primus de istis fictitiis carunculis disertè loquutus est *Columbus*, his verbis. In cervicis Vteri finibus vuluam versus, nonnulla caruncula prominent, à quibus voluptas & delectatio non parum augetur, sub his adijuncti à lateribus lata membrana, Nymphae, à Veteribus dicuntur. Interdum vidi locos illarum carnositarum, circulum carnosum exiguo foramine pertusum, quod vix







*sterilibus.* Vbi notat conceptum impediri propter membranam osculo Vteri præpositam, de quo morbo copiosè tractarunt *Proverbum Observat. Medic. & Consens in Epist. Medicinalibus.* Sed diserte *Aristoteles, libro quarto de generatione Animalium, cap. 4. & lib. 10. de hist. animal. cap. 4.* Morbus iste *Solino, cap. 4. concretum vaginalis* dicitur, & à *Cicerone, libro 2. de Divisione, obsequata vulva.*

Quum igitur Hymenis controuersia magni sit in Medicina momenti, quia vulgus credit partes genitales virginis hæc membranâ munitas esse: quæ si defuerit, ex Medicorum & obstetricum relatione, virginis pudicitia suspecta aut violata iudicatur: De *Hymenis natura & hyparxi accuratè agam, & occasionem inquiram, si præter eam membranam, alia sunt virginittis testimonia. Membrana Cunnipularis, Hymen à Græcis & Latinis per excellentiam est appellata, Alexander Benediculus Eugium vocat, quasi *euium*, vel *euum*, quod nomen ex antiquis desumpsit.*

Nam vetustissimus comicus *Nanius* hoc nomen vsurpauit, sine *Eugium* puellam inuenit, defloratam & vitiatam subindicans. *Laberius Mimus in Ceniquario*, in eo sensu hoc nomine vituit. *Quare tam arduam ascendis? An concupisti Eugium scindere?* *Lucilius in Epodis & hymnis* eugium & hymenem simul coniungit: quo loco *Nanius Marcellus* accipit *Eugium* pro media parte inter naturalia muliebria. Poëtæ *Zonam castitatis* appellant: sic enim apud *Catullum* passim in Epithalamiiis, solutam virginittis Zonam, pro Hymene rupto & violato interpretor: vnde apud Græcos deuirginatæ puellæ *zonæ* dicuntur. Meam opinionem manifestè confirmat illud *Catulli* Epigramma, quo puella de suo amasio conqueritur.

*Longiusdix tenera cui pendens sicula beta,*

*Nunquam se mediâ sustulit ad tunicam.*

Subiungit Poëta.

*Et querendum alunde foret nervosius illud,*

*Quod possit Zonam solvere virgineam.*

Ab Hymene dictum putant Hymenæum, nuptiarum Deum, *Servius & Donatus:* & ex eorum sententia, *Hymen*, membrana est quâ munitur virginittas, quæ primo dirumpitur coitu. Sponsi in Nuptiis solliciti admodum erant de officio suo, ne quis eos deuoaret, aut illis occentaret, ne isto maleficio offenderent Hymenæum: apud *Plautum in Casina 4. act. 3. v. 8.* quid si etiam offendam Hymenæum. Paulopost, *dirumpi cantando Hymenæum*, licet illo morbo quo dirumpi cupio.

Sic autem ab oculatis & expertis Anatomicis describitur. Membrana nervea tenuissima venulis conspersa, quibus laceratis in primo coitu sanguis effluit. Ceruicis orificio externo præcensa, ceruicis parietibus orbiculatim adhærescit, & in sui medio foramen relinquit ad menstrui sanguinis excretionem. Nonnunquam magno sanitatis detrimento continua est, inquit *Vesalius*. Hanc membranam *Arabes, Anisennas, lib. 3. Fen 21. tract. 1. Rhisus ad Almanesorem, & Auerrhois* agnouisse videntur, dum referunt ante puellæ corruptionem, extare in collo matricis panniculos ex venis & ligamentis valde subtilibus contextos, quos ariete crebro vir in primo coitu effringit: sed ante *Arabes, Soranus, auctor Græcus, in fragmento, quod superest de partibus mulierum*, notat collum Vteri concidere, & angustius esse in virginibus, occlusum rugositatibus coniunctis inter se per vasa, quæ producuntur ab Vtero, ex quibus in concubitu diuulsis dolor excitatur: eludit verò membranam illam in orificio Pudendi collocatam, his rationibus, quoniam ex dissectione nihil tale inuenitur. Propterea in virginibus debet hæc membrana aliquantulum specillo resistere, sed specillum in profundum vsque ingreditur. Si cum vitiantur, hæc membrana rupta est causa doloris, necesse profecto erat in virginibus antequam vitarentur, cum purgationes apparent, dolor quoque sequeretur, in ipsa verò excretionem non item. Iam verò si membrana corporea reddita morbum creat, quo genitalia calefiunt, opus esset vt id perpetuo eodem modo inueniretur, quo cæteras partes suo qualque certo & definito loco sitas intuemur. At in non perforatis mulieribus membrana hæc intersepiciens, quandoque in partibus labiorum, quæ in promptu sunt, inuenitur, quandoque verò in medio cunno, quandoque in medio ore vulvæ.

Inter recentiores *Iacobus Corpus* circa medium ceruicis collocat *Panniculum Virginealem*, vt rete contextum ex ligamentis subtilibus & pluribus venis, quo violatæ carent. *Nicolas Massa* notat collum in virginibus breue esse, quoniam rugæ ipsius non sunt relaxatæ à suis ligamentis & venis, quæ venæ ligamenta que destruantur à

primo coeunte seu deuirginante. Quare in maximo versati sunt errore, qui panniculum Hymenzum posuere Os matricis obstruentem, putantes ipsum frangi à coeunte, & sic aperiri matricem. At *Vesalius & Fallopius*, peritissimi Anatomici, in omnibus virginibus *Hymenem* inueniri statuunt, & obseruauerunt, quibus subscribunt *Platerius*, & *Piccolominus*; Eumter *Columbus* obseruauit, & ostendunt *Anatomica Patanini*, vt notat *Schenckius*, *Taubertus lib. 5. Errorum popularium, cap. 4.* postquam declarauit omnes virginittatis notas incertas esse, tandem caput concludit, se monitum à *Fallopio* deprehendisse *Hymenem*, quem dicit geminas esse pelliculas vrinx canali subiectas, quæ humore viscido veluti glutine, molliter copulantur. *Parvus* in virgine annos 17. nata *Hymenem* vidit: quinetiam *Fvicrus*, *lib. de prestigiis demonum*, asseuerat, se in virgine quadam istam membranam deprehendisse, quam extare in virginibus rescituit à pudicissimis mulieribus, quæ in seipsis hoc pudicitiz munimentum prima admissione expertæ sunt. Propterea *Celsus* in sectione calculi feminarum, vult virgini digitos subiciit tanquam masculo, hoc est per anum: mulieri verò per naturalia: pari ratione clysteribus vterinis & pessis in virginibus abstinemus, quamuis *Erasistratus* prouocavit in virgine menstrua pessacio indito.

Porro, non in omnibus virginibus *Hymenem* reperiri certum est, quia interdum lasciuæ puellæ inopinato membranam istam effringunt, vt notat *Vesalius in libro Anatomico*, & *lib. de radice China*, dum Veneris stimulis agitatz digito indito, vel quopiam alio instrumento, *inco* vocat *Aristophanes*, coitum imitantur, quæ de re mirabilia recitat *Arnaldus de Villanova in suo Breuiario Practico, capite de morbis mulierum*.

Addit *Vesalius* in quibusdam locis solere Obstetrices hanc membranam tanquam inutilem lacerare, quando digitum podici & vuluæ immittunt, vt partes istas conatas aperiant, quemadmodum solent in recens editis linguæ irazum effringere. Idem notat in *Examine Obseruationum Fallopij*, *Hymenem* pudendi inferiorem posterioremve, quæ ad anum spectat sedem, & huius sedis laterum imam tantum regionem occupare, adeo vt in sui medio illum esse perforatum verè dixeris, nihilque aliud est, quàm si præputij ad Penem vinculum plus iusto conscendere fingeremus: ac proinde non mirum si moltæ matres, & harum iussu Obstetrices, *Hymenem* tanquam inutile huius loci ligamentum adhuc admodum puellis, non secus ac præputij & linguæ ligamentum excedens diuellant. Ex *Vesalio* *Hymenis* vsum, quem *Platerus* assignat, deprompsit: *Hymen* oslij Vteri amplitudinem ante congressum inutilem nonnihil ocludit: & summa, reponit inferna, pudendi latera ligamenti linguæ & præputij instar colligit. Alij pro *Hymene* substituant quatuor Carunculas membranulis quibusdam coeuntes, quæ florem virginæum caryophyllo nondum explicato persimilem constituunt. *Paralus* per *Hymenem* intelligit membranosa copulam, quæ Pudendi alas parte inferiore connectit; in virginibus tensa est, in desforatis relaxator. *Fabricius ab Aquapendente in Operat. Chirurg. cap. de Hymene imperforato*, existimat *Hymenem* esse coalitum Alarum, seu Nympharum, interuentu membranæ tenuissimæ, quæ eas inter se connectat, ita vt simplici sectione rectè efformentur Alæ, tum laxatis ex vtraque parte membranæ; vt ex his liceat coniectere vsum harum Alarum esse, vt perforata membrana, tutelam Alæ suscipiant Pudendi mulieris; quod alioqui priùs ab *Hymene* custodiebatur.

In tanta Anatomicorum disensione quid sentiam de *Hymene*, ex mea in multis virginibus post obitum dissectis obseruatione apertam. Ex istis virginibus quædam erant tabidæ & admodum extenuatæ, aliz carnosæ & succi plenæ, omnes tamen nondum fuerant menstruales, quædam etiam annum 13. attigerant, aliz 15. aliz 18. In omnibus Nymphæ, siue Alæ erant exiles & paræ, versus Clitoridem reuulsæ, quæ manifestè prominebat. Iuxta Nymphas intus, intra foramen Vrethræ, obseruauit circulum medioeriter carnosum, ceruici transversim obtensum, obscuris venulis si quæ sint conspersum, in medio pertusum angusto foramine per quod pislam traduci potuisset: Nullæ aderant Carunculæ, siue tubercula carnosæ, nisi illud quod Vrethræ foramen obturat & cetonat. Sed locum istarum caruncularum occupabat circulus iste carnosus, prout suprà descriptus est, quem pro vero *Hymene* accipere oportet. Qui si petulo & delectabili digito attrectetur, vel immodico menstruorum profluvio nimium humectetur, effringi potest, & ita laxata substantia ceruicis, in istas carnositates, siue tubercula carnosæ degenerare, quæ in carnosæ & pulposæ Pudendi

do magis extumescant. Circulus autem iste carnosus eo sine ibi collocatus est, ut Vteri ceruicem constringat, si desint istæ carnosæ rugositates.

*Hymenis* hyparxim & existentiam memorabili exemplo demonstro, cuius testem & spectatorem habeo, *D. Claudium Charles, Doctorem Medicum Paris & regium Chirurgia Professorum eruditissimum*. Cum eo vocatus ad inspiciendum cadauer nobilissimæ virginis 14. annos natæ quod secabatur ad pollincturam, in partibus pudendist multa notatione digna obseruauimus. Orificium illud labiorum vuluæ admodum angustum erat, cum frænulo, siue membranula valde tensa & rigida, hæc labra infernè constringente. Spatium vuluæ & podici interiectum in ea ætate ferme tres digitos æquabat: diductis labris tenerrimæ & exiles apparebant Nymphæ. Clitoris verò insigniter prominebat pro ratione Nympharum. Pro Carunculis in eadem sede circumtenfa erat Membrana Carnosa orbicularis, in medio pertusa angusto foramine, per quod tenue pisum traduci potuisset. Hæc membrana verum *Hymenem* à veteribus descriptum exquisitè referebat, quâ diligenter inspectâ & laceratâ, nullas vidimus carnositates, quæ tamen deficiente *Hymene*, in aliis reperiuntur.

Nec possis dicere membranam illam vitium fuisse naturæ, ut in Puellis imperforatis, quia membrana in medio perforata erat, orificium internum duriusculum, sed fundi corpusculum erat membranofum, ipsiusque Vesicæ fundo agglutinatum, quod est in puellis & virginibus, nondum menstrualibus consuetum, forsân etiam mulieribus nunquam parientibus id accidit.

Anno 1630. initio mensis Decembris *D. du Cledat, Medicus Parisiensis doctissimus, & peritissimus Anatomicus*, cadauer virginis carnosæ obtinuit ægnos viginti natæ, ad vsum Anatomicum, quod in ædibus suis multis Medicis & Chirurgis spectandum exhibuit. In eo membrana quæ colligat infernè Pudendi muliebris labra, manifestè tensa erat; Nullæ apparebant carunculæ, siue carnositates vltra Nymphas, sed earum locum occupabat *Hymen*, membrana carnosâ orbiculatim collo circumtenfa, in medio pertusa mediocri foramine.

Cæterum admiratione dignum, quod vbi membrana *Hymen* adest, defunt Carunculæ adeo celebratæ, siue carnositates, aut plicaturæ carnosæ in vestibulo orificij Pudendi muliebris post Nymphas collocatæ, sola remanente carnositate Vrethræ circumiecta, quæ est admodum exigua. Propterea frustra in virginibus perquires *Hymenem*, si præsentem habeas rugosas carnositates, in quibus virginittatis notas inuestigabis, prout exposuit *Senerinus Pinus*. Adiunges etiam tensionem pelliculæ Nymphas infernè necitantis: quare dubitaret aliquis an *Hymen* carnosus nascatur & exurgat in virginibus macilentis, ex colli carnosî constrictione & coarctatione, aut reuulsiõne ad interiora, propter corpus vterinum versus Vescicam contortum: vel si in obesis & habitioribus virginibus, quibus euadit carnosum ac pulposum Pudendi orificium, rupto vel laxato *Hymene*, tres illæ carunculæ, siue carnositates, nam quarta orificio Vrethræ semper appositæ remanet, emergant, quæ quò virgo adultior est & habitior, eò tumentiores & ampliores apparent. *Spigelus* more aliorum Anatomicorum, 4. istas carunculas describit, & cum membrana foramini obtensa *Hymenem* constituit: verus *Hymen* in figura *Cassery* exactè depingitur, contra ipsius *Spigely* doctrinam.

Nunc quibus notis Virginitas integra & intemerata dignosci queat, expendamus. Olim *Roma* erat delubrum pudicitiz matronalis, hodie dicatum *D. Mariæ Egyptiaca*; in eo Bucca veritatis erat, scilicet imago marmorea apertis labris. Huic *Volaterrani Regis filia* manum in Os imposuisse dicitur ad Virginitatem suam probandam, cum vetula quædam *Fesulana* impudicitiz eam argueret. Sed cum paulò post altera puella eiusdem criminis accusata, idem probationis testimonium subire veller, contracto ore imago ipsi manum amputauit. Apud *Ephesus* in antro quodam vbi *Pan* versabatur, fistulæ sonus index erat Virginitatis: nam puella de cuius pudicitia ambigebatur eò demittebatur: si et Virginitas manserat ilibata, duleis quidam peneque diuinus sonus exaudiebatur, nec multò post illius antri valug sponte recludebantur, & quod mirabile erat, ipsa virgo aspiciebatur foliis pinus capite coronato. Præstigiæ cacodæmonis aut sacrificulorum.

Signum pudicitiz & Virginitatis erat apud veteres intactis pedum plantis rogam pertransire, ut est apud *Helædorum*, lib. 10. *Æthiopica historia*. De probatione Virginitatis per ferrum candens ordine dispositum, quod dicitur *Ardclium*, consules *epistolam Regery*

*Rogery Baconis, & in Partis Christi. Bezzaldi, discursus extat de probatione pudicitie & virginitatis per ferrum candens. Apud Hebræos epotis amarissimis aquis lala pudicitia dignoscēbatur, vt legitur cap. 5. Numer. nam sacerdos amarissimas aquas in quibus cum ex curatione maledicta congesserat, mulieri ob impudicitiam accusatz bibendas porrigebat: quas cum biberit, si polluta est, & contempto viro adulteri rea, pertransiunt eam aqua maledictiois, & inflata ventre computrescit femur, erique mulier in maledictionem, & in exemplum omni populo: quod si polluta non fuerit erit innocua, & faciet liberus.*

Ridicula sunt Ethnicorum experimenta ad Virginitatem explorandam, quæ dæmonis astu fiebant. Hebræorum probatio ab impudicis mulieribus hoc sæculo contemneretur, & illa quam recitat *Herodotus lib. 2.* Responsum oraculi *Pheræ Regi* cæco datum admirabile fuit, vt oculos ablueret vrinâ illius, quæ solius coniugis consortio frueretur, suæ vxoris lotium & aliarum ei non profuit, reperta tandem quæ visus claritatem instaurauit. Hanc duxit in vxorem, sed alias mulieres cum priore sua vxore in vrbe quadam coëgit, & concremari iussit, cum sint cuncta hæc signa fallacia, alia sunt Virginitatis & pudicitiz perquirenda veriora magisque naturalia testimonia.

Narrat *Soranus* Virginitatem explorari posse fustitu forum rumicis, vel lapathi: ex hoc si se puella comminxit; ex illo si se pollucrit integram iudicabis. Addunt nonnulli fustitu gagatem aut eporum, Virginitatem demonstrare. Nam si eius odor nares non feriat, vel potus præsentem vrinam non moueat, Virginitatem arguit. *Bartbolomæus* Anglicus scribit mirabilia videri in corrupta muliere, dum fumum seminis portulacæ super carbones iniecti ad se recipit; sed quæ sint illa mirabilia, non explicat. *Michael Statius in Physiognomia*, virginem tactu pyrulæ nasi dignosci affirmat, quia cartilago solida est in virgine, & cum semel corrupta est, sentitur partibilis. Alij longi profusionem obseruant, quia si subito tenuæ ac pellucidum prodierit, cum leui sibilo Virginitatem indicat. Virgines mulieres vidit *Scaliger* ad parietem alto iaculari. Vrinam emittere, corruptæ ne quidem retrò reddunt, sed coxim conquincentes.

Veteribus familiaris erat Colli commensuratio, ex qua postredie nuptiarum puellam integram vel corruptam cognoscebat, inquit *Mercatoris, lib. 6. cap. 23. Variarum lect.* quem morem expressit *Catullus in Epithalamio.*

*Non illam genitrix orientis luce renitens,  
Hæsterno poterit collum circumdare fila.*

Quod non absque ratione factum fuisse credo. Si quidem, vt memoriz proditum est ab *Aristotele*, præcipue vox mutatur in asperiores & minùs acutam; quo tempore coitus inchoatur, quare si vocem conseruare volueris, à coitu prorsus abstinebis: quod designare videtur *Martialis.*

*Cantasti male dum fututa es Aegles  
Iam cantas bene, possunda non es.*

Tumet autem collum in Virginitibus desloratis, quia in coitu incaluerunt ex voluntate: Dum quis veneri indulget, vocem immutari in isto tempore certum est. Ob eam causam veteres Phonsæprum penè insubulabant, vinctis & subligaculis coercēbant, ne lasciuires Priapus. Refertur *Albertum Magnum* ex musæo suo puellam ab œnopolio vinum pro hero afferentem, vitiatam fuisse in itinere deprehendisse, quod in reditu subinde cantillans mutata haberet vocem ex acuta in grauem. Quo etiam signo forsā vnus est *Democritus*, qui *Hippocratis* puellam, primæ die vt virginem, secunda vt feminam salutauit. *Capsuacius* omnia Virginitatis signa incerta & fallacia decreuit in sua practica. *Cuiacius lib. 17. Obseruat. cap. 20.* scribit Virginitatem cognoscere rem esse difficilem, ac pene impossibilem, nec huius rei vnquam Obstetricibus declarum fuisse arbitrium; quod tamen intelligendum est de *Iure Civile*. Nam *Ius Pontificum* hoc negotium matronis & Obstetricibus commisit, quarum etiam in rebus veneris consilium requirit *Hippocrates, libro de Septimestri partu & libro de carnibus*. Idem Hispani vt peritiores habeant Obstetrices, cadauerum mullebrum dissectionibus adesse cogunt, referente *Augenio in Epistolis Medicinalibus*. Ingratam Obstetricis fatetur *Galenus* se libellum de matricis dissectione composuisse. Multi in arte Medica nihil vnquam difficilius iudicarunt, quàm puellæ Virginitatem detegere, mille sunt artes, quibus hoc versipelle genus Virginitatem simulare solet. *Anticennas* medicamentâ tradit, quibus amissa Virginitas restituatur. *Agrippa c. 6. libri de vanitate scientiarum*, medicinam extare scribit, quæ Virginitatem reparare potest resarcinato *Hymen* c. 6. vt re-

petito mercatu porcum suum vendant. *Baptista Porta in magia naturalis*, lenocæ & lenas edocet modos, quibus amissa Virginitas restitui queat, vel potius simulari. *Arnoldus de Villanova, lib. 3. breuiary, cap. 6.* refert ad simulandam Virginitatem medicamentis constringi genitalia, & induta vesica piscis sanguine plena in locos mulieris, eruptionem illam sanguinis in primo coitu effingi. Vide *Ranchinum, lib. de morbis Virginitatis*, ubi docet modos Virginitatis reparandæ, vel potius simulandæ. *Ibidem* quoque agit de nouis Virginitatis. *Quartilla meretrix apud Petronium Arbitrum*, lunonem suam iratam optat, si unquam se meminerit virginem fuisse, quia infans cum paribus inquinata fuit, & subinde prodeuntibus annis maioribus se pueris adplicuit, donec ad hanc ætatem peruenit. *Sapientissimus Salomon Prouerb. cap. 30.* tria difficillima censet, & quartum penitus ignorat: *viam aquila in calo, viam colubri super terram, viam nautis in medio mari, & viam viri in adolescentula*: alij legunt in *adolescentia*. Nam experimenta superius adducta ad probandam Virginitatem dubia sunt & fallacia: deinde ex signis faciei & colli, quidquam certi colligere est impossibile.

Quapropter ad Pudendum inspectionem deueniendum. Siquidem natura virginæ pudicitie follicite, ibi certissimas Virginitatis notas apposuit, ex quibus Virginitas præsens, aut amissa dignoscitur. *Nulla reparabilis arte lesa pudicitia est, deperit illa semel.* Et eleganter *D. Hieron. in Epist. ad Eustochium. Virgo Israel occidit, & non est qui suscitaret eam. Audacter dicam, cum omnia possit Deus, suscitare virginem non potest post ruinam. Valet quidem liberare de pœna, sed non valet coronare corruptam.* Signa Virginitatis in Pudendorificio collocata sunt, videlicet inferiorum labiorum cutis tensio & rigiditas, quatuor Carnositatum figura naturalis, qualis suprà descripta est, florem virginicum constituens, de quo sic venustè loquitur *Catullus.*

*Vt stas in sepiis secutus nascitur hortis,  
Ignotus pœori, nullo contusus aratro,  
Quem mulcent aura, firmat sol, educat imber,  
Multi illum pueri, multa optantere puella.  
Idem cum tenni carpius desormit ungui,  
Nulli illum pueri, nulla optantere puella:  
Sic virgo dum intacta manet, tum chara suis, sed  
Cum castum amisit polluto corpore florem,  
Nec pueris incunda manet, nec chara puellis.*

Deinde si membrana *Hymen* reperiatur, certior adhuc erit virginitas, quam membranam in Beatissima Virgine ab Obstetricibus inuentam fuisse, cum de eius Virginitate dubitaretur, *Suidas* prodidit, & *Clement Alexandrinus, lib. 7. Stromatorum* confirmavit. Apud *Hebræos* alia Virginitatis nota erat, sanguis in primo coitu profluens, qui lineis exceptus suspiciosus ostendebatur, & tanquam illibatæ pudicitie testimonium asseruabatur, vt *Deuteronomij cap. 22.* vbetius exponitur: sponsus ubi perspexerat sanguinem virginicum, hanc dicebat benedictionem: *Benedictus es Deus noster Rex saculi, qui statisti uincem in Paradiso Edem: liliisque connallium non dominabitur alienis in fonte signato.* Ex *Genebrardo in Symbolo fidei Indæorum*. Hanc desolationis typom, etiam aliis nationibus consuetum, *Claudianus in Epithalamio Iuliorij* eleganter expressit.

*Et vestes Tyro sanguine fulgebat  
Alter virginem nobilitet eruit,  
Tum villor madido profluit thoro,  
Nocturni referens vulnere prælij.*

Quod si membrana *Hymen* defuerit, aut si sanguis in primo congressu non effluerit, dicetne virginem corruptam? interdum *Hymen* in puellis leui de causa laceratur, in aliis ad primam mensurorum eruptionem perseverat, postea madefactus quauis occasione deletur, qui si euauerit, nõ propterea iudicabis violatam esse virginem, inodò angustia Pudendi cum tumore quatuor Carnositatũ simul reuinctarum remaneat.

Neque semper necessum est sanguinem stillare in primo congressu ad Virginitatem cognoscendam. Nam si Virgo paulò annosior, vt pœte annum 10. supergressa, tenuiori & minuto Peni subiciatur, nullus inde cruor emanabit: at si virguncula admodũ, inotella viro maturo & prepotenti ac bene mentulato congregiatur, ex ista violẽta secretionẽ & diremptu quatuor Carnositatum, sanguinem subsequi videmus. Ita vt possit iure ac merito suo marito exprobrare, quod illa apud *Plantum in Truculentis.*

*Qui me interfecisti Pene, & uita, & lumine,*

*Quique vim magnam doloris per voluptatem tuam,  
Candidisti in corpus, quo nunc & morbo misera sum.*

Porro in suspensis mulieribus cuncta hæc Virginitatis signa non sunt perquirenda, quia omnes impudicæ, & obatrocina crimina adulterij consecraria suspensæ. Olim uetus erat *Roma* virgines strangulari, idcirco *Tiberius* iussit immaturas puellas more tradito, vitiari prius à carnificæ, dein strangulari: quod factum est in filia Sciani. Scribit *Scaliger*, *Exercit.* 175. in *Athlantis* iugis occidentalibus, quæ pars *Sarnag* ab incolis nuncupatur, radicem quandam reperiri, puellis adeo inimicam, ut si super eam sedeant, aut urinam faciant, eis perinde rumpatur Hymen, ac si à viro essent vitiatæ, & *Henricus Bassius*, lib. de regno *Neapolitano* refert, quod nella terra d'Agropoli Provincia del Regno di Napoli, le donzelle, quando sono di dodici anni, per dono la Virginità, per la molitine dell' aria.

Gaudéant honestæ virgines, quod Gallia eiusmodi scelerata radice careat, nec aëris malignitas adeo sit infensa virginibus, quæ forsan impudicis optanda esset, ut læsæ pudicitia: casum prætexere, huicque radici, vel aëris vitio imputare possent.

Nigritarum, siue *Æthiopum* nationis notis minus confisa, validioribus certioribusque prædiis filiarum virginialia munire solet. Nam ubi primum nata sunt, pudenda consunt, sic tamen ut urinae meatus non interceptiur, illæ autem ubi adoleuerint, sic consutæ nuptum dantur. Sed primum sponso ea relinquuntur, incumbiturque cura, ut ferro conglutinata cervicis labra secet diuidatque. Crudelis custodia, quæ tamen hoc deprauato sæculo non foret inutilis, quo virginum pudicitia auro, blanditiis & lasciuia facili expugnatur, Virgines autem, vel mentis imbecillitate, vel inuidentiâ pene virili, se vinci patiuntur. Implet cum amplexu *Danaës* frui non posset, imbris aurei modo per impluuium in eius sinum delapsus est. *Cassa est*, inquit ingeniosus Poëta, lib. 1. *Amarum, elegia 8. quam nemo rogauit.* Quod confirmat *Martialis*, *Epigr.* 71. ad *Sophronium* lib. 4.

Quapropter cum mamma intumescunt & fororiantur, virgines diligenter custodiri debent, ex consilio *Aristotelis*. Puella tenellulo delicatior hædo, asseruanda nigerimis diligentius vult, ait *Catallus*. Eleganter & verè scripsit *Euripides*. *Αὐτὴ ἔχοντι τῷ ἰσχυρῷ πατρὶ*, id est, verum filia laboriosa est possessio patri.

Vix possum credere quod litteris consignauit *Americus Vesputius*, in Antarcticò solo feminas etiam post plurimos partus integrum virginaleque corpus præ se ferre, ita ut perperæ nulla re differant ab ipsis virginibus, quod canibus, atque aliis brutis commune est. Atiamen cum ex *Tenpinambourorum* regione femina annos 25. nata valde impudica, quæ viros ad coitum inuitaret, in hanc urbem *Parisiæ* adducta fuisset, post eius obitum Pudendi officium admodum angustum deprehendi, & *Os* pubis valde depresso, Cunus glaber erat, pilis spoliatus, quos sibi radicibus euellunt eiusmodi regionis mulieres.

De cervicis Vteri spatio & longitudine inter Recentiores nata est controuersia, ex contrarietate locorum apud *Galenum*, quorum nonnullos proposuit & enodauit *Hesmannus*, lib. 6. *variarum lectionum*. Sed totum negotium absuluit & definuit *Galenus* lib. de diffict. *Pulua* cap. 7. Vteri cervix *αἰχμή τοῦ πύθου*, musculosa est, carne dura constat, quæ durior & cartilaginosa euadit. Huius naturam *Herophilus* gutturis summæ parti, *αἰχμή τοῦ ἀφῶ*, comparat. Cervici huic foramen inest, quo menstrua expugnat, & maris genituram excipit, & fœtus in lucem editur; in conceptione ita occluditur, ut vix specilli acuminatum caputulum admittat: ad muliebrem sinum peruenit, *αἰχμή τοῦ αἰχμῶτος τοῦ αἰχμῶτος*. Quapropter cum cervix vera Vteri sit quodammodo cartilaginea, & ob id ab *Herophilo* laryngi comparata, cum exactè claudatur in conceptu, dum semen recipit in Vterum, in enixu aperiatur. Quis non animaduertit Cervicem veram Vteri esse protuberantiam illam carnosam, quæ desinit in sinum muliebrem. Adde quod & *Ruffus & Pollux*, *αἰχμή*, *αἰχμή* & *αἰχμῶτος* vocant, & ab illis reliqua concauitas sinus muliebris, *αἰχμῶτος αἰχμῶτος*, *αἰχμῶτος αἰχμῶτος* nominatur, ut totum genitale cum exterioribus, & *αἰχμῶτος αἰχμῶτος αἰχμῶτος αἰχμῶτος*; & quod mirum, amboissidem verbis vtuntur ad explicationem huius rei.

Necputo vnquam *αἰχμῶτος αἰχμῶτος* significare sinum muliebrem, sed potius eam partem pudendi quam Cunnum vocamus, & sic à *Galeno* accipitur, lib. de matric. c. 2. *αἰχμῶτος αἰχμῶτος αἰχμῶτος αἰχμῶτος*, *αἰχμῶτος αἰχμῶτος αἰχμῶτος αἰχμῶτος*, *αἰχμῶτος αἰχμῶτος αἰχμῶτος αἰχμῶτος*. Spatium illud est sub ossibus Pubis extrinsecus pelliculam quandam adnatam



habens, virorum præputio correspondentem, intelligit, vt opinor Alas pudendi muliebri. Cervix isthæ interior ex *Aristotele*, & *varius enudat, quæque præputis*: & ab eadem peculiariter *isthæ* vocatur, estque *isthæ*, & *isthæ* *isthæ*, *lib. 3. de hist. animal.* Comparauit Natura viam in mulieribus, qua semen egrediatur ad hunc modum. Collem habent, quemadmodum viri Penem, *isthæ* *isthæ*, *isthæ* *isthæ*. Sed in ore per illum restant pusillo meatu, cuius situs paulo altior est, quàm is quo vinam reddunt, quò sit, vt ea pars aliter sese habeat, cum illæ in venerem incitantur, quàm cum non appetunt: ab hoc igitur Cole fit feminis casus, anteriorem antem Matricis regionem natura multò constituit maiorem, quàm is sit meatus, per quem illum in locum excidit. Est autem id simile naribus hæ in parte; Nares enim meatum habent quandam peruium, quo flant & restant ærem extrorsum: Eodem modo & in matrice meatus est parvus admodum & perangustus, quantum satis sit ad spiritus exitum.

*Fallopianus* Cervicis nomine intelligit eam Vteri partem, quæ ab orificio interno, longitudine duoram vel trium digitorum interiùs exporrigitur, donec amplificari incipiat Vterus: corpusculum est durum pollicari crassitie, quod in sinum pudoris prominet. At totus ille meatus quem subit & implet Priapus, improprie vocatur *Cervix*, quoniam ab antiquis Anatomicis *Galeno* & *Sorano*, *isthæ* *isthæ*, necnon *isthæ* nominatur, ideoque contendit *Fallopianus*, hanc partem sinum pudoris, vel vaginam Penis appellari debere. Huic opinioni adstipulatur *Arantius*, qui muliebrem sinum seu vaginam Penis, neuriquam inter partes Vteri numerandam esse statuit. Nam intra sinum muliebrem prominet verum collum Vteri, eique vagina pudendi orbiculatim adnascitur, ac si pollicis longam & orbicularem vaginam aptares, intra quam pollex conclusus protuberaret.

Attamen *Bambinus*, *aduersus Fallopianum*, ex doctrina *Galeni*, demonstrat cervicem Vteri esse illud spatium quod Penem recipit. Sed si cervicem propriè sumamus, vt est pars angustior, rotundò & amplo corpori subiecta, ex *Galeni* doctrina, corpusculum illud rotundum magni pollicis crassitie, & oblongum mensura secundi intermedij eiusdem digiti, corpori vterino præpositum, & intra sinum muliebrem protuberans, pro vera Vteri cervice accipi debet. Huius excavata lōgitudō plurimū cōfert ad feminis sustum, tractionem, & retentionē: Nam tum adeo exquisitè canalishic elauditur, vt specilli cuspidē foris adacta, non possit pertundi & penetrari: quāvis aliter sentiat *Spigelius*, qui conuiuentiam illam osculicō modo fieri putat, quo conuiuent inter se palpebræ, ita vt digitus possit intrudi ad explorandum, *An factus sit, vel male, quod Vtero gestatur*. Illud orificium ori catelli vel luci pifeis simile non apparet, nisi in mulieribus quæ sunt à menstrua purgatione remotæ, siccō existente Vtero. Nam fluentibus menstruis molle est ac ouale. Huius orificij portio maior superna est, minor portio inferna est, & euidentius figura oris catulini cernitur in iis quæ Vtero gestarunt. Obseruabis diligenter huius orificij sectionem esse transversam, & aduersam sectioni Osculi Pudendi, siue Cunni, quæ recta est. *Cancer Vteri* potissimum in illa cervice Vteri nascitur, quia earosior. Fieri potest vt longior Penis, dum orificium veræ cervicis Vteri apertum est fluentibus menstruis, in id osculum introductus & apprehensus aliquantulum retineatur & constringatur, vt in canibus simul iunctis & coherentibus accidit: quod quibusdam euenisse certa fide mihi testatur.

Notat *Hipp. lib. 1. de morbo mul.* mulieres quibus Os Vteri nimio coito laxatū, eū plus æquo apertum est, non concipere. Scribit etiam *Gal. lib. 14. de vsu part.* Os istud Vteri omni alio tempore quā quo semen infertur, aut menstruum, aut fœtus effertur, eōtortum esse & obliquum: hoc in Anatomis videri, & *Herophila* proditum fuisse. Causam refert ad rugositatem substantiæ; Vsum hunc assignat, ne ab occurso aëris frigidi lædatur Vterus, ludicauit *Hipp. lib. 1. de morbo mulierum*, & alibi, si menses mulieri quæ non peperit, non erumpant, contingere, vel quod Vteri os conelufum fuerit, aut distortum esse, aut aliqua pars Pudendi contracta. Atque *Fabricius ab Aquapendente*, in *Operationibus Chirurgicis*, hunc locum *Aristotelis, lib. 4. de generat. animal. cap. 4* ad illud orificium internum Vteri spectare putat: in feminis nonnullis, inquit, Os Vteri compressum, concorporatumque ab ineunte ætate, ad tempus vsque menstruorum perseverauit, mox vrgentibus menstruis, doloreque infestante, aliis sponte disruptum est, aliis dissectum à Medicis, nonnullæ interierunt, cum aut per vim disrumpere, aut dirumpi non posset.

Huius verè & internæ cervicis insignis *Fossa* subiecta est, in qua Penis recipitur, & semen virile effunditur: nec enim potest ei aculatum directè in officium cervicis traduci, sed iniectum in sinum muliebrem à cervice rapitur, & exsugitur.

Et quomodo nulla fiat generatio sine Penis intermissione, ex *Galenus iudicio*, omniumque Medicorum consensu, nuper tamen vidimus Parisiis mulierem, quæ ex laborioso & difficili partu laceratas habuerat partes genitales, cuius Nymphæ & quatuor Carunculæ, tam arctè coaluerant, ut vix specilli cuspidem foramen admitteret; nihilominus decimo quarto abhinc anno concepisse. Intra Pudendi labra effusum semen Vterus huius pabuli avidissimus atraxit, quemadmodum à profundis cuniculis ceruus serpentes narium inspiratu allicit. Cum instaret partus introducto speculo matricis foramen dilatatum fuit in eam amplitudinem, quæ ad egressum fœtus necessaria erat, sicque fœtum perfectum emisit mulier incolumis & superstes.

Exemplum simile visum fuerat Parisiis anno salutis 1609. mulier imperforata impotentis & frigiditatis accusat maritum coram iudice, quod nondum ab eo quidquam passa fuisset, cum vtriusque partes diligenter inspicerentur, mulier inuenta fuit grauida. *Clementina 2. quæst. 15. de consang.* refertur in Francia olim imprægnatam fuisse quandam, cuius Virginitatis claustra omnia firma, atque illæsa manserant, adeoque imprægnatam esse virginem non desisse. Historiam factam reperies apud *Fabricium in Operat. Chirurg. de Sacerdote*, qui percontatus est *Fabricium* de confessione femine, quæ ex viri amplexu sine Penis intromissione conceperat.

Hanc questionem examinat *Carpus Comment. in Mundinum, pag. 201.* Internum Vteri officium, quod est verè cervicis osculum, semper coniuget, nisi dum medio-criter aperitur ad semen recipiendum vel eiiciendum, vel menstrua singulis mensibus excremenda.

Vt autem excerptum semen facilius retineretur, intra canalem cervicis inferiori eius parti *tuberculum oblongum additum est*, quod foramen exquisitiùs occludit: in muliere similem usum præstat, atque in viris Carunculæ extremitatibus vasorum Eiacularantium apposita. Vidi in nobilissima muliere, quæ anno ætatis 35. decessit, exiguam matricem durissimam, ac fermè cartilagineam, tres liberos tantum susceperat, intra canalem veræ cervicis, carnositatem exiguam inveni infernè positam, tanquam pessulum ostio obditum.

Circa tuberculum canalis verè cervicis, *pori sine foraminula* conspiciuntur, quæ videntur esse fines, siue extremitates vasorum Eiacularantium ad cervicem desinentium.

Apud *Hippocratem*, obseruo partem illam tuberosam, oblongam & perforatam intra cervicem prominentem, appellari *μύζα*, & eius aperturam *μύζα*, eius circumferentiam *μύζα*, labra: *lib. de superferat.* distinguit, *μύζα μύζα*, *μύζα μύζα*. *Galenus lib. 1. de sem. cap. 6.* scribit semen à Stomacho Vteri avidè attrahi eo modo, quo trahitur cibus per Stomachum à Ventriculo famelico, hoc est, quod *Hippocrates* voluit. Non potest ipsis Stomachus genituram attrahere. Idem *Præceptor, lib. 1. de morbis mulierum*, Vteri cervicem extra Pudendum propendere scribit, *μύζα μύζα* *μύζα μύζα*, ac proinde cervix extenditur ab inferno officio ad Pudendum usque. *Fandi* angusta est admodum *cavitas*, quæ vix fabam maiusculam capit, nullis cellulis ut in brutis animalibus discreta, solâ suæ vel potius lineâ imaginariâ, per longitudinem exporrectâ, & in interiore tantum parte carnosetunicæ designatâ, Vterum in dextras & sinistras partes dirimit, qualis inest scroto & linguæ: atque hoc sensu muliebris Vterus, *μύζα*, bisinuatus intelligendus est.

Observatione digna est dubitatio illa quam movet *Bauhinus, in appendice ad librum Ruffi de partu Cesareo*. Num mulieres, quæ superfœtare solent, aut plures fœtus, quam duos generant, Vterum bipartitum habeant? vidit *eius frater*, in quadam puella Vterum bipartitum, qualem canes habent. Obseruavit etiam *Sylvius*, in puella Vterum veloti bicornem, ut in multiparis: Sed id adscribit Vteri breuitati, Testium & spermaticorum vasorum distantie longiori. Anno 1599. in scholis Longobardorum discabatur mulier, cuius Vterus septo medio diuisus erat.

Novi mulieres, quæ singulis conceptionibus geminos fœtus proferant, quod est quibusdam familiis gentilitium. Anno 1615. mense Iunio, in oppido *Stemio*, milliarum ultra urbem *Sancti Dunyfi*, hermaphroditam puellulam multis præsentibus discit: cui: Penis parvus prominebat absque scroto & testiculis; sed ab officio duplici ex-

terno usque ad fundum Vteri, duplex erat matrix, mediano pariete secreta, reliquæ partes generales simplices erant, ac si fuisset vnicus Vterus. In muliere olim Romæ duplicem Vterum inuentum fuisse memorat *Iulius Obsequens; & Isidorus*, Vterum dictum putat, quod duplex sit, ab vtraque parte vnus.

Cervix Vesicæ in muliere ultra partem mediani & supernam sinus muliebris applicatur, quem perreptat usque ad extremitatem, sine vlla perforatione Vaginz, digitalis internodij longitudinem æquat, extrinsecus carnosa, vel potius carne obuoluta, quæ sphincter est: intus nigricat, eiusdem substantiæ cum Vethra hominis, sphincterem habet externum latum, siue fibras rubicundas, orbiculares, quæ pro sphinctere interno haberi possunt.

Notauit *Puerum* in suis *Observationibus* extremitatem colli Vesicæ exteriorem, non eodem in cunctis feminis loco apparere, pluribus supra ceruicis Vteri angustias exteriores sub Nympha conspicitur; paucis introrsum in superiori parte Pudendi latet, quod nondum vidi. Cervix Vesicæ ita dilatari potest, vt magnum digitum non difficulter admittat, quod est notandum ad extractionem calculi vesicalis. Circa orificium Vesicæ intra pudendum, vtriusque conspiciuntur foramina, quo sine ignoro, an serui humor inde fluit in tunicam matricis? Cervix Vesicæ in mulieribus etiam Vethra nominatur.

Attamen *Aristoteles lib. 1. de hist. animal.* dicitur accipit pro Collo matricis, vt post *Gazem Scaliger* interpretatur, cum ramen dictionis significatio repugnet. Propterea mendum subesse suspicor in textu, qui restituitur additione particulæ, ut vt sic legatur, & *accipit pro collo matricis*. Adde, & dicitur *accipit pro collo matricis*, & cervix Vesicæ est extra Vteros, & transitus seminis virilis, id est, ceruix. Nam paulo supra, *Aristoteles* accipit pro collo & ductu Vesicæ ad emittendum lotium.

In partibus genitalibus mulieris, quæ nunquam Vtero gestauit, non leue discrimen ab iis quæ peperere, obseruari, nempe triplici forma constitutas. Nam aliter in muliere apparent, quæ sæpius virum passa est, aliter in muliere prægnante, pariente, & puerpera per octo dies à partu, aliter in virgine intacta: quin etiam diuersa est mammarum conformatio. In iis quæ nunquam Vtero gesserunt, vasa spermatica sunt renua & exilia, rubra Vteri exilis, lata ligamenta sunt extensa, & fundo Vteri eleuato vela expansa, aur alas vespertilionum referunt. Pudendi pars inferior, siue in labiis, siue nymphis magis tensa cernitur, si indito digito externè reuellatur. Caruncula magis integre remanent, & Nymphæ, siue Alæ breuiores, & crassiores existunt.

Vagina Pudendi virilis rugosior est, & longitudo breuior. Fossa etiam ceruici subiecta minor est. In Virginibus, quas dissecui usque ad 30. annum, vterinum corpus molle deprehendi, pollicari crassitie, atque reflexum & agglutinarum fundo Vesicæ: inde cognoui Vterum ex conceptu crassescere, & eo crassior fieri, quod pluries gestauerit: cessantibus menstruis exarescere & imminui. Cervix vera Vteri dura est admodum, ac veluti callosa, & quamuis orificium externum quatuor Caruncularum appositione, angustum reddatur, spatium tamen vaginæ latius est, ipsiusque substantia spissior & carnosior est vterino corpore.

Apud *Hippocratem* partes locorum genitalium his nominibus designantur, *lib. de morb. mulier.* partes pilosæ *μήτηρ*, oris *στόμαχος*, os *στόμαχος*, labra *χείλη*, Pudendi mulieris collum *μήτηρ*, Vteri os internum *μήτηρ*, *μήτηρ*, *μήτηρ*.

Veteres Anatomici partes Vteri hoc modo distinxerunt, vti referunt *Soranus, & Maschius in Gynaecis*. Hic enim enumerat orificium externum, *μήτηρ*, deinde collum, *μήτηρ*, postea ceruicem, *μήτηρ*: omnis horum concursus *μήτηρ* & *μήτηρ* dicitur: vbi dilatarì superne incipit Vterus, hinc *μήτηρ* vocatur: partes paulo superiores, *μήτηρ*, latera: vbi rotunditas Vteri concluditur, *μήτηρ*, fundus. Media pars fundi *μήτηρ*. Omnis inanitas illa, quæ in medio est, *μήτηρ*, *μήτηρ*, venter, conceptaculum appellatur. Sic *Soranus* collum distinguit à ceruice, & quod *Maschius* vocat *μήτηρ*. Ille *μήτηρ* appellauit, & addidit *μήτηρ*, quod est in medio cunno, & *μήτηρ* *μήτηρ*.

Obseruo in *glossis Hippocratis*, *Galenum* tribus nominibus orificium internum Vteri appellare. Imprimis *μήτηρ*, à similitudine rotundi ferri, quo terra profcinditur, ex interpretatione *Ruffi Ephesi*: vel, vt placet *Galenus*, quod labris cucurbitulæ simile sit. *μήτηρ* etiam dicitur ab extremitatibus indumentorum, necnon *μήτηρ*, à flexuosa extuberantia, *μήτηρ* enim & *μήτηρ*, palmitem & clauiculam significant. Qui ple-

maorem istarum dictionum interpretationem desiderat, ad *Oeconomiam Fœgii* recurrat.

Os istud vulvæ insatiabile dixit *Salomon*, *Proverbia* 30. sed inexplēbilis huius libidinis exemplum memorabile si requiras, leges epistolam *Sorani* nuper euulgatam ad *Antonium*, ubi de libidine *Cleopatra* agitur. Quum autem Vterus, tam superne quàm infernè firmis ligamentis sit reuinctus, ipsumque corpus vterinum, atque orificium internum durum & solidum sit, quomodo potest inuerti, vt ad orificium externum deuoluatur, vel inter femora procidat? *Soranus & Aretæus lib. 2.* internam tunicam carnosam, quæ corpus Vteri constituit, delabi ad inguina dicunt, exteriore tunicâ membranosa, quæ firmiter partibus vicinis alligatur, intus remanente. Imo *Aretæus* internam tunicam Vteri duplicem esse scribit, & inter se connecti, & ratione istius duplicis bipartitum esse Vterum; has autem membranas disijungi, & foras exilire, vel per abscissum, vel fluxionem, vel per abortum, vel dum violenter extrahuntur. Secundæ.

Sed corpus Vteri relaxatus ligamenti intra ceruicem laxiore & ampliore corpore vterino, deuoluitur, & extra orificium externum prominet, atque propendet, vt sæpe obseruari. Repulsus in suam sedem non potest sibi & contineri, nisi pessulo obdito, id est, pessario amplo, siue ovali, siue annulari, & fenestrato indito. *Iam Soranus* in sterilibus mulieribus intra Vteri cauitatem notat communiter duo reperiri amacula, vtpurimum variis modis conduplicata, *Vel namque vtriq; aliq; ducuntur à pectore & aliq; ab inguine* *quidam hinc ducunt, hinc ducunt*, quod tamen falsum esse credo. Eodem capite *Soranus* subiungit, minimè existimandum est Vterum principatum ad vitam obtinere: quia is non solum procidit, sed in quibusdam etiã præciditur, nec tamen mortem adfert, vt *Themison* litterarum monumentis consignauit. Præterea in *Galatia* suæ habitiores, *Alipharion* fieri aiunt, postquam Vterus abscissus fuerit. De Vteri cœcomia innumera exempla reperies in *Obstetricationibus medicis Schenckij*. De consensu Vteri cum variis partibus corporis, memorabilis extat apud *Hippocratem* sententia, *lib. 1. de morbis mulierum*, oportet curationem vicerum in Vteris exactè facere, vt quæ in tenera & subtili sensu prædita sunt parte, & in nervosa cauitate: multæ autem sunt partes cum quibus societatem habet, scilicet, stomachus, & mens pereclitatur. Scribit *Galenus* in vniuerso mulieris corpore nullam esse partem imbecilliorē Vtero, quicquid enim ex alimento, siue bono, siue malo superfluum est, id à validioribus membris ad infirmiora solet depelli. Vnde femina, quia frigidum & imbecillū est animal, multis abundat excrementis, quæ ad partes genitales omnium imbecillissimas confluunt, à quibus ilias morborum oritur: ideoque *Democritus*, Vterum *Matriæ atummatum* appellat, in epistolis. Vterus ad purgationem & partum bonus est, inquit *Aretæus, lib. 2. Chron. cap. 12.* sed morborum, infirmorumque malorum aceruum congerit in muliere, quæ sola omnium animalium affectionibus Vteri obnoxia est, si credimus *Aristoteli, lib. 4. de generat. animal. cap. 7.* Ac proinde verissimum est *Hippocratis* oraculum, *si vterum vultis esse sanum, uti vultis, prout valet Vterus, ita totum corpus muliebri*, quoniam Vterus animal est ferum & venenatum, quod instar animalium *infectum*, suum virus celcrit in partes superiores eiaculari, atque disseminat. Sed remedium eiusmodi affectionibus proponit *Plato sub finem Timæi*. In Mulieribus Vterus animal est, quod cupit generare, quod cum longo tempore non adipiscitur, indignatur, & ægrè fert. Quam ob rem per totum corpus vndique oberrans, tum intercluso spiritu impedit respirationem, tum in difficultates & morbos plurimos coniciit feminam, vsque dum acceperit, quod vnicum desiderabat. Quod quidem remedium confirmatur ab *Hippocrate, lib. de virginibus, & lib. 1. de morbis mulierum*. Id etiam probat Epigrammate *Martialis de hysterica Leda*. Notat *Galenus, comment. ad part. 2. lib. 6. Epid. sect. 1.* inter omnes corporis partes plurimas grandissimæque venas Vteros habere, cumque eos aut menses, aut à partu lochia suppressa, aut phlegmone vtriusque orta malè accipiunt ipsos, sanguine compleri necessum est, quo deinde putrescente, si febris accendatur, inter synochorum species numerari debet, ex qua sumi & vapores in Cerebrum assurgunt & vehuntur: febres autem ardentes ab Vtero enasci testatur ibidem *Galenus*, & vidit ex Vtero in coxendicem migrare, colligique materiam, licet id rarius accedat.

# PARTIVM GENITALIVM MVLIERIS

## Administratio Anatomica.

### CAPVT XXXV.

**Q**UAMVIS Galenus scripserit mulieres easdem partes genitales habere, quas viri obtineant, situ tantum differre, *non tamen demonstrat planè dissimiles, unicuique peculiare datas esse, ut ex earum historia manifestius intelliges. Illas doctrina gratiâ distingues in Seminales, & Vterinas. Seminales sunt Vasa semen deferentia, Testiculi, Eiaculatoria vasa cum Tuba, sine Cornu vteri: Vasum deferentium in mulieribus idem exortus, & contextus ut in viris, sed dissimilis insertio. Nam prope Testes in tres ramos fissa, parvis Testibus communicatur simpliciter, & circa Testem anfractuosa more Parasitæ Cirsoidis varit, ut insusillando venam spermaticam deferentem deprehendes.*

Altera in fundum Vteri, tubam, & ligamentum rotundum disseminatur. Tertia, latius Vteri percreptans, ad cervicem excurrit: inde colliges semen non ex alio sanguine confectis, quam quo nutriuntur relique partes. Nam in mulieribus ut in viris, vasa spermatica in excursu suo, vicinâ paribus insinuat ramulos largiuntur. Hac autem distributio vasum spermatici Deferentis insusillando manifestè conspicitur, & quod mirabile videtur, arteria illa insignes ab Hypogastrica ad Vterum ascendentes, & cervicem rigantes dum insistant, pariter etiam tam dextra, quam sinistra vasa Vteri, per illam insusillationem vena spermatica insistant: ut inde cognoscas omnium vasorum in Vtero communionem, quam in aliis partibus consimilem imaginari debes.

Testes muliebres plani & compressi unica vestiuntur propria tunica, aliam habent à Peritonæo dum latius Vteri ligamenti implicantur, ex multis vesiculis conglobati sunt, quæ serosum huiusmodi continent, earent epididymide. Vas autem eiaculatorium gracillimum parvis digitis longitudine ab inferna parte Testiculi nascitur. Cum pervenit ad fundum Vteri, bifariam finditur, pars una sinuatum penetrat, altera per corpus seu longitudinem Vteri inter duas tunicas delapsa, in colum Vteri iuxta orificium internum inseritur. Tuba Vteri, sine Cornu, fistulosum est corpus Testi circumscissum, eique adnexum, interueniunt membrana digitum lata, multis filamentis, sine arterialis conspersa, vâ à Testicula semen exsugat, & attrahat. In hysterici mulieribus sæpe vagum & oberrans cum Testiculis adnexis, iniis anfractuosum, intra se neruum rotandum reconditum habens. Semen candidum continet ad usus venereos, atque in mulieribus eodem officio fungitur, quo vesicula seminaria. Præterea Tuba hæc sine Cornu fistulosum, Testiculum ita comprehendit, ut nequeat excurrere sine Tuba: atque istâ membrana Tuba & Testicula interiecta, videtur esse vinculum quo sessus Vtero necitur & colligatur, tanquam à Cremaster musculo.

Periis Seminalibus expeditis, ad Vterinas progrediendum, quas diuides in Internas & Externas: internarum ambitum exteriorem citra dissectionem inspicies. Itaque situm Vteri inter Rectum Intestinum & Vesicam obseruabis, deinde ligamenta quatuor Vteri perquiras, quorum duo Superiora, lata & membranosa, sunt eminentes Vteri productiones, quæ lateraliter & inferius connectunt, & ipsos Testiculos sibi remittunt habent, inferiorem duo ligamentarum, fistulosa & sanguine repleta ad pubem per apophysim Peritonæi ascendunt, & Clitoridem percreptantia in panniculum adiposum femoris expanduntur.

His obseruatis ad Partes Externas Vteri quæ Pudenda dicuntur, accedes, in quibus citra sectionem multas partes notabis. Pilosa pars extuberans officio superuicella, Mons Veneris appellatur, ex adipè subiecto intumescent. Orificium externum Cunnini, siue vaginæ penis vestibulum, quod multa circumscissa particula efformant. Cuticulares & semicirculares eminentia pilis repleta, Cunnini labra vocantur, quorum inferna commissura in virginitatibus tensa est & contracta, ac veluti ligamentosa, in corruptis laxa, & in his quæ pepererunt laxior: Furca penis appellatur, quod ab ea Penis in coitu fulciatur.

Intra labra ex cutis reduplicatiōe, membranosa corpuscula alarum modo expansa conflatantur, Nymphas vocant. In apice Nympharum intra labra pudendi, Clitoridis caput eminet, de qua mox agebit, cum rescribitur. Inis progrediendo quatuor tubercula carnea, siue car-

*nostrates myrthoides, myrthi folia referentes, vel potius mole sua magnis amygdalis similes apparent Amygdaloides, quæ in virginibus rubicundæ sunt & inflatæ, in corruptis attrita flaccescent, atque disruptis fibris quibus inter se colligantur, ab invicem abscidunt. Superior carnositas semper cæteris maior bifida est, ut intra se foramen Vrethrae admittat & occludat. Inferior interiora versus Efflam habet, & instar aggeris opposita est, ne semen viri iniectum confisum egrediatur.*

*In ea fossa, sine lacuna serosus humor albicans, qualis Hillet in sinuibus albis, dum lentum destillat ab inguine virus, coæternatur, cum magno mulierum pruritu, vel alius serosus humor ibi congeritur ad titillationem, qualis effluit in viris ex Peni in venerem pruriente, sine spermatis ejectione, isque humor est Vtero proprius, descriptus ab Aristotele, lib. 1. de gen. anim. c. 10. & lib. 10. de hist. anim. Alia dua carnositates minores sunt collaterales.*

*Præter Carunculas, in ductu interiore muliebri sitas, membrana tenuissima in medio perforata, in quibusdam virginibus reperitur, quæ Hymen appellatur.*

*His omnibus diligenter inspectis, quæ etiam in vivente muliere spectari possunt, Clitoridis structuram inuestigabis. Cuius ab inguine quatuor digitos infra flexum femoris detraxes, simulque copiosum adipem sensim auferes, donec membrana carnea compareat, tum quatuor Clitoridis musculus separabis, quorum unus superior & angustior ligamento Clitoridis superiectus, alter inferior & latior externi orificij labro subiensus est. Dein ligamenta tria, ut in Penne virilis perquiris, duo lateralia nigricantia & spongiosa ab interno tubere Ischyj emanant, tertium medium & candidum à superna parte symphyseos osium Pubis nascitur. Videbis etiam Clitoridem venulis & arteriis quibusdam rigari, supra dorsum currentibus, quod apparet ab osse Pubis reunis & inuerti à Clitoride.*

*Tandem musculus ani præparatis atque demonstratis, ut in vitro prælitum est, commissuram osium Pubis tenuissimo scalpello separabis, atque Rectum Intestinum, Vterum & Vesicam simul connexa radicibus euellēs, vel relictis partibus in suo situ, crura tantum vehementer diuaticabis, ut reliquas partes secando intueri possis. Imprimis notabis Collum Vesicæ pollicis longitudine spongiosum, & nigricans, qualis est Vrethra virilis. Dein vagina Penis substantiam fungosam, Vrethra ferè similem, atque sanguine repletam, extrinsecus carnosam, intrinsecus membranosam, & instar boni palati rugosam examinabis, quæ factum ad maiorem delectationem in coitu, feminis faciliorem retentionem, & maiorem colli distensionem in enixu. Cernix enim Vteri extrinsecus tota venosa est, venis & arteriis innumeris confersa, ut facilius distendi, iustarique possit in congressu, ex affluxu spirituum.*

*Dein sectione facta, ad orificium interius peruenies, veraque Cernicis substantiam duram & glandulosam balano similem obseruabis. Dississa vera Cernice, intra canalem crevis exasperatum, animaduertes etiam duas Fibrulas carneas ligularum instar ibi appositas, & in quibusdam foraminula quadam perquiris, quæ sunt extremitates vasculi Eiacularis interdum eò desinentis. In quibusdam Carunculam oblongam infernè positam offendes.*

*Sed priusquam rescindatur vera cernix Vteri, orificij interni formam ori catelli similem, in iu qua tum menstrua non patiuntur, inuenies, & sub illo tubere cernicis, in fossa utrimque foraminula stylo & compressione cernicis perquiris, quæ sunt extremitates vasculorum Eiacularum, eò desinentium, ut intra veram cernicem. Postea fissam cernicis subiectam, in quam semen immittitur, & grandior Penis recipitur, obseruabis. Aperi Vteri fundo cauitatem exigam deprehendes, nullis cellulis discretam, nullam etiam venam videbis per Vteri substantiam discurrentes, quia tota spongiosa est, ac fistulosa.*



# IOANNIS RIOLANI ANTHROPOGRAPHIÆ LIBER TERTIUS.

## PRÆFATIO IN LIBRUM TERTIUM. DE PARTIBVS THORACICIS.

Procurata in publi-  
co Aaaco-  
m.



PARTIBVS ignobilibus ad nobiliores ascendo, à culina ad aulam progredior; est enim corpus nostrum instar Palatij regij, in quo distinctis locis culinæ officia & ministeria separantur à domicilio Regis. Nostri corporis Rex est vnicus Cor in pectoris folio sedens, molliter exceptum pulmone, cum quo familiariter versatur, ab eo sustentetur, stabellatur per respirationem, & per eum loquitur.

Cor multa benefici Regis opes & diuitias, quas intus & foris accepit, reliquis partibus vniuersi corporis liberaliter impertit. Cerebrum, in quo consilij locus residet, ipsi Cordi ministrat: Nec eius facultates vigerent absque Cordis opera, quod omnia in se possidet, nullius rei indigum. Costæ tanquam satellites circumstant ad custodiam. Regij Palatij præfectus dispensator iecur est, culina stomachus cum Mesenterio, & parte superiorum Intestinatorum quæ deducunt ad Hepar, reliquæ inferiora Intestina cum renibus & vesica sordium expurgandarum sunt vix, reliquæ partes tanquam mancipia Cordi ministrant & inferuiunt, vt brachia, & pedes.

Propter pulmonem erectum esse corpus hominis scribit *Aristoteles*: & propter loquutionem quæ à pulmone proficiscitur, datas ei manus censuit *Nemesius*, & quemadmodum cælestes orbes in motu suo musicalem harmoniam, siue concentum admirabilem efficiunt, inquebat *Pythagoras*, qui non percipitur à nobis propter mundi tumultus: similiter circa Cor, & in ipso harmonia muta, atque etiam sonora editur ac resonat.

Vniuersum Corpus humanum instrumentum esse musicum facile probatur ex *Hippocrate*, *Democrito*, & Recentioribus *Philosophis*. Musica autem duplex est, Vocalis, & Muta, quæ motibus rhythmicis editur, vtræque in Corpore humano reperitur. Vocalis in capite, auribus, ore, pectore, & ventre perficitur: Muta etiam editur in Cerebro, Corde, Thorace, & Ventre.

Vocalis in aure dignoscitur ex auris fabrica, quæ intus ossa est, fistulosa & anfra-



Quousa ut facilius resonaret. Habet obtusam in vestibulo membranam, quæ Tympanum dicitur, intrus chordam tympano obtusam, & tria officula ibi conclusa, quæ a figura dicuntur Malleolus, Incus, & stapes.

Præterea in capite utrimque quatuor cavitates sinuosa reperuntur ad resonitum comparatæ, in maxilla superiore duæ, in Osse frontali duæ, in apophysibus mastoideis duæ, in basi Sphæroideis duæ. *Democritus in Epistolis* mentum lyra simile facit, intelligit maxillam inferiorem ad formam lyrae constructam, dentibus tanquam clavis circumdatam, quibus illius lingua sonum edit. Nasi spiracula ore clauso spirituque propulso fistulam resonantem eleganter exprimunt.

Musica Muta in rhythmico Cerebri motu deprehenditur, sed Anima in Cerebro residens, non tantum istam harmoniam dirigit, sed etiam totius corporis: imò si credimus *Aristoxeno*, ipsa est quasi harmonia in fidibus, ex constructione corporis & compagibus viscerum: Musici enim intensionem concentumque nervorum in integros modos, siue vlla offensione consonantium harmoniam vocant: volunt enim arrium simili ratione constare in homine, qua concors modulatio constat in fidibus: id est, ut singularum corporis partium firma coniunctio, membrorumque omnium consentio in vnum vigor, motum illum sensibilem faciat, animumque concinet, sicut sunt nervi, bene intenti ad conspirantem sonum: & sicut in fidibus, aut eum aliquid interceptum, aut laceratum est, omnis canendi ratio turbatur & soluitur: ita in corpore, cum pars aliqua membrorum duxerit vitium, delui vniuersa, corruptisque omnibus, atque turbatis occidere sensum, eamque mortem vocari.

Hanc opinionem reprehendit *Lactantius, lib. de Opificio hominis, cap. 16.* Ad hanc opinionem alludit *Democritus*, dum compagem nostri corporis, *συνεχόμενον* appellauit, quod nomen *Hippocrates* retinuit.

Non est igitur Anima, humanis fidibus constans, sed ipsa potius *ψυχή*, concentum omnium corporis partium facit & conseruat. Eleganter *Vates Regius* corpus humanum appellat *Psalterium Decachordum*, ob insignem partium inter se varietatem, & omnium inter se concordiam: in *Psalterio Decachordo psallam tibi*: quem locum illustrans *D. Chrysostomus*, ait veteres quoddam instrumentis musicis fuisse ad iuendendam symphoniam, quæ Dei laudes resonarent: nunc autem pro instrumentis nos corpore humano vocali uti posse. Propterea *Clemens Alexandrinus, lib. 2. Protreptici, cap. 4.* dum explicat illud Davidis, *Laudate Deum in chordis & organo*, ait organum ibi dici corpus nostrum, & chordas eius nervos, per quos numerosè & concinnè intenditur, ut celestem edat harmoniam ad prædicandas laudes nostri summi Opticis.

Iam pridem veteres Philosophi Platoniei & Pythagorei celestem & mundanam harmoniam inuenerunt, quam *Ptolemæus libris harmonicorum* probauit. Inter Recentiores *Georgius Vencius*, eruditus Philosophus & Theologus, istam harmoniam, philosophicè, mathematicè & theologicè demonstrauit, ut & *Keplerus, Præstantissimus Mathematicus, libris harmonicorum*. Nos verò inuestigamus, non illam dininam & celestem harmoniam, vel Mundanam, sed Humanam dumtaxat querimus, oga elementis & humoribus concinnatam, qualis brutis animantibus concessa est, sed eam quæ Homini soli competat, reliquis animantibus denegatam, ut inde licet colligere & cognoscere Hominem natum fuisse ad Musicam, ut laudes Dei perpetuò prædicaret. Ideoque solus Homo Musicæ capax est, non tantum propter intellectum, sed propter organa Phonica & symphonica, quæ in eo solo reperiuntur, ad eum scopum diuersoae diuino artificio extructa.

Instrumentum illud Decachordum reperitur in partibus Thoracis & Colli, quod refertur ad Thoracem propter instrumentorum continuitatem. Sunt autem decem in Thorace partes musicales & symphonicae, à partibus inferioribus incipiendo, Diaphragma, Mediastinum, Cor, Pulmones, Trachea Arteria, Glottis, Gargareon, Lingua, Deutes, Labra. Tetrachordon in ore continetur ex quatuor partibus constatum: quales sunt Larynx, Lingua, Gargareon, Deutes.

Demonstremus nunc Musicalium instrumentorum Hominis discrimen à brutis. Diaphragma aliter conformatum, est rotundius, & habet duas apophyses oblongas versus Os Sacrum protensas: centro suo neruo excipit Pericardium, & hanc partem neruicam Cor cono suo modulatur ferit: Respirationis primum est instrumentum, ac proinde vocis, dum Thorax & Pulmo mouetur: Mediastinum est excava-

tum ad resonitū, inde *sternomaniels*, qui ex Thorace loquuntur ore clauso. Cor humanum aliquatenus diuersum à belluino, in suis motibus musicæ mutæ modulos exprimit: si credimus *Authori Anatomiæ viutorum. Herophilus* pulsum Cordis & arteriarum in musicos pedes descripsit, referente *Plinio*, lib. 29. cap. 1. Nuper musicalem harmoniam in pulsibus, libro edito demonstraui *Hesperiferus*, Germanus Medicus. In Homine aliter extructus est larynx, bruta carent glottide modulandæ vocis instrumento, & gargareone vocis plestro. Lingua humana differt à belluina figurâ suâ & volubilitate, vt etiam dentes & labra, quæ sunt planè dissimilia. Thorax partes phonicas, siue musicales includit, & si collum adiungas, eleganter testudini comparatur ab *Hippocrate*, & *Xeni* dicitur: sæpius nominat *utitur*, quod formam citharæ æmulat.

Venter inferior suam quoque Musicam vocalem & mutam edit: Vocalis est in *Ergasitromyiti*, *Ventriquois*, & quibus venter assidue murmurat cum quodam modulamine, vt in virginibus ieiunis, imò etiam saturis. Ventriculus ex *Democrito*, choream ducit instar Præcentoris, aliis distribuit partibus quod agant, & ipse corneam musam cum oesophago & portione Intestini accuratè refert. Intestina præter motum harmonicum mutum, quem edunt in suo motu Peristaltico, etiam vocalem habent in borborygmis, & crepitu cum quodam modulamine eliso & excusso. Notauit *Diuus Augustinus*, lib. 14. c. 14. de *Ciuitate Dei*, se vidisse quendam, qui quoties vellet modulatè pedebat, ac si fistulâ caneret. *Ludouicus Vines* in eum locum, talem se vidisse testatur: & *Garronus*, in platea vniuersali, talem vidit. Similem nebulonem nuper vidimus Lutetiz. Iltam musicam eleganter describit *Poeta in Anthologia Græca*, quod Latine reddit *Obsepus* Medicus eleganti versione.

*Vt crepitus multos nequicus erumpere perdit,  
Et seruat blefum dum canit ille melos.*

*Ergo si crepitus ingulat, seruatque sonando,  
Regibus hunc magnis, quis negat esse parem?*

Crepitus quoque sonorus, vel silentes à Medico obseruandos esse monuit *Hippocrates*. *Aristophanes* Socratem irridet Meteorologica docentem, fingit Rusticum Strepsiadem disputantem contra Socratem de generatione, & sono crepitus, quem generationi & sono tonitruui comparat: & quemadmodum aëre agitato & accenso, *nieum* producit, tonitru igneum, sic ex candela accensa & podici obiecta, videbis aërem exsistentem ignescere, flammamque concipere. Ergo susque deque in nostro corpore musicam edi certum est, atque vt superioris musicæ modulationem deridet Glottis, sic inferioris musicæ modulos regit Sphincter, siue pylorus ani, qui subcentor dici potest, vt præcentor in superiore parte vocatur.

Ex Cute hominis, Tympanum resonans confici posse testatur historia *Zischa Bohemorum Regis*, qui post mortem tympano extruendo suum corium destinauit, sic fore vt hostes audito sono in fugam verterentur: Ex Ossibus tibiariū olim musicalia instrumenta constata fuisse certum est. Ex his satis intelligitur, nostrum corpus esse verum instrumentum musicum, cumque verè *quoniam* esse, qui negaret nostrum corpus esse systema musicum.

Nec tantum in sanis corporibus ista harmonia deprehenditur, verumetiam in ægris, rythmos agnoscit *Democritus*, & quinam sint, explicat in *Epistola ad Hippocratem*. Ipsemet *Hipp.* in lib. de *Alimento*, musicam in hominibus videtur agnoscere, tam in sanis, quàm in ægris, & lib. 1. de *Dieta*, musicam & symphoniam in alimenti consecutione & distributione constituit, & in omnibus rebus naturalibus istam concordiam & discordiam notat. Vide locum & *Commentarium Zuingeri*, qui secundum regulas musices istos locos interpretatur. *Foetus* de arithmo morborum in *Oeconomia Hippocrati* tractat, & *Herodianus* in *Dictionario*, quid sit rythmos explicat. Eleganter *Problema*: Musica in omnibus rebus deprehenditur, quia nihil est in rerum vniuersitate, quod symmetriâ non constet, imò Deum ipsum sui ipsius & vniuersitatis harmoniam appellari. *Idem* c. 3. lib. 4. *harmonicorum*, eleganter describit modulationem asperæ Arteriz. Tibiz quidem naturalis simile Arteriarum opificium, vno hoc solo discrepans, quod per Tibias pulsantis loco manente eodem locus pulsari concedit propius ad pulsantem; remotiusque abscedit ope foraminum: in Arteriis contrà, eius quod pulsatur loco manente pulsantis, ad hunc accedit, receditque à Principe nostri corporis parte ob insitam Musicam, mirificè simul ac promptè inueniēte acci-

accipienteque subductorij instar in Arteriz locos, à quibus ad externum aërem distantia ad portionem excessurum, respondentes inter se efficiunt differentias sonorū.

Quod autem Medicus scire & callere debeat Musicam, colligitur ex *Galeno*, qui mufices cognitionem Medico necessariam esse statuit, *initio lib. 1. Meth.* Apollo inventor Medicinæ pingitur cum cithara, & suo discipulo, *Lapide apud Virgilium 12. Æneides.*

*Angurium citharamque dabat.*

Ideoque Musica apud Veteres erat propædia, quā instructi esse debebant pueri nobiliores. *Themiſtocles* indoctior fuit habitus, quod in conuiuiu lyram recusasset. *Ædianus*, libro de animalibus, scribit *Hippocratis* doctrinam musicalia multa continere, quæ fiebant per incantationes & epodos: Vnde hoc fit expiscatus nescio, cū nihil tale extet in eius libris, imò damnauit libro de morbo sacro.

## THORACIS DIVISIO.

### CAPVT PRIMVM.



**A**BOLVTO Ventris inferioris extispicio, factaque euisceratione, ad Thoracicas partes transeundum, quæ ambitu Thoracis comprehenduntur. Ambitus autem ille circumscribitur, supernè clauibus, infernè notis Costis, ita vt quiddid à Clauibus ad inferiores vsque Costas exporrigitur, Thoracis nomine comprehendatur: His enim spatiis concluditur Thorax à *Galeno*, lib. 8. *Admin. Anat.* & lib. 6. de vsu partium, & ceterisque *Anatomicis*: Hoc posito quis non videt Collum separatam esse partem à Thorace. nec ad Caput referri posse, ac proinde partem distinctam ex se constituere in generali Corporis diuisione. *Aristoteles*, lib. 1. de historia animalium, & passim, Thoracis spatium metitur à Collo vsque ad pubem, atque pudenda virilia ad finem Thoracis apposita esse scribit. Sic *Ruffus Ephesus* iisdem limitibus Thoracem circumscribit. Definitur Thorax ab *Aristotele*, lib. 2. de partibus animalium, c. 7. Arx quædam corporis, in qua focus naturæ absconditur, & aëreus in se sic quies composuit animi. Ab *Arctas* pulmonis vallum & conceptaculum, *Quintus Serapion* lib. 3. de reg.

Totus autem Thorax consideratur, vel quatenus integer & indiuisus, vel quatenus dissectioni subiicitur. Si primo modo spectetur, obseruabis in Thorace *Figuram, Structuram, Situm, Magnitudinem & Vsum.*

Quod attinet ad Figuram, orbicularis facta fuit, & quodammodo oualis, vt esset capacissima & securissima: Testudini ab *Hippocrate* comparatur libro de Anatomie. An testam Animalis intelligit? an potius musicale instrumentum, non tam ob figuram, quàm ex officio formandæ vocis? Vide *Falsum in Oeconomia*, diſtione xii<sup>a</sup>: an potius xii<sup>a</sup>, inde xiiii<sup>a</sup>, expectorare, & xiiii<sup>a</sup>, tussicula? dicitur etiam ab *Hippocrate* *id. 100*. In homine lata est antrosum, & retrorsum depressa, contrà in brutis animalibus acuminata est, propterea solus homo in tergum iacere potest, reliquæ animantes in alterutrum latus inclinatæ recumbunt. Notauit *Galenus*, libro tertio de articulis, hominem inter animalia latissimum habere pectus, deinde simiam, quæ quidem pectus habet angustius homine, latius verò cæteris animalibus.

Thoracis Structura non est penitus ossæ vt caluaria, ne stabilis & immota maneret. neque carne tota, vt abdomen, ne moles carnea pondere suo depressa, Cor ipsū premeret, & suffocaret, sed Ossibus carnes interpositæ fuerunt ad liberum Thoracis motum, cuiusque capacitatem constituendam. Nam à costis obliquis velut à circulis dolij, eadem fermè ac æqualis amplitudo Thoracis cōseruatur, & ope musculorum liberè mouetur & agitur, vt in dilatatione sua, pulmones frigidum aërem attrahant ad Cordis refrigerium; in contractione sua, pulmones expellant fulgines, ne Cor ab ipsis exstingatur.

Magnitudo Thoracis magnitudinem Cordis sequitur, authore *Galeno*, lib. 6. *Epid. sect. 4. part. 24.* Cor, inquit, statim ab initio conformatur, ad cuius proportionem pectus amplum efficitur.

Situs est Thorax in mediocruci parte, vt calor natiuus qui in Corde, tanquam in proprio foco residet, æqualiter omnibus partibus distribuatur. Configitur autem

ad eam spinæ partem, quæ dorsum dicitur, tanquam naui, quare necessarii eius longitudo æquabitur dorso: latitudo erit pro vertebrarum ratione.

Amplitudo verò Thoracis calidioris Cordis indicium est, vnde tñm Cordis caliditas exspectans persisterit, ac dilatauerit in primo sui ortu Thoracem, erit eiusdem caliditatis proportionem respondens. Vulgò diuiditur in partem anteriorem, quæ Sternum, siue Pectus vocatur, latera, quæ Costæ dicuntur, & partem posteriorem, quæ Dorsum nominatur.

Vfus Thoracis est partes spirituales, seu vitales custodire, propterea definitur *partium vitalium conceptaculum*, vel vt placet *Fernelius* Cordis domicilium, quia pulmones tanquam stragula creati sunt ad Cordis feruorem temperandum.

Quarens autem Thorax dissectioni subest, diuiditur in partes Continentes, & Contentas, Continentes sunt Communes, prorsus similes his quæ iam in abdomine expositæ sunt (excepta tantum mammarum eminentia) nempe Cuticula, Cutis vera, Panniculus adiposus, Panniculus membranofus, & Membrana communis musculorum. Cutis tantum hoc habet peculiare, quòd lub axillis pilosa sit, ne partes illæ continua brachiorum agitatione atterantur; quinetiani, in robustis hominibus cutis circa pectus pilis luxuriat. Pinguedo non ita copiosa in viro, vt in muliere, & ibi stauior. Panniculus carnosus prope claues & axillas veræ carnis speciem præ se fert, & quorundam opinione distinctus est musculus, qui trahit dorsum maxillam, quod si verum sit, falsum est panniculum carnosum, qui corpus vniuersum obuoluit ab ea parte verè carnosâ produci.

Proprie multiplices existunt, quas triplici differentia comprehendere licet, vel enim sunt Carnosæ, vt Musculi costis incumbentes, & earum interstitia opplentes: vel sunt Ossæ, vt Sterni, Costæ, Clauiculæ, Dorsum: vel sunt Membranosæ vt Pleura.

Quod attinet ad Musculos Intercoştiales, de illorum origine & vfu non conuenit inter Anatomicos. Huic controuersie occasionem dedit *Galenus*, qui inersis in locis contraria prodidit, modò Externos Intercoştiales ab inferno latere costæ supernæ educit, modò à superiore parte costæ infernæ ducit. Idem lib. de causis respiratorum, voluit Externos Intercoştiales contrahere, Internos dilatare. Liber iste spurius est, vel fragmentum maioris libri, vel error est in textu, pro *in* & *int*, extra & intra, quæ sunt voces affines. Priori opinioni fauet *Laurentius* posteriori subscribunt *Vesalius*, *Columbus*, & *Fallapius*. Sed intercoştiales externos oriri ab inferiore parte costæ supernæ, ac proinde trahere sursum costas in inspiratione, inde manifeste patet, quia prope articulationem costarum ad vertebra tendinosi sunt, & nervos recipiunt. Vnde cognoscetis eos emanare à latere inferno costæ superioris, & inferi in latus superum costæ inferioris. Interni musculi Intercoştiales à superiori latere costæ infernæ oriuntur, & in latus infernum costæ supernæ desinunt, Costas deorsum trahunt in expiratione.

De Intercartilagineis qui sterni spatia opplent, non minor fuit controuersia, cuius auctores fuere *Arabes*, quorum exemplo decepti *Vesalius* & *Columbus*, Intercartilagineos musculos introduxerunt. Quum enim viderent ex *Galen* fibras uniformes vsque ad confinium Sterni produci, easque interspatia Sterni immutari, ex varietate fibrarum distinctos esse musculos iudicarunt.

Sed aliam huius erroris causam profert *Fallapius*, videlicet Externos Intercoştiales tantò citius in anteriora terminari, quantò longius à vertebra oriuntur: & vicidim internos tanto longius per interualla Sterni produci, quantò breuius à flexura costæ incipit. Si quæras, cur Intercoştiales externi non protendantur per longiorodinem Sterni, id factum duabus de causis autumo, vt musculi Intercoştiales essent inter se æquales, atque vt Serratus maior & Pectoralis Sterno tenacius inhaerent.

De Actione & Vfu maior nascitur difficultas. An ambo vni & eidem actioni inferuiant, An externi distinctâ edant actionē ab internis. *Galen* lib. de motu musculari Externos inspirationi, Internos expirationi præesse voluit. Inspirationem autem dilatato, expirationem constricto Thorace fieri Romæ docuit publicè, præsentibus *Suero*, *Paulo*, & *Barbara* Consulibus. Idcirco, lib. de diff. musculari, externos Thoracē dilatare, internos contrahere asseruit. Ratio est, quia musculi externi maiores costis superiōrē, qui Thoracē dilatant, sequuntur ductum fibrarū intercoştialiū externorum: deinde intercoştiales externi sunt crassiores internis, & habent nervum in principio, qui perperat Costæ latus superum. Adde quod motus inspirationis validior est expiratione. *Vesalius* omnes

intercostales Thoracem constringere, & expirationi inferuire contendit, quia opus est robore ad exufflationem, vocem edendam, tussim & fecum excretionem; sed cum ex Galeno Diaphragmati in subsidium veniant, necessarii septi transversi motum sequuntur: at illud contrahitur in inspiratione: ergo omnes Intercostales, tam externi quam interni ad id opus potius conspirabunt, & educuntur ab infernis partibus costarum superiorum.

Equidem lubentiùs descendo in Fallopij & Arantij opinionem, Musculos Intercostales carnosos esse ligamenta, quibus inter se nequuntur Costæ, vel saltem si movent & agitant Costas, id non per se, sed tantum per accidens præstare; dum scilicet Costæ inuicem colligatæ maiorum muscutorum sequuntur motum. Præterea, Costæ vtroque extremo Costis & Sterno affixæ, moveri per Adductionem, & Abductionem earum ad inuicem nequeunt, nisi per eas portiones Costarum cartilaginosas, quæ sunt iuxta Sternum. At in eo motu inter se adduci vel abduci nequeunt, nisi obliquata sit inflexio, semperque spatium inter vtramque Costam æquale manet. Præterea, in luenibus, vt in senibusteperiuntur Costæ per totam longitudinem Offæ, sine vlla portione cartilaginosa, vt obsetuavi in Illustrissimo Principe Alexandro de Vandsme, annos 30. nato, qui nulla spirandi difficultate quandiu vixit, laboravit. Adde quod musculi Thoracem mouentes aliunde, quam à Thorace originem habent: Musculi autem intercostales intra spatia Costarum collocati sunt: Quapropter Costæ nullo modo ab his musculis moveri possunt. Itaque si Costæ moventur ab intercostalibus musculis, sui motus principium habent à Diaphragmate, stimulant partes illas inferiores Thoracis; & à musculis maioribus ibi definitibus, qui dum attollunt Costas inferiores, simul & reliquæ Costæ eodem momento agitantur ab Intercostalibus reuulsæ. Nullæ seorsim ab Intercostalibus moventur: ideo cuiusque lateris Intercostales musculi externi & interni, pro duobus tantum accipi debent. Costæ autem dum moventur sursum, in exteriora retrahuntur, vt Thoracem dilatent, dum moventur deorsum ad interiora vergunt & inclinant, atque Thoracem constringunt.

## THORACIS PRIMA ADMINISTRATIO

### Anatomica.

#### CAPVT II.

**S**IC autem partes illas Communes & Proprias separabis. Pectus à Xiphoides usque ad mentum rectâ rasicabis, cutim cum adipe diripies, quod facilius eriam in muliere; si cadaver habueris mulieris puerpera, Mamma strucluram diligenter expendes, priusquam totum pectus cute & adipe nudetur.

Detrahis cute & adipe, musculos costis incumbentes separabis; nempe Pectoralem ab inferna parte, & Serratum minorem pectorali substratum. Deinde à Sterno & Clavicula originem Mastoideis & Bronchijs feceris, atque principium musculi carnei, siue latissimi, qui musculus colli innouit, ab eodem loco nempe Sterno & Clavicula perductum diligenter conseruabis, & iuxta Claviculas post adipem accuratè dirimes.

His peractis in vitro aut Muliere Mammarum strucluram inquires, quam vbi satis contemplatus fueris, Sternum auferes, vt Thoracis interna capacitas compareat. Galenus initio lib. 7. Admin. Anat. Sternum in duas partes fecit, ducto scalpello à cartilagine Xiphoides per os medium pectoris ad clauas usque, vt costis in contraria versus acrotortis, gemina Media & Intima membrana diuelli, & in suum queque latus distrahi queat.

Alterâ discicandi ratio usitata melior est, quæ resectis vtriusque extremitatibus costarum cartilagineis, vniuersum Os pectoris tollis, quod dum agitur diligenter aduerteris, ne in separando Sterno à Clavicula, venas Subclauias vulneres, nec in rescindendo Sterno cultrum profundius immerges, ne vasa Cordis attingas. Interea notabis interiorem & inferiorem partem cartilagineas Costarum obduci duplici musculo Triangulari à lateribus Ossis Sterni enato, quoniam iomentis instar illis appositum credo, vt Cordis iñna mollior exciperet, hancque adempto Sterno demonstrabis, quia confectum exsiccat.

## DE MAMMIS.

## CAPVT III.



**P**OSTEA Mammarum structuram inspicere, mulieres Mammæ habent, viri Mammillas. Reliqua animalia Vbera. Dicuntur Mammæ, quoniam infantes alunt, etenim Mamma nutricem vel matrem significat, Græcis *μαῖνη*, quasi *mammi* quod partes istæ manfæ alimentum suppetent, siue quod puellis escam, quam ipsi *μαῖνα* vocant, impetiant: Vnde manducatio, quod illi *μαῖνα* dicunt, vel *μαῖνα*, quod applicari denotat, quoniam ipsi infantes primò applicantur, siue à *μαῖνα*, quod quærere significat, quia eas infantes recens nati quærant, ex *Meletio*. *Iulius Pollux* à *μαῖνα* detrahit, quod est quærere, vel à *μαῖνη*, sono lugentium. Papilla verò à verbo *papo*, quod est edo; hanc enim partem infans papat, *Vita à dno*, apud *Hesychium*, *Simo* *apud*.

Sunt autem Mammæ viris & mulieribus diuerso fine datæ & constructæ. Viri Mammæ tantum habent ad pectoris ornatum & venustatem, vel ne mulier luptum animal gloriaretur se Mammæ habere, quas natura viris denegasset. Sunt quædam ita posita in corpore, vt tantummodo decorem habeant, non etiam vsum, sicuti pectus virile mammillas habet, sicuti facies barbam, quam non esse munimento, sed virilitati ornameto indicant putæ facies feminarum, quas vtique infirmiores viris muniri tutius conueniret, inquit *Diuus Augustinus*, lib. 22. de *Ciuitate Dei*, cap. 24. id primùm à *Cicerone* lib. 3. de *finibus* pronunciatum fuit. Quod verò refertur ab Anatomicis, Mammæ pectori additas fuisse ad Cordis tutelam, ridiculum est, quia molcum & amplitudinem habent ex subiecto musculo Pectorali, qui absque illa figura externa Mammæ, ad muniendum & tuendum Cor in vitis sufficiebat. Et licet concedatur Mammarum mulem & amplitudinem in viris, Cor tueri & custodire: Quæro quo fine Papilla, quam dicunt centrum esse in quod venarum, arteriarum & neruorum fines definant, quod falsum est, cum ad papillam in viris, neque venæ, neque arteriæ pertinent, ne quidem in feminis. Non est exigua facilisve disquisitio, quam ob causam natura maribus addidit Papillas, pulchriores enim canes quibus absunt. Item in Elephantis vix cernuntur, vir verò non ostendit, nec enim id faceret viriliter. Nam quod ait *Aristoteles*, ad operimentum Cordis mammæ apporatas, esto? At papillæ nota quo fine, in hac dubitatione nihil definit *Secher*, possumus respondere cum *Galenus*, lib. 15. de *usu partium*, cap. 1. *Vt à dno* *in* *libro* *de* *usu* *partium* *cap. 1.*

*Sic placet sapere, quære plura nefas.*

Mammæ mulieribus viles sunt ac necessariæ ad lactis generationem, ideoque *Fauorinus* apud *Agellum*, sanctissimos corporis fontes, & generis humani educatores appellabat, maiore quàm in viris artificio constructæ sunt: Virorum Mammæ ex cute & adipe dumtaxat constantur. Mulierum Mammæ glandulosum corpus adipi substratum, vel potius immesum, cum supernè & infernè adipe tegatur habent. Vnicum est, & continuum, non multiplex, atque ex *Vesalia* ad papillæ centrum, glandulam vnā cæteris maiorem positam esse reperies, cui aliz parue glandulæ amygdalis cerasorum decorticatis similes in circuitu accumbunt.

Mammarum structuram in muliere lactente & sicca differentem obseruavi. In Mammis aridis & succis Adepes vbique candidus apparet, eiq. subiecta est Membrana durissima & crassissima, quæ pro glandoso corpore accipitur, eaque musculum Pectoralē ab adipe determinat. Præterea adipi superius est Membrana tenuis, quæ debet à cute accuratè separari. In puerperis, & lactentibus mulieribus manifestior est, quia tumidior. tumque adips sub axillis rubicundus est, ex affluxu sanguinis per Thoracicas, alibi candidissimus spectatur. Adipi verò subiectum corpus glandosum musculo Pectorali firmiter agglutinatur, hoc nexu plena & distenta vbera, ac veluti pendula firmantur: quo tempore corpus illud glandosum durius ac solidius crassius, & amplius existit, manifestis locellis ac tubulis in adipem ipsum penetrantibus, & quoquoersum dispersis differtum ac peruium est, vt in his locellis lacre condatur & aliterueatur, sicut in grumosis Mammis obseruatur. Per istos tubulos lac ad papillam defer-

tur. Quos forsan intellexerat *Marinus*, qui in sua *Anatome* caput scripserat, de vasis Mammarum quibus lac continetur, referente *Galeno*, libro de *libris propriis*. In vbere ouis prope diem parituræ, supra papillam, quinque vel sex cellulas vidimus membranis secretas, tanquam lactis conceptacula, ex quibus lac stillabat per foramen papillæ apertum.

In nostris Anatomicis reprehendo, quod ex *Vesale*, Papillæ substantiam fungosam esse statuunt, similem cum Pene substantiam obtinere. *Laurentius* similem balano facit, ut erigi & flaccescere queat. At balanus glandosus est, atroxque sanguine refertus. Penis substantiam constituunt ligamenta duo neruea. Itaque Papilla nihil est aliud, quam duplicata, ac veluti coarctata cutis cum productione membranæ corporis glandosæ, quæ ibi fistulosa, deducitur ad papillam effingendam, ut ore puelli apprehensa facilius fugeatur. Propterea eiusdem non est naturæ cum Penis balano, ut ipsa dissectio patefaciat.

Vnicui aut duobus, interdum tribus vel quatuor foraminulis pertusa est, quæ vix setam equinam admitterent, sed manifestè spectantur, dum nutrices lac exprimunt ab vbere, totidem sunt foraminula, quot sunt radioli fluentis lactis.

Geminas Mammas mulieri Natura dedit, ut binos foetus alere possit, quæ non secus ac boni & fideles serui, stant ad vteri ministerium, ut illi succedant in opere. Quibusdam tamen quadrigeminæ obseruatæ fuerunt, omnesque lacte distentæ, ut refert *Cabrolus*. Visâ fuit ab *Hallerio* mulier, quæ in altera Mamma duplicem papillam lac reddentem haberet.

Fabulosum existimarem, nec auderem in scripta referre, quod *Iuuenalis* de Mammarum magnitudine memorat, nisi quædam similia exempla legissem apud historicos nostræ ætatis.

*Quis tumidum guttur miratur in Alpibus? aut quis*

*In Merce crasso maiorem infante papillam?*

*Nempe quod hac illis natura est omnibus una.*

Narrat *Alysius Cadamustus* in regno *Senega*, feminis ubi annum ceciderit decimum & septimum attingere, à viris Mammas vi distrahi sune per medium iniecto, itaur ad ventrem vsque procident. Alter, *Grallus*, dñ *Peyrard*, in sua *relazione Orientales India nuper edita*, recitat in insula *Arabanis*, nutrices Mammas adeo longas habere, ut eas possint in terga reflectere; eiusmodi Mammis prædita erat, de qua loquitur *Martialis*.

*Mammas atque tatas habet Asra, sed ipsa Tatarum*

*Dixi, & Mammarum maxima Mamma potest.*

Nodum quærit in scirpo *Turnebus*, dum aliter interpretatur hoc distichon, lib. 8. *Aduersus c. 2.*

Scribit *Aristoteles* solis animalibus in pectore sitas esse, quæ partus suos possunt attollere, idcirco homini tantum & similibus eo situ collocantur, cæteris animantibus in sumine. Eleganter *Pellus*: solus in pectore Mammas habet Homo, Vespertilio & Elephas, ut dixit *Solens*. *Stagiritis* verò notat Elephantem iuxta pectus, non in pectore Mammas habere, lib. 2. de *hist. animal.* Sed mendum est apud *Pulacem*, in dictione *rinnet*, quia nullum volatile, ex eodem *Philosopho*, Mammas habet: Attamen *Bellonius*, libro de *Piscibus*, notat se verum illud in *Egypto* comperisse, Vespertilionem Mammas in pectore gestare. Videntur autem propterea manus in pectore situm habere, ut mater puerum suum vlnis & manibus comprehensum simul osculari & alere queat, si que amore suum erga prolem magis intendat, ex *Plutarcho*.

*Galenus* huius sedis Mammarum alium vlnem ex *Aristotele* profert, lib. 7. de *vsa part.* Lac est vitilis alimentum superfluum, quod in brutis, vel in iubas, cornua, vel dentium magnitudinem absument; quare cum simile alimentum circa pectus coarctuari nequeat, Natura à pectore deduxit Mammas, & ad imas ventris partes abiecit. At in homine pectori pluribus de causis inhærent, ad mulierem à sexu brutorum distinguendam, lactis faciliorem generationem: inhærentis firmitatem, alendi foetus commoditatem, coeundi facilitatem, Cordis partiumque vitalium tutelam, pectoris ornatum, & veneris incitamentum. Nam Mammarum semigloboli inuicem fororiantes suauiter contrectati, Veneris igniculos accendunt. Notabile est exemplum *Menelai* duels licet inuicti, qui euaginato gladio cum necem Helenæ intentaret, inspectis eius mammillis enseni abiecit, & hanc exosculatus est; quod et



apud Euripidem in *Andromacho*, Pelcus exprobrat: quam historiam notat ex Chryssippo Galeus lib. 4. de placitis, cap. 6. De situ Mammaram, lege Synagagam Iudaeam Euxartori, pag. 110 ex doctrina Rabbistarum.

Dubitar *Vesiculis*, si Mammis arteriæ distribuantur, quas nunquam observare po-  
rui; sed manifestas habent à Thoracica, quæ plurimos in adipem & corpus glandu-  
losum furculos spargit. Nec est verisimile partem per se frigidam, coquendo lacti de-  
stinatam arteriis carere, quibus præ cæteris opus habet ad augendum ipsius partis  
spermaticæ & glandulosæ natium calorem.

Irredit quoque *Vejalus* Anatomicum Mammarum cum Epigastrica, per quam societas & commercium Vteri cum Mammis perficitur. Ex *Galeno*, libro de *Diffinitione venarum & arteriarum*, cap. 8. qua de re leges *Aphor. Hipp.* 37. 50. 58. *sect. 5.* In puerpera recentem enixa Mammariam internam & Epigastricam, crassius & mole calami scriptorij pares vidi: quin etiam puerperæ sentiunt lac frigidum supra Stomachum secundum ventris longitudinem ad Vterum decurrere. Et ipsæmet *Hippocrates* istas vias designat & videtur, libro de *Natura pueri*: *Materia, inquit, lactis ab Vtero ad Mammam confertur, ab his in ipsas matricem ex qua quædam portio per easdem venas refertur, siquidem tum hæ, tum aliæ perfusiles venulæ in Mammis, atque Vterum protenduntur.*

Solent præter modum crescere Mammillæ, & turpitudinem afferre, præsertim virginibus, quæ si tenues non habeant Mammillas, suspectam reddunt suam Virginitatem: quæ etenim feminae sæpè sunt ob incalcescentiam Veneræ, maiores habent Mammillas, propterea illis quæ peperere, pulchriores sunt Mammillæ, quia rotundiore.

Nervi habent Mammæ ab Intercoſtali quarto, qui in viris & mulieribus circa medium Coſtæ penetrat muſculum Intercoſtalem, & quadripartitus in muſculum Pectoralem diſſeminatur, inde nervi producuntur in Mammæ.

## DE DIAPHRAGMATE.

## CAPUT IV.



**D**IPHRAGMA & diligenter obseruatis Mammis, ordine sectionis ad Diaphragma perges, quod Græcis *σπλην* dicitur. non quod ad prudentiam conducere videatur, sed quod eâ parte affectâ, mens quoque lædatur, *σπλην* nō parit̃, quā nō *σπλην*, ex *Aristotele* lib. 3. cap. 3. de partibus animalium, rationem assignat *ibidem Philosophus*. Si contingat Diaphragma attrahere ex vicino Hepate & corde humores calidos & excrementitios, subito & manifestè lædatur mens vni cum sensibus externis, parum tamen aridet illud Etymom auctoris libri de Morbo sacro [qui *σπλην* nomen fortuitò repertum opinatur. Ito nomine vitur *Hippocrates*, libro de oss. nat. & in Coacis, sed libro de Virginalibus, *σπλην* vocat, & libro de Flatibus *σπλην* nō *σπλην*. Cur autem istud nomen *σπλην* Diaphragmati veteres imposuerint, exponit *Galenus*, lib. 5. de locis aff. simulque quomodo *σπλην* à Platone vocatum sit, & ab *Aristotele* *σπλην*. Latini hanc partem Præcordia dixere, si credimus *Plinio*, quia Cordi prætenduntur, quod Græci appellauerunt *phrenas*. At verò *Celsus* Præcordia semper accipit pro hypochondriis, & *Glossa phlozen*, præcordia reddunt *σπλην*; quo sensu etiam à *Cicerone* sæpius vsurpatur. Dicitur etiam Diaphragma, cinctura corporis, vel quod zonâ externâ constingatur corpus eo in loco, vel potiùs ab interno cingulo Diaphragmatis, idque ibi zona collocatur. Diaphragmatis velamen ex *Polluce*, *σπλην* dicitur, ex Spene enata membrana Diaphragma succingens. Sic *Eustathio* *θλαδον* n. i. e. *θλαδον* *σπλην* nō *σπλην* nō *σπλην*. Notat *Meletius* Diaphragmatis membranam *σπλην*, quod visceribus inuoluatur nuncupari; siue *σπλην* nō *σπλην*, quod ipsis in pepli modum subternatur, vel *σπλην* nō *σπλην*, quia compactum est & constrictum.

Est autem Diaphragma Membrum naturale à vitalibus fecernens, liberę respirationis instrumentum, quia musculosum est : pisces enim qui non respirant, Diaphragma quidem habent, sed membranofum. In pennatis deest quoque musculosum. A

ergo præcipuum instrumentum respirationis, quia pennata animalia respirant, sed habent Costas homine mobiliore qui præditus est Diaphragmate. Primus verò *Galenus* actionem Diaphragmatis ad respirationem reuocauit. Vfus consistit in separatione cavitatum Ventris & Thoracis viscerum nutritionum suspensione. *Aristoteles*, Diaphragma non agnouit pro Musculo, nec ei motum tribuit, sed Vsum separandi Thoracem à Ventre inferiore: quod præstat in omnibus animalibus tam spirantibus, quam non spirantibus. Ne quidem *Hippocrates* Diaphragmati motum tribuit, etiam si *ἡσυχίαν τῆς ἀναπνοῆς* vocarit, quia pulmonibus attractus aer cuncta rerum permeabilis, per septum transpirat in Ventrem.

Diaphragma duabus constat partibus præcipuis, vna Neruea in medio collocata, cui circumiecta est altera Carnola: superne intra Thoracem Pleura succingitur, inferne intra ventrem Peritonæo velatur. Neruosa portio in medio collocari debuit, vt densitate sua ascendentes culinæ vapores repellat, quos carnosa substantia instar spongiæ ebibisset, auctore *Aristotele*. Necessaria quoque fuit ad tutam & securitatem partium transeuntium venæ Cauæ, Aortæ, & Oesophagi, quæ constringerentur ab eo musculo dum contrahitur, si totus carnosus fuisset. Tertiā causam adducit *Hippocrates*, vt sit robustius Diaphragma, minusque doloribus obnoxium. Addo vt esset fortius ad ictus Cordis sustinendos, quam partem Diaphragmatis neruosam Cor suo cono tangit: non solum vt motum infundat Diaphragmati, sed vt oppositum Iecur succutiens, sanguinem in Venam Cauam refundat, cuius ascensum in homine recto sua diuerbatione faciliat. Quare palpitatio quæ circa Xiphoidem in ventre percipitur, non ab Arteria Coeliaca paulò infra micante proficiscitur, sed à Corde Diaphragmatis centrum nerueum percutiente.

Venas duas recipit Phrenicas à Caua ascendente: totidem Arterias ab Aorta descendente: Nervos duos insignes habet, qui prodeunt ab illo crassiore neruo collæ in brachium porrecto, inter quartam & quintam colli vertebrae vtrique enatos, qui per duplicaturam Mediastini, sinister infra, dexter supra Cor reptantes, prope centrum Diaphragmatis inferuntur. Nervulos alios accipere potest in eiu cuitu ab intercostalibus.

Inde cognosces, cur in vniuersali totius corporis paralyfi Motus Diaphragmatis integer maneat, si musculus est, & à neruis motum illum obtineat, qui oriuntur à medulla spinali ceruicis: An quia motum alium habet diuersum à reliquis musculis, qui potius à natura, quam à voluntate nostra dependet? An quia nerui illi sunt interni, medium Thoracem perreptantes, ideoque calore viscerum vitalium fouentur, magisque calent, quam reliqui nerui spinalis medullæ, qui omnes sunt externi, & in partes externas dispergantur? An quia nervos habet alios inferiores, qui satis roboris suppetunt Diaphragmati ad motum.

Notabis adhuc per Diaphragma ascendere Venam Cauam, & descendere Oesophagum, atque Aortam. Illius quoque circularem adhæSIONem obseruabis, dum vtrique Costarum infernarum cartilaginibus vsque ad quartam notam adnectitur.

Etenim Diaphragma commune est ligamentum costarum uotharum, quod natura inferuire voluit istis costis colligendis, & colligendis, quæ nequaquam firmatæ ad æternum, vt verè septem, nisi hoc communi vinculo carneo inter se conducerentur. Nec enim haberent satis roboris muscoli intercostales ad impediendam istam diuulsionem, & distractionem costarum: Nec Diaphragma ob suam grauitatem carnosam posset continere in suo situ & statu costas illas spurias, nisi supernè reuelleretur à Mediastino forti, propter geminas quibus constat tunicas.

Porro, Diaphragmatus tanta est dignitas, vt contabescens febrem hæcticam lethalem inducat, inflammatum, mentem perturbet, & phrenitidem inferat: cuius generationem, sic docet *Hippocrates*, libro de Virginalibus Sanguis præ multitudine resilit ad Cor, & Diaphragma, inde Cor fatuum fit, ex fatuitate torpedio, ex torpedine delirium apprehendit.

Vulnera Diaphragmatis lethalia esse scriptum est ab *Hippocrate* & *Aristotele*, quod quidem in parte neruosa verum est, non carnosa, quæ faciliè percuratur, vt animaduertit *Galenus*, & confirmauit *Hallerius*. Cur in parte neruosa vulneratum Diaphragma repentinam mortem adfert? an propter neruorum offensionem? an quia neruo eius circulo Pericardium adhæret, eidemque circulo Hepar alligatur: quem

locum Vlyfles lethali vulnere perfodit, vt legitur apud Poëtam *Odyſſea* 9. & *Galenus* repetit ex *Homeri libris de viſu partium*.

Veteres Diaphragmati referebant mentis ſubtilitatem, atque in eo præcipuam hilaritatis ſedem conſtituebant. Ob hoc in præliis gladiatorumque ſpectaculis, mortem cum riſu traiecta præcordia attulerunt, aiunt *Ariſtoteles*, lib. 3. *de partibus animal.* c. 10. & *Plinius* lib. 11. c. 37. Scribit *Hippocrates* 7. *Epidem.* Thyconem in ſepto tranſuerſo vulneratum riſiſſe. *Amatus Luſitanus Cœmeteria* 7. *tyfus* & hilaritatis ſedem eſſe in Diaphragmate probat.

Conſideratio Diaphragmatis in Vſu, Aëtione ſua, & ſitu propter viciniam viſcerum, magni eſt in Medicina momenti, ad diagnoſionem & curationem morborum, & multa ſymptomata dyſpnoïca læſæ reſpirationis, dependent ab iſta parte, quæ tribuuntur pulmonibus. Deliria quoque huc pertinent, affecto tantum per conſenſum Cerebro.

Nunc rerum maior mihi naſcitur ordo, de natura & motu Diaphragmatis: *An ſit verè muſculus partes aliquas mouens, vel Membrana tantum carnea, inſtar ſepimenti circumſecta: Et ſi Muſculus, ubi Caput & ſinus conſiſtunt debeant? cur ſit circularis, unde motum habeat?* *Galenus* paſſim Diaphragma muſculum eſſe ſtatuit, cui ſubſcribunt omnes Anatomiei. Mouet enim Coſtas in reſpiratione. At muſculus omnis inſtrumentum eſt motus voluntarij, vt *Galenus* latè explicat lib. 1. *de motu muſculorum*: motus verò Diaphragmatis non eſt eiufmodi, nec dependet ab arbitrio noſtro, quia reſpirationis conditionem ſequitur, quæ tota naturalis eſt, faltem ea quæ libera dicitur, quia nobis dormientibus, ac inuitis non ceſſat. Nihilominus exiſtimat *Piccolominus*, in præſentibus *Anatomicis*, Diaphragmatis motum eſſe voluntarium: quem duplicem facit, alterum ſimpliciter & abſolutè voluntarium, vt eſt progreſſio & apprehenſio: alterum quidem voluntarium, ſed neceſſitate aliqua cogente, vt in reſpiratione, deiectione & miſtione. Voluntarij ſunt motus, quia muſculorum ope perficiuntur, ſed urgente aliqua neceſſitate, ſic Diaphragma propter ſpirandi neceſſitatem mouetur: At cum Diaphragma ſit muſculus in ſua ſpecie particularis, non eſt mirum, ſi motum peculiarem, & ab alijs diſtinctum obtineat, nempe quodammodo naturalem. *Galenus*, libro *de motu muſcul.* notauit omnes muſculos præter voluntarium motum, habere etiam naturalem. Si muſculi definitionem ab *Hippocrate*, libro *de Arte*, aſſignatam ſpectemus, muſculus eſt caro in orbem circumducta, circulare Diaphragma muſculi nomen meretur. Oportet eſſe circulare, & fibras à peripheria ad centrum coire, vt eſſet robuſtum, ab eo enim Hepar, ventriculus, & interdum lien dependent. Adde ex *Ariſtotele*, in *ſeſto Mechanicorum*, quod motuum admirabilem, qui per inſtrumenta ſunt, Circulus continet cauſæ principium: Nec abſurdum eſt ex admirabiliſſi quid admirabile contingere, maximè vero mirabile eſt contraria ſibi inuicem ſimul fieri.

Quum autem hic muſculus totus ſit in ſua ſtructurâ, ἀνὰ μέρος, non abs re quaeritur, ſi vnicus ſimplexque ſit muſculus vtrique lateri communis, vel duplex ſimul iunctus, vt opinatur *Aurelius Senerarius*, in ſua *Zootomia*.

Hanc quaëtionem intactam reliquiſſem, niſi animaduertiſſem *Bambinum*, in *Theatro ſecondæ editionis*, authorem huius quaëtionis nominariſſe Chirurgum Pariſienſem dictum *Habicus*, cuius rationes olim à me refutatas, nunc in medium producam, & ad illas noſtras reſponſiones. In primis probat Diaphragma muſculum eſſe duplicem, quod apud *Homerum* & *Hippocratem* dicatur *μῦς*, nomine plurali. 2. Item Corpus noſtrum geminatum eſt, ergo geminum erit Diaphragma. Thorax in duas cavitates, dextram & ſiniſtram ſepto medio dirimitur, ſimiliter Diaphragma in duas partes diſtinguitur ab ipſo Mediſtino: Nam duplices habet neruos, venas & arterias, quin etiam duplicem apophyſim, partim carnoſam, partim neruoſam, ad lumborum vertebres producit.

Præterea vtriuſque diſcrimen variam in fibris obſeruat. Denique ſi muſculi ab dominis duplices ſunt, qui ſunt oppoſiti Diaphragmati tanquam antagoniſtæ, quidni Diaphragma duplex erit? 7. Tandem ſi triangularis, ſue peſtoralis internus apud Anatomicos duplex conſtituitur, cum tamen ſimplex accuratè intuentibus & ſecaribus appareat, quidni Diaphragma duplex erit? Adde quod in Hemiplegia totum Diaphragma reſolueretur, non ſine reſpirationis diſpendio, niſi duplex eſſet, atqui reſpiratio integra reſtat, ſuperſtite & illæſa remanente altera portione Diaphragmatis.

Singulis autem hisce rationibus olim ita respondebam. 1. Ridiculè probatur Diaphragma duplex ex ditione *non*, quæ semper ab *Hemero & Hippocrate* in plurali numero profertur, quia caret angulari. 2. nec Peritonæum in dextrum & sinistrum diuidi potest, quinuis *non* in plurali dixerit *Hippocrates*. 3. Si nostrum corpus geminum exisset, non inde sequitur Diaphragma geminum esse debere, nam vnico adest in corpore Venter, vnica Vesica vniaria: 4. Quamuis Thorax in duas cavitates directus sit, non ob id Diaphragma duplex constitui debet, est enim destinatum ad discernendas cavitates Thoracis & Abdominis, vt videre est in piscibus, qui Diaphragmate præditi sunt, etsi non respirent: atque hic vsus Diaphragmatis non magis pertinet ad Thoracem, quàm ad Ventrem inferiorem, neque Medialtinum findit, penetratque Diaphragma, sed tantum supra & infra circulum nerueum, ipsi adhærescit. 5. Si Diaphragma propter duplicitem venarum, arteriarum, & neruorum, geminasque aponeuroses duplex existeret, lingua, quæ geminata vasa recipit, duplex erit: sic Venterculus pluribus venis & arteriis præditus, duplex erit constituendus. 6. Si Diaphragma propter geminas apophyses ad lumbos exproctas geminum esset, sequeretur omnes musculos, qui duplici vel triplici constarent aponeurosi, totidem esse musculos distinctos, quales sunt biceps cubiti, & triceps femoris. 7. Fibre Diaphragmatis sunt ubiq; vniiformes à centro ad circumferentiam protensæ. 8. Vana est ista consequentia, Musculi abdominis sunt oppositi Diaphragmati tanquam antagonistæ, ergo cum Diaphragma attollat Thoracem, vt musculi abdominis deprimunt, erit duplex instar musculorum abdominis. Nam demonstrat *Galenus*, in expiratione Thoracem pondere suo deiedere, ac proinde non indigere musculis. 9. Nec melior est consequentia de Triangulari musculo: nam licet in origine simplex appareat, in finibus inferiorum costarum in duas partes manifestè distinctus est, quamuis Diaphragma in alterutro latere lædatur, propter eius amplitudinem, & vasorum duplicitem, quæ per totum musculum excutunt. In Hemiplegia resolut non potest: sic videmus in eodem affectu linguam aliquatenus oblesam, adhuc distinctè loqui. *Galenus lib. 1. Admin. Anat.* scribit motuum similitudinem notam esse sufficientem, quæ sùdem facit vnicum esse musculum. Diaphragmatis actio vniiformis, à primo vitæ ortu vsque ad extremum spiritum indefinenter ritu pulmonum procedens, huius corporis simplicitatem atque vnitatem manifestè ostendit.

Quum igitur Diaphragma vnico sit Musculus, Capite & fine constat. *Vbi Caput & Caudam* assignare liceat, controvertitur. *Galenus* de Ortu & Insertione Diaphragmatis valde incertus est, modò in ambitu costarum collocat: inodò in centro, nunc à lumbis emergere scribit, nunc à cartilagine Xiphoide. Tradit *Hippocrates*, *lib. 1. de Opium natura*, Septum Transuersum iuxta vertebra infra costas, prope renem exurgere. Hoc confirmat *libro de corporum refectione*: à spina retrò Hepar Diaphragma productum est. *Galenus, lib. 5. Admin. Anat.* quæ postremi sunt Anatomici labores, quibus vt omnibus Medicinæ libris posterioribus acquiescendum, à spinæ vertebri deducit. *Columbus* huic opinioni subscribit, quæ duabus rationibus stabiliri potest. Omnis musculus rei fixæ & immobili niti ac firmari debet, ipsæ Costæ, à quibus Rectus & Obliquus descendens exoriantur, sunt mobiles, dum abdomen comprimunt musculi agitantur. Nec inseruiunt deprimendo Thoraci, cum sponte sua deeidat, nullusque musculus expirationis opifex existat, vt doctè animaduertit *Galenus*.

Præterea, Obliquus Diaphragmatis situs manifestè docet hanc originem. Nam aponeuroses carnez & tendinosæ quas è directo costarum, nimirum vndecimæ vertebrae Costis oppositæ connecti oportebat, ad tertiam & quartam lumborum vertebra descendunt, ibi tenaciter affixæ, quæ sternum molle cum cartilaginosis Costarum extremitatibus deprimunt, vt latera sub Collis ampliora reddant, quemadmodum in circulo dolij dum supernè deprimuntur, eius latera ampliora sunt.

*Fernellus* Diaphragmatis Caput in Costarum extremis collocat. Finem in media parte neruosa tendoni similis. Eandem opinionem sequuntur *Fallopium, Piccolomini, Laurentius & Mercatus Hispanus*, qui iisdem rationibus vitur, quibus *Laurentius*. Quod si à circumferentia nascitur, centrum attrahet, at illa distensio non potest non esse dolorifica: Deinde si centrum attrahitur, dum agit, eiusque actio ad Costas mouendas referatur, à quibus nasci dicitur: Tendo & Caput simul eodem tempore mouebuntur, quod est absurdum. *Sylvius* Diaphragmatis Caput in medio

ponit, Finem in circuitu Costarum, cui *Vesalus* ad stipulatur, & quamvis in circulo neque sit principium, neque finis, ex *Hippocrate*, centrum tamen cui pes alter circini stat, dum alter circumfertur, pro principio accipi potest.

Opinio *Fabricij ab Aquapendente* talis est. Origo Diaphragmatis in centro & apophyibus carnosus ad lumbos, Infectio & Finis ad Costas. Tenditur in inspiratione, & ex curvitate ad planitiem accedit, tumque trahit Nothas Costas deorsum, quæ sunt separatæ à veris Costis. Thorax verò dilatatur sursum, dum angustatur deorsum.

Situs Diaphragmatis in Homine magis est obliquus, quàm in brutis, nam vnde decimæ vertebrae in brutis adnectitur, sed in Homine ad lumbares vertebrae, imo vique ad Os sacrum per suas appendices carnosas progreditur.

Maiores quæstio exurgit de specie & qualitate motus in Diaphragmate. An fluxus & Refluxus moueatur, vt ventrem inferiorem flabelli instar euentilet: An sui Dilatatione, & Contractione. *Vesalus* fatetur Diaphragmatis officium quo Thoracem mouet, obscuro esse. Neque fatiscio, *inquit*, an quispiam verè id scriptum posteris reliquerit, aut etiam illud condignè tradere aggressus sit. Fluxum & Refluxum Diaphragmatis prohibet Mediastini colligatio, quæ suspensum tenetur, ergo sese dilatando & contrahendo mouetur, vt omnes admittunt Anatomici: & *Galenus* declarauit motum Diaphragmatis, *lib. 1. de motu Muscularum*. Musculus animotum habet contractis crumenis similem, cui simile est Septum Transuersum per contractionem, nisi quod perforatum non est. Quæritur nunc si Dilatio, siue Relaxatio, & Contractio proprii sint motus Diaphragmatis, vt systole & diastole in Corde, quorum vnus exstat per se, alter per accidens, quoniam cuiusque musculi vnicus est motus per se, nempe contractio, alter per accidens, videlicet relaxatio, quando oppositus agit musculus: sed Diaphragma non habet oppositum musculus, ergo duplices sunt & essentialis Diaphragmatis motus, Relaxatio, & Contractio, quibus quies interiecta est. Geminus autem hic motus, Respirationis partibus, nempe inspirationi & expirationi respondere debet, cum ipsum Diaphragma sit instrumentum liberæ & placidæ respirationis, ergo Diaphragmatis motus erit duplex.

Nunc in qua parte respirationis agat Diaphragma inquirendum. Magna pars Anatomicorum, vt *Piscoluminus*, *Laurentius* statuunt Diaphragma contrahi in expiratione, relaxari in inspiratione, quamvis *Galenus* hac in re dubius sit & incertus, si libera respiratio violentæ sit proportionata, quemadmodum violenta inspiratio sit ascensu Thoracis, exspiratio descensu; pariter in libera inspiratione attolletur Diaphragma, in expiratione deprimetur. Quod verò animali mortuo Diaphragma superne contractum appareat, non demonstrat vitam expiratione cessare, ac proinde supernè reuulsum apparere Septum Transuersum, quia hæc naturalis est figura Diaphragmatis, propter Mediastini copulationem.

Sæpius in sectionibus viuorum animalium deprehendi Septum in inspiratione contrahi, collectà & in sese contractà versus centrum substantià, & ad rectam lineam adductà, in expiratione relaxari concauumque fieri, quæ figura in mortuis cernitur: forsan tamen hic motus violentus est, atque conuulsus in moribundis animalibus: sed longè differunt inter se libera, & violenta Respiratio. Quippe libera dependet à solo Diaphragmate, ac ferme nullo partium thoracicarum motu aspectabili: pulmo quidem mouetur, sed leniter cum Diaphragmate: At in violenta Respiratione, musculi Intercostales verarum costarum, & qui Thoraci sunt superentis, à collo, capite, & omopla prodeuntes, mouentur violenter ad eleuandum Thoracem. Itaque de his omnibus quæstionibus sic statuo.

Diaphragma esse musculus simplicem in sua specie admirabilè, qui motum habet perpetuū, cum pulmonibus æquali passu incedentem: Orii à vertebrae lumborū vique ad Os Sacrum, & oblique protensum ad omnes nothas costas & sternum connecti. In motu proprio contractū in inspiratione, nothas costas & aliquantisper sternum deorsū trahere, vt hypochondria ampliora reddantur, & flabelli instar adducatur Diaphragma, naturaliter supernè reuulsum ob adhæSIONem mediastini inferne reuulsū, postea rēdire ad naturalem figuram, propter nexum mediastini, vt euentilet partes internas Thoracis instar flabelli, sicque leui fluxu, siue descensu inspirando, & refluxu, siue ascensu expirando euentilat vitæque cavitatem Thoracis & Ventris inferioris.

Quod spectat ad Intercostales Musculos, qui nothas costas intericiunt, & oppositi Diaphragmati, releuant nothas costas, qui veris costas intericiuntur, violentan-

inspirationem cum aliis musculis externis adiuuant: Arque omnes musculi Interco-  
stales, tam interni quàm externi, oriuntur à latere infernæ costæ superioris, & inse-  
runtur in latus supernum inferioris costæ. Exspiratio violenta fit, & per decidentiam  
Thoracis, & per musculos obliquos ascendentes. Eleganter *Galenus*, libro de motu mus-  
culorum, septem dum liberæ inspirationi confert, non habet oppositos musculos, qui  
expirationi inseruiant, quia lentè Thorax decedit: At in efflatione, quæ est violenta  
spiritus expulsio, necessarij sunt musculi oppositi Diaphragmati, quales sunt Inter-  
costales. Interuentu Medastini pulmo alligatus est Diaphragmati quibusdam liga-  
mentis, per quæ sequitur motus etiam pulmonis ad Diaphragmatis motum, inquit  
*Nicolaus de Massa*.

Porro scire perarduum est, unde motus irrequietus Diaphragmatis procedat. An  
sit insitus & congenitus ipsi Diaphragmati? An aliunde fluat, videlicet à Corde cen-  
trum Diaphragmatis feriente, vel à pulmonum amplificatione & contractione. Cre-  
derem motus illos Diaphragmatis pendere à Pulmonibus partem istam agitantibus:  
Dum amplificantur in inspiratione, deorsum impellitur Diaphragma, atque contra-  
hitur: At in expiratione, contractis & compressis Pulmonibus, fuga vacui, & ope  
mediastini, supernè reuellit, & ad suam naturalem figuram accedit. Exissimaret al-  
iquis Diaphragma in expiratione contrahi, hac potissimum inductus ratione, quod  
dum contrahitur, crassius euadit, & tumore suo deorsum pellit. Quare si Musculo-  
rum abdominis actionem adiuuat in comprimendo abdomine, necessum est illud se-  
qui actionem Musculorum abdominis. At illi comprimunt abdomen in expiratione.  
Ergo mouebitur in expiratione. Respondeo, ut respiratio Libera est, aut Violenta, sic  
duplex actio Diaphragmatis, Libera vel Violenta: In libera respiratione dum moue-  
tur, tum liberè inspirando leuiter contrahitur, & laxatur in expiratione. Sed in respi-  
ratione violenta, dum sequitur motus Obliquorum Ascendentium, & Transuerso-  
rum Musculorum, qui ei sub nothis Costis adherent, tum in expiratione Violenta  
contrahitur, quoniam ad id cogitur ab illis Musculis, quorum actiones sequitur. No-  
tabis in ista compressione abdominis, quæ videtur fieri in expiratione, non solum mu-  
sculi inferiores abdominis agunt, sed etiam laryngis, ideoque, quàm alij putant ex-  
pirationem inspiratio est, quia musculi laryngis, & potissimum Arytænoidei licet exi-  
gui, illis maioribus musculis obstant, ex *Galeno*, dum viam spiritui egressuro Inter-  
cipiunt, sicque aliquantum manet tensum Diaphragma in suo tonico motu, agentibus  
musculis abdominis, & dilatato Thorace, ex amplificatione pulmonum, qui con-  
hibito spiritu distenduntur: Vbi verò referatur via spiritui, aperta Arytænoide, tum  
relaxantur Diaphragma, & musculi abdominis. *Aurelius Senerius Chirurgus & Anato-  
micus Neapolitanus*, in consilio quodam pro abscessu: Ad regionem Hepatis demonstrat dari  
viam manifestam expurgandi pulmones & thoracè, præter ramos illos & inutiles  
ad hoc officium, nempe in sinistro latere Diaphragmatis iuxta centrum neueum re-  
periri laxitatem quandam. In illa, substantia est carnea, quam perreptant venæ phreni-  
cæ, quæ ebibunt serosos humores, vel crassos & purulentos in cavitare thoracis con-  
clusos. Id pluribus demonstrat. Vide locum, & hoc inuentum examinabis.

## DE PLEURA.

### CAPIT V.



**D**E PRædITO Diaphragmate vndique resectum Sternum extrahes, vt  
omnia quæ Thorax includit, ordine depromi spectarique possint. De  
Costis & Sterno hic non agitur, quia pertinent ad *Osteologiam*. Neque  
de Musculis, ne longior sit expositio & indagatio vitalium viscerum,  
quæ inter moras corrumperentur. De his in *vniversali Systeme* tra-  
ctabitur.

Ut Costæ extrinsecus Musculis operiuntur, sic Intrinsecus membranâ proximè  
continguntur, quæ à *rabius* nomen Pleoræ accepit, & *rabius* quasi *rabies*, à *rabio* quod  
est spiro. Nec tantum Costas succingit, sed vnioersam Thoracis capacitatem supernè  
& infernè continuitate sua concludit, vt Peritonæum ventris inferioris omnes partes  
succingit.

Pleuræ substantia nervosa est, Peritonæo similis, & si credimus Recentioribus Anatomicis, robore & crassitie validior, ut Costis duris atque Pulmonibus mollioribus esset interiecta, quod falsum conuincit *anatomia*. ipsiusque Pleuræ contractio. Durior enim ac robustior est Peritonæi membrana, ut Intestinorum pondus gestaret, atque ut Peritonæum duplex existit, sic Pleuram geminam esse volunt, quia circa dorsū vertebras conspicuè duplicata apparet. *Lib. de Constit. artis*, Pleuram duplicem facit *Galenus*, & *lib. de laxis affectibus*. *Columbus* cum reliquis Anatomicorum turba præter illas duas tunicas Pleuræ, periostrium etiam adiunxit, quod verum est. Sed istam duplicitem Pleuræ aliter accipio, quia membrana tenuissima Musculos Intercostrales contegit foras, quemadmodum altera Costis subtenfa est, ita duplex assignari potest Pleura. Præterea Costæ suam habent periostrium innumeris venulis conspersum. *Sylvius* Tunicam Subcostalem geminam facit, sed diuerso sensu, quoniam vna est dextra, altera sinistra, & vtraque ad Sternum deducta, non coheret, sed reflexa Mediastinum efformat. Obseruatum fuit in pleuriticis post mortem apertis, Pleuram adeo intumescere, ut decuplo solito sit crassior, & propter *visum* huius Membranæ, Costæ liuent: propterea scripsit *Hippocrates*, cadauera Pleuriticorum dissecta apparere fulgurita, quod de partibus internis Thoracis est intelligendum: interdum ex Pleura modò in hoc, modò in illo latere, sed frequentius in sinistro, nervæ quædam fibræ expullulant, quarum interuentu Pulmo Pleuræ etiam in sanis adstringitur, vnde fit, ut simul & semel Peripneumonia & Pleuritis exuriantur, *Pleurapneumonia* affectuum illa combinatio nominatur, quod ante *Vincetium Barpentum*, *Medicum Italum*, exposueram.

Ineptum est disputare, vnde nascatur Pleura, an à prima conformatione, vel à meningum propagatione. *Galenus* partium firmiores adhesionēs exortus appellare consuevit, quare cum vertebris dorū firmiter adnectatur, ab his enasci probabile est. *Herodotus*, in libro cui nomen est *Medicus*, Subcostalem, & Peritonæum à Pericranio produci affirmat, quod scilicet per colli spondylos ad dorsū & lumborum Vertebras protensum, in Thoracis Subcostalem tunicam producit, in abdomine Peritonæum. Nec absurdum, quod *Theophilus Protospatharius*, in Epitome librorum *Galenus* de *usu partium* prodidit. Quemadmodum totum hominis corpus communis Membrana, nimirum cutis suecingit, ita intrinsecus Membrana quædam omnia animalis Membra oblinet & obducit, quæ ab imo ventre ad caput continuatur, communi nomine *cutis interna* vocatur. Verumtamen pro varietate locorum diuersa fortitur nomina, infra Scipium Peritonæum, supra Pleura, seu Suecingens Membrana dicitur: in Capite Meninx.

Pleura non alio modo conspicitur, quàm digitis distracta, & euulsa à Costis, tumque Intercostralia Vasa, venæ, arteriæ, & nervus intra Costarum spatia apparent. Pleuram quoque obseruabis superiorem Diaphragmatis faciem obducere.

## DE MEDIASTINO.

### CAPVT VI.



**P**LEURA cum ad Sternum usque peruenit, laterum concursu duplex facta, in dorsū spinam rectā delabitur. Ista reduplicatæ Pleuræ reflexio, *Mediastinum* nuncupatur, à medio dictum, quod in medio Thoracis consistat, & forsitan *pericardium* apud *Aristotelem*, *lib. 1. de hist. anim.* vocatur, aut mendum est in textu. Nam nisi Mediastinum intelligatur, extra locum proprium interruit hoc nomen à *pericardium*, cum agit de Corde: Scribit adnatum esse magnæ Venæ, iuxta magnam cauitatem *venæ* *lib. 1. de pericardio* *lib. 1. de pericardio* *lib. 1. de pericardio*. At paulò supra, cum agebat de ventre inferiore, Mesenterium dixit venas habere à Vena magna, & arterias ab Aorta. *Sylvius* *Podius* Pericardium accipit pro Mediastino, aut mendum est in textu: namque à *pericardium* *lib. 1. de pericardio* *lib. 1. de pericardio* *lib. 1. de pericardio*. Ac sanè Pericardium nihil est aliud quàm Mediastinum, à quo non potest separari: apud Latinos *Mediastinum* dicitur, quia in medio stat, & appositè respondet nomini, à *pericardium*.



Geminata hæc Membrana sibi mutuo non est appressa & agglutinata, sed alibi quatuor aut quinque, alibi duorum digitorum latitudine difuncta, vt continendo Cordi spatium relinquat. Extra Cordis situm, interuallum illud non est vacuum & inane, sed nervosis filamentis intertextum, quod homini soli proprium est. Id spatium inane factum est, vt sonus tanquam ex Echo vicina intensior esset. Vnde in statuosis corporibus & melancholicis, quibus Omenti duplicatura statu distenditur, & obmurmurat, etiam Thorax ratione huius cavitatis statu differtæ resonare potest, ita vt fiant simul *murmur*, qui sunt *isomurmur*, de quibus supra in Omento dictum est. *Galenus, li. 2. de Placitis, c. 7.* mentionem facit huius cavitatis, quam vocat *πύλον δι' ἧς περὶ τὸν θυμὸν ἔστιν ὁ πύλος* & c.

Tam latè patet Mediastini Cautitas, quam latum est ipsum Sternum, eamque detegi & manifestari docet *Galenus*, si os Xiphoides euellatur. In hac parte vulnus inflitum extra Cor non est adeo periculofum, vt in aliis partibus Thoracis, quod ex eo dignoscet, si sanguis paucus effluat, nec spiritus egrediatur: potest etiam vulnus istud sordidum iniectionibus tutò elui & abstergeri, quod breui perfunatur: Vidit etiam *Carpus* fistulas in hac cavitare quæ admitterebant ad minus vncias quatuor lotionis exsiccantis. Etenim in eo spatio interdum humor præter naturam colligitur, qui tractu temporis putrescens educi debet perforato Sterno, vt notauit *Columbus*, quem immerito reprehendit *Pareus*. *Galenus* tamen perforauit Sternum in seruo *Maralli Mimographi*, deprehenditque Pericardium Sterno adhærent. Et quando in hydrope pulmonum *Hippocrates*, libro de internis affectionibus, costam trepano perforat, forsan hunc locum intelligit, & sterni partem accipit pro costa.

Comparatum est Mediastinum ad Cordis suspensionem, & Thoracis diuisionem in duas capacitates, vt vnâ læsâ altera incolumis persistat, & ad suspensionem Diaphragmatis, quod nexu Mediastini supernè reuellit & sustinetur, alioquin pondere viscerum ab eo dependentium aggrauaretur in homine recto: Nam in brutis animantibus, quæ prona terram spectant, non est adeo validum Mediastinum, nec ea cavitare præditum vt in homine.

Intræ vsus Mediastini hic non postremus est censendus, videlicet Naturam sic extruxisse Mediastinû, vt Cordis motus nobis significaret, cum pectus ferit: alioquin nisi hoc discrimine Mediastini difuncti fuissent lobi pulmonum, in dilatatione Thoracis expansi, totum Cor ambitu suo inuoluerent & opprimerent: ideoque cavitatis duplicata Mediastino interiecta, non tantum ad resonitum comparata foit, verumctiam vt spatium agitato Cordi relinqueret, dum ad anteriora pectoris exurgit. Venas habet & arterias, à Mammariis sui generis.

Insuper in homine venam recipit insignem Mediastinam, quæ extrinsecus secundum Mediastini longitudinem excurrit ad Diaphragma. Per internum Mediastini spatium nervos Diaphragmaticos repentes inuestigabis, & intra eandem duplicaturam infra Cor, iuxta dorsum nervos Stomachicos reperies, qui sub vasis Cordis plezum nervorum admirabilem constituunt, qui non ab intercostalibus nervis efformantur, vt imaginantur omnes Anatomici.

## DE PERICARDIO.

### CAPVT VII.



EDIASTINVM ordine sequitur Pericardium, capsula & inuolutum Cordis: siæto nomine cordituum vocat *Γαζα*, *Hipp. lib. de Cordis, c. 1.* Vagina dicitur. *Aristoteli*, *ἡ δὲ αὐτὴ τῆς καρδίας*. *Galeno* *χώρα τῆς καρδίας*, vel *χώρα διεισδυτική*. De quo duo quæri & proponi solent ab Anatomicis, vnde producat, & quo sine constructum fuerit.

De origine inter se discrepantes sunt Anatomici. *Galenus lib. 7. administ. anat.* ex vasis Cor subcumbibus nasci scribit, apertius *Vesalius* ex tunica comuni vasorum Cordis pleuritica: *Columbus* à Mediastino deriuat: vtraque opinio verissima est, & conciliari potest ex *Syluio*. Pericardium duplici constat tunica, exterior soboles est Mediastini, interior producit à tunica vasorum Cordis. Nam intra Pericardium vasa Cordis hac communi tunica destituuntur, quoniam absumpta foit in conformationem Pericardij. Quando scribit *Aristoteles*, libro de historia animalium, cap. 17. Cor

membranam habere pingue & crassam, ea parte quâ vena magna & Aorta Cordi adnascuntur, forsan non Pericardiû, sed propriam Cordis membranam intelligit. Antale Pericardium brutorum pingue crassum? Non est verisimile membranam Pericardion durissimam & robustissimam villis carere, quamvis id statuât *Sylvius*, ex mente *Galenus*. Quam *Ruffus Ephesus* Pericardium motu à Corde transfulso palpitare scripsit, intelligere oportet de motu secundario, cum à Corde impellitur & agitur.

In Pericardij structura solum hominem hoc habere peculiare scripsit *Vesalius*, quod centro Diaphragmatis nervo adhæreat, cum tamen in bobus id observaverim. Hæc quidem colligatio in omnibus hominibus reperitur, licet *Sylvius* in *Isagoge Anatomica*, Pericardiû Phrenas non attingere assuecet, in iis quibus Thorax est longior, Sternisque septem ossibus compactum. Istam etiam adhæSIONem notavit *Anonymus Grecus*.

Cur ista colligatio Pericardij cum Diaphragmate facta fuerit, hanc ratione reddit *Sylvius*, ut nimirum Venæ Cavae truncus ascendens minore spatio intra Pericardiû traduceretur ad securitatem: contrâ in brutis, Pericardio & Diaphragmati interiectus est quintus Pulmonum lobus, qui instar pulvinaris fulci t, & sustentat Venam Cava: sed quintus ille Pulmonum lobus etiam in hominibus quibuldam reperitur, ergo alterius finis causâ hæc coherencia facta fuit, vel ad dilatationem Pericardij, ut amplius spatium relinquatur Cordi ad se dilatandum. Propterea Pericardij adhæsiO ad centrû nervo cum Diaphragmatis latissima est, ut motus Cordis ad centrû Diaphragmatis dirigeretur, atque eo sine adnexum esse Pericardium existimo, quod etiam Sterno circa septimam & octavam costas pectori adstringitur, ex opinione *Galenus*.

Id in Anatomis viuentium animalium facile est explorare, si Diaphragma in circuitu rescindatur, nondum resecto & sublato Sterno. Vnde fit, ut Cor partes duas percutiat, eono suo Diaphragma, basi sua cum eminente portione Aortæ pectus. Quare prudenter notavit *Galenus*, lib. 6. de usu part. cap. 18. Pericardium tunice vsum non præstare Cordi, quia disunctum ab eo: domicilium Cordis potius, vel securum vallum Cordi circumiectum appellatur, quàm tunica. Præterea setosum humorem continet ad Cordis humectationem.

*Galenus* lib. 3. de locis affectibus, cap. 2. Pericardium inter partes Cordis ignobiles nometat, eoque læso nullum imminere periculum, nisi ad Cor transcurrat affectio. Verum tamen, ipsemet tabem ex tumore Pericardij exortam vidit in sua simia. Similem morbum in multis observavit *Salus*, lib. de raris affectibus, eiusque morbi signa proponit. *Columbus*, in sua Anatomie, ex defectu Pericardij quendam vidit immaturè diem suum obiisse, cerebrâ dum viveret syncope diuexatum.

Nemo dubitat in mortuis intra Pericardium setosum humorem contineri, in quibusdam largiorem, in aliis paucior. Communiter tamen mulieres viris copiosiorrem habent, teste *Vesalio*, & in senibus vberiorrem quàm in iuuenibus observavi. Colore similis est tenui vrinæ; sed quæstio est, si in viuentibus reperitur. *Matthæus Curtius*, commentario in Anatomem Mundini, negat aquam contineri in Pericardio viuentium, quoniam hæc tunica non est maior, quàm ut possit continere Cor dilatatum, quomodo poterit & Cor & aqua simul continere? Præterea humectatio Cordis melior erit ex pinguedine Cordi circumfusa, quàm ex illa aqua, quam tamen in mortuis inueniri fatetur, ut in ventriculis Cerebri. *Vesalius* incertus est, si aqua in Pericardio viuentiû, ut mortuorum reperitur. Tandem admittit paucissimam in viuentibus adesse. *Thomas à Vega*, comment. in lib. 5. Gal. de locis affectibus extincto animali enasci scribit.

Contrâ, Recentiores Anatomici, *Fallapius*, *Columbus*, *Piscioleminus*, *Laurentius*, humorem intra Pericardium viuentium reperiri sustinent, idque probatur autoritate *Hippocratis*, lib. de Corde. Adest in ipsa tunica humor modicus veluti vrina, ut videatur Cor in vesica diuersari. *Nicolaus Massa* contendit istam aquam in capsula Cordis viuentiû animalium semper reperiri, quæ fit ex colamento sanguinis venientis ab Hepate ad auriculam Cordis, per viam refudationis continuæ. *Galenus* nullam istius humoris mentionem fecit lib. de usu partium, sed lib. 5. de locis affectibus, cap. 2. notat se in Anatomis animalium sæpe vidisse in Pericardio humorem capiosum vrinæ similem. De hoc loco *Galenus*, vide *Glandinum* in epistolis. Attamen ipse *Galenus*, ab exundante sero intra Pericardium Cordis palitationem excitari prodidit: sæpius in dissectione viuentium animalium, ut canum & ouium, aquam intra Pericardium inueni, atque etiam in foetibus observari, teste *Corpo*, & nimirum id verum deprehendi, & *Bellinus* in Pericardio viuentium piscium observauit.

Nunc vnde generetur hic humor inquirendum. Tres super ea re video sententias: *Hippocrates* ex portione potus illabentis in pulmones, & ab his in Pericardij cavitatē confluentis gigni statuit. Alij ex sero vasorum Cordis exuberante, & per diapedesin exudante. Argumento quod palpitatio Cordis inde nata, venæ sectione percuratur. Vel istud serum, est excrementum nutriti Cordis. Nam ob ingentem feruorem pluri alimento indiget, & quemadmodum ex ligno viridi accenso & viente liquor exillat, ita & Corde natui coloris foco humor ille aqueus exprimitur. Alij putant ex vaporibus æstuantis Cordis, frigore, vel potius densitate membranarum pericardij concretis produci, non secus ac vapores in alembico sublimati aqueſcunt: vel in ollis ad ignem positis videmus coire guttas in operculis. Hunc humorem assidue generari & consumi facile probatur ex *Hipp.* humorem Cor emingit bibendo, ipsum assumens & absumens, Pulmonis nimirum potum lambens. Id etiam exemplis confirmari potest.

In quibusdam fissum aut erolum Pericardium coaluit, ægris postea feliciter viuentibus, vt demonstrat exemplum serui *Marulli Mimographi*, apud *Galenum*, & exempla duo apud *Beniuenum*, ergo aquant illam regenerari oportuit, si aliquem vsum vitæ præstat, & ad Cordis conseruationem necessaria existit. Quod si crassa & viscida fuerit, eius crassamentum in pilos conuertitur. Vnde Cor pilosum in quibusdam obseruatum fuit. Cor autem motu continuo & propria natura calidissimū, hanc aquam obtinuit, vt in ea assidue veluti balneo temperatum maderet, quò floridum & vegetum conseruaretur. Vnde quibus per ardentis febres, vel in edias, vigilias, & ingētes mœrores exhausta est, tabidi pereunt. Vidi in cadauere Illustrissimi Cancellarij *Dom. de Sillery*, post obitum ad pollinēturam exenterato, Pericardium siccum, aquā illā per morbum dysentericum decem dierum exhaustā: nec tamen Cor torrefactū exaruerat, sed erat mollius & staccidius quā par erat. Testatur *Melanchon*, Casimiro Marchioni Brandenburgico, ob mœrores & vigilias, eo humore consumptō & exsiccatō, Cor dissectum pyri toſti faciem representasse. *Galenus* simia quæ tabida mortua est, sine hoc humore reperta fuit. Vidit *Iessenius à Iessen*, in febre ardenti aquam Pericardij consumptam. *Casp. Hofmannus* censet hanc aquam esse stimulum caloris, vt enim fabri ferrarij non solibus tantum virgent ignem suum, sed & aspersā aquā. Ita hic quoque accendit Cordis calorem: quis enim dubitat aquam igni amicam esse? non quia humida est, sed quia frigida, hac enim qualitate iuuat motum eius deorsum: est autem motus hic alimentum, quo pertinet illa *Philosophi sententia*, lib. 2. de *Anima*, cap. 4. aquam esse ignis alimentum.

Cum igitur paucus humor in viuentibus intra Pericardium contineatur, miraculosum est, & præter naturæ legem, quod ex latere nostri *Saluatoris* lancea perfoſso, illico sanguis & aqua effluxerint. *D. Ioannes Euangelista* latus non exprimit. At *Textus Arabicus codicis Euangelij Roma excuſi*, dextrum latus designauit, vt miraculi magnitudinem designaret, quam significare voluit sanctus Euangelista, testis oculatus, quando ter geminatam hanc assertionem apposuit, *Et qui vidit testimonium perhibuit, & verum est testimonium eius, & ille ſcit, quia vera dicit, ut & vos credatis*, quod in conprobando vilo, quantumuis maximo etiam miraculo, in tota scriptura similiter scriptum, non inuenitur. *Chiffletius*, lib. de *litteris sepulchralibus Christi*, cap. 32. probat ex *Syndone Taurinensi*, & *Sudario Vefuntino*, aliisque auctoritatibus, Christi latus dextrum lancea perfoſsum fuisse. Propterea doctē *Carpus comment. in Mundini Anatomen*, docet aquam quæ effluxit è latere Seruatoris nostri miraculosam fuisse, & è dextro latere proſiliſſe. Ideoque *Laurentius* imperit, ne dicam impiè, è capsulā Cordis effluxiſſe scripsit. Istū errorem hauit ex *Rondeletio*, doctore *Manspeliensi*, trall. de morbis *diagnoscendis*. Si serum vnā cum sanguine per vulnus redditum sit, Pericardium vulneratum significat, vt in Christo apparuit, cui, cum lanceā latus perforatum eſſet, fluxit sanguis & aqua, quod certissimè significauit Christum, verum hominē, & in cruce mortuum fuisse. Istam miraculosam aquā doctē & copiose demonstrat *Franciscus Collins*, libro de sanguine Christi.

Nonnunquam etiam in Thoracis capacitate ad feruorem Pulmonis contemperandū aqua parum cruenta reperitur, quæ per diapedesin roris modo è vasis exudat, partim è portuicula potus in Thoracem trans Pulmones illapſa colligitur. Porrò, cōm sit Pericardium sterno affixum, iuxta costas veras sextam & septimam, si quando Pericardium turgescens, & distentum sero plurimo, assiduam palpitationem & præfocationem inferat, nullis remediis vacuantibus, tam per venæ sectionem, quā per purgationem vsurpatis curabilem, quidni ad locum adhesionis Pericardij sterno pyroti-

cum efcharoticum apprimetur, atq. tenuiffima terebra fenfim pertunderetur, vt inclinato & prono corpore illius aquæ stagnantis portio exhauriatur, quæ certum exitium ægrotanti minatur, & intentat? Situs Pericardij ex Anatome facilitatem & fecuritate huius remedij demonftrat.

## DE VENA CAVA ASCENDENTE

per Thoracem.

CAPUT VIII.



**R**IPLEX Vasorum genus in Thorace continetur, quæ prius inquirenda & obseruanda, quàm ad Cor & Pulmones deueniatur: sunt autem Venæ, Arteriæ, Nervi, quæ hoc ordine inuestiganda sunt. Ascendens vena Cava iuxta Diaphragma intra Ventrem, duas venas Phrenicas emittit in Diaphragma. Iplum tenero circumuectu lambentes, vt plurimum Dextra perrepat Diaphragma, Sinistra Pericardium cingit: à Cava iuxta Diaphragma intra Thoracem. Interpretes *Auicenna Cassius, & Mongius lib. 3. Fen. 10. tract. 6. cap. 1.* narrant *Nicolaum Sammelium, Neocomensem, peritissimum Anatomicum, & alios*, in cadaueribus quibusdam obseruasse Ramulum insignem ad Pulmones ductum, per quem vomica Pulmonum expurgari putant. Quem etiam ab *Aquapendente* animaduersum & demonstratum nonnulli referunt, sed ista noua sunt, & lusus naturæ si recipiantur, nec vllus furculus è Cava potest emergere, nisi supra Pericardium, quia truncus est inclusus Pericardio. *Baubin*us verò in *Theatro Anatomico secunda editio*ne, scribit se in cadauere virili obseruasse ramum insignem ab arteria venosa ventriculorum sinistrum Cordis egressa, qui supra Pulmonem sinistrum ferebatur, & reflexus secundum Arteriæ magnæ latus sinistrum, descendens sub Diaphragmate in Emulgentem inferebatur: Quod si verum est, & in multis Cadaueribus obseruatur, hac viâ poterit Pulmonis vomica per vrinas euacuari.

Priusquam ad Cor venias, diligenter velim obseruari sanguinem exilire ab Hepate per eius fastigium, seu caput, quod est situm iuxta Diaphragma, & cum locum duobus tantum digitis distare à Corde. Inde *Peripatetici* captarent aliquid, quod eorum faueret opinioni. *Hippocrates libro de morbo sacro*, pituitam ad dexteras partes magis vergere ac defluere, quàm ad sinistras scribit, quia venæ sunt cauiore & plures, quàm in sinistris, quod non obseruatur, ne dicam falsum, quia verumque latus consimile.

Cava perforato Diaphragmate sese insinuat in Pericardium, quo disrupto & lacerato, videbis Coronariam Venam, quæ instar coronæ Cor circumdat, orificio suo præpositam habet membranulam instar valvulæ, ne Cordis assiduo motu sanguis in cauam remigret: Mox trunci latus sinistrum Cordi adaperitur, vt in dextrum eius ventriculum sanguinem euomat.

Supra Pericardium euectus producit Azygon solitariam venam, coniuge destitutam; de qua non conuenit inter veteres & recentiores Anatomicos. *Vesalius* reprehendit *Galenum*, quod scripserit eam venam infra Cor nasci, cum in hominibus & brutis semper obseruata fuerit supra Cor emergere. *Fernelius* venam solitariam Azygon paulò supra Cordis aurem dextram emergere scribit, quam tamen nonnullæ corporum diffinitiones ostendunt à Cava deriuari, antequam ad Cor accedat. *Sylvius* fatetur in nostris corporibus ob Sterni & Thoracis breuitatem, supra Cor & Pericardium urari. At temporibus *Galen*i sub Corde obseruatam fuisse, in his quibus Sternū septem ossibus compactum, Thoracem facit longiorem. Sed aduersus *Sylvium*, locum *Galen*i opponerem, lib. quod optimus Medicus sit Philosophus, suis temporibus eandem fuisse mundi & hominis structuram, quæ fuit tempore *Hippocrati*s.

*Non alios prima crescentis origine mundi*

*Illuxisse dies, aliumve habuisse tenorem.*

*Crediderim, &c.*

ex Virgilio.

*Bartholomæus Eustachius, Romanus Anatomicus, libro de vena Azygo*, meliores rationes produxit ad defensionem *Galen*i. Etenim præter varias Exemplaris Græci correctiones quas profert, illud Achilleum argumentum adducit contra *Vesali*um, qui variis in locis *Galen*i sententiam veluti ridiculam explodit & expungit. Passim *Galen*us scripsit octo collarum spatia venam Azygon nutrire. At Vena Cava è regione

oſtauz Coſtæ Cordi iungitur, ergo non potuit ſtatuerè *Galenus* hanc venam infra Cor enaſci. Si quidem *lib. 7. Admin. Anat.* affirmat Azygon perpetuò quintam dorſi vertebram conſcendere, quæ eſt ſupra Cor: adde quod in omnibus animalibus non eſt ſimilis exortus huius venæ: in quo, è regione mediæ baſis Cordis, in ſuiſus, bobus & capris, infra Cor emergit, ſcilicet infra auriculam dextram. Quare falſus eſt *Veſalius*, cùm in homine cæteriſque animantibus, Venam Azygon ſupra Cor emicare prodidit. Communiter autem in homine ſupra Cor, Azygos, inter quartam & quintam Thoracis vertebram ex inferiore ſede Venæ Cauæ nalcitur; mox deorſum reflexa deſcendendo, in dextrum latus magis inclinatur quàm ſiniſtrum, ſed circa octauam & nonam vertebram dorſi, planè in medio ſpinæ poſita eſt. In ouibus tamùm à ſiniſtro Cauæ oritur, & per ſiniſtram Thoracis cavitatem deſcendit, quod fuit à *Galenus* animaduertum, *lib. 7. Admin. Anat.* In bobus, ſuiſus & capris gemina ſemper adeſt, quælibet ſui lateris coſtas irrigans. Interdum in homine duplex obſeruata fuit, quod eſt rariffimum, & ſemel in Fœtu humano à me, bis rerve in viro & muliere, ſine vlla communicatione cum Caua deprehenſum. Quàdo ſolitaria eſt, rotidem ramulos ſiniſtris coſtis arque dextris tribuit. Atramen ſiniſtri non ſunt ita magni ac euidentis vt dextri.

Cùm verò Truncus huius venæ ad nonam vel decimam Thoracis vertebram peruenit, in duos ramos ſcinditur; qui ſecundum ſpinæ longitudinem repentes, vel in emulgentem ſui lateris, vel in truncum venæ Cauæ iuxta emulgentem deſcunt. Vnde quidam colligunt, inchoante pleuritide, ex *Arabum* doctrina, Saphenam vriliter aperiri: in quo morbo vbi plenitudini ſatisfactum fuerit, lumbis etiam cucubitas cruentas affigere proderit.

Interdum accidit proptet hanc anatoſomofim, pus Empyicorum, hoc eſt ſuppurata pleuritidis vomica pet vrinas expurgari. Quoniam Azygos in ventrem viſque decurrit, infermiſque coſtis magna ſui parte diſtribuitur, inde factum eſt, vt *Hippocrates* in pleuritide inferiorum coſtarum, ſotu priùs eliquatà materià catharticum exhibear. Quum autem animaduertet *Veſalius* Azygon è dextro Venæ Cauæ latere proſiliſſe, & deſcendendo dextrorſum magis inclinare quàm ſiniſtorſum: exiſtimauit, & libello edito, ſuſtinuit in pleuritide dextra, ſiue ſiniſtra, ſemper venas cubiti dextri aperendas eſſe. Sed ille nondum adhuc obſeruauerat Anatoſomofes Thoracicæ cuiuſque lateris, cum ramulis Azygæ conſtatas, quas ſenior in *Examine Obſervationum Fallopij* agnoſcit, priùs deſignatas à *Fernelio*. Sic ille.

Quamquam externa & interna pleuritis ſitu diſtent, magna tamen ſocietate inter ſe connexæ ſunt. Ac ſæpe interioris in externam, aut contrà tranſitus eſt, quod, vt in *Anatome* docui, internarum venarum extrema foras emergant, & externarum ora intro ſubeant, ex *Fernelio, Pathologia lib. 5. cap. 11.* quod tamen à *Gordonio* priùs obſeruatum fuerat, in *practica, cap. de Pleuritide*. Pet eas anatoſomofes coniuncta pleuritis materia, ſiue lateri impactus humor exhauritur. Quare iudicio *Hippocrati*, & *Galenis* conſilio, ſemper è directo lateris affectu celebranda venæ ſectio.

Nec tamen quælibet vena promiſcuè ſecanda, ſed putiſſimum Baſilica, è qua producit Thoracica, ſicque *veſ. 11.* celerior euacuatio conſequeretur, vt inſigni hiſtoria docetur in *Enarrationibus eruditiffimi Duretii in Hallerium*. Iſtas autem Anatoſomofes, ramulorum Azygæ cum furculis Thoracicis iunctorum, non per mutuum oſculationem, ſed per approximationem ſiue contactum ramulorum inuenies ſub axillis, ſi curioſè Pectoralem & Serratam minorem anticum omoplatæ euellas, quod adminiſtrabis aperto Thorace, priuſquam truncus Cauæ aſcendenſis depleatur, id etiam confirmatur à *Carcano, libro de Vnione Vaſorum Cordis in ſutu*, & à nobis ſæpius demonſtratum fuit.

Contra communem Anatomicorum opinionem in Azygo Valuulas illas ab *Amato Luſitano Centuria 1. curat. 52.* deſignatas ſæpius obſeruauimus, quamois vt impoſitor ab illis deriſus fuerit. *Hallerius* earum mentionem fecit in ſua *Practica*, ſed *Fallopius* nunquam iſtas Valuulas in hominibus, aut brutis videre potuit. *Bartholomæus Euaſtachi* non putat extare. *Carcanus, libro citato*, nunquam deprehendere potuit, & eas eludit. *Laurentius* fictitias Valuulas, meras nugas, & chimericas appellat.

*Banſinius* omnes falſi ſcribit, qui Valuulas illas admittunt, quas neque in hominibus, neque in brutis vnquam obſeruare potuit, edoctus tamen ex mea *Anthropographia*, non mutauit ſententiam in editione ſecunda *Theatri Anatomici*, ſed memominatum adduxit tanquam propugnatorem Valvulatum *Αζγόν*, nec auſus eſt reſellere.

Forſan, quia monitus fuerat à quibuſdam *Germanis* Medicinæ ſtudioſis, quibus priuatim & publicè id demonſtraueram. *Fabricius ab Aquapendente in ſuo libello de Officulis & Valuulis venaarum*, nullam fecit earum valuularum mentionem.

Ego verò cæteris Anatomicis perſpicacior ac diligentior, vidi quod videre non poterunt. Primuſque, poſt *Amatum Luſitanum*, Valuulas Venæ Azygæ detexi, & in omnibus cadaueribus priuatim ac publicè demonſtrari, atque in Vena Intercoſtali Valuulam adhuc ſæpius obſeruavi. Inter oculos teſtes quos habui multos, producerem *Danielem Bucetium*, *Germanum*, peruiſiſſimum *Anatomicum*, ſi viueret, qui hoc anno 1628. me duo cadauera publicè ſecantem, & demonſtrantem Anatomica, ducentis diſcipulis ſtipatum ſpectauit, & libenter ambas oſtendi, vt ſuæ nationis Anatomicis referre, & teſtari poſſet, inuito *Bauhino*, exire duas Valuulas oſtio 4<sup>te</sup> venæ præfectas.

Sed ab *Amato* diſſentio, in ſitu, & Uſu Valuularum. Nam ipſe foris intrò ſpectare & nutare voluit, vt remeanti ſanguini obſiſterent. Ego verò intrò foras reduci demonſtro, vt impetu aſſuentis ſanguinis ſuſtineant, reſtuenti cedant. Quom natura præuideret incommoda, quæ partibus euenire ſolent ex plenitudine vaſorum, elegans artiſticiſcimus excogitauit. Nam in partibus decliuioribus, & quæ continuò mouentur, vaſorum oriſiciis membranulas appoſuit tanquam repagula, quibus repentinus ſanguis aſſluxus ſiſteretur. Quom igitur Thorax ob reſpirationis neceſſitatem perpetuò moueatur, ne ſanguis in Venam Azygon aſſatim irruens pleuritidem inferret; benigna parens, vt huic incommodo proſpiceret, duas vel tres Valuulas tanquam oſtiola vel repagula in caudice Venæ Azygæ alternatim diſpoſuit. Prima eſt in exortu venæ, duæ aliæ directè oppoſitæ in medio caudice ſunt aſſixæ, aſſatim irruenti ſanguini obſiſtunt, ſed remeanti cedunt. Propterea non impediunt, quominus materia pleuritica ab Azygæ ramis in Cauam reſtuet. Quod ſi vnica tantum adlit Valuula, vt mihi videre contigit, cuiuſmodi corpora pleuriticis affectionibus ſæpiſſimè tentantur.

Sæpius vidi ramulum exiguæ pennæ ſcriptoriæ craſſitie, à dextro ramo Azygæ ad Venam Cauam infra Emulgentem productum, non ad expurgationem puris in Pleuritide per vrinas, quoniam iſta propago infra Emulgentem inferitur in Cauam, & purulentia ſuppuratæ Pleuritidis intra Cauam Thoracis effunditur, ſed ad exhauriendum ſanguinem in trunco & ramis Azygæ, regurgiantem.

Vt hic ramus manifeſtè conſpiciatur, continuitatem venæ Cauæ inferioris non effringes, neque Renes ſuo loco dimouebis. Deim ipſo Diaphragmate inſiſco vel reuulſo, productionem illam Azygæ ſectaberis: Inde cognofceſ quantum viſile in pleuritide, lumbis cucurbitas admouere cruentas, & è pede ſanguinem detrachere inchoante pleuritide. Notauit enim *Hippocrates*, libro primo de morbis, in Pleuriticis affectibus, ſi materia conuertatur ad infernas partes, per venas in Veſicam deriuari, multumque ac bilioſum mectere ægrum.

Quando Azygos ramulos ad Coſtas ſuperiores tranſmitrit, deeſt Intercoſtalis, ſed frequentiuſ ſiniſtra reperitur. Nam duplex eſſe debet Intercoſtalis, quæ in ſpatia trium Coſtarum ſupernarum diſfunditur: Dextra à Trunco, ſiniſtra à Subclauio naſcitur. Solus ex Anatomicis *Sylvius* notauit interdum deeſſe Azygon, cuiuſque locum obtinere infra Cor geminam Intercoſtalem, vtrimque vnâ, quod nondum obſeruavi.

Si quæras, cur Natura in homine vt in brutis alteram venam oppoſitam Azygo non produxerit? illud reſponderi poteſt. Quia non erat idcus capax, idoneus & lecurus ad exortum huius venæ, propter Aortam in eo loco triſidam, quæ & contigua eſt venæ Cauæ, & totam illam ſedem occupat. Nullam creauit Azygon Arteriam Natura, ſed ſecundum ductum Aortæ à iugulo ad Os Sacrum, ab inferiore parte ipſius Aortæ arteriolæ vtrimque in diremptu cuiuſque vertebræ prodeunt, quæ comitantur progreſſum venarum Intercoſtalium ab Azygo prodeuntium.

Truncus Aſcendens Venæ Cauæ hiſ educiſ propaginibus, cùm ad Clauas peruenit, in duos ramos ſcinditur, qui à ſitu quoniam Clauibus ſubieſti, nominantur Subclauij. Ultra Clauas Superclauij: Nam vnus idemque ramus ratione claniculæ ſupra vel infra eam, Superclauius & Subclauius nuncupatur, ſicque interpretandus *Sylvius*, capite de Venis. Priuſquam reſcindas & euellas Sternum, videbis à Subclauio Mammariam duplicem, internam & externam naſci: vtrique per longitudinem ſterni

ad mammas fertur, sed interna grandior, vterius progreditur ad Rectum musculum excurrentem, vt Epigastrica iungatur per anastomosim venæ Mammariæ.

Secabantur ab *Hippocrate*, in partium Thoracicarum inflammationibus & doloribus, vt in pleuride & peripneumonia: nunc verò quia sunt obscuræ, facilius erit applicatio hirudinum, vel cucurbitarum cum scarificatione, vt consulunt *Hippocrates*, & *Trallianus*. Eleuando sternum per partem inferiorem, obseruabis exortum Mammariæ internæ, eiusque progressum secundum longitudinem sterni, & à diremptu venæ Causæ produci exiles venas, Thymicam, Caplularem, & Mediastinam, quæ eadem est cum Caplulari. Sed quatuor insignes venæ à Subclauo ramo prodeunt, prima est anterior Ceuicalis, quæ Mastoideis Musculis supertensa ad mentum ascendit, partes anticas ceruicis irrigans. Huic succedit Iugularis Interna amplior externa, quæ à Subclauo ramo iuxta commissuram clauiculæ cum sterno enata, sub mastoideo musculo collum ascendit. Circa eius medium in tres ramos scinditur, quotum alter crassior & maior vertebra petens, Cranium subit & ingreditur per foramen apophysi Styloidi vicinum, vt lateralibus duræ meningis sinubus applicatus, sanguinem suum effundat, ex vulgari opinione, vel ex doctrina circulationis, recipiat & reuehat sanguinē ad Truncum Venæ Causæ. Sinus non descendit & permeat, sed in ipsorum exordio terminatur. Propterea solus sanguis venosus per eiusmodi canales traducitur. Ac proinde pulsatio sinuum non ab isto sanguine perficitur, sed ab arterioso dependet. Secundus Colli latera perreptat, & sub maxilla distribuitur. Tercius in linguam abit, & ranulares, siue *sublinguales* venas profert, quarum apertionem in affectibus Cerebri mirabiliter prodesse vidi.

Dubitare posset aliquis, an Iugularis vena externa in apoplexia tuto secari queat, digiti distantia infra angulum maxillæ inferioris vbi eminet. Hanc operationem securam & salutarem multis profuisse vidit, & ab aliis accepit *Rossius lib. 6. de partu Casareo*, pag. 430. Notat *Prosser Alpinus, lib. 2. de Medicina Ægyptiorum, cap. 10.* apud Ægyptios Iugulares venas secari, in maximis tum gutturis, tum ceterarum partium respirationi subseruientium inflammationibus, atque tumoribus; maximeque in Angina suffocante. Multo etenim sanguine ex Iugulari secda vena euacuato, multos ferè suffocatos ad vitam rediisse, à multis, atque à me obseruatum est. Neque mirum, si quidem *auctor, lib. de Anat. vniuersam* hæc scriptis reliquit: ex istis sunt duæ Iugulares, quæ minuuntur in principio lepræ, & fortis Anginæ, & angustia anhelitus, & in asthma acuto, & in rauedine vocis, & in apostemate Pulmonis, & in spirandi difficultate, quæ ex multo sanguine fit calido, & ægritudine splenis & laterum. Venæ grandiores quæ assurgunt pone aures, sunt extremitates Iugularium externarum, quas in Cedmatia secare consulit *Hipp. lib. 6. Epid. sect. 5. partic. 22.* An ex illis venis pone aures, quas *Scyphæ* sibi secabant, vt *Asclepiades* curarent, quibus claudi fiebant, & coxæ contrahebantur, tanta sanguinis copia fluebat, vt steriles redderentur, vti narrat *Hippocrates, libro de Arte, Aquis & locis*. Facilius est, & tutior apertio Iugularis externæ ad eum locum, sed parum sanguinis detrahitur, nec tam citò Cerebrum exoneratur, ac si secaretur eadem vena ad angulum basis maxillæ inferioris. Quod si non emineat, eius sectionis loco, vicariæ erunt hirudines ibidem admotæ. *Jacobus Carpus* in Angina suffocante & in Lepra incipiente, Iugulares tuto secari docuit, atque modum eas venas aperiendo docet.

Obiiciet aliquis periculosam esse venarum iugularium apertionem, *Donato Grammatico*, ideo *Lise* dicuntur, quod iis elisis animal statim extinguatur, vnde elisum quidquid ex tali causa mortuum est. *Anuerhois Collectaneorum lib. 2. cap. 29.* percussis Iugularibus mortem inferri scribit, vnde Rex quidam *India*, eius loci percussione reos nobiles interficiebat. Et *Aristoteles, libro tertio de historia animalium, cap. 3.* ait Iugularibus foris tantum apprehensis, corrumpere homines, sensibus ereptis & palpebris compressis: *Galenus lib. 2. de decretis cap. 6.* monet Iugularibus venis & artetiis Carotidibus sectis animal statim perire, ex immodica sanguinis profusione. *Aluarius lib. 3. meth. Med.* Venæ Iugularis sectionem periculosam esse statuit. Idem scribit *Oribasius*. Ac sanè vena Iugularis interna cum sit profunda, & operata musculo mastoideo, nervo sexti paris & Carotidi sociata, non potest sine periculo sociari, neque secari.

At Iugularis externa, quæ in macilentis manifesta est, & leuiter constricto Collo euidenter spectatur, securè tundi potest digiti distantia infra angulum maxillæ in-



ferioris, ubi eminens. Nec leue sperari debet emolumentum ex hoc remedio, quia citissime Cerebrum depletur & exoneratur; id sæpius feliciter administratum fuisse rescitur. *Erditissimus Medicus Parisiensis Remains Moreau Professor Regius, libro de sanguinis missione in Plautide*, testatur se iubente, in vehementissimis & diuturnis capitis doloribus apertas fuisse Iugulares sancto successu. Quod etiam sæpius factum & administratum à *Fabricio Hildano* refertur in suis *Centuriis Chirurgicis*, ut sistatur sanguis convenienti ligatura utendum, parvis & mollissimis asseribus utrimque ad collum applicatis supra iugulum à claviculis ad aures, & à sternum ad mentum.

Hæc autem Iugularis externa digiti latitudine distans ab interna, à Subclauio ramo emergit, & oblique repens sub clavicula, circa eius medietatem furculos infra Clauem emittit, ibique in duos ramos scatur, quorum alter oblique ad Delroidem musculum sub acromio contendit, alter ad capitis posticas affurgit, & supra Collum lateraliter ascendens, ubi ad angulos maxillæ peruenit, bipertitus portione sui in fauces, omnesque partes maxillæ subiectas distribuit, altera portione pone aures traducta in occiput, & in frontem dispergitur supra tempora, ubi eius furculi, tam antici quam postici mutuò occurrentes, inuicem coeunt: inde disces, cur *Hippocrates* in doloribus Capitis, qui frontem obsident, venam occipitis secar, & in occipiti doloribus venam frontis incidit. Atque cum iste ramus Iugularis externæ in faciem, aures, oculos, & frontem expandatur, cognosces, cur pyroticum cauo quod est ad radicem auris appositum magis conferat oculis fluxione laborantibus, quam occipitio admotum: Non quod ex ea parte furculus à vena Iugulari intrò subeat, & ad Opticos nervos utrimque excurrat, ut opinatus est *Fernelius*: Sed propter viæ breuitatem, & ramum venæ Iugularis auribus & oculis communicatum. Notabis etiam Iugularem internam in Collo communicare cum externa. Inter Iugularem internam & externam enascitur Cervicalis interna antica, quæ introrsum penetrans per foramina transuerfarum apophysearum spondylorum cervicis ad Cerebrum ascendit. Ab axillari prope acromium exurgit vena notabilis cervicalis postica externa, quæ partes posticas Colli & capitis perreptat.

Porro venarum tam internarum quam externarum inter se, imò arteriarum inter sese, & venarum cum arteriis mutua est anastomosis, ita ut dextræ venæ sinistris coniungantur, atque dextræ in partem sinistram, & sinistrae in dextram transeant, ut in posticis humeris & femoribus videre est. Inde fit in morbis transumptio humoris desultorii, ex *Hippocrate*, lib. de off. nat. & lib. de morbo sacro.

Nec tantum ea communio & societas obseruatur in partibus externis, verumetiam internis, ut in vtero. Nam si spermatica aliquam venam insufflaris, alteram insilari cum arteriis videbis, quod fuit à *Galeno* prius animaduersum, lib. 16. de usu partium, cap. 12. Capitis humani exemplum proponens, ut quod hic fit, eodem modo in aliis partibus fieri statuendum sit. Natura, inquit, in facie, & toto Capite arterias quidem quamplurimas cum arteriis, venas autem cum venis, tum à dextris ad sinistra, tum à sinistris ad dextra, tum à parte anteriore in posteriorem, & rursus à posteriore ad anteriorem, & ab interno ad externa ducens, inter se connectit. *Aristoteles* hanc vasorum communionem subolfecisse videtur, libro tertio de historia animalium, dum scribit de Aortæ, & maioris venæ ramis, multos ferri per inguina & coxas, qui permixti inter se tractus rationem, quippe à sinistra parte in dextram, & à dextra in sinistram, & iuxta poplites cum aliis venis arteriæ coeunt. Idem repetit, libro tertio de partibus animalium sub finem, cap. 3. Inde colliges veritatem illius sententiæ Hippocraticæ, libro de alimento, *Εἰς πρῶτην πιν. Εἰς πρῶτην πιν. Εἰς πρῶτην πιν.*

Istas Anastomoses, & mutuas venarum in alterutrum latus corporis translationes, tam studiosè & diligenter perscrutatus est *Hippocrates*, ut de illis anastomosis & translationibus venarum, quæ in partibus internis, & potissimum externis perficiuntur, intelligendum sit illud ænigma Hippocrati de paribus quatuor venarum, quæ à Capite prodeunt. Quod à *Galeno* tanquam absurdum & ridiculum refutatum fuit, & ab aliis exploratum. Sed si venas illas sub cute Capitis & colli larentes, accurata sectione indagare & insectari velis, deprehendes nullo modo Hippocratem hallucinari. Atque hac inuestigatione & interpretatione, mentem Hippocrati de venis corporis humani in dimidia & postrema parte lib. de nat. off. expressam faciliè intelliges. Atque notabis Hippocratem, eas tantum venas externas crassissimas corporis à Capite vsque ad pedes exporrectas proponere, quæ secari possunt in variis affectibus, ut ipsemet de-

scribens venas illas sectioni idoneas adiunxit, monendo vt quàm longissimè à locis  
vbi dolores sunt, ac sanguis colligitur, fecimus. Nec enim *Hippocrates* ignorauit Venæ  
Cauæ ortum, eius distributionem in partes internas corporis, quàm enarrat *lib. cit. de*  
*off. nature.*

Propterea miror *Galenum* referre *Comment. ad particul. 6. lib. 1. de Natura humana*, ubi eadem verba recitantur de quatuor partibus venarum, isthæc ab imperito & ignaro artis Anatomicæ, tum ebrio cum hæc scriberet, prodita fuisse. At tamen *Aristoteles*, *libro scripto de historia animalium, cap. 3.* eandem sententiam de partibus quatuor venarum à Capite, iisdem verbis recitat, & adscribit *Polybo*, qui fuit auditor *Hippocratis*, quod non fuit ab ipso *Galeno* animaduersum. Itaque media & postrema sectio *lib. de Off. nat.* liber est de Venis, ab *Hippocrate* promissus, *lib. 3. de Articulis, particula 32.* vel ista quæ de venis exarata sunt apud *Hippocratem*, ad *Polybium* eius discipulum referenda sunt. Nam *Galenus in Comment. ad particul. 32. lib. 3. de Articulis*, notat ea quæ *Hippocrates* de venis & arteriis pollicetur non extare. Cum tamen in *Exegetici vocum Hippocratis, dictione ὀφθαλμοῦ*, monuerit hoc nomen deproptum esse ex *lib. de venis*, qui adiectus est *Moschico*. At sermo ille de venis adfusus est *lib. de Oculis*, quem *Moschici* nomine inscripsit *Cornarius*. Propterea principium huius libri, qui tractat de Oculis, vsque ad illum numerum Oculi corporis, *Ossa manus 20. funt*, retulit ad librum *de primis iunq.*, quæ tamen separantur à *Poesio & Mercuriali*, ita vt prima sectio inscribi debeat *postquam*, secunda *de primis iunq.* Ego verò existimo librum illum de venis & arteriis promissum ab *Hippocrate lib. 3. de Articulis*, & quem *Galenus* adiectum esse *Moschico* prodidit, in *Exegetici*, esse eam partem *libri de Oculis*, quæ tractat de venis & arteriis. Neque hunc librum veluti compagem quandam, hinc inde ab aliquo posteriorum constat fuisse, vt putat *Mercurialis*, quoniam quæ de venis *lib. 2. Epid. describuntur, lib. de Off. nat.* etiam interferuntur, & ab ipso *Galeno, lib. 6. de Placitis* verbo tenus recitantur sub *Hippocratis* nomine. Quod si quis dicat librum secundum *Epid.* non accenseri à *Galeno* inter perfectos & sortus *Hippocratis*, cuiusmodi sunt *lib. 1. & 3. Epid.* vt notat *Comment. ad particul. 2. lib. 3. de Articulis*, eodem iure licebit inferre, hanc particulam de venis *lib. 2. Epid.* exaratum, ex libro *de primis iunq.* excerptam esse.

## DE ARTERIIS THORACIS.

## CAPVT IX.

**V**N A eademque operâ venas & arterias indagare conuenit, quia semper inter se copulatæ reperiuntur. Arteriarum autem Radicatio est in Corde, vnde Truncus expullatur, qui *Aorta* nominatur. *Aἴμα*, inquit *Aristoteles*, libro tertio de *historia animalium*, ὅ ἐστι τὸ αἷμα κατὰ τὴν ἀρχὴν αἰσθητικὴν, ὃ ἐστὶ τὸ αἷμα πρὸς τὴν καρδίαν, quod est ærẽm ducere, vel ὡς τὸ *πνεῦμα*, cuius præteritum perfectũ in tertia persona habet *pneuma*; vnde & per pleonasmũ *aîma*, vel *aîritis*. Apud *Pollucẽm* lib. 7. cap. 19. Vasa vesicæ conseruantia *aîma*, quod repetit lib. 10. cap. 21. *aîmis* verò baltheum significat, apud eundẽm *Pollucẽm*, cap. 38. eiusdem libri, inde forsã *Aorta*, quod ab ea Cor suspendi videatur: dicitur autẽm arteria *aîmiferous*, quod ærẽm trahat & conferuet, vel ὡς τὸ *aîmi*, quod perpetuò moueatur, atque saliat, ex *Melisso*. Hæc è sinistrol Cordis ventriculo profiliens statim in exortu suo, modò vnã, modò duas arterias Coronarias, vrĩmque vnã producit, quæ instar coronæ Cor cingunt. Has non videbis exactè, nisi sectam Aorãm per sinistrũ Cordis ventriculum introspecias. Si vnica adit, eius orificio exiguam Valuulam appositam inuenies.

Paulum progreſſus Aortæ truncus, extra Pericardium in duos Ramos ſinditur, quorum vnus Aſcendens, alter Defendens dicitur. Aſcendens Trifidus exiit, ex eodem loco tribus eduſtis arteriis, Dextra ad Clauas aſcendens, Subclauia dextra eſt. Aliæ duæ ad læuam latuſ affurgunt, quarum Prima dicitur Carotis ſiniſtra: Secunda Subclauia ſiniſtra. Ab hac prope Aeromium emanat Cereualis. At Subclauia Arteria dextra ſuperacis Clauibus, emittit Carotidem dextram, quæ prope angulum

maxillæ inferioris in duos notabiles Ramos, Internum & Externum, vt Iugularis interna secatur. Carotides nominantur, quoniam compressæ hominem sopore, siue Caro aggrauant, vocemque adimunt. Sed nostro sæculo, inquit *Ruffus Ephesius*, lib. 1. cap. 3 & 4 non arteriarum, sed netuorum senfiorum adiacentium id vitium esse compertum est, quare si nomen mutare volueris, non peccabis. Ex *Aristotele*, libro tertio de historia animalium. Venæ Iugulares *αριστερα*, de magna vena partitæ subeunt. Collum, quas interdum si quis extrinsecus intercipiat, concidunt homines sensu priuati, atque palpebris clausis. Ne quis autem putet mendum subesse, accipiendo Iugulares venas, pro Carotidibus arteriis, subiungit: Sic verò tendentes, atque in medio sui recepta arteria, feruntur inter aures, quæ maxillæ Capiti commissæ sunt: id etiam confirmat lib. 2. c. 2. eiusdem operis. Videtis non constare inter antiquos authores de vasis, quæ laqueo intercepta soporem inducunt, quoniam hæc vasa, venæ, arteriæ, & nerui, sunt ita contigua, vt vnum pro altero acceptum fuerit. Sed Caros non dependet à neruo, intercepto aut resecto, an potius à vena, quàm arteria obturata in morbis, non illaqueata, quoniam *Galenus*, lib. de vtilitate respirat. cap. 5. copiosè demonstrauit experimento factò in animalibus viuus, ex arteriarum Iugularium constrictione nullo incommodo mulctari & affici. Cederem porius arterias obstrui, quàm Venas in hoc affectu. Vt altera in *Anatome*, cap. 11. lib. 8. testatur publicè in Theatro *Columbum* demonstrasse in adolescente soporem induci ab arteriis carotidibus compressis vel constricis, quomodo id factum fuerit, non exponit. Subclauia continuato cursu sub Acromio, Axillaris incipit appellari, vnde nascitur Cervicalis.

Descendens Truncus Aortæ ad læuam contortus, ac deorsum reflexus, vertebrarum corporibus fulcitur, & in progressu suo vsque ad Os Sacrum ex vtroque latere tot arteriolas producit, quot sunt vertebræ, nullaque reperitur Azygos arteria, quæ comitetur venam Azygon, sed eiusmodi arteriolarum illius vicem supplent. Intercostales arteriæ in spinalem medullam per foramina vertebrarum sese insinuant, inde explicatur facillè sententia illa *Hippocratis* in *Coacis*, quod si totus pulmo inflammetur cum Corde, vt in latus procidat, resoluitur totus æger, &c. quod fit delabente & influente materia serosa in spinalem medullam, quæ ex inflammatis pulmonibus regurgiat in eum locum. Id confirmatur memorabili exemplo apud *Galenum*, lib. 4. de loc. aff. cap. 4. cuiusdam qui ex Peripneumonia vehementi in paralyfim superiorum artuum incidit, ac neruis intercostalibus superioribus illæsis sanitati restitutus fuit, sic qui pleuritide laborant, interdum conuulsiones patiuntur, vel Paralytici fiunt, vt ex historia filij *Valeriolæ* in *Observationibus* comprobatur. Sic etiam apud *Hippocratem* in *Coacis*, conuulsio finem febri adfert, quæ aut eodem die, aut posttridie, aut perendie incidit, translatione materiæ febrilis in spinalem medullam. Atque crederem lubentius materiam paralyseos per has vias in spinalem medullam facilius deriuari, tum per arteriolas cervicalis arteriæ, quæ medullam ceruicis irrigant, quam per illas arteriolas totius trunci Aortæ à iugulo vsque ad Os Sacrum excurrentis, sicque imbuta & inebriata spinalis medulla, prout humor in hanc vel illam partem influxit, vel totam medullam madefieri, paralyfis dimidiati corporis, vel totius succedit. Nec enim agnosco, quomodo humor per quartum Ventriculum Cerebri deriuari & delabi potest, in spinalem medullam sine repentina suffocatione, vel intercepto spirituum comiteatu, vel saltem æquali humectatione totius spinæ: nisi dicamus intra Cerebrum radices spinalis medullæ vtrique distinctas esse, seorsim ebibere & absorbere humorem, quem in se collectum & sensim abditum, de repente expriment in spinalem medullam. Propterea solet præcedere paralyfim, vel apoplexiam, vel conuulsio, perquam excutitur in spinalem medullam humor, qui in postico Cerebro continetur. Eadem ratione ex Mefenterio materia serosa per arteriam coeliacam remeare potest in Aortam, & per arteriolas penetrantes spinalem medullam deriuari in neruos artuum inferiorum: Vicissimque materia nothæ Ischiadis secundum continuationem crassissimi nervi reingratre in spinalem medullam, inde per Aortam in Mefenterium traduci. Hæc vispatentior & evidentior est, quàm per neruos lumbares in Mefenterium dispersos, cum nerui sint porosi, rarò peruii. Quum ad Diaphragma peruenit, binas Phrenicas illi suppeditat, dein per fasso Diaphragmate in Ventrem distribuitur, vt in *Ventris Anatome dictum* fuit. Intra Thoracem, si discindas Aortam, videbis in tres pelliculas crassas diuidi, interna mollis est ac membranosa, secunda durior, tertia & externa crassissima est, ac veluti cartilaginea.

DE NERVIS INTRA THORACEM  
consentis.

CAPUT X.

**I**N Thorace Nervi octo insignes veniunt obseruandi, duo sunt Diaphragmatici, duo Recurrentes, bini Stomachici, duo Costales.

Diaphragmatici inter quartam & quintam cervicis vertebrae exorti, ab illo crassiore nervo cervicis in brachium abeunte, intra duplicaturam Mediastini descendunt ad eentrum nervum Diaphragmatis.

Recurrentes, & Stomachici propagines sunt nervi sextæ coniugationis, cuius truncum in Collo prope ljugularem internam inuestigabis, iuxta mastoideum, ubi in duos ramos finditur, quorum alter in musculos superiores Colli disseminatur: alter cum ad claves pervenit, in duos ramos scinditur, Recurrentem, & Stomachicum; sinistri Recurrentis reflexio invenietur circa descendens Aortæ incurvationem, & facile antequam aperiatur Pericardium, dextri Recurrentis reflexionem reperies circa Subclaviam arteriam dextram. Cur autem Sinister ad arteriam axillarem sinistram non reflectatur, causa est rectitudo huius rami, qui recta petit axillas. Aliam rationem assignat *Columbus*, ne tenuissimus nervus qui Cordi suggeritur, longiore ductu periclitaretur, ob continuas Cordis agitationes. Nec arbitror tam exigui nervi obstructionem repentinam mortem inferre, vt tradit *Piccolomini*, & post eum *Banhus*. Istum Nervulum nunquam obseruare potui, sed ambobus Recurrentibus nervis resectis canes viuere, eursitare sapius vidi, ac publicè demonstravi.

Stomachicos nervos infra Cor iuxta vertebrae perquires: intra duplicaturam Mediastini latitant, ab his decem vel duodecim fureulos in Pulmones produci videbis, & ex ramulis vtriusque Stomachici simul implexis, Nervorum mirabilis plexus constituitur, quem in basi Cordis collocavit *Fallopins*, & inde produci Pericardium voluit. Omnes Anatomici istam coniugationem vagam esse dicunt, & ad pedes vsque produci, quod ex *hysteria Næptheri*, *Scholæ in Synefium de infans* colligitur, de puero cui cum nervo cervicis percussus fuisset, pedem macrum breviorē & inertem habuit, cum alter cresceret, & robustus evaderet.

Costalis nervus quem omnes Anatomici constituunt, & derivant à sexto pari, ab eodem puncto Cerebri cum sexto pari oritur, & calvaria egressus ganglio circumiecto roboratur, & indiuisus descendit supra Collum. Vbi pervenit ad tres ultimas vertebrae Colli, altero ganglio stipatur, & crassescit trium nervulorum additione, & delapsus intra Thoracem in progressu suo iuxta spinam sub Pleura, aliarum fibrularum à dorsali medulla prodeuntium accessione adaugetur; Penetrato Diaphragmate stomachicis nervis iungitur, ad plexum illum rectiformem nervorum effingendum sub ventriculo inter Renes & Diaphragma collocatum, à quo nervi omnes depromuntur, qui in partes omnes ventris inferioris distribuuntur.

Hunc plexum nervorum diligenter obseruari cupio ab Anatomicis, quia si ferro acri, sereno & maligno imbuti, & nimium madescere contingat, inde Colici dolores acerbissimi & profundissimi excitantur, atque convulsionēs horrendæ, quæ pro hystericiis sæpe habentur in mulieribus, cum tales etiam in viris subortas observaverim. Qua de re confules *Carolus Pisonem*, eruditissimum Medicum Parisiensem, lib. de morbis à ferro, pag. 240.

## DE PVLMONIBVS.

## CAPVT XI.

**I**NVENTVS ac demonstratis vasis, ad Pulmonem te conuerstes, quem priusquam Cor attingas, expedire oportet. Dicitur *viscū*, ex *Aristotele*, cap. 10. lib. de *respirat.* *hū* dū *in vicijs* *conteritur*, propter spiritus receptionem. Spiramentum animæ ex *Virgilio*. Est autem Pulmo officina atq; promptuarium attracti per respirationem aëris ad refrigerium Cordis, simulque respirationis & vocis organum, solis animantibus datum quæ respirant, & Collum habent ex *Aristotele* & *Galeno*. Ideoque pisces, quia non respirant, carent collo, Pulmone, & sinistro Cordis ventriculo, quinetiam quorundam opinione, ad aëris præparationem qui Cordi suppeditatur, Pulmo videtur necessarius. At vocis causi conditum fuisse negat *Fabricius ab Aquapendente*, quoniam vtricularia tibia sonum edit, ita Thorax sine Pulmone idem efficere posset. Pisces non edunt vocem, quia carent materia, id est aëre, quem intra aquas non attrahunt. Verum, aliud est sonus, aliud vox, ideoque Pulmo & vocis & loquutionis instrumentum esse potest, quamuis loquutio sit vocis per linguam explanatio in gutture & ore.

Vt igitur instat follis aërem attraheret, & in se conferuaret, substantiam siue parenchyma obcinuit spongiosum, molle, quod iunioribus esse densum testatur *Hippocrates*, in adultis rarius magisque cauernosum. Rarefcit enim motu, & aëris inspirati contactu, siue transitu: ac sanè, Pulmo tior est in adultis, quàm in foetu, recentique editis, quoniam ex *Hippocrate*, aërium trahit alimentum, id est, sanguinem arteriosum & aërem, cætera membra simile fugit, lib. de *alimento*. Quod confirmatur à *Galeno* lib. 6. de *usu partium*, cap. 10. quippe arteriosum sanguinem mutuatur, non à trunco Cauæ, sed à dextro Cordis ventriculo, vbi purior, subtilior, & vitalis factus, Pulmonibus distribuitur. In foetu contrà, Pulmo venoso sanguine alitur, qui à vena Caua in Arteriam Venosam regurgitat, vt in *historia Foetus* declarabitur, ideoque Foetus parenchyma durius est ac ponderosius, & iniectum aquæ mergitur: contrà adulti hominis Pulmo, quia leuis & mollis aquæ supernatat.

Sed cum Pulmo calidiore sanguine alatur, quàm reliquæ partes, quinetiam cum ex tenui & spumosa sanguinis portione concretus formatusque fuerit, ex *Hippocrate*, libro de *Corde*, & passim apud *Galenum*, mirum est quod scripsit *Hippocrates*, Pulmonem naturà frigidum esse, & inspirato aëre magis refrigerari, libro de *Corde*. Quinimò frigidos affectus semper pati, hydropi obnoxium est, sine vlllo vitio Hepatis & lienis, libro de *morbis*. Responso quæ profertur à *Laurentio* non satisfacit, quod Pulmonem frigidum dixerit *Hippocrates*, comparatè, non absolute, maximè cum dicat *Hippocrates*, naturà suà frigidum esse.

Inter omnia viscera Pulmo maximè sanguine abundat, & sæpius regurgitat, ex *Aristotele*, cap. 13. lib. de *respirat.* quod repetit lib. 1. de *historia animalium*, propterea Pulmo viscus est sanguisorbum, quod facile impletur sanguine, ratione substantiæ fungosæ & vasorum, quæ maiora sunt in eo viscere, quàm in Hepate. Propterea morbi Pulmonum non curantur, nisi copiosâ sanguinis detractione, vt *Hippocrates* docuit lib. 2. de *morbis*, articulo de *Pulmone tumente*. Scribit idem *Philosophus*, lib. 2. de *generat. animal.* cap. 1. caloris naturalis rationem pendere ex Pulmonis sanguine, quæ enim Pulmonem habent, omnino calidiora sunt iis quæ non habent, & inter ea superant, quæ non fungosum aut tetorridum, aut parum sanguinis continentem habent Pulmonem, sed sanguinolentum & mollem, hinc fit, vt inspecto tantùm Pulmone, definire possis, quousque vnumquodque animal sit calidum, quoniam vbi cumque Natura parauit Cordi peculiare instrumentum, à quo ventiletur, ibi oportet calidum illud sit potens: quod repetit lib. 2. de *respirat.* cap. 15. Idcirco animalia quæ Pulmones amplos habent, multùm potius desiderant ad refrigerium, ac proinde liene magno prædita sunt, qui superfluas humiditates absorbeat, ex *Aristotele*, lib. 3. de *part. animalium*, cap. 7.

Propter Pulmones etiam erectam esse corporis molem, discas ex *Aristotele*, libro de *respirat.*

*respirat. cap. 13.* Elegans locus extat apud *Apfyrum, lib. 1. Veterinaria.* Ex tussi vel alia violentia Pulmo rumpitur: id verò causa fuerit, quod viscerum omnium tenuissimam habeat membranam, & vernaculo spiritu refertus sit, omnis autem humor quo imbuitur, continuo motu spumofus bullat, tenuissimamque constitutionem inducit, proinde summa mollietie præditus est, etenim pulmonem natura Cordi vitalem aëram eiaculanti, semperque vibranti suffulit, subterque adfirmavit, ut si quando Cor duro corpori, nec cedenti admotum fuerit, vel ictum acceperit, animanti perniciem non molietur. Pulmo igitur distensionum iniuriis patens facile abrupitur.

Dicam liberè quid sentio de Pulmone: est emunctorium Cordis, emungit fordes sanguinis impuri à dextro Ventriculo reiecti, atque vnicum est promptuarium sanguinis refluus ad Cor, si deficiat sanguis Caux Venæ, quemadmodum Lien est emunctorium & spongia ipsius Hepatis, promptuarium quoque sanguinis si defit in Hepate.

Prodidit *Hippocrates, libro de Anatome,* Pulmonem in quinque lobos sectum esse, quem secutus est *Ruffus Ephesus lib. 1.* Quarum dux in sinistra Thoracis cauitate continentur, tres in dextra, quod verum esse in brutis animantibus fatentur *Anatomici*, non autem in homine. Nos tamen sæpius tres lobos in quibusdam obseruauimus, & publicè demonstrauimus: nec ob id inficitæ accusandus *Galenus*, si post *Hippocratem*, tres Pulmonum lobos in dextro Thoracis specu constituat: quintetiam *Hippocrates*, in *Coacis*, tres vtrimque lobos numerat, supremum, infimum, & medium. *Aristoteles, lib. 1. de hist. animal.* monet in homine Pulmonem non esse multifidum, ut in quibusdam animal generantibus, neque laxum, sed inæqualiter inæqualitate illa supponit lobos.

Vtrimque in fibras sectus fuit Pulmo, propter longiorem viam Thoracis à iugulo ad Diaphragma, ad quod producitur: idcirco non potuisset commode dilatari, explicari & confringi, si vnicus continuusque fuisset. Et quoniam eiusmodi lobi alarum more dilatati, faciliè explicantur & colliguntur, idco per metaphoram *Alæ* dicuntur: proinde *Hippocrates* scripsit, *ἡδυνώμενοι ὡς πτερά*, & *Pollux lib. 2.* sic appellat. Quintetiam *ἄνω* & *ὑποῦ* dicuntur ab *Hippocrate*, ut docet *Foesius*, in *Oeconomia Hippocratis, distictione 4. vni.* Adde quod sectio Pulmonis in lobos facit, ut vitium in vno lobo sistatur, nec tam faciliè ad alios perueniat.

Pulmonem cineritium colorem præ se ferre notauit *Hippocrates, lib. de Anatome*, & notis quibusdam subobscuris, fuscis & nigricantibus compositum esse, *ἵπποκράτης ἰστοῦσιν αἰσθησίν*, & naturā suā perforatam, *ἡνὶ ἰσὶν ὑπὸ πνεύματι*. Sic enim *ἡ ἰσὶν ἀνὰ τὸν*, dixit *Hippocrates, lib. de Eff. nat. & Iussu. & ἔστιν ἡνὶ*, libro de locis in homine. *Aræteus lib. 1. Chron. cap. 10.* *πῶς ἡ πνεύματος ἀνὰ τὸν* *ἰσὶν*. *Galenus* etiam Pulmonis carnem mollem & foraminulentam facit lib. 7. de usu partium.

Nervi quamplures ad vtroque Stomachico Oesophagum petreptante Pulmonem substantiam ingrediuntur, quapropter valdè sensibiles sunt. Nec possum adduci, ut credam cum *Galeno* perexiguum, aut ferè nullum sensum habere, lib. 1. de diff. resp. lib. 3. prægn. comm. 30. lib. 4. de loc. affell. cap. 6. Contrà scripsit *Hippocrates, lib. 3. de morbis*, Pulmonum inflammationes dolorificas esse, ipsumque dolorem lateri & dorso communicari, ob tunicæ Pulmonem succingentis & Pleuræ continuitatem, parilemque substantiam: At Pleuræ acutissimus est sensus, ergo tunica Pulmonum Pleuræ soboles sensus exquisiti particeps erit. Quintetiam ipsa Pulmonum substantia pluribus nervis instructa est, deductis ex implicatione & contextu neruorum Stomachicorum, ex quibus Reticularis ille Plexus conflatur, quem describit *Fallopianus*, & ad basim Cordis collocat, cum tamen ab ea longè distet, & iuxta vertebrae dorsii reperiat. Ad hunc finem constructus fuit, ut inde nervi in vicinas partes deriuarentur, nec mirum si in cardiogmo, siue affectu Stomachi, otificij superioris ventriculi, Syncopæ, Cardiaca accidat.

Dependet autem Pulmo ex aspera arteria sese in mediā eius substantiam insinuante, atque in homine solo naturaliter Clauiculis ac supremis Costis adnecti scribit *Fallopianus*, & inde suspensum teneri. Attamen sæpius ad Clauiculis & Costis prorsus seiunctum obseruavi. Interdum Pleuræ adnascitur, non tantum interuentu tenuium filamentorum, sed per adhesionem firmam. Hæc colligatio si ampla & ar-

et fuerit, itaut Pulmo immediatè Costis adhæreat, molestam dyspnceam etiam in sanis hominibus adfert. *Nicolaus Massa* istam coherentiam Pulmonum cum Pleura vtilem Cordi esse putat, ne Pulmonum mole premeretur, nec villam spirandi difficultatem adferre.

Membrana tenuissima à Pleura propagata succingitur, quam *Galenus* negat aduersus *Aristotelem* & experientiam tenuissimis foraminulis pertusam. Eo sine facta fuit, vt pus & sanies in pectoris capacitate congesta, à spongioso Pulmone faciliùs absorberentur, & tussiendo extruderentur. Sunt autem hæc foramina, siue pori extremitates bronchiorum in ambitum & circumferentiam Pulmonum definitum. Hanc membranam Pulmones succingentem in Catis, animalibus domesticis valde foraminulentam inuenies, & in homine inflato Pulmone. *Galenus lib. 1. de loc. affect. cap. 3. & lib. 5. meth. cap. 8.* copiosè demonstrat aduersus *Erasistratum*, à substantiâ Pulmonum bibulâ, & foraminulentâ thoracis materiam purulentam exsurgere & absorberi, foras educi per asperam arteriam tussiendo, sed quâ viâ eadem materia per vrinâs & secessum, id est, per renes & intestina vacuari queat, nondum manifestè decretum & inuentum. *Diocles* existimabat Thoracis suppurationes per arterias ad renes & vesicam deduci, simulque cum vrinis excerni, ex auctore *Isagog. cap. 15. Galenus lib. 6. de loc. affect. 4.* opinionem *Erasistrati* proponit, de transitu materiæ à vena arteriosa, in Cauam per medium Hepar decurrentis, inde vel per Intestina, vel per renes expurgari. *Galenus* non placuit hæc opinio, mauultque per arterias deriuari materiam, videlicet per arteriam venosam in sinistram Cordis sinum, inde per Aortam rectò tramite ad emulgentem, siue renes delabi: Quando verò per Intestina vacuatur materia, tum Vena Caua in Venam Portam transmittit per ramulum, qui Venæ Portæ per Anastomosis iungitur, quæ quidem Anastomosis vt rara est, sic raro contingit isthæc puris in Thorace collecti expurgatio per Intestina. Ipsemet *comment. ad Aphor. 30. lib. 7.* istas duas vias agnoscit. Attamen *lib. 6. meth. cap. 8.* Thoracem & Pulmones dumtaxat tussiendo per anacatharsim expurgari decreuit. *Bartholomæus Eustachius, lib. de Renibus, cap. 41.* affirmat se multoties obseruasse propagines Venæ Portæ unitas cum venis septi transversis. Inde cognosces viam, qua Pulmo & Thorax per Intestina & renes expurgari possunt: Quamuis enim viâ à *Galenus* assignatæ sint verisimiles: Hoc tamen fieri à natura, non ita faciliè concedendum, quia cum viâ hæc satis longa, anfractuosa ac inusitata sit, commixtio verò sanguinis puri, ac spiritus cum pure admodum periculosa, credendum est sagacem Naturam eiusmodi vacuationes valde cauere, & quàm rarissimè tentare: adde quod Natura de principi viscere maxime sollicita, tale excrementum potius à Corde repellit, quàm transmittit. Crederem potius per Anastomosis Arteriæ Venosæ cum Vena Caua, Pulmonem suam illuuiem in Cauam effundere, quâ postea ad renes deriuabitur.

Intra substantiam Pulmonum triplex Vasorum genus obseruatur, nempe Vena arteriosa, Arteria venosa, & his interiecti Asperæ Arteriæ tubuli qui Bronchia dicuntur. Venæ & arteriæ cuiusque lateris decussatim in lobos feruntur. Bronchiorum verò cartilagineæ non sunt amplius sigmoides, vt in superiore parte Asperæ Arteriæ, sed tessellatarum more variis figuris constructæ: quædam enim sunt rhomboides, aliz quadratæ, aliz triangulares, quæ varietas eo sine facta fuit, ne contactu Pulmone, bronchia pariter constringerentur, aut coniuerent, inquit *Fallopianus*. Quoniâ ad inspirationem & expirationem cavitates bronchiorum semper patens & permeabilis esse debet. Deinde per intermedia cartilaginosa spatia aer liberè sese insinuat in Thoracis capacitatem, & per eadem regrediuntur fulgines. simulq. aquosa vel purulenta intra cauum Thoracis collecta à spongioso parenchymate pulmonum exsucta & absorpta faciliè bronchia transmeant, & tussiendo eliduntur ac eliminantur. *Rondeletius lib. 1. de piscibus c. 11.* diuersarum cartilaginum inuentionem sibi arrogat, & aliter explicat. Aspera Arteria statim atq. in pulmones spargi cœpiß, vndiq. tenuibus cartilaginibus contexta est, quæ squamulis, seu potius *piscibus* figuræ sunt haud absimiles. Sic ordinatæ, vt cum *piscibus* altera super alteram in medio sui steterit, vtriusque in eo quod hiat spatio sitæ sint, aliz duæ suis angulis acutis aliarum duarum contactum attingentes atq. ita vbique & vndiq. semper inter sese dispositæ, & mirabiliter cœcæ, tenuibus membranis reuinctæ sunt, quemadmodum superioris arteriæ cartilagineæ,



quarum membranarum beneficio latiores fiunt angulis acutis, & duabus super se stantibus in medio sui, procul à se recedentibus in Pulmonum dilatatione: in eorum verò contractione angustiores, nimirum in vnum se cogentes & constringentes, vnius angulo acuto proximarum duarum super se stantium contactum supergrediente, altero eiusdem angulo duarum etiam super se stantium oppositarum contactum subeunte. In pulmonibus piscium non adestr raritas illa & assimilis spongiæ, nec mollitudo, qualis est in cæteris animantibus omnibus, ne aqua in pulmones effunderetur, ex *Rondeletio*.

Pulmones moueri sui dilatatione & contractione certum est & indubitatum: Sed an motus ille sit insitus, vel aduentitius, id est, ab alio impellente factus, controuertitur. *Galenus libro de Thoracis motu, & variis in locis*, ad motum Thoracis cieri Pulmones prodidit, quod recentiores Anatomici probant duabus rationibus. Natura Pulmones costis adnecti voluit, vt Thoracis motum necessariò sequantur, per vulnus aperto Thorace immobiles manent pulmones. Fateor in violenta respiratione Pulmonem Thoracis motum sequi, & secundum eius amplitudinem amplificari fugâ vacui, sed in libera respiratione, immoto Thorace mouetur Pulmo: Respiratio autem perficitur dilatatione & contractione Pulmonum. Sæpius obseruavi Pulmones nullibi subcostali tunica coherentes, ne quidem Diaphragmati affixos. At dices, in morte adhesiones illæ effringuntur, coincidentibus in se se Pulmonibus. Nam *Galenus cap. 10. lib. 8. Admin. Anat.* fuitur seiunctum Pulmonem à Costis in mortuis, sed in viuentibus semper Costis aliquatenus adherere: Deinde falsum est in vulnere Thoracent penetrante Pulmones esse immobiles. Nam in dissectione viuorum animalium eleuato Sterno Pulmonem dilatari & constringi videmus: ergo dilatatur Pulmo inspirato aëre, constringitur exclusis fuliginibus, quod accidit impellente Corde ad sui refrigerium & vitæ conseruationem: ideoque Cor, & motus Pulmonum, & Diaphragmatis præcipua causa est. *Aristoteles variis in locis*, sed potissimum libro de respiratione. Pulmonis motum naturalem esse sustinet, & à Corde pendere, follis instar, non vtis modo contrahi & distendi: existimare, inquit, oportet instrumenti constitutionem similem esse folliis, qui in officinis ferrariis habentur, geminum autem existit quod tale est, scilicet Cor, quod nutriendi facultate præditum est, & in medio consistit, quod quidem medium cum amplificatur eleuari solet, cum attollitur eam quoque partem, quæ illud ambit eleuari necessum est, quod in respirantibus fieri cernitur, quando pectus attollitur, propterea quod eiusmodi partes à Corde agitatae promouentur. Pulmo, vt alibi scribit Philosophus, spirandi officio destinatus, originem sui motus accipit à Corde, sed sua tum amplitudine, tum inanitate adicum spiritui patefacit, cum enim attollitur insuit spiritus, cum contrahitur effluit. Itaque Pulmo sequitur motum Cordis, si non passibus æquis, Thorax verò Pulmonis morum. Huic opinioni fauet & adspulatur *Aretæus lib. 2. acut. cap. 1.* Pulmo attrahendi causam in se continet: nam in ipso medio calidum viscus Cor sedet, vitæ spirandique principium, id Pulmoni attrahendi frigidi aëris cupiditatem iniicit, quoniam ipsum incendit, ac sollicitat: verum Cor est quod attrahit. Hanc opinionem *Aristoteles* aduersus *Galenum* tuetur *Thodæus Dunus, libro de respirat.* Eleganter *Aristoteles libro de respiratione, cap. 17.* notat pulmone per senium arefcente, & indurescente interire animalia, quia non potest sese attollere, & alas suas expandere, ac proinde ipso coincidente Cor obruitur, atque suffocatur: Accedit in Corde debilitas caloris natiui, qui non est satis potens ad impellendos & dilatandos Pulmones.



motus quidam est naturalis, qui à Corde influit, & communicatur partibus officialibus ad agendum, alius voluntarius, qualis in reliquis Musculis obseruatur. Sicque Cor erit Musculus, seu principium motus naturalis.

Carosam & Fibrosam Cordis Substantiam extrinsecus *Adeps* oblinet & circumdat, in homine copiosior, quàm in brutis, ( quibus Pericardium foris adiposum est, ) ad Cordis humectationem, vt facilius moueatur, & perenni agitatione calefactum non penitus exarescat: impedit etiam suo veluti glutine, ne humidum radicale in Corde fixum celeriter absumatur, quin etiam per in medias pabulum Cordi subministrat. Nec enim aliter intelligere oportet partes adipe nutriti, quàm refici aliquandiu. Sic enim calor natiuus alitur isto adipe, vt lucernæ flamma oleo nutritur & conseruatur. Passim scripsit *Galenus*, quod est in sanguine pingue & oleosum, etiam in calidioribus corporibus, pabulum calido subministrare, & adipem in magis inediis in alimentum facessere. *Aristoteles* non credit circa Cor adipem inueniri: & *Galenus libro de temperamentis*, scribit impossibile circa Cor adipem condescere, quod falsum conuincit experientia in sectione viucentium animalium. Excusari potest, quod dixerit *quidam non esse*. At illud seuum est, quod adnascitur Cordi. Mirum est, quomodo visceri calidissimo adeps hæreat, qui calore suaditur & liquatur. An quia circumfusi feri aciditate non crescit, quemadmodum oleum vitrioli in glaciales stirias vertitur affuso oleo tartari, & quamuis tepeat hic humor non impedit concretionem adipis, sic videmus adipem liquatum in aqua tepente confestim condescere. Crepirat autem hic adeps eliquatus, ac si oleum aquæ permixtum videres, quod in alio adipe non obseruatur, ideoque aqua Pericardij concrecioni adipis confert, eiusque duram consistentiam conseruat, ne calore liqueatur. Quod si flammæ candelæ difficillime liquari queat, multo minus temperato calore Cordis liqueat. Alij statuunt Cor durissimum crasso & terrestri sanguine nutriti, ex quo seuum seu adeps crassus generatur, non mollis, vt voluit *Fernelius*, imò quouis adipe durior, si credimus *Pesalio*, & liquatus difficillimè coit, nec vnquam pristinam recuperat consistentiam. Opinione quorundam sanguinis parte tenuiore consumpta ab ingenti Cordis æstu, quæ remanet portio sanguinis multo terrestrior & durior euadit. Atque verissima esset hæc ratio, si cum *Fuchio*, in *Paradoxis*, pinguedinem ficti à calido indurante desiccatus tenuioribus partibus asseueremus. Vena Coronaria cordis suppeditat materiam ad generationem adipis.

Existimat *Nicolaus Massa* pinguedinem istam fieri & condescere ex crassiore & viscidioris sanguinis portione, resoluta tenuiore, agente calido complexionali animalis, quod non agit eo modo quo calor externus colligat. Eleganter & probabilem rationem offert *Achillinus*, circa Cor pinguedo adnascitur, ratione multæ agitationis sanguinis, vt ex forti agitatione lactis butyrum extrahitur. De adipe Cordis copiose differt *Iacobus Carpus comment. in Mundinum*, pag. 59. & 60. ex doctrina Scholasticorum Medicorum. Sed cur in homine adeps potius inhærescit Cordi, quam Pericardio membranæ, contra naturam adipis? quia Cor fibrosam adhesionem aptius est. Sæpius inueni Cor vbique adipe obuolutum, in mulieribus copiosorem adipem, cumque magis flauum quàm in viro.

Situm est Cor in media Thoracis capacitate, instar Solis, qui Cor mundi dicitur, & medium locum occupat non ratione Planetarum, sed ratione totius mundi, quò facilius imperium suum exerceat, suasque vites in vniuersum corpus effunderet, vt doctè probat *Cremontinus*. Ita Plato mundi Animam in centro collocat, vt possit Mundum continere & gubernare, dum quoquo uersum æqualiter sese extendit: sed illud medium Thoracis nonnulli putant de basi Cordis intelligendum, quæ medium Thoracis exquirit occupat secundum omnes dimensiones, ex *Galeno lib. 7. cap. 7. Admin.* *Anat.* id est tantum distat à Clauibus quantum à Diaphragmate, tantumque recedit à Sterno quantum à vertebri dorso. Nam conus Cordis in homine centrum Diaphragmatis pertingit. In quadrupedibus non Basis solum, verum etiam Cordis mucro in medio consistit. *Aristoteles*, libro tertio de partibus animalium, Cor medium totius corporis occupare scribit demptis artubus, qui nihil conferunt ad vitam. De hac questione *Ioannes Matthæus* disputauit *quest. medic. 18.* Scribit *Aristoteles* libro primo de historia anim. Animalia quibus pectus est, in eius medio Cor situm habere: Vni Homini in læuam papillam inclinare. Notatione dignum quod proponit *Nicolaus Massa*, an sit verum dubito, eos qui habent partem superiorem Cordis latam, vergentem

tem ad sinistram, ut sinistra manu pro dextra, qui habent Cor rectum in medio, neque à dextris, neque à sinistris declinet, isti sunt ambidestri. Sed cor in sinistro latere infra laevam papillam pulsatio percipitur? quia spirituosus & sinister Cordis ventriculus in priora Thoracis eminet cum Aorta, quæ simul ferunt latus sinistrum, in systole dum Cor extenditur, & eodem instanti cono tangit centrum Diaphragmatis, & Aorta amplificata percussit pectus. Quædam consimilis res apud *Laurentium*, lib. 7. ex opinione *Hispani Medici*, qui à paucis annis edidit commentarium in libros *Galeni de Morbis*, & attexit istam disputationem.

Cor autem natura deflexit in latus sinistri maiorem Cordis portionem? ut esset corpus iniquum, in æquilibrio, vel ut sinistram partem frigidiorē calfaceret, quum dextra ab Hepate, Vena Cava, & Azygo, satis calida reddatur, & ita ambæ corporis partes calorem, robore, ac pondere æquales fiunt.

Cum autem Cor intra Thoracē sursus medium locum occupet, nonnunquam visum est relaxatis inuolucris, Mediastino & Pericardio quibus suspenditur, sua si de dimotum subsedisse, & mucrone suo succingenti tunicæ circa Septi regionem adfixum *Platerum* deprehendit, ut notat in *Observationibus*. Vidi in *Regina Matre Maria Medica* Cor prægrande in latus dextrum inclinatum, firmius affixum costis interuentu Pericardij dextra parte cartilaginosa. Scribit *Aristoteles* omnia animalia tam aquatilia quàm terrestria & volatilia Cor in Thorace locatum habere. *Aelianus & Arbenus*, pisces Afellum Cor in imo ventre habere testantur.

Magnitudo Cordis non omnibus eadem & æqualis cernitur, pavidis & ignavis animalibus prægrande Cor datum est, audacibus pusillum aut medioere. In quodam nebulone ferocissimo, qui dum virgisi carnifice caderetur, lictoris subfannantis ensē artipuit, eumque vulnere perfodit, deprehendi Cor pusillum admodum & durissimum inflat cartilaginis, ut nullum unquam viderim solidius. Homo, si creditur *Aristoteli*, proportionē corporis, reliquis animalibus Cor grandius obtinuit, quod augeri per singulos annos, ac binas drachmas ponderis ad quinquagesimum annum accedere, ab eo detrahi tantundem, & ideo non vivere hominem ultra centesimum annum defectu Cordis *Ægyptij* existimarunt, referente *Plinio post Herodotum*, quod fabulosum arbitror.

Figura Cordis est Conoidis, siue Turbinata; nuci pineæ respondens. Sic *Democritus* in epistolis *Hippocratis*, regionē Cor cono simile, iram nutriendum, aduersus omnes insidias Thoracem induit, *Artemidorus* lib. 1. de somniis, &c. *Hippocrates* libro de Cordis, natus est per alia sua verba. Cor figuram habet pyramidi similem, quam *Galenus* libro 6. de 2. a partem, c. 7. & *Rossius* *Epistolis* illi tribuunt. Sed in brutis exactè Pyramidalis existit. *Hippocrates* lib. de Anatome scribit Cor in medio pectore situm, rotundius esse quàm aliis animalibus, *Celsus*, *Oppianus*, addit de suo *Cornarius*, oblongius, quod retinuit *Mercuriales*, cum in *Græco codice* non extet *Mercuriales*, ut animaduertit *Fabius*. *Aristoteles* agens de Corde libro primo de historia animalium, mentem & iudiciū *Hippocratis* retinuit, ut si sitis aut sitis, ut mercuriales sit, ut si sitis aut sitis, ut si sitis aut sitis, tota eius figura non tam oblonga quàm rotunda, præterquam quod infima basi in euspidem surgat. Talem figuram obtinuit velut aptiorem ad tractionem & expulsionem, siue ad faciliorem dilationem & constrictionem, quod exequi non potuisset, si alia figuræ præditi fuisset. Huius Pyramidalis figuræ causam *Allertus Magnus* ad motum spiritus refert: spiritus, inquit, mouetur in modum Pyramidis, quod etiam facit lox à Sole procedens, quare dum expellitur spiritus exitum habet Pyramidalem. Idem scribit *Meletius*, libro de natura humana, Cor natui caloris insusceptibilum pyramidalis figuræ constructum fuisse, ob calorem intra se conceptum, cuius figura propria pyramidalis est. Quamuis id concedatur ex *Platone*, quod tamen inficiatur *Aristoteles*, debet intelligi de igne, non de mixto corpore animato, quod figuram habet secundum quod exigit forma ad actionem edendam, inquit *Aelianus*. Addit *Laurentius*, quod si talem figuram Cor adeptum fuisset ob igneitatē, deberet conus sursum vergere. Respondeo non ascendere euspidem sursum, propter gravitatem sanguinis dextri ventriculi, tum quia commodè Cor non exceperet sanguinem. Adiecit *Meletius*, si conus superne vergeret, plurimos ad Cerebrum vapores mitteret, qui narium Cerebri temperiem destruerent, conus autem deorsum inclinat, propter illos vñs expositos in historia Diaphragmatis. Cor brutorum durius est in sua substantia, figura est vere conoides, conici extremitas rotunda & dura.

In homine substantia Cordis est mollior, conus non adeo durus, sed acuminatior, basis latior & amplior.

Ex figura Cordis dissimilarem eius substantiam indicauit *Aristoteles*, qualem in Hepate & Cerebro reperire non licet, quia non habent figuram determinatam, sed diuersa in diuersis animantibus obseruatur: At Cor nusquam suam figuram mutasse visum est. In hac figura Cordis oblongas duas extremas partes obseruari oportet: Superior & latior vasa quatuor recipiens, Basis Cordis, vulgo Caput nuncupatur. Altera pars acuminata Mucro siue Conus appellatur, ex *Iulio Polluce*, lib. 2. Basis Cordis Caput nuncupatur, prominentia acuta fundus. Ex *Aristotele* pars summa, quæ vasa recipit, *οὐρανός* dicitur: pars ima & acuta *κῆρ*, quæ quidem *Hippocrate* vocatur *κῆρ* & *μυρμήκων*. Vtrum ex *Galeno*, lib. 6. de *usu part.* pars acuta *μυρμήκων* & *μυρμήκων*, apex & fundus, pars latior vasa excipiens *μυρμήκων* & *μυρμήκων*.

Quamuis autem vitum & continuum extrinsecus Cor appareat, intus tamen excavatum est, in duos Ventriculos discretum, quos paries interiectus carnosus & porosus discriminat: Ventriculorum autem alter Arteriosus siue Sinister, Alter Venosus siue Dexter nuncupatur, quia Arterix in Sinistro, Venæ in dextro ventriculo sunt. Dexter Ventriculus *Russo* & *Galeno*, lib. 6. de *usu part.* c. 7. dicitur *ἀριστερός*, sinisterrimus: sinister *καρδιακός*, spirituosus. Vocatur etiam dexter *καρδιακός*, vt similiter *ἀριστερός*. Priusquam diuidatur Cor, Ventriculi solo intuitu facili separantur, verum etiam situ secundum *Hippocratem*, quod alius sinistram, alius dextrum latus respiciat, aut ratione venarum & artierarum in ventriculis sitarum: sed potissimum substantiæ molliæ & crassitiæ, atque alui amplitudine inter se distinguuntur, ex *Galeno*. Dexter ventriculus latior & capaxior, carne molli & tenui circumseptus est: Sinister angustior, carne triplo duriore, & crassiore obuallatur, & tamen ex ista inæqualitate substantiæ in ventriculis, Cor non magis præponderat in sinistram latus, quam in dextrum: quia sanguinis copia quæ dextro ventriculo continetur, Cor reddit *ἰσχυρότερον*, & in æquilibrio constituit.

Denumero Ventriculorum inter *Aristotelem* & *Galenum* controuertitur: ille tres Ventriculos Cordi tribuit, *Galenus* duos, cui chorus *Anatomicorum* subscribit. *Iulius Pollux* etiam duos tantum in Corde ventriculos constituit. Qui patrocinantur *Aristotelem*, de Corde grandiorum animalium interpretantur ex *mente Philoponi* lib. 1. de *part. animal.* cap. 4. grandiora verò animalia constituit *Aristoteles* Elephantem, & hinocerōtem, Cete. Mediocria facit Equum, Leonem: inter minima collocat Hominem, in cuius Corde duos tantum ventriculos reperiri fatetur. Sed *Galenus Aristotelem* insultans lib. 7. *Admir. Anat.* in Elephantis Corde, quod Romæ præsentibus Medicis dissectuit, testatur se non plures quàm duos inuenisse Ventriculos, similitudineque Cordis structuram in magnis & parvis animalibus obseruasse. *Nicolas Massa* in sua *Anatome Aristotelem* defendit, & meatum siue ductum insignem in superiore parte septi Cordis iuxta basim, in grandiore hominum Corde deprehendisse affirmat, quod simile obseruatum fuisse in nostris scholis memorat *Scholasticus Sylus* cap. de *Corde*. Ille est meatus, quem doctissimus *Gassendus* Professor Regius, describit inuentum fuisse Aquisgranæ in Anatome hominis. Itaque *Aristoteles* pro Tertio ventriculo quem duobus interiectis esse scripsit, intellexit scrobiculos siue foueolas septi Cordis. *Carpus* foramina & foueas quæ sunt in septo Cordis accipit pro Tertio ventriculo, quæ quidem foueæ dilatantur, dum abbreviatur Cor, constringuntur dum elongatur. *Hippocrates siue alius auctor* lib. de *Corde*, nam hic liber totus est *Anthonicus*, vocat septum Cordis esse crassum, & intus tanquam fossicula excavari, quæ est ad instar pilæ, *ὁποῖον ὁ σῆς τοῦ τοῦ*, & *ὁποῖον ὁποῖον*, & *ὁποῖον ὁποῖον*. *Galenus libro de usu part.* cap. 9. scribit Tertium Ventriculum Cordis ex *Aristotele* partem esse dextræ. Nam si Cor per medium dissectueris, Tertium illum Ventriculum ad principium Aortæ inuenies, vbi Tertium collocat *Aristoteles*, quod ex *ipsomet* probatur lib. 1. de *hist. animal.* vbi scribit Cor adnexam esse Aortæ, iuxta sinum medium. Ergo sinus apertus in principio Aortæ constituendus. Clarius id exponit lib. 3. de *historia animal.* Aorta è medio sinu prodit, verum non eodem modo quo vena. Cum autem Aorta è sinistro sinu transeat per medium septum, vt se interponat Venæ Cavae & Venæ Arteriosae, Tertius ille sinus videtur in Aortæ principio, aut ipso septo Cordis collocandus. Id etiam confirmatur ex *Aristotele*, lib. de *simon.* capite ultimo, ex tribus Ventriculis qui habentur in Corde, is qui in medio est utrique extremo communis est, atque extremi specus sui.

guinem ab utraque venam maiore & Aorta recipiunt, in medio sinu distinctius  
 lius fir. Sed notabis *Aristotelem* nullibi ternos ventriculos humano Cordi assigna-  
 nam *lib. 4. de gener. animal. cap. ult.* dum hominem elephanro comparat, *duos*  
 tantum Ventriculos attribuit. At tres Ventriculi cum reperiantur in Corde auium  
 & piscium, vt obseruauit *Casalpini*, *lib. 3. questionum Peripateticarum, c. 3.* non mirum  
 si in genere animalium tres Ventriculos Cordis constituerit *Aristoteles*. A *de*  
*Casalpino* *Rondeletius* demonstraerat tres Ventriculos Cordis in piscibus, lege *lib.*  
*1. de piscibus pag. 67. & 68.* Certum est *Aristotelem* duos tantum Ventriculos in Corde  
 constituere: fatetur tamen *lib. 3. de part. animal. c. 7.* melius fore si tres adessent Ven-  
 triculi, vt vnus commune principium sit: at si reperitur quiescere debet, dum alij  
 mouentur, vt per eum ductum patentem à dextro Ventriculo elabatur sanguis in si-  
 nistru. Talis reperitur in Cordibus maiorum animalium, & si defir, eius locum te-  
 nent foraminula & fossulæ in septo Cordis exaratz.

Rursum inter *Galenum* & *Aristotelem* altera dissensio est de Caliditate Ventricu-  
 lorum. *Aristoteles* *lib. 1. de partibus animalium*, Dextrum calidissimum esse tradit ob  
 sanguinis abundantiam, Sinistru verò frigidissimum non per se, vt interpretor, sed  
 ex accidenti, propter affluxum aëris inspirati. At si inspiratus aër non perueniat ad si-  
 nistru cordis Ventriculu, sed in pulmonibus tantum consistat, ad refrigerium  
 pulmonum, & ad expurgationem fuliginum, quas continenter Cor euomit. Aliter  
 explicandus est *Aristot.* iudicio Cremonini: nam calorem Ventriculorū considerauit,  
 non tantum ratione insiti calidi primigenij, verum etiam ratione sanguinis affluens,  
 sanguis aurem ab Hepate ad Cordis dextrum Ventriculū deuectus, calidior est, quam  
 vbi peruenit ad sinistru, ibi enim retunditur & mitificatur ab ipso temperamento  
 Cordis, quod est temperatissimum in ratione viuendi, & potissimum insidet sinistro  
 Cordis Ventriculo, tanquam crassiori & maiori Cordis portioni, isque calor Vitalis  
 similis est generatio, qui respondet elemento stellarum, ex *Aristotele*. Præterea ca-  
 lidiores dextrum Ventriculu Cordis iudicauit *Aristoteles*, quia primus mouetur,  
 & vltimus moritur, quod indicium est maioris caloris, itaque sinistra Ventriculi san-  
 guis dicitur ab *Aristotele* frigidissimus comparatè, & habita ratione alterius sangui-  
 nis, qui appellat ad dextrum cordis Ventriculu. Aduersus *Aristotelem* *Galenus* *lib.*  
*2. temporum*, experientiam Anatomicam adducit: si in sectione viui animalis digitum  
 in sinistru Cordis ventriculu intrudas, non tantum dextro, verum & qualibet  
 corporis parte calidiorem senties: quod repetit *libro de inæquali intemperie, c. 4.*

Interdum Ventriculi Cordis in cono, intervallo quodam dirempti sunt, quod oc-  
 casionem dedit quibusdam scriuendi in certis animantibus Cor duplicatum reperi-  
 ri. Huius rei rationem Anatomicam profert *Galenus* *lib. 7. Admin. Anat. cap. 11.* de  
 Galli Corde, quod binos habebat vertices. *Albertus Magnus* recitat duos mucrones  
 in Corde Simij inuentos fuisse, & nuper in sectione Cadaueris, Cor bino vertice dis-  
 sectum à *D. de Cledat* peritissimo, Anatomico obseruatum fuit. De ea Fissura in co-  
 no Cordis intelligendus hic locus *Pliny*, Perdices in Paphlagonia bina sunt Cor-  
 da. Ventriculorum circumscriptione obseruata, te conuerter ad Cordis appendi-  
 ces, vel potius apophyses ex *Galeno*, cum ex Cordis substantia attenuata & dilatata  
 producantur in omnibus animalibus, vbi Cor adest, ibi reperiuntur Auriculæ, vel  
 quid analogum, atque semper sequuntur numerum Ventriculorum, ita vt si vnus  
 Cordis Ventriculus reperitur, vnica aderit auricula, cuius tanta est necessitas in  
 Corde, vt eius formationem Natura exordiat ab auricula: sic quibusdam animali-  
 bus, scilicet insectis, extat vesicula pulsans instar puncti sanguinei: Sunt autem in basi  
 sitæ, quæ ab effluie auriculæ nominantur ab *Hippocrate*, *libro de Corde & morbo sacro*,  
 quamuis nihil conferant ad auditum, appositæ sunt vas materiam aliquam puta san-  
 guinem aut spiritum ad Cor deferentibus. *Galenus* Auriculas Cordis tanquam prom-  
 ptuaria materię sanguinæ vel spirituosæ quæ ad Cor appellit, constatas, & vasis illi  
 materiam ad uenarum apposititas esse scribit. Vel sunt tanquam diuerticula, in quæ  
 recipitur materia in Cordis ventriculis regurgitans. *Vesalius* ridet istos vsus, nec me-  
 liores profert. *Paracelsus* ad aëris conseruationem extructas esse Auriculas Cordis o-  
 pinatur, quod prius animaduersum fuerat ab *Hippocrate*, *libro de Corde*, dum ait aures  
 priuatim & seorsim à ventriculis insari & considerare, mox foliis fabrilibus com-  
 parat, per quos ventus trahitur ad ignis ventilationem. Auricula dextra Cordis gran-  
 dior & capacios incubat venæ Caux orificio, sinistra minor & angustior, atque in

circuito cristata superiecta est Arteriz Venosæ. In Corde cerui sinistram atriculam dextra ampliorem esse obseruavi, & ossiculum in orificio Aortæ appositum, vt sustineat Valvulas ostiarias, siue ianitrices. In Corde *Illustriss. viri D. Nicolai Primarii Præsidis Camera computorum, octogenarii*, ad radicem Aortæ ossiculum quale in ceruis, repertum fuit, & in Corde *Regine Matris Maria Mediceæ* ossiculum à me deprehensum in pollinatura Cadaveris. Os in Corde constituit *Aristoteles*, vt sit basis & fundamentum motus in Corde, nec in omnibus animalibus reperitur, sed in equis, bobus. *Albertus Magnus* in ceruis, in homine & multis animalibus: vide *Hieroclem, lib. 2. Veterinaria, in præfatione*. Auricularum substantia diuersa est à valis, & Cordis parenchymate, ex *Galeno lib. 2. Admin. Anat.* Attamen crederem potius Cordis portiones esse quam vasorum quibus affixæ sunt; peculiarem habent motum à Corde distinctum, quod indicauit *Hippocrates lib. de Corde*. Cor tota sua natura agitur: At Aures priuatim, tum intumescunt, tum flaccescunt: In sectione viuientis animalis Auriculæ etiam deficiente Cordis motu, palpitant aliquandiu, omnisque vitalitas Cordis in his clanguescit ac emoritur, ex *Hippocrate lib. de Corde, & Galeno 7. Admin. cap. 11.* quod sæpius in viuicis canibus obseruatum fuit.

Mirari subit, cur elixatum Cor magis induretur, quam tenerescat nisi ademptis auriculis. Nec Lucius piscis exactè coquatur, nisi extracto Corde. Neque facilius est alterius miraculi interpretatio: Cur eorum Corda qui veneno sublati sunt, siue morbo cardiaco perire, non possunt cremari, vt historia memorabili demonstrat *Plinius lib. 11. cap. 37.* Ex hoc fundamento Vitellius probare conatus fuit, quod Pisu Germanicum Cæsarem veneno sustulerit, quia Germanici Cor comburi non potuit. Contra autem Piso saluatus & defensus fuit, quod Germanicus morbo cardiaco decesserit. Simile exemplum narrat *Illustrissimus Thannus lib. 1. historiarum de Helueto gladiatore Hndricho Zuinglio*, quod cadauere flammis tradito, solum Cor exuri non potuerit. An id contigit proprietate occulta, si verum quod narratur de articulo dextri pedis in *Pyrrho Epirotarum Rege*, qui comburi non potuit? An quia eorum qui cardiaco morbo aut veneno perire Cor repletum est sanguine crasso, concreto in ventriculis & magnis vasis, instar medullæ sambucinæ intra suos tubulos. Ita humidius quam par est Cor, postremum est quod exurit, quia difficilior resistit adustioni, sed tandem crematur, & in cineres vertitur, nihil est carneum, quod vim ignis eludere possit, etiam Salamandra crematur & incineratur, cuius cineres præscribit *Galenus: & Aristoteles, atque Dioscorides* ignibus indomitam scribere, ex aliorum relatione. Adde quod cum sit Cor pulmonibus obuolutum, capsula Inclusum, aquæ immersum, & per adustionem totius corporis sanguis ad Cor veluti centrum repellatur, forsitan tardius crematur, cum sit in meditullio corporis collocatum.

Auricularum inspectio nos trahit ad Cordis Vasa, quæ numero sunt quatuor, duæ Venæ, nempe Vena Cava, & Vena Arteriosa: Totidem Arteriæ videlicet Aorta, & Arteria Venosa. Quemadmodum enim vniuersum terrarum orbem quatuor magna flumina alluunt & irrigant, Nilus, Ganges, Tigris & Euphrates, quæ sunt ex Paradiso quatuor flumina prodeuntia, vniuersam terram irrigantia, *cap. secundo Genesios*: Sic in Corde quatuor sunt insignia vasa, fontes ac flumina humanæ naturæ, quibus vniuersum corpus alluitur. Venæ sunt in dextro ventriculo, quarum vna scilicet Cava sanguinem adfert: Altera, nempe Vena Arteriosa, è Corde depromptum Pulmonibus suppeditat. Arteriæ in sinistro ventriculo radicanter. Aorta Truncus arteriarum sanguinem spiritumque vitalem à Corde excipit, totique corpori distribuit. Arteria Venosa triplicem vsum habet, ex opinione Anatomicorum aërem inspiratum desert in Cor; spiritus vitalis purgamenta, nempe fuligines reuehit; quin etiam arteriosum sanguinem Pulmonibus suppeditat. Vix crediderim hæc tria per eandem viam eodem tempore commeari, & discurrere, atque ipsam arteriam pulsare. Nonnulli verò potant moueri cum pulmonibus, quia excipit aërem à pulmonibus, & transmittit ad pulmones fuligines: nam si sequeretur motum reliquarum arteriarum ipsiusque Cordis, pulmonum motus ei valde incommodaret.

In his vasis multa foris & intus obseruantur. Extrinsecus obseruabis situm & substantiam. Nam Vasa Cordis eiusdem naturæ & officij, & ab eodem ventriculo prodeuntia, non sunt proxima, sed alternatim disposita, Arteriæque Venæ semper intericiuntur: Itaque si à Vena Cava incipias, sequens vas est Aorta, Tertium Vena Arteriosa, Quartum in sinistro latere, est Arteria Venosa, quæ non apparet nisi dextræ;



sum inoerit Corde. Cor eo situ Vasa collocantur? ut communis ordo naturæ ubique seruetur, quæ Venæ semper Arteriam comitem adiungit, nonquam eodem duas Venas simul copulat, vel ut Aorta in anteriora emicans, Cordis affecti aut sani indicium proderet pectus feriendo, quod si transuerfam & profundam ducas sectionem supra Cor iuxta basim, deprehendes tres eius Cavitates ex *Aristotele*, vnam in Venâ Cauâ, secundam in Aortâ, tertiam in Venâ Arteriosâ, sique medius Ventriculus in Aorta collocabitur, ex *Aristotele*, reuolato Corde in latere sinistro reperies Arteriam Venosam, quæ est opposita Aortæ. Quamuis hæc duo Vasa ab eodem Ventriculo sinistro prodeant: apparent tamen ita seiuncta, cum sint opposita & in diuersis lateribus sita, ut Aorta videatur Ventriculū vnū constituit.

Substantia autem duorum Vasorum Cordis, nempe Arteriæ venosæ & Venæ Arteriosæ est admirabilis, quia naturam & substantiam aliarum Venarum & Arteriarum non imitantur. Nam Vena substantiam habet Arteriæ, Arteria verò Venæ. Talem substantiam in prima foetus conformatione obtinuerunt, quia Vena producit ab Aorta, ut Arteriæ munere fungatur in foetu. Et Arteria à Caua propagatur, tumque Venæ officium præstat: sed foetu in lucem edito hunc usum in alium commutat, seruata tamen primaria substantia, quæ adiuncto cognomine significatur, quando Arteria vocatur Venosa, & Vena dicitur Arteriosa. Verum plenior huius rei explicatio ad *Fetus bifuriam* pertinet: inueni sæpius in adultis huiusmodi adhuc anastomosim Venæ Cauæ com Arteria Venosâ, ita ut sanguis possit liberè per illud furamen meare in Venam Cauam illi subiectam, quod est notatio dignum: Altera Anastomosis semper est excisæ & abolita.

Intra Vasa & in ipsis orificiis Valuulas obseruabis. In singulis tres, exceptæ Arteriâ Venosâ, cui binæ dantur, sæpius ternæ apparent. Sunt autem Valuulæ, pelliculæ seu membranulæ in ipsis vasorum orificiis appositæ, quarum alie sunt Tricuspides, siue *mitralis*, trifidæ, siue sagittariæ, vasis quæ sunt substantiæ venosæ ad Cor materiam, puta sanguinem vel spiritum deferentibus adiunctæ, ne quod semel influxit, remigret. Tales possident Vena Caua, & Arteria Venosa. Aliæ sunt Sigmoides, siue semilunares à forma litteræ Græcæ veteris C, lunata scriptum testidine Sigma octo capit de meosa semicirculari, apud *Martialem*. Ideoque semicirculares dicuntur, ipsis vasis quæ sunt substantiæ arteriosæ materiam, nempe sanguinem venosum & arteriosum à Corde emittentibus agglutinatæ, ut quod elapsum est, regrediatur. Sed istas Valuulas intueri non datur nisi resecto Corde, quapropter bis omnibus exterioribus diligenter inspectis, scalpello dexter Cordis ventriculus in media parte transuersim inciditur, & fornice recta sectio fiat versus orificium Venæ Cauæ, ut Trifidas Valuulas obseruare queas, columnis carneis tribus affixas. Deinde altera sectione facta perquires orificium Venæ Arteriosæ, in qua tres Valuulas Sigmoides videbis: similem sectionem facies in sinistro Cordis Ventriculo, ut Valuulas Sigmoides in orificiis Aortæ, & Tricuspides in Arteria Venosa inspicias. Has omnes Valuulas etiam intacto Corde ipse ligare licet, resectis vasis vsque ad basim Cordis. Sed in ventriculo dextro Columnas carneas Valvularum Tricuspidum, numero quinque vel sex exare, graciliores quàm in sinistro videbis. In quo duas tantum crassiores & solidiores reperies, sicuti Valvularum membranæ crassiores existunt. Porro si Valuulæ Sigmoides prohibent elapsi sanguinis refluxum, quomodo per phlebotomiam humor in Polmone collectus in Cauam remigrare potest? deinde venæ Pulmonum nullam cum Caua communione habent, & sanguis à Corde Polmonibus suggeritur: Equidem existimo duobus vel tribus phlebotomiis depleta Vena Caua, redundantem in Pulmonibus sanguinem in Cor, cedentibus Valuulis, vi remigrare fugâ vacui. Quare *Fernelius* notauit in Pulmonum affectibus, sinistram potius brachium quàm dextrum aperiendum esse: rationem assignat. Pulmonum, Cordisque affectus reuellet, pariterque deriuat, interior cubiti sinistri, potius quàm dextri vena secta, quandoquidem Pulmonum venæ à dextro Cordis sinu prodeant, hic autem in sinistram parietem Venæ Cauæ ioteritur, qui per alam sinistram in cubitum excurrit: sique seruata fibrarum rectitudine sanguinis vacuatio fiet.

Apertis duobus Ventriculis, internam superficiem inæqualem, exasperatam, ac veluti cancellatam & cuniculosam obseruabis, ne sanguis & spiritus Cor ingressa prius non excidant, quàm perfectionem suam adepti fuerint. Apertior est sinister ventriculus dextro, illum propterea scripsit *Hippocrates* attritum & erosum esse ab igne, ibi conclusio.

Postea Septi foraminula perquires, vt viam & transitum sanguinis à dextro in sinistrum ventriculum cognoscas ex *Galenus doctrina cap. 17. lib. 6. de vsu part. & lib. 3. de nat. facul. cap. 15.* Neque assentiri possum *Columbo*, qui sanguinem per Venam Arteriosam magnitudine & crassitie Aortæ æqualem, in Pulmones deriuari sustinet, vt ibi præparatus per Arteriam Venosam purior in sinistrum ventriculum refundatur: neque ab hac opinione multum recedit *Vesalus*, qui fatetur ingenuè se ignorare, quomodo per septum Cordis crassum, è dextro sinu in sinistrum, vel minimum quid sanguinis assumptum possit. *Arantius in obseruat. Anatom. cap. 33.* de illa traductione sanguinis per septum, suas dubitationes proponit, qua de re vide *Hofmannum pag. 112. comment. in Galen. de vsu partium.* *Valuerda* fauet suo præceptori *Columbo*, cuiusque opinionem tueretur, de illa traductione, & præparatione sanguinis intra Pulmones. Huic opinioni subscribit *Spigelius*, ramulos Venæ arteriosæ per Anastomosis furculis arteriæ Venosæ vniri iuxta bronchia asperæ arteriæ, vt aëris benigna aura fruantur & refrigerentur: sicque sanguinem arteriosum in dilatatione Cordis subire & ingredi sinistrum Ventriculum, refundi in Aortam constituto Corde. Hæc questio de traductione sanguinis à Corde per Pulmones est magni momenti, & diligenter à Medicis consideranda, ad curationem morborum Pulmonis, in quibus non erit parcendum venæsectioni.

Quamuis autem hæc Foraminula in mortuis non sint adeo manifesta & laxa, vt in viventibus, non est dubium trans septum Cordis sanguinem traduci. In Corde elixaro hæc Foraminula manifestè patent. Ac sanè medianus Cordis paries versus mucronem conspicuè peruius est, atque septum ibi tenuissimum, vt faciliùs sanguis percolaretur: deinde intra Arteriam Venosam paulo infra Valvulas, alia reperitur Valuula, fere semper hiuala, qua leuiter sublata stylo, foramen exiguum apparet, per quod sanguis à Vena Caua proxima in arteriam venosam liberè fluit in sinistrum Cordis Ventriculum. Hic meatus est à *Botallo* obseruatus, quem appellat venam arteriarum nutricem, & est Anastomosis altera vasorum Foetus, quæ tanquam necessaria ad vltimum vitæ spiritum in quibusdam extat, atque remanet.

Intra Cordis Ventriculos *Galenus*, libro 6. de vsu partium, c. 8. Ligamenta robustissima constituit, quæ retracta systolem efficiunt: putarem diastole potius inferuire. Idem *Galenus lib. 1. de motu musculorum* ista ligamenta tendonibus similia esse scribit: *Nicolas Masse* parui sunt Musculi, meoque iudicio nihil sunt aliud quàm Valuulæ tricuspides cum columnis carneis, quas quidem portiunculas carneas instar musculorum contrahi in dilatatione Cordis existimo, vt basim Cordis ad conum terrahant, est enim verisimile in diastole basim potius ad conum adduci, quàm conum solidum & durum reduci ad basim. Si obiciās intra Cordis cavitates contineri. Respondeo Crustata Aquatilia & Terrestria musculos habere in cavitatibus testarum. Maior Crustatum Aquatile, flexores & extensores musculos habet intra testarum cavitates.

Intra Ventriculum dextrum ad Orificium Venæ Causæ, in quibusdam repentina ac inopinata morte suffocatis, deprehendi frustula carnea, pugni magnitudine inuicem conglobata: & nuper in Episcopo Malleacensi id à me fuit obseruatum. Propterea qui premuntur spirandi difficultate cum pulsus interceptione, sine rursu, sine vlla suspitione hydropis Pulmonum aut Vomitiæ, suspectam habere debent repentinam suffocationem Cordis ab influxu sanguinis in carnem concreti, qui in diastole attractus in Ventriculos derepente Cor obruet & suffocabit. Anno Domini 1602. Parisiis in Corde duorum Polonorum fratrum hæc miracula visâ fuere. Alterius Cor solidum erat sine ventriculo, sed ad basim Cordis vasa erant admodum dilatata, & Anastomoses illæ quæ sunt in Foetu remanserant. Alterius Cor in medio septo insignem glandulam habebat.

De Neruis Cordis magna est inter *Galenum & Recentiores* altercatio. *Fallopium* plerum Nervorum Cordi substratum, illius gratiâ constructum esse scribit, vt inde numerosa soboles Nervorum in Cordis substantiam spargeretur. *Piccolominius* motum Cordis opem nervorum perfici statuit, quamuis exiles Cordi distribuuntur. Si vnum non duo mouendi principia in nobis sunt constituenda, Cerebrum animæ sentientis & mouentis sedes, omnium motuum principium erit, sicque nervus non solum facultatem sensificam, sed etiam motiuam deferret. Ridiculum est quod subiungit, nervulis Cordis obstructis repentinam mortem accidere. Nec minor est inter *Gæ-*

lenum & *Aristotelem* dissensio de ortu neruorum à Corde: Nam *Aristoteles* Cor sedem facultratis vegetantis, & sentientis constituit: inde Nervos & Venas oriri statuit. Reprehenditur tamen à *Galeno*, quod inspectis Cordis ligamentis, inde nervos oriri crediderit: Sed quomodo Cor sit radix & origo neruorum, sic explicat *Crematius*, per nervos intelligere oportet ligamenta, quæ artus inter se colligant: hoc posito, cum membra inter se iuncta & coaptata vnum corpus debeant efficiere sub vna forma, colligationes illæ neruorum videntur ortum habere à Corde, quamuis eorum continuïtas nequeat demonstrari. Attamen *Aristoteles*, lib. 3. de *historia animalium*, c. 6. proponit coniunctionem à Venis ad nervos, quæ sit interuentio fibrarum. Alibi dicit *Aristoteles* Venas definire in nervos, vt probat *Casparinus* in *questionibus Peripateticis*.

Verè censet *Galenus* Cordis facultatem pulsficam ipsi innatam, ex parenchymate procedere, non autem à nervis, qui tenuissimi sunt, & inspectabiles, quibus etiam præcisus, dum Cor auellitur, non cessat palpitare, quod non accideret, si ad motum essent necessarij nervi. Ipsemet *Aristoteles* agnouit Cordis motum naturalem esse, non animalem ac voluntarium. Lib. de *respirat.* cap. 20. in Corde tumefactio ebullientis humoris, qui semper è cibo accedit, pulsum facit, explicans eleuantque extremam Cordistunicam, atque hoc perpetuo fit, & sine intermissione, sed motum istum Cordis non pendere ab affluxu sanguinis, vt statuit *Aristoteles*, & *Hærenus* confirmavit. Inde manifestè probatur, quia Cor palpitat statim atque formatum est, vt in ovis tri-duo incubatis à Gallina obleruatum fuit. At tunc tempotis Cor nondum excauatum est, nec admittit sanguinem, nondum cavitatibus efformatis. Accedit, quod Cor euulsus & resectus à suis vasis in animali viuente, aliquandiu palpitare deprehenditur, sine vilo appulsu sanguinis, ergo facultas pulsfica Cordi insita est, nec pendet ab appulsu sanguinis, quoad productionem, sed de continuïtate motus verum est.

Motus autem Cordis duplex est, Diastole, & Systole, quibus gemina quies Peristole interiecta est. Magna dubitatio & cōtrouersia est, quomodo fiat iste motus Cordis: An Diastole fiat Cordis parietibus diductis & eleuatis, vt in folle: Systole iisdem concidentibus & mutuo appressis, vt opinatus est *Erasistratus*? Vel si in Diastole conus ad basim rectis fibris attrahitur, vt Cor sphericum & amplius reddatur, longitudine in latitudinem mutata. In Systole rectis fibris relaxatis, transuersarum beneficium conus à basi recedit, ex doctrina *Galeni*, cui sublecribit *Pesalins*, lib. 6. c. 10. probabile est in Diastole basim ad conum accedere, in Systole recedere, quia conus solidissimus ac durissimus inuerti non potest, vt adducatur. Deinde conus immobilis existit, vt fibræ Cordis perpetuò motæ principium habeant immobile, cui innitantur: Basis autem Cordis mollissima est, ac facillè mobilis, vasa quatuor continet, tam aduentitia, quam emittentia. Quidni igitur basis in Diastole ad conum accedet, retractis etiam vasis, quæ materiam suppeditant, vt sanguis & spiritus commodius eliciantur. Adde quod Columnæ carnez à cono ad basim producunt, quæ vasis adferentibus sunt attributz, hunc motum euidenter adiuuant, dum basis à cono recedit in Systole, expellitur sanguis arteriosus in Aortam, & venosus in Venam Arteriosam. Quænam pars Cordis pectus ferit ad læuam papillam? An conus vel basis? existimat *Aristoteles* variis in locis conum esse, quod perspicue declarat, libro 1. de *historia animalium*, Cordis mucro pectus versus directus est omnibus animantibus quæ pectus habent, quin etiam iis quæ pectore carent in anteriorem partem vergit Cordis mucro, sepe verò latere potest. Ego verò crederem in homine pectus ferire basim Cordis, cum Aortâ ibi eminentè durissimâ & cartilagineâ, ita vt Capsulâ suâ conclusum Cor, simul & semel eodem tempore in Systole feriat cono centrum nerueum Diaphragmatis, & basi, seu potius Aortâ pectus. Interdum tanta dilataio Aortæ obsecratur, vt pugnam exciperet. Verisimile est propter violentum motum Aortæ duriter pectus ferientis id accidisse, tangit enim Aorta pectus dum excipit, quia dilatur, & atrollitur confrecto & expellente Corde. At in brutis, quæ prona terram spectant, conus ferit pectus, quia Cor quamuis Pericardio sit inclusum, non dirigatur ad centrum Diaphragmatis, quia carent illa adhesionē, quæ in homine reperitur, quamuis Cordis & auricularum motus similis sit, diuerso tamen tempore perficitur: Nam cum dilaturur Cor contrahuntur auriculæ, vt expellant in Ventriculos. Quando Cor constringitur auriculæ dilatantur, vt excipiant portionem humoris expulsi, tanquam fermentum ad nouam productionem. Vtriusque motus diuersa est causa

causa ex *Galeno*, Cor enim quia dilataitur, impletur: At auriculæ, quia implentur, distenduntur. Ergo conditæ sunt auriculæ eo fine, ut in systole Cordis, sanguis, tam Venosus quam Arteriosus in eas tanquam diuerticula consulant, inde pendet motus earum si non habeant inætum, ut Cor, vel si appulsu materiæ ibi exceptæ priusquam sinus ingreditur, moueantur, perinde est, ac si exciperent, Corde expellente. Existimo omnino falsam esse *Columbi* opinionem, qui putat in diastole, sanguinis, & spiritus expulsionem fieri, in systole horum liberam esse exceptionem, non autem attractionem, sed opus est robore ad expulsionem, idcoque fortior est systole, & diastole debilior ac laxior ut excipiat. Quod decepit *Columbum* est ipsius Cordis abbreviatio, quæ fit in diastole, quam putauit esse contractionem, quia tum breuius redditur Cor primum mobile, quemadmodum reliqua corporis mobilia instrumenta euadunt breuiora, dum agunt & mouentur, cuiusmodi sunt musculi, quorum motus duplex est, alter per se nempe contractio, alter per accidens, uidelicet extensio, siue relaxatio. Sed non ita fit & accidit in Corde, nam duo illi motus dilatationis & contractionis insunt per se, quia cauum materiam excipit & emittit. Proinde diastole non potest esse actio, ut systole passio, sed ambo illi motus erunt actiones per se, sibi inuicem succedentes. Dilabitur Cor abbreviatum per lacertulos, siue columnas carneas intus collocatas, fibris rectis conspersas, quales recipiunt septum, & parietes interni. Contrahitur Cor elongatum & extensum, à fibris circularibus vndique prementibus, quæ sunt extrinsecus circumiectæ, ut videre est in Corde bubulo elixato. In isto motu Cordis auriculæ non simul mouentur, quia vasis materiam ad Cor deferentibus sunt annexæ, & infra valvulas tricuspidales collocatæ. Ac proinde primæ excipiunt, & in ventriculos propellunt quod continet, at non possunt euacuari contractæ sine systole, tumque in Cor expulsa materia dilatat ipsam, sicque dilatabitur Cor contractis auricularibus. Proinde non erravi quando dixi cum *Varolio*, ut opinatur *Harnus*, quatuor esse motus in Corde, tempore & loco distinctos. Quoniam diastole vtriusque ventriculi differt à diastole auricularum, tempore & loco. Systole itidem Cordis differt eo modo à systole auricularum, ut superius probavi. At ipse *Harnus* motum incipere ab auriculis, & in ventriculos progredi in Cordibus piscium & frigidorum animalium sanguineorum multoties obseruauit, sic ut prius desinat Cor pulsare quam auriculæ, & cessante motu dextræ ventriculi, qui vltimus micat auricula dextra palpiet adhuc. Isthec omnia non probant auriculas eodem instati moueri cum Corde, amborum eadem esse simul diastoles & systoles. Quamuis enim auricularum & Cordis motus successui fiant cum summa celeritate, quemadmodum in horologiis celeris sunt rotarum circulationes, & in sclopeti dispositione omnes machinæ velocissime agitantur, sunt tamen distincti tempore, loco, & vsu. Ceterum auriculas Cordis quauis membranosas motum habere priusquam Cor moueatur manifestè probauit eruditissimus *Harnus*, motumque ab illis incipere, in eas desinere, atque naturam formationem Cordis exordiri à Vesiculis, quæ palpitant, priusquam corporatura Cordis facta fuerit. Sed vnde motus ille proficiscatur, non satis adhuc liquet, nisi dicamus cum *Galeno* auriculas esse apophyses ipsius Cordis, ac eadem facultate pulsifica cieri. Quod si auriculæ appulsu sanguinis dilatentur, quidni ab eodè mouebûntur ex *Aristot.* opinione de motu Cordis. Ac proinde auricularum motus pendeat à sanguine spirituofo, quem Cor expellit in auriculas, vel erit motus hic auriculis infusus qualis inest arteriis, at *Harnus* coniecit Cor contractum expellere spirituosum sanguinem, quem arteriæ dilatatæ excipiunt & mouent omnes, eodem instanti per celerem effusionem spirituosæ substantiæ, ut in longissimis trabibus ictus & motus ab vno extremo ad aliud momento traducitur. Id etiam probari potest exemplo vini, cuius motum, si obseruaueris eo tempore, quo spiritus ab eo vi caloris eliciuntur in vasis circulatoriis, ipsa tangendo arteriarum motum aliquatenus comperis. Imo vehementius palpitare quod non aliunde proficiscitur, quam à spiritibus in vino contentis. Quare eleganter *Aristot. lib. 3. de hist. anim.* scripsit, quod palpitat intra venas sanguis est omnium animalium, polique simul vndique mouetur, quia quando iu uiuit, tandiu animatur & feruet. Ideoque continuus appulsus sanguinis ad Cor directus tamen ab Animâ, motus perennitatem facit. Inde probatur per circulationem sanguinis in Corde ipsum Cor assidue moueri, & sanguinem alimentarium in Corde postremum elaborari, ex doctrina *Aristotelis*.







IOANNIS  
RIOLANI  
ANTHROPOGRAPHIÆ  
LIBER QVARTVS.

PRÆFATIO.

Proponitur  
in publi-  
ca Amco-  
rie.



INTER veteres Philosophos, qui fabricam Hominis admirabilem curiosè indagarunt, dum Hominem supra ceteras animantes extollere & præferre meditantur: Eum Mundo compararunt, & quidquid in hoc orbe vniuerso coërectur, in Homine reperiri voluerunt: Nec tamen vtriusque mundi analogiam perfectè demonstrarunt. Sic Aristoteles Hominem videtur *Microcosmum* appellasse, lib. 8. *Physic.* 2. sed antea *Democritus* & *Pythagoras* isto nomine vti fuerant. Forsan *Democritus* per innumeraabiles Mundos quos constituebat, Homines intelligebat: & Philosophus ille *Anaxarchus*, cum tot populos ab *Alexandro* debellatos videret, alios mundos ipsi vincendos superesse dixit, Homines forsan intelligens. Nec abs re dubitaret aliquis, Num *parvus Diacosmus*, scilicet *commentarius à Democrito* scriptus, tractaret de comparatione Hominis cum mundo: Nam illum peritum fuisse Anatomicum reliquæ eius commentationum id satis testantur: scripserat enim de natura *Hominis*, siue de *Carne* duos libros, & alios in arte Medica: atque in *Epistolis* ipse testatur, cum ad eum *Hippocrates* accessit, se tum scribere de mundi dispositione, & de natura celi & *Astrorum*. Testis est *Porphyrus*, *Pythagoram*, Hominem *Microcosmum* nominasse, tandem Medici istam appellationem approbarunt. *Galenus* libro tertio de *vita partium*, Hominem appellauit *Microcosmum*, aique comparationem Hominis cum mundo eleganter ibidem exponit. *Rufus Ephesus* lib. 2. ex doctrina antiquorum Philosophorum, Hominem mundo similem esse, & *Microcosmum* iure vocari scribit. Id etiam attestatur *author libri, an animal sit, quod in vtero continetur. Platonis*, si credimus *Philoni Iudeo*, lib. *Quis diuinarum rerum heres*, Hominem mundo assimilari, quia ut mundus anima & corpore constat, sic Homo ex anima & corpore constitutus est: propterea mundum magnum Hominem appellabat, & Hominem paruum Mundum. Quod videtur ex doctrina *Trismegisti*, in *Pimandro*, cap. 8. & 10. depromptum, qui mundum, primum animal, Hominem, secundum animal esse dixit. Eandem sententiam *Macrobius* retinuit & expressit *comment. in somnium Scipionis*. *Physici* magnum Hominem Mundum, & Hominem paruum mundum esse dixerunt.



*Aristoteles* ipsius similitudinis nempe Hominis & Mundi causas assignat, lib. 1. de *historia animalium*. Partes, inquit, Hominis tam superiores quàm inferiores ad situm superiorem & inferiorem Orbis Vniuersi dispositæ sunt, similiter & priores, & posteriores, dextræ & sinistræ. Paulò post subiungit: quoniam Homo ad Vniuersi habitum institutus est, idcirco partem istam, videlicet Caput, habet respondentem parti sublimi Vniuersi. *Porphyrius* in *alta Pythagoræ*, Hominem Microcosmum dici non putat, quod ex quatuor elementis constet, id enim cætera quoque animalia etiam minima habent, verùm quia omnes mundi Virtutes continet: Nam in Mundo sunt dii, & quatuor elementa, animalia, bruta, atque plantæ, omnes hæc potentias possidet Homo: Ideoque nosse seipsum nihil aliud est, quàm totius Mundi naturam nosse, quod fieri non potest, nisi Philosophiæ operam demus, quod Deus hoc præcepto nos admonet.

Eleganter *Heraditus* in *Epistolis*: si mundi naturam perspexi etiam Hominis novum morbos, noui sanitatem, meipsum curabo. *Gregorius Nissenus*, lib. de *apificio Hominis*, irridet eos, qui Hominem *Microcosmum* appellant, quia constat quatuor elementis, quæ habet cum brutis animalibus communia. Alium Homini præstantiam *Ecclesiæ* tribuit, quæ in similitudine huius Mundi creati non consistit, sed ad imaginem naturæ Creatoris facta est, ideoque cùm Homo ad imaginem Dei formatus esse dicitur, valent illa tantumdem ac si diceretur, Naturam humanam à Deo in omnem bonorum societatem vocatam esse: Nam si Dei natura perfecta quædam copia est bonorum omnium, Homo autem eius est imago haud dubiè simulacrum hoc Dei Princeps, ita exemplum referet, vt & ipsum bonis omnibus abundet.

Postquam *Rabbi Moses* proposuit Hominis Microcosmi comparisonem cum maiore mundo, ex elementis & partibus corporis consimilem esse, subiungit: comparatio ista ad singula animantia, quæ in membris suis perfecta sunt, trahi & extendi potest: neque tamen hæcenus vidi, qui asinum vel equum vocaret Microcosmum: Verùm, ornatio homo est hoc nomine, propter quandam rem, quæ ipsi soli præ cæteris animalibus est propria, facultatem nempe rationalem, hoc est intellectum materialem, quem apud nullum inuenies è reliquo animantium genere. Pari ergo modo in hoc vniuerso res quædam est, quæ tum totam illius compagem regit, tum principale eius membrum mouet, cui facultatem dedit reliqua omnia mouendi & regendi: sine re illa cessaret necessariò totus iste globus cum suis principalibus partibus: Res autem illa est Deus Optimus Maximus: hinc quemadmodum Homo propter vnicam hanc & solam rationem vocatur *Microcosmus*, quia in illo principium quoddam est reliqua mouens, sic propter hanc rationem Deus in lingua nostra vocatur *Vita Mundi*: Nec satis Homini dedisse putauit Deus, vt ipse alter Mundus effectus, partes omnes in se complecteretur, etiam semetipsum Homini tanquam dilecto filio præbere voluit, quod asserere minimè audem nisi sapientes, & ipsemet omnium bonorum largitor Deus idem testaretur. *Xylus Pythagoricus* Hominis Animam templum Dei esse iudicauit, sed exerta voce hoc *D. Paulus* pronunciauit, *Templum Dei quod estis vos*. Hæcenus Physici veteres & recentiores comparisonem, siue parallelum maioris mundi cum Homine inuestigarunt in vniuerso corpore Hominis.

Nos verò reuocamus ad Caput, illudque *Microcosmum* esse demonstrabimus, ita ut in anima, atque ipso Capite isthæ comparatio contineatur: sic enim in vniuersa rerum natura comparatum est, vt vnicuique formæ & essentix, sua quædam & certa materia sit analoga, ita vt verè dixerit *Sextus Philosophus*, corpus, siue materiam esse quandam formæ imaginem, quia locus debet esse proportionatus locato: quippe natura cuique animanti corpus animæ affectibus idoneum condidit: hæc quidem cognitione fiet, vt intuitus quoddam animal non antea visum prænoscas, qualem sub Cute structuram habeat: ac frequenter hoc indicauit *Galenus*, non aliunde eius cognitionem adeptus, quàm ex formæ perspicentia, quia singula animantia corporis structuram animi moribus facultatibusque propriam obtinuerunt, lib. 6. *administ. Anat. cap. 1.*

Propterea, cùm statuisset Deus ex omnibus animalibus solum Hominem facere ceteris, ei Caput dissimile dedit, vt Animæ domicilium pararet, cælo simile, à quo defluxit, & ad quod tandem reditura est: Ita scripsit *Aristoteles*. Caput Hominis ad formam orbis celestis figuratum esse. Quid sine Capite, inquit *D. Ambrausius*, est

Homo? Si caput inspexeris, agnosces Hominem protinus: aliàs iacet truncus ignobilis, sine honore, sine nomine, sola ære ducta Principum capita, vel marmore adorantur, proinde iure illi, vel consulti tori cætera famulantur membra, & vt Numen feruli circumferunt gestamine, quod censoria quadam potestate quò libuerit omnia dirigit.

Capitis igitur tanta est dignitas, vt rarior huius partis Homo dicatur ad imaginem Dei factus. *D. Apollonius* scribens ad *Corinthios*, cap. 7. dixit, *Vir non debet velare Caput, quod est imago & gloria Dei.*

In Capitis verò parte anteriore, vultus, verum & expressum est Dei simulachrum, quam partem Deus elegit, suæque diuinitatis participem effecit, cum in faciem primi parentis spiraculum vitæ insufflauit, & super eam lumen sui vultus signauit, sigillum diuinæ creationis certissimum. Nam in facie totus Homo tanquam in parua tabella continetur, ex illa Homines ab inuicem discernuntur, sexus, ætas, pulchritudo corporis demonstratur: quinetiam corporis mensura, reliquorumque membrorum proportio ex facie desumitur, itaut Pictores & Statuarij hanc solam partem exprimerè satis esse putent, vt qualis quisque fuerit, intelligatur, inquit *Aristoteles*, *sect. 3. 5. Probl. 1.* Denique ex facie tota dependet *Physiognomonica*, ex qua morum indicia sumunt Physici, sanitatis & morbi signa, vitæ, mortisque prælia depromunt Medici, quæ omnia in vultu elucen ad eum planè modum, quo in ipsa horologii facie, horæ quas abdixit intus rotæ conficiunt, foris agnoscuntur.

His ita constitutis, & diligenter obseruatis, cogimur fateri & agnoscere in Capite *Microscopium* contineri, ibique inuestigandum esse: Nam ex *Hipp.* Caput est *arcium*, totius corporis velut arx munitissima, totius vrbis propugnaculum, ac veluti compendium. In ista arce nihil eorum deesse debet, quæ in Vrbe reperiuntur, Arcem Dux siue Rex habitare solet, tanquam locum securissimum ac munitissimum: similiter in Capite residet Anima sensuum satellitio stipata, rebus omnibus instructa, quibus vniuersum corpus sustentatur: Nam omnes facultates corporis retrices in Capite sedem habent, & inde manant ad subiectas partes, cum sint ab anima inseparabiles: Quinetiam earum ductus & canales ab ipso Capite proficisci videntur: Venas ab ipso Cerebro enasci non est inuentum *Pelops*, *Præceptoris Galeni*, sed ante *Aristotelem* istud dogma propositum fuerat, quæ ipse notauit libro tertio de *Historia animalium*. Quinetiam interior Cerebri structura, partium inferiorum figuram æmulat. Forma Intestinorum in Cerebri anfractibus spectatur, qui falcati cornearum fistulam referunt. Vesica cernitur in Choana. Veteres Anatomici particulas quasdam, *Nates*, & *Testes* appellarunt. Conarium penem dixere Recentiores Anatomici, rimas inter nates & testes, Podicem & Vuluam appellarunt: omentum notabis in ipsa membrana tertio ventriculo obtexta, qui videtur officium Hepatis exprimere. Pulmones refert substantia illa Ventrículis superiecta porosa, venulis interpersa, quæ medioeriter attollitur & deprimitur per inspirationem, & expirationem, vel aëri fluxum spirituum. Cordis natura continetur in arteriis pulsantibus, & canalibus quatuor dure meningis qui perpetuò palpitant. Denique, cum lege quadam naturali contraria, idem subiectum afficere nata sint, si Caput ex *Hippocrate* morborum radix est, illud debet esse vitæ & sanitatis fons & fundamentum. Demonstrat *eruditus Medicus Pindaxius*, omnes febres ortum habere in Cerebro, ibi nasci, & inde deriuari in vniuersum corpus. Ne quis autem putet hanc doctrinam

De Microscopio in Capite locando nouam esse, & à me recentèr excogitatam, eius auctorem agnosco & produco *Hippocratem in Epistolis*. Mentis arcem inhabitant artes, Virtutumque genus, Dij, Dæmones, consilia, & sententiæ, in illaque regione magnus polus, id est, Mundus astris plurimùm semouentibus tanquam coronâ cinctus est. Nec ab ea opinione recessit *Plato*, *dialogo de Iustis*. Dij figuram Capitis ad rotunditatem mundi finxere, in eoque duos illos animæ diuinos circulos statuerunt. Idem sensisse videtur *Aristoteles*, dum Caput ad figuram orbis cælestis formatum esse scribit: Atque existimo *caput 12. Ecclesiasticus*, pertinere ad Caput humanum, quia quæ describuntur de senili corpore, eò referri possunt, & ostendunt comparationem illam de Homine cum mundo maiore. *Hippocratis* sententia, quæ à me fuit proposita obscura quidem est, multis ænigma videbitur, nisi referatur ad Caput, sed manifestam lucem adferet maioris Mundi cum Capite comparatio: Cum autem figura

mundi sit sphaerica & rotunda, Corporis verò humani figura longa & inæqualis, quis non animaduertit cum utroque nullam intercedere analogiam, nisi recurrat ad Caput.

Homo denominationem & essentiam suam habet ab anima residente in Cerebro. Totus igitur Homo in Capite continetur, & ibi Microcosmica analogia perquirenda: nec alio fine finxere veteres *Athlantem* humeris suis gestasse mundum, quàm vt significarent Hominem sapientem, humeris suis circumferre caput, in quo mundi figura & proportio expressa continetur: sic Homo celsiter *axem humeris torquet, stellas ardentibus aptum*. Truncum corporis communem habemus cum brutis animantibus, solo Capite distamus ab illis: Vt autem celsus & sublimis esset hic orbis, instar fulcri & fundamenti suppositus est truncus corporis, non quidem iners & inutilis, sed ab ipsa anima viuificatus: quocumque libuerit orbem illum caelestem deducit: In eo lingua proximè Capiti locata, animæ iussa defert. Manus per nervos agitata, exequitur imperata, Os pabulum ministrat, cùm sit radix vniuersi corporis, ex *Aristotele*.

Nunc persequamur nostram demonstrationem de Microcosmo. Imprimis probandum Animam esse rotundam, ideoque rotundo hospitio locari debuisse. *Xenophanes Philosophus* apud *Laertium*, Dei essentiam sphaericam esse voluit: similiter *Democritus* apud *Aristotelem*, cap. 2. lib. 1. de *Anima*, Hominis Animam sphaericam esse dixit, ex rotundis atomis: inde concludo, si Deus ex *Mercurio Trismegisto*, est intelligibilis sphaera, & mundus hic totus se præbeat in figura sphaerica conspiciendum: Homo, qui inter Mundum & Deum medium tenet, eandem figuram retinere debet, & imitari intellectualem illam sphaeram in Anima, sensibilem in corpore. Docuit *Aristoteles*, lib. 1. de *Anima*, rationalis Animæ operationem circulo similem esse: & *Auerroës* circularem motum rationali Animæ proprium esse statuit: Cur autem hæc dicta sint, explicat *Alicius* pag. 30. *caelestis agricultura*.

Præstantia Capitis pendet ab intellectu, sed non quiuis Homo intellectu præditus, dici meretur *Microcosmus*: Requiritur, vt Potentia intellectus in actum transeat, & sese ad contemplationem mundi intelligibilis euehat, Deumque Optimum Maximum Mundi vtriusque Architectum intueatur, & exquirat, atque hoc pacto Vir sapiens erit *Microcosmus*: Cùm enim Deus in se omnia complectatur, & Mundum ipsum, qui Mundum atque ipsum Deum mente comprehendit, nonne ipso mundo maiora comprehendit? ac proinde ipse præstantior est mundo, cùm in Deum videatur transformatus.

*Exemplumque Dei quisque est in imagine parua.*

Nec tantùm in intellectu consistemus: sed eius domicilium, nempe Caput accuratè perlostrabimus, & in eo materiale mundum perquiremus.

In primis scire conuenit, Caput, licèt cum reliquis partibus principibus habeat eandem conformationem, tamen in quolibet formationis tempore semper reliquis partibus grandius apparere. Proinde, iure *Albertus Magnus* scripsit Hominem in vtero solam habere Capitis magnitudinem. Forsan legerat apud *Aristotelem*, pueros in vtero esse *pumiliones*, quia Caput habent proportionem sui corporis valde magnum, coherèrè quàm in brutis animantibus accidit, quæ in vtero partes inferiores superiores maiores habent, quia vbi nata sunt, pedibus egent ad victum quærendum.

Cur autem Homini Caput cæteris partibus grandius natura concesserit, hanc rationem adfert *Mercurialis*. Caput est sedes animæ, quæ simul atque corpori infunditur, suum domicilium architectatur, exornat & amplificat: Ex Capitis magnitudinis reliquorum ossium natura dependet, ex *Hippocrate* lib. 6. *Epid.*

Nec tantùm spectanda humani Capitis magnitudo præ cæteris animalibus: Verum etiam eius dissimilitudo, tam in partibus internis, quàm externis. Nullum est animal, quod partem anteriorem Capitis similem habeat faciei Hominis, cui soli conuenit, reliquis animalibus os, vel rostrum. Nullum est quod habeat Caput sphaericæ figuræ vt Homo. Dissimilis Ossium compages in saturis & tætura, quia Ossa non sunt in brutis, vt in Homine duplicata, carent diploe siue medullis: Dissimile capillamentum obtinuit Homo. Caput mirum in modum volubile in quemcumque partem. Capitis interior structura diuersa est à brutis: nam Homini moles cerebri amplior & humidior: Processus mammillares aliter fognati: diuersa ventriculorum cerebri figura: meninges aliter extructæ, atque in basi cerebri belluini non obseruæ.

tur ea structura, quæ in Hominis cerebro spectatur. Itaque Caput Hominis sphericâ figurâ donatum, circularem habet motum, & duplici vertice in basi, tanquam duobus Polis voluitur. Cælum stellatum est, similiter & ipsa cutis capillata, quot enim pilî sunt in cute confusi, tot sunt stellæ: ex *Artemidoro* stellæ pilis respondent. In quibusdam scintillant & lucent in tenebris, & pexi ignis scintillulas excutiant, & interdum *vixta est lambere flamma comas*. Ea de re extat commentarius de capillis scintillantibus, & ignem producentibus.

Sequuntur septem orbes humani Capitis, Panniculus carnosus Saturni Orbem refert, Pericranium Iouis sphaeram, ossa Caluaria Martis orbem, dura Meninx Solis orbem, pia Meninx Mercurij, Cortex cerebri cineritius Venens orbem: Callosi corporis substantia candida Lunæ orbem repræsentat: Omnium istorum orbium in Homine quædam est connexio, & communicatio. Atque ipsum cælum stellatum, siue pilosum communicare potest cum partibus internis Capitis per suturas. Intelligentia motrix circumagens orbem Capitis, in musculis, qui circumdant Caput continetur. Eleganter *Galenus*, libro tertio de usu partium, Soli comparat Oculum, at ipse duræ meningis astrum est, cum ab ipsa dependeat ratione membranarum, quas à dura meninge mutuatur. Oculi *Hesychio*, *animæ vîam*, Solis portæ dicuntur: & ut Iris circa Solem formatur, sic in Oculo circulus variegatus Iridem repræsentat. Astrum istud solare Oculus, ut extrinsecus illuminat, sic intrinsecus cametas cerebri colustrat.

Præterea meninx censetur mater omnium membranarum totius corporis, ut Sol rerum omnium parens, quoniam ab ipsa omnes serie quadam propagantur, & inde sensus omnis deriuatur: Quinetiam per suos canales sanguineos instar Solis totum cerebrum viuificat. Voluit Deus in Oculo, cerebri abbreviata tabella, Microcosmi Epitome, non tantum minoris mundi, verumetiam maioris structuram repræsentare. Nam Oculus pars est corporis pretiosissima, lucis vsura vitam distinguens à morte: Videtur esse animi domicilium, quemadmodum Deus in Sole tabernaculum suum posuit: Ideoque cum Oculos exosculamur, animum ipsum credimus attingere: Nec immerito *Aphrodysius*, Oculum *animæ vîam* appellauit.

Huius partis præstantiam manifestè declarat artificium, quo natura vitur in ea fabricanda. Nam ab Oculo tanquam à parte artificiosissima & operosissima, formandi Capitis exordium sumit: & quamuis primi formentur Oculi, vltimi tamen in omni genere animalium perficiuntur, ut docet *Aristoteles*, lib. 2. de generat. animal. cap. 4. Ne quis autem putet nostros Oculos brutorum Oculis similes, adspice Oculorum suggrundationem, supercilia pariter & alternè mobilia, & in iis partem animæ, palpebras utrimque valde mobiles aduersus incurfantia, cum bruta alterutram dumtaxat, moucant.

Præterea Oculi in Homine tantum, diuersi coloris, & numerosissimæ varietatis atque differentie, cæteris animantibus in suo cuique genere similes. In brutis Oculi diuerso modo compositi, septem intra orbitam continentur musculi, sed omnes ad Oculum pertinent. In Homine septimus ad palpebram superiorem dirigitur ad Oculum sursum attollendum: Obliqui maioris trochlea in homine ad videndi continuationem & stabilitatem: Vuez color variegatus est, Crystallinus humor lehti similis. Videtis Oculum in homine aliter extructum fuisse.

Si desideras in cerebro Zodiacum, finge tibi illum longitudinale canalem duræ meningis, forsan signa duodecim in illo postulabis, disces figmenta esse Mathematicorum, qui stellis inuicem confertas his nominibus designarunt: Attamen intra istos canales foraminula, tanquam stellæ atque tubulos ab iisdem prodeuntes demonstraabo, quæ numerum duodenarium æquabunt. Si æquinoctialem Circulum & Tropicos Cancrî & Capricorni requiris, assignabo concursum quatuor canalium duræ meningis, & præsertim illius inter cerebrum & cerebellum cavitates cerebri subeuntem, in quo vitæ & mortis, lucis & tenebrarum fit diuortium: Nam, quandiu liber est commotus sanguinis ad interiores partes, tandiu vita persistit, eo obturato mors repentina & inopina contingit. Sin hoc non ardeat, falcata cerebri diuisionem accipies pro linea æquinoctiali, quæ subiecta est canali longitudinali, & pro Tropicis Cancrî & Capricorni duo latera ipsius cerebri ab illa falce diuisi. Viam latèam inuenies intra substantiam cerebri detracto cortice exteriori, & punctis cruentis signatam ac distinctam deprehendes. Omnes isti orbes cæli Capitis motum habent

communem instat cælestium orbium, atque alium particularem, sicuti orbes Planetarum. Proinde Anatomici motum peculiarem tribuunt duræ meningi, & Oculum astrum meningis valde mobilem cernere est. Substantia cerebri callosa circumdans ventriculos cerebri, & Lunam referens, motum habet peculiarem dum dilatatur & constringitur.

Satis est demonstrasse duorum Planetarum Solis & Lunæ motus, quia in comparationibus eorum, nihil est tam simile quod non habeat aliquid dissimile: Non oportet, inquit *Aristoteles*, omnium rationem quærere, sed analogiam considerare. Motum trepidationis observabis in Vertigine. Si Polos arcticum & antarcticum, super quibus voluit Orbis, desideras in cerebro ostendi, in vertice arcticum constituam, ubi sanguis ductus pulsátiles: Antarcticum in basi cerebri, ubi plexus arteriarum retis mirabilis.

Pergamus ad elementarem regionem Microcosmi cephalici. Certum est quantumdiu vivit Homo, calore frui & foveri cerebrum: Calor iste, ex *Aristotele*, similis est elemento stellarum, beneficus est, non incendiarius: Alter est elementaris, qui continetur intra canales arteriarum retis mirabilis & venarum plexus choroidis, qui in ceterum intenditur pro variis gradibus suæ qualitatatis. Aer cuncta rerum permeabilis in ambitum cerebri diffusus est: aquam refert, pituitosus, vel serosus humor circumfusus. Tellurem repræsentat solidamentum duarum illarum eminentiarum cerebri, quarum ambitus rari superne quàm inferne quatuor illis elementis circumdatur. Terra magni mundi dividitur in quatuor partes, Europam, Asiam, Africam, & Americam, sic moles interior cerebri in quatuor ventriculos. Terra alluitur mari Oceano & Mediterraneo, sic cerebri moles interior sanguine retis mirabilis, & sanguine plexus choroidis rigatur: Circa tellurem Microcosmi cephalici observabis colles, valles, flumina, & animalcula, quæ generantur in istis cavitatibus: & quemadmodum in paradiso quatuor flumina manabant, totam terram rigantia, sic ex ipso cerebro, si credimus *Hippocrati*, eiusque discipulo *Polybo*, quatuor venarum paria in cerebro reperiuntur, quæ molem ipsius rigant, quales sunt iugulares internæ, & duæ carotides.

Præterea in cerebro interiore lapides generantur, & metalla. Nonne vidit *Albertus Magnus* portionem cranij verè auream, osse in auri substantiam converso. Nonne densille aureus Silesij pueri à *Germanis* observatus, quamvis ab aliis reiectus, ab aliis defensus & approbatus fuerit. Si Meteora circa tellurem Microcosmi creata & apparentia demonstrari cupis, videbis pluuias per Oculos lacrymantes, per catarrhos & coryzas: Nebulas in caligine cerebri, & oculorum: Ventos & status in aurium rinitibus & sibilis: Nivem in piruita liquida siccitate reiecta, vel per nares emuncta, grandinem in pituita recocta. Fulmen in Oculis veneficis fascinantium, vel in subito casu epilepsiz: Cometas in tuberculis faciei: lanceas & dracones in herpete & raboribus faciei.

Denique si aquam supra celos desideras, inuenies inter cutem capillatam & Pericardium, ubi ex opinione *Fernely*, magna portio fluxionum generatur. Denique si diligenter & curiosè hanc comparisonem maioris mundi cum minore examinaris, quicquid in magno continetur, illud in parvo reperies, sed intra Ventriculos cerebri tanquam in centro Microcosmi habitat, spatatur, & discurret *Anima*, sensuum satellitio & ministerio stipata & adiuta, qui animæ iussa celerrimè transmittunt & exequuntur: nec enim ipsi sensus per se quidquam agere & moliri possunt, sunt tantùm ministri & internuntij, instrumenta quibus utitur anima ad iussa sua descenda, non enim Oculus videt, sed anima per Oculum: non auris audit, sed Anima per aures: non lingua loquitur, sed Anima per linguam suas conceptiones exprimit & communicat: Hospites & incolæ huius terræ cælestis cum animæ sunt notiones, & cogitationes sapientis hominis, omnesque ideæ rerum creaturarum quæ sub sensum cadunt, per Oculos cerebri ingrediuntur, ibique manent impressæ & affixæ. Cum autem Anima sit cælestis auri particula, Deo quippe simillima, in ea Trinitatem observare licet, ut in Deo Vni-Trino, quæ sunt tres animæ facultates, Imaginatio, Ratio, & Memoria, essentiam animæ constituentes. Mutationes verò quæ sunt in cerebro dignosces ex mutatione vultus tanquam Phenomenis, hanc enim partem instat tabulæ horologij natura finxit, ut dignoscamus, quid intus agatur.

Quapropter plurimum hallucinantur, totoque vt dicitur aberrant celo, qui Microcosmi partes in vniuerso corpore constituunt, dum ætheream & supracælestem regionem in Capite collocant, cælestem regionem puta celum in Thoracis regione: Regionem elementarem in abdomine, Saturnum in Liene locant, Iouem in Hepate, Martem in Cykli fellea, Solem in Corde, Venerem in pudendis partibus collocant, Mercurium in Lingua, Lunam in substantia Cerebri.

Ex ista enarratione quis non animaduertit Physicorum & Anatomicorum insignem errorem, in assignandis Microcosmi partibus, cum orbis isti cælestes debeant sibi mutuo seriatim succedere, & in corpore rotundo etiam sphæram particularem effingere. Itaque Microcosmum in Capite contineri certum est ac indubitatum, nec alibi perquirendum.

Coronidis loco attexam *Caput 12. Salomonis*, eiusque interpretationem interlinearem ex Anatomie depromptam interferam, vt intelligatis *Salomonis* verba ad solum Caput pertinere.

## EXPLICATIO VERBORVM SALOMONIS

### cap. 12. Ecclesiastis.



**M**EMENTO Creatoris tui in diebus Iuuentutis tuæ, antequam veniat tempus afflictionis, & appropinquent <sup>senectus oculi caligent</sup> anni, de quibus dicas, non mihi placent, antequam tene-  
 & obfcurantur, & notiones, atque cogitationes deficiant, aut languant: breſcat Sol, & Lumen, & Luna, & Stellæ, & reuertantur & quia humidum cerebrum deſtillationes deſcendit per foramina Capitis: ſenſu verò nubes poſt pluuiam: quando commouebuntur cuſtodes omnes titubant, & ſaluantur ſatellites domus, & tremunt muſicali robuſtiſſimi domus, & nutabunt viri fortiſſimi, & otioſi erunt Caput ſuſtinentes, ceſſabunt dentes molere, quia pauci & rari: mens verò & animus molentes in minuto numero, & tenebreſcent videntes debiles erant inuicentes per oculos ſum beaſtores: nec erunt labia, quæ conſtituunt in facie, per foramina, & claudent oſtia in platea in humilitate adeo expedita ad loquendum & mandandum cum ſanitis, nec proſuadè dormient, ſed leuiſſimæ vocis molentis, & conſurgent ad vocem volucris, & erunt, excitati à tuſſi, nec amplius canere, & carmen modulari poterunt: Nec aures muſicæ obſurdeſcent omnes filiarum carminis, excelsa deleſcunt: Erunt etiam valde meticuloſi, ideoque ſibi timebunt, tandem caneſcet Caput quoque timebunt & formidabunt in via, florebit inſtar florum amygdali, & corpus ſiccum inſtar locuſte inſtillabitur ob hydrope, aut alio Amygdalus, impinguabitur locuſta, & diſſipabitur timore, & omnis libido emaneſcet, inſtar caparis luxuriantis. Poſtea concedet in ſepulchrum capparis: quoniam ibi homo in domum æternitatis viſque ad finem mundi, & amici eius lucebunt mortem, aut præſcia mulieres: ſux, & circuibunt in platea plangentes, antequam priuſquam in ſenectus ſectatur ſpina, & retrahatur cerebri membrana rumpatur funiculus argenteus, & recurraſſet vitta aurea, aureo colore, & effringatur canalis ſanguinis ſupra cerebrum, & diſſipetur & conteratur hydria ſuper fontem, & confringatur circulaſſio vaporum intra cerebrum & ſupra eboanæ, vel ſupra Cor ciſternam rota ſuper ciſternam, & reuertatur puluis in terram





in homine sacra? Ita prorsus *Aristoteles* sentit *Probl. sect. 32*, quærens cur erupio flatus & ructus haudquaquam sacra habeatur, iterum utitur verò sacra habita sit. Respondet, An quia sternutamentum ex Capite prodians, quæ pars sacra est, ut sacrum veneramur, ideoque mos est sternutamenti consalutari? ait *Plinius*. Tanta olim fuit apud *Aegyptios* Capitis veneratio, ut infano etiam cultu Caput omne venerarentur, & à Capitibus brutorum prorsus abstinere, diuinitati iniuriam facere arbitrati, si quis illa comedisset. Memoriz proditum est *Sidonius*, gentem feram & agricolam, cum parentes comederent, eorum tamen Capitibus abstinere, eaque deaurare. *Aegyptii* per Caput salutem designabant, nec quidem abs re, nam bene habente Capite, reliquum corpus sanum existit, at si Caput debile fuerit, cætera membra languent. *Hippocrates* scripsit ad Capitis dolorem animum perturbari. Idecirco *Hippocrates* imagines pileo contegebantur, ut significaretur quammaximè custodiendam partem illam. Nam in ea tanquam domicilio, princeps Animus habitat, & intelligendi beneficium positum est.

Hæc autem præclara de Capite elogia soli humano Capiti conueniunt, quoniam in genere animalium Caput non est tanti momenti ad vitam quanti Cor: quamuis enim *Aristoteles*, libro quarto de partibus animalium, scripserit Caput cerebri gratiâ potissimum existisse in illis animalibus, quæ habent collum, & alia annexa: Affluerat tamen alterius causâ factum fuisse, præsertim propter instrumenta nutritioni deficiente, cum principium alimenti sit à parte superiore, adeo ut Caput radici plantæ respondeat, sic homo dictus fuit arbor inuersa. Nec Caput ob situm supremum præstantius est Corde, cum videamus in reliquis animalibus, quæ terram prona spectant, Caput non esse supremo loco situm, ut in homine. Adde quod *Valerius Cæsar* summa cum admiratione sapius obseruauit Brutorum viuentium cerebra detecta, vulnerata, & intactis nervis eorumdemque principio & ventriculis illis exempta, sine ullo vocis, aut respirationis, vel sensus, aut motus offensionis signo moueri, respirare, quin etiam aues absque cerebro aliquandiu viuunt, ut quilibet in Gallinis vel pullis gallinæis, si rostrum superius cum dimidia Capitis parte absciderit, cerebri que maiorem partem exemerit, expectari potest.

## CAPITIS STRUCTURA, CONFORMATIO, & eius Administratio Anatomica.

### CAPUT I I.



**C**APUT licet dignitate reliquis partibus præcellat, postremum tamen explicatur, quia eius partes diutius putredini resistunt, excepto Cerebro, quod facillè flaccescit, & emollitur. Ideoque si velis particularem & exactam Cerebri Anatomiam instituere, quamprimum in cadauere secabitur, & administrabitur. Vniuersum autem Caput, diuiditur in partem Capillatam, & alteram Glabram, quæ Facies nominatur. Rursum Capillata in tres partes scatur, quarum prima & anterior ad medium Capitis exporrecta, *Sinciput* appellatur. Quæ sequitur pars *Vertex*. Posterior proiectura, *Occiput* nominatur. Partes laterales auribus & oculis interiectæ, *Tempora* dicuntur.

Caput verò quatenus dissectioni subicitur, in suas partes integrantes resoluitur: quæ sunt *Continentes*, & *Contenta*. Continentium quædam sunt *Communes*, ut *Cuticula*, *Cutis Capillata*, *Membrana Carnosa*. *Propria* sunt externæ, & internæ. Inter externas habentur *Pericranium*, & ossa *Cranij*. Internæ sunt duæ *Meninges* cerebri ambientes. Contentæ verò partes, *Cerebrum*, & *Cerebellum* dicuntur, quibus aliæ partes includuntur, quas ipsa dissectionis patefaciet.

*Cutis* in Capite crassior est quàm in alia corporis parte, porosa tamen & peruia, ut exitum præbeat fuliginosis excrementis ad pilorum generationem. Cutim sequitur *Membrana Carnosa*, cuius adhesionem accidit, ut in quibusdam cotis Capitis ad nutum & arbitrium moueatur. *Pinguedo* nulla interiecta est, ne crassitie sua fuliginosos vapores coërceat, & Capitis molem augeat. Si quæ reperitur durissima est, & parua quantitate continetur. Cur Caput carne careat, exposuit *Aristoteles*, cap. 10. lib. 2. de partibus

*partibus animalium.* Dum istas partes administrabis, diligenter inquires, & Spectabis Venulas exiles satis insignes, antrosum & retrorsum ponē aures à Iugulati Externa propagatas, quæ inter cutim & membranā carnosā supra ossa temporum excurrentes, per anastomosis inter se vniuntur; quod *Fernety* opinionem confirmat, *Pathologia lib. 5. cap. 4. & lib. 6. cap. 11.* dum magna vasa illic collocat, in quibus serosum humorem, materiā arthritidis cumulari & congeti arbitrat. Vena interdum reperitur in vertice, quæ per duo foraminula foras excidit. Ejus meminerunt *Rhazes lib. 1. Continentis cap. 8. Venam tesue* appellat, & *Celsus* dum agit de vlsione Capitis. Per eadem foraminula venas etiam externas intus subire Cerebrum, notauit *Nicolaus Massa.*

ADMINISTRATIO ANATOMICA  
Capitis Externi.

**D**ETRACTA membranâ carnosâ Pericranium accuratè dinelles. Membrana est totam caluam operiens, propter musciculum Temporalem comparata. Nascitur à crassa meninge, cuius dilatatione uniuersum Cranium obvelatur, nisi quâ parte musculus Temporalis osibus incubat, quem Pericranios membrana superiensa firmius colligat. Ad nares, & infra oculos orbitas supra frontem reuoluta excutitur. Productionem Pericranij membrana à dura meninge per intervalla osium Crany egressa, in infantibus manifestè videbis, in quibus ossa Crany distincta sunt, nondum serratil suturis conferta. At sensim osibus induratis & coarctatis, continuas illa à brumpetur.

*Sublato Pericranio, aliud offendes Periostium, quod acie scalpelli eradi & euelli potest. His peractis nudum fuisse operimentis spoliatum Cranium apparbit offensum; cuius historiam ex Osteologia oportet repetere. Deinde orbiculatum Cranium serrâ circumcidetur, prius tamen musculus frontalis & auri superioribus musculus atque temporalibus in faciem reclinatis, ut possis per tempora serram circumducere. Secabis autem in fronte digitâ latitudine prope supercilia, & in parte postica eandem distantiam ab imo sine cauo occipitis seruabis, ut laterales sinus possis aperiri videre, atque demonstrare. Sed in rescindendo Crania ista serram appresses & circumferes, ut subinde illam auferendo, tenuissimo specillo introducto sectionum penetrationem explores; ne dura mentis potissimum versus sinus laterales, & in fronte lateat.*

*Vbi ex omni parte Cranium resectum fueris, eius operculum sensim auferes intromissa spatula, ut dura meningis adhaeso distellatur à Cranio, Exempto Crani operculo, in marginibus duplicem cuiusque ossis laminam, & interiectam diploem tubicundam, siue fungosam substantiam sanguine conspersam, ex venis capillaribus inter duplex tabulatum discurrentibus videbis.*

In Cerebro denudato *Meninges* occurrunt, dictæ *Ἰσχυρὸς ἢ μυσία*, quod in ipsis cerebrum maneat & Vocantur etiam *Ἰσχυρίδες*, *διὰ τὴν ἰσχυρὰν μυσίαν*, quod citra medullam volvantur, ex *Pollice*. *Arabes* *Matres* vocant, quasi ab his omnibus membranæ propagarentur : *Ἰσχυρίδες* dicuntur ab *Ἐμφύστω*, vt notat *Platarchus*. Sunt autem cerebri involucria, quibus hæc mollis & cerea substantia conflringitur, & ab ossis dutie defenditur. Si species externam primæ meningis superficiem, quandiu cerebrum succingit, propter venas huc & illuc discurrentes, Ficus folia eleganter exprimit. Idcirco apud *Aristophanem* in *Ramus*, Dionysius cum minatur se Capiti lechæe vulnus inflicendum, *Ἰσχυρὸν Ἰσχυρίδας ἦναι δύν*. *Scholias*tes notat, *ἰ Ἰσχυρίδας ἦναι αὐτὸν*, *ἔξ ὧν ἰσχυρὸν ἰσχυρίδας* nō ἦν ἡ αὐτὴ φωνή : quinctiam *Aristarchus Medicus* eam comparisonem approbat, vt ibidem refert *Scholias*tes.

Prima hæc Membrana, quæ Cerebrum amicitur est venosa, cutis specie, quædam à Hippocrate, ex Aristotele libro de historia animalium. Ab Hippocrate & Galeno Crassa vocatur, ab Arabibus Dura Mater, ac reuera hæc membrana reliquis membranis corporis crassior existit: ideoque Hippocrati *κορυμνη* dicitur, libro de locis in homine: oritur à basi Cranii, vbi firmiter adhærescit. Parte superiore aliquantulum distat à Cerebro, ut facilius attolli, & intumescere queat in diastole: Distantiam duræ meningis à tenui obducibus, ex Galeno, lib. 9. administrat. Anatomicarum, leuiter pertusa dura

meninge ad fistulam introducendam, per quam si insufflaueris, deprehendes spatium utriusque membranae interiectum. Nec solis cranij futuris alligatur, verum etiam tota sua superficie mediis ossibus adnectitur, ut docet *Galenus*, & in senibus tota cranio intrinsecus affixa contumaciter deprehendi. Idcirco *Hippocrates* os modiolò excisum vi auferre vetat, ne membrana ossi affixa laceretur, sed expectare iubet, donec suppurata meningis sponte decidat. Nec tantum extrinsecus Cerebrum amplectitur, sed intus penetrans in vertice Capitis reduplicata, secundum longitudinem futuræ sagittalis usque ad nares protensa. Cerebrum in laevum & dextrum dirimit, usque ad Cerebri medietatem callosam, Ventriculis superiectam, Mediastrinum illud membranosum, Cerebrum diuidens in duas partes, & ad tectum usque Ventriculorum Cerebri descendens, sustinet fornicem Ventriculorum, quoniam dura hæc membrana futuræ sagittali adhærescit. Huius diuisionis figura *Falcem*, quæ segretes demeti solent, repræsentat. Dubitari possit, an discrimen illud Cerebri, *falcis* dici debeat, an potius isthuc appellatio conueniat duræ membranæ interiectæ, & more falcis incuruatæ. *Vesalius & Columbus falcis nomen tribuunt duræ meningi.*

Posteriore parte meningis quadruplicata Cerebrum à cerebello determinat. Notauit *Sylvius* isthuc discrimina non fieri à geminata membrana, sed simplicem dumtaxat intercedere, quod quidem verum est in ea parte, quæ *falcem* repræsentat, sed duplicata Cerebellum à cerebello distinguit. Deinde supra cerebellum reuoluta vndique cerebellum amplexatur, & in basi dirimit in duas partes.

In pulsta & laterali parte Cerebri secundum tramitem laterum futuræ lambdoidis, ex coalitu duræ meningis in Cerebro & cerebello duplicatæ, *Canales*, siue *Fistulae* formantur, quibus continetur sanguis rigaturus Cerebrum. Sunt autem *Canales quatuor*, bini laterales exurgunt ab inferiore parte cranij prope apophyses mastoideas, & secundum futuræ lambdoidis tramitem ascendentes, supra Cerebri & cerebelli coalitum instrati, in elastissima cerebelli sede, seu potius in suprema coniunctione cerebelli cum Cerebro inuicem eocuntes, *Communem Canalem* efformant, per Capitis longitudinem ad summam nares protendentem. *Tertius hic Canalis ab Herapilio dicitur*, Torcular appellabatur, quod ab eo velut à Torculari sanguis in partes inferiores deriuetur. *Galenus in Isagoge*, notat Cerebrum parte superiore à Corde venas habere, iuxta eum locum, qui *explanum* dicitur ad nutritionem, & ad basim arterias, vnde hoc nomen de promptum. Ad potius *magis*, canistrum, cum prior dictio non extet in *Lexico*, neque *Thesauro Stephani*.

Non desunt, qui pro Torculari quatuor Canaliū concursum accipiunt. Nec ipse *Galenus* de Torcularis loco sibi constans est, modò tertium Canalem Torcular appellat, modò quatuor Canaliū compitum, ex quo quartus Canalis dictus enascitur, constatus ex concursu duorum priorum cum tertio iunctorum. More aliorum exteriorum Cerebri substantiam non perreptat, sed inter Cerebrum & cerebellum, ubi incipit, latissimus degenerat in *Venam*, quàm *Gai. lib. 8. de v. s. part. c. 12. magnā* vocat, hæc in mille venas capillares fruticatur, ex quibus *Plexus ille Choroides* contexitur.

*Eruditus Nymmanus, lib. de Apoplexia*, probare nititur apoplexiam fieri ab obstructione huius canalis, quam facit pituitosus humor congestus: sicque interciperetur influxus spiritus vitalis necessarii ad Cerebri conseruationem. Verum arteriæ carotides, quæ plexum retiformem, siue rete mirabile in basi Cerebri constituunt, possunt ad tempus, vitam Cerebri fouere, imò solæ Cerebrum viuificare, cum sanguis dumtaxat venosus per venulas traducatur.

Canales istos natura condidit, ad sanguinis venosi faciliorem distributionem, quia non erat tutum venas per mediam & mollem Cerebri substantiam ascendere & diuagari, ne pondere Cerebri venis compressis, sanguinis commercium interciperetur. Idcirco natura Canales istos per superiora deuexit. Sanguis enim insita grauitate deorsum inclinans, è supernis partibus elapsus, facilius infernè distribuitur. Sed non roris modo per totam Cerebri substantiam dispergitur: nam è tertio canali innumere venulæ prodeunt per anfractus exteriores Cerebri diffusæ, atque penitiorem Cerebri medullam penetrantes, ut ex cruentis stigmatibus cognoscas, quæ medullæ Cerebri intra digitos elisâ conspiciuntur.

Propterea falsum est, quod scripsit *Aristoteles*, ex æque omnibus animalibus Cerebrum esse, nec vilam in se venam recipere.

Sed benignè interpretandum est *Aristoteles*, venis quidem fatetur circumseptum

cerebrum, *cap. 10. l. 1. de historia animalium, & libri tertij capite tertio*, quæ non subeunt, & penetrant substantiam cerebri, sed solum ambiunt & irrigant externam superficiem, ut roris instar sanguis destillet ad nutritionem. Ideoque scribit venas & arterias cerebri multas esse, sed paruas, ne ferueat nimis cerebrum, quod morbos & mortem induceret animali. Ideo libro secundo de partibus animalium, agnoscit venas in ambiru cerebri, & in meninge, non intra substantiam cerebri. At Hippocrates passim scribit venis abundare cerebrum, quæ cum calefactæ fuerint, humores ad se trahunt, & libro secundo de morbis, in siccatione capitis, eam ob causam anteriorem Capitis partem dolor occupat, quod in ea venæ sint crassissimæ, & cerebrum anteriore magis parte Capitis, quàm posteriore situm habeat. Obseruavi venas cerebrum ambientes in iis qui soporati, siue comatosi interierunt, vbique æquales, & plenas sanguinis, tumefactas ac prægrandes.

Interea notabis ex Galeno, Venas in principio lateralium canalium terminari, nec ultra progredi, & his canalibus solum sanguinem venosum tanquam proprio vase optimè conseruari: propterea Galenus illos sanguiniductus, Venas nominauit.

Nicolaus Massa, pag. 82. existimat venas Iugulares continuari & expandi instar araneæ reuulsissimas, intra capales illos Cerebri. Spiegelus existimat arteriæ carotidis minorem ramum, & venæ iugularis internæ maiorem ramum, subire & penetrare istos sinus. Ac sanè deprehendi solum sanguinem venosum his canalibus contineri, quem Iugulares internæ euomunt, in exordio canalium terminatæ. Ex doctrina circulationis sanguinem infernè reuehunt: Arteriosus sanguis ex utriusque carotidis ramis supernè per anfractus cerebri reptantibus quoquoersum diffunditur. Infantibus palpitans vertex percipitur ex motu Arteriarum meningis crassæ, per systolem & diastolem: quod manifestè vidi in quodam, cui dimidia pars frontalis ossis cariosi vsque ad futuram coronalem euulsa fuerat, ideoque vera est Russi opinio, dum ex meningibus solum externam pulsatoriu motu eieri scripsit.

Ratione quatuor canalium, solum hanc meningem micare immoto cerebro opinatus est Fallopius.

At Hippocrates libro tertio de offeina, parte vltima, manifestè docet Cerebrum moueri, quod variis in locis docuit Galenus, *cap. vlt. lib. de formatione fetus, & lib. 4. de differentiâ pulsuum, capite secundo, lib. 8. de visu paruum, cap. 10. & presertim cap. vlt. lib. de instrumento odoratus*, per respirationem moueri docuit: propterea existimat Rodericus à Fega, solas arterias cerebri micare, & ad eas motum cerebri pertinere.

Interea notabis narium ingentes hæmorrhagias ex illis sinubus emanare, idæque in posteriora reuellendum esse sanguinem, & vicissim sanguine guttatim stillante repidâ rigandum esse Caput vt vberius suat. Quæ de causa Hippocrates, in Metone, cui subitulum sanguinis è naribus superuenit, occiput aquâ repidâ fouit: vt sanguis liberius & liberalius fluere. Cur inter animalia solus homo narium hæmorrhagiæ sit obnoxius, Aristoteles explicat, *sest. 10. Probl. 2.* Cum autem Natura per canalem tertium longitudinalem interdum faustis ægrotum rebus sese exoneret, quâ premitur sanguinis copiâ, quemadmodum per hæmorrhoidas in viris & in mulieribus per vterum: Miror, cur Fernel. libri secunda meth. med. cap. 2. inficietur in vlla hypochondriorum inflammatione sanguinis fluorem per nares prodesse, nec in Caulo & febribus continentibus, per quas humores in maioribus venis putrescunt conferre, nisi fortè immoderatio succedat euacuatio, quam summa virium dissolutio semper vitanda, consequitur. Atramen Hippocrates, passim in Epidemias, febres acutas, arduas, sanguinis profluvio è naribus solui restatur: & inflammatione viscerum etiam sanari liberali hæmorrhagia è naribus, in Prognosticis docuit. Idem confirmat Galenus, libro tertio de Crisibus, c. 3. modò contingat die critico, & è directo parris affectu: alioquin suspecta omnis alia hæmorrhagia. Hippocrates libro tertio Prorrh. partic. 33. hoc etiam asseruit. Auicenna, Fen. 2. lib. 4. tract. 1. cap. 73. Cum omnis materia tam humoralis, quàm halitiosa ad cerebrum ascendens deducatur per venas & arterias, atque istam materiam canales illi extremam cerebri faciem perreptantes & rigantes excipiant, & quoquoersum distribuunt, potissimum in partes externas, vnde roris instar interius destillat: Non sine ratione & prudentia maiores nostri metasyncritica ad suspenden-

dum catarrhum, & exsiccandam superficiem humidioris cerebri, calida siccantia topica admoueri, atque etiam cauteriis eutim Capitis aperiri consuluere.

Remotâ crassâ meninge, *Tennis*, siue *Pia Mater Arabum* occurrit, vniuersum cerebrum complexu arctissimo proximè circumdans, vt firma continetur cerebri medulla. Nec eam extrinsecus tantùm fuceingit, sed per exteriores anfractus valde profundos d'uerfa, & intra cerebrum insinuata, interiores cauitates obliniit, pluresque particulas efformat.

Ventriculus interior obuoluens tunica *χρυσή* cognominatur, *Herophilus χρυσή* appellat, inquit *Ruffus lib. 1. cap. 22.* propter Venulas quibus conuersa est. Inde colligitur cerebrum inflammatione possetentari: quod animaduersum fuit à *Galeno, comment. ad Aphor. 50. lib. 7. & à Meschione, cap. de Sinsasi puerorum.* Ac sane tres Ventriculi cerebri tenuissimâ membranâ obducuntur, quam verisimile est propagem esse tenuis meningis, quamuis aliter sentiat *Vesalius*: proinde eum quartus Ventriculus eo velamento careat, non meretur nomen Ventriculi: si credimus *Valerda*: quod falsum est.

Sublata tenui meninge Cerebrum spectatur album, ratione finis, vt spiritus animales reddantur lucidi & perspicui, qui in obscura & opaco loco ratione coloris alterius, minùs clari, & turbidi fuissent. Cerebrum autem dicitur quasi cereum, quia molle & album, vel quasi *τὸ κερί* hanc, Capitis pondus. Græci carent proprio nomine, appellatur *ῥαῖνας*, quod nomen vlitatum fuisse *Homero, Euripidi, Hippocrati* docet *Casaubonus, lib. 2. cap. 14. comment. in Athenæum.* Ibidem declarat, cur veteres à cerebris abstinerint in eduliis.

Cerebri Substantia apud veteres Anatomicos controuersa fuit. Quidam glandosam, alij medullosam esse volebant. *Hippocrates libro de Morbo Sacro*, Cerebrum glandulæ simile facit, quoniam album & friabile, instar aliarum glandularum. Maius autem Cerebrum est quàm aliæ glandulæ; ac proinde capilli etiam maiores ibi nascuntur, quàm alibi. Sed Cerebrum glandulæ comparatur, ab vsu potius quàm similitudine substantiæ, quia caluæ capacitate concluditur, quæ instar cucurbitulæ trunco corporis imposita, omnis generis expirationes attrahit, quarum assiduus haustibus tanquam magna glandula, Cerebrum inebriatur.

*Galenus* Cerebri substantiam medullosam esse scribit, qualis nulla in toto corpore similis reperitur: sed ad tollendam homonymiam, *μυελὸς ῥαῖνας* appellat, nonnunquam Parenchyma. Eleganter *Aristoteles, lib. 2. de partibus animalium, c. 7.* omnium ferme fluxionum, quæ à Capite desillant, ortum repetit ab euaporacione viscerum feruidiorum, quæ ad Cerebrum euecta, frigore huius partis condensatur, & aquescit, perinde arque terrarum expirationes in nubes concrefcentes, mox dissoluantur in imbrem. *Fernelius* istud dogma non satis probabile, profectum putat ab *Arabibus*, cùm tamen ab *Aristotele* sit promulgatum, de promptum ex *Hippocrate lib. 2. de morbis.* Hæc autem Cerebri humiditas si excrementitia fuerit, in pituitam conerescit, sin alimentaria, nec morbida, deorsum prolapsa Cordis calorem contemperat, ex eodem *Aristotele, cap. 7. libri de somno.* Ideoque longâ experientiâ obseruari pituitosos homines minùs febribus obnoxios, nec acutis morbis tentari, quinetiam viuaciores esse biliosis & melancholicis.

*Magnitudo Cerebri* in homine amplior est, quàm cæteris animalibus, quinetiam Elephanti Cerebro maior, vt olim *Lycus peritissimus Anatomicus* scripserat, cuius tamen opinionem *Galenus* sic explicat. *Lycus* alibi dicit maximum esse hominis Cerebrum, non quidem accepta absolutè magnitudine, sed habita potius animalis cum animali proportionem. Ergo sicuti paruulum puerum maius habere Elephantem maximo Cerebrum affirmat, non sola habita corporis magnitudinis consideratione, sed adhibita præterea proportionem, id est intelligendum. *Aristoteles* scribit Cerebrum homini pro magnitudine corporis maximum, & humidissimum inesse, *l. 1. de hist. anim.* *Ruffus Ephesus* Hominis Cerebrum duobus bouum Cerebris grandius esse affirmat. Sed diligentius examinanti, Cerebrum Humanum tam mole quàm pondere sextuplo maius bubulo apparebit.

Cùm in statera humanum Cerebrum librarem, deprehendi trium librarum mercatoris pondus æquasse, quæ quatuor libris Medicis respondent, sed non potest esse certa, quia inæqualis moles.

Falsum est, quod scribit *Vesalius, lib. 7. cap. 1. Anatom.* maiora esse animalium cerebra, quo propius ad naturam humanam accedunt. In hominum genere maribus amplius datum est cerebrum, quàm feminis, ideoque mas plures futuras habet, ut locus hic sit magis perspirabilis, quia plus cerebri continet, quod est falsum. Cerebrum amplissimum Homini datum fuit, ob animalium functionum multitudinem, quibus obeundis magna & iugis spirituum copia requiritur, qui non possunt aliunde quàm ex abundanti sanguine succrescere, multus autem sanguis angusto spatio contineri non poterat. Confert etiam magnitudo & ponderositas Cerebri ad creationem corporis. Nam si quid mobile & deciduum stare rectum volumus, pondus ingens superponere solemus.

Notatione dignum, quod observavit *Fallopianus, libro de vulneribus Capitis*, in profundis Capitis vulneribus turgere cerebrum in plenilunio: subidere decrescente Luna; Inde causam venari licet, cur in deliquio Lunæ grauiora patiantur incommoda, quibus icium vel oblatum fuit Caput, & cur nouilunij tempore periodo quædam moueantur.

De *Temperie cerebri* eleganter philosophatur *Aristoteles, 1. 7. lib. 2. de partibus animalium*, nempe cerebrum natura sua frigidum refrigerandi Cordis causa constructum fuisse, quod indiget benigna explicatione ab ipso *Aristotele*, ibidem designata: Afferit enim animæ omnia munia obis ministerio caloris, qui residet in Corde, ut in foco, propterea calidissimum esse: sed cum istius caloris mediocritas quædam in diuersis partibus requiratur, præsertim in cerebro, ea de causa frigidum factum fuit, ut mutatum à Corde calore temperaret ad edendas actiones animæ moderatas. Itaque vsum exposuit *Aristoteles*, dum Cordis gratiâ factum fuisse cerebrum scripsit: modum quo refrigerat, dum materiam à Corde delatam temperare statuit, de qua quæstione copiosè disputauit *Hofmannus*. Sed cum sit naturæ aqueæ, erit etiam humidissimum, ex ipso *Philosopho*. Proinde nulla pars erit in corpore, frigidior cerebro si comparetur cum aliis partibus corporis frigidis. Idcirco potissimum refrigerandi Cordis causâ tale temperamentum obtinuit, quamuis *Aristoteles, lib. 4. de partibus animalium, cap. 10.* non dissiteatur sensus in cerebro habitare. Natura, inquit, sensum etiam nonnullis in Capite collocauit, quoniam eius partis sanguis temperatus modicè sit, & idoneus ad cerebrum tepesciendum, tum ad sensum tranquillitatem & integritatem. Itaque cerebrum frigiditate sua Cor refrigerabit, & vicissim Cor sua caliditate cerebrum calefaciet, quoniam inter illas partes quædam est contrarietas, & mutua compassio, siue reactio, non solum ex utriusque diuerso temperamento, ut exuperantis pareatur aliquod auxilium, inquit *Philosophus, cap. 7. lib. 2. de partibus*. Solet natura semper moliri aduersus cuiusvis exuperantiam auxilium, per coniunctionem rei aduersæ, ut excessum alterius altero compenset, & modicetur. Inde nata est illa contraoperatio partium principum inter se, ratione temperamentum constituta à *Thoma de Garbo & Gentili*, ex qua deriuatum est temperamentum partis, & temperamentum totius, sub vnâ formâ comprehensum.

Si quæras, quomodo fiat isthæc mutua compassio & reactio Cerebri & Cordis; respondebo cum *Aristotele*, perfici ratione spirituum, & ratione fluxionum: Nam in cerebro spiritus Cordis refrigerati cum sint continui, ad inuicem Cor refrigerabunt, & cum sit caloris motus velocissimus & impetuosus, sursum natura frænum istud impositum, ne cerebrum offenderetur: At quomodo fiant fluxiones in partes inferiores, explicat *Aristoteles, cap. 7. lib. 2. de partibus animalium*. Alimentum, inquit, per venas sursum respirat, ubi excrementum ob eius loci vim refrigeratum est, nascuntur fluxiones, quæ sunt in cerebro, fluxu & refluxu instar Euripi, ex eodem, libro de *semine, cap. 4.*

Cum autem mirabilis structura cerebri non sit eadem in animalibus qualis in homine reperitur, non mirum si *Aristoteles* generaliter loquatur de usu cerebri, quod factum sit à natura ad Cordis refrigerium: forsan Ventriculi anfractus, & alia structura ad nutritionem cerebri comparata est: cumque videret in animalibus, cerebro exempto, vel magna ex parte detracto viuere, moveri & respirare animalia, non tantum fecit cerebrum in genere animalium, quanti æstimatur à Medicis in Homine.

Redeo ad cerebri structuram, cuius exteriorem ambitum contemplare, ut extrinsecus anfractuosum est, innumeris gyris & meandris profundioribus exaratum, in quos tenuis meninx altè admodum sese insinuat: istos anfractus leuitatis gratiã factos

esse putat *Aristoteles*: Alij ad faciliorem irrigationem, vt his veluti sulcis conclusa vasa, tutius & commodius per vniuersam cerebri substantiam distribuere. Alij opinantur ad præparationem aëris, qui inspiratur, paratos esse istos anfractus, vt permeabilis aër transeundo per substantiam cerebri alteratus perueniat ad Ventriculos. *Carpus* existimat conferre istos anfractus, non solum ad conseruationem venarum & arteriarum, sed etiam faciliorem spiritus vitalis, & aëris inspirati penetrationem, vt simul mixti & alterati intra substantiam cerebri deriuentur ad Ventriculos anteriores cerebri. Summa cerebri pars *vniuersa* est: Inferior *hinc* dicitur, ex *Russo lib. 1. capite 22.*

Præquam Cerebrum rescindas, in eo duas partes considerabis, *Cerebri substantiam, & Nervorum principium. Galenus Comment. ad Aphor. 3. sect. 3. Perorrhetican*, Caput in tres partes diuidit, dum ait, cephalalgiam esse Capitis malè affecti symptoma, surditatem cerebri, manuum tremorem, nervorum principij. Vbi hæc tria manifestè distinguit Caput, Cerebrum, Nervorum principium. Rectius tota Cerebri moles diuidetur in tres partes, *Cerebrum* propriè dictum, *Cerebellum*, & *spinalem medullam*: quatenus verò Cerebrum dissectioni subiicitur, in tres *Regiones*, *Sublimem*, *Mediam*, & *Inferam* diuido. In sublimi *Anfractus*, *Falcem*, *Corpus callosum* obliuerebis. In Media quæ est infra Fornicem, notabis *fornicis concameratum*, quod est tectum Ventriculis superimpositum, *septum* tribus *columnis suffultum*, *Tres Ventriculos* cum eminentiis quibusdam, quæ canalem efformant ad quartum Ventriculorum. Deinde *plexum Choroideum atque Cerebellum*, & in eo reconditum *quartum Ventriculum*. In regione infima notabis *Chocanam*, *Glandulas*, *Mammillares Processus*, *septem nervorum Paria*, *Rete mirabile*, & *Radices spinalis Medulle*.

In Cerebri substantia notabile discrimen apparet in colore & duritie, nam exterius substantiæ circuitus duorum digitorum crassitie cinericius & mollis est, ab Anatomicis recentioribus *Cortex Cerebri* dicitur. Color iste à sanguine manat roris instar effuso, quem prima substantia ebibit & immutat. Verùm, relectâ cerebri substantiâ cinericiâ duorum vel trium digitorum crassitie, candidior & solidior occurrit substantia, quæ *callosum corpus*, *moles magna* dicitur, veramque Cerebri substantiam constituit, quam in Cerebro Hominis sani statim ab obitu repentino dissecâ, actu separatam à corticeprehendi.

Huius portione sensim detractâ, *Ventriculos anteriores deteges*, quos tenuissima & pellucida membrana à tenui meninge producta inter se determinat: Inde *septi lucidi* nomen traxit: A *Galeno* dicitur *διὰ τὴν λευκότητα αὐτῶν*: Nec aliud est, quàm adhæsiō istius corporis, quod psaloides appellatur, ad concameratum Ventriculorum anteriorum Cerebri.

His administratis contemplare *Ventriculos anteriores*, vt sunt amplissimi parte superiore, ferme totam longitudinem Cerebri occupantes: Amplitudinem istorum Ventriculorum veteribus Anatomicis ignotam fuisse scribit *Galenus*, *lib. 16. de v. s. partium*, cap. 3. ad basim Cerebri descendentes, ac veluti cameram quandam constituunt, infernè aliqua ex parte peruij sunt in nares, in gratiam processuum Mammillarium propter olfactû. vt inde spiritum suum parum eliciant. Nam inspiratus & narius attractus aër, ex inferiore cavitare ascendit ad superiorem cavitatem anteriorum Ventriculorû, à quibus in tertium Ventriculum defertur. Purior hic spiritus in Ventriculis anterioribus & superioribus potius continetur, quàm in inferioribus. Propterea nervi Optici spiritum suum trahunt è superioribus Ventriculis, reliqui nervi à quarto Ventriculo in Cerebello latitante: Inde deriuatur in nervos omnes.

Substantiam medullarem Cerebri frustulatim rescindes intus ad superiorum Ventriculorum operculo, vt eorum amplitudo introducto tubulo per insufflationem cõpareat: hoc enim artificij soleo demonstrare, quantum sese atollat & deprimat substantia Ventriculis superiecta. Meritò succensere *Baehino*, dum falsâ recitat ex *Piccolomino*, sine vlla animaduersione, nempe foramen sub processibus mammillariibus medium esse, & biuium, cuius pars ima in Ventriculos anteriores exporrigitur, altera in palatum & pulmones, quod plerique incognitum sit, nec conspicuum fieri, nisi in Cerebris sanis inopinatò vita priuatis, & mox dissecâs, partes enim Cerebri huic foramini circumiectas tempore adeo concidere, atque coniuere, vt penitus obstruatur, ac deleatur. Idcirco *Galenum* dixisse aërem inspiratum influere in Cor, sed eius partem in piores Ventriculos ingredi, vt ibi præparatus fiat animalis spiritus



pabulum. Haëtenus ex *Piscalomo* & *Banino*, qui pares erant Anatomici, in dissectionibus inexpert: sed de ingressu aëris in Ventriculos valde dubito, ut miscetur spiritui vitali, & ab vitroque consuetur animalis. Est enim potius circumfusus duræ meningi, nec facile peruat, penetratque anteriores Cerebri Ventriculos, si sunt imperatj, ueque processus Mammillares sint porosi.

Ut autem tertius Ventriculus compareat, crus anticum psalloydis corporis eleuabis, retroque euerles, tum inter eminentias illas magnas cauitatem tertij Ventriculi spectabis, intra quam foramen est descendens ad Choanam. Duas autem illas eminentias anteriùs connectit *Transuersus Funnis*, eiusdem substantiæ & molis cum nervo Optico. Diductis Eminentis conspicitur à tertio Ventriculo ad quartum Canalis protensus, cuius longitudinem persequi non licet nisi sublato fornice. Est autem Fornix, siue *nauium*, opinione recentiorum Anatomicorù, corpus callosum ex tribus cruribus, seu columnis suffultum, quorum duo posteriora lateraliter supra eminentias anteriores Cerebri reuoluta, ad basim Cerebri pertingunt, alterum anterioribus Ventriculis interiectum, & tertio superctensum, in crista ossis ethmoidis terminatur.

Huius corporis idem est usus, qui fornicum in ædificiis, quippe cerebri molem sustentat, ne pondere suo tertium ventriculum comprimat, sed pedibus suis posterioribus dorsum reflexis, & supra magnas eminentias reuolutis, tectum siue partem superiorem interiorum ventriculorum sustinet, *Pedes Hippocampi* nominantur ab *Aranio*, & cauitates inferiores nuncupantur *ventriculi Hippocampi*, sed improprie, quia pictura *Hippocampi* apud *Rondeletium* & *Vlyssim Aldrandum*, longè discrepat: *napieus* & *Januandis* videtur esse apud *Galenum*, lib. 8. de usu partium, c. 11. & lib. 4. aduinnist. Anatomice, tectum concameratum ventriculorum anteriorum cerebri, quod quidem est durum & callosum. At corpus illud tribus columnis suffultum, quod *Vesalius* descripsit, inde alij omnes ab eo describere, vel est fulcrum fornici, siue concamerati anteriorum ventriculorum, vel est tantum portio ventriculorum. Ergo in huius corporis fornicati interpretatione, sequenda mens est ipsius *Galeni*, cum primus hoc nomen excogitarit, & huic parti assignarit. *Sylvius* cum *Vesalio*, similiter *Januandis* corpus accipit pro tribus, seu arcubus, ex durata magis Cerebri substantia confatis, quod veluti fornici ad ventriculi medij tutelam repræsentat.

Cum perueneris ad corpus callosum, obserua diligenter, An res illæ columnæ sint eiusdem portiones, quod melius inspicias cerebrum dissecando more *Varolij*. Choana parte anteriore iuxta transuersum ligamentum perforata est in nares, ideoque ventriculi anteriores non indigent foramine petuo in nares ad excrementorum expurgationem.

Rupto per medium fornici, eiusque cruribus distractis, Plexus, siue plexus *Choroides* apparebit, qui per amplitudinem ventriculorum supernè & infernè diffunditur. Ad illius principium ultra tertium ventriculum, *Glandulam* inuenies cano, siue nucupineæ similem, vnde *Conarium* dicitur: exposita aëri hæc glandula tepescit, ac veluti colligatur: eminentis illis, quæ Testes dicuntur imposita, pro firmamento plexus choroidis esse creditur, vel tanquam valvula canalis principio appositâ qui ducit ad quartum ventriculum, ut claudat & aperiat.

Secundum longitudinem huius canalis plures Particulas eminentes ac tuberosas, tanquam colliculos hinc inde dispositos notabis, ut canalcm illum efforment. Istis eminentiis veteres Anatomici obsecnarum partium nomina propter similitudinem, & ad distinctionem indidere. Primæ & maiores eminentiæ, quæ posteriores fornici columnas, siue pedes excipiunt, *Thalami neruorum Opticorum* dicuntur à *Galeno*, quos in gratiam, eorum neruorum constructos esse statuit, suumque inuentum esse gloriatur, lib. 16. de usu partium. Sequentes duæ eminentiæ minores Testes vocantur, quibus aliz duæ subiectæ *Ngies* appellantur, earum fissura *Anus*.

Postea succedit quartus ventriculus, cuius initio apophysis quædam appositâ est, quæ propter vermis figuram, *Vermiformis* dicta fuit. Nam ex pluribus particulis inuicem colligatis coagmentata, vermis sericei ritu producit & contrahitur. Vermis qui generatur in Cerebro, & Maniam inducit equo, an à putredine Humoris? An ab apophysi Vermiformi in vermem degenerante? *Percuquin*, Gallis dicitur, inde Proverbum, *Chacun a son Percuquin dans la tesse*, ac si intelligerent istam Apophysim Vermiformem. Quinetiam Veterinarij istum vermem interficiunt vitione factâ inter Caput & collum. Suprà tertium ventriculum & canalcm illum ad quartum vique

ventriculū, *Membrana* extenditur, quæ Apophysi scolicoidi affixa, principium quarti ventriculi circumdat, ut nulla fiat spirituum dissipatio, ut primus animaduertit *Galenus*, lib. 8. de usu part. cap. vli.

Quartus Ventriculus totus in cerebello latitat, ab aliorum Ventriculorum natura plurimum differt: Nam figura est spherica cerebello appositè respondens, propterea penè duplex videtur, fissurâ distinctus: ad eum plexus choroides non excurrit, quia purissimos cerebri spiritus continet, qui ulteriori non indigent elaboratione. Tantæ est amplitudinis, ut nucem grandiore intra hunc sinum quis facillè recondere possit.

Hunc Ventriculū spinalis medulla cerebello iuncta effingit, & constituit, ut ab eo in spinalem medullam spiritus celerrimè deriuetur. Propterea *Spegelus* inscienter & imperitè hunc sinum indignum iudicauit ventriculi nomine, quoniam in ipsa cerebri, cerebelli substantiâ non est situs, neque primaria intentione à naturâ insculptus, sed ex corporum concursu, & dispositione necessariò talis emergit, dum superiorem eius portionem cerebellum, inferiorem spinalis medulla componit. Ac proinde nugæ putat, si spiritus contineat, sed si accuratè structuram & conformationem vsumque indagasset cum *Arantio*, nunquam istas nugæ effudisset, suisque scriptis inferuisset, quoniam *Herophilus* hunc Ventriculū principalissimum esse censuit, referente *Galeno*, libro nono de usu partium, & eleganter *Laurentius*, hunc Ventriculū præ cæteris nobilissimum demonstrauit, *quæst.* 12. lib. 10.

Quod spectat ad Numerum Ventriculorum Cerebri, si diligenter exploramus, & introspeciamus cavitates Cerebri, ex duabus cavitatibus. tam supernis quàm infernis anteriorum Ventriculorum vnicam cavitatem effingi obseruabis. Tertium Ventriculū canalem esse deprehendes ab anteriorum ventriculorum cavitatē productum ad cerebellum, ubi continetur alter Ventriculus, *cisterna spirituum animalium*, qui in nervos, cerebrum & spinalem medullam distribui debent.

Dubitare posset aliquis, si Ventriculus quartus cerebello totus insitus, & immetus, motus alicuius sit particeps, quia semper adaptum teneri probabile est affluentibus spiritibus in eum Ventriculū, ut inde in nervos cerebri & spinalis medullæ deriuentur. Ventriculū hunc quartum non moueri inde coniciitur, quia cerebellum in quo continetur, aliter conformatum est quàm cerebrum: Nam cerebelli superficies exterior caret anfractuosis meatibus, nec admittit venas errabundas, ut cerebrum, nec arterias habet eius ambitum infernè sursum teptantes. Denique quod cerebelli substantiâ à cerebro prorsus disiuncta sit.

De usu Ventriculorum Cerebri non conuenit inter recentiores Anatomicos. *Nicolasus libello peculiari* probauit Ventriculos esse dumtaxat conceptacula aquei & serosi excrementi, quod ex nutritione Cerebri plurimum redundat. Hæc opinio pluribus placuit, ac præsertim *Fontano in Physiologia*, & *Banhuo in Anatome*, atque *Varolio* tanquam Inuentori adscribitur, cum tamen primus *Nicolaus Massa in Anatome*, pag. 85. & 86. demonstrauerit ventriculos Cerebri, præsertim anteriores, excrementorum Cerebri conceptacula esse, spiritum verò animale in arteriis contineri. At verò *Galenus*, lib. de usu partium, & *comment. ad Aphor.* 51. lib. 7. ex *Hippocrate*, docet in cavitatibus Ventriculorum Cerebri spiritus coerceri, atque productio nervorum Opticorum ab istis ventriculis, manifestè probat, inde spiritus visuos tanquam è cisterna derivari: si quæ producuntur aquosa excrementa intra Ventriculos Cerebri, aut aliunde deriuantur, confestim per Choanā descendunt ad basim cerebri, vel defluunt in partes inferiores anteriorum Ventriculorum, quæ ad basim cerebri excurrunt. Quod si contingat Choanā obtuari, serum intra Ventriculos anteriores defluens, si excurrat in quartum Ventriculū, derepente iugulare potest.

Est autem Cerebellum paruum Cerebrum. τρυφώδης, quasi accessio ad cerebrum, duplicatæ meningis interuentu disclusum, supernè coniunctum & continuum existit, versus quibusdam stritum, infernè ad basim in duas partes diuisum spectatur. Ut enim Cerebrum parte superiore bifidum exiit, sic Cerebellum parte inferiore bipartitum est. Substantiâ constat ipso Cerebro duriore, intra se continet *cavitatem insignem*, nempe *quartum Ventriculū*. Spirituum animalium cisternam à qua in nervos Cerebri, ipsamque medullam spiritus effunduntur, videturque propter quartum Ventriculū, in quo spiritus animales perficiuntur & conseruantur, Cerebellum extractum. Inde occipit vacuum, minusque Cerebri continere scitipit *Aristo-*

nes, quia Cerebellum ibi continetur, quod differt à Cerebro, vel quia Cerebellum totum sinuosum est & excavatum. Huius cavitatis quartæ Fornix, parte anteriore & posteriore vermiformi corpusculo cingitur, itaut duplex esse videatur *Apo-physis Sceloides*, anterior una in limine seu vestibulo cavitatis sita, quæ porrecta & exensa ingressum occludit: contra & retrorsum reducta viam patefacit: quoniam tantum limen cavitatis referat, quantum retrorsum accedit. In ea cavitare *Fissuram calami* ad scribendum aptato similem, spinali medullæ inscriptam & insculptam obseruabis, quæ nihil est aliud quàm *spinalis medullæ diremptus*. Alij tamen spiritum animalem rectè dirigere in spinalem medullam arbitrantur. Quomodo ista *Fissura* sit intelligenda, *Jacobus Cains Britannicus* explicat notis in lib. *Galenus administr.* non vniverso calamo similis est ea pars Cerebri, sed ei tantum parti, quæ ex celatura incisioneque simplici vt olim, non duplici vt nunc, exit in cuspidem, quæ literas figurat; ita enim antiquitas suos formabat calamos, vtque illis rima est & fissura, quæ atramentum inter scribendum elabatur, ita in hac spinalis medullæ parte fissura quædam oblonga exarata est, quæ fissuram calami imitatur. Deinde in pavimento canalis prope vestibulum quarti Ventriculi ductum inuenies, qui antrosum deducit in Choanam excrementa quarti Ventriculi, ab eaque fluere in palatum. Tanta est huius Ventriculi præstantia ad vitæ conseruationem, vt eo tacto confestim pereat animal, ex subita iactura spirituum, ideoque *Galenus* sectione spinalis medullæ in occipitio animalia enecabat, eoque modo mactari pecudes in Græcia recitat, vt testatur lib. 7. *administr. Anatom. & lib. de Placitis*. Vnde si contingat serosum humorem in eum Ventriculum subito & confertim irruere, derepente etiam sanus homo extinguitur atque suffocatur, sine vlla conuulsione, vt in quibusdam obseruatum, qui reliquas corporis partes sanas habebant: ideoque rarò in aliis affectibus Cerebri lethalibus, nisi repentino isto casu moriuntur ægri, quartus hic Ventriculus humore differtus repletur.

Vt huic incommodo prospiceret Natura, à tertio in quantum Ventriculum canalem angustissimum pollicis longitudine constituit, quem duriusculis corpusculis tanquam colliculis obvallauit ad firmitatem maiorem: in eius canalis vestibulo *Conarium* apposuit ad humores repellendos, & in altero extremo, quod est ingressus quarti Ventriculi, processum vermiformem adiunxit, qui sublatus & extensus instar repaguli, humoribus viam intercipit, & sæpius in canalem illapsus, per foramen in pavimento canalis exaratum deriuatur in Choanam. Quare si quendam videbis subito & inopinato mortuum, illico tentabis exsiccationem cerebelli, & reuulsionem humoris illapsi in quantum Ventriculum profunda vlsione occipitij cum ardenti carbone vice candentis ferri, quod semper non est ad manum, & ad cuius ignitionem opus est tempore. In præcipiti isto casu cum festinatione rapienda sunt præsidia.

In Cerebello propter duritiem, & siccitatem *Arabes* memoriam collocant, quibus fauere videtur *observatio Beniuensis*. In quodam fure cerebellum defuisse vidit, idcirco sæpius in furto deprehensus & admonitus, præcedentis facinoris non meminebat. In iis, qui continuo dolore capitis in occipitio laborarunt, deprehendi cerebellum mollius ipso Cerebro, in aliis aridum & fragile.

Detracta anteriorum Ventriculorum portione, *Choanam* obseruabis, quæ est peluis seu infundibulum instar vtriculi, aut manice oinoeraticæ, ex portione tenuis meningis constatum, in quod omnis confluit, deriuaturque Cerebri colluies: excipitur à *tribus duabus glandulis* in sphenoidis sella collocatis, quæ Cerebri excrementis inebriatæ, sese exonerant per *quatuor canales*, vtriusque duos, in palatum productos.

In circuitu sellæ sphenoidis continetur *Rete illud admirabile*, ex carotidibus arteriis contextum, de quo tam magnæ fuerunt inter Anatomicos controuersie. In homine textura est admirabilis arteriarum æqualiter ampla, vt in brutis animantibus. Sed euidenter conspicitur in uerso Cerebro, quando dissectatur, more *Vasalis*. Præterea discissa ac reuulsa dura meninge, quæ circumdat sellam equiam, fossulas inuenies innumeris arterioliis refertas, quæ Retis Mirabilis naturam præ se ferunt, itaut de hyparxi Retis Mirabilis non sit dubitandum. *Nicolaus Massa* eleganter demonstrat illud *Rete Mirabile* ratione, & *animâ*, & modum illud inuestigandi, ibique soporem exreptione arteriarum, somnum ab effumatione sanguinis generari. Nihilominus tamen *Jacobus de Carpo comment. in Mundinum, pag. 459. & Philippus Ingrass-*

*ſuas comment. in lib. Gal. de off.* nullum Rete Mirabile in homine reperiri cenſent. At tamen fatetur *Carpus* ſe multoties inter duram matrem, & os Baſilare aliquid intricatum deprehendiſſe, ſed neſcit iudicare, an ſit hoc Rete, vel alia intricatio, tamen ſi datur Rete Mirabile eo modo, quo dicit *Galenus*, de facto ego teneo, quod prædictæ intucationes ſint Rete Mirabile, &c. Hallucinatur *Volcherus Coiter*, dum Rete Mirabile, non ex arteriis, ſed è neruiſtertix coniugationis contextum eſſe ſtatuit. Prudenter *Sylvius* aduerſus *Veſaliũ* in humano Capite extare, eiufque inueſtigandæ rationem docet, ſi carotidem in collo inſtaueris, id Rete cum ſtatu ſubſultare conſpicias, & ſanguinem ex iis arteriis, ſi vulneraæ ſint eodem ſtatu expui in cranij capacitatẽ, quod ſi ferriſ falcatis oſſa temporum, deinde lapidoſa peritẽ ſecueris, arteriam carotidem totam cum ſuis omnibus ramis à cranio eximes, æſpectandam exhibebis. Rete mirabile deſcriptum à *Sylvio* illud eſt, quod ſub dura meninge continetur ad baſim cranij in circuitu ſellæ oſſis ſphenoidis: vbi quatuor arteriæ ſubeunt, & ingrediuntur Cerebrum. Duæ parte poſtica per vndecimum foramen cranij Cerebrum penetrantes. Aliæ duæ dictæ carotides per illos hiatus cranij iuxta neruos opticos ingredientis, & circa ſellam ſphenoidis, quatuor illæ arteriæ inter ſe coeunt, plexum illum verè mirabilem ſive reticularem conſtituunt.

Aliud Rete Mirabile ad baſim Cerebri collocatum, propago eſt Choroidis plexus, qui anteriores Ventriculos, tam ſuperiores quàm inferiores perrepat, atque iſ plexus Choroides efformatur ex vena illa magna à *Galeno* deſcripta, quæ quarti canalis extremo aſſixa, à nulla alia vena propagatur: Nec ſine ratione *Pelops Galeni Præceptor*, principium venarum in Capite conſtituebat, cùm videret venas in Cerebro ab aliis nullo modo productas. Quod ante *Pelopem* alij propoſuerant, & reſelluntur ab *Ariſtolele*, libro tertio de partibus animalium. Plexus ille Choroeides in hoc diſcrepat à Rete Mirabili, quod ex arteriis conſtitur, plexus verò Choroeides ex venis formetur. Vtriuſque vel alterutrius continuatio inſuſſato ſpiritu perſequenda, & perluſtranda erit.

In plexu mirabili generari & formari apoplexiam illæſis Ventriculis ſuſtinet & probat *Fernelius* ex propria inſpectione, lib. 2. de abditis rerum cauſis cap. 15. & in *Parthologia*, quod eſt veritati conſentaneum, nec enim crediderim Ventriculos omnes Cerebri, præſertim anteriores tam vaſtoſ & amploſ obſtrui in apoplexia, multo minus in epilepſia: Nam in diſſectis cadaueribus apoplecticis, non reperitur ſerum maiore copia intra Ventriculos anteriores, quàm in aliis hominibus alio mortis genere eneſtis: quod ſi in quantum Ventriculum conſluit, diuinam fauiſſam ſpiritus animalium, & vnde nerni oriuntur, iude paralyſis totalis, vel dimidiata emergit.

Poſtea ſeptem neruorum coniugia inſpicias, eorumque diſtributionem fraëtis & diſſectis oſſibus cranij perſerutaberis. Videbis autem, ſi diligens fueris, neruos omnes à ſpinali medulla & cerebello prodire, vbi ſpiritus animalis ciſterna, quod primus ſignificaffe videtur *Hippocrates*, lib. de oſium natura. Neruorum, inquit, exortus ab occipitio eſt, & occiput dicitur *ſum*, quod ab eo *ſum* nerui producantur: id *Varolius* in negro libello demonſtraui, quod antea *Columbus* ſubolſecerat. Certum eſt ex ſpinali medulla omnes neruos oriri, prout intra Cerebrum radices agit, vel in ſpinam propagat. Neruos autem in Cerebro decuſſatim interſecari exiſtimarunt *Arctæus*, *Chron.* lib. 1. cap. 7. & *Cæſius* ſatrapoſiſta in *Problematis*, itaut dexter à ſiniſtro latere, & viciffim ſiniſter à dextro oriatur, in exortu ſele interſecantes in modum chyſmi. Talis neruorum conſtitutio non obſeruatur, niſi in ſexta neruorum coniugatione, vt annotat *Galenus*, lib. 9. de uſu partium. Ex illa neruorum decuſſatione fieri putant, vt dextra parte percuſſa Capitis, ſiniſtra conuellatur, & viciffim iſta ſiniſtra parte, dextra conuulſionem patiatur.

Mammillares proceſſus in homine ſunt renuiſſimi, in brutis verè mammillares exiſtunt. Hos nunquam veteres in numero neruorum collucarunt, quia cranio non exidit, ſolus *Nicolaus Maſſa* in ſua *Anatome* neruos eſſe probat, quod iterum demonſtrat *epiſt. 6. lib. 1. aduerſus Veſaliũ*, quem tacite perſtringit, & veluti plagiarium furtiuiſ pennis inſtar corniculæ æſopice exornatum ſuggillat: ibi docet ex *Galeno* lib. 15. de uſu part. neruos eſſe ad nares decedentes: licet ipſe alio loco inter neruos Cerebri non enumerauerit. Sed lubentius amplector vulgatam *Anatomicorum* opinionem, Mammillares Proceſſus parte inferiore ſupra coalitum neruorum Opticorum pe-

atrant Ventriculos anteriores Cerebri, qui sunt breuiter perforati ad infertionem & penetrationem iforum proceffuum: foramen iftud inftar fifluræ euidentiùs apparet in Cerebro fenis hominis, diducta digitis portione anteriore Ventriculorum confpicitur. In bafi forfan iftud foramen non apparet propter mollitiem Cerebri in quibusdam adultis, multò minùs in pueris, fed in Cerebro duro & fcco fenilis corporis fæpius obferuari.

Itaque prima cotingatio ex opinione omnium *Anatomicorum* erit *neruorum optidorum*, qui à posteriore Cerebro prodeuntes, ex fententia *recentiorum Anatomicorum*, per caluariæ foramen in oculi centrum defcunt. *Galenus* à primis & maioribus eminentiis *neruos Opticos* deriuat, iftasque eminentias *Thalamus* vocat, in gratiam *neruorum Optidorum* conftitutas. Opus naturæ admirabile *Anatomicis* incognitum, & à *Galeno* deprehenfum, quod miros *posterioribus Anatomicis* Indidum & intadum fuiffe, cum tamen id fit maximi momenti in Medicina, Phyfica, & Optica. Propterea moneto & demonfiro, *neruos opticos reuolutos effe* circa magnas illas eminentias Cerebri, quas *Galenus Thalamus neruorum optidorum* appellat, qui ad Ventriculos anteriores & superiores perueniunt, inde fpiritus opticos depromi, tanquam ex ipfa fcaturigine certum eft, ac indubitatum. Coalitus prope fellani fphenoidis comparatus fuit, ad reffluxum fpiritus vifui ab vno oculo in alium. In exortu fuo cum fint molliffimi, lenfim progredientes duriores euadunt, ne in tanta itineris longitudine periclitarentur; circa fellam fphenoidis inuicem coeunt, per medullæ confufionem mutuamque penetrationem: ita coniundi fibi mutam præftant operam, vt in progreffu fuo per iftâ interfectionem roborentur, & vifilis fpiritus ab vno oculo ad alterum mómto confluat ad vifum augendum, non tantum in fanis, fed etiam monoclis, vt vnici duos videndi acie æquare poffit, atque obiectum fimplex & vnum, tale repræfentetur ambobus oculis, quod non probat *Carpus*, quia talis vnio in aliis fenforiis neceffaria foret. Sed ifta coniunctio in neruis aliorum fenfuum non adeo neceffaria erat, quia nullum fenforium adeo mobile, vt oculus, nec eorum operationes funt ita neceffariæ: ficuti vifio. Verum fi coniunctio formarum in *neruorum optidorum* interfectione fit caufa, cur vna eademque res ambobus oculis appareat: qui fieri poterit, vt digito alterum oculorum premente, vnica res gemina videatur? cum ea oculi preffio *neruos opticos* non dirimat. *Galenus* cum eam caufam frigidam & inanem effe intelligeret, ad demonftrationem conuerfus reperit, pyramidum fub radiis ab oculo emiffis comprehenfarum, eandem effe bafim, ob idque vnâ & eandem rem duobus oculis vnâ apparere, digito vero alterum oculorum premente, bafes illas geminari & dirimi, ob idque eandem rem geminam eerni. *Galenus, fine alius Auctor lib. de Oculis*, plures rationes profert, vt demonftraret *neruorum optidorum* coitum neceffarium fuiffe. *Aetius* huius connexionis diuulfionem repentinam cæcitatem inferre notauit. Vidit tamen *Vefalius* opticos *neruos* naturaliter feparatos fine vlla vifus læfione, *lib. 4. cap. 4.* Quod etiam *Valnerda* obferuauit, qui præterea monet fingulis annis leui negotio *Patanus* demonftrari *neruos opticos* non decuffatim coire. Nam latronibus oculorum altero, ob primum furtum Venetiis eruto, euenit vt poft annum vnium vel alterum fufpenfi *Patanus* diffectionis caufa deferantur, in quibus *neruus oculi* adempti flaccidus, & prope aridus occurrit, altero profus illæfo. *Cafalpinus* notat in *Anatome* publica, *Pifis* celebrata anno millefimo quingentefimo nonagefimo repertum fuiffe, alterum ex *neruis viforiis* attenuatum, alterum plenum. Vifus autem erat imbecillis in oculo, ad quem *neruus extenuatus* ferebatur. Habuerat enim vulnus in Capite, circa eandem partem. *Neruus autem extenuatus* non ad oppofitam partem procedebat, fed ad eandem ftegebatur, vnde omnes fpectatores argumentum id certum exiftimarunt, *neruos viforios* nequaquam fe interfecare, fed coire & regredi ad eandem partem.

*Opticos neruos* perforatos effe, fcribit *Galenus, lib. 10. de vfu partium*, ad fpiritus animalis delationem. Sed nolla cauitas, *recentioribus Anatomicis* diligenter intueftibus apparuit. Ipfe met *Vefalius*, cum summam operam adhibuiffet in inueftiganda optici nerui cauitate, tandem deprehendit folidum effe ex variis fibrulis conflatum, interueniente paffim fubftantia medullari. Qui verò nerui optici cauitatem defendunt, in fimilis manifeftam effe dicunt, quinetiam in Homine, modò *neruus* ab exortu non flatim tranferim fecetur, fed paulò ante infertionem. Verum *Galenus* nulla eget excufatione & defenfione, cum ipfe fuam opinionem interpretetur *lib. 71*

de placitū Hippocratis & Platonis cap. 4. & libello de Oculis cap. 3. tres enim conditiones requirit ad peruidendum optici nervi foramen, vt animal sit magnum, nuper maculatum, & in lucido aere conspiciatur. Præterea si nervi non essent perforati, quomodo fieret amaurosis? Nervus opticus transuerſim dissectus, perforatus vidi, & ante coitionem foramen apparet, idem fatetur *Spigelius*. In ipsa coniunctione solidiores sunt, vt per earum substantiam spiritus traductus subtilior reddatur, & ne statim ad oculos affluens cito dissipetur. *Iacobus Carpus comment. in Mundium*, ingenuè fatetur, se nunquam deprehendisse illam cavitatem nervorum opticorum, quam semel vidit in nervis Opticis vnius porci, erant enim concavi sicut vena seu arteria, sed in homine nunquam vidit talem concavitatem, per substantiam ipsorum nervorum, sed interdum inuenit aliquod vacuum in centro eorum, in loco medio suæ inercitationis, & forte non apparent concavi, quia mortuo animali porositate eius clauduntur: opticus suillus, si credimus *Vesalio*, non est corpus continuum, sed perinde ac crurum nervi ex multis funiculis constatus.

*Secunda Coniugatio* oculos mouet, in exortu suo continua est, vt vnum quasi funem constituat, vnde fit, vt vnius motum sequatur alter oculus, & ambo in idem laus contorqueantur.

*Tertia Coniugatio* statim in exortu suo diuiditur in duos insignes ramos, quorum alter cranio excidit, alter in orbitam oculi deſertur, quam vbi attingit, rursus in duos furculos dirimitur. Superior ramus per foramen superioris orbitæ traductus in palpebram superiorem & musculum frontalem inseritur, inferior per infernam orbitam inter duas laminas delatus, in musculos labij superioris ramulosè absuntur. Hunc Surculum notauit *Galenus*, lib. 9. de vsu partium, c. 8. qui diligenter obseruandus propter conuulsionem & contractionem labij superioris, quæ nuper accidit baculo percussâ genâ. Hæc nullo alio remedio curari potuit, quàm ferro candente inusta parte. Nervus inflammato non pauci spasmo correpti sunt, & mente alienati, quorum quidam sic affecti, cùm sapientiore Medicum nacti essent, nervo inciso, statim spasmo & mentis alienatione liberati sunt. Ex *Galeno* lib. de mot. musc. cap. 1. Alter ramus tertiæ coniugationis, qui cranio excidit linguæ communicatur, & per internum maxillæ inferioris foramen traductus, & per foramen eiusdem maxillæ externum egressus in musculos labij inferioris absuntur, singulis dentibus furculos tribuens.

*Quarta Coniugatio* tota in oculum abit.

*Quinta* in maiorem & minorem furculum dirimitur: Maior foramen auditorium seu cochleæ extremum subit, ibique terminatur, alter per aqueductum *Fallopi* ductus, per foramen inter styloideum, & mastoideum apophysim latitans, in fauces delabitur, obiter in nares & buccas transmissis furculis, sed maiore sui parte radici dentium, linguæ, & laryngi distribuitur. Hinc surdastis vox rauca & raucidula redditur, & magnas hæmorrhagias siliit arcta & vehemens aurium oclusio, apud *Galenum* lib. 3. de vni. Hinc à sono aspero citra contactum dentes offenduntur, apud *Galenum* lib. 3. de vni. Hinc à sono aspero citra contactum dentes offenduntur, & natura surdi sunt moti, & surdi anhelosi, qui durius aures scalpunt, tussunt, & peripneumonici aures madent, & parotides illis superuenientes faustæ: hæc omnia contingunt propter nervum quintæ coniugationis istis partibus communicatum. Eadem ratione apud *Hippocratem* 4. Epid. part. 26. cum Athenadæ puero dens dexter grauiter doleret, sedato dolore, auris dextra suppurauit, ex dente ad eam partem translata materia. Non potui obseruare, nec verum puto quintam coniugationem comitari sextum par nervorum, & ad extremum peruenire, vt refert *Banhus*. Obseruavi tamen è foramine auditorio interno portionem auditorij nervi surreptam, lateralliter spinalem medullam perreptare.

*Nervus sexta Coniugationis* caluariâ egressus carotidi arteriæ comes adinngitur, ibi in duos ramos dirimitur, quorum alter in musculos superiores spargitur, alter ad clauiculas descendit: vbi dexter in duos ramos *Recurrentem* & *Stomachicum* diuiditur. Sinistri eadem diuisio, sed intra Thoracem iuxta reſectionem Aortæ descendens: illius distributio in nervis Thoracis explicata fuit.

*Septima Coniugatio* à spinali medulla infra Cerebellum emanat, & in linguam ac musculos laryngis abit. Interim notabis omnes Cerebri nervos. exceptis opticis & motorijs oculorum, ex pluribus filamentis simul implexis conflatos esse, quæ quidem filamenta ab origine sua sunt discreta, mox in vnum coalescunt, membranis firmissimo amplexu, quæ reuulsa, facile separantur filamenta. Optici nervi substantia soli-

solidiuscula, est compacta veluti medulla, vnde cognoscitur opticum neruum alterius esse naturæ, & ab aliis nervis omnino distinctum.

## D E F A C I E.

## CAPVT III.



**P**ARS altera Capitis glabra, *Facies* dicitur, vni homini concessa, melius animantibus os, vel rostrum. Est autem facies rota corporis habitudo, quasi factura corporis, & si credimus *Grammaticis* à faciendò dicta, quod maiore apparatu, quàm cæteræ partes fabricata fuerit, vel quod homines à brutis differre faciat. Quamuis enim in singulis humani corporis partibus egregium diuinæ sapientiæ specimen tanquam in speculo elucescat, vna tamen facies cum ob artificij elegantiam, & pulchritudinem, tum admirabilem cum animo consensum, reliqua membra dignitate ac pulchritudine longè superat: Non est formosa mulier, cuius crus laudatur, aut brachium; sed illa cuius vniuersa facies admirationem singulis partibus abstulit. Hanc partem Deus admirabili & inexplicabili artificio extruxit. In superiore parte *Frontem* amœniter frontentem, tanquam vultus frontispicium, & propylæum collocauit, cæli Capitis pulcherrimâ plagam, in qua tristitiæ, hilaritatis, grauitatis, & humilitatis sedes est. *Supercilia* frontis termini, tanquam suggrundia, vel imbricamenta, Oculis munimentum præbent. Fronti subiacent *Oculi*, gemina illa sidera, duo veluti Soles vniuersum corpus illustrantes, affectuum animi & corporis indices ac iudices. Latet vultus elaudunt *Aures*, musarum filix, orbem Capitis æquis portionibus secantes. Oculos determinat *Nasus*, in quo latet sagacitas, per quem non minus fouetur animus, quam per aures intellectus: sternit tamentum eadem agitur parte, signum augurale, & vnum è spiritibus sacrum. In Genis nobilis illa ruboris purpura efflorescit, pudoris & ingenuitatis index. Ab Ore manat sal sapientiæ, cuius delubrum Os, labris veluti suauitatis liminibus clauditur. *Mentum* pulcherrima meta stadij ac circi faciei, *apex* & *vertex*, ex *Democrito* acuminatum, & lyre simile nutu monendo, animi sensa declarat. Denique in vultu agnoscitur visum & expressum Dei simulacrum. Propterea facies ab *Homero* Soli comparatur. *Plato* *hîndus* appellauit, prudenterque *Constantinus Augustus* vetuit in facie noxiorem scribi, quod dedecret faciem foedari, quæ ad similitudinem cælestis pulchritudinis esset figurata. Idcirco Romani scuro edicto vetuerunt, ne mulieres in luctu genas sibi lacerarent, vt in *duodecim Tabulis* legitur. Mulieres genas ne radunt. Est enim facies pudoris & reuerentiæ, & auctoramenti imago, *ut* *Menestheus* *ut* *Antisthenes*, & *ut* *Plutarchus*, *idem*, ex *Artemido*, lib. 4. c. 9. Præterea in facie totus homo tanquam in parua tabella continetur. Nam ex facie genus dignoscitur, ex facie homines inuicem distinguuntur, ex facie totius corporis mensura deprehenditur, ex facie præcipua Physiognomoniz signa depromuntur. Præterea, facies ætatem & pulchritudinem demonstrat, sexum separat, dignitatem hominis ostendit. Tandem facies certissimum est animi nostri exemplar, & amplissimum eorum quæ in abscondito latent theatrum. Vultu plurima intelligimus, & est sæpe pro omnibus verbis, ait *Quintilianus*. Oculi, supercilia, frons, vultus denique totus, sermo quidam mētis tacitus est. Sic Iacob ex facie Laban, eius in se odium deprehendit, & ad vxores conuersus dixit, cognoui ex facie patris vestri, non esse amplius in me, qualis heri fuerat. Denique Medicis sanitatis & morbi indicia suppeditat, vitæ mortisque præfagia declarat, quæ quidem omnia sigillatim demonstrabo. Imprimis apparent in facie parentum & agnationis firmissima signa, ex quibus proles cognoscitur, quod significauit *Poëta*, lib. 8. *Æneid.*

ut se fortissime Tenebrum

Accipio, agnoscoque lubens, ut verba parentis,

Et vocem Anchisæ magni, vultumque recorder.

Est etiam admirabilis facierum varietas prudenti naturæ consilio facta, vt singuli propriis notis discernerentur, ne eorum similitudo errorem in oculis spectantium pareret. Percontatus D. *Andreas Apostolus* à dæmone sub femine forma quodnam esset maius in terris miraculum. Respondit facierum in hominum genere diuersitatē. Nam cum in facie vultuque nostro, sint pauca membra, nullæ duæ in tot millibus hominum indiscretæ effigies existunt, quod ars nulla in paucis numero præstat affectan-



do. Cur facta fuerit ista facierum diuersitas eleganter *Nemesius lib. de nat. hum. cap. 41.*

Cum autem nostrum corpus nihil aliud sit, quam harmonicum instrumentum omnibus numeris absolutissimū, huius principium est *Facies*, à qua reliquæ totius corporis proportionēs, sicut à monade numeri, & à puncto lineæ dependent. Omnes enim corporis partes ad faciei normam sunt ita commensurate, vt sit facies longitudinis, latitudinis, & profunditatis in humano corpore probè conformato regula & mēsurā, vti docent *Vitruuius lib. 2. & Pomponius Gauricus, lib. de Symmetria*. Propterea pictores, vel statuarij hanc solam partem exprimere satis esse putant, vt qualis quisque fuerit, intelligatur, quia totus homo in facie velut in compendiosa tabella comprehenditur, ex *Aristotele scēl. 6. Probl. 1.* quod confirmauit *Plutarchus in vita Alexandri magni*. Nec tantum à facie reliquorum membrorum proportionēs dependent, sed etiam ab ipsius nēuis reliqui per vniuersum corpus efflorescentes, tanquam à radice prodeunt & producuntur. Res profecto mirabilis, sed tamen certa, nēuis qui in fronte conspicitur, comitem ac veluti sodalem habet alium in Thorace, qui in naso nēuis exoritur, similem in pene demonstrat, & in Muliere, in labris vuluæ. Qualis in genis nēuis apparet, talis in coxis conspicitur: hæc de re libellum elegantissimum edidit *Seperatus*. Præterea facies totius Physiognomoniz pars præstantissima, morum & animæ præbet indicia certissima, ex hac qualis quisque fuerit, faciliè cognoscitur, quoniam vultus sermo quidam est tacitus mentis. Sic appositè dicebat *Adamantius*, ex fronte & vultu etiam in ipso oris silentio naturam proloqui. *Vultus* idcirco dictum volunt, quod voluntatem detegat. In facie prudentis lucet sapientia, & bonam ac laudabilem faciem *Ecdesias* appellat vestigium boni Cordis. Idcirco præclare mīti videntur fecisse Reges illi ac Principes, qui scientiam diuinandi ex facie magnificebant, vt vtilem ac necessariam ad cognoscenda suorum subditorū vitia & virtutes. Narrat *Tamblicus* morem Pythagoreis fuisse neminē in Lyceum admittere, nisi prius vultus lineamenta diligenter inspexissent. Vnde *Plato* apud *Plutarchum*, ex faciei dignitate prædixit Alcibiadem ad summum Reipublicæ fastigium peruenturum. *Nicollus* rati apud *Stobæum* prudentem monet non perfunctoriè, sed attentè & studiosè faciem vxoris futuræ considerandam esse, vt illius cum qua viuere debes, morēs deprehendas. Cum plures de aliquo crimine sunt accusati, primus quæstioni subiici debet, ex opinione Iurisperitorum, qui facie fuerit deformiore.

*Disortum vultum sequitur distortio morum.*

Quale pondus habeat ipse vultus, eiusque compositio rectè *Poeta* indicauit.

*Nec vultu destrue verba tuo.*

Potest enim vis orationis vultu manifestè prodī & labefactari, quin etiam facta non minus quàm verba vultu pariter destrui possunt, si credimus *Ciceroni*. Nec tantum morēs animi ex facie cognoscuntur, sed etiam vitæ decursus in ea descriptus legitur.

---- *Facies tua computas annos,*

Apud *Iuvenalem Satyra 6.* Sexus quoque diferimen facies constituit, quæ in mulieribus depilis ac mollis est, in viris hirsuta atque veneranda pilorum segete decorata, vt vir esset femina venerabilior, & aspectu grauior, iudicio *Galenī*. Faciei venustas & pulchritudo, tam suavis & amabilis existit, vt apud Persas Gymnosophistæ ad regale solium dumtaxat eueherent, quos formæ pulchritudo commendaret. Nec olim in Elide sacris ministeriis fungebantur, nisi qui dono pulchritudinis exornati fuissent, quod existimarent diis gratiores fore victimas, si à formosis hominibus sacrificarentur. Quinetiam primæuo tempore honores & opes hominibus distributas fuisse, pro faciei cuiusque dignitate prodidit *Lucretius lib. 3.*

*Condere ceperunt vrbes, arcemque locare*

*Præsidium Reges ipsi sibi, persequimurque.*

*Et pecudes & agros diuinit, atque dedere*

*Pro facie cuiusque, & viribus, ingenioque,*

*Nam facies multum valuit.*

Quod in *Æthiopiā* scitari notauit *Aristoteles lib. 4. Politicū cap. 4.*

*Si verum excutias facies, non vxor amat:*

*Tres ruga subeant, & se cuius arida laxet,*

*Fiant obscuri dentes, oculique minores,*

*Collige sarcinulas insit Libertas, & exi,*

*Iam grauis es nobis.*

Insuper ex facie maiestas & veneratio hominis dependet, quoniam in facie animæ vigor, nē inhabitat, quem etſi non vident animantia, tamen reformidant, inquit *Diſcus Ambroſius*, ſicuti nos Deum quem quia non videmus, timemus, & c. plus metuimus, quia non videmus. In hac vultus platea corporis omnes ſenſus collocantur, vt eſſet pictura conceptuum, ſpeculum intentionum, quāvis Momi fenestra certius, ad explorandam hominum indolem, mores & ingenium. Denique facies certa vitæ ſupeditat indicia, qualis enim humor in venis dominatur, talis in vultu efflorefcit, colore deſignatur. Proinde ſanguinei facies roſea conſpicitur, bilioſi ſaua, melancholici ſuſca, purpureus genarum color Pulmonis æſtum declarat, ibi magis elucens quam alibi, propter cutis tenuitatem & pinguedinis penuriā. *Galenus* ex facie iudicabat Hepaticos, idcirco non ſine iuſtiſſima ratione *Diſſimus Præceptor* monet diligenter agroti faciem explorare, ſitne ſanorum ſimilis an diſſimilis, ac multum immutata. Faciem cadaueroſam ipſe deſcribit lib. 1. *Prognost.* ex qua mortem præſagire licet. Sed admirationem ac fidem ſuperat, quod narrat *Plinius*, lib. 3. cap. 10. Protogenes imagines adeo ſimilitudinis indiſcretæ pinxit, vt incredibile dictū *Apollon Grammaticus ſcriptum reliquerit*, quendam ex facie hominum adiuuantem quos *Metoposcopos* vocat, ex liis diſſiſſe, aut futura mortis annos, aut præterita.

[illegible]

Itaque faciem in tres partes diuido, Frontem, Maxillam superiorem, & inferiorem.  
*Frons* autem à ferendo dicitur, quod animi indicia præ se ferat, est enim animi ianua  
*Ciceroni*, Varro tamen à foraminibus oculorum potius dictam existimat. Alij deducunt  
à φρῆν, sentire, quod ἡ φρῆν, mentis iudex sit. Græcis μᾶστις supra oculos, quia  
ut notat *Magenus Etymolog.* Gracum, μᾶστί hic idem sonat, quod σῶφ. Nescit *Scalegger*,  
quare Græci frontem dixerint μᾶστις, nec enim conuenit etymon, quippe μᾶστις ὁ  
ὀφθαλμὸς, nequaquam est supra oculos.

In diffecione partium quæ faciæ componunt, diuifionem illam partium Continētium & Contētarium obferuabis. Continentes Communes funt Cuticula, & Cutis, quæ ibi tenuiffima eft pueris, & mulieribus læuis & polita. Poft adolefcētiā in maribus numerosa pilorum fegete decorata, quæ barba dicitur, nulla pinguedo nifi in fpaciis mufculorum reperitur. Carnofæ quoque Membrana velamen deeft, quæ terminatur in mento, nec infat lazæ totam faciæ contegit, vt exiftimant *veteres Anatomi*. In fronte tamen potius pro Membrana Carnofa duos huius partis mufculos accipere. Continentes propriæ funt Mufculi, & Offa. Contētæ quatuor fenfuum organa, quæ ſitum habent in faciæ, cuiufmodi funt Oculi, Aures, Nares, & Os, in quæ lingua guftus instrumentum continetur. Faciæ autem irrigatur Venis à iugulari externa iuxta aures prodeuntibus, & arteriis à carotide productis. Nervos recipit inferiores à tertio pari neruotum Cerebri, qui ſub pavimento orbitæ intra duplicem laminam officam traducti, & per foramen infra orbitam egreſſi in totam faciæ difſeminantur, præſertim in lazæ pedis anferini furculosè ſupra buccarum mufculum diſperguntur.

## DE OCVLO.

## CAPVT IV.



*S*VMMA boni est, alacres homini contingere vifus,  
Quos quasi custodes, defensoresque peruli,  
Prospiciens summa Natura locauit in arce.

Inquit Serenus Sammonicus. Ideoque nihil est in hoc spectabili mundo pulchrius Homine. Nihil in Homine dignius Capite: Nihil in Capite vultu decentius, Nihil in vultu Oculis elegantius & amabilius. Quare inter partes faciei primus explicari debet Oculus, pars corporis pretiosissima, quæ lucis vsu vitam distinguit à morte. Quid enim vita nostra nisi miserabilis ærumna, si lucis iucunditate priuatur? tenebroso carcere clauditur anima, nisi per fenestras oculorum lucis vsurà fruatur. Et quantum nox tristis est propter Solis absentiam, tantumdem cæcorum vita mortore & tristitia perfunditur, si oculorum orbetur vtilitate & amoenitate. Vt enim Solis lumine reliqua sidera illustrantur, sic in homine oculorum beneficio cæteri sensus commodum & voluptatem percipiunt. Oculus, inquit Galenus, in homine idem est, quod Sol in vniuerso. Dulce autem est, ac delectabile oculis videre Solem, qui cæli tristitiam discutit, atque humani nubila animi serenat: Ad eum spectandum natos homines affirmabat *Anaxagoras*,

\* Pronaque cum spectent animantia cætera terram,  
Os homini sublime dedit, calumque iura  
Instit, & erectos ad sidera tollere vultus.

Ob eam causam morientibus oculos operire, turfusque in rogo patefacere Quiritum magno ritu factum erat. Ita more condito, vt neque ab homine supremum spectari fas esset, & cælo non ostendi nefas, ait *Plinius lib. 11.* Cum Angelus *Tobiam cæcum* verbis amicis solaretur, & ad lætitiæ excitaret, respondit ille non esse quod lætetur, cum hoc suauissimum cælestis lampadis lumen non aspiciat: *Quale gaudium mihi erit, qui in tenebris sedeo, & lumen cæli non video.* Narrat *Galenus lib. de compositendis animi affectibus*, *Adrianum Imperatorem* itatum, serui cuiusdam sui Oculum eruisse: cuius sceleris patrati conficius, & ille pertæsus promissit se daturum quidquid ille posceret, tandem multis compellationibus coactus respondit, Oculum suum optare, cuius satisfactionem nullum munus æquare posset. Hinc illa *Lucretii* ad populum lata rogatio, vt qui Oculum sciens & volens effodisset ipse vtroque Oculo orbaretur. Apud *Hebræos*, si quis dolo malo Oculum ingenuo homini eruisset, talionem ferebat: si seruo, ipse libertate donabatur. *Zalencus* *Laurensum legistator*, quoniam adulterium vehementer oderat, seuerissimum supplicium edixit, vtriusque Oculi extractionem. Cum autem filius in eo delicto deprehensus, legis seueritatem subire cogeretur, ne propter Oculorum orbitatem viuendi commoda perderet, vnum sibi, alterum filio euelli passus est. Cum *Metellus* Oculos incendio amisisset, dum raperet *Palladium* ex æde *Vestæ*, memorabili causa, sed euentu misero, tribuit ei populus Romanus, quod nunquam vlli alij ab æuo condito, vt quoties in Senatam iret curru veheretur ad curiam: Magnum id & sublime, sed pro Oculis, ait *Plinius, cap. 47. lib. 7.* Verumtamen dubitatum fuit, vt refert *Seneca lib. 4. controuersiarum*, vtrum idem *Marcellus* sacerdotio priuandus esset ob cæcitatem. Hanc dubitationem firmat lex noua, qua cæcis scripsit, & nouum magistratum ambire interdixit fuit, quia quem Oculorum dignitate casus priuauit, ei non conuenit magistratus gerere dignitatem. Propterea apud *Ægyptios* Oculus sceptro superimpositus, principis erat Hieroglyphicū, imo etiam Dei, vt supremi principis & rerum dominatoris. Ipse Sol iustitiæ Deus in sacra scriptura, mundi Oculus, & pater luminum nuncupatur: cam ob rem apud *Corinthios* statua Iouis tribus oculis insignita triplicem Dei prouidentiam significabat, vt legitur apud *Pausaniam in Corinthiacis*. Nec solum conferunt Oculi ad vitæ vsum & dulcedinē, quæ nobis cum brutis communis est, sed etiam vitæ beatioris duces existunt. Etenim Oculis debetur Philosophia, authore *Platone in Timæo*, cui subscribit *Philolaus*, siquidē homines ex iis quæ Oculis viderunt capti admiratione, coeperunt philosophari, causasque rerum inuestigare. Desluxit, inquit *Philos.* cælo in hominum animos

Philosophia, sed oculis sequestris, in id hospitium deducta fuit, ut doctè atque copiose docet, *lib. de legibus specialibus*. Nec tantum Philosophiam induxit, sed et oculi, Celi ipsam Theologiam nos inuiciamus, quod *Regius Psaltes* his verbis enunciauit, *Calli enarrant gloriam Dei, & opera manuum eius annunciat firmamentum. Dies dei cruciat verbum, & non nollis indicat scientiam*. Cuius contemplationis beneficium ipsis oculis acceptum referri debet. Proinde non est mirum, si homines supra reliquos sensus visum maximè diligant, authore *Aristotele*, *lib. 1. Metaphysicæ*. quoniam inter sensus hic præcipue nos facit aliquid cognoscere, multasque rerum differentias demonstrat. Cæterum huius diuinæ particulæ præstantiam inde licet cognoscere, quod nulla ex parte corporis maiora & certiora affectuum animi & ægritudinum corporis indicia, quam ex oculis depromantur. Sunt enim oculi moderationis, clementiæ, misericordiæ, odij, amoris tristitiæ fideles internuntij, ita ut animus in oculis habitare videatur, quos cum osculamur, animum ipsum credimus attingere. Nec immerito *Aphrodisiense* oculos *ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς* dixit: Alij animi fores & fenestras appellarunt, quod per illos animi intentiones foras prodeant, & si credimus *Isidoro*, luciferi orbes disti sunt oculi, quod occulta detegant. Eleganter *Polemon* oculos alicana Cordis prode, ac manifestare dixit, quoniam signa quæ in oculis cernuntur, simulachra sunt affectuum Cordis. Locus referente *Alberto* scribit omnem Physiognomoniam perfectionem in oculis consistere, & oculorum signa validiora esse cæteris, quæ in vultu effluunt. Propterea in *sacra Scriptura* oculus pro natura viri probi, vel improbi passim usurpatur. *Deuteronomij* cap. 15. *Israëliis Deus præcepit, ne malignus esset oculus in fratrem. In Proverbiis bonus oculus benedicitur, quia dat de cibo suo pauperi*, apud *Mattheum* cap. 16. ne edas cibum oculi mali. Apud eundem Saluator noster de oculo ita loquitur. *Lucerna corporis tui est oculus tuus, si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit, si autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrum erit.*

Quod si mores animi ex oculis coniectare licet in sanis hominibus, multò facilius erit in ægris morborum indicia depromere, attestante *Galeno*, cap. 2. lib. 2. ad *Glaucanem*. Tota verò *Ophthalmoscopya* nititur eo fundamento, quod proposuit *Diogenes Senex* lib. 6. *Epid. vi oculi valent, sic ipsa persona*. Istud Oraculum multis rationibus, & innumeris morborum exemplis confirmare possem, vnicæ demonstratione contentus ero, ex *Aristotele* deprompta cap. 7. lib. 1. de gener. animal. Ut oculi nativæ puritate cæteris partibus antecellunt, ac suo nitore facultatum principum virtutem reddunt ad spectabilem, ita si à se mutantur, ipsarum facultatum infirmatorem, & naturalis œconomiz impuritatem ostendunt. Sunt enim gemmarum & margaritarum apertiores maculæ, quam stitum obscurorum. Deinde Caput cum sit instar ollæ, vel cucurbitulæ toti corpori superimpositum, fumis æstuantium viscerum, aut sanguinis in venis ebullientis vaporibus impletur facile, quibus Cerebrum tanquam magna glandula inebriatur, quod si doliat, iure vicinæ mox oculi afficiuntur, si soli spiritus animalis infecti fuerint, mox vitium in nitidissimo oculi speculo enitescit. Ex *Aristotele* lib. 2. de generat. animal. Sterilitatis & fecunditatis signa petuntur ab oculis, vi explicat *scit. 4. Probl. 2.* Verum oculi præstantiam manifeste declarat artificium illud naturæ, quo vitur in fabricando oculo, à quo tanquam parte artificiosissima & operosissima formandi Capitis exordium sumit, & quamvis primi formetur oculi, ultimi tamen in omni genere animalium perficiuntur, vi docet *Aristoteles*, libro de generat. animalium, cap. 4. Nec meliores rationes adducit *Fabricius ab Aquapendente*, lib. de formatione pulli.

Cum igitur oculorum tanta sit dignitas & utilitas ad bene beateque vivendum, summa diligentia eorum structuram perscrutabimur. Oculus Latinis dicitur, quia ciliatorum tegmine occultitur, siue quod occultum in se habeat aliquid & secretum, vel intus positum ex *Isidoro*. Apud *Hesychium* legitur *ὀφθαλμὸς ὁ κρυπτός*, An inde oculus? Posses etiam referri ad *ὄρα*, velox, oculorum enim motus est velox, *ὄρα* movere significat. *Græcis* *ὀφθαλμὸς*, *ὄρα* *τῆς ψυχῆς* *ὄρα* *τῆς ψυχῆς*, quod omnia visui peruia reddat, vel quia *ὄρα* *τῆς ψυχῆς* *ὄρα* *τῆς ψυχῆς*, visionis sint sedes, ut docent *Melissus* & *Erymolog.* *Magnum Græcum*. Dicuntur etiam *ὀφθαλμοὶ* *τῆς ψυχῆς* *ὀφθαλμοὶ* *τῆς ψυχῆς*, quia inde *ὀφθαλμὸς* *τῆς ψυχῆς*, quod ex ipsi visibilis spiritus cum impetu feratur. Ab aliis *ὀφθαλμὸς*, *ὄρα* *τῆς ψυχῆς*, quod nomen tenebrarum locum designat, per quem nobis aliquid igtuendi facultas datur. Plura nomina Græca oculorum explicata reperies apud *Melissum*. Monet *Galenus* in historia par-

tium tradenda, ab iis quæ toti organo communia sunt inchoandum esse, quibus subnecti debent, quæ singulis partibus propria sunt. Hoc præcepto instructus, prius oculi conformationem explicabo, quæ sine dissectione spectatur.

Imprimis obseruabis quantum natura oculorum securitati prospexerit, vndique propugnacula disponens aduersus incidenceia. Nam oculorum orbem concavis foraminibus concussit, à quo foratu *Frontem* nominatam *Petro* existimauit: atque vt munitiores essent palpebrarum tegminibus oculuit. Ipsa Superciliorum suggerundatio pilis breuioribus adornata, quasi aggeribus, munimentum oculis præbet, ne quid superne incidat, ex quorum confinio Nasus exoritur projectura sua occurrantia corpora repellit. Genarum non indecens tumor, in similitudinem collium leniter exurgens, ab omni parte oculos efficit tutiores, omnique arte prouisum est ab artifice summo, vt si quis forte vehementior ictus extiterit, ab eminentibus repellatur. Præterea frontis & nasi eminentia alios vsus præstant. Nam frontis fornix maxime protuberat ad excludendam cæli lucem, quæ visibilia opprimerentur, propterea quibus claritas lucis molesta est, frontem corrugant, & id vallum ad oculos propius adducunt, inquit *Aristoteles*, *sect. 21. Probl. 16.* Vallum nasi promouens duo commoda præstare videtur, vnum quod alterius oculi conspectum alteri eripit, ne mutuo splendore à repercussionibus orto occæcerentur, alterum quod altitudine sua terminum præscribit appropinquationi rerum visibiliu.

Siti sunt oculi in loco editissimo, tanquam speculatories eorum quæ fugienda sunt, aut persequenda. *Galenus* naturalem rationem profert, quoniam in perfectis animalibus propter oculos formatum fuit Caput, in quo Cerebrum continetur, sentiendi principium, & spirituum promus condus.

*Aristoteles* autem existimauit naturam oculorum aquare naturæ frigidos & humidus; in anteriore & superiote corporis sede collocasse, vt à Cerebro frigido & humido assidue conseruarentur, & ab eo sentiendi vim depromerent, atque per meatus purissimum sanguinem cum spiritibus tenuissimis haurirent. Sunt in anteriore Capitis parte collocati, vt motum corporis qui fit in anteriora dirigerent, eodem enim prospiciendum erat, quod motus agitur. Præterea functiones omnes non absoluuntur, nisi in directum & antrorsum: ideoque natura Cerebrum in parte anteriore Capitis ex *Aristotele* locauit. Addit *Philosophus*; quod cum omnes sensus à Corde velut à fonte primario proveniant, idque parte anteriori animalis concessum fuerit, sensus quoque in eadem parte corporis situm eundem habere debebant: oculi in Homine, aut prominent, aut in profundo latitant, aut medio spatio siti sunt, propterea in quouis genere acutissimi sunt ad videndum, ex *Aristotele*, prominentes sunt imbecilliores minusque acuti, Cauum siue Capsam oculorum *Albertus Magnus* orbitam barbarè nuncupauit, sunt enim sub ea appellatione rotæ vestigia in puluere, inquit *Scaliger*, Nihilominus fossa ocularis potest dici orbita ob rotunditatem *Virgilius* in *Æne.*

*Solis scire modum & quanto minor orbita Luna.*

Oculi duo sunt, vt ad latera prospicerent, atque vnus defectum alter compensaret. Deinde vt visio à duobus perspicacior efficiatur, nam duo simul iuncti rerum distantias facilius percipiunt. Accedit quod faciei ornatus venustior est; alioquin si vnicus in fronte instar Polyphemi collocandus fuisset; is faciei omne decus & gratiam ademisset. Exiguo intervallo inter se disiuncti sunt, quod homini peculiare notauit *Aristoteles*, *libro primo de historia animalium*, rationem assignat *sect. 10. Problem. 17.*

Varietas colorum in oculis est admirabilis. Nam quibusdam cæsi sunt, aliis flauo, aliis nigri, aliis caprini, cum animantia eundem oculorum colorem præ se ferant, excepto eorum genere, in quibus aliqui cæsi reperiuntur: oculi omnium puerorum statim à partu cæsiusculi sunt, postea verò immutantur in eam naturam quæ futura est, cæsiu potius quam alium præ se ferunt colorem, quia partes vix natorum imbecilliores sunt. Narrat *Histories* in Sinarum regione incolas omnes nigris oculis præditos esse, Tartaros virides habere oculos. *Aristoteles* *sect. 14. Probl. 14.* querit cur oculis nigris nascantur, qui metidiem versus inhabitant. Coloris autem ratio dependet ab vix & iridis colore. Causas autem eiusmodi colorum qui scire desiderat, adert *Aristotelem* *lib. 7. de generat. anim. cap. 1.* & adiungat *Simonem Peritium*, libello de coloribus oculorum, & *Montanum* in *Optica Physica.*

Virtus vtpurimum non est æqualis in ambobus oculis, fortior & robustior observatur in dextro oculo, quod animadversum fuit ab Hippocrate, lib. 6. Epid. sect. 8. *partis, 21. dicitur maior est visus in dextro oculo.* Ideoque frequentiores sunt affectus oculi sinistri, & mamma sinistræ, quia dextra sunt robustiora sinistris: Ex Aristotele lib. 3. de partibus animalium, cap. 9. & lib. de progressu animal. c. 4. dextrum natura melius est sinistro, præsertim in homine. Quærit Plutarchus in quæst. Romanis. Cur sinistra sint debiliora naturæ insituta. Ex Hippocrate lib. 2. de morbis, quanto dextra robustiora sunt, tanta vehementiores sunt eius partis morbi.

Magnitudo eorum non omnibus æqualis data est, sed unicuique tanta quanta ad imagines rerum percipiendas sufficiebat. Maiores & prominentiores oculi deteriores sunt minoribus, & in profundo reconditis, quia hebetiore visu præditi, magisque fluxionibus obnoxij.

Oculorum figuram rotundam iudicabis, si solum bulbum spectaveris. At suis musculus adhuc obvolutus figuram potius pyramidalem refert, cuius basis extorsum vergit, conus introrsum delitescit. Eam obtinuit ad capacitatem & mobilitatem promptiorem, corporum enim *inobtusior*, rotundum est capacissimum; faciliusque agitur, quam aliud cuiuslibet figuræ. Rotunditas quoque oculi facit, ut quàmlibet magnitudinem comprehendat, dum rectæ linæ in eum cadentes, & in centro concurrentes, quanto longius distrahuntur maiorem basim intercipiunt; quod aliis figuris non contingit, quæ dumtaxat æquale sibi spatium percipiunt.

Postquam hæc omnia contemplatus fueris, ad ipsam dissectionem properabis, diuise prius oculo in partes externas, quæ propugnaculi loco circumiectæ sunt; & internas, quæ ipsum oculum constituunt. Externas partes aggredere à supercilij, quæ Tertulliano dicuntur oculorum exordia. Sunt autem arcuatæ & hirsutæ frontis extremitates, quibus pars animi fastidiosi insidet, superbix alibi conceptaculum; sed hic sedem habet, in Corde nascitur, hic subit, hic pendet. Tota superciliorum stru-ctura ex cute, musculis, adipe, & pilis componitur. Cutis crassior & durior est, ne pilis vberius luxuriet, cuius productio non est recta, sed obliqua ut inflexus, aduer-*De superci-  
liis.* sa omnia instar muri facilius propulsaret. Sed eminentia superciliorum conducit potissimum ad excludendum cæli lumen quò visibilia opprimerentur, propterea quibus claritas lucis molesta est, fronte in corrugant; & supercilia depilant. Aciem quoque oculorum ab his recta dirigi scripsit *Dionysius Basilus, Homilia 11.* idque probat eorum exemplo; qui rem longe distitam inspecturi manum concavant oculis obtendunt. In superciliis duas extremitates observabis. Capita dicuntur extremitates, quæ sunt iuxta nares, Caudæ, quæ vergunt ad tempora. Notabis præterea, quod hi pilæ vna nobiscum nascuntur, sicut & hi qui in palpebris sunt. Vnde ab his solis, cum reliquos omnes radant; Ægyptiorum sacerdotes abstinent, ex *I. Pollace lib. 2.* Ex superciliis veteres Vaticanum lumbant, quod *Suidæ ex Pysidonio* variorum *cinna* dicitur, & *metaphorice*, qui tali varicatione utebantur. Supercilia enim salire & palpitare bonum omen credebant, quod significabat successura ex animi voto, quæ optabant. *Plautus in Psudolo.*

*Asque id futurum unde, unde dicam nescio.*

*Nisi quia futurum est, ita supercilium salit.*

Parum adiumenti ex superciliis oculus reciperet, nisi aliis tegminibus occultaretur.

Id munus subeunt Palpebræ, quæ oculis præteritæ celeri mobilitate mouentur, ut videndi tenorem non impediunt, & obtutum reficiant. Duplex est in vnoquoque oculo Palpebra cute per medium discissa: vna superior, altera inferior. Illa maior homini, & iis animalibus data est, quibus inferior immota manet: Aulibus contrà, inferior superiorem magnitudine superat, eaque sola mouetur. In Homine vtramque Palpebram moveri observavi, motum tamen evidentiorem esse in superiore, quam inferiore fateor, quod licet musculis peragatur, nihilominus ex arbitrio nostro non dependet, tantæ difficultatis est homini non continere, plerisque verò naturale ut nictare non cessent, quos pauidiores accepimus. Palpebrarum substantia cute, carne muskulosa; & pericranio constat, limbo cartilagineo cingitur, qui *Gruæ* dicitur. Huic infixi pilæ Cilia dicti ordine stantes eriguntur, quibus vallo quodam muniantur pilæ, contra leuiorem occursum, & ab oculis emanantes radij diriguntur. His propterea elapsis vel retortis, nequaquam animal, ut antea, in rectum vel longum videre potest;

*De Palpe-  
bris.*

authore *Galenus in definitis*. Inferiunt quoque Cilia colligandis palpebris inuicem cōferta & implexa, ex *Dino & Asilio Hamil.* 11. In superiore palpebra pili leniter superne inflectuntur, in inferiore deorsum incuruantur, ne umbram oculis inducant: Eleganter *Theodoretus ferm. 3. de prudentia*, Ciliorum pili inflexi sunt, ne ex propugnatoribus hostes, vel insidiatores reddantur. Nec etiam secundum rectam lineam extenduntur, ne in palpebrarum coniunctione sese foras inuicem atterant, sed foras nonnihil extenduntur, vt ea quæ ex tenuissimis corporibus damna oculis accidunt, arcerent. Solis autem hominibus palpebrarum eiusmodi Pilos concessos fuisse notat *Iulius Pollux*, a quibus quidem palpebras Deus dedit, Pilos autem palpebrarum negauit, aliis vero animalibus Pilos ipsos dedit, sed non vtrimque. Inferioribus etenim palpebrarum Pilis carent, quare *Simon* inscitæ probum Miconi intoluit, quod in equi descriptione etiam inferiorum palpebrarum pilos posuisset. Palpebrarum Pili nunquam plus isto crescant, & defluunt rebus veneris inceptis, & quod vsus veneris fuerit amplior, eò magis & celestius canescunt, inquit *Aristos lib. 3. de hist. anim.* Palpebrarū Pili Græcis *Βασίδες*, Latinis Cilia dicuntur ratione palpebræ, quæ Cilium vocatur, apud *Festum*. Ciliū est folliculus, quo oculus tegitur, vnde fit Supercilium. Negat *Scaliger* Ciliū Græcè dici. *Pollux tamen lib. 2. nō appellat, nō tamen nō Βασίδες, nō δὲ αἰνῶν Βασίδα, & nō αἰνῶν Palpebris* turgere. Vnde potuit deriuari ὀφθαλμὸν Ciliū, vel à verbo Græco *αἰνῶν*. Vtriusque palpebræ ambitus apud *Hippocratem lib. de visa*, *αἰνῶν* nō *αἰνῶν* nominatur, non autem malarum rotunditas, vt interpretatur *Scaliger*. Cur autem in palpebris natura tarsū effluxerit, triplicem causam assignat *Galenus, lib. 10. de visu partium, cap. 6.* dicitur *τῆς δὲ τῆς ἰσχυρῆς*, quod est arefcere, quia tarsus siccus est, & carnis expers. *Alphesibius* exponit *αἰνῶν* *εὐαἰνῶν*, vel *αἰνῶν* à verbo Græco *αἰνῶν* siue *αἰνῶν*, aut *αἰνῶν*. Arbotes enim *αἰνῶν* dicuntur, quarum radices mutuo implexæ veluti cratem efficiunt. Sic Pili palpebrarum dispositi sunt. *Galenus in excepsi αἰνῶν*, exponit *αἰνῶν*, subiungens tarsū vocari, *αἰνῶν* *αἰνῶν*. Vocatur *Βασίς* quasi *αἰνῶν* nō *αἰνῶν*, oculi indumentum, vel *αἰνῶν* *αἰνῶν*, *αἰνῶν* nō *αἰνῶν* *αἰνῶν* nō *αἰνῶν*, quod primum ostendatur, vel quod in cernendo attollatur. Vide *Etymolog. magnum Græcum*. Cuti palpebræ subiacet musculus orbicularis, quem obducit Pericranios, non in ambitu orbitæ terminata, sed ad malas vsque producta. Ideoque in ophthalmia diffunditur humor quocumque peruadit pericranios. Ita vt ecchymosis infra orbitam latitudine duorum digitorum extendatur, ex *Galenus, lib. 3. local. medie*. Palpebras in lateribus coniectant & claudunt Anguli, *αἰνῶν* Græcis dicuntur, Latinis *Hirqui*, quorum Interior ad nares Maior Angulus appellatur, Alter Exterior ad tempora Minor Angulus. In maiore cantho glandulam siue *carunculam* obseruabis intusam foramini, quod in nares peruiaum est, quæ cum prohibeat lacrymarum effluxum inuoluntarium, ob id *Lacrymalis* dicta fuit, apud Græcos *αἰνῶν*: erosa, vel consumpra, parit ægyplos, fistulam lacrymalem. In tarsis palpebrarum prope angulum maiorem diligentiores Anatomici foraminula duo petquunt à *Galenus* prius obseruata (Puncta lacrymalia vocat *Fallopium*) quæ manifestiora sunt in bouum mortuorum palpebris. Foramen inferiotis palpebræ tarso insculptum foris exiguum, intus profundum est, quod videre licet in bouis oculo recens mactati, est etiam in feminis maius, quàm in maribus, & in lacrymosis, qui vellent oculos erudiere suos. Per ea foraminula lacrymas stillare dicunt: habent autem duos meatus, qui postmodum coeunt in vnum, atque eundem meatum sub caruncula lacrymali, qui ad nares deriuantur. Notat *Nicolaus Massa* ex eorum foraminum occlusionē, materia ibi suppressa & suppurata, generari fistulas lacrymales. Sed priusquam ægyplos fiat, vt plucimum anchylops præcedit, aut saltem ab appulsu & illapsu humorum, membrana pericranios, quæ partes illas contegit, ab ossibus huius loci abscedit. Credit *Carpus*, quod intra talia foramina, sint aliqui villi omnium modorum, qui faciunt ad expulsionem & retentionem naturalem lacrymarum, & ideo si contingat chirurgum incidere tales villos, vt sæpe fit in exituris salium locorum, continuè fluunt lacrymæ: expissime contingit hic error in cauterisando fistulas lacrymales.

Partes internæ quæ intra orbitam reconditæ oculum constituunt, sex numerantur, *Adeps, Glandula, Musculi, Tunica, Humoris, & Vasa*. Ex his bulbus oculi compactus est. Multus adeps oculo circumiicitur, vt eo veluti lana obuolutus ab externo frigore muniatur, nec ossium duritie lædatur, & ob id oculus minime omnium partium corporis rigere solet, nemo enim vnquam interna parte oculi frigit, ex *An-*



*forte libro de sensu & sensibili cap. 2.* Hic etiam musculos infarcit ad motus facilitatem. Nam perpetuo motu incalescens oculus, tandem exaresceret, nisi ab adipe circumfuso humectaretur. Adipi immersam reperies glandulam in parte superiore. Versus exteriorem angulum iuxta latus muscoli palpebram attollentis, quæ perpetuo rore madida rigat oculum ad movendi facilitatem. *Galenus lib. 11. de usu partium*, duas glandulas unicuique oculo tribuit, vnam supra, alteram infra oculum collocat, sed vna reperitur eo situ locata, quem declaravi.

Remora pinguedine sex occurrunt muscoli, quorum ope in omnes loci differentias oculus circumagitur. Musculorum historiam ex *Myologia* repetes, & ne in horum administratione decipiaris, scias muscolum palpebræ superioris levatorem intra orbitam contineri. Cæterum oculus organum est visorium, ex multis constans particulis, quæ omnes ad vnam actionem, scilicet visionem conspirant. Quasdam enim habet per quas videmus, alias sine quibus videre non licet, alias melius videndi gratiâ, alias ad harum omnium conservacionem, ex *Galeno libro primo de usu partium*, cap. 3.

Detrahis musculis *Tunicas oculi* conspicias, quarum numerus apud Anatomicos valde controversus est. Quisque sibi placet in fingendis Tunicis, sed qui peritè & accuratè oculum secuerit, Duas tantum Communes & Veras hanciscetur, Corneam, & Veam. Reliquæ non merentur appellationem Tunicæ. Quid enim aliud Adnata quam ligamentum oculo circumiectum, ne exorbitet? Innominata circulus est membranofus, ex aponeurosis musculorum conflatus, quem *Galenus lib. 10. de usu partium*, cap. 2. & 3. designavit, ut intelligat *Columbus* nil in re Anatomica *Galenum* latuisse, sed rerum omnium semina iecisse, quæ nos maiore industria excolimus, & pro novis obiectamus. Pupillaris tunica ambitus est foraminis vœæ, siue pupillæ crepido, quæ licet ab vœa separetur, non propterea tunica dici debet. Crystalloides crystallini tunica nulla est, & si credimus *Galeno*, dimidiam & anteriorem crystallini partem contegit, quæ polita mihi videtur ob crassierem crystallini, recteque *Rufus* à concreto humore crystalloidem appellavit, monetque quorundam opinione non esse tunicam, sed membranofam quandam congelationem. Amphiblastroides tunica humori vitreo more fibrarum intertexta, non debet inter tunicas referri. Itaque tunicarum naturâ diligenter æstimatâ duas tantum eo nomine dignas inuenies, nempe Corneam, & Veam. Tres tunicas constituit *Hippocrates lib. de locis in homine*, & *Plinius* appellat, sed nominibus propriis non designat, nisi quod suprema crassior est, media tenuior, & tertia tenuis quæ humorem conservat. At *lib. de carnibus*, videtur duas tantum admittere, nempe Corneam & Veam. Cum enim scribit, sunt multæ hæ tunicæ, quæ oculi pellucido prætenduntur, ipsique sunt similes, intelligit Corneam, quæ in plures pelliculas diuiditur. Postea cum addit, tunicæ pupillam ambientes nigre existunt, intelligit Veam. Subiungit tunicæ definitionem *χρυσία ὁ περιβάλλων τὸν ὀφθαλμὸν ὡς ὁ κύβητος*. Tunicam appellamus id quod velut pellicula inest. Sic *Aristoteles*, libro quinto de generatione animalium, Tunicam quæ pupillæ obtenditur, *κίχνη* dicitur, & *ἀλβὴ*, ὁ περιβάλλων ἰσθμὸν vocat, cutim pellucidam, albam, reuem, & lævem, intelligit Corneam. Quæ tenuis est, ut morus qui extrinsecus venit recto tramite feratur, lævis ne rugis obumbret, eam ob rem senes acutè non cernunt, nam vt cæterarum partium cutis, sic oculis quoque senescentibus corrugatur, & crassior redditur. Alba autem esse debet, quoniam nigrum pellucidum esse non potest, vnde fit ut læternæ lucere nequeant, si ex tali cute confectæ sint. *Corn. Celsus lib. 7. notat oculum summum habere duas tunicas, ex quibus superior à Græcis κορυμνία vocatur, ea qua parte alba est satis crassa, pupilla loco extenuatur. Huius inferior adiantha est media parte, qua pupilla est modico foramine concava circa tenuis, vltioribus partibus ipsa quoque plenior, quæ ἰσθμὸς à Græcis nominatur. Hæ duæ tunica cum interiora oculi cingant, rursus sub his cœunt, extenuataque ad membranas Cerebri perveniunt, ipsæque inhaerescunt, sub his autem qua parte pupilla est, locus vacuus est, deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus κορυμνία nominavit, ea media subsidet, eoque cavo continet quiddam, quod à virri similitudine vocant Græci vocant. Id autem superueniens ab interiori parte, membrannula includit, sub his quæ humoris est oui albo similis, à qua videndi facultas proficiscitur, κορυμνία δὲ à Græcis nominatur. Inde patet *Celsum*, duas tunicas constituere, extrimas & orbiculares, alias duas membranulas interiores, quarum vna κορυμνία: altera est innominata: Sic *Galenus in Isagoge cap. 11.* dum quatuor tunicas enumerat, primam constituit*

De tunicis oculi.

Legit à quo vi humores tres distinguntur.

Ceratoidem, Secundam Rhagoidem, Tertiam Amphiblistroidem, Quartam à nonnullis inuectam *Adnatam*, seu minùs apparentem vocare consueverunt. *Iulius Pollux lib. 2.* quatuor tunicas enumerat. Prima & exterior vocatur Ceratoides. Secunda dicitur Rhagoides, vel *χρυσάδης, & χρυσάδης, & χρυσάδης*. Tertia vocatur *παννυχίς & αραννιδίς, & αραννιδίς*. Quarta verò *αφροδισιαδής, & αφροδισιαδής*. *Ruffus Ephesus lib. 2.* similiter quatuor tunicas statuit. Prima est *αφροδισιαδής*, sic appellata, aut propter firmitatem, aut propter pelluciditatem, aut quia instar Cornu in pelliculas secatur. Secunda antrorsum perforata, *αφροδισιαδής*, ex *Herophilo*, quoniam vix corio similis, vel *χρυσάδης* *αφροδισιαδής*, instar chorij fortis, multis venulis irrigata: an potius *χρυσάδης* dicenda ex *Aristotele*, libro sexto de historia animalium, attamen, lib. 3. de generatione animalium, c. 2. scribitur *χρυσάδης*. Tertia ab humore vitreo *αφροδισιαδής*, à tenuitate, *αφροδισιαδής*, à vasorum contextu & figura, *αφροδισιαδής*. Quarta tunica crystallinum comprehendens *αφροδισιαδής*, & *αφροδισιαδής* à figura, *αφροδισιαδής* verò ab ipso humore. *Galenus* quidem, lib. 10. de usu partium, cap. 2. videtur septem tunicas Oculi constituere, ex opinione recentiorum Anatomicorum, quoniam dum circulos efformantes Iridem percenset, Sextæ tunicæ mentionem facit ex dilatatis aponeurosis Musculorum Oculi, & Septimam addit periosion circumtensum Oculo. Sed reliquas quinque non enumerat, nisi Amphiblistroidem, & Choroidem, à qua productiones araneæ similes ad reriformem exrensæ, ligamenta illi sunt, simulque alimentum suppeditant, ergo ex *Galeno*, Arachnoides non potest esse tunica, & imperitè *Fallopium*, illam crystallino adiudicauit, vti ab omnibus Anatomicis fit, quod est falsum: sed *Anonymus Græcus* sex tantum enumerat, quales sunt adnata seu album Oculi, Cornea, Vnea seu nigrum Oculi, Aranea, Vitrea, & Reticularis. Auctor libri de Oculi *Galeno* adscriptus, discordiam auctorum de numero tunicarum Oculi conatur conciliare. Quidam Medici dixerunt Oculum panniculos septem esse, alij sex, alij quinque, quidam quatuor, quidam tres, nonnulli duos, quorum discordia non erat in re. Dicentes enim septem, computabant Retinam, Secundinam, Scleron, Arancam, Vneam, Corneam, Coniunctiuam: Qui autem sex, Retinam non esse panniculum dicebant, asserentes defensorum quoddam esse Retinam, potius nutrire quam custodire. Sed qui quinque autumabant, Arancam non panniculum, sed crystallini partem esse dicebant, neque Coniunctiuam. Dicentes autem quatuor, contendebant Coniunctiuam non esse panniculum, sed ligamentum Oculorum, neque Retinam, nec Arancam telam. Tres esse dicentes, Vneam & Secundinam, unum esse dicebant panniculum, quia Vnea à Secundina procedit, Retinam quoque & Arancam unum panniculum, item Scleron, & Corneam unum panniculum. Qui duos dixerunt, Scleron & Corneam, unum intendeant, & Secundinam & Corneam unum, Retinam verò & Arancam, & Coniunctiuam non esse panniculos. Intentio ergo antiquorum erat una.

In tanta veterum & recentiorum auctorum dissensione super numero & appellationibus tunicarum Oculi, numerum talem proponam, quem possibile sit demonstrare, & appellationes veterum retinebo.

Prolixior equidem fui quàm pro more, in percensendis antiquorum opinionibus super numero & appellationibus tunicarum Oculi, ut inde pateret recentiores Anatomicos grauiter errasse in assignandis tunicarum Oculi appellationibus. Itaque sex tunicas constituo & demonstro. Communes tres, Coniunctiuam, Corneam, Vneam. Tres proprias, Papillarem novam, Crystallinoidem, & Amphiblistroidem, siue Arachnoidem.

Clariùs autem sic distingues. Membranæ Oculi, vel sunt ligamentosæ, vel continent humores: quæ reticuli officio funguntur, sunt Coniunctiuæ & Tendinosæ ex musculis Oculorum propagatæ: quæ humores amplectuntur, sunt Communes, vel propriæ: Communes sunt duæ, Cornea & Vnea: propriæ sunt tres, Papillaris, Crystallina, & Amphiblistroidis.

Prima tunica ex pericranio producta, Coniunctiuæ siue Adnatæ dicitur. Quoniam eius interuentu Oculus in antro suo sistitur & adhærescit, ne in violentis motibus exoribet, dimidium Oculi bulbum succingit, relicto foramine è directo pupillæ, à candore Album Oculi ab *Hippocrate* & *Aristotele* vocatur, & lib. 4. de historia animalium, cap. 8. nominatur: Quæ quidem albedo magnâ naturæ prouidentia facta fuit, ut à luce Solis mitius percutiatur Oculus. Lux enim fortius agit in materiam nigram, quia nigrum cogit radios, quos album segregat. Dicitur etiam *Pollux* hæc tunica, siue album Oculi, *αφροδισιαδής, & αραννιδίς*, quoniam instar vinculi, vel fundæ, vel tanquam anouli pala oculum intra suum cauum sistit & comprehendit: *αραννιδίς* verò *αφροδισιαδής*.

nuncupatur, ab obliquitate, quia oblique & circulariter antrosum eingit Oculum, inquit *Melesius*.

*Secunda tunica Cornea* nominatur, quia cornu duritilem & splendorem æmulatur; posteriore parte crassa & opaca, versus anteriora sensim extenuatur, ut putè nitcat, & instar cornu luceat, ad excipiendas rerum imagines, & visui spiritus emissionem. Ex varietate substantiæ nonnulli duas esse constituunt propriis nominibus distinctas, partem anteriorem Corneam vocant pellucidam, posteriorem Scleroticam duram & obscuram. Sed cum utriusque substantiæ una & eadem sit continuïtas, nulla ex parte separabilis, imperitè in duas tunicas dirimitur.

*Tertia tunica Rhagoidis, siue Choroidis*, intra Corneam continetur: quæ *ῥαγώδης* id eo dicitur, quod exterius læuore, interius aspretudine, *ῥαγώδης*, vix acino sit perfrimilis. quæ verò albam tunicam corneam tangit, *ῥαγώδης* vocatur, quoniam vcnulis referta, *ῥαγώδης* fortui circumdatum repræsentat, ex *Herophilo*, ait *Ruffus*, lib. 11. cap. 23. Posterioriæ *ῥαγώδης* vocari, quia *ῥαγώδης*, pupilla, est in eius foramine. Sola hæc inter Oculi tunicas intus variegata est, ut omnium colorum species præ se ferat, sed in brutis tantum est diuersicolor, in homine impensè nigra, quia hic color ad splendorem colligendum utilis est, atque ut lux debilis in erythalloïde magis conspieua reddatur, liquidem lux in obscuro loco splendidior apparet. *Galenus* lib. 10. de *usu part.* colorem hunc medicamentofum Oculo inesse scribit, ut à vehemēti luce affectus, ad fuseum hunc spectandum clauis palpebris conuersus recreetur, atque reficiatur. Hæc autem nigredo, non tam insita & congenita Oculo est, quàm ab excremento sanguinis nascitur.

Non vndique eingit Oculum uti Cornea, sed parte anteriore fenestrata, pupillam efformat, ideoque *Pupilla* nihil est aliud quàm *foramen vucæ*, quod non sinit incertam vagari aciem, sed veluti canali dirigit. Huius foraminis ambitus cuspidē scapelli tractus, orbiculatim abscinditur: Id euidentius in Oculo bouis ebullito spectabilis. Nam *Vucæ* coronam prorsus separatam inuenies, quod experimentum me docuit, ambitum pupillæ distinctam esse membranam ab *Vucæ*, eum habeat fibras peculiare: morum quoque proprium obtinuit, quo pupilla naturaliter coarctatur in luce splendida, dilatatur in obscura, quod spiritus visui accessu vel recessu fieri putat *Galenus*: ideoque in senibus, spiritu deficiente, corrugari, in iuuenibus, paucitate spiritus, phthisim contrahere. Audiuī à Patre meo, *ῥαγώδης*, in pupilla, non aliter excitari, quàm in bulbo Oculi, semelque vldisse intra Oculum palpitationem, quæ nullis remediis percurari potuit: de hoc morbo in *Praxi sua* loquitur. De quo intelligendus est *Plinius*, dum loquitur de illis, qui equi effigiem habebant in Oculo. lib. 7. *Renatus Cartesius*, in *sua Dioptrice*, pupillam moueri voluntariè credit, ciliare fibrulas crystallino applicatas mouere crystallinum, eiusque situm immutare.

Inter pupillam & corneam locum vacuum esse scribit *Celsus*, in quo concrefeit humor qui suffusionem parit. Hoc spatium agnouit *Galenus*, lib. 10. de *usu partium*, & spiritu plenum esse tradit. Intra *Vucam* concluditur humor aqueus, qui ne prorumpat & exiliat, ab ambitu pupillæ stamina trahuntur, quæ humorem aqueum circulariter amplexantur, erumpente humore dissoluuntur stamina, seruata tamen coronæ figurâ. Hæc autem compages, siue contextus filamentorum Tunica Ciliaris dicitur; sed improprè. Incircuito *Vucæ*, ratione villorum humor collectus in membranam degenerat, ut testatur *Author* lib. de *Oculis*.

*Quarta tunica Crystalloides*, Crystallinum humorem proximè succingit, tenuissima est, instar speculi nitida, ut in eius superficie tanquam in speculo rerum imagines elueant. In bouis Oculo detrahi potest instar spoliæ aut exuij.

*Quinta tunica Amphiboloides, siue Hyaloides, & Arachnoides*, his nominibus designata fuit à veteribus, per substantiam humoris vitrei diffunditur, cuius interiectu concretus apparet, nec fluidus redditur, nisi frequenti sectione solutis filamentis, tum in aquam fluentem liquefcit.

Non constat inter Veteres Anatomicos, quid pro *Iride*, & *Pupilla Oculi* accipi debeat. Ex *Podice* lib. 2. Oculorum nigra pars media *Pupilla* dicitur, *ἡ σκία τοῦ οὐλοῦ*, ambiens autem hanc circulus, vel linea circularis est *Iris*, & *ἡ περιεστῆς αὐτοῦ αἰσίνη*, & *ῥαγώδης*, *ῥαγώδης*, *ῥαγώδης*. Ex *Ruffo* *Ephefio*, quod pupillæ contiguum est vsque ad albū, *Irim*, & pro colore quem habet nigrum, aut rufum, aut cælium, apt fuluū nominant. At *ῥαγώδης* nigrum ambit, & albo distinguit, *ῥαγώδης* *ἡ ἰσχυρὴ*, & *αὐτοῦ αἰσίνη* *ἡ ῥαγώδης* *ἡ ἰσχυρὴ*.

circulus & copula est tunicarum Oculi. Ex *Ruffo*. *Galenus* Irim in Oculo appellat, locum ubi albo nigrum coniungitur, quem alij *epithima* vocant, locum designantes, quod committuntur inter se tunicæ omnes, c. 19. l. 14. *Methodo medendi*, & lib. 10. de *usu part.* Quod etiam probatur *Paulo Aegineta*, l. 6. c. 21.

Corona hæc quæ Iridem constituit, ex septem circulis sibi ipsis ordine insidentibus, crassitie tamen & colore discrepantibus constat. Primus circulus fir ab insertione nervi Optici in medium Crystallinum, unde circulus maximus in pellucido corpore exprimitur. Secundus designatur in circuitu humoris Vitrei Crystallinum orbiculatim cingentis. Tertius dependet à Retina, prout est ligamentum Vitrei & Crystallini humoris. Quartus fit à Choroidæ, prout versus Crystallinum ducitur. Quintus à dura matre, siue Corneæ, quæ inrudentu fibrarum circulo Crystallini adnectitur, siquidem Corneæ Choroidi tunicæ superiecta est, Choroides Retinæ. Hæc Vitreo & Crystallino incumbit, sicque ad Irim efformandam concurrunt. Corneæ. At sextus circulus ab extremitatibus musculorum, siue aponeurosisbus efficitur. Septimus circulus ab adnata promanat, atque hoc sensu *Galeni* sententia valde obscura de *Iride*, ex septem membranis in eundem circulum desinentibus intelligenda est.

Aliter istam dispositionem circuloꝝ exponit *Philippus Ingrassias*, lib. de *tumoribus*, pag. 293. & reprehendit *Carolus Stephanus*, qui septem Oculi tunicas ex *Galeno* constituit, suis circulis in Iride complantatas & coniunctas. Totidem enim sunt in Iride circuli, quos sunt membranz conuestientes Oculum, & ita *Galenum* interpretatur *Ingrassias*. *Galenus* haud septem Oculorum tunicas, sed Iridis coronæ septem circulos disquirir, ex quibus Iris constat. Quorum primus Crystallini maximus circulus est, secundus verò Vitrei supremus atque extremus circulus est, quorum uterque ad Irim communi quadam insertione, atque plexu, communique per Arachnoideam facta ligatione connectitur. Tertius extremus retiformis tunicæ circulus. Quartus ipsius Choroidiæ. Quintus ipsius duræ membranz, siue Corneæ. Sextus ex musculorum aponeurosisbus efformatur. Septimus demum circulus est ipsius coniunctiuz Iridis color variegatus, dependet ab Ueæ colore, quæ parte respicit Corneam, & à similitudine quam habet cum cælesti illa Iride nomen accipit, inquit *Galenus* in *Isagoge*.

Videtur *Hippocrates* lib. de *principiis*, Irim designare dum scribit: *Quæ verò pupilla Oculi appellatur, nigra apparet, ob id quod in profundo est, & tunica circum ipsam nigra sunt.* Inde patet, quod nigrum Oculi, Irim denotat apud *Hippocratem*; quo sensu apud *Aristotelem* lib. 1. de *hist. animal.* ἡ ἴρις accipi debet.

Nunc de pupilla agamus. Ex partibus internis, inquit *Philosophus*, quæ humida est, vocatur pupilla, ὤψις, visionis instrumentum, & ὀφθαλμία, quod eam circumdat, nigrum ὀφθαλμία appellatur, quod extra est, album ὀφθαλμία, quo in loco *Aristoteles* aspectabilem Oculum secat in tres partes, Pupillam, Nigram, & Album. Quod spectat ad pupillam, dicitur quasi pupula, quia cum à nobis inspicitur, nos tanquam pupulos & infantes intuemur, inquit *Isidorus*. Ideoque etiam à Poëtis pupilla etiam pupula dicitur apud *Manilium*.

*Parvula sic magnam peruasit pupula calum.*

Et apud *Ovidium*.

---Oculis quoque pupula duplex

*Fulminat, & geminum lumen ab orbe venit.*

ἡ ἴρις Græcis dicitur, ὡς οὐκ ἔστιν ὁ ὀφθαλμός: vel ὡς ἡ ἴρις ὡς ἡ ὀφθαλμία, quod sit similis puellæ, vel ab ea visibilis spiritus effundatur. Ex *Etymologica magna Græcæ*, & *Melesio*, qui addit, ὡς ὡς quoque nuncupatur, ὡς ὡς ὡς ὡς ὡς ὡς, quia mentem tranquillum ostendit, nam mentis dispositionem Oculi indicant. Aliter tamen *Galenus* *Isagoge* perparatur à *Iulio Polluce*, quod pupillæ ὡς ὡς, sit ὡς ὡς. Ex *Ruffo* ὡς ὡς ὡς ὡς ὡς ὡς.

Definitur ab Auctore definitionum medicarum pupilla, pars media Oculi, per quam visus peragitur. Sed qualis sit hæc particula, indefinitum à veteribus. Apud *Hippocratem*, lib. de *Carnibus*, pupilla est, quod in Oculo nigrum apparet. Apud *Iulium Pollucem*, Oculorum pars media nigra, Pupilla nominatur. Ex *Ruffo* *Ephefio*, quod in medio Oculi spectatur, Pupilla vocatur: alibi pupillæ ὡς ὡς, ὡς ὡς, ὡς ὡς, ὡς ὡς ὡς ὡς, media Oculorum per quæ videmus. Eleganter *Plato* in *Alcibiade* monet, ut ad id respiciat Oculum, in quo se ipsum sit intuiturus. Ad oculo quo videmus

rale

tae quid inest. Animaduerte ergo hominis in Oculo conspicientis faciem, in op-  
posito Oculo velut in speculo apparere, & si non in speculo sed in oculis, quam qui-  
dem inspicientis imaginem ibi apparentem *speculum* appellamus. Subiungit *Socrater*,  
Oculus vt se ipsum videre possit, in Oculum per se intueri debet, & in illum quidem  
locum, in quo inest Otuli virtus, illud autem est pupilla, *ut si non in oculis, quod no-*  
*men pupillam significat.*

Hunc locum expressisse videtur *Aristoteles*, lib. de sensu & sensibili, cap. 2. visus senso-  
rium non est in Oculi extremo, sed in parte interna. Quamobrem necessum est, vt  
pars Oculi interior pellucida & luminis exceptiua sit, *ut si non in oculis, quod no-*  
*men pupillam significat.* Ideoque, qui in temporibus profundè vulneratus fuerat, poris Oculorum ab-  
ruptis occæcatus fuit, quasi extinctâ lucernâ, propterea quod pellucida pars Oculi,  
& vocata pupilla abscessa fuit, seu laterna quædam, *ut si non in oculis, quod no-*  
*men pupillam significat.* Ibi *Aristoteles*, per *humorem*, intelligit crystallinum humorè  
pupillæ proximum, & coniunctum. Propterea pupillâ & humidam, & ex aqua constare  
scripsit, lib. 1. de hist. anim. & lib. 1. de sensu & sensibili, quia humor crystallinus foraminis  
vulvæ intrusus est, vel prope sit: lib. de partib. animal. c. 2. primam partem visus pu-  
pillam esse statuit, coniunctam verò per quam agitur, *ut si non in oculis, quod no-*  
*men pupillam significat.*

Sed magis implicitum & obscurum, quod scripsit *Aristoteles*, lib. 3. de hist. animal.  
cap. 18. pupillam partem esse pinguem. *Scaliger in comment.* notat hæc verba transpo-  
sita esse, nec vllum habere sensum, quæ sic interpretatur: quibuscumque duri Oculi  
non sunt, ea in ipsis pupillam habent, quibus omnibus commune est, vt ipsa seuo con-  
stet. Illud caput 18. quod distinxit *Galenus*, continuatio est præcedentis, vbi demon-  
strat *Aristoteles* adipem in omnibus partibus reperiri, ne quidem in Oculo desesse.

Porro *Galenus* rectius cæteris *Pupilla* naturam expressit, cum dixit esse foramen  
Rhagocidis tunicæ, lib. 10. de usu partium, & lib. 1. de sympt. causis, monet eius dilata-  
tionem, sine mydriasis, vel eius angustiam, siue phthisim, visum imminuere. Nos-  
que cum *Galenus*, pupillam vsurpamus pro foramine vulvæ, quod facultatem habet fe-  
se aperienti, & claudendi, ne obiectum nimis vehemens sensum læderet, aut nimis  
debile visum effugeret. Pupillam autem dilatari & arctari ab insita facultate, mani-  
festè patet ex animali seculo, qui in eadem opacitate pupillam dilatant in orbem, & in o-  
uale figuram constringunt, sine vlla lucis externæ mutatione. Sic vno clauso Oculo  
in eodem loco, sine vlla aut exigua mutatione aeris lucidioris vel obscurioris, vide-  
bis aperti Oculi pupillam magis dilatari. Attamen *Bepistia Porta in Optica sua*, contra-  
ctionem & dilationem pupillæ fieri contendit, lucis accessu & recessu.

Huius rei plures causas assignat: prima est in Luna, quoniam huius sideris incre-  
mento, nostri corporis humores augentur, crassescuntque, tumque necessum est O-  
culos luculentius illuminari maioris luminis inuasione. In decretu verò Lunæ, quia  
humores tenuiores defæciatioreque sunt, minori lumine indigemus. Propterea, si  
quis eodem lumine constitutus vtraque tempora obseruaret, id verum deprehenderet,  
& clariùs in Æthero, qui Lunaribus quotidianis incrementis, decrementisque pupil-  
las maiores minoresque habet. Altera ratio ab ætate petitur, quippe senibus dum  
humores crassescunt, & sæculentiores euadunt, maiori lumine indigent ad inspectio-  
nem, ob id eis relaxatur pupilla. Iuuenibus verò, quia tennes & purissimi sunt spiri-  
tus, arctius coarctatur, ne validæ lucis intromissione læderetur oculus.

Præterea, quod nimio Solis, vel aliculus fulgidi obtutu lædatur visus, patet in iis  
qui diu in Sole ambulant, vel locis niue oblitis. Nam tenebricosi euadunt, & illatam  
oculis affectionem diu seruant. Tandem si quis apertis oculis tantisper Solem intue-  
retur, pupillâ expansâ ex radiorum solarium illapsu, ignem in oculo accenderet, vel  
maximum ardorem ingeneraret, vt demonstrant Optici, per illam propositionem. Pila  
crystallina Soli opposita ignem accendit prope pilam. Propterea fabulosum est, quod  
narrat *Plinius*, lib. 7. de Gymnosophistis, qui ab exortu Solis vsque ad occasum, con-  
tinentis oculis orbem candidissimi sideris intuerentur, in globo illo igneo rimantes se-  
creta quædam.

Animaduersione dignum est pupillam derepentè non posse contrahi, atque dila-  
tari, sine maximo dolore. Sic per Solem aut niuem iter facientes, si ad tenebricosum  
locum illico diuertant, cæcutiunt. Nam pupilla Solis præsentia coarctata repentinò  
tenebrarum occurfu dilatari nequit. *Dionysius Siciliæ tyrannus*, referente *Galenus*, lib.  
10. de usu partium, domum super carcere construxit splendidissimam, tæce inculta;

tam, vt homines quos in carcere obscuro diutissimè detinuerat in eam educeret, quò ex profunda caligine in splendidiorem lucem protrusi ocellarentur. Sic militum *Xenophontis* læsi fuere oculi, eùm per multram niuem iter facerent.

Notabis præterea, eos qui latè sunt pupillà interdiu lumine multoque splendore offendi, noctu verò acutiùs videre, quoniam rerum simulacra pupillam faciliè subeunt, ob sui amplitudinem, contrà qui arctam habent pupillam, quia lumine non offenduntur, interdiu acutiùs vident, noctu rerum simulacra penetrare nequeunt.

Pergo ad *Humores*: tunicis tres includuntur, *Aqueus*, *CrySTALLINUS*, & *Vitreus*. *Hippocrates* mentionem facit vnius humoris pellucidi, vt etiam *Aristoteles*. Intelligent vt credo, CrySTALLINUM. Veteres post *Aristotelem*, vt *Iulius Pollux* & *Ruffus Ephesus*, dumtaxat meminere CrySTALLINI & Vitrei humoris. Tres humores proposuit *Galenus*, & tertium aqueum ipse adiecit.

Primus autem occurrit *Aqueus*, siue *Albugineus* in anteriore parte Oculi positus, vt instar propugnaculi obiectus CrySTALLINO, splendorem externi luminis affatim irruentem obtundat, & tanquam conspiciulum rerum simulacra CrySTALLINO maiora repræsentet. Sic videmus eos qui in minutissimis operibus occupantur, ampullam vitream aquà limpidissimà plenam luminì obicere, vt radiorum à tergo collectione res minimas distinctiùs accuratidèque cernant: Nec tantùm CrySTALLINO humorì obiectus est Aqueus, verumetiam Vitreo circumfusus, & totus intra vteam continetur, quod manifestè cognosces, si Oculum parte postica feceris, videbis humorem Aqueum effluere, ac si anteriùs secaretur.

De natura huius humoris inter Anatomicos dubitatur. Sunt qui partem Oculi viuentem & spermaticam esse volunt, alij excrementum ex CrySTALLINI nutritione genitum. Si verum sit eum humorem ex vulnere emissum regenerari, oculorum acie restituta, lubentius eorum opinionem amplector, qui excrementum esse statuunt: etenim *Galenus lib. 1. de Symp. caus. c. 2.* in pueris humorem albugineum renatum vidit, etiam si hoc rarissimum moneat, præsertim in adultis. Vidit etiam *Columbus* eum humorem prorsus effusum, interposito spatio redintegratum. *Beniuenus in suis Observationibus*, similem historiam profert: id adhuc confirmarunt *Leugius in epist. insigni exemplo*, & *Parolus*. Verùm vt certius experiaris huius humoris reparationem, in pullo punctione Oculi extrahatur, videbis intra quindecim dies nouum fuere reserere. Affirmauit *Celsus lib. 6.* hirundinibus amissam ex vulnere oculorum aciem, interposito tempore restitui, sensim iacturà eiùs humoris reparatà, quod confirmatur ab *Aristotele, lib. 6. de hist. anim. c. 6.*

*Secundus humor*, *Gemma Oculi*, *CrySTALLINUS*, siue *Glacialis* dicitur, quod glaciem coneretam referat lumine suo, ac splendore purissimo CrySTALLINO consimilis existat. Cùm sit pellucidus, cum niger apparet, & nigrum Oculi appellatur ab *Hippocrate*: Nigredo illa non est vera, sed apparens ex interna Oculi opacitate: Opacitas verò ex foraminis angustia, quæ amplo lumine non collustratur, vel vteæ intus nigricantis color trans omnes humores in superfacie CrySTALLINI elucet: Ideoque vteæ concavæ tincturæ transiæcentes per CrySTALLINUM, pupillæ & iridis colorem efformant: Nam fundus vteæ taurinæ cæruleus est, felis flauus existit. Tanta est CrySTALLINI pelluciditas, vt si litteris scriptis imponatur, specilli modo maiores exhibeat: tantaque huic vis inest speculi, vt tam exiguum corpusculum totam huminis imaginem reddat, quæ quandiu in CrySTALLINO elucebit, non est augurium timendi mortem in ægritudine, inquit *Plinius*. Ex ea perspicuitate cognosces CrySTALLINI substantiam aqueam esse, quæ tamen non diffuit, sed instar ceræ molliuscule coacta rerum simulacra faciliùs excipit apud *Hippocratem lib. de Carnibus*: sæpe conspeximus Oculo disrumpo exiisse humorem glutinosum, qui dum calet est liquidus, at postquam refriguit, siccus fit, ac thuris modo pellucens, quod de crySTALLINO intelligendù, vide si liquidus sit intra oculum viuentis animalis. CrySTALLINI figura rotunda quidem est, non tamen globosa, quia anteriore parte plana, vt maiore spatio simulacra rerum omnium admittat, quibus excipiendis non est apta, & eapax globosa figura, vt docet *Galenus, lib. 10. de usu partium*. Propterea, à *Ruffo Epheso*, lenticularis pars Oculi nominatur. At posteriore parte perfectam habet rotunditatem Vitreo humori infixam, vt inter duos humores Aqueum & Vitreum CrySTALLINUS confideat: nonnulli dicunt globosam figuram CrySTALLINI non esse eandem in omnibus oculis, quod probatur ex vña





lucidi, id est, Crystallini. Addit. *Sape conspeximus Oculo distrupta prodisse humorem glutinosum, qui quando calidus est, liquidus existit, ubi vero perfrixit, siccu evadit, mittit tunc transparentem.* Supra disseruerat de natura pellucidi, siue Crystallini: *Id quo lumen & splendenda cuncta lucem reflectunt, per hoc igitur in quo lumen reflectitur visio fit.* Quibus verbis visionis modum declarat. *Circum oculos album est caro.* Per carnem Zosterium intelligit msculos, aut saltem aponeuroses musculorum, *Pupilla oculi nominata nigra ob id apparet, quod in profundo sita sit, & tunica eam ambiens nigra existant.* Dumtaxat apparenter pupillam ambientes, nonne possunt usurpari pro Rhagoide? Itaque ex hoc discursu Hippocratis colligitur illum tunicas cognovisse, Corneam & Rhagoidem, & alias multas, dein venas à Cerebro prodeuntes, quibus forsan etiam nervi comprehenduntur, à Hippocrate, Corneam, à Apuleio, msculorum aponeuroses, à Galieno, pupillam, quam tunica ambientes constituent, vucam, à Hippocrate, Crystallinum humorem, à Galieno, vitreum humorem.

## ADMINISTRATIO ANATOMICA OCULI.



**H**ÆC operatio admodum laboriosa est, si Oculum intra suam capsam conclusus teneatur, facilius erit, si frontalis ossis portio, qua capsam efformat cultri excisio excutatur. Itaque si intus Oculi capsâ velis Oculum administrare, prius msculos palpebrarum, ut decet preparabis, & diligenter investigabis nervum, qui per fissuram marginis superioris capsæ, in palpebram superiorem & unguinum frontalem disseminatur. Deinde forficibus angustis & acuti adipem circumsum extrahes, tenuibus etiam tenaculis adhibitis, ut msculos 7. intra capsam collocatos desegras sine ulla laceratione. Methodicam illam sectionem repetes ex Myotome.

Sectionem verò imitabis à maiore cantu, diligenter cavendo, ne minorem obliquam in margine infera capsæ obliquè porrectam, & tendinem obliqui maioris per trachileam in maiore angulo situm laceres. Ibidem ligamentum exile, rotundum & canam nancisceris ab eodem angulo enatam, quod excipit tendinem illum admirabilem, & molliter deducis ad Oculum. Eodem in loco eras glandulam lacrymalem, & puncta lacrymalia inquires, antequam ullam sectionem adhibeas: Sensim & minutim auferendo adipem, alteram glandulam latam supra Oculum versus angulum minorem invenies. Vbi msculi adipe suo spoliati fuerint, sex revertere ad Oculum, & septimum musculo Oculum attollenti superpositum dabis palpebra superius. Proinde eam deduces forfices in partes superiores Oculi, conservabis hunc musculum integrum cum sua insertione. Vt alius msculos omnes positis scorsim ostendere, nunquamque filo reunies, ut hoc signo inter se discernantur.

Administratis ac demonstratis msculis, bulbum Oculi radictis eximes, postea msculos detrahes, ut Oculi tunica facilius secernere queat, & humores inspicere alisque ostendere. Secabis igitur Oculum, vel parte anteriore in circuli coniunctivæ, scilicet levi penetratione per scalpellum, dein introductis forficibus magnam portionem Corneæ accuratè circinabis, ut tridem, pupillam & pupillarem tunicam illaceras contemplari possis. Postea radictis humeribus, nunquamque scorsim examinaabis, & tunicas, Corneam, Vucam, & reliquas diligenter observaabis. Si velu in altero Oculo sectionem inchoare à parte postica, nervum opticum filo reunieris cum exigua portione Corneæ aliquis suspendet, & altera manu bulbum sustinebis, tum facta simili sectione, ut in priorè administratione, præparationem membranarum à nervo quantum fieri poteris sellaberis. Quod facilius perficitur disulsa superiore parte capsæ, tum Vitrei humeris suspensionem ab Amphiblastroide expansa manifestè laceris inuerti, & pupilla inversa adhesionem ad Crystallinum, cum ciliaribus impressionibus interna pupillæ. Propterea, ut isthæc omnia clarius spectentur, aliorum animalium ut boni, ovini, suis, Oculos recentis ad manum habebis, & partes illas internas puta membranas & humores, cum humano Oculo comparabis.

## D E A V R E.

## CAPYT V.



**A**BSOLUTA Oculorum historia ad *Aures* festinat oratio, quarum visum proximum à luminibus natura nobis dedit, inquit *Celsus*, imo priorem si credimus *Aristoteli*, lib. de sensu & sensibili, cap. 1. quoniam auditus sensus est disciplina, ad excipiendam ab aliis artem, scientiam, sapientiam, visu accommodatior, quò fit, ut inter eos qui nascuntur visu & auditu privati, cæci, quàm surdi doctiores evadant. Quà forsan ratione ductus *Xerxes Imperator*, apud *Herodotum* in *Polihymnia*, animum in Auribus habitare credidit. Partium autem dignitas & utilitas ex earum iactura cognoscitur: Tum demum bona nostra intelligimus, cum eorum iacturam fecimus. Quà forsan ratione accedit corpori detrimentum, quàm ex cæcitate: Cæcitas enim solam videndi facultatem tollit: Surditas verò naturalis duas simul, nimirum audiendi & loquendi facultates destruit. Ideoque *Cræsus* apud *Herodotum*, lib. 1. alterum filium auribus caput pro nullo deputat, ut de imperio *Cræsus* ait, ut ait *Herodotus*. Quapropter summâ curâ & diligentia auditum conservare oportet, & valde suspectum habere gravem auditum, quia paulatim augecens temporis progressu perfectam surditatem inducit, auctore *Galenus*, lib. 3. de comp. medicam. secundum locos. Deinde maius impendet periculum ex morbis aurium, quàm oculorum. Nam vitia oculorum intra ipsos nocent, aurium inflammationes doloresque interdum etiam ad dementia, mortemque præcipitant, ait *Celsus*. Non est igitur *Auris* dignitate inferior *Oculo*, siue partis utilitatem, siue admirabilem structuram spectes, quæ manifestè ostendit Dei potentiam nusquam nisi in minimis totam esse. Ingrediamur ergo Antrum illud veteribus Medicis inaccessum, & curiosis oculis perlustremus stupendam huius partis Architecturam.

Sed priusquam ulterius progrediamur, quid in vestibulo huius antri contineatur inspiciamus. Etenim *Auris* diuiditur in *Externam* & *Internam*. Externa dicitur *Auricula*, quæ cartilaginea est, in modum vanni expansa, ut sonos facilius excipiat & colligat, quod enim siccum & durum est melius resonat, intus turbinata & anfractu cochleæ similis, ut etiam resonantior fiat echo. Quantum ad audiendum confecerat, *Adrianus Romanorum Consul*, testis est locupletissimus, qui eum obtusius audiret, manus cauas quò facilius audiret, à posterioribus ad anteriora spectantes aures obtendebat.

*Auriculæ* cartilago in homine continua est, in brutis tres vel quatuor cartilagine inuicem connexæ sunt pro magnitudine auriculæ: Ossis lapidoso circa foramen auditorium alligatur ope robusti ligamenti, quod à pericranio versus os mamillare producit. Venas recipit à Iugularibus, arterias à Carotidibus, quorum valorum scarificationem in cedmatibus commendat *Hippocrates* lib. 6. Epid. sect. 5. part. 21. *Valerius* in commentario notat *Saracenos* in pluribus morbis aures posticas scarificare, & ischiadicis omnibus internam auriculæ partem, quâ cartilago veluti replicata tumorem quandam habet, cauterio vere salutariter: forsan quod ex capite fluat materia, & huius loci vltione intercipiatur. *Galenus* lib. 9. de comp. medicam. secundum locos, in antiquis hepatis & lienis morbis, venas pone aures religiose secari scribit. Notavit *Hippocrates* libro de *Aëre, Aquis, & Locis*, *Scythas* insecundum fuisse propter sectionem venarum pone aures, quod à solo *Hippocrate* animaduersum atque repetitum, lib. de genitura: Nempe sectionem venarum iuxta aures, propter callum, viam seminali humori intercipere, ac proinde fecunditatem imminuere: sed raram & inutilitatem fuisse temporibus *Galenus* hanc venarum sectionem inde colligere licet, quod comment. ad partem supra citatam lib. 6. Epidem. moneat sectionem venarum pone aures inutilem esse, nec à Medico vilo perito tentatam fuisse. *Anicetus Galenum* in hac re dubium & ancipitem fuisse statuit, 4. primi, doctrina 5. cap. 10. Vide *Rodericum Castrensem*, libello, quæ ex quibus. Notandus diligenter luteolus à Carotide deductus, qui aures antitragum perrepat, maxillam superiorem irrigaturus, ut singulis denti-

bus spiritum vitalem suppeditet. Per cum ramum fluxionem in dentes fieri puto, quoniam eo refecto miraculi instar fedatam vidi odontalgiam, propter commeaum serofi & acris humoris interceptum. Erat quidam Parisiis, qui ex hac sola operatione magnum quæstum faciebat.

Nec solis ligamenti continetur Auricula, Musculis quoque vndique cincta est, vt firmius hæreat, & in sua sede consistat. Ab his tamen obseruatum fuit in quibusdam aurículas pro arbitrio moueri, quamuis *Aristoteles* aurículas homini tantum immobiles esse prodiderit. Musculorum quidem delineamenta circa aures *Galenus* animaduertit, quæ in brutis perfecti sunt musculi. Musculorum auris historiam repetes ex *Myologia*, lib. 5. cap. 13.

Legi Pol-  
lucem &  
Rufum.

Cæterum *Auris Externa* plures habet particulas nominibus distinctas, quas apud omnes Anatomicos, tam veteres quàm recentiores legere licet. In iis explicandis non immorabor, ne videar actum agere, & eandem cantilenam occinere. Interim monebo, quod in *novis relationibus India Orientalis* proditum est, in *Calecutis* indigenas aurículas habere ad humeros vsque protensas, quoniam per aliquot annos trahere, sequaci materia eò produci queunt.

Porro geminas aures Natura construxit, vt reliqua sensuum organa, quoniam vtriusque lateris eadem est species sonora, & vna male affecta, altera defectum supplere potest. Moralem causam addert *Zeno Curius apud Stobæum*. Binas aures, & vnicam linguam nobis tributas fuisse, vt duplo audiamus, quàm loquamur. *Aristoteles in Problemis*, sect. 32. narrat alteram Aures nempe Dextram, Marem indigitari: alteram vcrò Feminam. Eleganter apud *Aristotelem libro secundo de mundo*, & apud *Poll. lib. 2.* aures, oculi regis vocantur, quoniam quæ ab aliis dicta & visa sunt, reges auribus excipiunt. Intersecant Aures Capitis orbem æquis portionibus, & medium ibi locum obtinent, & ad libellam oculorum sunt collocatæ, non autem supra, sicut in quibusdam quadrupedibus, ex *Aristotele lib. 1. de hist. animal.*

Auris officia interna, in ossæ petroso conclusa distinguitur quatuor Cameris seu Cavitatibus, varia supellectile instructis. *Prima Cautis* foris obuia semperque patens (introitus corneolus dicitur) flexuosa est, ne aer impetuose & assatim in membranam irruat: Obliqua vt sonus vehemētior frangatur, quæ quidem magis inuiscantur sordibus biliosis, quibus est oblita. Generantur autem per vaporum exudationem trans membranam tympanum. Istud excrementum *Aristoteles*, sect. 32. *Probl. 4.* *id est mucus*, sudor putridus dicitur, eondensatur & incrassatur ob loci frigiditatem. Angusta est, vt animalculis & leuioribus corpusculis aditus intercludatur, oblique sursum permeat, vt si quid fortè inciderit, statim relabatur. Terminatur membrana tenuissima, quæ *Tympanum* vulgò dicitur. In ea tamen tenuitate duriciem summam obtinet, vt acerrima & vehementissima medicamenta tolerare queat, id monente *Galeno sub fin. lib. 6. Meth. & lib. 3. secundum locos*. *Hippocrates* siccissimam adhuc facit, vt ab aere ista clariùs perstrepat. Nam semper acutiùs personat, quæ exaruit membrana, inquit *Præceptor lib. de principis*, madescens enim grauem auditum aut surditatem inducit. Scripsit tamen *Galenus* auditus subtilitatem sonitus causam esse, præsertim si acuto audiendi sensu æger præditus fuerit. Inde colligi potest membranæ summam ariditatem in vicio esse. Duplex Tympanum constituit *Plempium*: secundum fuit inuentum à quodam Medico *Asturpensi*, sed vbi locatum, non explicat. Præterea notat, non tantam esse necessitatem tympani ad auditum quantum prædicatur, quia eo rupto nulla, aut exigua audiendi diminutio consequuta fuit, vt ex *Horsley* epistolis demonstrat, quod non ausus fui tentare in surdis: oportuit membranam tympani crassiforem fuisse, eaque disruptâ obscure audiuisse.

*Secunda Cautis Concha* dicitur, membranæ tympani septo à priore disclusa. Plures particulas comprehendit. Imprimis dorso tympani *Chorda* non aliter intenta est, quàm nervus militari tympano, quod baculis comploditur, implicans, ipsique membranæ affirmans *tergemina Officula*, ex quibus solus *Malleolus* membranæ inhæret, & ab eo reliqua duo, *Incus*, & *Stapes*, consecutione & colligatione quadam dependent. Ad sunt præterea *exiles duo musculi* ad motum officulorum comparati, vel potius ad fluxum & refluxum tympani definiendum, vt in *Myologia*, & *Osteologia* determinatur.

Proximè tympanum versus superiora, Foramen angustum apparet, quod dilatatur in alueum amplissimum innumeris cauernulis scatentem, apud loculamenti

haud dissimilibus, ista cavitas intra mammillarem processum continetur. *Vesalius* hoc antrum fodiæ amplissimæ comparavit, quod non est vacuum, sed interno: & congenito aëre refertum, qui multus in eo spatio reconditur. *Hic spiritus*, qui debet esse quietus & immotus, appulsu alterius status adactus, perpetuò agitur, inde tinnit & resonant aures. An terebratione mastoideis apophysis educi queat expendendum, quia non potest exhauriri, etiam si masticatorii vtariis, ratione ductus ab aure in palatum & fauces peruij & disseminati. Huius *secunda Cavitas* extremo, quod è directo tympani situm est, *duæ sunt fenestellæ*, quarum altera Qualis, vestibulum est Labyrinthi, altera minor ingressus ad cochleam.

Est autem *Labyrinthus tertia Cavitas* pluribus diuerticulis abundans, vnde nomen traxit. *Cochlea* vero *quarta Cavitas* est, à tortili spirataque cochlearum structura nuncupata. Sed de his omnibus vberius in *Osteologia* tractabitur.

Sic autem perficitur auditio: externus aër primam cavitatem subiens placidè ferit membranam, quæ vibrata sibi connexa ossicula concutit, tumque imago soni trans membranam imprimitur interno aëri, & ab ossiculis tanquam graphiis in eodem consignatur, qui recepta soni qualitate, per ambages labyrinthi reuoluitur, vt maiorem poritatem ac resonantiam acquirat, in cochleam traducitur. Vbi tandem nervo traditur, vectoreque animali spiritu ad communem sensum omnium formarum & specierum æquissimum iudicem perducitur. Cæterùm auris internæ occultam hanc structuram, *Hippocrati* cognitam fuisse patet ex libro de principijs. Aurium foramina, inquit, ad os durum & sic in lapidi simile, *quæ in ista*, perueniunt, cui cavitas fistulosa, *valvæ necessariæ* addita est, soni autem in durum impingunt, & os cauum per ipsum durum insonat. Pellicula verò in ipso meatu auditorio, iuxta os durum tenuis est, instar telæ aranæ præ reliquis pelliculis siccissima. Quod autem siccissimum est, id ad sonum concipiendum maximè facere multis argumentis comprobari potest, cum ergo plurimum resonat, tum maximè audimus. Eadem prodidisse videtur *Aristoteles*, libro primo de historia animalium. Auris regio intima cochleis similis est, extremo osse auriculam imitans, in quod tanquam in vltimum vas peruenit sonus, neque ad Cerebrum ab eo meatus vllus, sed in cauum oris. Attamen lib. 2. de part. animal. ab auribus meatus in occiput penetrare scribit, & quod inane vocatur plenum aëris esse. Vide cap. 2. lib. 5. de generat. animal. *Galenus* ipse de auris internæ fabrica pauciora, quàm *Hipp.* & *Aristoteles* cognouit, aut saltem literis consignauit. Nam *Philosophus* nota fuit anfractuosa auris cavitas, aër ibi insitus & meatus ab aure in palatum, de quo loquitur *scilicet*. 32. *Probl.* 6. *Hippocrati* verò præter cavitatem anfractuosam tympanum membrana innouit, quam etiam ipsi *Aristoteli* cognitam fuisse quispiam existimaret ex lib. 2. de Anima, & *scilicet*. 12. *Probl.* vlt. *Carpus* inter recentiores Anatomicos, de auris structura accuratè scripsit, primus direxit ossicula duo, cavitates, & exposuit versus membranae tympani, & aëris implantati. Cæterum auris internæ structuram *Valerius* demonstrare in osteotome, vbi quomodo sit detegenda & administranda docetur.

## D E N A S O.

## CAPVT VI.



**A**B aure ad Nasum accedes, odoratus instrumentum, Cerebri spiraculum, eiusque per aëcidens canalem expurgatorium, modulanda vocis fistulam ingratè resonantem, sircumate offendatur, ingenij iudiciiue indicem, nec mediocre faciei ornamentum: Cuius mediam & meliorem partem constituit, eiusque venustatem complet, quo deficientie, informis redditur facies. Vnde Poëta *truncas inhæntes coniungere nares* appellat. Nec maiore infamiâ olim mœchi mulstabantur, quam nariû amputatione: mulieri apud *Ægyptios* in adulterio deprehensæ Nasus amputabatur, vt viueret in perpetua deformitate, quæ formâ abusa fuisset ad libidinem, ex *Diodoro Siculo* lib. 1. *Bibliotheca*. Deus apud *Ezechielem* cap. 23. Ciuitati Hierusalem ignominiosum istud supplicium minatur, Nari & aurium amputationem. Persæ quid regium Naso inesse credebant, nec alios quàm Nasutos ad regiam dignitatem admittebant, quasi

Nasus generatus, & Nasus, quæ generatus, supponit hunc, quod est Nasus, sed rectè Nasus denari potest à verbo Nas, quia per Nasum Cerebri excrementa fiunt, & exant.

peculiaris quædam dexteritas & prudentia in Naso eniteret. Ideoque Eunuchorum qui curam habebant alendi pueros stirpis regiz, præcipuus labor erat, Nasum conformare elegantem, tubulis in nares inditis, ut notat *Plato in Alcibiade*. In lege Moisaica *Leuitici cap. 21*, qui naso prauo erant præditi, iudicati fuere indigni sacerdotio, proinde *Venusino Poeta in arte Poëtica*, Vita displiceret, si deformem obtinuisset Nasum.

*Non magis esse velim, quam prauo vivere Naso,  
Spectandum nigris oculis, negroque capillo.*

Nec tantum mentis sagacitas animique generosi virtus, ex Nasi magnitudine cognoscitur, verum etiam ipsa virilitas demonstratur. Vnde paroemia de Nasutorum pectulio, vulgò trita. Nasi magnitudine concipi mutonis quantitatem. Quod declarat hoc Epigrammate *Catulli*.

*Multus homo es Naso: nam tecum multus homo est, qui  
Descendit: Naso multus es, & Patricius.*

*Heliogabalus* non alios ad libidinem suam exercendam eligebat, quam Nasutos, rati eos fore ad veneris negotia promptiores & alacriores. Quamvis Nasi longitudo præferatur similitati, quæ apud Indos laudabilis est, eminentior tamen deturpat faciem, & indecoram reddit. Qualis erat Nasutus ille à *Martiale* descriptus,

*Mentula tanta tibi est, tantum tibi Nobile Nasus,  
Vt possis quoties arrigis, olfacere.*

Decentis longitudinis mensuram definiuit *Martilius Furius comment. in lib. Plat. de Amore*, ut Nasi tres in longum dispositi, vultus vnus impleant longitudinem, longitudo Nasi longitudinem labij compleat, aurisque similiter.

Nasum bifori via præditi partiiri lubet, ut in oculo & aure fecimus, in externum & internum. Externus componitur ex cute, Musculis, Venis, Artetiis, Neruis, Ossibus, & Cartilaginibus. Cutis quæ Nasum inuestit tenuis est, Cartilagini & Musculis contumaciter affixa, ut vix illacera separari queat: ad pinnas vsque progressa interiorum vergit, ut replicata margines Narium ipsamque columnam constituat. Resecta cute musculos administrabis, quos ex *Myologia & Myotome* repetes. Venas habet à iugulari externa, quæ secantur in affectibus Nasi, & faciei, arterias à carotide, neruos à tertio pari per foramen orbitæ inferioris egrediente.

Remotis musculis Nasi corpus nudum apparebit, ex duabus diuersis substantiis constructum, superna pars ossea est, inferna verò cartilaginea. De ossibus actum est in *Osteologia*. Nunc paucis *Cartilagineis* expediam. Ab omnibus Anatomicis quinque numerantur, duæ sunt elatiore ossibus adnatæ, quæ licet mediam dumtaxat alarum partem efforment, prælonga tamen apophysi ad pyramem vsque Nasi producuntur. His subiectæ sunt aliz duæ, quæ pinnas narium constituunt. Solæ cartilaginee à musculis mouentur: Quinta cartilago nares instar septi determinans ab osseo Nasu septo exoritur. At Nasus internus complectitur membranam musculosam pinnas narium constringentem, & membranam quæ totam narium capacitatem oblinet, atque cavitates insignes osse vomeris disclusas, inter tabulata palati, & basim cranij conclusas, vbi ossicula spongiosa, & carunculæ cauernulis ossium inclusæ continentur. Membrana nares internas oblinens, oritur à crassa meningē per foramina ethmoidis erumpente: Parte inferiore pilis abundat, quibus in vestibulo Nasi positæ & erectis, inspiratus aer elutriatur, & aditu prohibente animalcula. Nasi summum elandit os ethmoides, cui intus mammillares proceßus odoratus instrumenta incubant. Sed discissis cartilaginibus, intra cavitates narium obseruabis carnes spongiosas, subrubras, quibus ossa Nasi spongiosa sunt oppleta. Ex his tumefactis polypus narium generatur. Nonnunquam vidi prolongatas, & ad imas nares prolapsas, sponte, vel adstringentibus medicamentis supernè reuelli, interdum supra palati geminas cavitates vomere disclusas, in fauces iuxta gargareonem magno vocis & deglutitionis incommodo propendent. Quas quidem exerecentias carneas vidi nobilem quandam, singulis ferè mensibus in fauces & intra nares propendentes, forficibus innoxie abscidisse per quadraginta annos, quibus ista hyperfarctosi diuexatus fuit. *Aristoteles* in superiore parte Nasi velamen in respirantibus animalibus constituit, quod adaperitur, dum respirando spiritum attrahunt: illud negat reperiri *Galenus lib. de instrumentis odoratus cap. 5*, vbi *Aristoteles* opinionem acerbè nimis eludit, & impugnat, & reuera in homine non reperitur tale velamen, siue oper-

culum, sed in brutis ut ouibus, vitulis, canibus supra os ethmoides instar operculi processus mammillares dilatati, & mammae modo subumidi obsecuantur, quorum poris & meatibus distentis spiritus attrahitur viam sibi faciens, & sic intelligendus *Aristoteles lib. 2. de anima cap. 9. & lib. de sensu & sensib. cap. 5.*

## D E O R E.

## CAPUT VII.



**P**ROXIMA naribus subiicitur rictus ex transverso patefactus, Os appellatur, ab O literæ figura, quia cum hircimus, Os ad eiusmodi formam circinatur. Oris vius in tribus constat officiis, respirandi, sumendi victum, & eloquendi. Huius duplex apud *Galenum* extat significatio, primum denotat labiorum scissuram, quasi cuius antea coherens intercisâ fuerit. Deinde significat totum id spatium, quod diductis labris ad fauces extenditur, quo sensu Os nunc accipimus. Eleganter *Aristoteles, libro primo de historia animalium*. Oris spatium descripsit, quod intra maxillas & labra continetur Os est. Cuius partes palatum, pharynx, & lingua, gustus instrumentum potissimum in mucrone, quia lata pars minus sentit. Dubitari tamen potest, an lingua pertineat ad partes internas Oris, quoniam *Aristoteles sect. 3. Probl. 6.* causam adferens, cur lingua totidem coloribus immutetur quot cutis. Respondet, an quod ea quoque in membrorum externorum numero recipitur, quamvis in Ore abdita recondatur. Os exiguum datum fuisse homini propter caninorum dentium paucitatem *Galenus* demonstrat, *lib. 11. de usu part. cap. 9.* Cuius partes alie sunt externæ continentes, quæ ipsum Os constituunt: Alie intus abditæ Oris spatio conclusæ. Externæ duplices sunt, carnosæ & ossæ. Carnosæ sunt labra eorumque muscoli, quorum historiâ ex *Myologia lib. 5. cap. 11.* encheirism ex *Myotome* requires. Ossæ verò partes sunt ossa utriusque maxillæ, quæ in *Osteologia* deelasantur. Dicuntur labia, siue labia margines Oris. Distinguunt *Grammatici* labra à labiis, quod labra sint modica, labia immodica, & plusquam iusto crassa, vnde *Labronum* nomen inditum, & labia deriuant à lambendo. Labrum verò est nomen homonymum, significat enim vasorum margines siue oras, inquit *Donatus*. Apud *Virgilium*.

*Plenus spatium vindemia labris.*

Dicitur etiam *ὀστρον* = *ὀστρον* = *ὀστρον*, quod excipiat cibos ex *Plutarcho, lib. 8. Symposiac. quest. 6.* *χένον* dicitur, Græcis *χένον* = *χένον*, ex *Etymologica magna*. Labiorum fungosa & carnosâ est substantia, ex cute & musculorum extremitatibus conflatâ, vel potius cuius illa, productio est internæ tunicæ ventriculi, proinde vomituris labra sunt tremula. Plures usus obtinent, primus est ad edendi & bibendi commoditatem. Secundus ad decus & pulchritudinem faciei, vnde quibus curta sunt labra, deformes existunt. Tertius vt in Ore saluam retineant, ne dormiendo aut vigilando continuò fluat, vt in decrepiis & pueris quibus mollia sunt & resoluta labia cuntingit. Quartus, vt dentes Orisque spatium ab externis aëris iniuriis tueantur, dum propinqua inter se clauduntur. Quintus, vt inseruiant vocis & sermonis formationi, idcirco vt mobilia essent, musculos obtinuerunt. Labiorum concursus, latera Otis constituunt, quæ buccæ dicuntur, à *βουκ*, *βουκ*. Inde vox Latinorum, & quoniam spirita à pulmonibus exufflato possunt inflari, forsan à dictione *βουκ* = *βουκ* = *βουκ*, ventus, formatur buccæ ex *vetere Glossario*, quæ Græcis *βουκ*, à *βουκ* = *βουκ* = *βουκ*, vnde *βουκ*. Ex *Etymologica magna*. Vel *ὀστρον* = *ὀστρον*. Buccas inflans *βουκ* = *βουκ*, vnde *βουκ*. Partes quæ intra Oris spatium continentur sunt gingiuar, dentes, palati tunica, & lingua. *Gargareonem* possis addere, qui in principio faucium consistit, & glandulas amygdalinas ad radicem linguæ sitas. Gingiuar quæ dicuntur à gignendis dentibus, carnes sunt immobiles, in eum usum constructæ, vt dentes in suis alucolis, sistant ac regineant. Dentium historia in *Osteologia* explicabitur. Eorumdem encheirism *Anatomica* demonstrabitur, cum *Osteotomen* percurtemus. Palatum pars Oris superior est, conuexa & fornicata, vt aëre percussu vox reddatur acutior, crenis exasperata, vt ei membrana durissima & candida tenacius inhaereat, quæ etiam rugosa & aspera

est, vt cibos in masticatione facilius retineat. *Plinius* notauit saporum intellectum esse cæteris in prima lingua, homini & in palato.

## D E L I N G V A.

### CAPVT VIII.



VAST cum *Isidoro Polluce* præfari, γλώσσα ἡ ἀνθρώπου καὶ ἡ τοῦ κτηνίου γλώσσα, καὶ ἡ τοῦ ἰσθίου γλώσσα, ἡ ἀνθρώπου γλώσσα, καὶ ἡ τοῦ κτηνίου γλώσσα, ἡ ἀνθρώπου γλώσσα, καὶ ἡ τοῦ κτηνίου γλώσσα. Lingua pulcherrima omnium in corpore partium existens, dentium septo & munimine conclusa, sermonis fons & dux, gustusque index est, qui in homine, quàm in brutis perfectior est. Quod prius à *Democrito* in epistolis *Hippocratis* pronunciatum fuerat, lingua est loquelz mater, animæ nunciuſ, gustum custodiens, minutis dentium septis custodita. Quamuis lingua his dotibus & ornamentis ab antiquis decorata fuerit, nihilominus vltim in sacrificiis tanquam profanum membrum non adhibebatur. Hanc *Pittacus* misit Amasidi Ægyptiorum Regi, vt pessimam victimæ partem, eandemque optimam, quò respexit *Fabulator Æsopus*, cùm animalium linguas hero suo tanquam rem optimam & pessimam coëmit: *Lingua quid melius, lingua quid peius eadem*. Nam per linguam benedicimus Deo Patri, & maledicimus hominibus ad Dei effigiem creatis, vt ex eodem procedat ore Benedictio, & Maledictio, ait *Dionys Iacobus in Epistola*, vbi etiam clauo naui linguam assimilât: Hæc licet sit pars minima, totam tamen nauim aut euerit, aut seruat. Nec inſcitè dictum à *Solomone*, mors & vita in manibus linguæ. Eleganter *Propheta Regius Psalmo 86*. Dentium & linguæ incommoda notat, filij hominum dentes eorum arma, & sagittæ, lingua eorum gladius acutus. De potestate linguæ elegans est, & facetus Apologus in *Commentariis Iustiniani ad Psalms Davidis quatuor linguas expressos*. Euenit, vt Rex Persarum detineretur mortali ægitudine, cui dixerunt Medici, Rex nunquam poteris conualeſcere, nisi adhibeas tibi leænz lac, quod solum valet ad curam tuam. Respondit ex seruis suis quispiam: Si placet Maiestati tuæ, iube, vt dentur mihi decem capræ, & ipse adferam lac leænz. Quibus acceptis accessit homo ad spelzæm leonum, reperitque leænam lactantem carulos suos, & prima quidem die stetit vir à lungè, secundo verò die propius accessit, deditque leænz vnā ex capris quam comedit, cùm verò sic fecisset multis diebus cicureſcente nimirum fera, emunxit ab ea lac, reuertens verò priusquam in domum se reciperet, vidit per fumnum concertationem singulorum membrorum suorum, etenim pedes dicebant, nisi nos functi fuissetus officio non poterat hic ire, & portare lac: nos igitur primatum tenemus inrer omnia membra. At verò manus, imò nos principes sumus, nam solâ nostrâ operâ lac emulctum est: sed & oculi exclamabant, nos cuncta exsuperamus membra, nisi enim nobis iter monstrantibus nihil factum fuisset. Cor verò dicebat, imò cunctis sum anteponendum: quod solo me consulente res hæc tentata & perfecta est. Vltimo surrexit lingua dicens: si ego loquara non fuisset, nihil facere potuissetis. Excanduerunt in linguam singula membra, & dixerunt ei: tu quæ obligata es, & clausa in obscuro loco, careſque osse, quasi in vituperium, audes mutire contra nos. Illa verò respondit eis, hodie vel inuiti confitebimini me esse principem & reginam omnium vestrum. Hac visa per fumnum concertatione, timuit homo accedensque ad Regem dixit. En quod tibi attuli, est canis lac. Successus ira Rex, iussit hominem cruci affigi. Cùm verò duceretur ad patibulum, plorabant & tristabantur nimis singula alia membra. Dixit autem ad ea lingua. Nonne dixistis me infimam inter vos, imò nihil esse, atqui si hodie vos liberauero, nonne agnoscetis principatum meum: quibus respondentibus vtique, dixit lingua, reuertamur ad Regem, cui dixit: Cur iubes me suspendi? Quod, inquit, lac canis pro laude leænz mihi attuleris. At illa, quid interest modo curam obtineas mea opera? Nescis leænam nonnunquam canem appellari. Inuentum est autem experimento factum, quod lac leænz esset. Reuocata vero sententia mortis, membra singula confessa sunt esse referendum principatum linguæ. Quod citra dubium mors, & vita, in potestate linguæ constituta sunt. Sed Medici ex linguæ colore, siccitate, crassitie, &



magnitudine, morborum indicia certa depromunt. Quamvis *Sanctorius* incertam esse ex linguæ inspectione morborum cognitionem adstruere conetur, suo tamen errore, *lib. 10. vitandorum errorum*: quinetiam linguæ, lotium significant, ex *Hippocrate, lib. 6. Epid. sect. 5. tex. 14.* Sententiam *Hippocratis* confirmat *Aristoteles, sect. 4. Problem. 4. Galenus sic explicauit in Commentario*, vt lingua habitudinis humorum index est, haud secus atque vrinæ. Propterea lingua situm peropportunum obtinuit, vt multa morborum signa declararet: Est enim locata in confinio & exitu trium magnarum cauitatum, siue regionum, Capitis, Thoracis, & Abdominis ratione Oesophagi, quorum excrementis humidis & fuliginosis imbuitur & inficitur. Atque cum lingua sit Gustus, locutionis, & animi instrumentum, tribus istis partibus respondere & communicare debuit. Componitur ex carne propria, tunica, venis, arteriis, neruis, musculis & ligamentis: etenim linguæ substantia carnea est, ac spongiosa, qualis in corpore nulla reperitur. Proprius ad glandulosani, quàm ad musculosam naturam accedere, pluribus rationibus docuit *Arantius*, proinde putat linguam non rectè musculum appellari, quamuis in omnes motus differentias celerissimè mouetur, sed contrahitur, dilatur, duplicatur, & ad mentum exeritur sine musculis ad eas actiones destinatis, & in loquendo velocissimè & expeditissimè mouetur, vt animi motus celerissimos sequatur, ergo musculosa. Itaque lingua musculus est, & musculos habet, idemque de labiis dici potest. Nam lingua & labia duobus modis mouentur ex se, vel ab alio putà musculis. Certum est ac indubitatum linguam, & labia in locutione ex se moueri, quia celeritate incredibili agitantur, dum spiritum exufflatum intra spatium oris diuerberant, ex quo formatur locutio, quod perficitur sine musculis, sed actiones, quæ robustiores, & operosiores sunt, vt masticatio & deglutitio, opè musculorum absoluntur, quia lingua cibos, vt cumque graues & ponderosos reuoluere nequit sine musculis, est autem lingua caro, ex *Aristotele lib. 1. de historia animalium*, rura & fungosa, *videt. uim. 3. quæst. lib. 1. de hist. anim.* vt saporum qualitates excipiat, atque de his iudicium ferat, inde fit, vt fumos & vapores dominantium in corpore humorum ebibat, inque superficie colorata referat. Scriptum est ab *Hippocrate lib. 6. Epid. & in Coacis*, linguam vaporibus ipsam attingentibus concolorari. Huius substantiæ euident est emolumentum in morbis, vt patet ex *historia Pythodori, lib. 7. Epid.* dum ait *Hippocrates*, sub vltimum tempus dolor pectoris deglutienti potum, & maior in pectore, cuminum & oua absorbenti sedacuse est, *lingua raritas profuit*. Vnde colligitur, quod Pythodorus difficulter solida deglutiebat, nullo modo liquida, sed infusillata exsugebat linguâ, & in ventriculum eemittebat. Linguæ figura est Pyramidalis planè dissimilis ab aliis animalibus. Homo, inquit *Aristoteles, lib. 2. de partibus animalium, cap. 7.* Linguam expeditam mollissimam, & latam præcipuè habet, vt commoda ad vtrumque officium sit, hoc est, & ad sapores percipiendos, & ad literas exprimendas. Certum est molliorem & latitudinem linguæ plurimum conferre ad vocis conformationem & articulationem, proinde experientia cōstat non tantum aues, quibus lingua est mollis, & latior, acutiùs & rectius canere, sed etiam homines, & imprimis feminas, quibus lingua est mollis, esse loquaciores & voces articulatorios proferre. Tunica succingitur ex crassa meninge productâ, quam omnes oris partes peræque participant. Linguæ mollities & fungositas plurimum valet ad eius reparationem, si fuerit erosa & consumpta, vidit enim *Heritius* in puero septennij linguam ad radicem vsque putrefactam & consumptam, semestri spatio regeneratam. Corpus linguæ etsi continuum appareat, nullo septo discretum, ad comestitionis & locutionis commoditatem: Diuisionis tamen index linea secundum linguæ longitudinem exporrigitur, quam primus *Hippocrates* *diapum* appellauit. *Aristoteles* etiam agnouit istam diuisionem *lib. 2. de partibus animalium, cap. 3.* *Galenus* quoque *lib. 11. de usu partium*, duplicem facit linguam, eo quod neque à dextris ad sinistra musculus vllus, aut vena, aut arteria, aut nervus transcat, neque vicissim à sinistris ad dextra. Ex offensione linguæ fissura manifestè cognoscitur: quippe in hemiplegia partem alterutram linguæ paralyticam fieri vidimus, & in vuluæ malis alteram nigrescentem illæsa parte altera, continuis diebus obseruauit *Alexander Benedictus*. Ridiculum est, quod narrat *Ioannes Bohemus*, nationes quasdam duplices habere linguas, quibus diuersos sensus animi possint promere eodem instanti. Venas habet à lugulari externa, quæ vulgò Ranulares dicuntur, totidem Arterias à Cæphode, Nervos à tertio & septimo pari. Opè musculorum in omnes loci differentias

agitatur & circumducitur, quorum cognitionem & administrationem Anatomicam ex *Myologia & Myotome* repetes. Ligamenta quoque duo recipit, vnum latum & membraneum est, quo lingua basi hyoidis innixa molliiter constringitur, vt laxitate sua permittat linguam libetè moueri, ab eo producit alterum ligamentum sub lingua deuectum, quod Frænulum appellatur, id si ad mucronem linguæ protendatur, in puerulis vngue diuellitur, vel forfice inciditur: alioquin linguam interdicti necessum est, ipsiusque lactationis beneficium tolli.

Sed aduerte diligenter in sectione frænuli, ne vicinos & substratos linguæ nervos insignes, quod ad angulum in parte inferiore frænuli coeunt, attingas, quibus istis repentinam linguæ conuulsionem superuenisse vidi, qua de re leges *Fabricium Hildanum de Anguloglossis*. Ideoque in sectione frænuli linguæ sectionem potiùs duces in partem superiorem quàm inferiorem. Est tamen summopere considerandum, linguæ tantum, atque pudendis frænulum indidisse Naturam, quoniam in his potissimum organis voluit homines esse modestos. Frænulum istud linguæ in canibus degenerat in vermem, & est causa rabiei, quo euulso canes in rabiem non aguntur, *nota dicitur à Plinio*, & tale experimentum vidi in canibus venaticis. Id confirmatur à *Puerinchio prof. lib. de Monstris*.

Lingua dicitur à lingendo, vel à Græcæ voce *λινγω*, fuit enim initio liga, vnde & ligula, addita liquida ad sonum, sicut *αλκο λικωλιν*, inquit *Scaliger*, Græcis *γλῶττις* *γλῶττις*, quod dignoscit saporis omne genus, vel *αλκο λικωλιν*, *αλκο*, *αλκο*, & *γλῶττις*, quia dum circumagitur, formantur voces, ex *Meleto & Etymologico magno Græco*. *Euphathius* *γλῶττις* deducit à *γλῶττις*, frangere. Linguæ actiones plures ab *Anasom* memorantur, quas *Pollux* sic describit, *γλῶττις γλῶττις γλῶττις, ὅτι γλῶττις, ὅτι γλῶττις*. Sed Achilæ præcipua est, vocem motibus suis in verba discernere, idcirco Tereus cùm Philomelæ vocem adimere voluit, vocis explanandæ instrumentum linguam abscidit, ait *Galenus*. Vidimus Parisiis ex Pichonum regione puerum quinquennem, ex malignis variolis miseretè affectum, erosam linguam expuisse, integra manente vuula, absque vlllo aut exiguo locutionis detrimento. Hoc dumtaxat incommodo mulsetur, quod os copiosa madescat saliuæ & resupino Capite cogatur deglutire. In *Codice Infirmitatis*. Vidimus Venerabiles Viros, qui abscissis radicibus linguis poenas suas miserabiliter loquebantur. Idem testatur *Marcellinus*, *Enasus Gazæus in Theophrasto*, *Procopius de bello Vandalorum lib. 1. Gregorius Magnus Dialogorum lib. 3. cap. 32*. Instrumentum excoGITAVIT *Paras* ad loquendum defectu linguæ, vide locum. Est autem lingua proprium locutionis, siue vocis dearticulatæ organum, quod *αλκο λικωλιν* dicitur ab *Entripide*, cuius beneficio homines à cæteris animantibus differunt, dum mutuam inter se societatem conseruant, atque Dei miracula & beneficia prædicant: sed non ita præcipua est locutionis causa, vt omnis loquela, omnesque literæ ab ea emanent. Siquidem nonnullæ literæ à labiis, non à lingua proferuntur, scilicet F. M. B. P. formatur à labiis compressis, quod non ignoravit *Aristoteles, libro secundo de partibus animalium, cap. 16*. Literæ, inquit, partim linguâ producuntur, partim labiis comprimuntur: & *lib. 4. de historia animalium, c. 9*. ait, vocales literæ à voce & larynge, consonantes lingua & labiis proferuntur, quod si lingua imbecillior fuerit, vtpote breuior, vel humidior, vel mollior, vel siccior non poterit consonantes T. R. exquisitè pronuntiare, ac proinde in D. & L. declinabit, inde *αλκο λικωλιν* Græcis, qui dicuntur Latinis Dlazsi & suauiori sono Blazsi: Vide *Galenum in Comment. ad Aphor. 32. lib. 6*. præterea linguæ vitia sunt *ιγλαρτία, ὁ γλαρτία, ὁ γλαρτία, ὁ γλαρτία*. Habet lingua aliud officium, quo contritos & commolitos dentibus cibos colligit, & conglobatos vi sua deprimat & transmittit ad ventriculum, ideoque *Paras* à ligando cibo putat linguæ nomen impositum, quamvis alij à dicendo veteribus linguam dictam fuisse *linguam* prodiderint. Bestiæ etiam in potu adiuuat, protentâ enim cautâque linguâ hauriunt aquam, & linguæ sinu comprehensam, ad palatum celeri mobilitate complodunt: confert etiam lingua ad sputationem & excretionem, id est, eiciendum sputum. Radicem linguæ eiusque musculos non poteris obseruare, nisi facta fuerit ceruicis encheirisis Anatomica. Redendum igitur ad ceruicem, quam deserui, vt ad Caput festinarem, ordine necessitatis ita postulante, ne Cerebrum nimis emollitum putresceret.

## DE COLLO, ET OSSE HYOIDE.

## CAPUT IX.



**C**OLLUM dicitur, quod inter caput & thoracem situm est, eius anterior pars *ἡ πρόσθεν*, Posterior *ἡ ὀπίσθεν*. Vocatur etiam *κίρκα*, anterior eius pars, quæ est cartilaginea, quæ & vox & spiratio est. At *ἡ ὀπίσθεν* carnosus interiori spina positus, posterior & inferior cervicis pars est *ἡ ὀπίσθεν*, ex *Aristotele lib. 1. de hist. anim.* Quamvis hoc nomen *ἡ πρόσθεν*, apud *Iulium Pollucem & Galenum* tribuatur summmitati humeri ad concursum clavis, sed ex *Aristotele* denotat interscapulum.

Dicitur Collum, non à colendo, quod mobilibus exornetur: Nam ante usum molitum Collum erat, sed quod instar collis ab humeris exsurgat. Cervix etiam dicitur à gerendo, quia Caput gerit, inquit *Scaliger*. Græcis *κίρκα*, *ἡ πρόσθεν*, & *ἡ ὀπίσθεν*, quorum vocabulorum etymologias reperies in *Etymologico magno*, ex *Aristotele lib. 3. de partibus animalium, cap. 3.* Collum propter laryngem & œsophagum videtur exstruatum. Postea verò scribit conditum fuisse ratione laryngis, nam pisces Collo carent, quia pulmonibus destituti, attamen œsophagum habent. Itaque Collum propter arteriam, & hæc propter pulmonem. Secundus Colli usus est apud *Aristotelem*, ut quibusdam animalibus locum manus teneat.

Inter homines, qui longam habent cervicem sunt obnoxij phthisi, quoniam in illis Collum octo constat vertebis, ac proinde illis angustior & brevior thorax, qui sequitur longitudinem & brevitatem dorsi. In tam angusto conclavi effervescens sanguis acrimoniam acquirit, quæ pulmones tandem erodit, vel pulmones non satis refrigerati, incallescunt, & sensim exarescunt.

Ex pluribus partibus Collum constat, quarum alia sunt continentia, alie contenta: Continentia sunt cuticula, cutis, membrana carnosæ, quæ hic veræ carnis speciem præ se fert. Quæ sequuntur partes pro contentis omnes accipio, cuiusmodi sunt musculus maxillæ, Capitis, Colli, Ossis hyoidis, lingua, larynx, pharynx, gargarconis, quibus ordine dissectis, laryngem & os hyoides observabis: dein pharyngem, gargarconem, & plures alias particulas, quas ordine dissectionis recensibo.

Detracta totius cervicis cute musculos duos lateros membranosos, quibus antè Collum obvelatur, eximes. Deinde musculos mastoideos, & coracohyoides separabis: Tum videbis venas cervicales anticas, Iugulares internas, carotides arterias, Iugulares externas, & nervos sextæ coniugationis carotidi & Iugulari internæ interiectos. Nervi utriusque progressum ad thoracem, & recursum ad superiora inuestigabis, ut in nervis thoracis exposuimus. Postea musculos omnes in parte anteriore Colli sitos ordine administrabis, ut in *Myotome* declaratur, ad quam recurret. Musculos vero postici Capitis & Colli intactos relinques, quos in vniuersali *Myotome* tuo ordine administrabis. Itaque musculis linguæ, ossis hyoidis & laryngis communibus demonstratis, videbis linguæ basim adstringi & connecti interuentu crassi & laxi ligamenti, à cauo ossis hyoidis enati, quod linguæ pro fundamento subiicitur: laxum est, ut ab eodem cano, vel latere supremo epiglottis exsurgat.

Os Hyoides ex septem ossibus constat, quorum grandius excavatum, Basis est, ex basi utrimque duo ossicula magnitudine inæqualia, inuicem coherentia, ad apophyses styloides ascendunt, quibus ope ligamentorum adstringitur. Ex basi qua parte ossiculis nascitur, utrimque epiphysis ossæ emicat, quæ angulis superius hyoidis cartilaginis affigitur, sicque per synœurosim quibusdam vinculis apophysebus styloides, & thyroidei cartilagini firmatur, & adnectitur, & per accedens tantum musculorum adminiculo suspensum tenetur. Nam si ab æquali tensione musculorum os hyoides suspenderetur, ut volunt omnes *Anatomici*, muscoli nunquam ab actione sua cessarent, essentque in perpetuo motu tonico, quem impossibilem esse *Galenus* affirmat. Itaque cum os hyoides sit linguæ fundamentum, linguæ motus sequitur, eique subserviunt omnes muscoli ossis hyoidis, qui eandem originem, similem progressum, parem insertionem habent, exceptis duobus inferius coracohyoi-

deo & sternohyoides. Eorum musculorum antitarsi dissoluta, vt accidit in paralyſi, ſequitur aphonía, ex linguæ ſympathia, vt notauit *Rondeletius*, cap. 33. *Methodi mēdendi*. Quem morbum in quodam nobili ſe vidiffe memorat. Interim obſeruabis mufculos omnes linguæ ſubtus deferri, nullos autem ſupra linguam expandi.

## DE GLANDVLIS ORIS, FAUCIUM,

& Colli.

### CAPVT X.



**N** Collo & oris ſpatio plures glandulæ continentur, quæ fluentem à capite pituitam excipiunt, ad oris & linguæ humectationem, quin etiam laryngis leuem irrorationem, & per accidens immediatè labentem è capite humorem intercipiunt, ne continuo tramite decurrat in pulmones.

Dux ſunt glandulæ ad radicem linguæ collocatæ, quæ à fundenda ſaliua *μαζιγα*, ab alijs *αμυγδαλ*. Latinis tonſillæ, *Barbaris*, & vulgo amygdalæ dicuntur. *Mercurialis lib. de morbis puerorum* ſateatur ſe ſciſſe, cur *Serenus Poeta Medicus* tonſillas appellauerit Tolles, *Fellus* tamen interpretatur tumorem Faucium, cuius diminutiuum eſt tonſillæ. Notat *Iſidorus* glandulas Faucium nominatas fuiſſe Tolles, & per diminutionem tonſillas. Ergo malè tonſillæ accipiuntur pro morbo Faucium: *Celfus* puriſſimæ Latinitatis auctor, tonſillas Græcis *αμυγδαλ* vocari ſcribit, cap. 12. lib. 7. in *Vetere Gloſſario*, Tolles & Tollia, *μαζιγα*. Tonſillæ in homine, glandulæ in ſuiſus, inquit *Plinius*, lib. 11. cap. 37. Tonſillarum vſus eſt, torum os ſaliua perfundere, quo madefcat lingua ad guſtatum, eibique maſticationem: *μαζιγα* *Hippocrati* partes tonſillis vicinæ. Vide *Foeſſum* in *Lexico*. Aliæ dux inferiores & externæ in Colli principio, gutture ſitæ. Thyroidi cartilagini incubatæ *μαζιγα* nominantur, ex *Polluce*: mulieribus ſunt ampliores ad æquandum Collum, vt thyroidis nodus minùs extuberet. *Galenus* in *ſpagoge*, & *libris de uſu partium*, quatuor iſtas glandulas ſitu ita diſtinxit. At *Ruffus Ephreſius* lib. 2. cap. 4. ſenas glandulas in faucibus conſtituit, quas his verbis delineauit, & expreſſit. In penitioribus ab vtraque linguæ parte afixa ſunt pariſthmia, numero ſex, corpora glanduloſa, figurâ ſubrotunda, naturâ facilè mutabilia, atque diſſipabilia, membranulis quibuſdam altiùs inſertis conuoluta, ex his quatuor ab vtroque latere cernuntur, duo verò vix ſpectari queunt. Vocata ſunt pariſthmia, quod in anguſto meatu ſita ſint. Veteres enim locorum anguſtias *ισμὸν* appellabant: *αμυγδαλ* verò nominarunt, quoniam ore aperto *αμυγδαλ*, ex aduerſo oppoſitæ, præſertim cùm inſtimulatæ ſunt, appareant.

Si quis accuratè tonſillas aſpexerit, vnâquamque in duas dirimi poſſe deprehendet. Quod animaduerſum ab *Ariſt.* lib. 1. de *hiſt. anim.* *αμυγδαλ* *αμυγδαλ*. Nec abſurdum eſſe *Ruſſi* opinionem de ſenario numero glandularum in faucibus latitantium agnoſcet, ſi alias adiungas, quas mox deſcribam. Inepte *Fabricius* ab *Aquapendente* antiadas dici putat, quod antaram inſtar à lateribus faucium ſint collocatæ, lib. de *Locutione*, & in *Icone* depingit foramen à ſe inuentum in dextra glandula, cùm tamen in ſiniſtra plurima foramina, vt in dextra reperiuntur: earum glandularum tumor & dolor *αμυγδαλ* ab *ſcipiano* nominatur.

Tulſe *Polluci* partes poſt hypoglottidem vtrîmque prominentes dicuntur *αμυγδαλ* & *μαζιγα*, quæ his ſubſunt ſimiles quidem tubore, maiores verò rotundioresque vocantur *μαζιγα*, qua ſunt cartilagini thyroidi appoſitæ. Sub maxilla inferiore vtrîmque glandula inſignis continetur, quam in adminiſtratione primorum mufculorum aucterre conuenit. Deinde circa principium œſophagi, ſub mulogloſſo, qui ab alijs cœratogloſſus dicitur, glandulas duas oblongas & rotundas reperies, quin etiam plurimas glandulas carnoſas ſub lingua circa eius frenum offendes, quæ ad laborum & linguæ humectationem comparatæ ſunt.

Atque maiore copia ſaliuam effundunt in os, & inuoluntariè profluunt, quod accidit malè ſectò frenulo linguæ, tumefactæ imperitioribus ſuſpicionem elephantiaſis

inducunt, Ranulares hypoglossides glandulæ nominari possunt, ibique morbus *Αν-  
ραξ* generatur & consistit. Sub aurium radice corpora quædam glandulosa simul  
conglobata reperiuntur, quæ à loco *Parotides glandula* dici possunt. Non tantum  
tendonibus musculorum temporalium munimento sunt, verumetiam cum aliis sub  
maxilla inferiore collocatis, excrementa Cerebri suscipiunt, & articulationem ma-  
xillæ supernæ assidue agitatem irrigant.

In colli lateribus secundum ductum Iugularis internæ, glandulæ exiguæ huc &  
illuc dispositæ sunt, in quas Cerebrum sese exonerat. in pueris tumefactæ Capitis  
plenitudinem indicant, & in his potissimum scrophulæ generantur & apparent.

## DE LARYNGE.

### C A P V T XI.

**H**is observatis priusquam Laryngem eximas, asperæ arteriæ caput, no-  
tabis Latinis guttur dici à verbo garrere, quia inde procedit garrulus,  
forsan *χρῆς*, quia voces fundit à *χρῆς*, deinde mulculos toti Laryngi  
communes & descripro, lib. 5. c. 17. inquirens.

Postea considerabis, ut ex quinque cartilaginibus componitur, qua-  
rum tres maiores Laryngis corpus constituunt. Maxima & anterior *Thyroidis* dici-  
tur, reliquas duas minores cartilagine includit. Secunda cartilago *Cricoidis*, in basi  
thyroidis consistit, orbem annuli perfectum referens. Huic insistit intra thyroideum,  
tertia cartilago ab *vreoli*, vel oris œnophori figurâ nomen habens *Arytenoidis*. Tres  
istæ cartilagine à circumiectis musculis moventur motu duplici, alter est *Clausio &  
Apertio*, qui pendet ab Arytenoide. Alter *Dilatatio & Constrictio*, cuius opifex est  
Thyroidis cartilago, sola Cricoidis perstat immobilis, primis duabus vice funda-  
menti subiecta. Restant duæ cartilagine, glottis & epiglottis explicandæ.

*Glottis* intra Arytenoideum consistit ipsi Cricoidi orbiculatim affixa. Scissura, si-  
ue orbiculus est cartilagineus, non edendæ vocis, ut *Glottis* voluit, sed potius mo-  
dulandæ instrumentum. Nam glottis deest in ruminantibus animalibus, boue, &  
oue, quæ tamen edunt vocem, sed simplicem & uniformem. Ergo non est glot-  
tis principale vocis instrumentum. *Glottis* eius figuram linguæ tibiz compa-  
rat, quæ *γλῶττις* appellatur, ut ex *Disseride* liquet, lib. 1. cap. 14. In arundinum genere  
quædam *γλῶττις* vocatur, ex qua sagittæ fieri solent. Alia femina, quâ tibiæ ligulas  
efficiunt, *γλῶττις* à *γλῶττις* nomen habet, *γλῶττις* enim eadem ligulæ hodie nostris tibiis aptan-  
tur, sine quibus sonus edi non posset, Galli *anchæ* nominant. *Aristoteles* in *Fragmen-  
to de auditibus* scribit, *γλῶττις* densa, & lævis, & æquales esse debere, ut  
spiritus transuchatur per ipsas lævis, & æqualis, & non distractus. Apud *I. Pollu-  
cium* *Περὶ τῆς γλῶττις* sic emendabis *Glottis*, lib. 1. de locis affectis, quæ intra Laryngem  
est *γλῶττις*, lege *γλῶττις*: præcipuum est vocis instrumentum, ipsa enim à musculis mo-  
deratè abducta & adducta conformat vocem.

Quæstione dignum, An *γλῶττις* dilatetur, & constringatur, & vnde pendat hic mo-  
tus? Constringi credo à musculo Tyroarytenoideo, glottidi circumiecto, & in homi-  
ne glottis videtur efformata ab extremitate eius musculi pellicula duriusculâ velati.

Ad latera musculi & glottidis, utrimque iacet *Canernula*, eo fine condita, ut si bi-  
bendo aut edendo aliquid in Laryngem decreret, illic retineatur & assuetur, quod  
postea tussiendo expulit.

Arytenoideum quæ Laryngis introitus est, contegit, clauditque altera cartilago  
oblonga, cum pediculo, ex fissura antica Thyroidis educta ossi hypoidi innixa, foliis  
laurocerasi similis, membrana velatur rubra quadatenus carnosa, quæ habetur pro  
musculo. Huic altera membrana adiposa substernitur. Hæc particula à subiecta glot-  
tidæ nomen accepit epiglottidis, quasi *ἐπὶ τῇ γλῶττι* sit. Semper erecta tene-  
tur ad respirationem, deprimitur tantum supra Arytenoideum pondere alimentorum  
prælabentium, ne quid bibendo aut edendo in Laryngem incidat, & elabatur, quod  
ubi præterlapsum est, mox sursum erigitur. Cibum quoque à lingua veluti ventilabro

purgatum, & Laryngis orificio superimpositum ad œsophagum pontis modo detrahit, authore *Galeno in Isagoge*. Sed deglutitionis, siue descensus cibi modus, inspectione potius, quàm longa oratione cognosci potest. Durities epiglottidis vitæ multum incommodat, dum liquidorum deglutitionem impedit, quia non potest ab his, vt ab alimentis solidioribus deprimi: similiter gracilior & tenuior ac reuulsa, vel retorta epiglottis, obstitit liquidorum deglutitioni, quia non potest deuolui & deprimi, nisi à solidioribus, vt in quibusdam obseruauimus. Notabis in mulieribus minorem esse Laryngem quàm in viris, & thyroïdem cartilagineam minùs extuberare. In quibusdā senibus Laryngis cartilagine potissimum thyroïdem & arithenoidē osses deprehendi. Inspectis diligenter Laryngis cartilaginibus, musculos proprios obseruabis, nullos autem in epiglottide inuenies, sed propter firmiorem atque strictiorem connexum in cauo ossis hyoidis interuentu crassioris ligamenti semper erecta tenetur, nec nisi vi depresso confestim erigitur. An *Hippocrates* epiglottida cognouerit per *Galenum* aut *Ualeriū*, ionicè, dubito. Nam apud *Galenum in Excepsi*, est locus ad gulam sub tonsillis, quare de re consules *Foesium in Oeconomia*.

Certum est *Hippocratem* cognitam fuisse non *epiglottida*, quam sine adiuncto sic appellat, quod imitatus est *Aristoteles*. Sed post *Hippocratem* & *Aristotelem* *ἐπίγλωττις* adiungere, vt distingueretur ab aliis arteriis. Huius arteriæ Caput *Hipp. ἐπίγλωττις* vocauit, canalem *ἐπίγλωττις*, ramos in Pulmonem sparsos *ἐπίγλωττις*, vt etiam fecit *Aristoteles*, cum dictio *ἐπίγλωττις* *Hippocratis* tempore nodum esset in vsu, sed *ἐπίγλωττις* ab *Hippocrate* sæpius vsurpatur pro Larynge. De oratione nominis, à *ἐπίγλωττις*, lege *Etymol. magnam Græcam*, pag. 188. & 11. 215. Accuratè *Aristoteles*, lib. 1. de hist. anim. de arteria, siue Larynge differuit, quem datum esse omnibus, quibus & pulmo, & cartilaginosa esse natura, à *ἐπίγλωττις*, obturatū ligula, quam vocat *ἐπίγλωττις*: Et videtur agnouisse *ἐπίγλωττις*, si sequamur correctionem *Scaligeri*, *ἐπίγλωττις* *ἐπίγλωττις* *ἐπίγλωττις*: neque lingua hic debet intelligi, quia suprà egit de lingua, cuius est pars epiglottis, *ἐπίγλωττις* *ἐπίγλωττις*. Sed per illam dictionem videtur intelligere eam partē linguæ, quæ à *Pollace* *ἐπίγλωττις* dicitur, vt anterior linguæ pars *ἐπίγλωττις*. *Hipp. lib. 2. de morbis* partes sub lingua *ἐπίγλωττις* appellat.

## DE PHARYNGE.

### CAPITULUM XII.



**P**OSTERIOR maxillam infernam auferes, vt alix partes quæ in faucibus continentur faciliùs inspicere queant. Imprimis *Isthmus* ex *Galeno* est Laryngis & pharyngis coniunctio, seu confinium, vel spatium duobus canalibus interiectum, quod in brutis euidentius est, quàm in hominē. *Isthmus* autem apud *Geographos*, nihil est aliud quàm arcta terra inter duo maria, ex *Galeno*. Alij tamen *Isthmum* accipiunt pro interiore oris spatio, & pharyngem pro corpore membranoso hunc locum ambiente, quod principium est œsophagi, *Idem* ex *Eustathio*, *ἐπίγλωττις* *ἐπίγλωττις*. Dicitur autem *Pharynx*, *ἐπίγλωττις* *ἐπίγλωττις* *ἐπίγλωττις*, ex *Etymologico magno*, pag. 788. Sed eiusmodi canal is non aëri transferendo dicatus est, sed potius cibis deducendis, quamuis non diffitear, interdum aëre deduci in ventriculum. Dictio Latina *Faux*, à verbo Græco *φαίνω* emanat, propterea quod sermo inde procedit, ideoque *dolysimus Poeta* dixit,

----- & vox faucibus hæret.

Eleganter *Isidorus*. Fauces à fundendis vocibus dicuntur, vel quod per eas famus voces, vel à Græca dictione *φαίνω*, pro *φαίνω*, quod est loquor, dicitur etiam frumen, an Rumen ex Donato summa gula, per quam lingua demittit in ventriculum. *Seruius* sic appellat sub mento gutturis partem.

Huic parti attribuuntur septem muscoli, tres coniugati, & quartus sine pari, nimirum œsophageus. Quum enim *Deglutitio* nutu & voluntate nostra perficiatur, animalis iudicari debet, ac proinde musculis indiget ad eam actionem edendā. Quod autem pharynx volūtarie mouetur, sic de monstro. Motus ille non potest esse naturalis, qui à voluntate nostra proficiscitur: At in nobis situm est, cum lubet deuorare, pharyngem mouere, & in ipsa transglutitione huic motum inhibere possumus. Quod immota pharynx possumus deglutire innumeris belluonum exemplis probatur, quæ dā recitat *Cardanus*, lib. 3. de varietate rerum, & *Brasauola comment. in Aphor. Hippocratis*.

Præterea nulla fit deglutitio, si lædatur imaginatio, aut animalis facultas appetens. Sicrei ingrata difficilis est deglutitio, quamvis organa libera sint. Accedit, quod resolutus musculus pharyngis, plures derepente perierunt, integris aliis facultatibus, vt testatur *Thomas à Veiga comment. in lib. Galeni de locis affect.* cap. 3. quem affectum se vidisse testatur *Zerbus in sua Anasione, cap. de Gula.* Huius morbi mentionem faciunt *Haly Abbas, Theophrast. cap. 24. & Aetius lib. 6. cap. 33.* Nonnulli hanc controuersiam sic component, vt deglutitio sit actio mixta, ex naturali & animali: Naturalis quidem est, quia expulsiōe fit, & attractiōe, quæ nutritrici facultati famulantur. Attractiō fit villis rectis, expulsio circularibus. Animalis etiam est, quia voluntariè à musculis peragitur, qui pharyngem dilatant, vt cibos admittat, constringunt ad eorum expulsiōem. Ego, verò contendo deglutitiōem esse actionem prorsus animalem: Quorum enim Pharynx musculos obtinuit? Cur ipse œsophagus totus carnosus est, multiplici fibrarum genere contextus, nisi vt musculi naturam & officium subiret. Itaque gula mouetur proprio motu ad detrudendum alimentum in ventriculum. Nec enim sponte, & grauitate sua deorsum labitur. Sed etiam pressum, vt videmus in iis, qui partem istam habent resolutam, & in brutis, quæ prona terram spectant, cibos traducunt in ventriculum, Gulâ trahente & deprimente. Motus autem iste perficitur instrumentis muscularis, cuiusmodi est musculus orbicularis œsophagiæ compellens, & substantia carnosæ & fibrosæ œsophagi attrahens ad ventriculum.

DE GARGAREONE.

## CAPVT XIII.

**Q**UO vuz nomine vltimo dependet palato homini tantum est, inquit *Plinius lib. 11.* Græcis γαργυρία, καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς γαργυρία τὸ τὴν δεξιάν αὐτῆς. καὶ τὸ ζυγόν τὸ ἀπὸ τῆς γαργυρίας τὸ ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ, τὸ τὴν ἐκ τῆς γαργυρίας. *EX ETYMOLOGICO magno Græco.* Sic *Aristoteles* libro primo de *historia animalium*, respirationem & expirationem fieri scribit, καὶ τὴν γαργυρίαν. Notauit *Iulius Pollux* libro secundo etiam à quibusdam αὐτὸν γαργυρία vocari γαργυρία, *sestione eadem libri citati.* Laryngis in collo prominentia γαργυρία, & αἰσθητὸς nominatur: sed propriè gargareon dicitur γαργυρία & αἰσθητὸς, quorum *etymologus* fusè exponit & *etymologicum magnum Græcum.* Vnam *Latini veteres* appellauerunt, satis aptè, quia pendet, & vnam vineacem æmulatur: At columnam pendentem quos vnquam vidit, inquit *scaliger*, propterea columella vocatur improprie. Obiter monebo veteres *Latinos Plinium, Celsum, Serenum*, Vnam dixisse. *Trotula primus lib. de passionibus Mulier.* Vulam vocauit. *Latinis* quoque vocatur Gurgulio, à gutture si credimus *Isid.* vel Gurgulio dicitur à dictione γαργυρία, quæ collum apud *recentiores Græcos* significat, vt docet *Meursius in Glossario Græco-barbaro.* Sed nomen istud antiquum est apud *Persum Sat. 4.*

*Inguinibus quare detonsus Gurgulio extat,*

Pro pene posuit, sumpta translatione à gurgulione, qui ingula crescit, & inflatur, auctore *Serapio*. Apud *Varro* lib. 2. de re rustica cap. 3. accipitur pro colli parte exteriori, ut *gurgulio* apud *Græcos*. *Hircus*, *inguit*, molliori pilo & potissimum albo, ac ceruice, & collo breui, gurgulione longiore. Sed satis de nomine.

Nunc ad rem accedamus. Est autem γαργαρεύον corpusculū rubrum, fungosum, quod fluxione facili intumescit, & elongatur, ex *Arsysteles lib. 7. de hist. animal.* μίαν μακρότατον αὖν ἔχειν λέγουσιν, quod deprompsit ex *Hippocrate lib. 2. de morbis.* Εὐαγρία δὲ γαργαρεύον. *Aretaeus* nerium humidum appellat. *Columbus* ex palati tunica reduplicata conflari putat: *Fallopio* glandulosum est corpus. Ego verò carnem potius esse crederem, cum ab extremitate musculorum, qui ad id corpus feruntur, exurgat. Magnitudo gargareonis æqualis esse debet epiglottidi. Nam si minor fuerit nullius erit usus, si maior incommodabit: Vnicus debet esse gargareon, non duplex, siue bifidus, quia locutionem offendit, ut in plerisque obscuratum.

Huius particulae plures vias ab *Anatomicis* proferuntur. Imprimis impedit, ne aer frigidior repente & affatim irruat in Pulmones. Deinde instar ventilabri seu flabelli pulverulenta corpuscula discutit & expellit. Addit *Iulus Pollux*, quod cum sit visus à



palato dependens densitatem cibi potiusque diuidit, ne abundantia affluentia suffocetur. Confert etiam ad vocis elegantiam & modulationem, aliquid etiam humoris insillat in laryngem, vnde Gargareon dictus est, *ἡ δὲ ἐν γογγύσσει γογγύσσει τὴν ἀρχὴν ἐν τῇ ἀρχῇ* : à titillatione, quæ ab ipso fit in trachæa arteria, inquit *Erotianus in Lexico suo* : quas omnes utilitates in iis manifestè dignosces, quibus Gargareon exedus aut etofus fuerit. Nam vocem raucam edunt, & pletumque pulmone refrigerato, aur acrioribus fluxionibus exulcerato, quibus postea sunt obnoxij, tabe consumuntur. Quocirca monet *Galenus, lib. 11. cap. 11. de v. p. partium*, non esse temerè abscindendum Gargareonem, sed quandam basis partem relinquendam, de qua excisionem loquitur *Hippocrates, lib. 3. Prognost.* Sed *Mundinus in sua Anatome*, præ exteris modum inuendi vnam docuit, monuitque vñionem præferendam esse excisioni, quia propter situm & substantiam, quando inciditur, raro consolidatur, atque sanies ibi aggregatur putrida, & sentitur foetor oris. Itaque mirari subit, cur *Ruffus Ephesius* hanc partem velut inuilem neglexerit, eaque reserata nullam corporis actionem vitari scripserit. Non me latet *Fallopium* inficiari eius erosione, vel amputatione vocem depruari. Scio quoque *Nicolaum Florentinum* literis consignasse, cantoribus Gargareonem extirpati, vt crassiores edant vocem, quod prius ab *Alexandro Aphrodisio* annotatum fuerat. Sed ego pletosque vidi, quibus tabo luis venereæ consumptus fuerat, rauca voce loquutos. *Carpus* vidit homines vñ desitutos, raucam & pessimam vocem habuisse. Idcoque reprehendit *Zerbum*, qui notat eius auulsionem crassam vocem reddere. Quidam hunc nodum ita solui putant. Quod amputato Gargareone vox lædatur in duratione & modulatione, non in altitudine & clangosa soni vehementia, quæ potius augetur. Quod si alta & clangosa vox fuerit, non erit magna, vt placet *Aphrodisio*, nec crassa, vt opinatur *Nicolaus Florentinus*.

Præter istos vsus commemoratos, alter est insignis, cuius causa conditum, ibique appositum gurgulionem affirmarem : impedit enim liquidorum refluxum in nares cum deglutiuntur, quod sæpius expertus fui in puerulis, qui cum Gargareone carent, lactere non poterant, temeante ad nares lacte quod exugebant, & in adultis, quibus erosus fuerat.

Aburdum fortasse videbitur Gargareonem exiguum adeo particulam *myofulus* habere descriptos *lib. 5. cap. 19*. An ad motum, vel suspensionem? Motu enim manifesto moueri non apparet, solo aëris appulsu ventilatur. Quidni obscure mouebitur, cum fit vocis plectrum, quam exquisitè modulatur & articulat. Præcipuus musculorum vsus est, eam particulam suspensam cōtinere, vt nonnulli dixerit de musculus hyoidis, quod munus carnibus potius, quàm ligamenti commissum fuit. Etenim Gargareon in humido loco situs, continuo humorum affluxu alluitur, quibus imbutus, vel relaxatur, vel intumescit. At si sola ligamenta Gargareonem suspenderent, semel relaxata, difficillimè contrahi, & amissum robur recuperare potuissent. Siquidem partium nervosarum pristinus tonus nunquam restituitur. Notatur apud *Hippocratem*, non tantum gurgulionis relaxatio, verumetiam contractio, *lib. 3. Epid. sect. 2*. Eury-naëdis filia ab initio morbi fauces dolebant cum rubore, & gurgulio retractus erat. Subita gurgulionis tetractio, quando pipere aut sale tangitur, demonstrat motū huius partis manifestum, quamuis exiguum. Præter musculos, latetibus gurgulionis accumbunt vtrique lata duo *Ligamenta*, quæ ipsum Gargareonem connectunt, aliis expansis similia sunt, de quibus eleganter tractauit *Aretæus, lib. 1. acutorum, cap. 8*. Tertius, inquit, Gargareonis affectus, est membranarum ab vtraque parte iacentium, quæ veluti squammæ latæ, aut vespertilionum alæ conspiciuntur. Id genus morbi, lorum, *quodum* vocatur, locis enim similes sunt membranarum in latum expansiones. At si in tenuem & oblongam membranam columella desinat, velut vrinaculum in extremis habens, *quodum* dicitur, quod montis radicem vel pedem significat. Eorum ligamentorum etiam meminit *Auulor Anatomia vñorum*, & Barbato nomine *Gassamach* appellat, quod nomen est Arabicum, & apud *Auicennam 9. Fem 3. cap. 1. & 10. extat*, *Algasama* : *lib. 1*, inquit, cato est panniculosa, annexa palato, sub vña pendens, cooperiens caput canæ, sicut arca, istæ pelliculæ tonsillis circumtense sunt, tanquam auriculæ caucernose, ait *Carpus*, & ideo vocantur aræ, & repositoria aëris. Istæ enim aræ sunt notabiles in Cynocephalis, intra quas seruant non solum aërem, sed interdum cibum, vt sunt castraneæ, auellaneæ, fabæ. Istæ pelliculæ melius videntur in vno, quàm in alio, sed melius in viuo, quàm in mortuo animali, quia in mortuo animali retrahuntur, &

istæ arcæ seruant aërem magis in egressu, quàm in ingressu, ne totus exeat à via Eor-  
dis, & peteat animal, ex *Corpo in Isagoge*. Addit comment. in *Mundium, Galenus lib. 11.*  
de *virtute*, notauit quod sunt duo orificia, seu fontes, à quibus exit saliuæ, in illis o-  
rificiis ingreditur stylus, teste *Avicenna*, & teste sensu, & talia orificia aperiuntur, &  
constringuntur per suas pelliculas, sicut clauditur & aperitur Bursa, quod ignoran-  
tes aliqui Chirurgici facientes operationem in isto loco, incidendo aperiunt talia o-  
rificia taliter, quod suæ pelliculæ non possunt postea claudi tempore debito, & tunc  
perpetuò velit, vel nolit patiens ille, semper est cum ore pleno sputamine, & ego ha-  
bui tales casus præ manibus. Vidi istas capsulas membranosas tonsillis circumtensas,  
quæ in iis, quibus continuò madet os saliuæ, euidentius propendunt, & conspiciun-  
tur, in aliis complicatæ, & in sese concidentibus nobis apparent. In eadueribus mani-  
festæ sunt, & disiunctæ magnum spatium intra se relinquunt, sinu suo tonsillas cau-  
ernas variis foraminulis pertusas, excipiunt & amplexantur. *Galenus* videtur aliqua-  
tenus exploratas habuisse eiusmodi glandulas spongiosas quibusdam meatibus per-  
tusas. Notat enim *lib. 11. de usu partium, cap. 11.* Glandulas spongiosas Cerebri extre-  
menta pituitosa exfugere & absorbere, ab eisque meatus per obliquas partes atque  
inferiores humorem pituitosum distillare in fauces. Excipiunt autem istæ glandulæ  
vtriusque duos canales Choanæ, expurgantes sursum humorem Cerebri, de quibus  
loquitur *Galenus, cap. 6. lib. 1. & lib. 9. cap. 1. & 3. de usu partium. Julius Pollux lib. 2.* vi-  
detur subolsceisse istas cavitates, dum scribit, *ὅτι ἡ ἰσχυρία τῶν πάλαιων ἀνθρώπων ἔχοντο  
αὐτοὺς, οὐ δὲ ἔστιν ἐκ τῶν ἀνθρώπων.*

Ab soluta gurgulionis Anatome, considerabis *Faucium Fornicem*, nempe basim of-  
fis Sphenoidis, obductam membranâ, quæ foraminulis quibusdam pertusa est, ad ef-  
fluuium humoris pituitosi à Cerebro labentis. Deinde videbis inanes cavitates infra  
palatum, ossæ vomeris diuisas. Totum istud spatium internarum faucium obuclat  
rubicundâ membranâ. Margines seu oræ apophyseos pterygoidis munitæ sunt  
cartilagine, & in basi lateris interni cuiusque apophyseos, foramen obseruabis, quod  
ad aurem tendit. Per canaliculum in os ad apertum sardi audiunt.

Sed mutum est surdus à natiuitate etiam mutos, artificio admirabili edoceri ad lo-  
quendum & intelligendum aliorum conceptiones voce prolatas. Sic eruditum fuisse  
in Hispania Illustrissimum Principem à Sabaudia Principi Cariniani filium, surdum  
& mutum, qui ex signis significantibus literas Alphabeti, quæ momentò illi demon-  
strantur, illicò coniungit literas, easque lentè profert, & prosequitur, atque sic re-  
spondet interrogatis. Cùm autem polleat tanta vi memoriæ & iudicij, vtrerum om-  
nium nomina retineat, & exprimat, si gas habere voluerit. Artificium istud admi-  
rabile inuenit Hispanus, & scripto eleganti tradidit Hispanico, quod conseruatur in  
*Bibliotheca eruditissimi Medici, & Professoris Regij, D. Renati Morean*, mihi quæ commu-  
nicatum. Inscriptio libri talis est. *Reduccion de la letras y arte para enseñar a ablar los Mu-  
dos, por Juan pablo Bonet, en Madrid, anno 1620.*

His obseruatis ad musculos festinat oratio & dissectio Anatomica, quos omnes à  
Capite ad calcas continuata serie soleo demonstrare, excepris musculis abdominis,  
de quibus actum est in ventre inferiore: At cùm facies, oculi, nasus, aures, & parres  
omnes colli, puta lingua, pharynx, larynx, gargareon, tonsillæ non possint ostendi,  
neque spectari sine administratione muscutorum earundem partium: idcirco mem-  
bratim dissecando musculos, de istis partibus suo loco commodè tractatur, quas  
tamen nolui separare à Capite, cùm ceruix pars Capitis esse videatur.

### Finis Libri quarti.



IOANNIS  
RIOLANI  
ANTHROPOGRAPHIÆ  
LIBER QVINTVS.

MYOLOGIÆ UTILITAS.

CAPVT PRIMVM.



**A**BSOLVTIS tribus nostri corporis cavitatibus, & quæ in his continentur partibus explicatis, ad *Artus* pergo, quorum *Myologiam* à Capite ad pedes persequar. Nonnulla tamen præmittam ad perfectam musculorum cognitionem valde necessaria, quibus instructus Anatomicus per hoc salebrosum iter tutius incedet.

Quum homo ad varias actiones obcundas natus sit, Corpus variis discretisque ossibus compactum obtinuit: quæ ita iuncta sunt & continuata, vt cuiusque extremitas alterius sinum & capacitatem subeat ad formandum articulum, & ne violento motu seiugata distraherentur, aut suis sedibus exciderent. Natura eorum copulationem & compagem firmissimis vinculis cartilagine, ligamento, & musculo colligauit. Nec solius connexionis causa musculos ossibus circumiecit, sed tanquam præcipua motus instrumenta, quibus voluntario motu corpus gubernaretur. Anatomicam eorum historiam nunc meditamur. In hoc studio plurimi se exercuerunt, sed nullus adhuc absolutam & perfectam *Myologiam* reliquit: Nec verebor de hac parte doctrinæ Anatomicæ liberè pronuntiare, quod *Plinius* 31. cap. 10. de lineis extremis picturæ, in quibus summa est subtilitas. Corpora enim pingere, & media verum, est quidem magni operis, sed in illis multi gloriam tulerint, extrema corporum facere, & desinentis picturæ modum includere, rarum in successu artis inuenitur. Ita facile est ventres secare, & viscerum compositionem retexere. Musculos autem, venas, arterias, & neruos optimè tractare, id est, verè & perfectè describere, paucis adhuc Anatomicis contigit. Nos in hac parte aliquid cæteris Anatomicis perfectius edere conabimur. Interca moneo, ne quis ad musculos accedat ignoratâ ossium naturâ, alioquin parum firmis fundamentis magnam ponderum molem imponit, teste *Galeno*, lib. 4. ad. min. anat. cap. 8. Ideirco Anatomices initium ab ossibus repetendum, quibus musculi ordine doctrinæ debent succedere, cum his duabus partibus veluti fundamentis reliquæ corporis partes innixæ sunt. Ad hoc studium nos inuitat huius artis utilitas facilis & iucunda. Quid enim facilius quam partes externas sensibus manifestas dis-

cernere? Laboriosè venæ portæ ramulos peruestigamus, supersticiosè super poris cholidocis rixamur, qui in arte medica exigui sunt momenti? Musculos verò tactui & oculis fidelibus subiectos contemnimus, vel saltem cursim attingimus? Hoc ingenij vitium nouum non est, sed vetus. Conqueritur *Galenus*, lib. 4. *admin. Anat. cap. 1.* quod iuuenes essent prorsus extispices, maiorem industriam in peiore dissectionis parte collocarent, vtiliorem quæ versatur circa musculos, prope omnes respicerent. Si oblectatio quaeritur animi, quid æquè delectat quàm scire, quibus motibus agantur brachia, pedes? qui musculi hunc vel illum motum perficiant? Sed huius doctrinæ vtilitas in artis operibus longe præstantior ad vulnera, telorum extractions, luxata, fracturas cum vlcere, item ad fistularum, sinuum, abscessuum incisiones, & alia id genus. Musculorum ignorantia facit, vt in rebus secutis timidi, in iis quæ metum postulant, securi simus. Itaque satius est cognoscere, non quot membranas singulis Cor orificiis habeat, neque quot venæ ipsum nutrant, aut vnde quomodo procedant, aut quo pacto neruus illi ex partibus superioribus inferatur. Verum à quibus musculus extendatur brachium, cubitus, brachiale, femur, & à quibus rursus inflectatur, quinam in obliquum istas partes circumagant. Quamobrem *Galenus*, cap. 31. lib. 3. *admin. Anat.* iuuenes hortatur, vt relictis visceribus prius ediscant, quali brachium scapulæ, & cubitus connexu deligentur, quomodo rursus alia artuum membra, quinam musculi ea moueant, atque ob eam causam manus & cruris Anatomen, lib. de *usu partium*, & *admin. Anat.* aliis partibus præmisit. Meritò hic succenserem Auerhoi, qui musculorum Anatomen Chirurgo quidem necessarium esse fateatur, sed inutilem Medico, nisi eius ignorantia in rebus Anatomicis, omnibus satis cognita & explorata esset. *Galenus* musculos præmisit vasis, id est, venis, arteriis & neruis, vt accuratam illorum distributionem explicaret: quoniam quamplurima & insignia vasa in musculos disseminantur, quorum historiam repetere oporteret in explicandis vasis. Itaque tautologiæ vitandæ causa musculos prius exponere conuenit.

## MUSCULORVM NATVRA, COMPOSITIO, & Differentia.

### CAP. II.

**M**USCVLVS Græcis *μῦς*, dicitur, quod figura sua murem excoriatum referat, qui capite & cauda gracilis est, & angustus, qualis figura in pluribus Musculis obseruatur. Eadem ratione Latinis *Lacertus* appellatur, inde lacertosus Musculosus significat. Alij dictum putant à similitudine, quam habet cum pisce Musculo, quam meritò reprehendit *Columbus*. Apud *Vegesium*, lib. 4. cap. 16. Musculus machina est militaris, à Musculo pisce dicta. Non ineptè *μῦς* *ὡς* *τὸ* *μῦς* *deriuatur*, quod est contrahere, opus Musculi proprium, & Latinis, *Musculus* quasi *Monifculus*.

Vulgo definitur voluntarij motus instrumentum. Quæ definitio non probatur *Piccolomino in prælect. Anat.* quia soli homini voluntas conuenit, non brutis animantibus, quæ tamen veris musculis præditæ sunt. Laudat generalem istam definitionem musculi à *Gal.* traditam, lib. 1. de *motu Musc.* Musculus est motus instrumentum, qui sit secundum impetum. Per impetum, *vel* *impetu* *Galenus* intelligit, quod *Aristoteles* lib. de *natura animalium*, cap. 7. vocat *ἰσμία*, id est, spontaneum, quod principium habet intrinsecum commouendarum partium, easque nulla externa occurrente mouens, sed sola re appetibili alliciente, ac iuuante. Deinde omnis motus voluntarius, est spontaneus: Non contra spontaneus, est voluntarius. Præter hanc definitionem quæ ab officio desumpta est, alia traditur ab eius compositione petita. Vt sit Musculus pars organica dissimilatis, contexta tunica proptiâ, carne, neruis, fibris, ligamentis, arteriis, venis, ex quibus Musculi corpus conflat.

Musculi omnes membranæ habent propriam ac peculiarem, authore *Galeno*, lib. 5. *admin. Anat.* Hæc autem membrana, ex eodem *Galeno* lib. 1. de *motu Musc.* cap. 1. à ligamento pronascitur. Ratione suæ originis insensilem esse scribit, quod est falsum.

Nec tantum extinsecus Musculi carnem obuoluit, sed aliàs immerfa, carnis firmiori colligationi inseruit. Caro musculi propria est, naturâ & positione ab aliis distincta. Nam in parenchymate caro nullo ordine disposita est valis circumiecta instar stœbes, siue tomenti ad firmandos vasorum diremptus. In membranis omnibus duplici ordine apposita est transuersum, ac per longitudinem. In glandulis caro mollis & spongiola circa venas & arterias nullo ordine conerescit. Itaque quadruplex genus carnis ab Anatomicis constituitur & obseruatur, pro vario modo infarsctus, siue diuersâ concreti sanguinis formâ, nempe viscerosa caro, membranosa, glandulosa, & musciosa. In musculis tantum per longitudinem, & secundum fibrarum nervosarum ductum porrigitur, itaut caro ambiat, & inueltiat fibras omnes. Nervi omnes musculi accipiunt à Cerebro & spinali medulla deriuarum, vsu quidem paruum, sed virtute maximum. Huius beneficio & mouetur, & sentit musculus, siquidem notauit *Galenus*, nullum musculum moueri, qui idem non sentiat. Nervi autem inseruntur in principium musculi, aut iuxta medium, infra nullum vnquam inferi *Galenus* affirmat. Idem *primo de fracturis* notauit nervum perpetuo nudum, neque vlla carne cinctum, in suas fibras diuisum progredi. Quum autem ingreditur musculi substantiam, non vt stamen in fibras dispensatur, sed in plures ramulosos diuicatus, in morem arbusculæ hinc & inde distribuitur. *Galenus* tamen fibras musculi ex nervo producti tradit, quem natura carpuit, & tanquam porrecta stamina in tenuissima filamēta multipliciter diuisit. In musculo fibrarum vnicum est genus, nempe rectum, nullæ sunt fibræ obliquæ raro transuersæ, earum defectum supplet diuicatio vasorum, & membranz succingentis firma cohesio, & intus penetratio, quamuis *Galenus lib. 12. de vsu partium*, scripserit in musculis vix obliquas & transuersas fibras inueniri, sine rectarum additione, & *lib. 1. admin. Anat. cap. 3.* tradit quosdam musculos simplicem fibrarum naturam habere, nonnullos duplicem, vt pluribus sibi mutuo incumbētibus musculis similes esse videantur, quinetiam fibras longitudine inter se continuas obtinēt. Si quis obiiciat in musculo massetere duplices fibras obliquas reperiri. Respondeo in massetere duplices quidē esse fibras, sed obliquas sibi mutuo incumbentes, & ratione istarum fibrarum duplex constituitur. Sed in musculis abdominis omnes rectas esse, & secundum eorum progressum obliquum ac transuersum, porrectas esse fibras. Nō enim à fibris denominantur musculi, sed à situ obliquo & transuerso. Nam transuersus musculus à transuerso situ dicitur, quem occupat in abdomine, non à fibris quæ sunt rectæ. Ligamentum quod in musculum, seu musculi caput ingreditur, voluit *Galenus* proximè ab offe prodire, non autem à ligamenti circa articulum positæ. At nullum aut rarum extra articulationes extat ligamentum. Ergo nullum musculi caput subintrat. Illud ligamentum quod ab ossenascitur ratione suæ originis insensibile iudicauit *Galenus*. At punctura ligamenti docet esse exquisito sensu præditam: loco ligamenti in musculo nervosum corpus reperitur à capite vsque ad finem diffusum, quod est simile corpus nervosum, à nullo prognatum, quod tendo à tensione vocari debet, tam in capite quàm in fine: ex quo carpinato, & in filamenta disperso fibræ, carnes amplexantes producuntur. Venæ & arteriæ nutritionem & vitam musculo suppeditant. Per venas & arterias efficitur naturale instrumentum, per nervos instrumentum animale redditur: Præterea notabis venas & arterias exteriora musculorum perreptare, nervos per partem tantum internam distribui, vt sint tutiores ab iniuriis externis.

Itaque musculi duæ sunt partes essentielles & propriæ, caro & tendo. Aliæ sunt extraneæ cæteris partibus communes, vt vena, arteria, nervus, membrana. *Galenus* quidem *atriæ parua cap. 30.* duas dumtaxat partes essentielles musculi agnoscit, sed diuersas, carnem, & fibras. Sunt musculi, *inquit*, qui ambiunt omnia ossa, carnes quædam compositæ ex prima & simplici carne, præterea fibris quibus innascuntur, propria enim musculorum substantia his duobus constat, quæ verò ad ipsos vasa pertinent, veluti riuus quidam sunt, qui non eorum substantiam complent, sed iis subministrant, vt in vita permanent.

Cæterum in omni organo perfectio quatuor partium genera obseruantur apud *Galenum cap. 1. lib. 1. de vsu partium*. Primum earum, à quibus tanquam præcipuis primò & per se actio perficitur: Alterum earum sine quibus non fit. Tertium per quas actio melior redditur: Postremum quæ actionem conseruant. Ita in musculis quatuor istæ partium differentię notari debent. *Vasalis* carnem fibrosam pro parte principe ag-

noscit, quia non semper nervi per substantiam musculi disseminantur, sed sæpissimè eorum superficièi leuiter adhærent, quosdam etiam musculos leuiter attingi à nervis videmus. Omnes tamen animali spiritu vigent, qui longius se in omnes partes extenditur, quàm nervi propagatio. *Columbus* contra *Vesaliũ* contendit nullum musculum nervo destitui, alioquin esset immobilis. Multis placet *Vesalii* sententia, de parte musculi principe, quæ his rationibus probatur. Carne deficiente motus aboletur, aut saltem minuitur, vbi illa reperitur, motus voluntarius adest, ex *Aristotele libro secundo de partibus animalium, cap. 8.* Caro est principium verum animalis, atque præcipua fere pars propter quam animal dicitur animal. *Galenus* scribit actionis causam per propriam partis substantiam inueniri. At propria musculi substantia est caro, ex eodem. Ergo caro actionis causa erit in musculo. *Galenus Expositum* reprehendit, qui carnem cuiusque visceris, parenchyma vocabat, quasi pro re leui & parua haberet. Si ipse tanti fecit parenchymata viscerum, vt eis actionum causas adscribat: quidni pari iure musculosa caro, motus causa erit proxima? Vt enim nervus non sentit, sed participatio nervi apud *Galenum lib. 7. de placitis*: ita quoque nervus non movet, sed participatio nervi, nempe caro quæ nihil est aliud quam siccatus sanguis, si villos habet, nullam ex iis firmitatem satis validam obtinet, quæ partem mouendam trahere possit.

Aduersus hanc opinionem obijci potest. Caro quamvis in partes mouendas perueniat, inutilis erit, nisi villis firmetur nervosis & ligamentosis, quibus solis partes attrahit, at illa caret. Caro non est pars princeps musculi, seu pars sine qua actio fieri non potest. Quippe nullam actionem edit, sed tantum usum præstat. Nam villis circumiecta, nervorum & tendinum siccitatem temperat, nervorum robur augeat, spiritus animales suo calore fouet, & ad motum aptiores reddit. Præterea cadenti aut cubanti firmiter molle subterniculum, dum pars contunditur, operimentum penicillis simillimum, cum vulneratur propugnaculum, contra frigus calefacit, contra æstum præbet umbraculum, quæ omnia ex *Timæo Platonis* desumpsit *Galenus*.

Qui præcipuam musculi partem nervi actionis authorem constituit, inde probat: nervo male affecto cessat omnis actio, quippe nervi, auctore *Hippocrate lib. de ossium natura*, flexionem & contractionem corpori exhibent. Cotpus igitur nervosum ac tendinosum actionem reddit perfectiorem ac robustiorem. Venæ, arteriæ, & tunica actionem conservant: Vena etenim sanguinem ad nutritionem distribuit, arteria spiritum vitalem ac nativi caloris custodiam, tunica musculum inuoluit, eiusque substantiam continet, & à vicinis partibus separat, sensumque tactus illi communicat. Hæc est *Vesalii & Galeni* opinio de parte principe musculi, sed multorum opinione vincit, & præstat *Galeni* doctrina.

Ego verò cum *Fabrico ab Aquapendente* partem in musculo præcipuam agnosco tendinosum corpus, quod ita demonstratur. Pars quæ præcipua est actionis causa in quoque organo, duas habere debet qualitates & conditiones. Prima est, vt sit similis, Secunda, vt illi similis in vniuerso corpore nulla reperiat. At in musculo duæ tantum sunt partes, quæ in aliis non reperiuntur, nimirum caro, & tendo, sed caro non potest esse præcipua motionis causa, vt supra dictum est: superest, vt sit tendo; modo pro corpore similari à primo ortu productum sumatur, vt mox talem esse *Tendone* probabitur. Præterea aliz duæ conditiones requiruntur. Prima est, vt pars sit robusta, seu potens mouere & attollere ossa, ob eam causam caro musculosa mollissima & laxissima, ac infirmissima, non potest constitui causa contractionis, vt tendo: Altera conditio est, vt pars illa contractionis causa habilis sit, & apta ad sese contrahendum. At tendo fere corpus illud nervosum potentiam habet ad sese contrahendum, vt videre est in decocto, vel aquâ macerato tendone. Si obijcias vim motoriam habere non posse, nisi ex nervo constitutus fuerit, dicam per influxum & irradiationem vim motuam consequi, vt torpedo manum piscatoris stupefacit, transmissa facultate per rete, & tridentem piscatoris, vt magnes trahit ferum, vt Sol momento totum hemisphærium collustrat.

Musculorum differentiz petuntur à substantia, situ, quantitate, quæ pro ratione dimensionum triplex est, longa, lata, & profunda: à figura, ortu, infertione, partium varietate, & colore. Si substantiam spectes, quidam sunt omnino carnosii, alij membranosi, alij seminervosi: Ex situ quidam dicuntur obliqui, recti, transversi, alij interni, vel externi: Ex quantitate plures notabis differentias, quas non est opus

figillatim percensere, ex figura prout diuersa est, sic variè denominati fuere musculi, Scalenus, Deltoides, Trapezius. Ratione figuræ, quæ vt plurimum rotunda est, siue periphæriam spectes in musculo plano, siue molem in lungo musculo. *Hippocrates lib. de Arte*, definiuit musculum, carnem in orbem circumductam. Ex origine quidam dicuntur enasci ab ossibus, alij à cartilaginibus, alij sunt circa partem mouendam orbiculatim reuoluti, vt sphincteres, alij à tendonibus proficiscuntur, vt lumbricales. Ex varietate partium non contemnenda petitur differentia, quod alij sunt bicipites, alij bisidi ad insertionem. Ex colore quidam rubent, alij candicant, alij liuidi & plübei conspiciuntur, qui color liuidus accidit propter opacam membranæ crassitiem. Denique ab actione eiusque varietate, diuersæ exsurgunt musculorum differentiz, quas ad quatuor præcipuas referre possis. Prima est, quod musculi sunt congeneres, vel antagoniz. Altera est, quod musculorum alij seipsos mouent, Alij alia corpora, vt sphincteres, hoc est, vt inquit *Galenus*, quidam seipsos dumtaxat mouent contracti, vel partem ad suum principium trahunt. Tertia est, quod musculorum actio, vel est simplex & vnica, vel multiplex, vt in Massetere & Trapezio, quod ex varietate fibrarum cognoscitur. Quarra peculiare respicit motus, qui varij sunt, vt Flexores, Extensores. & Rotatores. Sed omnes istæ musculorum differentiz, post cognitam ipsorum historiam facilius intelligentur.

## DE TENDONE.

### C A P. III.



**M**USCULVS quatenus est pars organica, diniditur in tres partes, caput seu musculi exortum, ventrem qua parte tumentior est, & finem, siue aponeurosim, quæ communiter Tendo dicitur, caput debet esse semper immotum, finis verò mobilis, quia inseritur in partem mouendam. Sed caput & finem musculi eiusdem naturæ, nimirum neruosaæ acque tendinosæ, cum *Fabricio ab Aquapendente* sentio, quod priùs fuerat obseruatum ab *Aristotele*, libro tertio de historia animalium, vt supra docui, cap. 3. lib. 1. Id manifestè rationibus & experientiâ demonstratur. *Prima ratio* est, quod sit eadem proprietas Tendinis, qui est in fine musculi, & ligamenti, seu neruosi corporis, quod ab osse in musculum peruenit, vt apparet in bicipite cubiti, in femineuoso, & semimembra-noso tibiae. Nam eadem albedo cum luciditate coniuncta, eadem durities, densitas & læuor, tam in capite, quàm in fine notatur. *Secunda ratio*. Eadem est continuïtas neruosi corporis per totum musculum à principio vsque ad musculi finem, vt in musculis crurum galli gallinaei obseruatur. *Tertia ratio*. Prisci cùm describunt exortum musculi dicunt oriri neruoso exortu, nunquam ligamentali, & finem musculi Tendonem vocant, quem veteres neruum quoque appellarunt. *Quarta ratio*. Nullum ligamentum ex se suscipit sensum, sed ligamenta in musculos potèda sensum habent, quia mouentur, motus autem supponit sensum. Nunc superest probare neruum ligamento non misceri. Quod his rationibus demonstratur. Qui in musculum inseritur neruus adeo exiguus & exilis est, vt non sit verisimile ad Tendonem generandum peruenire. Deinde diligenter inuestigando nunquam potui obseruare neruum ad Tendonem deduci, aut pertingere, sed in fibras insensiles tandem consumi. Neruus mollis cum ligamento duro amicti coire non potest, vel ex illa permissione mouendi facultatem amitteret. Nerueum principium musculi & finis sunt eiusdem naturæ. Atqui neruus non in caput nerueum, sed in carnem, vel medium ventrem musculi inseritur, ergo neque Tendo neruum obtinebit. Cùm igitur musculus ligamentum recipiat, neque neruus ad constituendum Tendonem concurrat, Tendo non resultabit ex ligamento & neruo simul mixtis: Neque Tendo semper in extremo musculi consistit, sed in medio, vel principio, aut per totum corpus. Nusquam legitur apud *Galenum* neruum & ligamentum in principio musculi coire ad caput constituendum. Atqui caput & finis sunt eiusdem naturæ. Quare totus musculus est Tendo, vel ex eo cum carne factus & concorporatus. Neque Tendini conueniunt proprietates, quas *Galenus* assignat, lib. 1. de vsu partium, cap. 17. & lib. 1. de motu musc. cap. 2. quod



quod nimirum sit conflatus ex neruorum & ligamentorum villis per carnem dispersis, rursusque in vnum coeuntibus, ita ut sit mediæ naturæ inter neruum & ligamentum. Adde quod *Veteres Medici & Anatomi*, cum viderent ambas musculi extremitates neruofas esse, ac eiusdem naturæ, modò exortus, modò ob tendones vocabant, quod ex *Galeno* colligitur, lib. 4. *admin. Anat. cap. 9.* vbi mastoideum ex capite procedere, & in clauiculam inferi scribit. Tandem subiungit; præstiterit forsan non fines, sed principia capitaque ipsorum ad clauiculam potrecta nominare: ad caput autem exortus, fines, siquidem illud reuera mouent, verum ob administrationis ordinem, exortus quidem ipsorum fines appellauit, *Anatomicorum* more qui nos præcesserunt, insertiones autem, inferiores ad clauiculam exortus, & eodem libro cap. 6. Musculum complexum ab occipite nasci scribit, notatque parum referre, si dicatur nasci, aut descendere à parte aliqua. Sic *Hippocrates* lib. 2. de *Artic.* Temporalem & masseterem à maxilla oriri tradit, cum tamen in eam desinant.

Vt igitur paucis expediam tendonis naturam: Corpus est omnino simile, simplex sui generis, ex semine vt cæteræ partes productum, ac per musculi longitudinem dispersum, quod iis proprietatibus præditum est, quales non videmus in alia corporis particula. Primò neruum est corpus peculiari substantia præditum, albedinem habet priuatam ac propriam, luciditati splendorique permixtam, tum etiam duritiem, læuorem, densitatem omnino à cæteris distinctam, atque dissimilem. Dicitur oriri tendo ab osse, & in os aliud terminari, ratione motus & dispensationis. Tendonis continuïtas à capite per totum musculum vsque ad finem in cruribus pennatorum manifestè pater, & quod mirum est, subinde per interualla cartilagineus deprehenditur, quin etiam dissectione accurata licebit obseruare fibrarum continuïtatem à capite musculi vsque in finem, in crudo & in cocto musculo. Tendo nudus in principio, & in fine, vel est rotundus, vt in musculo bicipite, vel membranofus, vt in musculis abdominis, ferratis posticis, & membranoso femoris. Quorumdam musculorum tendones, inquit *Galenus*, lati sunt instar membranarum, sed eos à membranis facile est discernere, quia membranæ fibris carent, quæ in tendonibus reperiuntur. Quod si musculi principium & extremum carnosum est, tondo perpetuò in plures fibras diuïsus est, carne coopertus. Tendonem enim, vt inquit *Galenus*, non omnes musculi obtinuerunt: siquidem linguæ, labiorum, ani, vetricæ musculi, Tendonem carent. Quare sic statuit *Galenus*, omnes musculos mouendis ossibus destinatos in tendones maiores, vel minores terminari, qui verò alias partes quàm ossa mouent, raro tendones habere. Quoniam verò musculus ad validiores motus edendos, tendone roboratur, iustissima natura maioribus musculis magnos tendones apposuit, vt instar vestitiis vteretur, minoribus minores dedit. Negabant *Epicurus & Asclepiades* tendinis magnitudinem quidquam ad validas actiones conferre, sed robur & fortitudinem tendinis pendere ab exercitatione & laboris consuetudine: vt qui laboribus validis assuescerent, validos tendones consequerentur, qui verò otiosam vitam degerent, tendones graciliores & imbecilliores obtinerent. Cuius opinionis falsitatem destruit *Galenus*, lib. 2. de *vsu part. cap. 21.* Eleganter *Hippocrates* lib. de *Arte*, musculum describit quæcumque membra carnem in orbem circumdata non habent, quam musculum nominant, *miræ uterque à pueri carnis*, ea omnia cavitatem habent, quidquid enim minime coalluit, siue cute, siue carne tegatur, cauum est: quod dum homo valet, spiritu quidem, dum verò ægrotat, ichore plenum est. Habent itaque brachia eiusmodi carnem, habent & femora, habent & tibia. Ex hoc loco colligitur musculi figuram esse orbicularem, siue seorsum spectetur, siue cum suo congenere & fraterno iunctus, & musculi inania spatia, cavitates, siue ventres habere, qui spiritu pleni sunt in homine sano, ichore repleti in ægrotante, quia carnes ex *Hippocrate*, sunt attractrices ex ventre & extrinsecus, lib. 6. *epidem. miræ tunc in unum & itur.* An potius hic locus *Hipp.* referendus est ad illos musculos in longitudine sua rotundos, qui brachia, femora, & tibia operiunt. Nam de ossibus cauis prius egerat, & ista ossa commemorata sunt exciuita.

## DE MUSCULORVM ACTIONIBVS,

&amp; unde procedant.

CAPVT IV.

**V**T motu ignorato naturam ignorari necesse est, inquit *Aristoteles*, *lib. 7. Physic.* ita si motum musculi nescias, illius naturam profus ignorabis, quæ tota in motu consistit. Est autem motus quædam actio, quæ musculi prior habitus immutatur. Ad eam actionem duæ causæ concurrunt, agens, & patiens. Causa motus efficiens, est anima ab appetitu mota, cui triplex instrumentum famulatur, Cerebrum, nervus, & musculus. Cerebrum imperium excipit, illud nervus defert, musculus obsequitur. Patiens verò est, id quod mouetur, Os scilicet, vel alia quælibet pars corporis, moueri nata. Partes corporis tribus modis mouentur, vel aliquod est mouens seipsum, & non motum ab altero, quale est Cor: vel aliquod est motum ab alio, & mouet aliud, vt musculus. Tertium est motum ab aliquo, & nihil mouet, vt pulmo. Itaque eorum quæ mouentur, quædam per se, alia alterius interuentu mouentur. Rursusque vel locum mutant, vel in eodem loco cidentur.

Musculi suæ motionis principium habent ab anima, & in eodem loco mouentur, quadruplici motus genere, quorum duo sunt per se, contractio dum versus suum caput musculi retrahitur, & contracti conseruatio, qui motus etiam *Tensus* dicitur, de quo postea dicitur: Alia duo sunt per accidens, extensio, & relaxatio, siue decidentia præ grauitate partis, motrice facultate otiante. Tensus autem differt à contractione: Nam multa tenduntur, quæ non contrahuntur: Vt virile membrum tenditur à distensiva facultate, sed non contrahitur, vt musculus: Vermes quidem contrahuntur, sed non tenduntur, musculi tenduntur & contrahuntur. Contractio musculi est, tanquam instrumenti animæ actio, *lib. 1. de motu musc. cap. 7.* Extensio eiusdem instrumenti non quidem actio, sed simpliciter motus, inquit *Galenus*, *lib. 1. de motu musc. cap. 10.* & eiusdem libri cap. vlt. scribit musculos omnes contractionem appetere, quam non possunt assequi, cum propter oppositos in diuersa trahentes musculos, tum propter naturalem offium grauitatem. Ab istis motibus dependet partium motus, qui non tantum loci differentia distinguitur, ante, retro, sursum, deorsum, sed etiam figura partis, quæ sic dicitur.

Figura autem est situs partis in motu. Situs verò vel angularis est, & flexio vocatur, vel non angularis, isque rectus, diciturque extensio, vel obliquus, isque vel lateralis est, vt abductio, & adductio in digitis, vt cum inuersione pronatio, & supinatio in manu.

Motuum tam differentium causam assignare arduum est & difficile. *Galenus lib. de format. fetus cap. 6.* valde anxius est in causa motus musculorum indaganda, tandemque ingenuè fatetur se nescire, quomodo musculi moueantur. Questionis causa. Quod cum infantes & pecora musculorum officia lateant, non videntur apta ad exigendum ab illis operâ, quia motus voluntarius est: Voluntas à cognitione, cognoscendus igitur finis quo mouemur, & motionis instrumentum peculiare. Ergo cum infantibus nihil horum cognitum sit, iure queritur, cur labra moueant potius quam pedes, aut quomodo moueant. *Scaliger exercit. 339.* hunc nodum ira soluit: Voluntas quædam cum electione, vt in homine sapiente, alia ab instinctu, vt infanti recens nato ad legendum lac. Nam cum adoleuerit idem efficiet, si opus habeat, sed cum electione. Id etiam confirmari potest ex *Hipp. lib. 6. Epid. sect. 5. part. 2.* Adinuenit, inquit, Natura sibi accessus, non ex cogitatione, qualia sunt nictare, & ea quibus lingua submisceat, & quæcumque alia eiusmodi. Inerudita natura & non edocta, quæ expediunt efficit. Itaque multæ partium actiones licet instinctu naturæ fiant, nihilominus sunt animales ac voluntariæ. Responderet *Gal.* ad hanc questionem duobus modis: eorum quæ motu voluntario fiunt, alia quidem libera sunt, alia verò affectibus corporis inferuiunt, *lib. 2. de motu musc.* vel omne animal suæ ipsius animæ facultates, & in quos vsus polleant nullo doctore præsentis, *lib. 1. de vsu part. cap. 3.* Existimat *Arist.* *lib. de motu anim. cap. 10.* nostri corporis æconomiam perinde se habere, atq. ciuitatem bonis legibus institutâ, in qua postquæ fœneml ordo constitit, non opus est secretò ducere, quem singulis quæ

geruntur intereffe oporteat, ita fingulæ corporis partes nouerunt, in quos vfus destinata: funt, fua munia fine vilo doctore perficiunt, dente lupus, cornu taurus petit. Vnde, nifi intus monftratum, vt eleganti hiftoria de hædo abvbere capræ extracto, docet *Galenus lib. 6. de locis affectis, cap. 6.* idem confirmat *cap. 3. lib. 1. de vfu parti.* An quemadmodum *Homerus* finxit fua fponfe moueri *Vulcani* instrumenta, ancillas vero illas aureas, ipfumque opificem ex feipfis moueri: ita mufculi conuenientiffima ftrutura præditi virtute quadam ingenita fuum opus peragant? æ auftore *Galenus, lib. 4. de vfu partium, cap. 5.* Sed maior admiratio eft in motu *Mufcarum*, *Papilionum*, & aliorum id genus insectorum. An aliquid mufculis analogum habent? An fpiritu infuente mouentur fine mufculis: quemadmodum nos moueri cenfuit *Aristoteles, lib. de animal. motu.* An fola facultas motrix per irradiationem transfertur? Propter corporis exiguitatem non opus erat mufculis, quia molem corporis auxiffent. At maiora animalia, quia pondus & molem corporis habent, idcirco instrumentis opus habuerunt ad motum. Insectorum vt *Apum* & *Culicis* motus admiratur *Plinius, in magnis fiquidem corporibus, aut certe maioribus facilis officina fequaci materia fuit, in his tam paruis atque tam nullis, qua ratio, quanta vis, quam inextricabilis perfectio?* *Turrigeras Elephantorum* miratur humeros *taurorumque* colla, & truces in fublime iactus, *tigrium* rapinas, *leonum* iubes, cum rerum natura nunquam magis, quam in minimis tota fit. *Diuus Angustinus lib. 1. de duobus animis, cap. 4.* Muscam ratione fui motus, Soli antepônere non dubitauit: fi fortè, inquit ille, quis à me querat, num etiam mufcæ animam huic Soli luci præftare cenferem: Refponderem etiam, nec me terreret, mufca quod parua eft, fed quod viuæ, firmaret. Queritur enim quid illa membratam exigua vegetet, quid huc atque illuc pro naturali appetitu tantillum corpusculum ducat, quid currentes pedes in numerum moueat, quid volantis pennulas muderetur, & vibret.

*His quidam fignis, atque hæc exempla fequuntur,  
Effe apibus partem diuinæ mentis, & haufus  
Ætheris dixerit.*

*Virgil lib.  
Georg.*

Cæterum notabis quorundam mufculorum actiones effe dubias & incertas, vt orbicularis palpebrarum, fi à cantho maiore nafcatur, & reuolutus circa oculum redeat ad punctum, à quo manarat. Motus fphincterum veficæ & podicis, peculiaris eft. Motus mufculi pterygoidei interni, qui intumefcens propellit antroftum maxillam admirabilis eft, vt etiam quadrigeminorum fecundi & tertij motus, dum prolongatur in artibus, ab illis intumefcentibus, motus acceleratorum vrethræ, qui ab alio mufculo nafcuntur, nec contrahuntur agentes, fed magis diftenduntur, vt & labiorum motus funt inexplicabiles, nec linguae volubiles motiones facilius poffunt exponi: Neque motus diaphragmatis caufa certa poteft assignari. Motus mufculorum spinæ, vt & cutis non carent admiratione. Propterea *Galenus* fæpius pollicetur librum de motibus dubiis & obfcuris mufculorum.

## DE MOTU TONICO.

### CAPIT. V.

**M**OTVS verò *Tonicus* dicitur, quando mufculi extenduntur, tensique permanent, quo in ftatu etiam fi immobiles appareant, vtrinque tamen agunt pari contentione. Multa fiquidem citra motum effe videntur eundem locum obtinentia, quæ nihilominus mouentur, *Galen. lib. 1. de Tremore cap. 1.* Etenim aues in aëre fufpenfas eodem loco ftare credimus, cum tamen ipfæ moueantur. Nam fi in eo loco mortuum auis corpus colloces, ftatim pondere fuo in terram decidet. Quare quam immobilitatem effe putas, motus eft ex duobus compofitus, qui corpus in contraria loca poffunt abducere, motusque *Tonicus* nuncupatur, qui etiam in homine ftante, & in medijs figuris tam moderatis, quam extremis manifefte deprehenditur. In erecto corpore mufculos operari, monuit *Hipp. lib. de vlcibus*, dum ftare vlceri noxiū effe fcribit: & alibi, fi in erectum conftiterit vlcus, neque fedendum, neque ambulandum, fed quiefcere & immotum permanere oportet, quia per illos corporis ftatus mufculi laborant, & exten-

duntur: vnde vlcerae parti dolor infligitur. Musculos autem agere in mediis & extremis figuris iam demonstratum est. Nec de moderatis dubitandum, in quibus certum est musculos tensionem quandam sustinere, minorem tamen quam in aliis: quippe ne quidem per somnum musculi cessant ab actione. Quod facile cognoscas, si corpus mortuum in alterutrum latus inclinaueris, quia ne minimo quidem temporis momento in eo statu permanebit, sed supinum aut primum statim fiet, quocumque grauitate sua verget. Idcirco Hippocrates lib. 1. Prognost. in aegris laudat in alterutrum latus facile conuerti, iacere supinum, & dormire aperto ore damnat, quia signum est resolutionis, propter intermissam musculorum actionem. Summam imbecillitatem arguit iactatio corporis in hanc vel illam partem, vt in stomachicis & cardiacis syn- copis accidit, quia tunc musculi, nec breuem tensionem, nec mediam figuram tole- rant, vt in Didone moribunda Virgilius lib. 4. Aeneid. eleganter expressit. Decumbere non posse viuientis modo, sed tanquam mortuum & inanimatum corpus deorsum feri, extremum malum fatetur Hippocrates, lib. 1. Prognost. quod lib. de humoribus, iij. q. 4. summam virium resolutionem appellauit, cessantibus omnibus musculis. Nullus ita- que musculus vnquam sine tensione est, ne quidem cum in mediis figuris consistit.

Dubitatur à nonnullis, si tensi musculi propriè moueantur: Non videtur Galenus, nisi ea tensionis specie, quam Tonicam appellat: hanc difficultatem animaduertit Va- leriola, eamque sic enodat. Cum primum attollimur, vt recti stantesque consistamus, tum musculi extenduntur, & mouentur, at postquam semel tensi esse coeperunt, cor- pusque stat & quiescit, non amplius mouentur, sed tantum à facultate corporis re- curre, sic tensi conferuantur.

## DE MEDIIS, ET EXTREMIS

### Figuris motus.

#### CAPVT VI.

**I**N Hippocrate lib. de articulis, omnes partes fractas & luxatas in fi- guris dolore carentibus manuali operatione pertractare. Propterea Fi- guras dolorificas, & eas quae dolore carent, Medicum scire expedit, quae pro ratione intensae, vel moderatae actionis musculorum duz consti- tuuntur, Media & Extrema. Haec breuis & dolorifica, valde molesta est naturae, quando vno agente musculo conuulso, alter praeter naturam relaxatur. Nam omne viminum naturae inimicum: Illa naturalis & moderata, proptereaque indolens & diuturna.

Vt autem in omnibus articulis Mediam Figuram inuenias, Naturam, Consuetu- dinem, & extremos motus considerabis: ita vt in articulo cubiti ea media sit, quae vocatur angularis, in articulo vero ad genus, quae propior est extensioni. Sic in spina ea quae magis accedit ad flexionem, in articulo carpi, quae exquisitè recta est.


Quod verò natura & consuetudo partis spectanda sit, patet ex Hippocrate lib. de fract. sect. 2. art. 57. Neque cubitus extensus diu haberi potest, quia non est solitus saepe in hoc statu detineri, sed curuatus. Crus verò, quia ambulando & stando in in- ferio rem partem, nunc ex toto, nunc prope ex toto intendi secundum naturam, & ferre etiam reliquum corpus consuevit, idcirco sine molestia extenditur, cum opus est, quia saepius in lecto hoc modo continetur figuratum. Addit Galenus, quod prius- quam cruribus utamur, in infantulis, fasciis sic extensa formantur.

Ceterum notari debet, quod in media figura duplex inest musculis constitutio. Altera quidem, quae neuter oppositorum musculorum trahit: altera verò, in qua si- militer vtriusque agunt, prior existit musculis quiescentibus, altera verò, cum neque extendere, neque flexere membrum alicui permittimus, ne si maximam quidem vim afferas. Fir autem haec oppositis musculis actionem tonicam habentibus. Distingu- dum igitur de media figura: quae est in quiete, indolens percipitur, quae verò sic cum aequali tensione musculorum, est valde dolorifica.

QVIBVS NOTIS IN MUSCULO ACTIONIS

modus, & propria natura dignoscantur.

C A P V T VII.

 Vbi Myologiam exacte scire desiderat, tamque ad artis opera teuocare, in singulis musculis actionis modum dignoscere debet. Nam, ut inquit *Galenus lib. 1. admin. Anat. cap. 3.* Actionis musculorum cognitio imprimis necessaria est, ut pernoscas functionem abolitam in magnis vulneribus, vbi musculus totus ex transuerso fuerit dissectus, quin etiam vt exquisitè manu cures: quippe nonnullorum munus tam est proprium, vt tota particula reddatur inutilis, si actione sua priuetur, quidam verò improptiis præfationibus. Præstat etiam pro fibrarum ductu ipsorum diuisionem moliri. Nam transuersæ sectiones quæ sunt ad angulos rectos, actionis dissoluunt.

Ex intellectu musculorum actione scire licet, congenerum musculorum qui in oppositis partibus sunt pares, numero, magnitudine, robore, & eodem tempore agunt vno resoluti, alterum conuelli: Propterea scribit *Hippocrates lib. de vulneribus capitis*, dextro temporali musculo vulnerato, sinistram conuelli. Insuper musculorum actio docet, motuum qui sibi inuicem succedunt, altero percunte alterum simul perire, non tam proprio actionis vitio, quàm subleui agendi vicissitudine, dum vnus conuellitur, alter relaxatur, ex *Galeni lib. 1. de motu muscul. cap. 4.*

Ad inuestigandum actionis modum in musculo, situm, & finem obseruabis. Totius musculi situs actionis modum indicat, itaut recti musculi rectum & simplicem motum edant, obliqui composito & obliquo motui præficiantur, qui verò vel totis suis corporibus, aut etiam tendonibus circa quidpiam obuoluuntur, circulares potius quàm rectum motum efficiunt.

Inuenio capite facillè tendo, & proinde actio musculi deprehenditur. Caput autem illic assignatur, vbi nernus inseritur. Tendo verò directè oppositus est capiti, si musculus vnicam edat actionem, vel si multiplicem pro varietate exortuum, varias obtinebit insertiones, id est, capita & tendones. Diuersitatem actionum cognosces ex vario fibrarum ductu, prout ad diuersos exortus & insertiones directè feruntur, vt in Trapezio musculo spectatur. At dices, musculus obliquus descendens duas edat actiones, cùm tamen simplici fibrarum genere sit præditus, quæ ad lineam cauidam producantur vsque ad ossa pubis. Sed compressio abdominis & motus compagis ossium pñhis eodem modo, atque eodem tempore non perficiuntur.

*Galenus cap. ult. lib. 4. admin. Anat.* aliam methodum docet, quâ possis cuiusque musculi obscuras actiones examinare. In animante mortuo recensitis adhuc molli- busque à morte ligamentis articularum, & musculis, reliquos alios auferes, iis dumtaxat, qui inter se sunt oppositi relictis, quorum motus exploreare volueris. Verùm magni musculi etiam mortuo animante teusi, functiones suas citra aliorum præcisionem indicare possunt, parui nonnisi multis detractis. Notatione dignum est, quod scribit *Galenus, de motu muscul.* Omnes musculos dum agunt cutuos, dum quiescunt erectos fieri, exceptis intercostalibus & abdominis musculis, qui contracti introcedunt, curuati relaxantur. Hoc etiam notandum de actione musculorum, quod non tantùm trahunt ossa quibus terminantur, sed etiam quæ cum ipsis quouis modo communicant. *lib. 13. de vasa part. cap. ult.*

Quoniam musculorum natio tam magna est, vt etiam interdum pro dissectantis imperitiâ multiplicetur: Regulam statuere oportet, quæ vnusquisque muscolum perfectum discernere queat. Eam pollicitus fuerat *Fallopium in obseruat.* quam tamen non reliquit. Hanc profert *Sylvius ex Galeni doctrina* de promptam. Muscolum circumseribit actio vniformis, & venter à vicinis partibus facillè separabilis, etiam cum multis vel capitibus, vel tendonibus: verùm si tendines in diuersa specie ossa inserantur, dissectionum periri plarium musculorum numero recensent. Huius præcepti Myo- logici exempla leges apud *Galenum lib. 1. admin. Anat. cap. 4.* vbi de vnitæ & pect-

ctione musculi differit. Idem *lib. de dissect. muscularum*, ut demonstraret mastoideum esse duplicem, tres profert rationes. Non sunt exactè vniti, eorum diuersa est insertio & origo, neque directè in eundem locum feruntur. Musculum vnicum & singularem etiam in exortu, & sine diuisum declarat actio vniiformis, quæ fit quando tendines simul mixti & coalescentes, in eandem & consimilem partem producuntur, ut biceps musculus in exortu suo filius, sed in fine iunctus, vnico tendine in eandem partem inseritur. Flexores duo digitorum in quatuor tendines dirempti sunt, sed in diuersa digitorum ossa tendines inferuntur, sicque pro duobus tantum musculis habentur. Flexorem pollicis, quia tendones duos habet in ossa specie diuersa insertos, possis duplicem vel vnicum dicere, modo binos eius tendones exprimas. *Galenus lib. 1. admin. Anat. cap. 6.* In gastrocnimio gemelli duo, solus sunt origine distincti, & vnico tendinem robustum indiuiduum efformant calcaneo implantatum: & quia ventres habent penitus diuissos; idcirco tres ab *Anatomicis* numerantur musculi. Distincti sunt musculi, qui distinctis membranis inuoluuntur, ideoque plures aut simplices erunt musculi, prout pluribus, vel vna membrana inter se iuncti aut diuisi erunt.

Dissecandi musculos modum & artificium paucis verbis eleganter explicat *Syllabus in Isagoge Anatomica*. Musculos in quibus est operosa magis Anatomica administratio, separare aggredieris, nunc à ventre, vbi linea quædam alba ex adipè interiecto diuisionis index, nunc à capite, nunc ab aponeurosi, seu prout clariorem & faciliorem diuisionem præsumperis, & superiores subiectis priores, & vnum à capite, alterum à fine secabis. Sed cum plures sibi mutuo incumbunt, quos nequeas administrare, nisi prioribus administratis, illos in exortu suo penitus rescabis, & inferiorem relinques intactam. Si multus adeps circumfusul musculi propriam substantiam & figuram, atque diuisionem abscondat, illum detrahes, & musculum perite deterges, ac expurgabis. Quod si membrana communis alicuius partis musculis arde circumtexta musculorum inter se diuisionem occultet, hanc perite detrahes, ut discrimina musculorum facilius internoscas. Veruntamen musculorum discrimina & locos, in quibus facilius separantur, prout sæpius obseruavi, diligenter annotavi, nec aberrabis, si mea vtaris manu ductione, tanquam *Ariadnes* filo in *Myntame* fideliter expressa. Cum de eadem materia veritas sit vnica & eadem, atque de iisdem rebus eadem sint dicenda, teste *Socrate*, *muta tibi formæ*, in hac Myologia nolui musculorum historiam aliis verbis describere, quam quibus vsus sum in *Encheiridio Anatomico*, quam tamen ampliorem descripsi. Id monere volui, ne quis istam repetitionem damnaret, atque improbaret.

## MVSCVLI FRONTALÈS. SIVE MVSCVLI Supercilliorum.

### CAPVT VIII.



**R**ONTIS Musculi duo sunt, in medio aliquantulum disuncti, qui à supernis partibus ossis frontalis, vbi capilli desinunt exorti, infernè descendunt ad supercilia. Istos musculos superciliis attollendis dicatos puto, non ad frontis corrugationem, quæ tristis & indecens est homini animali risibili. Nec ab ea opinione recedit *Galenus*, libro nono de vsu partium, cum scribit eum frontis & musculum, tam stricte coalescere, ut amborum motus sit vnicus, qui supercilia attollit. Veruntamen *lib. de libris propriis* notat se demonstrasse motus supercilliorum à quibusdam hætenus traditis falsos esse. Sed facile est demonstrare musculorum ope moueri supercilia. Nam palpitare scripsit *Galenus*, deinde contorquentur & inflectuntur in morbis, quod est lethale apud *Hippocratem*. At solus musculus, & palpitationem, & conuulsionem patitur. *Nicolaus Massa* in sua *Anatome*, monet musculos frontales inferuire mouendis superciliis, quoniam eorum villi feruntur ad supercilia. Idem affirmat *Carpus* in *Isagoge*. Ideoque musculi frontales, non sunt transuersum incidendi, ne procidant supercilia,

quod prius monuerat *Anicetas*, *Fem 3. tract. 4. cap. de exituris aperendis*. Idem sentire videtur *Valerda*, quod vno musculo affecto resoluta, vel transuersim vulnerato, non potest attolli palpebra. Præter istum musculum attolentem, alter notatus fuit à *Velchero* *Caster in observationibus Anatomicis*, deprimendo, corrugando, & retrahendo versus nates supercilio destinatus. Quibus sunt subtrumida supercilia satis erassus apparet, in aliis tenuior est. Oritur lato, & tenui principio à cantho maiore, vbi lachrymalia puncta sunt, & ascendens versus nasi radicem, crassiorque redditus versus supercilia, eorundem ductum comitatur reflexus, & circa mediam regionem superciliorum videtur terminari. Vfus huius musculi cum suo pari oculos exquisitè ocludere ex eorum contractione supercilia intumescunt, corrugatur intercapedo, & simul deorsum obliquè versus nares trahuntur, & inferna palpebra, leuiter superiori adducitur. Istum musculum nondum vidi, neque extare puto, & portione esse puto orbicularis, de quo *Fabricius ab Aquapendente sub finem lib. de Oculo*. Musculum superciliorum orbicularem inflat annuli formatum proponit, qui deprimat supercillum, & attollit inferiorem palpebram. Hunc non inuenies ad eum usum destinatum, nisi constituas musculum orbicularem vtriq; palpebræ dicatum, educi ab ora, siue margine orbitæ. Alterum verò orbicularem superciliis additum cum esse statuas, qui rotius orbitæ circuitum externum latitudine pollicis circumdet, quem demonstro conuenire vtriq; palpebræ: Cum membrana carnosissima vtriq; palpebræ subtensa sit, continuatio maioris orbicularis. Certum est supercilia deprimi, corrugari, & versus nares retrahi, sed cum in eo motu vnum sine altero moueri nequeat, vt in eleuatione superciliorum simul mouentur: Probabile est musculos frontales motus istos perficere, qua enim parte adhærescunt vtriusque radici narium, obliquis fibris breuibus ad supercilia porrectis prædixi, supercilia deorsum trahunt, & corrugant, versus nares, latissima verò portione supra totam frontem expansa fibris rectis ad supercilia descendantibus conspersi, supercilia attollunt.

## MUSCVLI OCCIPITALES.

### CAPVT IX.

**M**USCVLI frontalibus parte superna occurrunt duo *Musculi Occipitales*, qui à medio ferme occipitio carni lateraliter emergunt, & sursum ascendentes latissimo & membranoso tendine vsque ad aures, & musculos frontis excurant. Si multum carnosii fuerint cutim frontis rotiusque capitis ad posteriora retrahunt, quam nonnulli manifestè mouent, vt de se, & aliis testatur *Columbus*. Sunt qui totam cæsiem capite immoto, quantum capilli occupant, deponunt ad frontem, reuocantque eum volunt, inquit *Diuus Augustinus*, *lib. 14 de Civitate Dei, cap. 24*.

## MUSCVLI PALPEBRARVM.

### CAPVT X.

**P**ALPEBRÆ duæ tegunt & claudunt oculum, quarum Superior manifestè, Inferior obscurè mouetur. Superiori palpebram attollit & erigit *Musculus gracilis & oblongus*, qui intra orbitam continetur, ab inferiore parte, seu cono orbitæ eductus, & musculo attolenti oculum superiectus ad sursum palpebræ recta protenditur.

Memineris leuatorem proprium palpebræ, sui tendonis portione impertiri tendoni musculi trocleatoris, quod facilius innotescit discissa orbita, alioquin nisi maximam adhibeas diligentiam oculos effugit, vel laceratur inopinato.



*Recentiores Anatomia duos musculos orbiculares palpebras claudentes & constringentes constituunt, quorum alter maior & latus, alter minor & citius ducitur.*

*Orbicularis latus* totam oculi orbitam externam duorum digitorum latitudine circumdat, vtrique palpebrae subtenfus: dicitur enasci à magno cantho, & sub inferiore palpebra ad minorem angulum progressus, & per superiorem palpebram reuolutus, in idem punctum à quo recesserat desinit, dum agit eodem tempore inferiorem palpebram sursum, superiorem deorsum trahit, quod non potest præstare, nisi dicatur enasci à maiori cantho affixus circumferentiæ orbitæ totius, vt instar sphincteris constrictus palpebras adducat, & inter se committat.

Ego verò *hunc musculum orbicularem* non simplicem & vnicum facio, sed *Geminum*, vnicuique palpebræ suum attribuo. Nam obseruavi in cynico spasio faciei superiorem palpebram naturaliter moueri, immota inferiore, ac veluti reuulsa, ita vt dimidio clausus appareret oculus, quamuis moueri queat ab interiore musculo. Adde quod nervos distinctos, & à diuersis locis accipit. Siquidem inferior portio orbicularis musculi, nervum habet ab illo, qui egreditur per foramen infernæ orbitæ, superior portio nervulum accipit, ab eo motorio, qui per foramen supernæ orbitæ erumpit. At dicit aliquis fibræ orbiculares, vt in sphinctere musculo, motum orbicularis huius musculi manifeste demonstrent, quia secundum ductum fibrarum editur actio musculi. Ideoque quamuis duplex sit musculus, tamen vterque à maiore cantho oculi enasceatur, & quilibet suam palpebram cui subtenfus est, trahet versus maiorem angulum.

*Ciliaris musculus* cilium vtriusque palpebræ orbiculatim eingit, vt palpebras inter se exquisitè claudat, cartilaginis tarsi latitudinem non excedit. Cæterum tres erunt in palpebris musculi orbiculares, si constituamus palpebrarum musculum orbicularem solis palpebris subterni & educi ab ora orbitæ. Alterum à me propositum pro orbiculari totam orbitam extrinsecus ambientem, supercilium deprimere, cum inferioris palpebræ eleuatione. Adde ciliarem musculum, tres muscoli orbiculares vtramque palpebram circumdabunt, vt contra impetum occurrentium lenius, aut arctius constringantur, sic leniter claudentur palpebræ à ciliari, arctius ab orbiculari primo, qui dicitur Palpebralis, vehementius per constrictiorem & adductionem maiorem palpebrarum ad indicem, cum depressione superciliorum ab orbiculari secundo, qui superciliaris appellatur.

## MUSCULI OCULI.

### CAPUT XI.



**C**VLOS movent *sex Musculi*, quatuor *Recti*, & *Obliqui* duo. *Recti* ab operatione; elegantissima nomina sortiuntur.

*Primus* enim supra globum oculi, *Attollens*, siue *Superbus* dicitur. *Secundus* inferius priori oppositus *Deprimens*, siue *Humilis*. *Tertius* ad maiorem canthum *Adducens*, siue *Bibitorius*. *Quartus* ad minorem canthum *Abducens*, siue *Indignatorius*. Duo *Obliqui*, circumagentes oculum *Amatores* appellantur, quod sint in amore duces: inepta sine ratione, cùm ipsa oculorum conuersio ridicula & deformis, vultus venustatem minuat, ac proinde amorem auertrat.

*Omnes Recti* oriuntur à cono interioris orbitæ, seu ab ambitu osseo foraminis nervi optici: & adipe multo obuoluti ac circumfusi, larâ & tenui aponeurosi corneæ tenaciter adhærente, sub coniunctiva traducti, ad nigrum oculi seu portiuem corneæ pellucidam, perveniunt.

Alter ex obliquis *Superior seu Maior*, siue *Trocleator* emanat ab osse sphenoidis intra orbitam, iuxta foramen nervi optici, & secundum tabulam, seu squamam ossis ethmoidis ad superiorem sedem maioris anguli ascendens, in *Chordam gracilem* desinit, quæ in *transversa* illic posita *Cartilagine inuicem* ossea, veluti habena in annulo reflectitur, vel tanquam funis ductarius per trochleam contorqueitur, tandemque in latus corneæ supernæ obliquè inseritur, at in bobus totus est carnosus, atque

caret isto tendine, sed in aponeurosim definit, quæ in orbem, siue globum oculi expanditur. Tendo iste inclusus est ligamento exili, neruoso, rotundo instar vaginæ, vt sistat oculum, eiusque reuolutionem definiat, ne tres illi musculi *Atroliens*, *Deprimens*, & *Indignatorius* simul trahentes, oculum distorqueant, vel ad minorem angulum reuellant, ac reuoluant. Notatione dignum, quod huius musculi aponeurosis, siue tendo traducitur sub aponeurosi musculi oculum attollentis, vt ab eo musculo tanquam clauo sistatur insertio musculi obliqui maioris.

Alter *inferior*, seu *minor obliquus*, ab inferna ac prope externa parte orbitæ super eam rimam, quæ duo ossa maxillæ iungit enatus, ad externum angulum oblique procedit, ibique oculum transuersim amplexatus, alterius obliqui tendini superiora versus ferme occurrit. Ideoque sub ea aponeurosi musculi versus minorem angulum trahentis traducitur, vt ambotum musculorum obliquorum aponeuroses inuicem coëant.

Ego verò censerem musculos dictos communiter *obliquos* in alium vsum constructos fuisse, quàm ad oculorum conuersionem. *Trochlearis* enim *musculus*, nullo modo est oblique situs, vt alter minimus. Ille enim per trochlearem cartilaginem traductus, trahit, sistitque oculum versus maiorem canthum, vt cælum intueri possimus, & legere, & obiectum aliquod fixis oculis diu contemplari. Propterea motiones oculorum versus nares sunt frequentiores. Hunc etiam motum adiuuat *obliquus minor*, à cantho maiore externe prodiens, & circa globum oculi transuersim reuolutus, papillam siue nigrum oculi versus nares retrahit. Affectus musculorum oculi est duplex. *quiescens* & *inertis*. Strabismus est oculi musculorum non omnium, sed aliquorum resolutio, ob quam causam oculi, vel sursum vel deorsum, vel in latera nutare coguntur. *inertis* est dispositio à generatione prodiens, qua instabiles sunt oculi, ac semper mouentur tremulo motu, ex *Galeno* in *definit. Medicis*. Contra immobiles redduntur oculi in affectu, quem *mê* vocat *Hippocrates*, si neruus secundæ coniugationis affectus fuerit.

## MUSCULI LABIORVM.

### CAPVT XII.



ADMIRABILES sunt labiorum motus, dum introcedunt, vel intumescunt, aut constringuntur, qui à propria labiorum substantia carnosâ & musculoſa dependent: sed ad vulgares omnes motus labiorum perficiendos *tredecim musculos* inuenio, quorum octo sunt *proprij*, quinque alij labijs & buccis *communes*.

Ex *proprijis*, qui *superius labrum sursum trahit*, à cauo maxillæ infra os malarum exortus, oblique descendit ad latus labij superioris. *Deorsum mouetur à musculo*, qui à media maxilla inferiore in idem labium defertur.

Labrum inferius *sursum trahitur à musculo*, qui medius consistit inter Leuatorem labij superioris, & Zygomatium: hic ab inferna parte ossis malarum eductus in labrum inferius definit, sub Zygomatij insertionem. *Deorsum mouetur à musculo*, qui à mento in medium labium inferitur.

Communium musculorum, primus *Zygomatius* dicitur, carnes, gracilis, & rotundus à Zygomate prodiens, oblique per medias genas incedit, & in commissurâ vtriusque labij terminatus, vtrumque labrum ad latera trahit.

Huic venit adiutor alter male *Buccinator* dictus, quasi ad tubarum inflationem conferret, sed in ea actione laxantur musculi, quia ampliores redduntur cohibito spiritu intra oris spatium, clausis & constrictis labijs, spiritus autem violenter pellitur à Pulmonibus, eliditur à lingua ad inflationem & modulationem tubarum. Rectius à dictione Latina *Plauti*, *Bucca* nominabitur, quia buccas agit, dum cibum huc & illuc propellit, vt à dentibus atteratur. Oritur à summis gingiuis vtriusque maxillæ, iuxta vltimos molares, & in vtrumque labrum definit.

*Musculus orbicularis* labiorum propriam substantiam constituens, non tantum ratione fibrarum, quæ orbiculares sunt, verum etiam carnis colore qui purpureus est,

discernitur. In hoc musculo *fibras internas & externas* obseruat *Oribasius*, quas nondum vidi. *Ab externis* labia explicari, seu extrorsum verti, *ab internis* complicari, seu intus retrahi voluit. *Musculus iste circularis* quodammodo fungosus est, ita vt inaniri & intumescere possit: illius colorem diligenter obseruandum esse in morbis notauit *Hippocrates*.

## MUSCVLI NASI.

### CAP. XIII.



E quis putet nares constringi & dilatari per spiritum commeanem: distorqueti pet musculos externos, habent nares *musculos proprios, & communes*.

*Communis* unicus est, nempe portio superna orbicularis labia cingentis, quæ deprimit nasum, cùm labium superius deorsum retrahitur.

Proprij sunt sex, quatuor externi, & duo interni.

Erigunt nares *duo muscoli*, vtrimque vnus ab intercilio iuxta foramen lacrymale natus, ipsique ossi attensus ad pinnas narium deferitur, eorum motus facile deprehenditur, dum crispatur nasus.

In nasutis inuenio *duos alios externos, vtrimque vnus*, qui alas narium dilant sine eleuatione nasi, figuram myrthini folij æmulantur, & ortum ducunt ab osse maxillæ superioris iuxta pinnas, & toti cartilagini superiecti, desinunt in pyramem, nã sive rotunditatem.

Intra nares sub tunica succingente reconditus est, *paruus videlicet musculus membranaceus*, qui ab ossis nasi extremitate profliciens in alas internè infertur, quem *Carpus comment.* in *Alundinum* pluribus adstruit, & demonstrat.

## MUSCVLI AVRIS EXTERNÆ & Internæ.

### CAP. XIV.



*Auris* musculi sunt *communes, & proprii*.

*Communes tres* inuenio, nempe *portionem musculi frontalis* supra crotaphitam ad aurem producti. *Portionem musculi cutanei* supra parotidas ad aurem ascendentes, *portionem musculi occipitalis* eò protensis.

*Proprij vnici* existit sub ligamento auri latitans, à mammillari processu nascitur, & in radicem auri infigitur. Hæc massa carnea sæpius in duas aut tres particulas secatur.

Auris interna suos habet musculos, qui ab *Anatomicis Gemini* constituuntur in malleolum desinentes, ad tympani securitatem: vt in motibus vehementioribus æris, fluxu nimirum & refluxu ruptionis periculum euitaret. Horum *alter externum meatus auditorij partem superiorem occupat*, & tendine neruo, tympanum internè penetrans, malleoli cervici affigitur: Tympani introcessionem sistit, & moderatur, atque eadem opera stapedem retrahit ad fenestræ ovalis apertionem. *Alter internus, & in concha latitans* tendine gracili in elatiorem malleoli apophysin inferitur, vt concitato ære interno tympanum retineat, eiusque fluxum dehoiat. Fuit autem munus cohibendi motum malleoli, musculis voluntariis instrumentis commissum, non ligamenti eodem tenote semper agentibus, quia vt variæ sunt æris ad membranam impulsiones, sic cohibitio, ac resistencia motus mallei varia esse debuit, ex *Eustachio*. Alij fatentur quidem & admittunt duos auri musculos, sed alium extrinsecus collocant in poto auditorio, qui membranam tympani retrahit, alterum intra concham constituunt malleolo affixum.

In brutis auri internæ musculus euidentior est quàm in homine, quem ea parte quæ est versus occiput inuestigabis, detracta superiore lamina labyrinthi.

## MUSCVLI MAXILLÆ INFERIORIS.

## CAPVT XV.



MAXILLA inferior mouetur sursum à Temporalis, & Pterygoides internus.

Temporalis, siue Crotaphita laro & carneo principio oritur à tota temporum cavitare, sensimque angustior euadens, & sub osse iugali delatus neruo & validissimo tendine, in maxillæ coronam inferitur. Eius fibræ à circumferentia ad centrum feruntur, quæ Medicis acutæ sunt obseruandæ, ne dum huius partis vulnera dilatant, & abcessus fecerint, fibras transuersim incidant, quibus dissectis musculi actio viraque aboletur. Notanda etiam admirabilis sympathia Crotaphitæ musculi cum oculo, propter communione nervi oculum mouentis, ita ut læso temporali oculus lædatur, & contra, auctore Columbus. Quod prius animaduertit Aristoteles, lib. de sensu & sensib. Cum aut, ex vulnere temporum ortam esse excitatem. Multa sunt adhuc notanda in musculo temporali, quæ apud Arantium & Laurentium inuenies. Tanta est huius musculi dignitas apud Hippocratem, ut ex eo læso & vulnerato multa succedant symptomata perniciofa, lib. 2. de Articulis artic. 20. Temporalis musculus, si læsa inferiore maxilla distendatur, aut loco mouetur, rorporem ac delirium excitat, eiusdem libri scilicet. 4. vulnera in Temporalem musculum incidentia sunt lethalia, vomitum ac conuulsionem facientia: & in Cæcis, quibuscumque tempora præciduntur, conuulsionem è diuerso partis præcisæ incurrunt: Rarissimum est, si quando natura hos geminavit musculos, & tamen obseruatum à Nicolao Massa.

Pterygoides internus à cauo apophyseos pterygoidis, ad angulum maxillæ inferioris internè definit. Masseter internus dicitur à Galeno, lib. 4. adu. Anatom. cap. 4. & lib. de diff. muscularum, c. 6.

Tertius attondens maxillam masseter sic dictus ab Hippocrate lib. de art. est in ortu Biceps, cuius caput alterum à zygomate oritur, alterum infra zygoma. Vterque diuersis fibris in chiasmum sese interfecantibus donatus, in angulum maxillæ externè inferitur. Ratione fibrarum maxillam circumagere, id est, antorsum & retrorsum ducere creditur, & ad latera.

Deorsum mouent maxillam duo muscoli, Digastricus, & musculus latus.

Digastricus gracilis & oblongus, initio sineque carnosus, in medio neruosus ab apophyse styloide, interdum à mammillari enatus, in mentum sub maxillæ flexura inferitur: & quoniam à supernis partibus oritur circa styloceratoidem reflectitur, ut maxillam deorsum traheret, & ne dum agit nimium introcederet, natura ligamentum à styloide vsque ad angulum maxillæ infernæ produxit, cui attectus est digastricus.

Musculus latus oritur à superiore parte sterni, clauicula, & acromio, & inferitur in basim maxillæ inferioris, collum, totamque faciem obuoluens. Hunc veteribus Anatomicis ignotum, primus Galenus obseruauit, & postea tracheus vocauit, quem stylus capitis equitantum similem facit, si tantum eius aures, quantum pileolo tegitur. Hunc etiam Theophilus Protospatarius comparat muliebri velo, quod posteriores mulieres appellant. Notauit Galenus, lib. de dissectione muscularum, hunc musculum in iis qui spasmo corripiendi sunt, primum omnium intendi, & qui cynici vocantur spasmi, huius præcipue musculi affectiones sunt. An id verum de conuulsione Cerebri proropathica? An de ea, quæ fit per sympathiam Cerebri cum inferiore ventre, in quo serum acre stabulatur, cuius ad Cerebrum propagatio facta secundum nervos sextæ coniugationis, qui distribuuntur in musculos illos latus, ibi futura ac imminens conuulsio rudimenta primum elucent in hoc musculo lato, qui totam faciem obuoluit iudicio Galeni, sed improprie cynicus spasmus dicitur, cum sit ista conuulsio ex paralyti alterius lateris resoluti, propterea pars sana conuellitur, ubi retrahitur ex acutissi disoluta, æque remedia non parti retractæ, sed resolutæ admoueri debent. An quemadmodum in vulcribus capitis partes oppositæ vulncri res-

difcernitur. In hoc musculo *fibras internas & externas* obferuat *Oribafius*, quas nondum vidi. *Ab externis labia explicari*, feu extorfum verti, *ab internis complicari*, feu intus retrahi voluit. *Musculus ifte circularis* quodammodo fungofus eft, itavt inaniri & intumefcere poffit: illius colorem diligenter obferuandum eſſe in morbis notauit *Hippocrates*.

## M V S C V L I N A S I.

### C A P. XIII.



E quis putet nares conſtringi & dilatari per ſpiritum comitante: diſtorqueri per mufculos externos, habent nares *mufculos proprios, & communes*.

*Communis vnicus eſt*, nempe portio ſuperna orbicularis labia cingentis, quæ deprimat naſum, cum labium ſuperius deorfum trahitur.

*Proprij ſunt ſex, quatuor externi, & duo interni.*

Erigunt nares *duo mufculi*, vtrumque vnus ab intercilio iuxta foramen lacrymale natus, ipſique offi attentus ad pinnas narium deferretur, eorum motus facile deprehenditur, dum criſpatur naſus.

In naſutis inuenio *duos alios externos, vtrimque vnum*, qui alas narium dilatant ſine eleuatione naſi, figuram myrthini folij æmulantur, & ortum ducunt ab offe maxillæ ſuperioris iuxta pinnas, & toti cartilagini ſuperiecti, deſcunt in pyrulam, naſive rotunditatem.

Intra nares ſub tunica ſuceingente reconditus eſt, *paruus videlicet mufculus membranoſus*, qui ab offe naſi extremitate proſiliens in alas internè inferitur, quem *Carpus comment. in Mundinum* pluribus adſtruit, & demonſtrat.

## M V S C V L I A V R I S E X T E R N Æ & Interna.

### C A P. XIV.



*Auris mufculi ſunt communes, & proprij.*

*Communes tres inuenio*, nempe *portionem mufculi frontalis* ſupra crotaphitam ad aurem producti. *Portionem mufculi cutanei* ſupra parotidas ad aurem aſcendentis, *portionem mufculi occipitalis* eò protenſi.

*Proprij vnique exiſtis* ſub ligamento auris latitans, à mamillari proceſſu naſcitur, & in radicem auris inſigitur. Hæc maſſa carnea ſæpius in duas aut tres particulas ſecat.

Auris interna ſuos habet mufculos, qui ab *Anatomicis Gemini* conſtituuntur in malleolum deſcendentes, ad tympani ſecuritatē: vt in motibus vehementioribus aëris, fluxu nimirum & reſluxu ruptionis periculum cuitaret. Horum *aliet externum meatus auditorij partem ſuperiorem occupat*, & tendine nerueo, tympanum internè penetrans, malleoli ceruici aſſigitur: Tympani introceſſionem ſilit, & moderatur, atque eadem opera ſtapedem retrahit ad fenestræ ovalis apertionem. *Aliet internus, & in concha latitans* tendine gracili in elatiorem malleoli apophyſum inferitur, vt concitato aëre interno tympanum retineat, euſque fluxum definiat. Fuit autem munus cohibendi motum malleoli, mufculis voluntariis instrumentis commiſſum, non ligamenti eodem tenore ſemper agentibus, quia vt variz ſunt aëris ad membranam impuſſiones, ſic cohibitiō, ac reſiſtentiā motus mallei varia eſſe debuit, ex *Enſtacio*. Alij ſatentur quidem & admittunt duos auris mufculos, ſed aliom extrinſecus collocant in poro auditorio, qui membranam tympani retrahit, alterum intra concham conſtituunt malleolo aſſixum.

In brutis auris internæ mufculus euidentior eſt quàm in homine, quem ea parte quæ eſt verſus occiput inueſtigabis, detracta ſuperiore lamina labyrinthi.

## MUSCVLI MAXILLÆ INFERIORIS.

## CAPVT XV.

**M**AXILLA inferior mouetur sursum à Temporalis, & Pterygoideis interno.

Temporalis, siue Crotaphita lato & carneo principio oritur à tota temporum cavitare, sensimque angustior euadens, & sub osse iugali delatus neruo & validissimo tendine, in maxillæ coronam inferitur. Eius fibræ à circumferentia ad centrum feruntur, quæ Medicis accuratè sunt obseruandæ, ne dum huius partis vulnera dilatant, & abcessus secant, fibras transmissim incident, quibus dissectis musculi actio vitæque aboletur. Notanda etiam admirabilis sympathia Crotaphitæ musculi cum oculo, propter communionem nerui oculum mouentis, itaut laeso temporali oculus lædatur, & contrà, auctore Colombo. Quod prius animaduertenter Aristoteles, lib. de sensu & sensu. Cum ait, ex vulnere temporum ortam esse cæcitatem. Multa sunt adhuc notanda in musculo temporalis, quæ apud Arantium & Laurentium inuenies. Tanta est huius musculi dignitas apud Hippocratem, vt ex eo laeso & vulnerato multa succedant symptomata perniciofa, lib. 2. de Articulis arit. 20. Temporalis musculus, si læsa inferiore maxilla distendatur, aut loco mouetur, torporem ac delirium excitat, eiusdem libri sect. 4. vulnera in Temporalem musculum incidentia sunt lethalia, vomitum ac conuulsionem facientia: & in Coacis, quibuscumque tempora præciduntur, conuulsionem è diuerso partis præcise incidunt: Rarissimum est, si quando natura hos geminari musculos, & tamen obseruatum à Nicolao Massa.

Pterygoideus internus à cauo apophyseus pterygoidis, ad angulum maxillæ inferioris internè definit. Masseter internus dicitur à Galeno, lib. 4. ad m. Anat. cap. 4. & lib. de diff. muscularum, c. 6.

Tertius atrobens maxillam masseter sic dictus ab Hippocrate lib. de art. est in ortu Biceps, cuius caput alterum à zygomate oritur, alterum infra zygoma. Vterque diuersis fibris in chyalinum sese intersecantibus donatus, in angulum maxillæ externè inseritur. Ratione fibrarum maxillam circumagere, id est, antrosum & retrorsum ducere creditur, & ad latera.

Deorsum mouent maxillam duo musculi, Digastricus, & musculus latus.

Digastricus gracilis & oblongus, initio sineque carnosus, in medio neruosus ab apophyse styloide, interdum à mammillari enatus, in mentum sub maxillæ flexura inferitur: & quoniam à supernis partibus oritur circa styloceeratoidem reflectitur, vt maxillam deorsum traheret, & ne dum agit nimium introcederet, natura ligamentum à styloide vsque ad angulum maxillæ infernz produxit, cui attectus est digastricus.

Musculus latus oritur à superiore parte sterni, clauicula, & acromio, & inferitur in basim maxillæ inferioris, collum, totamque faciem obuoluens. Hunc veteribus Anatomicis ignotum, primus Galenus obseruauit, & iuxta tracheam vocauit, quem Syllus capitis equitantum similem facit, si tantum eius auferas, quantum pileolo regitur. Hunc etiam Theophilus Protospatarius comparat muliebri velo, quod posteriores conuulsus appellant. Notauit Galenus, lib. de dissectione muscularum, hunc musculum in iis qui spasmo corripiendi sunt, primum omnium intendi, & qui cynici vocantur spasmi, huius præcipue musculi affectiones sunt. An id verum de conuulsione Cerebri protopathica? An de ea, quæ fit per sympathiam Cerebri cum inferiore ventre, in quo serum acre stabulatur, cuius ad Cerebrum propagatio facta secundum neruos sextæ coniugationis, qui distribuuntur in musculos illos latus, ibi futuræ ac imminentes conuulsiones rudimenta primum elucet in hoc musculo lato, qui ræquam faciem obuoluit iudicio Galeni, sed impropiè cynicus spasmus dicitur, cum sit ista conuulsio ex paralyti aliterius lateris resolui, propterea pars sana conuellitur, vbi retrahitur ex antitasti dissoluta, atque remedia non parti retractæ, sed resolutæ ad-moueri debent. An quemadmodum in vulneribus capitis partes oppositæ vulnere re-

soluuntur ex *Hippocrate*, ut in *Serna Omilis lib. 1. Epidem.* & in puero Phatni, & Euergetæ *lib. 7. Epid.* sic in musculis faciei accidit?

Maxillam antrorsum pellit *Pterygoideus* externus à *Fallope* introductus, ab externa ala apophyseus *pterygoideis*, in spatium illud maxillæ condylo & coroni interiectum inferitur. *Vesalius* portionem temporalis esse statuit in *examine Observat. Fallopy.* *Aranius* prorsus reiecit & expungit, cum tamen sit distinctus & separatus musculus à *Crotaphita*. Dum intumescit maxillam antrorsum leuiter propellit, quod accidit cum dentes inferiores superioribus supereminent.

## MVSCVLI OSSIS HYOIDIS.

### CAPVT XVI.



**S** Hyoides in gutture musculosis carnibus suspensum tenetur, & quoniam linguæ pro fundamento subiicitur, motus etiam linguæ sequitur. Propterea eius musculus sunt linguæ, & Offi Hyoidi *Communes*, quinetiam toti laryngi inferiunt in deglutatione, dum larynx cum lingua attollitur, & deprimitur.

Mouetur autem Os Hyoides à *decem musculis*, utrimque *quini* locati sunt. Nam addo musculum *milohyossum* linguæ attributum, quem voco *milohyoidesum*, quia nullo modo linguam attingit.

*Sternohyoides* à summo sterno enatus, secundum asperam arteriam in Hyoidis basim inferitur.

Illi opponitur *Geniohyoides*, ab interiore mento in eandem Hyoidis basim producitur.

Huic subiacet *Milohyoides*, ab interiore maxilla, qua parte sunt molares dentes educus, ad basim Hyoidis fertur.

*Coracohyoides* non quidem à coracoidæ processu, ut volunt *omnes Anatomici*, sed à costâ superna omoplatæ prope angulum superiorem egreditur, & in medio nervosus obliquè in latera Hyoidis definit.

*Styloceratoides* à styloide apophysi, in Hyoidis cornua cessat.

## MVSCVLI LINGVÆ.

### CAPVT XVII.



**Q**UANTUM Linguæ motus sint inexplicabiles, propter admirabilem eius volubilitatem: Anatomici tamen *otto musculos*, utrimque *quatuor* obseruauerunt, à quibus in omnes motus differentias mouetur. Sex tantum obseruo, quia *Ceratoglossus* & *Basilglossus* adeo sunt vniti, ut pro vno & eodem musculo haberi debeant.

Antrorsum ducitur à *Basilglossa*, qui ab interno mento natus, ad radicem linguæ terminatur.

Retrosum ducitur à *Basilglossa*, qui ab hyoidis basi ad linguæ radicem producitur.

Trahitur ad latera à *Styloglossa*, qui ab apophysi styloide, in mediam fere linguam inferitur.

Præter *Styloglossum*, animaduerto exiguum musculum, qui à styloide apophysi, vel ab extremis cornubus hyoidis prope styloidem emanat, huic subiacet profundissimè iuxta collum *Stylopharyngeus*, ideoque accipiendus alter erit pro *Ceratoglossa*, & sic numerus musculorum octonarius retinebitur.



## MUSCULI LARYNGIS.

## CAPUT XVIII.



**A**RYTÆNÆ componitur ex tribus cartilaginibus, quarum duæ sunt mobiles, *Thyroides*, & *Arytænoides*, tertia nempe *Cricoides* immobilis, quia super aliquo quiescente motus fieri debet.

Cùm autem duplices sint Laryngis motiones, quibus tum dilatatur & constringitur, tum clauditur & aperitur, duas articulationes obtinuit, quarum singulæ diuersis motibus inscruunt. Nam dilatatio & contractio pendunt ab articulatione Thyroididis cum Cricoide. Clausura & apertura ab articulatione Arytænoididis cum Cricoide. Itaque cùm *Thyroides* dilatetur & constringatur, *Arytænoides* verò aperitur & clauditur, voluit *Galenus* dilatantes & constringentes musculos in Thyroidem, aperientes & claudentes in Arytænoidem inseri.

Cùm autem deglutitio fiat mutuo laryngis & pharyngis ascensu ac descensu, ad hunc motum peculiare musculi comparati sunt.

Quapropter ex quatuordecim musculis laryngis, *Communes sunt quatuor*, qui ab aliis partibus, quàm à larynge oriuntur, & totum laryngem manifestè mouent, cuiusmodi sunt *Bronchy duo*, & *Hyothyroides totidem*. Reliqui decem proprii sunt, qui in ipso larynge continentur, mouendæ thyroïdi, aut Arytænoidi cartilagini destinati.

Laryngem totum fursum trahit *Hyothyroides*, ex tota pene hyoidis basi egreditur, & in Thyroididis partem mediam & externam inseritur.

Deorsum trahit *Bronchius* ab interiore sterni parte profiliens, & asperæ arteriæ bronchiis instratus ad Thyroididis basim ascendit: alium vsum illi assignat *Galenus*, vt cum suo pari asperæ arteriæ longitudinem erigat, præsertim in animalibus longiore collo præditis.

Sequuntur nunc proprii. Imprimis Thyroidem dilatat *Cricothyroides anticus*, à parte Cricoidis antica externa, in Thyroididis latera internè definit.

Contrahit Thyroidem *Cricothyroides lateralis*, à parte laterali Cricoidis, in latera Thyroididis externè inseritur.

Arytænoidem aperit *Cricarytænoides*, à parte postica Cricoidis in Arytænoidem profertur.

Huic auxiliatur *Thyroarytænoides*, qui à parte interiore & anteriore Thyroididis emergens, in latera Arytænoididis definit. Ego verò glottidi constringendæ ad vocis modulationem tribuo, cùm sit glottidi circumiectus, quippe ad vocis formationem hanc aperiri & claudi oportet. Sed huius musculi licet exigui, & tam paræ cartilagini circumiecti tantum est robur, vt omnibus musculis thoracis inspirationi dicatis, & abdominis musculis simul agentibus cum Diaphragmate ad comprimendum abdomen solus obstitat, dum claudit Arytænoidem, & Glottida, vnde spiritus cohibetur & intercipitur, eoque laxato musculo, & reuerata Arytænoidè, cessant omnes isti musculi à suo motu tonico, vel violenta sua actione, & tum expiramus.

*Arytænoides* duplex constituitur, sed vnicus est musculus orbicularis, circumdans & claudens Arytænoidem cartilaginem.

Epiglottis in homine nullos habet musculos erigentes & deprimentes, vt in brutis animalibus, quæ prona terram spectant, quamuis *Sylvius* quatuor musculos constituat. *Vesalius* duos tantum erigentes admittit, quia deprimitur pondere præterlabentium alimentorum. Sed *Galenus* cæteris Anatomicis accuratior, Epiglottidis motum naturalem esse iudicauit.

## MVSCVLI PHARYNGIS.

## CAPVT XIX.



**P**HARYNX œsophagi principium *septem musculos* obtinuit, quorum tres sunt coniugati, & quartus sine pari, nimirum *œsophagus*.

Primus *Sphenopharyngeus*, oritur ab acuto quodam apice sphenoidis prope styloidem, & deorsum inclinans, ad faucium latera defluit, ut pharyngem supernè trahat.

Secundus *Cephalopharyngeus* prodit ab ea parte, quâ caput ceruicis iungitur, & descendens in pharyngem expanditur, ipsamque tunicam pharyngis cingere videtur.

Tertius *Stylopharyngeus*, à styloide apophysi exortus, in pharyngem latera liter infertur, ut eam dilatat.

*œsophagus* pharyngem constringit, hic ab vno latere thyroididis enatus, poscitant œsophagi partem orbiculatim cingens, in alterum latus thyroididis implantatur, vel vtrique lateri thyroididis externè affixus, sphincteris instar œsophagi principium constringit.

## MVSCVLI GARGAREONIS.

## CAP. XX.



**G**ARGAREON vtriusque *duos musculos* obtinuit, non ad solam suspensionem, ut nonnulli dixere de musculis ossis hyoidis, sed etiam ad leuicem exiguumque partis eiusdem motum, qui deprehenditur, dum sale aut pipere tactus gargareon retrahitur, quamvis motus iste non sit absolute voluntarius. Musculorum alter

*Pterylophylinus externus*, à maxilla superiore infra vltimum molarem eductus, desinit in tendinem gracilem, qui transit per rimam in supræma Pterygoidis sede excavatam, ibique veluti per trochleam reflexus, ad latera gargareonis inseritur.

Alter *Pterylophylinus internus*, ab inferna parte alæ internæ pterygoidis eiectus, cartilagineum habet peculiarem, mobilem, dicatam eius origini, & ascendens si cundum longitudinem alæ internæ pterygoidis in Gargareonem desinit.

## MVSCVLI CAPITIS.

## CAPVT XXI.



**M**VSCVLI Capitis sunt *communes, vel proprij*. *Communes* dicuntur, qui cum ceruice Caput movent: cuiusmodi sunt ceruicis musculi. *Proprij* dicuntur, qui immota ceruice Caput movent. Sic enim distribuo musculos mouendo Capiti dicatos ratione motus Capitis, qui *communis est*, vel *proprius*. *Communis* dicitur, cum ad motum ceruicis mouetur Caput. *Proprius* cum solum Caput mouetur immotâ ceruice, isque motus levis est. Rursum *proprius & communis motus duplex est, rectus & obliquus*. Recti duz sunt partes, *flexio, & extensio*. *Flexio* solius Capitis, fit annuendo. *Extensio* reuoluendo. In flexione Capitis ex motu ceruicis mentum sternum attingit. In extensione Caput retrorsum inclinatur. *Obliquus* motus solius Capitis, levis & exiguus est. *Communis* vcrò magnus, quando mentum ad humeros ducitur.

Sunt autem *proprij Musculi quatuordecim*, quorum *duodecim* parte postica collocantur. *Duo* tantum parte anteriore continentur.

Flectunt caput *massoidei duo*, qui à summo sterni & media clavicula, in apophy-  
sim mastoideam obliquè inferuntur. *Galenus* vnumquemque in duos dirimit, *Sylvius*  
in tres diuiduum esse scribit.

Interdum in parte anteriore colli longo musculo, *alter proximus & externus, atque  
breuior* accumbit, qui cum mastoideo caput flectit: à *Galenus* propositus fuit, *lib. de  
dissect. musculi*. Descriptus à *Fallopio*, quem *Bartholomæus Eustachius* sæpius obseruauit,  
& ego sæpius demonstravi. A transuersis apophyseis inferiorum vertebrarum colli,  
in capitis basim inferitur. Addit *Galenus* horum musculorum partem superio-  
rem, interdum delineationem vel circumscriptionem habere, similem paruis muscu-  
lis posticiis.

Extendunt caput *duodecim musculi, maiores quatuor, & octo minores.*

Maiorum primus *Splenius*, à quinque vertebrarum superiorum metaphreni, &  
quatuor colli inferioribus spinis productus, in occiput inferitur. *Fallopium* illi duos  
exortus assignat, vnum nerueum à spinis thoracis, alterum carnosum, quem in me-  
dio ductu accipit à ligamento vertebrarum colli, itaut principium huius musculi à  
sexta thoracis vertebra vsque ad tertiam ceruicis excurrat.

Huic venit adiutor alter *Complexus*, qui ab earundem vertebrarum transuersis a-  
pophyseis enatus, occipiti tenacissimè affigitur. *Galenus* hunc muscolum *triplicem*  
facit. Splenij & complexi fibræ sunt decussatim intersectæ vel dispositæ, ad robur  
utriusque musculi.

Minores musculi, partim sunt *recti*, partim *obliqui*. Ex utrisque quidam *maiores*,  
alii *minores*.

*Matores recti* à spina secundi spondyli in occiput inferuntur. Sub iis *minores duo*,  
à parte postica primi spondyli in occiput quoque desinunt.

*Obliqui maiores* à spina secundæ vertebræ ad apophysim transuersam primæ per-  
ueniunt. Ab eodem loco *minores obliqui* ad occiput feruntur.

## MUSCULI COLLI.

### CAPITULUM XXII.



**C**OLLUM mouetur extensione & flexione.

*Extenditur à quatuor musculis, utrimque duobus.*

*Spinatus* à radicibus spinarum septem superiorum thoracis, & quin-  
que ceruicis exortus, in spinam secundæ vertebræ ceruicis inferitur.

*Transuersarius* à transuersis processibus sex superiorum vertebrarum  
dorsi enatus, externè in omnes transuersos ceruicis processus implantatur.

Flectunt ceruicem *musculi quatuor*, utrimque bini: nempe *longus & Scalenus*.

Longus sub œsophago situs, à corpore tertiz dorsi vertebræ emanat, & ascen-  
dens vniuersis vertebrarum corporibus adnexus, in anteriorem primæ vertebræ  
processum desinit. Nonnunquam ad occipitale os prope foramen spinalis medullæ  
producit, tumque caput antrorsum cum mastoideis inflectit.

*Scalenus* à prima costa in omnes ceruicis apophyses transuersas fibris obliquis  
internè inferitur, perforatur vt venis, arteriis, & nervis in brachium distribuend-  
is viam præbeat.

Colli *motus lateralis* nullis peculiaribus musculis peragitur, sed ab altero *flexore  
& extensore* simul agentibus perficitur. Quod si omnes simul agant, ceruix firma,  
erecta & rigida conseruatur, vt in tetano.

## MUSCVLI OMOPLATÆ.

## CAPVT XXIII.

**M**USCVLI Omoplatæ sunt proprii & communes. Proprii sunt quatuor, *Trapezius, Levator proprius, Rhomboides, & Serratus minor anticus.* Communes duo, sunt *latissimus, & pectoralis*, qui licet brachio suam dicant operam, obiter tamen transeuntes Omoplatæ adhærescunt. Nam latissimus angulo inferiori Omoplatæ affigitur, & pars editior pectoralis obiter aeromio adhærescit.

Mouetur Omoplatæ sursum à *Trapezio, & Levatore.*

*Trapezius* oritur ab occipite, apice quinque spinarum colli, octo vel novem superiorum thoracis, & inseritur in Omoplatæ basim, & spinam usque ad aeromium, propter varia fibrarum genera, & diversos exortus, varios edit motus. Nam parte inferiore deorsum trahit scapulam, parte media, quæ respicit basim retrorsum ducit, parte superiore Omoplatam attollit.

*Levator*, siue patientiæ musculus, originem ducit ab apophysibus transversis secundæ, tertiæ & quartæ vertebræ colli superioris, & istis in vnum coalescentibus principiis definit in angulum Omoplatæ superiorem. Hic in exortu suo usque ad medietatem, in tres vel quatuor secari potest, sed cum in eandem partem inserantur, satius est vnicum constituere.

Mouet scapulam deorsum *latissimi musculi portio*, quæ obiter inferiorem angulum Omoplatæ subit. Addunt etiam *portionem inferiorem Trapezi.* Quidni etiam consensu Syluij, *Serratus maior* hunc motum iuvabit? sed potius thoracem videtur attollere.

Mouetur antorsum Omoplatæ ab *unico Serrato minore*, qui ex costis quatuor superioribus emergit, & definit in coracoidem apophysim.

Retrorsum trahit vnicus *Rhomboides* à tribus spinis inferiorum vertebrarum colli, & tribus spinis vertebrarum superiorum thoracis, in externam basim Omoplatæ inseritur. Habet portionem superiorem potius secretam, quæ videtur musciculum alium constituere, & cum sit affixa angulo superiori omoplatæ, eam sursum trahet oblique versus cervicem, à cuius spinis inferius educitur. Interdum ista portio deest.

Eam quoque actionem iuvat musculus *Trapezius*, quæ parte scapulæ basi oppositus est.

Existimo quoque cum *Galen. lib. 4. de locis affectis, cap. 4.* Musculos Omoplatæ sublimi respirationi inservire, intelligo *Levatores & Trapezius*, quia non potest in sublimi respiratione thorax attolli, quin scapula simul erigatur, quam dum elevant, *Serratus maior*, qui à basi interna Omoplatæ producit, supernè trahitur, atque ita consecutione quadam, costæ inferiores à Serrato maiore sublimantur, qui non potest agere, nisi scapula sursum attollatur.

## MUSCVLI BRACHII.

## CAPVT XXIV.

**B**RACHIUM movetur sursum, deorsum, antorsum, rettorsum, eorumque motuum mutua vicissitudine in circulum agit.

Sursum movent duo muscoli, *Deltoides, & Supraspinatus.*

*Deltoides* oritur à media clavicula, tota scapulæ spina, & inseritur in medium ferè brachium.

*Supraspinatus* in cavitate supra scapulæ spinam locatus, & sub aeromio delatus, in brachij cervicem inseritur, quam lato tendine cingit.

Deorsum movent *Latissimus, & rotundus maior.*

*Amiscliptor*, siue *anterior, latissimus* oritur à spinis ossis sacri, lumborum, novem

metaphreni, & angulum inferiorem scapulæ præteractus, in brachij partem infernam inseritur, non longè à capite.

Hinc venit adiutor *Rotundus maior*, à tota ima costa omoplatæ nascitur, & in brachium definit paulò infra ceruicem.

Anteriorum trahunt *Pectoralis*, & *Coracoideus*.

*Pectoralis* educitur à costis septima, sexta, & quinta veris, sterno, & clavi plusquam dimidia: & acuto tendine in brachium inseritur inter deltoidem & bicipitem. *Galenus* hunc muscolum geminum facit propter diuersos exortus, & fibras, quæ contraria serie producitur, in modum chiasmi sese intersecant: ac sane videtur esse duplex. Nam portio oblonga manifestè diuisa est iuxta clauiculam ab exortu, vsque ad insertionem, & trahit brachium antrosum, dum manus dextra imponitur sinistro humero.

*Coracoideus*, siue *Coracobrachius*, portio videtur esse bicipitis, etiam ab *Aranio* obseruata, prodire à *Coracoide* apophysi, & in medium fere brachium cessat.

Retrosum mouent tres muscoli, *Infraspinatus*, *Rotundus minor*, & *Immersus*.

*Infraspinatus* inter rotundum minorem & spinam medius, desinit in brachij ceruicem, quam obuoluit.

*Rotundus minor* ab eo sinu incipit, qui sub omoplatæ ima costa cernitur, & in brachij ceruicem producit.

*Immersus*, siue *Subscapularis*, cauam & internam omoplatæ partem occupat, & in ceruicem profertur.

Postremi tres muscoli simul agentes, brachium circumferunt eo motu, qui *Homonas* dicitur, quando brachium infernè sursum ad exteriora celsiter obliquatur, itaut geminatus motus appareat.

## MUSCULI CUBITI.

### CAPIT. XXV.



**C**UBITUS duobus constat ossibus, quæ ut variis connectuntur articulationibus, ita diuersos regunt motus. *Cubitus flexioni & extensioni præst.* Radius pronationem & supinationem dirigit, ac proinde proprios habent ad motum musculos.

Fleunt Cubitum duo muscoli, in parte interna brachij siti, *Biceps*, & *Brachius internus*.

*Biceps* gemino oritur principio, vno ex ora cavitatis glenoidis per brachij fissuram delato, altero à coracoide apophysi, quæ deinde vnita vnicum tendonem efformant, qui in radium intesum inseritur, qua parte eminet.

*Brachius internus* bicipiti subiectus, à media parte ossis brachij, cui firmitus adhæret educus, desinit inter radium & cubitum, qua parte colligantur ambo.

Extendunt cubitum quatuor muscoli, *longus*, *breuis*, *brachius externus*, & *Angoneus*, siue *cubitalis*.

*Longus* oritur à costa inferna omoplatæ prope ceruicem, vbi peculiarem sinum obtinet, & terminatur in olecrano.

*Breuis* natus à ceruice postica brachij in olecranon quoque cessat. Ambo vnicum robustum & nerueum tendinem efficiunt.

Pro tertio musculo *Galenus* lib. 1. ad *an.* cap. ult. molem carneam recenset, quæ cum duobus præcedentibus confunditur, & in eandem partem inseritur. *Brachium externum* appello, quia brachio externo instratus, duobus prioribus subicitur. Ibidem monet *Galenus*, vnicuique licere pro fibrarum restitudine tres istos musculos accuratè separare.

Quartus *Angoneus* situs est in posterioris cubiti flexura, quæ *Angon* dicitur, & respondet popliteo, oritur ab inferiore, & postica brachij parte, radio & cubito interiectus, tendine neruulo in cubiti partem lateralem inseritur, pollicis longitudine infra olecranon. Interdum adeo cohæret extremitati carnosæ brachiei externi, ut eius nullum differens appareat, tumque iudicatur portio brachiei externi eò vsque protens.

## M V S C V L I R A D I I.

CAP. XXVI.



RONANT Radium *duo musculi interiores*, quorum in parte interna cubiti collocati, quorum *alter inferior pronator, alter superior pronator* dicitur.

*Superior, rotundus* prodit ab interna parte condyli interni brachij, & obliquè in radium prope mediam, tendine membranoso desinit.

*Inferior pronator quadratus*, ab ima parte cubiti in imum radium transversim fertur, eique carnosus totus inferitur. Vnam etiam cum radio iuncta ligamenti connectit.

Supinant radium *duo musculi exteriores*.

*Longus supinator* ab acumine brachij supra condylum externum enascitur, & per radium protensus, imæ eius epiphysi carnosus internè inferitur.

*Brevis* ab externa parte internè condyli prodiens, oblique radium fere medium petit, & reuolutus arcuè comprehendit.

## M V S C V L I C A R P I.

CAP. XXVII.



ARPUS flectitur, exrenditur, & lateralitèr mouetur duobus muscularis cuiusque lateris, flexore & extensore simul agentibus.

Flectunt carpi duo musculi interiores, quorum *alter cubitens, alter radiens* à situ dici potest.

*Cubitens internus* oritur ab interna parte condyli interni brachij, & cubito attensus, ad os quartum carpi primi ordinis supereminens produciitur.

*Radiens internus* ab eodem loco eductus, & per radium exporrectus, in os metacarpij indicem sustinens inferitur.

Extendunt carpi *duo musculi externi*, qui similem viam tenent, ac interni, propterea nominibus eisdem designantur.

*Radiens externus, siue bicipitis*, ab acumine osseo, quod est in brachio supra condylum emergit, & radio innixus tendonem duplicem emittit, quorum *alter* in os carpi radio subiectum, *alter* in os metacarpij indicis suppositum inferitur. Nonnulli hunc musculum *geminum* constituunt, quia in origine & insertione omnino distinctus apparet. Nam *is qui desinit in carpi* ab acumine osseo brachij enascitur. *Alter* à condylo externo brachij oritur, & metacarpium cum carpo extendit: Tendonem suum habet peculiaribus thecis & vaginis neurochondroideis inclusos, & separatos extra ligamentum annulare carpi. *Cubitens externus* ab externa apophysi brachij ortus, & per cubitum delatus, in os quartum metacarpij minimo digito subiectum tendonem suum immittit.

## M V S C V L I V O L A E M A N V S.

CAP. XXVIII.



D volam manus pertinet *Palmaris*, qui ab interna parte condyli interni brachij enatus, & omnibus muscularis ac internis cubiti superstratus, in volam expansus, usque ad primum internodium digitorum produciitur. In exortu suo pollicis longitudine & crassitie carnosus est, mox in gracilem tendinem attenuatur, qui ligamentum annulare carpi supergressus, ac inclusus cum reliquis tendonibus, in nervosam membranam

dilatatur, cuti adeo tenaciter affixam, ad tactus subtilitatem, & apprehensionis firmitatem, vt difficillimè à cute secerni queat: Ex nervosa illa membrana videntur produci thecæ seu vaginæ nervosæ, quibus includuntur tendines musculorum *sublimis & profundus*, aut saltem ab ossibus metacarpi dilatatio hac nervosa palmaris firmius adherescit. Musculum hunc interdum geminum in vitroque brachio, & ab eodem loco prodeuntem observavit Fallopius. Vnustamen in latum desinebat, alter in ligamentum transversum carpi inferebatur. Quod si tendo hic sine carne reperitur, tum à tendinibus duorum musculorum carpum flexionem oritur, vel ab interno carpi ligamento. Itaut necessaria sit isthæc membranosa dilatatio in volanti expansa. Vidi defuisse palmarem in muliere anno Domini 1633. cum tamen plantaris adesset, quod aduersatur opinioni Columbi.

Præter palmarem in vola *caro quadam quadrata*, pollicem lata, rubicundior thenaribus supra ligamentum annulare reperitur, in principio manus internæ parte inferiore montis Lunæ, vbi carpi ossiculum octauum fixum est, quæ (sapius simplex interdum bifida, duorum musculorum effigiem refert, & musculo palmari subtenis & implicata, supra ligamentum annulare transversum ad ipsum thenarem defertur. Illius munus est manum cavam reddere, & *Scaphum Progenianum* efformare, dum eminentiam carnem articulari digito subiectam ad thenarem adducit. Ideoque videtur nasci à radice thenaris, & ad os illud octauum carpi extra ordinem positum deduci, supra hypothenarem, & quia supra carpum transversum protensus est, *Carpæus* instar *Pedus* dici poterit, vel *Palmaris brevis*.

Præterea in carpo *annulare ligamentum* observabis, quod omnes tendones interni & externi carpi comprehendit, per quod plurimi tendones digitorum atque pollicis, intra cavum carpi interni deferuntur: Cuius cavitatis eminentes & laterales oræ ab exuberante apophysi ossis carpi pollicem sustinente, & quarto osse primi ordinis supereminente efformantur.

## MUSCULI DIGITORUM.

### C A P I T U L U M XXIX.

**H**ALANZ digitorum *flexitur, extenditur, & lateraliter movetur.*  
Flexunt quatuor digitos, *duo muscpli, sublimis, & profundus.*  
*Sublimis* ab interna parte condyli interni brachij oritur, & circa carpum 4. tendones producit, qui ad secundum digitorum articulum terminantur, perforanturque vt viam præbeant tendonibus profundi.  
*Profundus* à partibus superioribus cubiti & radij paulo infra articulum emergit, & *quadrilaterus* ad tertium digitorum internodium per foramina tendonum suolimis porrigitur. Sed observatur naturæ industriam: quæ, vt digitorum recta fieret flexio, secundum eorum longitudinem parte internæ, ex durissimis & ligamentosis membranis *canalem* effinxit, qui tendones profundi & sublimis arcuè complectitur, ne flexis digitis tendones ineuruati à sua sede dinellerentur, & tanquam funiculi exurgerent, cutemque attollerent. Et quamvis tendones in isto canali sint arcuè comprehensi, iter tamen & cursum liberum habent, quia pingui & oleoso humore *canalis unctus* est. Ex ipsius tendonibus profundi iuxta carpum *lambdricales quatuor* enascuntur, tenaciter affixi, ad primum internodium cuiusque digiti, vbi coeunt cum interosseis.

Musculi *extensores* digitorum sunt *communes, & proprii.*

*Communes* voco, qui digitis quatuor conveniunt, qualis est *extensor magnus digitorum*, vel qui præter extensionem alios motus edunt, vt *lambdricales, & interossei* simul inniti.

*Proprii* sunt, qui digitis tantum quibusdam conveniunt & attribuuntur, vt *extensor indicis, & extensor articularis.*

*Magnus extensor digitorum* ab externo brachij condylo prodit, & iuxta carpum finditur in *quatuor tendones*, qui in duos inferiores articulos singulorum digitorum desinunt.



Digiti mouentur ad latera, quod vulgò *adduci & abduci* nominant.

Adducuntur cum ad pollicem trahuntur, abducuntur cum ab eo regedunt. Morus autem ille ab *interosseis musculis* perficitur: *Tres sunt externi, totidem interni*, spatii ossium metacarpij instrati. Oriuntur ab eorum partibus supernis iuxta carpum, & in primo internodio gracillimo tendine, tria digitorum ossa lateraliter percrepant vsque ad radicem vnguium, vbi antrorsum, & superne tendones coeuntes terminantur. Idcirco *interossei simul agentes*, extensos digitos simul constringunt, quali figura tenentur, dum natus.

Primus autem animaduertit *Galenus, lib. 1. de usu partium, cap. 18.* postremas digitorum phalanges ab interosseis extendi: ob id digitum tensore amputato, non aboletur digitorum extensio, quoniam extensionem perficiunt interossei sex simul agentes. Sed *Fallopins in Observationibus, & Institutionibus Anat.* obseruauit *lumbrales quatuor, & interossei sex musculi* potissimum extensioni digitorum inferuire, obliqui motibus per accidenstantum conferre. Quum enim lumbrales & interossei circa primum articulum digiti coterunt, vnicum tendonem efformant, qui lateraliter fertur vsque ad articulationem, circa quam parte exteriori ambo concurrunt: Vnde inciso digitum tensore, ejus defectum suppleunt isti musculi, quos dixi esse communes extensores. Tendones interosseorum in manu vniuntur tendonibus digitorum tensoris circa medios digitos lateraliter.

Interea notabis *interossei externos* intervallum ossium metacarpij implere. *Interossei vero interni* in palma manus collocatos, non intra spatium metacarpij contineri, sed extra prominere incumbentes. Medius & annularis digitus duos recipiunt tendones vtriusque ex vtroque latere, cuiusque interossei internè locatum, quia habent peculiare externos. Index, & auricularis vnicum habent: atque tam externi quam interni interossei coeunt, & conueniunt simul ad efformandum vnicum tendonem, cui ad primum digitorum articulum affigitur lumbicalis muscoli tendens.

Ex quatuor lumbicalibus *Primus* digito annulari inseritur. *Secundus & tertius* medio digito: *Quartus* indici, omnes extrorsum vergunt, Interosseorum tendinibus nequaquam affixi. Deinde tendones interosseorum non continentur intra ligamentum membranosum digitorum, quod tendones sublimis & profundi comprehendit, sed foris digitos lateraliter percrepant.

Præterea duos obseruabis musculi, tanquam interosseo externos, primo & quarto ossi metacarpij extrinsecus superstratos.

Quorum alter *Hypothenar* proprius est parui digiti, & in duos secari potest: Oritur ab osse tertio & quarto secundi ordinis carpi, & in phalanges eiusdem digiti lateraliter inseritur, vt eum abducit ad latus externum.

*Alter* indici conuenit, & antithenari subiectus, ab interna parte primi ossis pollicis enascitur, & in phalanges indicis inseritur, vt hunc digitum ad pollicem trahat, vnde musculus *abductor indicis*, potest appellari.

Index digitus præter tendonem communis extensoris, habet peculiarem musculum extensorem, qui *Indicator* potest appellari, quo motu indicandi causa utimur. Oritur à media & externa parte cubiti, atque bifido tendine in secundam articulationem inseritur, alterque tendo cum tendine maioris extensoris coalescit.

Auriculari digito *extensor proprius* tribuitur, qui potest exactè separari. Oritur à parte superna radij, interiectus cubito & radio, duplici tendine in auricularem digitorum externè implantatur. Sed altero tendine miscetur cum tendone maioris extensoris. Interea notabis *lumbrales musculi interdum tres, sapius raro quinque* reperiri, qui licet tendonibus profundi musculi sint implexi, & ab his oriri constans sit opinio, existimo tamen à nervoso orbiculari ligamento carpi nasci, vt ortum stabilem ac firmum obtineant.

MVSCVLI POLLICIS.

CAPVT XXX.



**P**OLLEX, quia instar alterius manus quatuor digitis oppositus est, idcirco suos habet peculiare musculos, quibus seorsim flectitur, extenditur, & ad latera mouetur.

Extendunt Pollicem *duo musculi longiores.*

*Vnus* à latere superiore & externo cubiti natus radium ascendit, carpumque præteruectus in Pollicis secundum articulum duplici, interdum triplici tendone externè inferitur. *Alter* ab eadem parte cubiti, sed inferiore, prope carpum exortus, in tertium articulum Pollicis definit.

Flectitur Pollex *ab uno musculo*, qui ab interna parte cubiti ciectus, ad primum & secundum internodium Pollicis internè defertur.

Mouetur lateraliter à duobus musculis. *Thenar* oritur à parte interna carpi sub Pollice, & in secundam Pollicis phalangem inferitur, vt illum à digitis abducatur. *Alter antithenar* ad indicem digitum Pollicem trahit. Nascitur à latere externo primi ossis metacarpi indicem sustentis, & in primam Pollicis phalangem definit. *Græci* prominentiores partes palmarum appellant *Næci*, deducto vocabulo *Nexi* à *Nixi*, à percutiendo. Alij non omnes prominentiores palmarum partes sic appellatas existimant, sed eas tantum quæ Pollici subiiciuntur, ex *Galeno comment. ad part. 20. lib. 1. de fracturis.*

Trahitur ad alios quatuor digitos, à *musculo*, qui iunctus & subiectus thenari, ex tribus ossibus internis metacarpi enatus, & in secundam phalangem Pollicis inferitur. *Hypothenar* Pollicis dici potest, quia *substratus thenari*.

MVSCVLI THORACIS.

CAPVT XXXI.



**V**TA respiratione conseruatur: Respiratio motu thoracis perficitur. Thoracem igitur moueri oportuit, vt pulmones dilatarentur inspiratione, constringerentur expiratione. Mouetur autem per se, vel per accidens, cum spinæ motum sequitur. Siquidem spina flexa, aut erecta, Thorax quoque flectitur, aut erigitur, sed per se mouetur, quando motu proprio respirationis causa agitur.

Vt autem respirationis duæ sunt partes, inspiratio, & exspiratio: ita thorax duplici motu cietur. Dilaturatur in inspiratione, contrahitur in expiratione. Dilatatio sit eleuatione, contractio decidentia thoracis.

Musculi thoracis sunt *proprij* vel *communes*. *Proprij* dicuntur, qui speciatim & propriè pertinent ad thoracem. *Communes* sunt, qui certæ parti destinati, suam tamen thoraci præstant operam, tanquam subsidiarij, quales sunt *musculi superiores omoplatæ*. Nam *Serratus maior* non posset attollere thoracem, cum è scapula oriatur, nisi scapula sursum eleuetur. Ideoque *Fallopianus* opinatur istum musculum omoplatæ inferuire. *Scalenus* quoque confert thoraci eleuando, quoniam adhæret priuæ costæ, in eo videntur *Galenus*, & *Fallopianus* consentire, propterea à colli musculis distrahi posset.

Dilant, siue attollunt thoracem *musculi* quinque, *Tres sunt antici*, *subclauius*, & *Serratus maior*, *triangularis*, *vnus posticus*, *Serratus*, *quintus est superior intercostalis externus*.

*Subclauius* à clauicula interna prope acromium carnosè exortus, in primam costam prope sternum inferitur. Non est intercostalis, quia clauiculæ & costæ affixus, & ab illis separatus.

*Serratus maior* ab interna omoplatæ basi, ad sex, modò septem costas pertingit, illius originem altiore observavi, à costis nimirum duabus superius vsque ad claviculam, quæ costæ breviores, & crassiores, & latiores videntur immobiles: & inferitur in costas septem, quarum quinque sunt veræ costæ inferiores, & spuriæ duæ superiores. Sed cum iste musculus dependeat ab omoplatæ costis superioribus, non videtur agere, nisi eleuata omoplatæ in sublimi respiratione. *Serratus posticus posterior* sub Rhomboide situs, à spinis trium inferiorum vertebrarum colli, & prima spina dorsi enascitur: principio nervoso & membranoso, atque in tres costas superiores, interdum quartam desinit. *Fallopianus* addit *Scalenum*, quem in tres fecat, sed nos musculus cervicis adscripsimus.

*Intercostales undecim externi* vnus musculi locum tenent, qui à costæ superioris inferno latere, in latus supernum inferioris costæ obliquè antrosum fertur. Istis musculis dilatantibus thoracem oportet addere *Diaphragma*. *Triangularis* à media & interna parte sterni enatus in costarum inferiorum cartilagine inferitur, vsque ad secundam vel tertiam costas nothas. *Triangularis apex* est in sterno, latera duo ad costas infernas producuntur.

De ortu *triangularis musculi* dubitatur, num potius oriatur à parte superiore sterni, & inferatur in costas inferiores, an potius à parte inferiore sterni, & producat in costas superiores: Nam si nascitur à parte superiore sterni, dilatationi thoracis quæ fit inspirando, inseruiet, quod confirmatur ex *Vesalio* & *Columbo*, qui deriuant istum musculum à claviculis, summoque sterno. Fallitur *Sylvius* dum putat ortui à media parte sterni, & inferi in duas veras costas inferiores, & tres aut quatuor superiores nothas: sic enim eductus non potest inseruire thoracis depressioni. Non potest internam sterni partem tomenti instar sublinire, quia duplex est, dexter & sinister, latitudine digiti dissectus ab invicem, nominari potest *Pectorales interni*.

Contrahunt thoracem tres musculi, *Sacrolumbus*, *intercostales interni*, & *Serratus posticus inferior*. *Sacrolumbus* ab osse sacro, & spinosis apophyibus lumborum oritur, & in superiores costas desinit, prope earum radicem, singulis costis duplicem tendentem, siue anfulam tendinosam tribuens internam & externam. Inseruit etiam erigendæ spinæ, vbi antrosum inelinatur & incuruatur.

*Intercostales externi* undecim, costarum spatia implentes, pro vnico habentur, ab inferna costa ad supernam obliquè ductur, fibras habet internis contrarias decussatim intersectas, quem chiasmum fibrarum, se primum inuenisse gloriatur *Galenus* libris administr. *Anatom. & lib. de dissect. muscul.*

*Serratus posticus inferior* à spinis trium vertebrarum extremarum dorsi, & prima lumborum eductus, in tribus quatuorve infernis costis terminatur, ex opinione Anatomicorum: sed observavi latum esse hunc musculum, & suum tendinem proferre ad partes inferiores, vsque ad os sacrum, & cum sit obliquè situs, potius inseruit deprimendo thoracem, quàm attollendo, aut ambo *Serrati* funguntur officio fasciæ ad colligandos & constringendos spinæ musculos posticos. *Serratus* iste posticus inferior, est oppositus, vel *Serratus* postico superiori, vel *Serratus* maiori. *Serrati* duo postici maior & inferior habent fibras decussatim dispositas ad robur.

Alij addunt ineptè musculos octo abdominis, quoniam ad expirationem violentam plures musculi requiruntur: quippe fortiore impetu efflamus, quàm inspiramus. Efflationis autem vehementis ope vociferamur, magnam & altam vocem edimus. Sed sufficient musculi obliqui ascendentes cum alijs thoracis.

## DIAPHRAGMA.

### C A P V T XXXII.



**V**T respiratio violenta est, aut libera, sic vtriusque diuersa sunt instrumenta, & distincti musculi. Violentæ respirationi, in qua thorax manifestè mouetur, inseruiunt musculi iam commemorati. Sed liberæ respirationis instrumentum vnicum censetur *Diaphragma*.

Musculus est admirabilis, tam in sua compositione, quàm actione, partes naturales à vitalibus separans, vnde nomen apud Græcos obtinuit, Latine di-

citur *septum transversum à sinu transverso*. Anteriorum cartilagini xiphoidi alligatum, nochiis costis vsque ad ultimam affixum, oblique ad duodecimam dorsi vertebam per duas apophyles carnosas, & tendinosas vtrimque bifidas vel trifidas contorque-  
tur, quæ ad tertiam vsque lumborum vertebam, & interdum os sacrum repunt, & producuntur, tenacissimè hærentes. Huius musculi *caput est in apophyse illius carnosæ iam commemoratæ, & in centro nervo. Finis seu aponeurosis est circumferentia costarum costarum*. Dum agit contrahitur & tenditur in respirazione, tum adducit deorsum costas inferiores, & ex conuexo redum efficitur, in expiratione supernè reuellit, vel potius redit ad naturalem suam figuram ope mediastini, & ex recto conuexum redditur: Dum violenter agit in inspiratione longa, violenta, & coacta, ad pellendum deorsum versus ventrem: Tum intumescit more musculorum abdominis, ab aëre retento, clausa ariænoide & glottide.

## MUSCULI DORSI, ET LUMBORVM,

Quibus spina mouetur.

CAPVT XXXIII.



**D**ORSVM non mouetur ob costas interiectas, & musculorum tam interiorum quam exteriorum penuriam. Musculos quidem habet extrinsecus supra se extensus, sed quibus aliò referuntur. Itaque inter ceruicem & lumbos tanquam medium immoritur manet, dum extrema mouentur. Motus autem sit in vltima dorsi vertebra omnino liberâ, quæ vndique excipitur à vicinis vertebis, & non excipit, & quia lumbis contigua, motus ille lumbis potius quam dorso adiudicatur, quamuis perineat ad totam spinam. Itaque spina, siue lumbi *stillantur, extenduntur, & ad latera duuntur*.

Fleunt duo musculi, vtrimque vnus, *Quadratus*, qui à parte postica costæ ossis Ilij, & laterali parte ossis sacri internè profilens, in transversas lumborum apophyses vsque ad vltimam costam carnosus inseritur. Ego verò potius ab apophyse transversis duarum vertebrarum inferiorum dorsi, & vltima costa educerem. vt possit cum musculis obliquis descenditibus, & rectis agitare & mouere anteriorum compagem ossium Ilij.

Flexionem quoque lumborum rotius spinæ musculi abdominis expirationi inferuientes adiuuant, thoracem enim deprimentes, spinam etiam incuruant, quod manifestè deprehendes, si supinè iacens supra nates truncum corporis erigas, aut in pedes rectus salias, absque manuum adminiculo, tum animaduertes manu supra ventrem apposita, musculos abdominis nonnullos in ea actione vehementer agere.

Extendunt spinam, siue lumbos *quatuor musculi vtrimque duo*, qui adeo sunt implexi secundum longitudinem spinæ, vt tot paria quot sunt vertebrae, vel vnum tantum par musculorum tendines vertebris omnibus tribuens statuendum sit, auctor Galeno.

*Semispinatus* nervoso principio à spinis omnibus ossis sacri, & lumborum enatus, in apophyses lumborum totiusque dorsi transversas desinit. Et quoniam ad collum vsque assurgit, *Syllabus* ab vndecimo dorsi spondylo ad primum vsque alium musculum ascendere scripsit.

*Sacer* acuto & carneo principio, à posteriore parte ossis sacri exortus, in radices spinarum dorsi vertebrarum producit: Dum quatuor isti musculi simul agunt, spinam erectam tenent: illis autem agentibus, qui ex alterutra sunt parte ad latus contorqueatur. Obseruat Galenus in istis muscularibus fibras obliquas, vt singuli spondyli peculiarem motum habeant, quod carerent, si fibræ recta protenderentur, *cap. 12. lib. 12. de vasa partium*.

Si musculi spinam extendentes sunt oppositi musculis abdominis obliquis descenditibus & rectis, qui mouent compagem ossium Ilij, nasci debent à partibus superioribus spinæ, vt inserantur in ossa Ilij, & os sacrum, & quamuis otiantur à partibus supernis spinæ, inseruiunt tamen illi erigendæ, cruntque sem-

per antagonizæ musculorum spinam flexcentium, nempe *quadrati*, & musculi *obliqui descendentes* & *Recti*. Nervos etenim recipiunt à partibus supernis, vt à mediis partibus.

## MUSCULI ABDOMINIS.

### C A P I T U L U M XXXIV.



**C**UM in hac Myologia describam musculos omnes totius corporis esse serie, quâ demonstrare consuevi: nunc suo ordine repeto musculos abdominis, quamvis non amplius compareant, quia inter partes continentes proprias ventris inferioris numerati, dissecti, & expositi fuere. Similiter alios musculos iam administratos recensui, vt in hac Myologia retinerent suum ordinem situs, cuiusmodi sunt Diaphragma, testis, penis, & ani muscoli.

Itaque abdominis decem numerantur muscoli, utrimque quini, à situ & fibrarum textura denominati. Quamvis autem à diuersis partibus orientur, omnes tamen in linea candida terminantur, quæ à xiphoide cartilagine directè per vmbilicum ad symphysim ossium pubis protendiuntur.

Constat dicitur ex tendinibus membranosis musculorum abdominis, sed cum aponeueroses dextræ sinistræ adeo strictim sint vnitæ, ac veluti continuatæ, vt nullum diuisionis vestigium supersit, non apparet hæc linea candida, nisi inter duos musculos rectos. Nihilominus hanc extrinsecus imaginari oportet secundum mensuram prius designatam.

Musculorum abdominis primus occurrit *obliquus descendens*, qui in exortu suo in septem vel octo portionculas carneas sectus, à septem vel octo infernis costis educitur iuxta sternum, inferno lateri cuiusque costæ affixus, tres vt rō superiores carnez portionculæ digitatim Serrati maioris intersectionibus implicatæ cohercent, deinde obliquè descendens externo labro costæ ossis ilium, & spinæ ossis pubis adhæret, mox lata & membranosa aponeurosis in medium abdominis productus, in linea candida terminatur vsque ad ossa pubis. Itaque muscoli exortus est in parte superiore, finis ad lineam candidam, & in osse pubis. Mutua hæc Serrati maioris, & obliqui descendents intertextura & origo, ad veras costas prope sternum, videtur comparata ad finniorem huius musculi adhæSIONem in obeundis actionibus, quæ validæ sunt, siue comprimatur supernè abdomen, siue ossa ileum compages anteriorum moveatur.

Huic subiectus est *obliquus ascendens*, qui à spina ossis pubis, apicē rotius costæ ossis ilium exurgens, & quatuor nothis costis affixus, duplici tendine, si lubet membranoso rectum musculus amplexante, ad lineam candidam profertur: fibras habet superioribus oppositas, & decussatim intersectas. Duplex in eo musculo tendo instar vaginæ rectum includens, fictitius est, cuius tamen leue rudimentum apparet supra vmbilicum, si artificiosè separetur.

*Rectus* ab inferna parte sterni iuxta cartilaginem xiphoidem carnosus enascitur, vel potius ab extremitatibus cartilaginosis collarum, & secundum longitudinem abdominis protensus, duro & nervoso tendine in spinam Ossis pubis terminatur. Supra vmbilicum tres vel quatuor nervosus & transversas intersectiones observabis, dum supra vmbilicum, tertiam è directo vmbilici, quarta si reperitur infra vmbilicum, exarata est.

Ad robur huius musculi comparata videntur hæc genicula, sicut in calamis, qui quò pluribus geniculis abundant, eo robustiores existunt. Deinde intra hunc musculus, epigastricam ascendentem, & mammariam descendentem venas repentes, simulque versus vmbilicum coeuntes inuestigabis, per eam venarum anastomosim, mammae & uterus inter se communicant.

Infernis rectorum partibus superiacent in viro & muliere, duo parvi muscoli *Pyramidales*, plerumque inæquales, ab Osse pubis enati. Interdum vnus adest, vt duos æquare possit. Sed duos semper inuenit *Fallopini*, interdum ita connatos, vt vnicus videatur sua latitudine duobus æqualis. Sæpius inueni *Pyramidalem musculus sinistram* dextro

dextro minorem, tam in latitudine, quàm in longitudine, & cum *unicus* adest, sæpius *sinister*, quàm *dexter* reperitur. Interdum in viris & mulieribus *utramque* deesse obftruaui, frequentius in mulieribus, quàm in viris, tùmque Rectorum extremitas, quæ solet effe tendinosa, tota effe carnosa. Ab his vesicam comprimi putat *Fallopianus*, & ad excernend. urinam. Quam enim Vesica duplicato peritonæo firmiter affixa, & suspensa contineatur, fundum illius deuoluere nequit, nisi retrahatur: At muscoli Pyramidales licet externi, suos tendones intra musculos Rectos huic parti peritonæi affigunt, quæ vesicam includit. Et quemadmodum superior, ac dimidiata musculi Recti portio tribus nervosis geniculis firmatur, sic inferior musculi portio Pyramidalium incubatu roboratur. Cornua quoque Ossium Pubis, tam in viro, quàm muliere moxiter contegunt, ne in coitu ex mutua partium istarum collisione & attritu, tendones Rectorum lædantur. Nam vr animaduertit *Nicolaus Massa*, tendo Recti sensibilis est admodum, & ex eius punctura sæpe conuulsio dolorifica consequuta est.

*Transversus muscularis* à transversis lumbiarum vertebrarum apophysibus emergit, inferne ossis Ilii costæ, sursum nothis costis interne affixus, usque ad cartilaginem xiphoidem, ac sub Recto musculo deuectus, per latam aponeurosim in lineam candidam definit.

Musculi abdominis *usum & actionem* habent. Actionis diuersa est figura, quàm in aliis musculis. Nam agentes extorsum incuruantur, intorsum intumescent. Reliqui musculi exceptis intercostalibus, dum quiescent Rectifunt, dum agunt, incuruant extorsum, propter osium subiectorum duriciem & renisum.

*Uterus proprius istorum musculorum est abdomen comprimere ad fecum excretionem, superne propellente Diaphragmate, quod spiritu cohibito deprimitur. Parturienti quoque, siue enixi parientium mulierum inferiunt, hypochondria constrigendo: quieriam ad vocis generationem conferunt, dum validas efflationes accelerant. Adde quod vomitioni opitulantur, & spiritus cohibitionem efficiunt, quam *Praxagorae*, & *Alcibiades* appellavit: Vide *Mercurialem*, lib. 3. *Gymnast.* & *Fesium* in *Deconomia*. Præter istas actiones uniuersales, quibus obediunt omnes simul conferre debent, eorum nonnulli peculiare edunt actiones, ut Recti & Obliqui Descendentes, qui antrosum movent compagem ossium Ilium. Alij expirationi inferiunt, & incuruant spinam, dum quis supinus absque manu auxilio truncum corporis erigit, & in pedes suos salit, quales sunt Obliqui Ascendentes.*

*Muscularum abdominis usus est, dum quiescunt, partes contentas contegere, munire, & ventris calorem conferuare.*

DE MOTV OSSIVM J LIVM, ET  
Ossis Sacri simul junctorum, & de eorum musculis.

## CAPVT XXXV.

**I**

NSANIRE me quispiam existimabit lecto isto titulo, quasi *paradoxum* ridiculum & inauditum proponam, Osse Ilium arcū iuncta per symphyllum cum osse Sacro, & antrorfum inter se coherentia in Pube, moventi supra femora, per articulationes osium Isthij cum femoribus.

Si quis perpendat motum istorum ossium in congressu venereo, siue stando, siue prono, aut refupino corpore, nates agitando perficiatur, immotis pedibus cruribus, recta & immota manente spina vsque ad lumbos, is facile animaduertet, & necum sentiet, isthac ossa simul iuncta per se moueri antrosum & retrorsum, aut falcem lumbares vertebrae vnâ cum ossibus Ilium inter reliquam spinam superiorem stabilem, & immota femora moueri: Nec motum istum à lumbis solis pendere.

Dum quitruncatis, ant flexis cruribus & colligatis invicem, innixis natibus progreditur, manuum dumtaxat beneficio sustentans & elevans truncum corporis, nonne motus hic progressivus illorum osium dependet à musculis docti, & abdominis, enatis à partibus superioribus.

Præterea, dum saltando attollimus totum corpus, necessum est adesse musculos,

qui continuatione quadam erigant sursum ossium istorum compagem, dum corporis truncus in sublime erigitur insiti caloris robore, & superiorum musculorum ad miniculo.

Si quis credit ossium istorum compagem moueri à musculis femorum, hoc fieri non posse sustineo: oriuntur enim ab istis ossibus, quæ debent esse immota, dum mouentur femora: sed quoniam simul moueri debet compages Ossium Pubis, Ilium & Ossis Sacri, idcirco ad mouendam & agitandam illam compagem Ossium, musculi abdominis obliqui descendentes inter se, per quandam aponeuroseam membranam continuationem vniuntur versus lineam candidam.

Si quæras, quo fine Ossis Pubis moueantur, respondebo ad procreationem hominis, quæ fit maris & femina congressu. Plura non dico, vt fugiam obscenitatem.

Sed à quibus musculis motus hic ossium voluntarius edatur, non est ita facile assignare, nec enim æquum est musculos, qui mouent antrosum & retrorsum femur, deputare huic actioni, quoniam agentibus istis musculis, necessum est istud os immobile stare & permanere.

Neque etiam musculi lumborum & dorsi, si ab Ossibus Ilium, & Osse Sacro oriantur, compagem istorum ossium mouere possunt, quia dum mouetur spina, Os Sacrum, & Os Ilium manere debent immota. Itaque officio fungentur isto musculi abdominis *Recti, & Obliqui descendentes*, quiescente Thorace, aut leuiter moto, & ex interuallis longioribus, à quibus antrosum mouebitur compages istorum Ossium. Postici musculi *sacer, & semispinatus* orti à partibus superioribus spinæ tunc temporis stabiles & immotæ, quia in lumbis dumtaxat mouetur, omniumque vertebrarum apophysis transversis & spinosis affixi, retrorsum mouebunt istam compagem ossium, simulque erigent truncum corporis, sicque dispositi & collocati erunt Antagonistæ musculorum flētētium lumbos, nempe quadrati & obliqui ascendentes, & aliorum musculorum mouentium antrosum compagem Ossium Pubis, scilicet Rectorum & Obliquorum descendētium abdominis.

At dicet aliquis, obliquus descendens vnicum habet genus fibrarum, quæ ad lineam candidam porriguntur, ergo vnica edet actionem comprimendo abdomen. Vera quidem sunt ista, sed producit aponeurosis musculi obliqui descendētis ad spinam Ossis Pubis, cui tenacissimè adhæret: ideoque per istam insertionem mouebit istam Ossium compagem.

Si quis pertinax & contentiosus obiciat, quod natura, si compagem Ossium Ilium & ossis Sacri moueri voluisset, musculos ad id comparasset: at nullos effinxit, quia musculi supra abdomen expansi eius compressioni conueniunt. Respondeo Naturam non potuisse, nec debuisse alios musculos ad motum Ossium Ilium supra ventrem disponere, quia ventrem maiore sarcina carniū, quàm par est onerasset: nec solet Natura per plura efficere, quod æquè commodè per pauciora præstare potest: ideoque musculos abdominis ad hoc officium comparauit cum aliis musculis spinæ, qui sunt Antagonistæ in ea actione: Nec est absurdum, aut impossibile, eundem musculum etiam vnicò genere fibrarum præditum sit, duos edere motos, & diuersas partes mouere, modò non longè distent ab inuicem. Sic musculus latissimus omoplatam & brachium mouet.

Si quis adhuc obiciat, quod musculi *sacer & spinatus*, si oriantur à dorsi vertebris, poterunt quidem erecti, ac proinde firmà manente spinà mouere compagem Ossium Ilium & ossis Sacri, sed non poterunt erigere spinam incuruatam, quoniam ortum haberent à parte mouenda, siue erigenda, in qua actione deberent potius nasci à partibus inferioribus, aut retrorsum traherent spinam incuruatam. Verùm, cum isti musculi neruos habeant, & adhæsiōem firmam ad singulas vertebrae vsque ad os Sacrum, quidni totum earum corpus vsque ad os Sacrum, vbi inferuntur, accipietur pro capite etiam infra mediam earum partem.

Quod si deputaremus *sacrum & spinatum*, mouendæ dumtaxat compagi ossium Ilij & ossis Sacri: *Sacrolumbus* validissimus musculus, qui singulis costis ad earum radicē iuxta articulationem cum vertebris tendines robustissimos suppeditat, poterit erigere incuruatā spinam, quam erectā & firmam tenebunt, & conseruabunt *spinatus & sacer* cum *sacrolumbo*, quem solum deprimendis costis attribue, cum pondere suo decidant, & alij musculi id præstare queant, non est æquum: alioquin plures erunt, & assignabuntur robustiores musculi deprimendo thoraci quàm eleuando.

Hæc meditatus fueram, & publicè proposueram voce & scripto, priusquam libel-

Ius Ioannis Cay Britanni, condiscipuli Vesalii in Medicina, Patavij, mihi innotuisset. Vbi demonstrat compagis ossium Ilium cum osse sacro motum, immotis ossibus femorum, ipsaque spina vique ad lumbos. Id me recreat & confirmat magis in mea opinione, quod habeam fautores & assensum in primis Spiegelum, & alios qui cum loquuntur, sicut Laurembergium, & Bartholinum, qui ossa Pubis aune motitani, sed imperitiè id docent, modum motionis ignorantes. Et quoniam licet Cay rarus est, Londini ex usus anno millesimo quingentesimo septimo, primo, vbi nactus sum, eius verba, excutibam, ut meæ assertioni fides maior adhibeatur. Duotantum sunt Recti musculi, quorum altero altero suo sine in osse pectoris, altero in osse Pubis firmatur. Non est quod vultorum capita in osse Pubis collocare, ut deorsum pectus moveatur. Id etiam circa musculos detrahentes relaxatis aduersus musculus, sua gravitate pellus sicut: ut antequam attollantur inferna corporis partes circa pubem, quæ sua gravitate in alium ferri veniuntur, musculorum vi opus est. Hinc eorum capita in summo posita sunt, & quamvis sua natura non moveatur ad Pubis, ut in articulo suo, moveatur tamen flexu alieno, spina videlicet, ut in altibus videretur similibusque motibus facile est videre. Subiungis agens de Rectis musculis, illud de inseritis: brevitè dicam, eas à Natura creatas, non ad rectorum numerum, sed ad eorum robur & similitudinem. Nam si Natura diuisisset ad numerum, singulos ad utrumque, & insertionem ossi affixisset. Ceterum cum ortus unus, & insertio una sit in uno musculo Recto, iniuria plures musculos plures non faciunt: Non enim omnis densio musculum facit, firmiores tamen faciunt nervositate intertexta partibus. Molles quidam & infirma breviores fallè, longitudinis infirmitati facile incurruunt, plures enim bicipes uno longo tenaciores sunt, & rumpendi periculo minus obnoxij, & ut brevis sumis longe est torosior & comenitior, &c.

Ex illo discursu liquet Catum ex profecto agere contra Vesalium, qui occasionem dedit huic multiplici Reclorum Musculorum. At ille contendit inferuire movendis ossibus Pubis, non irahendo sursum, ut volunt Spiegelus, Bartholinus, & Laurembergius, qui nunquam istius motionis modum intellexerunt, sed flexu lumborum & conjuginis istorum. Cum enim isthæ compages ossium, sit ossibus femorum & vertebris lumbaribus interiecta, quomodo sursum potest attolli?

Reprehendo in Cay, & alius, quod de motu ossis Pubis loquantur omnino osse sacro, quod cum ossibus innominatis constituit itam compagem ossium mobilem. Spiegelus opinatur ossa Ilii iuncta cum osse sacro inter se moveri deorsum, atque ossa Pubis modo quodam peculiari agitari, exemplis à seâ petitis probat, dum in illo pedibus sursum clatis convolvitur corpus, ossa pubis deorsum moventur: vel si quis pedibus terræ insistens alterutrum elevarit. Sed ineptire de his prævidetur, & gelus, cum ossa Pubis seorsum moveri, & ossa Ilium iuncta cum osse sacro levi quodam motu agitari feribit: Nam ossa Pubis inter se iuncta sunt per symphysem, & ossa Ilium cum osse sacro per eandem symphysem simul coherere. At ossa simul iuncta per symphysem nullum habent motum, suntque prorsus immobilia: quod si supinus iaceas, aut reclus stes, alterutrum pedem supernè movendo ad perpendicularitatem percipies, alterutrum quidem os Ilium attolli, sed istius compagis osseæ, quæ formatur ab osse sacro, & ossibus Ilium arctissime inter se iunctis, dum pars altera elevaritur, altera pars opposita supereminet. Dum verò pedem alterutrum longiorem altero facio, quæro, unde ista extensio & talis prolongatio pedis, sed in hystoria musculorum femoris explicatur.

## TESTIS MUSCULI.

## CAPUT XXXVI.



ESTIS Musculus est proprius, vel communis.

Proprius est, cuique Testiculo peculiaris, Cremaster dictus, qui à vasa, vel spermatica, quod est pendeo, siue suspendo. Oritur à spina inferna & antica ossis Ilium: Vel potius extrema pars est musculi obliqui ascendentis, Ossis Pubis vicia, cuius caro rubicundior, tenacior, & veluti diiuncta à carne musculi obliqui ascendentis extrinsecus peritonæi productionem inuolvens, vna cum vasis spermaticis ad Testiculum producit. Et quia plerumque gemino principio Cremaster exsurgit ab Ossibus Pubis & Ilium, ideoque Galenus utrimque binos consuit. In coitu Testiculum sursum retrahit, ut vasa re-

Ec ij



laxata commodius semen transmittant, quod pondere Testium distenta & contricta, tardius efflueret propter meatuum angustias.

Dum vir prospera valetudine fruatur, horum muscutorum beneficio sublato habet Testiculos, ne in Scrotum sudent, quod tum contractum corrugatumque sentitur, inde lasciuiores seminis constitutionem virorum, sine vlllo alio indicio promptè dignoscunt. Nam in virum infirmitate exoluti flaccescunt hi muscoli, quod in ægris longo morbo attritis & senibus euenire solet.

*Communis Musculus, est Scroti membrana darts,* continuatio panniculi carnosus. *Musculus iste carnosus* geminos Testes suspendit, quod officium carnosæ membranæ potius commissum fuit quàm nervosæ, quæ facillè contrahi & relaxari non potest. Id naturaliter Scroto euenire videmus non ratione entis, sed huius panniculi carnosus beneficio, qui nascitur à circumferentia ossium Pubis, & instar mansupij vtrumque Testem includit, ac comprehendit, æquè meretur nomen musculi, ac panniculus carnosus frontis, ceruicis, & occipitis.

*Cremafter autem mulieris* breuior est, productioni peritonæi superiectus: per illam productionem ligamentum Vteri rotundum traducitur, & in muliere, vt in viro, portione carnea, quæ refert Cremafterem obuoluitur. Inceptè *Vesalius & Fallopius* pro Cremaftere mulieris, accipiunt rotunda, & inferiora Vteri ligamenta.

## MVSCVLVS VESICÆ.

CAP. XXXVII.



E vrina in Vesica coaceruata inuoluntariè prodiret, eius ceruicem musculus orbicularis exactè claudit, qui prostaticis glandulis circumiectus est. *Sylvius* Vesicæ collo post prostaticam glandulam circumdatum esse scribit. At obseruo *sphincterem Vesicæ* duos digitos latum, & reuolutum super prostaticas, quos arctè obuoluit, & amplexatur. Ideoque non tantum urinam retinere claudendo Vesicam, sed etiam urinam expellere, sese leuiter subinde constringendo, & relaxando dum micturimus: Cumq. sit glandulis prostratis superiectus, non sine ratione dubitari posset, num intersuiat seminis excretioni, si verum semen in prostaticis contineatur? ac sanè sphincter ille latus prostaticas obuoluens videtur comparatus ad expressionem seminis in actu venereo, quia si claudendæ & constringendæ vesicæ destinatus esset, dum constringitur, comprimeret prostaticas glandulas, atque sic elideret semen, si sphincter esset infra prostaticas locatus, seminis excretionem interceptet, aut eius validæ eiaculationi esset impedimento, atque laxato eo musculo enim semine vrina simul efflueret: si supra prostaticas situs esset, longè distaret à ceruice Vesicæ, quæ cingunt, & obuolunt prostaticas, ideoque cùm sit prostaticis circumiectus, istos quos proposui vsus obrinuit.

Quidam ineptè *duplicem sphincterem* constituunt. Vnum *externum* prostaticis circumfusum, *Alicuius internum obsecrum, supra prostaticas.*

Notauit *Carolus Stephanus* filamenta retinere naturam sphincteris musculi vtriusque obliqua, sursum versus exporrecta, vt facillè iudicare possis eum esse duplicem, collum Vesicæ per medium ambientem, etsi id meritò dici nequeat, munus tamen habet, quasi duo sint musculi ab vna origine filamenta vtriusque producentes: vnde nihil tibi mirum videri debebit, quod in paralyti, quæ alterum tantum latus occupat, vrina sponte non profluat, etsi tantùm hic tibi videatur vnus musculus: Fit autem hoc nervorum beneficio, qui ab vna, & item altera parte in sphinctera inseruntur.

*Sphincter autem Vesicæ* in muliere carnosus, ceruicem Vesicæ orbiculatim cingit, & in carnositate foraminis externi terminatur, quam videtur efformare. *Utriusque expulso*, sine detrusor urinæ à *Fabricio ab Aquapendente* propositus, propria est Vesicæ membrana carnosæ, fibris variis intertexta, quæ comprimendo expellit urinam.

## MUSCVLI PENIS.

## CAPVT XXXVIII.



ENIS quatuor habet musculos, utrimque binos.

*Erector* qui penem vibrat & erigit in coitu, nascitur ab interno tubere ischij, & ligamento penis atrensus, lateraliter ad medium penis corpus pertingit. *Director* potius vocandus, quia dirigit penem in osculum pudendi muliebris.

*Accelerator* non tantum ab ani sphinctere, sed etiam à tubere interno Ischij infra ligamentum penis exurgit, & cum suo pari Vrerhræ substratus, ad medium usque penem producitur. Seminis eiaculationem accelerat cum suo pari, guttas quoque vrinx in Vrethra cespitantes, sub sineu mictionis, impetuose protrudit: & quoniam in exortu suo duplex est, ideirco *Geminus* posset constitui, sed eum portionem quæ à tubere ischij prodit, tribuam podici, quam leuareorem externum ani voco: ideo *verus accelerator*, ex opinione Anatomicorum, & mea, à solo sphinctere externo emanabit.

## MUSCVLI CLITORIDIS.

## CAPVT XXXIX.



CLITORIS in mulieribus penem virilem repræsentat, propterea pares musculos obtinuit, non eidem officio inferuientes. Clitoris æmulatur penem virilem, ut mammæ in viris, mulierum mammas.

*Duo superiores rotundi* lateralibus ligamentis insident, & ab eodem loco produentes, hempte interno tubere ischij Clitoridem erigunt.

*Alij duo inferiores Latij, & Planij*, à sphinctere Podicis manant, labijs pudendi accumbentes & attensi. Conferunt partim Clitoridi erigendæ, partim Vteri labijs motandis, vel si lubet solis Vteri labijs constituendis & formandis attribuunt; & adiudicentur.

## MUSCVLI ANI.

## CAPVT XL.



*ALENVS lib. de suis. medic.* eum agit de Hæmorrhoidibus, distinguit anum à sphinctere, & vtrumque à recto intestino. Ideoque tria sedem constituunt ex *Galeno*, Intestinum, sphincter, & anus. Forsan per anum intelligit orificium intestini recti.

Ani siue Podicis nouem sunt musculi, *Sphincteres tres, & Leuatores sex*, duo Interni maiores, quatuor externi minores in circuitu podicis circumscripti, atque circumcisi.

Sphincterum alter *primus & externus, carnosus*, circularibus fibris conspersus, duorum digitorum latitudine Podicem circumdat, nec ab vlla parte vicinorum osium nascitur, nisi quod extremitati eoecygis adnectitur. *Alter musculus orbiculatim* cingens Podicis ambitum externum, *Cutaneus* est, ac *superficialis*, cuti sic adhærens, ut in labris oris vultus, latitudinem ferme vnus digiti æquat in suo circuiro, atque præcedenti connectitur, & agglutinatur.

*Tertius sphincter internus* supra primum locatus, totum intestinum rectum suecincit, & inuoluit instar vaginx, vnde *Vaginalis*, siue *Leuagann* dici posset, & fibris rectis adornatus, ad principium huius intestini porrigitur, extrinsecus ambit inte-

stinum rectum, nec potest esse membrana carnosâ intestinorum, quæ internè sita esse deberet in hoc, vt in cæteris intestinis.

*Leuatores ani sunt quatuor, duo parui externi, & totidem maiores interni: parui externi positi, nascuntur à tubere ischij, à quo penis acceleratores emergunt, & inter primum & secundum sphinctera desinunt: Nec sunt portiones acceleratorum penis sphincteri externo affixæ, Incumbunt ligamento transuerso duabus apophysibus ischij interiecto, quod instar fulcri corpus penis sustinet. Majores leuatores ani, internè siti sunt ampli & carnei, spatium occupantes spinæ Ischij & ossi Sacro interiectum, atque recto intestino lateraliter attensi vsque ad primum & externum sphinctera perueniunt.*

Præter istos leuatores reperitur, *quintus leuator ani*, siue sphincteris, *musculus gracilis*, qui coccygi & ossis Sacri extremo affigitur, frequentius occurrit in muliere, *quintum sextus gracilis & acuminatus* extensus est supra acceleratores penis.

Multi mirabuntur, cur multiplicauerim numerum musculorum ani: sed si sorditas & sordities non reuocet Anatomicos ab indagatione accuratâ huius partis, sex istos leuatores inuenient, vt vndiquaque podex, siue extremitas Recti intestini sustententur, dum In conatu egerendi protuberat, & sæpissime procidit. Scio non esse multiplicanda entia sine necessitate, sed cùm natura huius partis retinendæ admodum sollicita fuerit, & tot vincula, & retinacula carnosâ parauerit distincta, non debebant à nobis prætermitti.

## MVSCVLI FEMORIS.

### CAPVT XLI.



**F**EMUR extenditur, flectitur, adducitur, abducitur, obliquè rotatur.

*Extenditur* nobis stantibus, cùm ad perpendicularum suppositum est femur Ischio.

*Flectitur* quando antrorsum & sursum erigitur, cum spina rectum angulum faciens.

*Adducitur* cùm ad femur alterum trahitur & approximatur. *Abducitur* cùm ab altero femore distrahitur, ac recedit.

*Rotatio* femoris dicitur, quando pes totus rectus terram tangens, obliquè ducitur. Est autem duplex, *interna, & externa*. Interna dicitur cum genu intrò ad popliteum alterum vergit, & perna foras fertur: Externa est quando genu foras, perna intrò ducitur.

Femur autem flectitur à tribus musculis: *Primus Lumbaris*, siue *Psoas*, in cano abdominis vertebrarum Lumbalium corporibus superiectus; Nascitur à transuersis apophysibus duarum inferiorum dorsi vertebrarum, & supra faciem internam ossis Ilium deuectus, in paruum trochantera inseritur.

Sæpissime in viris *paruum musculum* huic supertensum inueni, qui in exortu suo minimi digiti longitudine & crassitie carnosus, gracili & plano tendine super Psoam delatus, cum Psoa & Iliaco finitur: sed eùm peruenit ad Iliacum, in aponeurosim latam, ac firmissimam latefcit, quæ Iliacum & Psoam firmiter amplexatur: ideoque in robustis hominibus additum fuisse puto, vt Psoam arctè complectatur, & in sua sede firmiter contineat. *Paruus Psoas dicitur*. In mulieribus rariùs reperitur, quàm in viris, & anno Domini 1631. videre contigit in muliere robustissima Viragine.

*Iliacus* ab interna cauitate ossis Ilium emergit, & tendone suo iunctus cum Lumbari, inter magnum & paruum trochanteras antrorsum desinit.

Tertius *Pectineus* manat à superiore parte ossis Pubis, & paulò infra ceruicem femoris antrorsum inferitur: musculus est separatus, etiam *iudicio Fallopy*, quem alij portionem Tricipitis esse volunt: Et quia non sufficiebant isti muscoli ad flectendam & erigendam molem Femoris & Tibiæ, tum quia prope caput Femoris inferebantur, ideoque minùs robusti erant, *Galenus* Tricipitem velut auxiliarem musculum

adiunxit ad flexionem Femoris, *lib. 16. de usu partium*. Sed hunc motum adiuuant, inquit *Sylvius*, Mofculi in crure antico Tibiam tendentes, orti ab offe Pubis, Ilium, Ifchij, & obiter in crus portione quadam fui inferti. Inde fit, vt nequeas extendere poplitis commiffuram, nifi simul extendas eam, quæ eft ad inguen, præterquam vbi pedem admodum attollis.

Extenditur Femur à *tribus mufculis*, qui nates conftituunt, ideo *Gloutij natiqum* *authores* appellantur. *Maximus & extimus Gloutius* à coccyge, fpinis offis Sacri, Ilium costa plufquam dimidia enatus, inferitur quatuor digitis infra trochanterem magnum, vbi eminentia quædam offis apparet.

*Secundus & medius Gloutius* ortus ab exteriori parte offis Ilium, in trochanterem magnum & externum inferitur.

Hi duo *præter Gloutij* mole fua carnea funt craffiffimi, ad fedendi commoditatem. Conferunt quoque ad tutelam & conſervationem articuli coxæ, ne dum ſcendemus, aut Femur fleximus ad angulum rectum, extrorfum luxetur. Propterea dixit *Hippocrates, lib. 2. de art. part. 26.* boues hyberno tempore, quoniam ob alimentum penuriam graciliores habent clunium mufculos, facile in Femoris luxationem incidere: contrarium euenire, quo tempore funt pinguiore.

*Tertius & intimus Gloutius* à facie Ilium offis externa, fed interna magis eductus, in verticem, fuae ſummam partem magni trochanteris implantatur. Conferunt etiam tres ifti *Gloutij* mufculi ad conſtrictionem natiqum, atque firmiorem ſtructuram podicis.

Docit Femur ad latus internum *Triceps Mufculus*, qui tres habet origines, totidemque insertiones diſtinctas, rectius quadriceps diceretur, & in quatuor mufculos ſecaretur, inquit *Fallopius*. Vnum caput oritur à parte ſuperna offis Pubis: alterum à media parte eiusdem offis: tertium ab interna parte eiusdem offis, & inferuntur in lineam Femoris poſticam. Sed *primus*, qui à diacet peſtineo, inferitur in medium femur, *Secundus* minor infra ceruicem, *Tertius maximus & intimus* tendone robuſtiſſimo ad extremum vſque Femur producitur. Fortis & valida eſt *huius mufculi actio*, introſum trahendo femora, dum arbores & antennas ſcandimus, & equitamus. Hic mufculus triceps primus illuuiem ſeroſam corporis in tibiis delabentem excipit, ratione vaſorum illac tranſeuntium, ſi quando Femur humore madefcit. Primus quoque in cadauere putreſcit.

Trahunt Femur ad latus externum *exigui mufculi*, quia tractio Femoris extrorfum non eſt admodum neceſſaria.

*Quadrigeni diſti*, quatuor funt *parui mufculi*, parte poſtica ſupra Femoris articulationem alternatim collocati.

*Primus & ſuperior quadrigeninus* cæteris longior, ac veluti Pyriformis, *Iliacus externus* ab aliis nuncupator, oritur ab imo offe Sacro & externo.

*Secundus quadrigeninus* à tubere offis Ifchij.

*Tertius* huic contiguus ab eadem parte naſcitur, & *illi tres* in trochanteris magni cavitatem inferuntur. Tres ifti mufculi quadrigenini, cauo trochanteris magni inclufi, inferuiunt etiam propellendo deorſum, ſiue prolongando femori, dum paulum extra naturalem longitudinem exporrigitur: quod obſeruabis reſupino & extenſo corpore. Eam actionem perficiunt eo modo, quo *pierygoideus internus* maxillis duabus intericctus, antroſum pellit maxillam inferiore.

*Quartus quadrigeninus quadratus*, cæteris latior & carnoſior, à tertio quadrigenino duorum digitorum latitudine diſtans, naſcitur ab interna parte tuberis Ifchij, & in partem externam magni trochanteris affigitur.

Oblique rotant Femur *Obturatores duo, Internus, & externus*.

*Internus* naſcitur ab interna circumſerentia foraminis, quod eſt in offe Pubis, ac per eum ſinum, qui eſt inter tuber Ifchij & acetabulum deuectus, triſido tendine in cauum trochanteris magni proſertur: Eius tendo ſecundo & tertio quadrigenino, qui marſupium referunt, obuoluitur & includitur, rotationem externam dirigit.

*Externus obturator*, à circumſerentia externa foraminis quod eſt in Pube, & per ceruicem femoris veluti per trochleam reuolutus, ad magni trochanteris cavitatem ſub quarto quadrigenino deſertur, rotationem internam gubernat. Mufculi poſtici Femoris, ut *Quadrigenini, Rotatores & Gloutij*, inferuiunt quoque ad regrediendum, vt docuit *Galenus*, de mufculis poſticis tibiz, *lib. 2. de uſu part. cap. 4.*

Cæterum, hoc notabis de Rotatione femoris, quod Rotatio interna est, quando calcaneum intorsum, digiti pedis extrorsum feruntur. Hæc magis videtur esse necessaria, quam externa, & expende nunc duo Rotatores inseruiunt huic Rotationi internæ pedis. Rotationem externam dirigit *Pellens*, qui inseritur ad trochanterem paruum. Istæ femoris apophyses dictæ sunt *Trochanteres*, ob musculos istis partibus affixos, qui Rotationem pedis faciunt.

## TIBIÆ MUSCULI.

### CAPUT XLII.



**T**IBIA iungitur cum Femore per gynglymum, propterea tantum mouetur *flexendo & extendendo*. Sed quia laxa est hæc articulatio, permittit etiam ad latera tibiam deducere.

*Laurentius, & alij posteriores Anatomici*, Tibiam adduci & abduci volunt, à quibusdam musculis ad hoc opus destinatis. Adducitur Tibia, siue ad alteram trahitur, ope longissimi musculi sutorij. Abducitur, siue recedit ab altera, beneficio musculi membranosi, siue fasciæ latæ. Relinquo sic partiti musculos, vel in flexores & extensores tantum diuidere.

Interea notabis ad robur, & stabilitatem stationis in erecto corpore, omnes musculos, tam femoris quam Tibiæ extensioni, atque flexioni dicatos, non ab osse femoris, sed à compage ossium Pubis Ischij, & ilium enasci, exceptis crureo, vastis duobus, atque popliteo.

Flexitur Tibia à quatuor musculis Posticis.

*Quorum primus semimembranosus* appellatur, oritur à tubere Ischij, & in posteriorem ac anteriorem Tibiam definit.

*Alter semimembranosus* ab eodem tubere Ischij egreditur, principio neruoso ac membranoso, sed latiore tendine ad internam Tibiam & posticam producitur. *Galenus lib. 2. adu. iust. Anatomic. cap. 4.* notat se uidisse musculum posticæ Tibiæ, quem puto esse semimembranosum, ruptum in Carfore, qui nihilominus stadium currendo perfecit.

*Biceps* ab eodem tubere Ischij prodit, & per Femoris externam partem delatus, circa medium Femur carneam molem assumit in homine tantum, non in simia, & unico tendine in externam Tibiam inseritur. *Galenus unicam esse musculum* voluit, *Vesalius duplicem* facit, interdum geminum origine, & sine distinctum obseruauit. Huius tendonis gratiâ Femur sinum oblongum obtinuit, læui lubricoque ligamento in crustatum, quò rutilius vehatur, & obliquè flexus non exorbitet.

Quartus vulgò *Posticus Gracilis*, oritur à linea, quæ ossium Ischij & Pubis coalitum designat, & per internam parrem Tibiæ inseritur. Hic in mulieribus obscurus, quando Femora diducunt, instar ligamenti cuiusdam, vel nerui rigidi apparet, cum in illis neruosior existat, inquit *Vesalius*.

*Popliteus* ad flexiones referendus est. Is enim latitans in cauo poplitis, supra caput Solei, à Femoris externo tuberculo in Tibiam posticam, ac superiorem obliquè inferitur, quam arcuè complectitur. Obseruauit semel *Fabritius ab Aquapendente*, *Geminum Popliteum* in utroque poplite, superiorem & inferiorem inuicem contiguos.

Extendunt Tibiam *sex muscoli*.

Primus occurrit *membranosis*, à spina superna ossis iliumeductus, in Tibiam anticam fertur, vel potius Femoris ipsiusque Tibiæ musculos succingit, propterea *Fascia lata* dicitur, quia omnes Femoris & Tibiæ musculos inuestit, excepto musculo sutorio, ad extremum usque pedem excurrente. Si aliquo humore acri pungatur, dolores aciet acerbissimos, aut sensum lassitudinis inducit. Hæc aurem membrana non est transuersum, & latè incidenda, præsertim in externa & laterali parte Femoris, sed secundum longitudinem, ne musculi motus minuatur, aut omnino deperdarur, quoniam in parte externa, & suprema ossis Perones, firma & veluti cartilaginea adhæsiōne obfirmatur. Ideoque foris Tibiam trahere, vel abducere perhibetur.

*Longus*, siue *Sutorius* à spina superna & antica costæ ossis Ilium oritur, & per interiora Femoris oblique delapsus, in Tibiam internam desinit, quam adducere dicitur, & alteri superimponere more futurorum.

*Relius Gracilis* ab inferna spina ossis Ilium natus, & secundum longitudinem Femoris rectè protensus, in Tibiam anticam infra epigonarum desinit. Hoc læso musculo moriendum esse statuunt, inquit *Banhuus*, quod est falsum.

*Vastus* duo Recto gracili utrimque adiacent, quorum *alter externus* à radice trochanteris magni emergit, & in Tibiam paulò infra patellam externè cessat, *Alter Internus* à radice trochanteris parui oritur, & in Tibiam internam paulò infra patellam incidit.

*Crureus* vastis duobus subiectus, ab osse Fembris antico prodit, inter duos trochanteras, totique cruri adhærens tendonem suum supra epigonatim ad Tibiam anticam producit.

Quatuor isti muscoli, *Relius*, *Gracilis*, *Vastus*, & *Crureus*, circa genu simul vincti, vnicui efformant tendonem latissimum & robustissimum, quò patella obuoluitur. Interim obseruabis extendentes Tibiam Musculus, siccantibus esse robustiores, ut sustineant molem, & pondus corporis dum stant.

## PEDIS, SIVE TARSII MUSCULI.

### CAPUT XLIII.

**P**ES, ut Manus in tres partes diuiditur, Tarsum, Metatarsum, & Phalangem digitorum, atque ut in manu Carpus mouetur immoto Metacarpio, ita in Pede Tarsus mobilis est immoto Metatarso. Ideoque Tarsus flexitur, cum mouetur antrosum, Extenditur cum retrorsum agitur.

Flexunt duo Musculi Antici, *Tibicus*, & *Peroneus*.

*Tibicus Anticus* à Tibiz superna epiphysi prope fibulam exortus, toti Tibiz adhærens, circa medium os in tendonem abit, qui sub ligamento annulari Pedis in duos tendones scinditur, quorum *alter* in os primum innominatum inseritur: *Alter* ad os metatarsi Pollici præpositum protenditur. Malè igitur *Vesalius contra Galenum* negauit duplicem tendonem emittere. Hic & *Tibicus posticus*, quò parte reßectuntur sub tarso, siue pedio, cartilaginem & ossiculum sesamoides obtinuerunt.

*Peroneus Anticus* iunctus est Peroneo postico, in exortu suo, quamuis per fissuram malleoli externi ambo tendones traducantur, in fine & insertione sunt separati. Anticus oritur à media & externa parte Perones, & per fissuram malleoli externi deueniens, inseritur antrosum in os metatarsi, quod minimum digitum sustinet. Qui Pedem extendunt musculi sunt robusti, & oppositi robore iis qui extendunt Tibiam, ut firma sit statio & erectio corporis ad perpendicularum: Et quia innixus sit & Pede & Calcaneo, ideo extendentium, Alij Calcaneo insiguntur, Alij ad Pedium excurrunt.

Extenditur Pes à Musculis posticis.

*Primi & extremi sunt Gemelli*, quia mole, robore, & actione pares, qui etiam *Gastrocnemij* dicuntur, quia ventrem suræ constituunt, quorum *unus Internus* in latere interno Tibiz positus. *Alter externus* latus externum Tibiz occupat.

*Internus Gastrocnemius* ab interno femoris condylo oritur.

*Externus Gastrocnemius* ab externo condylo nascitur. In principio disuncti, tandem in vnum ventrem coalescunt, qui valido tendine ad calcem posticum profertur. Singulis eorum principiis *primus Vesalius* obseruauit singula ossicula sesamina apposita, sæpius alterum deficit, auctore *Fallope*. Ut læui lubricaque sua superficie, dum ossi & musculo interiecta sunt, impediunt ne in cruris directione musculi atterantur, aut ab osse lædantur.

*Plantaris* inter Gemellos & Soleum latitans, oritur ab externo condylo femoris superne carnosus, mox gracillimo & oblongo tendine non in calce terminatur, sed ex *Galeno libro tertio de usu partium*, cap. 11. sub calcaneo lateraliter traductus, iuxta

malleolum internum in plantam Pedis diffunditur: *am* in Pede, vt in manu eodem officio fungitur, vt Pes respondeat manui, & dum Pes cauius efficitur cutis tendonibus subiectis firmiter agglutinetur.

*Soleus* latus & crassus, musculus à Tibia superna originem sumit, vel à Tibiæ & perones superna & postica commissura, atque tendone cum gemellis mixto, in calcem posticum inseritur. Sub Soleo insignia vasa, Venæ, Arteriæ, & Nervi traducuntur. Inde fit, vt dolores Gastrocnimij sint profundi & diuturni.

Ex Gemellis & Soleo parte inferiore simul coalescis, constituitur *Communis iste Tendo* crassissimus & robustissimus, quem *Hippocrates Chordam vocans magnam*. Cum partibus principibus societatem habet, vnde contusus hic tendo & scilicet fibres continuas & acutissimas mouet, singultus excitat, mentem perturbat, tandemque mortem accessit. Calcaneum, inquit *Hippocrates*, societatem habet cum venis & nervis insignioribus. Nam posterior tendo ei necitur, ad eius fracturam suas fibres acutæ, continuæ, tremulæ, singultuosæ, paucorum dierum, denique mortiferæ. Idem *lib. 9. Epid. hist. 48.* exemplum adfert adolescentis, qui quod citato cursu per viam asperam calcem offendisset, intra viginti dies obiit. *Achilles* hac tantum parte mortalis erat. Hic tendo propter calcanei proiecitur paulò ante insertionem à Tibia abscedit, & cauitatem vacuum efformat, per quam etiam lanij baculo transmissio integra brutoium corpora in macello suspensa ponunt. Hæc cauitas est per quam *Achilles* funem in *Hectoris* pedibus traiecit, vt ad currum religatum circa moenia *Troia* traheret, vbi cecinit *Homerus*.

Pedem extendunt duo *Pollicii Masculi*.

*Tibiens posticus* oritur à superna Tibiæ, & toti Tibiæ affixus, per interni malleoli fissuram duos producit tendones, quorum *alter* scaphoide osse terminatur: *Alter* ad primam os innominatum produciunt.

*Peroneus posticus* à superna & postica parte perones proficiscitur, & per fissuram malleoli externi cum antiquo peroneo delatus, in os Metatarsi sustinens pollicem, sub planta pedis suum tendonem latum, durum ac veluti coriæ agineum transmittit, sub capite tendinoso illius massæ carneæ, quæ producit in ossiculos internos. Masculi *Peroneus anticus*, & *posticus*, vt origine sunt distincti, sic insertionem, quamvis per trochileam malleoli externi traducuntur. Sed alterius flexoris peronei tendo, externe in os Metatarsi sustinens minimum digitorum inseritur. Alterius peronei extensoris & pollicis tendo vterius internè sub pedio profertur. Ista duo tendones diuersis vaginis neurochondroideis inclusi separantur.

## MVSCVLI DIGITORVM PEDIS.

### C A P V T XLIV.



**D**IGITI Pedum proprios habent musculos ad flexionem, & extensionem, motumque lateralem comparatos, quorum tendones annulari & transuerso ligamento infra malleolos circumiecto comprehenduntur, vt in Carpo manus.

Extenduntur à *Longo*, & *Breui*.

*Longus Digitorum tensor*, siue *Crimodactylens*, oritur ab antica tibia & interna, quâ parte fibula iungitur. Sub stylio antico reconditus, recta secundum longitudinem fibula descendit, & annulare ligamentum præteruectus, in quatuor digitorum tres articulationes exporrigitur, vt quatuor digitorum tres articulos simul extendat.

*Breuis Digitorum tensor*, siue *Pedicus* à pterna astragaliqque vicini parte externa & superna emergeit, & superiori substratus, suis tendonibus in omnes primi, internodij articulos inseritur. Tendones horum musculorum tam longi, quàm breues, supra Metatarsi sum de eussatim sese intersecant.

Digiti flexuntur à *duobus*, *Breui* & *Longo*, qui respondent manus muscularis, *Profundus*, & *Sublimis*.

*Longus Digitorum flexor*, siue *Perodactylens*, à parte postica, & superna perones conascitur, & sub malleolo interno per calcis sinum peculiarem transducitur, in quatuor

tendones finditur, qui per fissuras tendonum brevis digitorum flexoris trahuntur, ut in manu, & in quatuor digitorum tertium articulum inferuntur.

*Brevis digitorum flexor*, siue *pediculus internus*, vel *permodiculus*, nascitur ab interna & inferna parte calcis, & quadripartitus in secunda digitorum articulatione terminatur. Eius tendones perforantur, ut longi digitorum flexoris tendonem transmittant.

Præterea, pedis digiti ducuntur ad latus per *Interossea*. Octo sunt, quatuor interni, totidem externi, qui non eodem modo se habent in pede, ac in manu. Externi ositi à spatii ossium metatarsi lateraliter inferuntur in primam digitorum phalangem. *Fallopianus* flexioni digitorum inferuire putat, quia extensio in pede non est à deo necessaria, ut in manu, sed errat, dum secundam & tertiam articulationem digitorum extendi statuit à musculis lumbricalibus, qui non à tendonibus longi digitorum flexoris oriuntur, ut in manu, sed à mole carnea, quæ sub breui digitorum flexore latitat. Hæc aotem à pterna nascitur. Huic opinioni *Vesalius* subscribit. Sont autem *lumbricales musculi* quatuor in pede, ut in manu, minores tamen atque breviores. *Interossei interni* in cauo pedis siti, ossibus sunt attensi, & à massa carnea, quæ cauum illud ossium metatarsi occupat & opplet, videntur nasci: sed membrana detracta ab vno principio necroso acuminato iuxta pternam internè affixo, & in quatuor tendines filis educuntur, & desinunt in secundam articulationem, quibus lumbricales musculi adhaerescunt. At *interossei externi* spatia ossium metatarsi occupant.

## MUSCVLI POLLICIS.

### CAPVT XLV.



**P**OLLICIS *Flexor* longo digitorum tenfori adiacens, carnosus prodit à superna parte fibulae, quæ cum tibia iungitur, & sub malleolo interno & planta pedis progrediens, in os primum pollicis interitur, & priusquam ad secundum os perueniat, sesamoides ossiculum præponitur, atque tendo duobus ossiculis sesaminis grandioribus ad securitatem est interceptum. Nonnunquam sub planta pedis in *duos tendones* dirimitur, vnum pollicis, alterum secundo digito suppeditat: Tum flexor longus digitorum in tres tantum diuiditur.

*Extensor Pollicis* nascitur à tibiæ externo latere ubi dehiscit à fibula, ac per pedis superiora prorepens, in totum pollicem parte superiore inferitur. Interdum *tendo bifidus* est, quorum *alter* in vltimum magni digiti articulum: *Alter* in os metatarsi pollicis substratum desinit.

Pollex, & minimos digitus *duos habent notabiles musculas* extrinsecus sitos, qui digitos illos abducent, itaut *alter* ossi metatarsi, quod suppositum est pollicis foris attentus, nominetur *abductor pollicis*. *Alter* quinto metatarsi ossi extenè superiectus *abductor minimi digiti* dicatur. Respondent *Thenari* & *Hypothenari* manus.

Præterea, Pollex in planta pedis *alium musculum habet transversum*. Antithenari similem, qui à ligamento ossis metatarsi, quod minimo aut proximo digito subiectum est enatus, obliquè supra alia ossa incedens, tendine robusto in primum pollicis articulum internè desinit: Hic opponitur *abductor*, ut pollicem retrahat.

Detracta carne, membrana trifida, vel quadrifida deprehenditur, existimo esse *massam* illam carneam, cauum illud plantæ pedis opplentem.

In ima parte pedis quæ vestigium vocatur, *Carnea Massa* continetur, quæ illud primorum internodiorum spatium & cauum occupat, vnde volunt produci tendones ad singulos digitos. Huius carnis, firmandis potius digitis, & eorum primis articulationibus interscè colligandis, quàm mouendis vsum esse puto, quinctiam mollis puluaris instar, tendonibus aliorum musculorum substermitur.

In planta pedis, demptis tendonibus musculorum digitorum flexorum, exiguus *musculus transversus* reperitur, supra primam digitorum articulationem protensus, qui à pollice vsque ad minimum digitem exporrigitur. Non tam colligandis primis digitorum ossibus appositum esse reor, quàm mollis puluilli, aut stœbes vicem obtinere, ne tendones terræ, & ossium duritie pressi læderentur.



ANACEPHALÆOSIS MVSCVLORVM  
totius Corporis, à Capite ad Pedes.

## CAPVT XLVI.

**M**VSCVLORVM sylvam prout à nobis diffecatur, & demonstratur; paucis enumerabo, vt inspectâ hâc tabellâ, singulorum nomina, omniumque numerum facillimè quisque comprehendat.

Vniuersum Corpus in tres partes integrantes, *Caput, Truncum, & Artus* dirimam. Ad Caput reuocabo collum. Truncus complectetur Ventrem, & eos qui continentur in Ventre musculos. Artus sunt duo, Manus, & Pedes. Cùm autem nostri corporis partes Geminæ sînt, vnus tantùm lateris musculos enumerabo.

{ Occiput. 1. *Occipitalis.*  
{ Supercilium. 1. *Frontalis.*

Auriculam. { externam. 4. *proprius. tres communes, qui sunt portiones frontalis & latissimi internæ sîti.*  
3. {  
Aurem { internam 2.

Palpebras, { superiorem. { *Attollens proprius, & dimidia pars orbicularis Musculi.*  
4. { 2. {

{ inferiorem. { *Dimidia pars Musculi orbicularis.* { *Vtrique palpebra communis est.*  
1. { *laris.* { 1. *Ciliaris.*

{ *Attollens.*  
Oculum 6. { *Deprimens.*  
{ *Adducens.*  
{ *Abducens.*  
{ *Obliquus maior.*  
{ *Obliquus minor.*

Nasum. { 1. *externus.* { *Erector nasi.*  
3. { 1. *externus.* { *Dilatator ale.*  
{ 1. *internus.* { *Constrictor nasi.*

Super Caput  
& Collū 64.  
Musculi collocati sunt,  
quorum alij  
referuntur, Ad

Labrum { superius { 1. *Attollens.* { *Vtrique communes sunt.* { 1. *Zygomaticus.*  
2. { 1. *Deprimens.* { 1. *Bucca.*

{ inferius { 1. *Attollens.* { 2.  
2. { 1. *Deprimens.* { *Adde sphincterem oris, siue orbicularem.*

Maxillam infernam 6. { Attollentes { 1. *Temporalis.*  
{ 2. { 1. *Pterygoideus internus.*

{ Deprimentes { 1. *Digastricus.*  
2. { 1. *Musculus Latius.*

Pellens antrorsum. { 1. *Pterygoideus externus.*  
Circumagens. { 1. *Masseter.*

|                         |                                         |                         |                                       |                                                                                               |                                    |                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Os hyo-<br>oides        | {                                       | Erigentes.              | {                                     | 1. <i>Mylohyoideus</i> .                                                                      |                                    |                                                 |
|                         |                                         | 2.                      |                                       | 1. <i>Genyohyoideus</i> .                                                                     |                                    |                                                 |
| 5.                      | {                                       | Deprimens. 1.           | <i>Sternohyoideus</i> .               |                                                                                               |                                    |                                                 |
| {                       | trahentes ad<br>latus 2.                | {                       | supernum.                             | { 1. <i>Styloceratoideus</i> .                                                                |                                    |                                                 |
|                         |                                         |                         | infernum.                             |                                                                                               | 1. <i>Coracohyoideus</i> .         |                                                 |
| {                       | Linguam 6.                              | {                       | 1. <i>Genyoglossus exerens</i> .      | {                                                                                             |                                    |                                                 |
|                         |                                         |                         | 1. <i>Basilglossus</i> , deprimens.   |                                                                                               |                                    |                                                 |
|                         |                                         |                         | 1. <i>Ceratoglossus</i> , trahentes   |                                                                                               | ad latera.                         |                                                 |
|                         |                                         |                         | 1. <i>Styloglossus</i>                |                                                                                               |                                    |                                                 |
| Laryn-<br>gem 7.        | {                                       | Communes.               | 2.                                    | {                                                                                             | 1. <i>Hyothyroideus erigens</i> .  |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       |                                                                                               | 1. <i>Bronchius deprimens</i> .    |                                                 |
|                         | {                                       | Thyroi-<br>dem.         | {                                     | Dilatans 1. <i>Cricothyroideus anticus</i> .                                                  |                                    |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | Contrahens 1. <i>Cricothyroideus lateralis</i> .                                              |                                    |                                                 |
|                         | {                                       | Proprij<br>5.           | {                                     | Aryta-<br>noidem.                                                                             | {                                  | Aperiens 1. <i>Cricocarytanoides posticus</i> . |
|                         |                                         |                         |                                       | Claudens 2. { <i>Thyroarytanoides</i> , siue <i>Glos-<br/>idens</i> .<br><i>Arytanoides</i> . |                                    |                                                 |
|                         | {                                       | Pharyngem.<br>3.        | {                                     | 1. <i>Sphenopharyngeus</i> .                                                                  | {                                  |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | 1. <i>Stylapharyngeus</i> .                                                                   |                                    |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | 1. <i>Cephalopharyngeus</i> .                                                                 |                                    |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | Adde <i>Oesophagum impari</i> .                                                               |                                    |                                                 |
| {                       | Gargareonem<br>2.                       | {                       | 1. <i>Pterystaphylinus externus</i> . | {                                                                                             |                                    |                                                 |
|                         |                                         |                         | 1. <i>Pterystaphylinus internus</i> . |                                                                                               |                                    |                                                 |
| Caput<br>7. quo-<br>rum | {                                       | Antrosum<br>fleat.      | {                                     | 1. <i>Massoideus</i> .                                                                        |                                    |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | Interdum aliter brevis in collo situs.                                                        |                                    |                                                 |
|                         | {                                       | Retrosum<br>erigunt 6.  | {                                     | 1. <i>Splenius</i> .                                                                          | {                                  |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | 1. <i>Complexus</i> .                                                                         |                                    |                                                 |
|                         | {                                       | 2. <i>Recti</i> .       | {                                     | maior.                                                                                        | {                                  |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | minor.                                                                                        |                                    |                                                 |
|                         | {                                       | 2. <i>Obliqui</i> .     | {                                     | maior.                                                                                        | {                                  |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | minor.                                                                                        |                                    |                                                 |
|                         | Collum<br>4.                            | {                       | Antrosum<br>fleat.                    | 2.                                                                                            | {                                  | 1. <i>Longus</i> .                              |
|                         |                                         |                         |                                       |                                                                                               |                                    | 1. <i>Scalenus</i> .                            |
| {                       |                                         | Retrosum<br>erigunt. 2. | {                                     | 1. <i>Semispinatus</i> .                                                                      | {                                  |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       | 1. <i>Transversarius</i> .                                                                    |                                    |                                                 |
| Thora-<br>cem 18.       |                                         | {                       | dilatant 14.                          | {                                                                                             | 1. <i>Subclavius</i> .             |                                                 |
|                         |                                         |                         |                                       |                                                                                               | 1. <i>Serratus minor anticus</i> . |                                                 |
|                         | 1. <i>Intercostales externi</i> .       |                         |                                       |                                                                                               |                                    |                                                 |
|                         | <i>Serratus posticus superior</i> .     |                         |                                       |                                                                                               |                                    |                                                 |
|                         | Adde <i>Diaphragma impari</i> musculum. |                         |                                       |                                                                                               |                                    |                                                 |

Duplicando istum numerum muscularum dimidium 64. obtinebis 128  
musculos in capite & collo sitos. Sed tres sunt impares.

Duplicando istum numerum muscutorum dimidium 64. obtinebis 128.  
musculos in capite & collo sitos. Sed tres sunt impares.

|                                                                                                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Trun-<br>co 46.<br>musculi<br>continen-<br>tur, quo-<br>rum alij<br>pertinent,<br>Ad           | contra-<br>hant | 15.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sacrolumbus.</li> <li>1. Triangularis, siue pectoralis internus.</li> <li>11. Intercostales interni.</li> <li>3. Serratus posticus inferior.</li> </ul>                          |
|                                                                                                   | Abdomen         | 5.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obliquus descendens.</li> <li>Obliquus ascendens.</li> </ul>                                                                                                                        |
|                                                                                                   |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rectus.</li> <li>Transuersus.</li> <li>Pyramidalis.</li> </ul>                                                                                                                      |
|                                                                                                   | Testiculum      | 2.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cremaster.</li> <li>1. Membrana Carnosa Dartos.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                                                                                   | Penem           | 2.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. erector.</li> <li>1. accelerator.</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>In mulieribus Clitoris pares habet musculos.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                                                                                   | Vesicam         |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sphincter.</li> <li>2. Lenatores.</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                                                                                                   | Anum            | 3.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Externi quatuor.</li> <li>Interni duo.</li> </ul>                                                                                                                                   |
|                                                                                                   |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Sphincteres.</li> <li>Externus latior carnosus, externus Cuiusdam, internus.</li> <li>Latior, Vaginalis.</li> </ul>                                                              |
|                                                                                                   | Lumbos & Dorsum | 3.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erigentes.</li> <li>1. Flectens.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                                                                                   |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spinatus.</li> <li>Sacer.</li> </ul>                                                                                                                                                |
|                                                                                                   |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Triangularis, siue quadratus cum abdominis musculo obliquo ascendente.</li> </ul>                                                                                                   |
| Ad compagem ossium Ilium non sunt noui musculi : sed                                              |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>mouent</li> <li>antrorsum</li> <li>mouent</li> <li>retrosum</li> </ul>                                                                                                              |
|                                                                                                   |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Obliqui descendentes abdominis.</li> <li>2. Recti abdominis.</li> <li>2. Spinati.</li> <li>2. Sacri.</li> </ul>                                                                  |
| Geminato numero 46. Musculorum dimidiati Trunci, reperies 86. Musculos, sed quinque sunt impares. |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Manus<br>Musculi<br>sunt, 56.<br>quorum<br>alij perti-<br>nent, Ad                                | Omoplatam       | 4.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Trapezus diuersos edens motus.</li> <li>1. Lenator proprius, erigens.</li> <li>1. Rhomboides, trahens retrosum.</li> <li>1. Serratus minor anticus, trahens antrosum.</li> </ul> |
|                                                                                                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   | Brachium        | 9.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>sursum</li> <li>3.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deltoidei.</li> <li>Supraspinatus.</li> <li>Latissimus.</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                                                                                   |                 | deor-<br>sum 3.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotundus maior.</li> <li>Pectoralis.</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   |                 | antror-<br>sum 2. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coracoideus.</li> <li>Infra-spinatus.</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   |                 | retro-<br>sum 3.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotundus minor.</li> <li>Immersus.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                                                                                                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                            |

|                          |   |                            |                                                                                         |                                            |  |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Cubitus<br>6.            | { | Flectunt<br>2.             | { <i>Biceps.</i><br><i>Brachius internus.</i>                                           |                                            |  |
|                          |   |                            | { <i>Longus.</i><br><i>Brevis.</i>                                                      |                                            |  |
|                          |   | Extendunt 4.               | { <i>Brachius externus.</i><br><i>Angulus.</i>                                          |                                            |  |
| Radius<br>4.             | { | Pronant<br>1.              | { <i>Rotundus.</i><br><i>Quadratus.</i>                                                 |                                            |  |
|                          |   | Supināt<br>2.              | { <i>Longus.</i><br><i>Brevis.</i>                                                      |                                            |  |
|                          |   |                            |                                                                                         |                                            |  |
| Carpum<br>4.             | { | Flectunt<br>2.             | { <i>Cubitus</i><br><i>Radius</i>                                                       | { <i>interni.</i>                          |  |
|                          |   | Extendunt 4.               |                                                                                         |                                            |  |
|                          |   |                            | { <i>Cubitus</i><br><i>Radius</i>                                                       | { <i>externi.</i>                          |  |
| Digiti 18.<br>quorū alij | { | Flectunt<br>2.             | { <i>Sublimis.</i><br><i>Profundus.</i>                                                 |                                            |  |
|                          |   | Extendunt 3.               | { <i>Communis.</i><br><i>Indici Proprius.</i><br><i>Auriculari Proprius.</i>            |                                            |  |
|                          |   |                            |                                                                                         |                                            |  |
|                          | { | adducūt<br>& abducunt      | { <i>6. Interossei.</i><br><i>4. Lumbricales.</i>                                       | { <i>3. Externi.</i><br><i>3. Interni.</i> |  |
|                          |   |                            | { <i>Adductor indicis.</i><br><i>Abductor auricularis, siue hypothenar auricularis.</i> |                                            |  |
|                          |   |                            |                                                                                         |                                            |  |
| Pollicem                 | { | Volam<br>2.                | { <i>Palmaris.</i><br><i>Caro Musculosa quadrata, siue Carpius.</i>                     |                                            |  |
|                          |   | extendunt<br>2.            | { <i>Longus.</i><br><i>Brevis.</i>                                                      |                                            |  |
|                          |   | flectit<br>abducit         | { <i>unicus flexor pollicis.</i><br><i>Thenar.</i>                                      |                                            |  |
|                          | { | adducit                    | { <i>Antithenar.</i>                                                                    |                                            |  |
|                          |   | ad alios digitos 4. trahit | { <i>hypothenar pollicis.</i>                                                           |                                            |  |
|                          |   |                            |                                                                                         |                                            |  |

Si duplicaueris istum numerum 52. inuenies pro ambabus manibus Musculos 104.

|                                    |   |                              |                                                                                        |  |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Femur 15.<br>quorum alij<br>mouent | { | antrorsum<br>flexendo<br>3.  | { <i>Psoas.</i><br><i>Iliacus.</i><br><i>Pectineus.</i>                                |  |
|                                    |   | retrosum<br>extendendo<br>3. | { <i>Glenius maximus.</i><br><i>Glenius medius.</i><br><i>Glenius minimus.</i>         |  |
|                                    |   | ad latus in-<br>ternum<br>4  | { <i>Quadriceps origine &amp;</i><br><i>insertione distinctus.</i>                     |  |
|                                    | { | ad latus ex-<br>ternum<br>4. | { <i>Quadrigemi, Primus</i><br><i>Secundus, Tertius,</i><br><i>Quartus latissimus.</i> |  |
|                                    |   |                              |                                                                                        |  |
|                                    |   |                              |                                                                                        |  |

{ rotando { externè, *obductor internus*,  
 2. { internè, *obductor externus*.

|                                                                                       |                                 |                                                          |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totius<br>Pedis<br>Muscu-<br>li sunt<br>56. quo-<br>rum alij<br>pertin-<br>ent,<br>Ad | Tibiam<br>12.                   | {<br>ascendo.<br>5.                                      | { <i>Seminervosus.</i><br><i>Seminembranosus.</i><br><i>Gracilis internus.</i><br><i>Biceps.</i><br><i>Popliteus.</i>                           |
|                                                                                       |                                 |                                                          | { <i>Gracilis reflexus.</i>                                                                                                                     |
|                                                                                       | {<br>extendendo.<br>6.          | {<br>Vassi duo.                                          | { <i>Externus.</i><br><i>Internus.</i>                                                                                                          |
|                                                                                       |                                 |                                                          | { <i>Cruentus.</i><br><i>Membranosus, siue fascia lata: istos duos alij mo-<br/>tus laterali destinant cum</i><br><i>Longus, siue futorius.</i> |
|                                                                                       | {<br>ascendentes<br>2.          | {<br>Peroneus.<br>Tibiens.                               | { <i>Postici.</i>                                                                                                                               |
|                                                                                       |                                 |                                                          | { <i>Gemelli duo</i> { <i>internus.</i><br><i>Soleus.</i> { <i>externus.</i>                                                                    |
|                                                                                       | {<br>ascendentes<br>2.          | {<br>Plantaris.<br>Peroneus.<br>Tibiens.                 | { <i>Antici.</i>                                                                                                                                |
|                                                                                       |                                 |                                                          | { <i>Longus, siue sublimis aut Perodactylus.</i><br><i>Brevis, siue Pedius internus, aut Pterodactylus.</i>                                     |
|                                                                                       | {<br>ascendentes<br>2.          | {<br>Longus, siue Enimodactylus.<br>Brevis, siue Pedius. |                                                                                                                                                 |
|                                                                                       |                                 |                                                          | { <i>Adductores &amp; 3. Interossei.</i> { <i>4. Externi.</i><br><i>Abductores</i> { <i>4. Interni.</i>                                         |
| Pollicè<br>4.                                                                         | {<br>abducens 1.<br>adducens 1. | {<br><i>Thenar.</i><br><i>Antubonar.</i>                 |                                                                                                                                                 |
|                                                                                       |                                 |                                                          | { <i>abducit minimum digitum hypobonar, adeest etiam caro musculosa.</i>                                                                        |

Duplicato numero 57. musculorum, qui in vno pede reperiuntur, habebit pro quobus pedibus 114. & ex omnibus illis numeris simul collectis, efficitur 431. qui numerus est musculorum humani Corporis, quos in *Myologia & Myotome* declaravi, & quotannis soleo demonstrare.

## ARTVM ANGEIOTOME.

### CAPVT XLVII.



Vm nostrum Corpus tam in externis, quàm internis partibus geminatum existat, administratis dimidij corporis Musculis, in altera parte quæ integra est, Venas, Arterias & Nervos, quæ in artus distribuuntur, simul inuestigabis. Sunt enim ita inuicem connexa & communi membrana iuoluta, ut raro seiuncta reperiuntur. Galenus post administratam Musculorum dissectionem, artiarum, venarum & nervorum Anatomen subiunxit, hortaturque iuvenes qui rebus Anatomicis delectantur, ut

in hæc primùm se exerceant, cùm spectent quotidie Medicos, qui sciunt quot & quales in Corde sint membrae, vel quot Lingua musculos habeat: si tamen ignorant exteriorum structuram, in præsignis & affectuum istas partes infestantium curatione Chirurgica, vehementer aberrare: Eos verò qui spectis partibus internis, externas accuratè cognoscunt, eleganter suum munus obire.

Itaque mauult *Galenus*, iuuenes istis rebus primùm instructos esse, tum quod earum vsum necessarium videat, tum quod ignorationis nota tantò grauior sit, quantò cognitio vt ipsi opinantur, breuior est. Idcirco *Galenus* libros de *usa partium*, & *adum.* *Anat.* à partibus externis inchoauit, quarum musculos & vasa quæ in artus fiunt, primùm descripsit, veluti partem doctrinæ Anatomice seu dignissimam ad artis opera peragenda, cui primùm tyrones incumbere debeant.

*Ramus Subclauus* cùm ad Axillas peruenit, mutato nomine *Axillaris* dicitur, totusque in duas venas distribuitur, *Cephalicam*, & *Basilicam*.

*Cephalica* in brutis, à iugulari externa nascitur, in homine ramulum sæpius acquirit à iugulari externa. Superiorem & anteriorem brachij partem perreptat vsque ad cubiti flexuram, ubi in duos *Ramos* finditur: quorum alter cum *Ramo Basilica* cœnit, tribus digitis infra flexum cubiti, veram *Medianam* constituit: Nam quæ propè flexum cubiti obliquè productæ secantur, sunt portiones *Cephalica*, aut *Basilica* concurrentes ad veram *Medianam* effingendam.

Alter *Cephalica* *Ramus* per longitudinem Radij iuxta carpum, ad manus metacarpium externè producit, quam ferè totam irrigat, & potissimum eam partem quæ inter paruum digitum, & annularem intercedit, quo in loco *Arabes* suam *Saluatellam* collocant, cuius apertionem in affectibus melancholicis ex *Arabum doctrina* commendant *nostri Practici*. Sed hoc remedium vt inutile & superstitiosum damnat *Aretæus*, lib. 2. acuterum morborum cap. 2. cùm ipsa *Saluatella* sit venarum cubiti soboles: propterea *Galenus*, libro de vena sectione, statuit affecto lieni non æquè conferre venam incisam, quæ inter annularem digitum & minimum consistit, atque si internam cubiti venam secueris.

*Postiores Græci* forsitan *Arabum* opinionibus imbuti, sectionem *Saluatellæ* laudant, vt *Paulus Aegineta*, *Trallianus*, qui affirmat quantuluncumque sanguinis è *Saluatella* detraxerit, plurimum conferre lieni. De hac quæstione tractarunt *Valesius lib. 7. Centrose. f. Antiquus* in *Epist. Medic. Spiegelus* notat se in manibus obseruasse mortuas *Anastomoses* Vênæ *Saluatellæ* cum arteriis vicinis: pares etiam venarum & arteriarum *Anastomoses* in pedibus vidisse, ne calor extremarum partium à Corde distitarum langueret: Ideoque secta *Vena Saluatella*, ex iactura sanguinis venosi & arteriosi, utroque refrigeratur, in centro corporis ventilatus. Adde quod arterialis à trunco *Aortæ* profliens, secundum longitudinem, & basim *Diaphragmatis* defertur ad *Lienem*.

*Basilica* per inferiorem & interiorem humeri partem procedit, comitem arteriam & nervos adiunctos habens. In sinistro brachio *Lienalis*. In dextro *Hepatica* nuncupatur ab *Antiquis*. In suo statim exortu *Thoracicam* producit, quæ tripartita aut quadripartita, ad latum internum Serrati minoris traducitur, intercostalibus venis verarum costarum affixa, ad latera prope spinam *Ramulis* *venis* *Azyga* per *Anastomosis* occurrat.

*Basilica* prope flexum cubiti in *Subclauicam*, & *Profundam* diuiditur. *Profunda* arteriæ axillari & nervo semper attenfa est supra cubiti flexum, non autem infra, ubi *Ramus* porrigit, qui iunctus alteri *Ramo Cephalicæ* *Medianam* constituit. Deinde inter cubitum & radium delapsa, in partem anteriorem cubiti profertur, vsque ad manum excurrent. *Subclauica* prope cubiti flexorem, in anteriorem cubitum contorta, per eius longitudinem ad manum defertur.

*Vena Mediana* ex duobus ramulis *Cephalicæ* & *Basilicæ* tribus digitis infra cubiti flexuram vnitis conflata, per mediam cubiti interni regionem ad manum internam proteritur.

Cæterùm, cùm venæ omnes brachij, quæ hodie secantur, ab eodem trunco, nimirum axillari prodeant, frustra laboratur in electione venarum, vt admonent *Perniculus*, *Pesalius*, & *Fallopis*: & ipsæ *Galenus*, curiosum hunc venarum delectum neglexit lib. 3. *adum.* *Anat.* cap. 6. & lib. de vena sect. cap. 18. *Galenus* sententiam confirmat *Oribasius* lib. 7. *Collectaneorum* cap. 5.

Attamen Hippocrates videtur quandam delectum habuisse Venarum. Nam lib. de Natura hominis, mentionem facit pro diuersis affectibus phlebotomiz, quæ fit *lib. de vitæ ratione in morbis acutis*, suadet in pleuriticis & peripneumoniacis affectibus, secare Venam brachij, *lib. de diffinitione morborum*, ut alibi secat, *lib. de morbis acutis*, vel *lib. de morbis acutis*, & *lib. de morbis acutis*. Per internam Venam, intelligit eam quæ vocatur hodie Basilica, per externam intelligit humeralem Venam, quæ lib. de locis in homine nominatur dicitur, ut lib. de off. nat. inopem, ab Epomide, quam perperat. Huius Venæ sectionem periculosam esse tradit ratione nervi vicini cui connectitur: quem imitari Orisafius, & Albiuanus, huius venæ sectionem periculosam esse statuunt, cum tamen nulla sit securior, quia caret arteria coniuge, & nervo comite.

Hippocrates libro primo de Morbis, in pleuritide consulit secare *lib. de morbis acutis*, vel *lib. de morbis acutis*, in manu, prout motus in alterutrum latas inclinaret. *Aristoteles lib. 3. de historia animalium ex Diogene Apollonata*, Lienarem & Iecorariam scribit esse summitates Venæ cauz, quæ sub axillam in brachia deferuntur.

Interea notabis nomina Venarum, ut Basilicæ, Cephalicæ, quamvis Græca, à recentioribus imposita fuisse, nec apud posteriores Græcos extare. *Galenus lib. de Venæ sectione* accuratius distinguit locos, ideoque Venas, ex quibus sanguis potius detrahitur, quam ex aliis. Tres sunt, inquit, loci mittendi è cubito sanguinis, Interior, Exterior, Medius: Interior vilis est iis, quibus inferiores Colli partes patiuntur. Exterior in iis, quibus superiores partes laborant, ut facies, aut Caput: Medius locus interdum utraque habet diductas Venas in vltiorem brachij partem, ac deinde coeunt in ipso flexu cubiti, ubi nonnunquam altera obscura est, altera manifesta. Itaque ubi Vena quæ parti affectæ propria est, obscurior fuerit, Mediarum aliquam incidet, quæ à propria deriuatur, & si in cubiti flexu nulla conspiciatur, eas quæ sunt in vlna secabis. Itaque ex Galeno non debemus esse admodum religiosi in electione Venarum, si desit locus eligendi eam, quam desideramus venam.

Nihilominus Cephalica secta, propter ramulum quem habet à iugulari externa, magis conferet, & opitulabitur Capiti laboranti, quemadmodum Basilica in affectibus pleuriticis, aperta præsentius auxilium adferet, propter communem quam habet Thoracica ab ea prodiens, cum venis Azygi. In brutis Cephalica semper oritur à iugulari interna. Sed vera Mediana fit ex concursu Cephalicæ & Basilicæ, tribus vel quatuor digitis infra flexum cubiti: quæ verò secatur in flexu, vel est portio Cephalicæ vel Basilicæ, descendens ad constituendam illam venam Medianam.

Claudem sermonem de Venis ista perquisitione, *An Vena fibras habeant, & si habeant, quæ sint?* An earum rectitudo seruanda sit in venarum sectione? Fibræ, Græcis *me*, sunt fila quædam oblonga, gracilia, mediz naturæ inter nervum & venam, ex *Aristotele libro tertio de historia animalium*. In musculis producantur ex nervo vel ligamento, in aliis partibus sunt peculiare, & insitæ à prima conformatione, ex flamine & subtegmine spermatici fundamenti constat. Nam ex *Orpheo*, ut ævis implexum constat animi, *ipius pinguis à suis m. si dicitur vna*, referente *Aristot. cap. 1. lib. 2. de gener. animal.*

Triplex fibrarum differentia, ex situ constituitur. Aliæ sunt rectæ, aliæ transversæ, aliæ obliquæ. Rectæ secundum longitudinem extensæ attrahunt, transversæ quæ rectas interfecant ad angulos rectos, expellunt. Obliquæ ambas interfecant ad angulos inæquales, acutum vnum, & obtusum alterum, & retinent. Fibras istas, omnes corporis partes recipiunt, quæ officialem actionem edunt, excepto parenchymate Hepatis, Pulmonum, Splenis, & Cerebri. Propterea Venæ quæ sunt canales deducendi sanguinis, Fibrarum quoque participes crunt. Fibrarum actio est ipsarum in sese contractio, ad attrahendum, retinendum, & expellendum. Illis potius tribuerem vsum, quam actionem, aut saltem partis actionem adiuuant, quippe conferunt & inferiunt in venis ad robur, & conseruationem venosi vasculi, dum dilatatur ex plenitudine, dum restringitur ex inanitione. Id etiam Galeno attestante de fibris intestinorum, in quibus rectæ transversæ sunt additæ ad robur, non autem ad chyli attractionem.

Quod spectat ad fibras venarum, dubitatur à recentioribus quibusdam Anatomicis, an reperiatur in venis? *Fallopianus in Obseruat.* scribit fibras in tunicis venarum

ita latere, ut potius in potentia sint, quàm in actu, neque moueri loco possunt ob connexionem, atque densam mutuamque inter se texturam, sed non est necesse moueri partem, ut fiat tractio, ex *Aristotele*, 7. *Physic. text. 10.* Cùm sit tractus, inquit, nihil refert, an quiescat id quod trahit, an moueatur. Tandem explosa & reiecta fibrarum actione, tantùm ob dyspathiam appositam fuisse concludit. *Vesalius in examinatione Obseruat.* *Fallopij*, fatetur fibras in venis, vel obscuras esse, vel nullas. Cùm enim, inquit, Venarum substantiam discernerem, fibrarumque inueniendarum gratiâ, crudam illam costamque difficarem, Fibræ mehercule nostrorum auctorum, potius nomine venerant imaginandæ, quàm ut in rerum natura illas esse possumus (ut verum fatear) asserere. Adeo ut tandem cùm de fibris istis addubitarem, & negotium vniuersum ad quandam vulgarem magis, quàm meam sententiam reicerem, alieubi scripserim, non multum illis tribuendum. Quo in loco retracta ea, quæ de fibris venarum copiosè differuit, libello de *Vena secunda in pleuritide*. Vbi ex situ, & exortu venæ Azygi in latere dextro, propter fibrarum rectitudinem: in quavis pleuritide, siue dextri, siue sinistri lateris, semper dextri brachij venam aperiendam esse censuit.

Nihilominus *Brissius lib. de secunda vena in pleuritide*, rectitudinem fibrarum in venis non aspernatur, quamuis *Æt.* siue *Aldouerus*, ex doctrina *Hippocratis*, de situ partium interpretetur. *Fernelius lib. 2. methodi medendi, cap. 5.* Fibras venarum in missione sanguinis spectandas esse monet. Aperta venâ, inquit, primum quidem pars vulneri propinqua exinanitur, hæc dein è longinquis sanguinem prolicat, cumque id restat fibrarum ope compleat, plus sanguinis & expeditius ab iis partibus, in quas fibræ diriguntur, quàm à cæteris eripiet. Imò etiam si nihil Venæ trahant, humores tamen sponte recto fibrarum cursu defluent. Huic opinioni fauet *Enchirid. comment. in lib. Galeni de Vena sectione: & Thadæus Dinnas* totus est in probanda rectitudine fibrarum mittendo sanguine, lib. de missione sanguinis.

Hæc opinio roborari posset autoritate *Hippocratis*, qui lib. 1. de morbis, pronuntiauit venas attrahendi virtute carnes ipsas præcedere, *ἵνα μὴ αἱ φλέβαι παύσιν ἢ ὑψηλῶν, ἵνα μὴ αἱ κείναι*. Igno cùm venæ exaruerint, rapiunt ad se biliosos & acres ichores. Hinc veniunt Causæ, & febres malignæ, ex *Galeno ad partic. 3. li. 6. Epid. & lib. 2. de morbis*, Venas capitis ubi calefactæ fuerint, pituitam in seipsis attrahere scribitur quinque, ut venarum actionem præter vsum coruinendi & vehendi sanguinem, demonstrat, lib. de morbo sacro, Venas vocat nosli corporis Spiracula, cùm aërem ad se trahant, & in reliquum corpus deducant, ac per venulas refrigerent, rursusque emittant, *ἵνα μὴ αἱ φλέβαι αἰσθάνωνται τὸ θερμὸν, καὶ ἵνα αἱ αἱματὶ ἀπορροῖται, & αἱ αἱματὶ ἀπορροῖται, & αἱ αἱματὶ ἀπορροῖται*. Ne quis putet per venas, *Hippocratem* intelligere arterias, illa descriptioni Venæ causæ subiunxit, & præcedentibus connexit per dictionem, *ἵνα μὴ, &c.*

Apud *Hippocratem* obseruatur morbus Venæ, *μῆλα* dictus, cùm præ sanguinis copia intensè distenditur, aut conuellitur Vena citra ruptionem, sitque veluti varix, aut varicis modo intumescit, & eleuatur. Quod accidit ex distensione aut diuulsione fibrarum ab externa causa violenta, ut plenius explicat *Foetus in Oeconomia Hippocratis*, dictione *μῆλα*.

*Scaliger comment. in lib. Hippocratis de Insomniis*, fibrarum rectitudinem repudiatur, ut definant isti, suum *καὶ ἴνα* intelligere, de rectitudine villorum, quibus venæ constant: quasi verò villis trahatur vena, non autem simplici calore. Non enim mouetur vena, neque renes aliò trahunt, quàm simplici facultate, sine instrumentis motus, sicut ne leuatur quidem. Quapropter si venarum fibræ sint admodum exiles, & trahendi facultate careant, non debemus admodum esse solliciti de rectitudine fibrarum seruanda, siue corpus venæ phlebotomo secetur, siue vena tundatur, pro sanando dolore, aut affectu partis dextræ, siue sinistræ, quasi nulla inueniatur rectitudo, nisi ubi rectæ fibræ, & venarum stamina conspiciuntur. Nam si hoc verum esset, nulla ratio posset assignari, cur sinistri cubiti vena, potius respiciatur Lienem è directo, quàm Iecur. Nam sanguis non hauritur, & eruitur ab ipso Splene, sed ab Hepate per venam cauam, cuius potensz ad iugulum eadem sunt stamina per utrasque venas axillares exporrecta.

Eadem dubitatio de fluore sanguinis è naribus moueri potest. Nam siue à parti-



bus infernis procedat sanguis, per venam cauam solitariam ad iugulares, ab his in Cerebrum ascendit, & per vnum canalem in nares desertor. Dolorem frontis, apertio venæ in occipite leuat, vbi nulla est fibrarum rectitudo. Itaque rectitudinem illam vasorum adeo commendatam ab Hippocrate, de situ partium intelligere oportet, ex interpretatione præstantissimorum Medicorum, Brissot, & Duret comment. in Cæsar.

A venis ad arterias progrediamur. Ramus Super. latus, ad axillas progressus, Axillaris dicitur. Venam Basilicam comitatur, cum nulla sit arteria Cephalica, prope axillas Thoracicam profert. In progressu suo vicinis partibus ramulos largitur, & ad cubiti flexuram perductus, in duos ramos finditur, qui ad manum internam producantur. Externa liquidem manus supra Metacarpium, vi musculis, sic arteria caret. Alter Ramus attensus radio, in carpo tactu percipitur. Alter vltimam rediā petcurrens, cum suo congenere in manum dispergitur.

Notæ Lemnius Lemnius, lib. 2. de oculis natura miraculis, cap. 11. tenuem quendam arteriæ ductum non nerui, vt Agellius existimauit, à Corde ad annularem digitum manus sinistræ porrigi, cuius motus in parturientibus ac delasatis, omnibusque Cædis affectibus indicis contactu facile percipitur. Quod absurdum videri non debet, cum animi defectu collapsos erigere soleant deligaro hoc articulo, ait Lemnius. Sed hic furculus si quis est, communis est aliis digitis, & ab arteria ad manum excurrente depromitur: nec est tanti momenti, vii ratus est Lemnius, deceptus mulierularum opinione falsa.

Eiædem fideiâ nervos totius manus expediam. Ex foraminibus quatuor vertebrarum inferiorum colli, & duabus primis dorſi vertebis, quinque vel sex nerui leatur, qui Scaleno immerſi traducuntur sub clauicula vsque ad axillam, vbi inter se implicantur instar faniculi galcri Cardinaliij. Postea quatuor Superiores sub Deltoide sparguntur in partem internam brachij, venam Basilicam, & arteriam brachij comitantes, & inter bicipitem & brachieum externum repentes. Quintus & sextus nervus sub rotundo maiore musculo scapulæ reflexi, in musculos polticos scapulæ difſeminantur.

Superſunt itaque quatuor, qui per brachium & cubitum delati, in ipsum cubitum & manum disperguntur. Primus nervus infra caput humeri coracoidæo immergitur, & tractus sub interno latere bicipitis, atque subtendone eiusdem musculi latitans, Venæ Cephalicæ se adiungit, vbi gracileſcit, eique Venæ subſtratus est infra cubiti flexuram.

Secundus nervus indiuiſus & craſſior ad flexuram cubiti deſcendit, adipe tantum contectus, & in flexu cubiti arteriæ venæ baſilicæ ſubiectus eſt. Vena tamen baſili a paulò infra cubitum verſus internam partem recedit ab eo neruo, vt venæ Cephalicæ vniatur: ſed quatuor digitiſ infra flexum cubiti ſemper baſilicæ ſuperſentent, indiuiſus ad carpum excurrit, vbi vena ſupereminet. In carpo finditur in decem ramulos, vnique digito duos tribuens furculos lateraliter preperantes. Interim notabis infra flexum cubiti trium digitorum latitudine, conteri à musculis flexoribus carpi & cubiti, qui naſcantur à tubere interno brachij.

Tertius nervus indiuiſus ad anguſtam perducitur, vbi per aſſuram inter olecranon & condylum internum brachij deuectus, ſecundum longitudinem cubiti, & ſuperſtratus cubiteo externo, ad carpum deſertur verſus minimum digitum, proinde cum cubito innititur, tota manus torpeſcit. Vbi in quatuor ramos ſiſſus, in partem externam manus expanditur.

Quartus nervus craſſiſſimus. venis & arteriis implexus, & immerſus Brachieo externo, ab antica parte in poſticam brachij deducitur, & per eam deſcendens, ad radium ſecundum eius longitudinem productus, venæ Cephalicæ ſociatus, in carpum obliſceſcit.

A manu ad artus inferiores deſcendo, quorum vaſa eo ordine perſcrutabimur, quo in manu declarata fuere. A Venis igitur incipiam.

Cruralis vena in inguine inſignem ramum nempe Saphenam producit, quæ ſecundum longitudinem futuroſij musculi ad popliteum deſcendit. Infra popliteum Venam Popliteam, quæ olim ſecabatur in ſura conſtituit, ibi ramulum ſuperiorem remeantem ſupra popliteum tranſmittit ad crurales venas, vel ab illis cruralibus ramulum iſtum ſaphena admittit. Poſtea biſida delabitur ad vtrumque malleolum externum, & inter-

num: sed maior portio excurrit ad internum malleolum, vbi *veram Saphenam* effugit, quæ secari solet. *Saphena* dicitur corruptè, quasi *maia*, nouum nomen à *posterioribus Græcis* introductum, *Galeno* ignotum.

Infra flexum inguinis Cruralis Vena in quatuor ramos scinditur, quorum binique interiores & laterales, atque breuiores in mûculos superiores femoris tam internos, nempe bicipitem, quàm externos, videlicet vastos, & crureum disseminantur.

*Ramus tertius* interiora penetrans, *Ischiæ* dicitur, *quartus muscularis* appellatur.

His eductis propaginibus, truncus Cruralis Venæ bifidus descendit ad genu, bifida stipatus arteria crurali, sed alter ramus est sublimis externas partes irrigans, alter profundior. ambo vicinis partibus ramulos suppeditant, & cùm petuerint ad popliteum, inter Soleum & Gemellos traducti, ad vtrumque malleolum descendunt: sed externus malleolus potissimum rigatur à ramo profundiore crurali: Ita tamen, vt in ambitu malleoli occurrant duæ notandæ venæ: Quæ supra malleolum consistit, soboles est saphenæ: quæ infra malleolum excurrit, supra tarsum expansa, propago est cruralis venæ. Vtraque vena non potest securè secari nisi tumeat, ratione vicinarum artèriarum, quibus caret vena saphena in malleolo interno sita, atque hæc scinditur in omnibus affectibus, tam virorum quàm mulierum, cùm tamen in Ischiade vera infra malleolum externum, maiore emolumento tunderetur, quia maiorem habet communionem cum parte affecta, nempe coxendice. Mirum est, cur hodie *Poplitea sectio* exoleuerit veteribus vñtata, quam *Hippocrates part. 1. sect. 1. lib. 6. Epid.* in renis dolore commendauit. *Venas etiam malleolares* secabat, vt videre est *lib. 6. Epid. in ancilla Strymurgi*.

Quæstione dignum est, si malleolares venæ ad libidinis pruriginem aliquid faciant, vt à *Fulgentio Placiade libro 3. Mytholog.* notatum est. Ait enim in talo venas esse, quæ ad renem, femorum, atque virilium rationem pertineant, quarum aliquæ ad Pollicem vsque tendant, quod tractantes & Physici, & mulieres ad obtinendos partus, & Ischiadicos dolores, eodem phlebotomant loco, & emplastrum entaticum applicât, quod Scyfidem vocauit *Africanus in Iatrosophistis*, ab artectionis facultate *Scyfidæ* & *Scyfidæ*, & polliciatque talo imponi præcipit. *Quin & Orphei* testimonio affirmat illum locum principalem esse libidinis. Id quodammodo probabile est ratione venæ saphenæ, quæ oritur supra flexum inguinis intra ventrem: quin etiam veteres, teste *Oribasio*, pedibus Elleboro perunctis, aluum purgabant. His omnibus valde contraria est *Hippocratis* sententia, *libro de locis in homine*. Venis malleolaribus sectis infocundum hominem reddi. Eleganter *Hippocrates, sub finem libri de Fracturis*, notat quod multæ & insignes venarum productiones per interiorem partem femoris & brachii feruntur, quare nonnullæ si vulnerentur, hominem iugulant: sunt exteriorè parte quadam, verum pauciores: id etiam annotatum à *Galeno, lib. 3. de vsu partium*.

## DE VALVVLIS VENARVM.

### CAPVT XLIX.

**I**NTRA Venarum cavitates membranula circumtensa reperiuntur, quas *Venarum Valvulas* vocant, suntque veluti appendices tunicæ venarum intra cavitatem suam eminentes, quæ formam habent Sigmatoïdem: qua parte collocantur, amplior ac tumidior videtur vena, vt peculiari quoddam sanguinis vasculum intra se Venæ constituent, ideoque foris extuberantes venæ, nodos, ac veluti genicula repræsentant, vt in viuèribus apparet, dum brachium ligaturâ stringitur ad sanguinem mittendum. Coniunctim vtriplurimum geminæ reperiuntur, vtriusque scilicet vna, interiecto spatio distantes, situque diuerso alternatim positæ, itaut sequentis membranulæ latus præcedentis conuexam partem respiciat. *Valvularum vsus est*, vt tanquam ianitrices sanguinis cursum & impetum moderentur. In artubus obstant, ne sanguis in partes de cliues motu & agitatione incalescentes, impetuôsè & assatim irruat: cuius vberioris affluxu, vel aggrauarentur, vel obruerentur. Robur quoque addunt ipsi venarum corpori, & immodicam dilatationem inhihent, dum cursum & impetum sanguinis retardant, quâ-

diu nutritio perficitur. Venis autem colli Cerebrum subeuntibus sunt appositæ Valvulæ, ne reclinato Capite sanguinis in Cerebrum impetu ruenis pars nobilis obrueretur.

Tales Valvulæ iugulari internæ affixæ sunt: *Dottissimus Harterus* appositæ ad circulationem sanguinis Valvularum in venis officium idem esse putat, cum sigmoideis Cordis, vt ad amissum & exactè clausæ, sanguinem ab infernis partibus remeanti sursum obstant, nè à centro corporis ad exrema sanguis confertim excurreret: sed potius ab extremitatibus ad centrum corporis regrederetur: Ideoque Valvulæ intra venas ita sunt collocatæ, vt versus Cor respiciant, sed si retrò sanguinem transeuntem remeare impediunt, descendenti obstant, sicque parum, aut nihil sanguinis præterlabetur Valvulas ad nutritionem partium infernatum, si ad amissum claudantur. Admitto equidem Valvulas vasorum diuisionibus appositas fuisse, ne à venis magnis in minores sanguis affatim & impetuosè moueretur, & sic illas dilaceraret, aut varicosas redderet. De Valvulis & Ostioliis Venarum libellum composuit *Fabricius ab Aquapendente*, in quo miratur, quomodo Ostiola seu Valvulæ Venarum ad hanc vsque ætatem, tam priscos quàm recentiores Anatomicos adeo lauerint, vt non solum nulla prorsus mentio de ipsiis facta sit, sed neque aliquis priùshæc viderit, quàm anno Domini 1574. quo ab illo summa cum lætitiâ inter dissecandum obseruata fuere. Nihilominus obseruo in vita patris Pauli Monachi Seruati, Veneti, istas Valvulas ab eo demonstratas fuisse *Fabricio ab Aquapendente*, non sine aliqua exprobratione ingrati tudinis, quod inuentorem subticuerit. Video quoque istas membranas Epiphyses intra venas, *Veteribus Anatomicis, atque recentioribus* longè ante *Fabricium* notas & exploratas fuisse.

Non producam *Piccolominum Italum*, qui descripsit Valvulas venarum, quas forsan antè, *Patentio Fabricius* demonstrauerat. Sed nemo dubitat *Iacobum Sylium, Medicinæ Professorem Regium in Academia Parisiensi*, vi doctrinæ, siue ætate præcessisse *Fabricium*. At ille Valvulas Venarum, licethoc nomine non indigitarit, sic eleganter describit in *Isagoge Anatomica. Membrana quoque Epiphys* est in ore *Azygi, vaserumque aliorum magnorum sepe, vt Iugularium, Brachialium, Cruralium, Trunci Canacæ Hepatæ præficientis. Vfus eiusdem cum membranis ora vaserum Cordis claudentibus. Ex Sylvio lib. 1. cap. 2. de membranis. Vesalius in examine Observationum Fallopij, notat à Canano sibi propositas fuisse membranulas in maioribus venis, quales extant in Corde.*

Non est dubium istas membranulas venarum, à *veteribus* animaduertas, & inuenerit dictas fuisse, quod ex *Ruffo Ephesio* probatur, cap. 23. lib. 1. *Omnium, inquit, quos inueniri primus Dionysius Oxymachus Filius, inuenerit, nomen nouum adinuenit, atque Eudemus inuenerit venam appellari voluit.* Sed mihi quidem videtur *Dionysius* rem venæ similem, non venam ita appellasse, sed quoddam aliud aduentitium, quod à *inuenit* dicitur. Non ignoro *inuenit* vocari à *Galeno lib. de venis*, capillares venas, sed malim sententiæ *Ruffi* adhærere. Quinetiam videtur *Hippocrates* subolfecisse istas Valvulas venarum. Nam lib. de off. nat. Humeralis vena medium in brachio locum tenet, & membrana spumosa iuxta axillam. Quæ nihil significat, nisi referatur ad Valvulam venæ humeralis, quæ duas vel tres in medio brachio obtinuit Valvulas. Eadem lib. iuxta Suram, vena fundam facit, quæ si non præterit & excedit membra: ibi *quidam*, est vena in extremis angusta, in medio ductu latior, ex *Fallopio* interpretatione. In oculo adnotata tunica eadem dicitur *Palluci*. An non intelligit Ostiola Venæ Suram perreptantis, quoniam Vena ibi semper latior & amplior, vbi Valvula consistit? Nondum obseruauimus apud *Anticennam*, Cellulas in venis reperi, locum designari cuperem.

Cæterum Valvulas habent in Collo iugularis interna, etiam si *Fabricius ab Aquapendente* ei denegarit: Ceruicalis, Iugularis externa, quia partes tantum externas capit alunt, nec Cerebrum ingredientur, Valvulis carent. Axillaris duas habet statim in exortu suo seriatiim dispositas. Intra Cephalicani & Basilicæ innumeras vidi alternatim collocatas: duas, & interdum quatuor etiam in vena Azygo deprehendi, quas in *historia Cane descendens* descripsi. Officio venæ Coronalis membranula præposita est. Sed nunquam obseruare potui, intra Cauam prope Iecur Valvulas, quas *Sylvius & Carolus Stephanus* ibi collocatas scribunt, ne sanguis elaboratus in Hepate & egressus regurgitet. Nullas quoque in trunco venæ Portæ deprehendere potui: etiam in Emulgentibus venis Valvulas affixas vidi, quas notauit *Vesalius*. In Crurali

vena insignes & multas valvulas inspexi, quinetiam in ramis mesenterij versus venam portam reperiuntur valvulæ, primæ duæ, paulò infra inguen occurrunt, infra valvulas cruralis venæ, etiam in saphena duas inuenies. Arteriæ valvulis carent, vt spiritus vitalis instar radij Solaris momento in partes distantiſſimas feratur. Præter illas tres Sigmatoides Valvulas, quæ in principio aortæ collocantur, & tricuspides duas arteriæ venosæ, in exortu coronariæ arteriæ si solitaria sit, valvulam obseruabis, nec tantùm in homine notantur valvulæ, verumetiam in venis aliorum animalium quadrupedum circa diuisionem cruralium venarum, & iuxta principium ossis Sacri reperiuntur. Præter valvulas, intra venas cruales, *Tubulus* digiti longitudine ex eadem venæ substantia conſtatos deprehendi, ne sanguis magna copia collectus venam effringeret, aut ex tumore crurum mouendi importunitatem adferret.

*Arteria crualis distributio* non est æqualis venæ cruali. Nam paulò infra inguen duas intra tricipitem transmittit, quæ ad Glutios vsque producutur. Postea binas ermittit in pames femoris anteriores: deinde *crualis indiuisa* ad poplitem descendit, vbi in duas secatur ramos, quorum vnus partem tibiæ exteriorẽ lateraliter perrepat supra Peroneum, Alter Soleo intrusus, & ad pternam delapsus, in plantam pedis dirigitur. Saphena vena caret coniuge arteria, & neruus ab ea vena remotus est, ideoque securè pertundi potest.

*Nervus anterioris femoris duo sunt*, in exortu suo distincti, mox coalescentes, vnicum finem conſtituunt, qui indiuisus ad inguen fertur, vbi in quinque *ſarculos* communĩ membrana obuolatos dirimitur, quoquoersum dispersi in musculos antici femoris ad molam vsque disseminantur. *Exortus aniem neruorum* est in tribus infimis lumborum vertebreis, nec apparet, nisi musculo Pſoa lacerato, intra quem latitant. Tum præter illos commemoratos, videbis *alterum neruum gracilem*, per ouale foramen pubis ductum, in musculos propinquos, nempe tricipitem abumi. Posticum femur perrepat. *magnus & crassissimus neruus*, ex tribus & *ſapius quatuor portionibus in exortu suo conſiſtus*, quæ nascuntur à tribus vel quatuor foraminibus ſuperis Ossis Sacri, & deuectus per sinum Ossis Ischij, intericctum spinæ eiusdem ossis & extremitati Ossis Ilium, per interiores & posticos femoris musculos indiuisus, interdum geminatus, ac solitarius absque comitatu venæ & arteriæ, vt sit in cæteris neruis coiporis ad poplitem producutur. *Vbi bifidus*, interdum *quadrisfidus*, ramulos exiguos pro mole sua vicinis partibus impertiens. *Alter Ramus*, per Gastrocnimium, siue ventrem tibiæ ad pternam descendit, obiter neruulos impartiens, & per fissuram malleoli interni ductus, in plantam pedis dirimitur in tot ramos, quot sunt digiti. *Alter* in anteriorem partem pedis deferitur perone attensus, atque ad malleolum externum delabitur, quod eũ peruenit, in superiorem partem pedis, vt dictum est de altero, dispergitur. Hoc ingenti & crassissimo neruo malè affecto in Ischiade notha quæ tota in eo conſiſtit, dolor atrox non solum in coxendice conſiſtit, sed in femur & suram, atque extremum pedem exporrigitur, quocumque nimirum ab affectu coxendice deductus neruus pertingit, inquit *Fernelius*, cap. 18. lib. 6. *Pathologia*, ideoque in notha hac Ischiade, pyrotica ad flexuram natiũ apprimi deberent, & partes illæ illini emplastro epispastico.

Notabis obiter in notha Ischiade neruos istos rigari ab hypogaſtriciis venis & arteriis ſupertentis: quare non possunt exſiccari nerui, nisi exinanitis vasis hypogaſtriciis per multiplices venarum sectiones brachiorum & pedum, & sanguisugis marginibus ani sæpius admotis. Cur autem Neruus iste cum aliis anerioribus non commiſceatur, vt in neruis brachij, sed per posticum femur proferatur, hanc rationem adducit *Galennus*, cap. 1. lib. 16. de *usu part.* quia brachij articulus longius distat à vertebreis ceruicis, quàm articulus femoris à lumborum vertebreis & offe Sacro. Circa principium huius magni nerui alter adiunctus est, qui à tertio foramine ossis Sacri profiliens, & suprapſinam ossis Sacri traductus, ramulatum sectus, in musculos Glutios, & flexores tibiæ, vsque ad poplitem diffunditur.

DE NERVIS, QVI A SPINALI  
Medulla prodeunt.

CAPVT L.



**C**VM Cerebrum omnibus partibus nervos commodè suppeditare non posset, propter partium multitudinem, & viarum distantiam: è Cerebro tanquam è radice caudex profunditur *Spinalis Medulla*, quæ per ossæam & fistulosam *Rachææ* cavitatem producta, circumiectis partibus nervos securè distribuit. Quum igitur *Spinalis Medulla* sit Cerebri propago, ipsius Cerebri compositionem, substantiam, naturam, & vsum retinebit.

Similem esse Cerebri & *Spinalis Medulle substantiam*, cognosces, si eius exortum inuerso Cerebro spectaueris. Nam in basi Cerebri quatuor radices videbis, duas ex Cerebro, totidem ex Cerebello prodeuntes, quibus simul iunctis constatur *Spinalis Medulla corpus bipartitum*, atque tenui meninge secretum: ita ut vna pars medullæ resolui possit, integrâ & illasâ alterâ: isthæc bipartitio coctioneprehenditur citra laerationem. Duobus inuolueris conuestitur, quæ à Cerebri meningibus proferuntur, & quæ eundem ac meninges vsum præstant: quibus in subsidium tertia tunica fortis, atque nervosa circumiicitur, ne dum spina iussit: situr, flexa quoque medulla disrumpatur. Hæc oritur ab osse Occipitis, vbi spondylus committitur, auctore *Sylvio*: vel à ligamenti vertebrarum, ut placet *Galeno*, quod refellit *Columbus*. Imperitè *Theophilus Protospatarius*, quartam adiecit tunicam colore sauo, materiâ inter neruum & cartilaginem mediâ, quæ omnes vertebrae communi quodam vinculo contineat. Tertiæ tunicæ additione *Rachitis medulla* à Cerebro differt, & quod pulsui moraque caret, & quod nullum habet medium intervallum, id est, cavitates ut Cerebrum, quæ omnia ex *Galeno* recitat *Sylvius*. Contrâ *Piccolominus in prælect. Anatom.* contendit *Rachitis* iisdem motibus eieri, quibus Cerebrum, nimirum systole & diastole, eodem sit ipsius Cerebri apophysis, siue continuatio. Partis enim & totius idem est motus, & mota parte continui mouetur totum. Cùm igitur dilatatur, spiritum animale ad quarto ventriculo excipit, quando verò contrahitur, illum in nervos à se prodeuntes refundit.

Sed fallitur *Piccolominus*. Nam *Spinalis Medulla* non est apophysis, sed epiphysis, ipsius Cerebri & Cerebelli additamentum in ossa vertebrata spinæ prolongatû, quod instar Cerebelli est immobile: adde quod Cerebrum & spinalis medulla, si credimus *Ar. Metel.*, temperamento differunt, quia Cerebrum frigidissimum & humidissimum, medulla spinalis calida: rationem assignat *Philosophus*, 2. de partibus anim. cap. 7. & cû sit subiecta & proxima Cordi citius incalescit quàm Cerebrum, & tale temperamentum à prima spinæ formatione obtinuit, cû ex eodem *Philosopho*, spina inter ossa corporis prima producatur, ut esset fundamentum reliquorum ossium, quod verissimum esse notauit, & publicè demonstravit *Columbus*, & sæpius id observasse in pulli generatione affecerat *Fabricius ab Aquapendente*. *Plato in Timæo* spinalem medullam vocat feminalem materiæ fontem & scaroriginem, quod existimavit cum vereribus, maximam feminalem materiæ portionem in hac fistula coaceruari, inde per venas ad genitalia vasa deriuari, ideoque definit semen, *spinalis medulla defluuium*. Scripsit etiam *Aristoteles scilicet. 10. Problematum*, semen è Cerebro per spinalem medullam deferri, ob idque spadonibus multum Cerebri inesse, quod venerem non exerceant. Sed isti Philosophi ex ipso *Hippocrate* hanc doctrinam mutuati sunt, qui libro de genitalura docet, quomodo è Cerebro in spinalem medullam ad lumbos vsque feminalem materia excurrat, quæ postea per venas ad pudendum per medios testes transendo delabitur. Isthæ viarum continuitas subobscura, vel impossibilis à multis iudicatur, quàm tamen non absurdum & fictitiam deprehendes: nam venas & arterias quamplures obseruabis à plexu retiformi ad spinalem medullam descendere, & lumbares venas quâdam in eandem circa lumbos penetrare, simulque ex aorta descenden-

re nonnullas arteriolas sese insinuare in eandem medullam per foramina vertebrarum spinæ dorsalis: proinde nec falsam nec ridiculam Hippocratis, & aliorum Philosophorum, qui eum sequuti sunt, sententiam iudicabis. *Spinalis medulla* vsum ferè similem habet cum Cerebro: nam spiritus animales in artus distribuendos completur, atque quodammodo perficit. Propterea illius dignitas ad vitam æqualis Cerebro, inde quæ dicta fuit ab Hippocrate, quod in ea sitam esse vitalitatem crederet, ut probat *Erasianus in Onomatistica suo*, & post eum *Fracus in Oeconomia Hippocratis. Plato in Timæo* Spinalem medullam tanquam vitæ fundamentum agnoscit infra Caput. Ipsemet Hippocrates docet ex Spinali medulla grauissimè & difficillimè homines ægrotare, scilicet ex fluxione quæ fit in illa, oriri rabem, & illius resuscitationem esse morbum grauem, morique hominem, si medullam spinæ sauciatus fuerit. Demum medulla spinæ, inquit ille, lib. 2. *Prophet.* si ægrotarit, siue ex lapsu, siue ex alia causa, siue sua sponte, homo & cruribus impotens fit, ut neque si tangatur percipiat, & ventre ac vesica, ut circa prima tempora, neque sterces, neque urinam egerat, nisi ad necessitatē. Cùm autem perustior factus fuerit morbus, non vrgente homine, & sterces & urina prodeant. Moritur autem postea non multo interposito tempore. Angues siue serpentes ex spinali medulla hominis procreari à præscis & recentioribus proditum est. *Aulus est Plinius lib. 10. naturalis historia, cap. 66.* angues ex medulla spinæ hominis gigni. Hoc verum esse probatur à *Platarcho, in vita Clemenis*, cuius sepulchro aperto, loco cadaueris putrescendi, serpens viuus repertus fuit. Id etiam *Antigonus & Phlegon Trallianus* Graeci auctores testantur in suis *Opusculis de Natura mirabilibus. Ouidius lib. 14. Metamorph.* huic opinioni adslupulatur.

*Sunt qui cum clausa putrescenda est spina sepulchro, Mutari credant, humanas angue medullas.*

*Ælianus lib. 1. cap. 53. hist. de Animalibus*, hanc narrationem suo calculo confirmati & *Paulus Æmilinus historicus in Vita Chilperici tertij*, narrat aperto sepulchro *Caroli Martelli*, serpentem viuum ex medulla spinæ genitum profluisse.

Ceterum, spinalis medulla per spinæ fistulam progrediens, semper seipsa durior & minutior redditur, tandem cùm ad dorsii finem peruenit, rota in *funiculus & filamēta* eandem ferè equinam referentia assumitur, ut in ea parte ruptionis periculum euitaret, quæ tota Spina flexitur & contorquetur, ut obseruauit peritissimi Anatomici *Vesalius, Columbus, & Laurentius*. Addit Columbus in brutis ad extremum, medullarem esse, in homine ad lumborum tantum initium medullam referre.

*Spinalis medulla urina*, ex pluribus filamentis inuicem attentis & tenui meninge comprehensis constantur, quæ quidem filamenta eò altius oriuntur, quo magis Spinæ medulla descendit. Quod non sine magna utilitate factum fuit, ne Spinalis Medulla mollis, ad metaphreni finem mobilem produceretur: vbi ex continuo flexionis & extensionis motu lædi & contundi potuisset.

Vidit *Nicephorus Gregoræ* aliquando puerum quendam, cui cum sagitta neruum ceruicis percussisset, contigit, ut inde pes alter corpore corripere, & permaneret in reliquo tempore insanabilis morbus, cùm pes alter ætaris progressu cresceret, alter verò in ea tenuitate & breuitate quæ tunc fuerat, consisteret, suspensus inutilis & otiosus tanquam pondus inanime. Itaque dubitatione afficiebat eos, qui causas & rationes non intelligebant, quo pacto cùm manus propior esset, sine villo sensu doloris permaneret, pes autem procul distans condoleat: ex *Scholis in Synesium*. Vt autem natura omnibus modis neruorum securitati prospiceret, Neruis per foramina vertebrarum egressuris, *substantiam crasso ganglio similem circumiecit*, quæ fibras nerui tam arctè & firmiter neclit ac colligat, ut à se inuicem diuelli nequeant. Post *Nodum illum* & egressum facillè separantur.

Sed in egressu nerui perpende quæso naturæ solertiam. Vt neruus raptura minùs foret obnoxius, hunc tenui adhuc meninge vestitum, non per foramen, quod est eius origini oppositum traduxit, sed per inferius, quod vbi præterlapsus est neruus, non proximam costam adit, sed ad inferiorem descendit, quam vbi attingit, *hippocrius, ramum maiorem versus spinam reterquet, maiorem in anteriore deducit*. Hunc neruorum exortum subolfecerat Hippocrates, ut apparet ex lib. de Off. nat. Ex spina neruorum propago prima fertur.

Ex Spinali medulla viginti octo neruorum coniugia scaturiunt, Septem à ceruice, Duodecim à dorso, Quinque ex lumbis, Quatuor ab osse Sacro.

*Primus Coniugatio cervicis*, non lateraliter elabitur more aliorum nervorum: sed à posteriore & anteriore parte inter occiput primamque vertebra[m] egreditur, *antere ramo* in parvos occipitis, & vertebrarum colli musculos diffeminatur, & si credimus *Galenus*, lib. 4. de *locis affectis*, cap. 4. etiam per totum occiput dispergitur, proinde stuporem occipitis non potuisse sanari, nisi huiusmodi nervis calefactis.

*Secunda Coniugatio Posteriore Ramo* per latera secundæ vertebræ sursum reflexo, ad capitis cutem, aures, & musculos ascendit, *Anteriore* in musculos secundæ spondylæ & occipiti communes deducitur.

*Tertia Coniugatio* ex foramine secundæ & tertie vertebræ communi profecta, statim in duos scinditur ramos, quorum *Anterior* ad eos musculos qui collum flexunt, sese applicat, *Posterior* in musculos Caput & collum extendentes, diffunditur.

*Quarta Coniugatio Minore Surcula & Posteriore* in cervicis musculos effertur, *Maiore & Anteriore* musculis, brachium & scapulas attollentibus, necnon Diaphragmati communicatur.

*Quinta Minore Ramo* in posticos cervicis musculos retorquetur, *Maiore* vnitur cum propagine quarti paris, & in quibusdam Ramulum à subsequenti bus suscipit: *Hic nervus* à tribus, nimirum quarto, quinto, & sexto constructus. descendit secundum latus œsophagi per anteriora vertebrarum colli, ad nervicam sepi transuersi partem, in qua terminatur. In nonnullis, sed raro exoritur à quarto pari, vt animaduertit *Columbus*.

*Sexta Coniugatio Ramo Posteriore & Minore* in musculos posticos reflectitur, *Anteriore & Maiore* Ramulos educit varios ad brachium pertinentes.

*Septima Coniugatio Maiore Ramo* in brachium dispergitur, minore in posticos musculos expanditur. Longiorem distributionem nervorum cervicis repetes ex præcedenti capite.

A vertebris Thoracis *undecim tantum nervorum Coniugationes* deriuantur, licet vertebræ sint numero duodecim. Nam ab his foramina undecim tantum constituuntur, totidemque sunt costarum interualla. Vbi autem *nervi* foraminibus exciderunt, in *duos Ramos* inæquales finduntur, quorum alter *Maior* anteriora versus protrahitur: Alter *Minor* versus posteriora reflectitur, musculis dorsalibus distribuendus. Nervus intercostalibus affectis vocem adimi, docet *Galenus* hystoria memorabili cuiusdam ex alto in terram prolapsi, cui ex eo casu dorsii initium lesum fuerat. Hoc probat fusiùs lib. 3. *admin. Anat.* Obseruauit etiam *Galenus* nervos, qui ex breviorum, siue notharum costarum vertebris emanant, superioribus intercostalibus maiores esse, quos semper circa mediam costam bipartitos nasci, vtesse vnus exterior foras eductus, alter interior costam perreptans. Huius magnitudinis causam assignat *Galenus*, quia in abdominis musculos abeunt, & magna sui portione visceribus inferni ventris distribuuntur. Hi & lumbares cum nervis costalibus coeunt & commiscentur. Cuius vnionis beneficio partes intra Peritonæum contentæ, robur accipiunt ex spinali medulla, sensum acutum à Cerebro, quia costalis sextæ coniugationis propagatio est, vt ait *Galenus*, libro decimo sexto de *usu partium*, cap. 4. *Nervi* brachiorum & crurum à spinali medulla prodeunt, de quibus dictum est capite præcedenti.

Porro cupio ab *Anatomicis* considerari & expendi, quomodo facultas animalis ad sensum & motum distribuatur, cum reperiantur muscoli nervis destituti, ipsique nervi sint solidi, nequaquam porosi, aut porosi. Nam in progressu nervi crassissimi, qui posticum femur perrepat, exiles & rari ab eo nervos exproxi ac derivari obseruabis, qui quoquoersum dispersi, partibus vim sentientem ac motiuam deferant. Imo nervus hic sæpe indiuisus vsque ad poplitem descendit, vbi bipartitus vsque ad talos decurrit. At in parte postica femoris multi & crassi iacent musculi aliquatenus nervis priuati. Inde licet cognoscere sensum & motum sine nervis, aut saltem proxima eorum distributione & insertione reperiri, vt *Zoophytis*: atque facultatem sentientem & motiuam sine iustrumento ad ceram distantiam in partibus continuis extendi. Etenim in magnis visceribus, quæ magnam musculorum portionem depasta sunt, caro regeneratur absque nervis, & tamen sentit, atque movetur.

Interea notabis omnes nervos præter opticum ex pluribus fibris contextos, quos inter se collectos, arcuè comprehendit membrana, quæ diuisâ videbis nervum



quod crassior est, in plura filamenta diffindi. Inde cognosces nervos omnes solidos esse, quod diligenter explorantur occasione dabit inquirendi, quomodo spiritus animalis in distantissimas partes feratur. Nervos autem esse solidos facile probatur ex Galeno, lib. 1. de locis affectis, c. 6. Nervus, inquit ille, protinus ab origine multum sunt simul concreti, & communibus involueris contenti, quæ à Cerebri membranis oriuntur. *Casulpinus, lib. 5. questionum peripateticarum c. 3.* existimat ista filamenta esse venulas & arteriolas multas in vnum corpus, seu fasciculum coëvutes: ideoque fissiles esse secundum longitudinem. Proinde *Accurambonus, notis in lib. 3. histor. anim. Aristotelis,* in maioribus oervis incisis, sanguinem stillare vidit: quod tamen nondum observavi.

DE PILIS.

CAPVT LI.



VM in naturæ censu oihil sit otiosum, nihil abiectum & despicabile, quia nulla res naturæ in qua oon mirandum aliquid insit, à nã p nã quavis dicitur omonem, inquebat *Aristoteles, lib. 1. de part. animal.* Sic in contemplatione rerum naturæ oihil videri potest superuacaneum. Ideoque Pili naturam perscrutari non est occupatio ridicula nec otiosa: cùm ipsa rerum natura nusquam magis quàm in minimis tota sit, ex *Plinio.* Nec Pilus res adeo vilis & abiecta, si Deus Pilos Capitis numerare dignetur.

Pilus autem dicitur à dictione πῖλος. Nam Græci & Latini ea voce dixere quiddid teres & oblongum esset, inde Pilæ faxæ, & oppilare verbum *Ciceronis in Philipp. ex Scaligero.* Posset etiam deriuari Pilus à πῖλον, eliso π, quod est pluma, Pili enim proportionem habent cum plumis auium: Vel à dictione Græca πῖλον, quia Pili in animalibus sunt, vt folia in arboribus, ex *Empedocle.* Vel Pilus deduci posset à πῖλον: Est enim Pilorum videri à πῖλον. Inde *Eustachius, minor,* Pileum deriuat à πῖλον, quod cā nescere faciat ferentes, ex *Aristotele.* Græcis Pilus vocatur πῖλος à πῖλον, quod est meo, vel πῖλος à πῖλον, vel πῖλος à πῖλον, & πῖλον à πῖλον. ex *Etymologico magno Græco,* vel πῖλος à πῖλον, quod inter tondeodum stridorem edant, vt anootat *Phaenonius in Lexico.* Inde *Tricia* Latinis dicitur, teste *Natio Marcello.*

Definitur Pilus ab *Auerroë collect. 1.* Corpus extensibile, siccum, ex superfluitate cibi genitum, quando nimis coquitur, durante in illo pinguedinis admisione. Dicerem potius Pilum corpus esse frigidum siccum, tenuissimum instar filamenti, à cute expullulans, molle & flexile, quia facile contorquetur, & distenditur priusquam rumpatur: proinde filamenta in plantis improprie, & *pinnatissimi* Pili dicuntur, vt in Epithymo, Pilosella, Cuscuta, Tragopogo: & filamenta, quæ in partibus internis corporis generantur, circa Cor, in ventriculo, tenibus, intra mammas, & in abscessibus reperiantur, non referunt naturam Pilorum, sed sunt tantum Pilis similia.

Generaliter diuiduntur Pili ab *Aristotele* in *mutabiles*, & *inmutabiles*, *Congenitos*, & *Postgenitos*, siue *Postterigenos*, vt placet *Scaligero.* Quoniam hoc participium, post, præteritum tempus significat. Itaque in infante oon possis querere, quo tempore nascuntur Pili pubis, si *Postgenitos* appelles, per oomen explicauit *Aristoteles*, oon per participium. *Congeniti* dicuntur, qui vnâ nascuntur, cuiusmodi sunt Pili palpebrarum, superciliorum, & Capitis. *Postterigeni* vocantur, qui certo quodam tempore, & in quibudam locis efflorescunt. Cuiusmodi sunt Pili Faciei, Axillarum, Pubis, Podicis, Pectoris, Nasi, & Aurium.

Differunt autem Pili, tam *Congeniti* quàm *Postterigeni*, ratione cutis & temperamenti, in substantia, & colore.

*Substantia* autem consideratur, vel ab exortu, vel ab ætate, vel à loco. Nam quibusdam ab exortu Pili sunt molliores, in aliis duriore. Naturaliter in primæuo flore barbz molles sunt instar lanuginis, progressu ætatis crassiores sunt.

Ratione *loci* molliores & tenuiores crescunt in abdomine, alibi duriotes & crassiores, quinetiam Capitis Pilus semper est mollior & tenuior Pilo Faciei.

*Pili colore* quoque differunt, quoniam in hominibus observantur albi, fusci, rufi, & nigri: sed Pilorum nullus, neque puniceum, neque halargum, neque porraceum, neque alium vllum colorem obtinuit: eo quod ij omnes colores gignat.



tur Solis radiis cum his permixtis, ex *Aristotele lib. de color.* Proinde non videtur ridicula *Cardani* ratio, cur viridis nullus nascatur Pilus, quia Pilus est densa substantia, & crassa, neque lucis capax, quamvis *Scaliger exercit. 114.* hoc responsum multis rationibus eludat, & tandem concludat, Pilum nihil aliud esse quàm plantam, ac propterea sicut quivis color non competit cuilibet speciei plantæ, ita nec quilibet color potest humanis Pilis convenire, quamvis in corpore portacea & viridis bilis reperitur, sed quæ tantum in primærgione continetur, nec in habitum corporis diffunditur.

Porro Pili confusæ & glomeratim erumpunt, vt in Capite & aliis partibus, vel ordine quodam seriatim sunt dispositi, vt in palpebris, in quibus directi semper stant, alibi deorsum vergunt & inclinant, vt facilius imber, sudor, & pulvis veluti ex fundo descendat, & decutiantur.

Materia Pili duplex est, *Vna in qua, Altera ex qua.* Materia in qua, est ipsa cutis subiectum radicationis Pilorum, quæ prout est in secundis qualitatibus disposita, id est, quatenus crassa vel tenuis, densa vel rara, sic Pili crassiores vel tenuiores, densiores aut rariores nascuntur. Debet autem esse temperata in actiuis qualitatibus, vipore calida siccæ ad productionem Pilorum, qui in siccissima vel humidissima pullulare nequeunt.

Præter cutis aptitudinem, requiritur ex *Hipp. lib. de Glandulis, substantia glandulosa,* quæ & cutem humectet, ac materiâ Pilis generandis ac nutriendis suppeditet. Quare vbi cœnosæ partes sunt & humectæ, ibi etiam glandulæ, cuius signum est, quod vbi est glandula, ibi etiam Pili. Natura enim facit glandulas & Pilos, vtraque eadem utilitate participantem, illas quidem, vt quod insuit luscipiant. Pili verò ex glandulis opportunitatem habentes, nascuntur & augescunt, coilligentes id, quod in extremitates redundat ac effluere scit. Vbi autem corpus siccum est, neque glandula, neque Pilus inest. Glandulæ porro sunt ab vtraque aurium parte, iuxta Iugulares colli venas, & Pili etiam ibidem. Item sub alis vtriusque & glandulæ & Pili sunt. Inguina & pubes similiter, vt alæ, & glandulas & Pilos habent. Maius autem est Cerebrum quàm aliz glandulæ, & capilli etiam maiores quàm alij Pili. Hæc tenet ex *Hippocrate.*

Materia ex qua generantur Pili, ex opinione Medicorum, præsertim Galeni, est excrementum humidum fuliginosum, crassum & terrestre. Definitur autem fuligo ab *Aristot. lib. 4. Meteor.* ipsius pinguis exhalatio. Galenus ait fuliginem esse vaporem terrestrem, *lib. 8. Meteor. cap. 5.* Depromitur hæc materia pilosa ex adipè substatto cuti, vel ex musculo & viscido humore, qui cuti subest & adhærescit, inde Pili suum repetunt alimentum & incrementum, quia radices Pilorum penetrant cutem, & adipem ipsum attingunt. *Hippocrates lib. de principis,* Pilos capitis ex glutinoso produci scripsit, nec ab ea opinione recessit *Aristoteles, lib. 3. de hist. animal. cap. 11.*

Habet genus quoddam Pilorum ad suam radicem lentum quendam humorem, qui proxinus vbi auellitur, si quæ leuiuscula tangat, attrahit. Atque istud glutinosum & viscidum subcurancum, valet ad firmiorem Pilorum adhærentem & radicationem.

Verùm Pilos, neque procreari, neque nutrirî ex fuliginosa materia nonnulli censent, quia Galenus, & alij posteriores Græci, in curatione Alopeciaz commendant ad regenerandos Pilos, optimam victus euchyimi legem, quæ parum & optimum sanguinem suppeditet. In adolescente vidit Galenus Alopeciam ex cû fungorum contractâ, cibis euchyimis reparatam. Quinetiam probè ac sufficienter repurgatio cutis, metastasiticiticis sanguine ad partem euocant. Propterea quibus duxit afflicta cutis non rubescit, insanabilis iudicatur Alopecia, quia non potest sanguis laudabilis ad cutem elici. *Aristoteles sect. 10. probl. 23.* scribit vellus proprio carnis alimento nutrirî, velus autem, vt ipse notat, est congeries Pilorum. Ergo non ab excremento fuliginoso nascuntur & nutriuntur Pili. Adde quod Pilo euulso sanguis manare videtur, ex *Aristotele loco citato, sect. 10. Probl.* Ergo sanguis erat ad radicem Pili.

Præterea si in morbis, colorem Pilorum cutis immutat, ergo non à fuliginoso excremento Pili producantur: quia pro varia conditione cutis, & humoris affluentis qualitate, Pili suam substantiam & colorem mutant. Quod confirmatur ab *Hippocrate, lib. de Natura pueri:* qualemcumque humiditatem caro attraxerit, siue albam, siue fuluam, siue nigram, tali colore etiam Pilus inficitur.

Cæterum, Pili cum sint alij *Congeniti*, alij *Postorigeni*: Pili *Congeniti* videntur ortum habere ex portione terrena seminalis matris, vt ossa, ungues & cornua, quorum

omnium eadem est materia, ex *Aristotele, lib. de generatione animalium*, quod inde probatur. Pilorum materia semini maximè est analoga & proportionata. Nam nati referunt substantiam, formam & colorem Pilorum alterutrius parentis. Quin etiam *Posterigeni* Pili ab eadem materia seminali nondum in partibus illis exhausti & exsiccati, ortum habere videntur. Si credimus *Seneca lib. 1. q. 1. est. nat. cap. 29.* In femine omnis futuri hominis ratio comprehensa est, & legem Barbae, & Canorum nondum natus infans habet. Totius enim corporis, & sequentis ætatis, in paruulo occulto quoque lineamenta. Id ex eo confirmatur, quod Pili eiusmodi tum crumpunt, cum seminalis materia turgescere incipit, quæ latentem illam & sopitam materiam in partibus pilariis suscitât. Præterea vitiosa & corrupta seminalis materia partium genitalium, si vitii suum effundat in partes spermaticas corrumpuntur & defluunt Pili, ut in lue venerea confirmata quotidie obseruamus. Accedit quod ex abundantia materię seminalis Pili luxuriant, eadem deficiente marcescunt & decidunt. Deinde Eunuchi, & qui venerem non exercent, caluitio rarè laborant, quod in aliis libidinosis nimium præmatrè ex coitu acceleratur. Docet *Aristoteles*, quod si vir aut mulier ab ortu fuerint impubes ex aliquo vitio partium genitalium, steriles inde fieri. Quod confirmatur ab *Hippocrate, lib. de Articulis*, quibus spina infra seprum transtulerunt gibba est. pubes & barba seriùs crescunt, & minùs complentur, & minùs fecundi fiunt, quàm quibus gibba est pars superior.

Si quis obiciat ex *Aristotele, lib. 2. de generatione animalium, cap. 2.* Pilos in morbis magis crescere, quàm per sanitatem, & in senio magis quàm in iuuentute. Respondum ibidem assignatur, tum humor qui non potest in alias partes diffeminari, in Pilos conuertitur. Sed illi ex prauo illo fundamento nutritionis non diu durant, nec firmiter inhaerent. Nam decidunt, ubi quis ex morbo conualecscens incipit probè nutrirî. At senio vergente omnes Pili sensim defluunt.

Pilos, inquit *Scaliger*, non alitur intus, neque præcisus verè crescit, sed ab imo sumit alimentum, & sicut lapides crescunt densatâ aquâ, ex apposita noua materia quæ expellit præeuentem, sic Pili nutriuntur, & crescunt per appositionem, non per veram accretionem, quæ fit secundum omnes dimensiones. Attamen si capilli per morbum albescentes, postea redeant ad naturalem colorem, ex *Aristotele*, certum est Pilos verè nutriri per totam substantiam. Deinde si in vera canitie Pilus in fastigio albescere incipit, non à radice, necessum est alimentum vsque ad fastigium distribui. Denique si vna nocte Pili derepentè canescunt, ut in quibusdam obseruatum fuit, tam repentina mutatio fieri non potest sine humoris distributione vsque ad cacumen Pilorum. Ergo Pili verè & propriè nutriuntur.

Forma Pilorum duplex est, vna *Essentialis*, altera *Accidentalis*. *Essentialis* ea est, quæ dat esse Pilis, qualis est anima. Propterea Pilos esse animatos nonnulli fusiunt, quia radices habent per quas sugunt & eliciunt alimentum. Cavitates in quas recondunt attractum alimentum. Poros etiam per quos exudat in quibusdam sudor superfluus ex vbertate alimenti attracti. Quidni etiam natiuo calore præditi erunt ad eas actiones obeundas. Nihilominus tamen non possum mihi persuadere Pilos esse animatos animâ propriâ instar plantarum eiusdem speciei, quæ in eadem area feminantur & crescunt. Sed animaotur dumtaxat, vel potius viuunt, si verè sint animati, beneficio animæ totius corporis, non autem anima vegetante peculiari, quæ de re animosè disceptatum fuit inter Physiologos, tam Medicos quàm Physicos, quos adire poteris, & quid lubuerit expiscari atque sectari.

Cum autem propria Forma & vera Pili, & reliquarum partium similiarium nobis sit ignota, ex *Aristotele lib. 4. Meteor.* Medici pro forma cuiusque partis similiaris, accipiunt Temperiem, à qua omnis proficiscitur actio. Proinde forma Pili erit Temperies frigida sicca: Siccitas autem maior in Pilo quàm in osse, ex *Antenna*. Quoniam ex Pilis per destillationem humoris minùs extrahitur, quàm ex ossibus. *Accidentalis* Pili forma, est ipsa figura oblonga & rotunda, aliis videtur angularis, siue recto, siue obtuso angulo, quia superciliares Pilos dicunt esse rectangulares, alios obtusè angulares. Ad figuram reuocari potest Pili rectitudo & crispitudo. Substantia Pili fissilis est, ex *Aristotele*, quia findi potest, & adeo fissilis, addit *Scaliger*, ut etiam scissus videatur cauus capillus.

Pilos esse cauos in morbo Polonorum *Plica* compertum fuit. Nam ex illis præcisus sanguis effluebat. Ex *Gesnero* Pili Alces sunt concaui, & distinguuntur pellis Alces à

pelle ceruina, quod illa insufflata in parte opposita statim expirare manu appressa percipitur, cum sit plena meatibus, & Pili in ea concaui. Quamuis *Gesnerus* in mortuæ alces Pilis nullam cavitatem obseruaret, fatetur tamen in uiuente posse reperiri: ne c leuem huius cavitatis in Pilo coniecturam dabit Seta Suilla dorſi, quæ fissilis est, & manifestè diuiditur. Pennæ autem venulam habent cavitati intrusam. At eo modo Pili nutriuntur quo pennæ, sunt ambo eiusdem naturæ excrementa. Cum igitur Pili sit fissilis, quidni cauus? Cum ex *Aristotele*, cap. 9. lib. 4. *Meteor.* Fissile sit, quod meatus in se habet. In Nabuchodonosore apud *Damiclem* cap. 4. Capilli ad similitudinem aquilarum crescebant: id forsitan naturale esse potuit, quamuis miraculosum, ratione vius agrestis, fœnum instar bouis comedendo, crassiores redditi fuere capilli, ac proinde caui instar plumarum aquilæ.

*Efficiens causa* Pilorum quorundam opinione, facultas est expultrix, foras eiciens partium excrementum fuliginosum, à calore nativo adiuta. Dum sensim protruditur, etiam ab externo & ambiente frigore magis exsiccat instar coralli, quod in aquis mollis fuit herba, ex vndis emergens induratur. Dicerem Pili à vegetante facultate produci, adiuta ab alteratrice & formatrice facultatibus, quæ dum agit in Pilos, *Pulifica* nominabitur, & cum hæc certo tempore, arque in certis & peculiari-bus locis operetur, certum est eam diuigi à præstantiore causa, nempe anima.

*Finis* Pilorum triplex est. Primus ad integumentum & munimentum partium: sic in muris extruendis, si lana permisceatur cum calce, maior fit resistentia Sclopetorum & bombardarum ictibus. Narrat *Busbequius* in *Itinerario Constantinopolitano* se vidisse Constantinopoli lanissarium, cui caput tanta Pilorum congerie circumse-pum erat, vt Sclopetorum ictus illæsum & intactum eluderet.

Secundus est ad decus & ornatum.

*Turpe pecus mutilum, turpis sine gramine campus,*

*Et sine fronde frutex, & sine crine caput.*

Propterea cum pulchritudo corporis dependeat ex omnium partium inter se harmonia & symmetria, auctore *Galeno* ex *Platonis sententia*, necessum est corporis pulchritudinem foedari, & informem ac inuenustam reddi ex Pilorum defectu.

Tertius finis est ad cibendas & absorbendas totius corporis fulgines. Propterea *Raxæ* & *Ancienus* experientiâ docti sicquentem testantur capitis Tonsuram aciendo visu maxime conferre, quod Pili humorum fuliginem ebiât & absorbent. Vt enim arbores sæpius decacuminatæ vberius crescunt, sic Pili largius erumpunt, si sæpius tō-deantur. Tonderi ad cutem in diuturno priuiz cursu consulit *Celsus* lib. 2. Nec caret mysterio, quod Hygie *Æsculapii* filiz, hoc est sanitati, Sicyoniæ mulieres valetu-dinis curam habentes, comas suas detonsas consecrabant, vt apud *Pausaniam* legi-tur. *Ægypti* quoque conceptis verbis capillum pueri defectum, diuis suis nuncupa-bant, vt ab aduersa valetudine respiraret. Neque alio fine *Aristotelem* attonso vertice vsum fuisse narrat *Laërtius*, quàm vt valetudini suæ consulcret, quod à *Medico* tem-pore *Galeni* fuditatum video, qui ad cutem vsque detonsi erant, vt ipse narrat lib. 6.

*Epidem.*

Nihilominus tamen *Leuinus Lemnius* lib. 3. de oculis naturæ miraculis, sanis suadet, ne barbam ac capillos ad viuam cutem deradi sibi patiantur, adiecta ratione. Depo-pulator enim nimius eius rei vsus vires, atque homines effeminatos mollesque reddit, quinetiam spiritus & calorem natium resoluit, atque extenuat, maximamque audaciz ac confidentiz partem in adeundis periculis cordi detrahit. Verumtamen ob-seruo olim inter Athletas (qui in promouenda corporis firmitudine, & *Atletæ* studium omne ponebant) iis qui viriliores erant, ad cutem vsque rescussisse capillos, vt in *Amatoris Dialogo* ostendit *Lactantius*. Forsan faueret *Lemnius* historia *Abalanis*, qui virtutem illam & insigne robur quo pollebat, abrafis capillis amisit. crescente ca-pillitio recuperauit. Sic *Nisus* capillo suo purpureo ab eius filiâ *Scyllâ* spoliatus, vitâ quoque priuatus fuit, quia Pilo incolumi mori non poterat. Sic *Dido* apud *Virgilium*, lib. 4. *Æneid.* moribunda vitam trahebat in perpetuis doloribus, quia

*Nondum illi flauum Proserpina vertice crimen*

*Abstulerat, Stygiæque caput damnauerat Orco.*

*Ergo Iris crucis per calum rursus a penus,*

*Mille trahens variis aduerso Sole colores*

*Deuolat, & supra caput adfixit, hunc ego Diti*

*Sacrum inſſa ſero, ſequè iſto corpore ſoluo.*

*Sic aut, & dextra crimem ſecat, omnis & vni*

*Delapſus calor, atque in ventos viſta receſſit.*

Quæ cum attondentur earum impetus cohibetur, & fronte triſtiori ſunt, ex *Ariſtotele lib. 6. de hiſtoria animalium*, *Scaliger* addit in *Commentario*, abſciſſo nodo caudæ creſcunt carnes, cæſa pullis cæſarie creſcit Collum: Rationes adſunt ætusi materiâ, At. quare cohibetur impetus in venerem tonſurâ? Nam hoc etiam *Calabri* armenarij, & *Aquileſes* & *Armeni* nobis dixerunt, mihi certè videtur ratio difficilis, ex *Scaligero*. Obſervabis an verum ſit, quod nonnulli ſcribunt, Pili maleficorum vim aliquam ineſſe, propterea maturè cute tenus detondendos eſſe.

Cum igitur tanta ſit Pilorum utilitas, ac neceſſitas: Mirot *Scaligerum lib. de hiſtoria plantarum Ariſtotele*, & *Comment. lib. de hiſtor. animal.* aſſeuerare nullos Pilos eſſe neceſſarios. Pili, inquit, in homine nulli neceſſarij, quidam verò adeo ſunt inutiles, vt etiam impediunt vſum vitæ. Cuiuſmodi ſunt ij, quos in ſuperiori labro, *Myſſacæ* Græci vocant. Nam, quod ait *Galenus*, ad tegendum homini datos à natura, tollit eiſ prudentiam, ſimulque eleuat eorum fidem, quæ de ipſa prædicabat, exedificat ſe nobis manum, quæ futura eſſet instrumentum instrumentorum.

Cæterum ineptia huius pertinaciæ apparet in cadaueribus, quibus Pilos creſcere manifeſtum eſt, cum tamen illorum iis nullus ſit futurus vſus. Cæterum excrementorum rationem ac finem declarabimus: Quod exequutus eſt *Comment. de hiſtor. animal.* Pilorum finis, inquit ille, eſt duplex. Vnus excretionis, & eſt finis non ipſorum, ſed naturæ in ipſis. Alter ipſorum ad naturam. Priorem finem ſic intelligit, eſt materia in corpore quæ excerni debet, ea autem duplex, aut tenuiſſima aërea, atque exit per vaporem, aut craſſiſſima per coctionem, eaque exit per Pilos, quos natura quantum poteſt molitur: Pilus igitur nobilior eſt, quam alia excrementa, quoniam vbi poteſt illum creat. Ergo Pilus hic nullam habet futuram utilitatem, ſed præteritam, itaque ipſorum nullus eſt finis, ſed in ipſis. Quædam enim habent finem in ſe propter ſe, quemadmodum homo animam rationalem, quæ poſtquam eſt introducta ceſſat generatio, quædam habent eundem quidem finem, omne enim quod eſt in prædicamento ſubſtantiz eſt abſolutum, & habet eſſe ſuum propter ſe, tamen hoc quod ſunt, ſunt propter aliud, veluti Pili excrementitij, vt ne eſſet, quod erat in corpore excrementum. Hoc in gente etiam vermes cenſentur, qui in ventre generantur. Haſtenus ex *Scaligero*.

Quamvis Pili producantur neceſſitate materiæ, tamen *Scaliger* Pilorum erat neceſſaria ad tutelam & conſervationem corporis, tam ab internis, quam externis iniuriis. Quare quidquid eſt in corpore humano ſecundum naturam, illud eſt neceſſarium ſimpliciter, quia ſi deſiceret aliquid, corpus non eſſet perfectum. Sic mundus non eſſet perfectus, ſi aliquid deeſſet eorum, quæ à principio mundi creata ſunt: id eoque vt homo ſit perfectus, nihil ei deeſſe debet eorum, quæ naturaliter ad eſſe debent. Præterea cum natura nihil faciat fruſtra, ſi Pili eſſent inutiles, vel contra naturam, vel præter naturam exiſterent. At non ſunt contra naturam, quia in omnibus expullulant, ſuo & conuenienti tempore: Nec ſunt Pili præter naturam, quia non ſunt ſuperflui, & nullius vſus, quia præter vſus assignatos ſunt etiam indices temperamenti corporis, & ipſius cutis, ex doctrina *Galeni*. Morbos etiam occultos declarant, quoniam afflicto & ſanario Lepræ, quæ deſcribitur in *Veteri Teſtamento*, potiſſimum colore Pilorum dignoſcebantur.

Significant etiam mores animi.

----- dura per brachia ſeta

Promittunt atrocem animum.

Quapropter natura quantum poteſt intendit generationi Pilorum, itaut eorum regenerationem impedire ſit opus difficiliſſimum, ex *Galeno lib. 9. 11. 12.* Nec remedium adhuc ſatis efficax excogitatum fuit. Non facilius eſt decidi Pili noua productio vel multiplicatio, ſi vitium aliquod inſit, vel fundamento inhaſionis, nempe cuti, vel materia noſatis apta, & conueniens ſubſtituatur.

Differentiæ Pilorum quamplures reſcenſeri poſſent ex *Ariſtotele, libro quinto de generatione animalium*, ex mollitie & duritie, longitudine, & breuitate, multitudine & paucitate, reſtitudine & criſpitudine, ex colore vario, de quibus ſigillarim pauca ſubnectam. Pili molles ex lenta & humidior materia prodeunt. Nam mollitudo

lentitudinis & humiditatis soboles est. Duri ex materia crassa & sicciore gignuntur, quia crassitiem sequitur durities. Sunt autem Pili in mulieribus propter ténueritudinem cutis molliores, in viris duriore, in regionibus frigidis molliore. In calidis duriore. Ex vbertate alimenti molliore sunt, per inediám duriore, ex *Aristotele*.

Præterea recti sunt molles, intorti & crispi duriore. *Ab eodem in Problem.* queritur cur oñium Pili duriore sint, quò prolixiore, secus in homine. Demde queritur, cur oñibus expilatis mollior Pilus subnascatur, hominibus autem durior, explicationem inuenies, *scilicet. 10. Problem.*

Longitudo & breuitas dependet ex vbertate & inopia alimenti, & eiusdem praua qualitate, vt docet *Aristoteles, c. 3. lib. 5. de generatione animalium.* Sed admirabile, quod scribit *Fernelius, cap. 2. lib. de Elem.* Pilos cùm ad iustam magnitudinẽ peruenierunt, non vltra promitti trahique posse, tametì materia ad radicem suppetat. Vnum ex his est, in quibus non aliud, quàm mirari liceat Dei & naturæ Providentiæ. Pili autem crescunt à radice, non à summo vt alij. Crescunt in defunctis, quia sunt reliquæ caloris & humidi, non quidem vitalis, sed elementaris, sicuti crescit muscus super lapidibus ex aëris concretionẽ. Multitudo & paucitas Pilorum dependet ex copia vel penuria humidi, atque ex paucitate vel multitudine foraminum cutis. Recti Pili à temperato calore, crassaque materia per rectas vias exeunte formantur, Pili crispi, quia flexuosi & incuruati, ex humore crasso per vias anfractuosas erumpente, aut per vñsionem constantur, vt docent *Aristoteles & Galenus, lib. 2. de temperam.*

Quod spectat ad colores, nihil in tota Physiologia magis simpliciter & obscurum occurrit, quàm verum examen & scrutinium colorum. Quamuis enim Medici paucos in humoribus, Pilis, & partibus colores obseruent, non tamen inter se conueniunt de natura colorum, præterea Pilorum colores, quantum attinet ad nostrum institutum, breuiter exponam.

In Pilis colorum causas reuocare licet ex *Aristotele lib. de Coloribus*, ad internas & externas. Internæ sunt duæ, calor tanquàm efficiens, vel imminutus, vel excedens. Atque humidum natiuum paucum, vel copiosum, aut aduentitium. Externæ sunt aëris ambientis qualitates, & alimenta tam solida quàm aquea. Cutim quoque conferre ad colorandos capillos scripsit *Aristoteles, lib. de Color. & alibi*: quoniam cuti redduntur Pili concolores. Attamen *libro quinto de generatione animalium*, fatetur in brutis cutim esse colorum causam, non autem in homine, quoniam albi nigros præ se ferunt capillos, imò dum cutis immutatur à Sole, vel ab aliis causis externis, Pili nullam mutationem recipiunt. Attamen non inficiatur Pilum sequi colorem cutis, non vt causam, sed vt medium.

Istas omnes causas in colorum explicatione demonstrabo ex *Aristotele* hoc posito fundamento. Quod Pilorum colores sunt duo extremi Albus, & Niger. Alij sunt Medij, Flauus, Ruffus, & Fuscus. Reliqui non reperiuntur in Pilis, vt Puniceus, Halurgus, Porraceus, & alij, quamuis in pennis auium obseruentur. Dantur etiam colores compositi Alboruffi, *à uirgij*, in quibus Pilus circa radicem albicat, in extremo ruffescit. Albi sunt Pili, cùm humidum adhuc proprium retinens colorem, exsiccatum fuerit à concoctione, inquit *Aristoteles, lib. de Coloribus*. Sed intelligere oportet humidum natiuum, non extraneum, ex quo Pili canescunt, vt in vitilagine & senectute, per illam humoris putredinem, quæ *Alexis* dicitur ab *Aristotele, lib. 5. de generatione animalium, cap. 4.* Quod si humidum illud penitus exarescit, Pilus colorem mutat, & ex albo niger euadit. Cani verò reuocantur ad albos: Tales euadunt, vel à morbo, vel à repentino accidente, vel ab ætate.

Interea notabis insigne mendum subesse apud *Aristotelem, libro tertio de historia animalium*, vbi agit de canitie Pilorum, in *æuim*, cùm legi deberet, in *uim*. Nigri fiunt Pili quoties in generatione ipsum humidum, vt in alijs omnibus antiquatum & tempore confectum, propter copiam nigredinem contraxerit, ex *Aristotele*, id est, dum humidum à calore natiuo non fuit excoctum: ideoque defectu caloris interni illa nigredo accidit, quæ in Æthiopibus ab externo calore potest induci, quamuis etiam in temperatis regionibus nigerrimi homines instar Æthiopum obseruentur. Nā potest calor per adustionem nigrum colorem rebus inducere, ex *Galeno lib. 2. de temperam.* quod pernegat *Aristoteles, lib. de Coloribus*. Quidam existimant nigra omnia

fieri, propterea quod alimentum ipsorum comburatur à calido, quemadmodum & sanguinem, & aliorum vnumquodque, etrantes. Nonnulla enim animalium statim ab initio sunt Nigra, sicut Canes, Capræ, & Boues, nec tamen alimentum habent adustum. At procedente ætate, atque adeo in ipso ætatis vigore, quò sicciora sunt & calidiora, minùs sunt Nigra. Fusci verò. Russi, & Flauï Pili, inde fiunt, quod in ipsis præuenit aresctio humidi, antequam perficere absoluantur mutatio in nigredinem, adeo vt humoris defectu non perducatur ad nigredinem. Sunt autem quidam gradus in humidi exsiccatione, nam Flauï citissimè exsiccantur, secundum ordinem obtinent Russi. Tertio loco succedunt Fusci, qui plus habent humidi, atque omnes eiusmodi Colores ex Albo & Nigro constati videntur, vt docet *Aristoteles, lib. de sensu. Qui plura desiderat de Coloribus Pilorum consulat Aristotelem, lib. de Color. & lib. 5. de gen. animal. cap. 3. 4. & 5. Galenus verò, qui Pilorum Colores humorum totiusque corporis temperiem indicare voluit, Pilorum Colores ex humorum Colore repetit, lib. 2. de Temperamentis c. 5.*

Cæterùm Pili in diuersis partibus corporis pullulant, in Capite, Superciliis, Palpebris, in Genis, & Mento, Axillis, Pube & Podice, atque intra Nasum, & Aures. De quibus scorsim agemus, vt demonstramus non sine vsu peculiari, in his locis Pilos fruticare. Inter animalia nullum est Homine pilosius in Capite, ex *Aristotele*. Pilus autem ibi nascitur, non tantùm ratione Cerebri, quod est magna glandula, ex *Hippocrate*, nec ratione plurimè humiditudo Cerebrum abundat, ex *Aristotele*, sed propter illum triplicem Pilorum vsum, quem supra exposui. Homo, inquit *Aristoteles, libro secundo de partibus animalium, cap. 14.* maximè omnium piloso Capite est, tum ad necessitatem, tum ad tutelam, necessarium enim erat propter Cerebri humiditatem & commissuras caluz ad munimentum, vt frequentia Pili Caput operiens defenderet à nimio frigore & calore. Vberius crescunt, atque prolixiores sunt in Capite Pili, quàm in alijs partibus, atque molliores & tenuiores, atque densiores. In *Abissalonia* Tonsura capillorum semel in anno cælorum, ducentos siclos ponderabat, *Leontici cap. 19.* id est, libras Romanas duodecim cum dimidia. Pili capitis in vertice, in duos ordines per lineam longitudinalem diuiduntur, quæ à *pilæ à vniuersis de vniuersis vocatur ab Aristotele*, in quibusdam est gemina, atque illi sunt Bivertices, *de vniuersis*, non ossè geminato, sed capillorum explicatione.

Capitis Pilus propriè dicitur *Capillus*, cuius congeries in mulieribus, *Coma* nuncupatur, à *uoin*, id est, orno, vel quasi *uoin*, ornamenrum Capitis, vel *capit* à *capit*, à credendo, vt in viris *Cæsaries*, à frequenti cæsiōe. Nomina Pilorum Capitis prout exoriantur, vel in diuersis partibus efflorescent, reperies apud *Tulium Pollucem*.

Superciliorum Pili *supercilia*, eo sine supra oculos applicati fuere, vt delabentes humores arceant, velut imbricamentum, aut suggrundium humoribus supernè defluentibus paratum.

In compage ossium Capitis positi sunt, *Pili in multis ossibus*, vt loquitur *Aristoteles, lib. 2. de partibus*, vel vt alibi, *qui in ossibus nascuntur in ossibus*, ideoque senescentibus inagis crescunt, quoniam in senectute ductis Ossibus transmittitur plus humoris. Sed ibi nulla synthesis, nullaque symphysis ossium obseruatur: proptereaque ab humoribus à Capite sub cutem defluentibus, & alimentum & incrementum admittunt. Hirsiutiores euadunt in senibus, cæteris etiam Pilis decidentibus canescunt tardius, & in media tantum parte. Eiusmodi Pili vnà nobiscum nascuntur cum ipsis ciliis, vnde ab his solis, cum reliquos omnes radant, *Ægyptiorum* sacerdotes abstinent.

Pili palpebrarum, *palpebræ*, Latinis Cilia, ordine quodam seriatim non confusè dispositi sunt, vt in alijs locis: Nec vltra certum terminum excresecunt, imò fermè ab ortu vsque ad vltimum senium æqualem seruant magnitudinem, propterea *Galenus lib. 11. de vsu partium*, admiratur summi opificis industriam, in ortu & dispositione Ciliorum, quæ contra naturam aliorum Pilorum, cartilagini duræ adhærent, nec crescent. *Aristoteles lib. 2. de partibus*, scribit Cilia venarum clauiculis summis inniti. Nam vbi cutis finitur, ibidem venulæ etiam desinunt. Itaque propter vaporem, qui inde crassiusculus prodit, Pilos iis locis nasci necessum est, quod est fallum, & repugnat doctrinæ & opinioni. *Galenus, lib. 11. de vsu partium* Homo solus Cilium in vtraque palpebra obtinuit. Quadrupes nullos Pilus habent in palpebra inferiore, nisi sub ea contineantur. *De vsu Ciliorum* pluribus dictum est supra. Sunt autem colore semper nigro, nec cum reliquis canescunt: sed in salacibus hominibus defluenter scriptis

*Aristoteles, Probl. 20. sect. 4. Nec vnquam defluere notauit Galenus, lib. 11. de vsu partium, nisi in magnis partis affectibus, vt in lue Venerea, & Elephantiasi.*

Pili qui in genis & mento erumpunt, barbam constituunt, quæ vel à dictione pilius dicitur, quia gravitatem & auctoritatem viro conciliet, vel à dictione Barba, quæ veteri Glossario virum significat, quia foli viro Barba competit : Græcis ὄψις vocatur, ὅτι τὸ πρῶτον αὐτῆς, ὡς καὶ τοῦ προσώπου, οὕτως ἐστὶν ὁπώρατος, ex Etymologica magna Græce : ὄψις etiam dicitur, ὅτι τὸ πρῶτον, ἢ ἀπὸ τοῦ τὸ πρῶτον αὐτῆς ὡς ὀψίον τὸ πρῶτον, ex eodem Etymologica. Generantur in genis & mento Pili ex necessitate materie, & opportunitate loci, quoniam laterales faciei partes, iuxta angulo s maxillæ inferioris occupant glandulæ Parotides, & sub mento quamplures glandulæ continentur.

Nimis subtile est iudicium *Alberti Magni* de productione Barbz. Nascuntur Pili Barbz ex acuto calore ab anteriori Capitis reflexo, & propter motum fortem & frequentem, super mandibulam inferiorem attrahunt, quæ vicina & opposita est loco, à quo fit reflexio. Viro concessa videtur Barba ad euacuationem fuliginosi excrementi, quod magis abundat in viro, quam in muliere: cumque totum nequeat absumi à capillitis defuit in Barbam: ideoque viti quia calidiores, duplicem euacuationem obtinere, Comæ, & Barbz. Femine vnam tantum, Comæ. Quapropter non ad integumentum faciei videtur Barba comparata, quia mulierum facies tenerior & mollior, eodem operimento indigebat aduerfus frigus. Nec ad decorem & auctoritatem viro addita fuit, vt mulieri venerabilis esset, quos vsus eleganter explicat *Galenus, lib. 11. de usu part. cap. 14.* Sed potius vt daret indicium pubertatis & adolescentiæ, ac proinde nouæ facultatis exoritis, nempe procreatricis, quo tempore pueri à puellis distingui, ac sepatari debent.

Barbæ ratio incredibile est quantum conferat ad dignoscendam corporis maturitatem, vel ad differentiam sexus, vel ad decorem virilitatis ac roboris, vt videatur non conflatura fuisse totius corporis ratio, si quidquam aliter fuisset effectum, inquit *Laſantius*. Itaque cum sit Barbæ index facultatis diuinæ, nempe procreatricis, in parte diuina efflorere, ac elucere debuit, vt esset testis, & index sexus, & temperamenti, ac virtutis parrium genitulum. Ideoque Pili Barbæ augentur coitu, cum reliqui, nempe Capitis, & superciliorum, minuantur, ex *Aristotele*.

Ex Barba de ingenio hominis iudicium ferre difficile est. Barba frequentius spectatur & agnoscitur, quàm Philosophus.

*Si promissa facis sapientem Barba, quid obstat,  
Barbatus possit quim caper esse Plato.*

*Clemens in Constitucionibus Apostolicarum.* Non oportet Pilos laxè distendere, neque formam hominis contra naturam pervertere. *Non deplabitis, lex ait, barbas vestras.* Hoc enim honestum, qui eas condidit Deus, esse voluit. Viris autè indecorè sanxit.

Pili eiusdem Barbae pro ratione locorum differunt mollior, quia labiorum Pili mystaces, sunt aliis duriores. Omnes tamen inflexi deorum vergunt, ne sine impedimento oculis. Nescio unde vocabulum istud *Grignaeus* expiscatus fuerit *Conchitar*, quo Pilos Barbae in muliere vocat. Quasdam enim mulieres barbatas fieri certum est. Ut patet ex duabus historiis Phaeulæ vxoris Pythæ, & Namyfæ vxoris Gorgippii, apud *Hippocratem Lib. 8. Epid.* Idem confirmat *Aristoteles* de Mulieribus Sacerdotibus in terra Caria. Sed Barba illis iam adultis conigit ex suppressione mensium. Nuper tamen à triginta annis, in Gynæcio Archiducis Austriae, Græciæ, vixit fuit iuencula, quæ à teneris annis ante mensium eruptionem, Barbam instar viri promissam cum mystacibus gestabat, & à quindecim annis talis vixit. Luteix.

Pili pubis sine viâ vfu videntur enafci, fed tantum neceffitate materiz, quæ in his locis luxuriat, propter glandulas in inguine, & alias glandulas, Proflatas in pectus collocatas. Attamen *Galenus*, lib. 11. de *usu partium*, circum pendenda Pilos neceffariò proveniffe fcribit, propter humiditatem & caliditatem iforum locorum: ornamentum, atque operimentum iftis partibus præbent, non aliter quam nates ano, præputium pendendo. Sed eorum vsum moralem produxit *Theodoreus*. Incipit in pube germinare Pilus mari & femine, quæ ratio firmit viciû à virtute difcemit, quafi tegere volens natura velamentis naturalibus eas corporis partes, ob quas homines erubefcere confueverunt. Et quoniam femina funt viris humidiores, idcirco priùs pubefcunt, & quo citiùs pubes exoritur, eò celerior eft facultas procreatrix, cuius index eû Pilus earum partium: ideoque impubes tam viri quam mulieres, generâdi







bus Vnguium repetit *Aphrodisius*, lib. 1. *Probl. 46*. Nec ab ea opinione recessit *Asclepiades*, dum lib. *de natura pueri*, tradit ex venis, arteriis, & cute manus nasci, & formari Vngues, qui intercepti ac concludunt venarum extremitates, vt non amplius augeant, neque altera alteri præineant. At lib. *de principijs*, ex glutinoso humore qui ab offe defluit, Vngues formari decreuit, interuentu calidi, quod eam substantiam siccat & indutat: & *Aristoteles* cap. 6. lib. 2. *de generat. animal.* hominis manus ideo Vnguibus donatas esse scribit, quod inrer animalia terreno excremento maximè exuberant.

*Galenus* incertus est, quid statuat de Vnguis geueratione. Quidam affirmant, inquit, lib. 2. *administrationum Anatomicarum*, ex ossis, nerui & cutis concretionem procreari, alij carnem etiam addunt. Sed per eorum substantiam tria eiusmodi vasa videre, aut demonstrare est impossibile, vt demonstratur in partibus quæ ab alijs producuntur. Nam quod ex aliquo nascitur, est eiusdem substantiæ cum suo principio. Attamen certum est, neruam, venam, & arteriam Vnguibus porrigi, vnde sensum, vitam & alimentum sicut alix partes accipiunt, & instar pilorum ab radice augentur, quia vasa, vt in alijs partibus, per rotam eorum substantiam non disperguntur, sed præter vsum communem, vasa inferiunt ad firmitatem Vnguium, ne suspensi vacillent, quin etiam ligamento proprio constringuntur, vt firmius hæreant, propterea carni tenaciter adhærescunt, & cute ad radicem conteguntur. Cutis enim radices Vnguium eo modo complectitur, quo gingiux dentes comprehendunt. In radice sua inferiore Vnguis candidus est ac mollis, foris aurem durior & rubore suffusus, ob id à radice sua crescit, quod percipitur ex cicatrice radicis, quæ progressu temporis ad extremum digiti peruenit, & refecatur.

Inde cognoscet Pilos & Vngues eodem modo nutriri & crescere, etiam in cadaueribus. Vngues autem omnibus insunt, quibus & digiti, similes imbricati, homini lati, & defuncto crescent, rapacibus vni, cæteris rectè vt in canibus.

Confusionem illam & obscuritatem opinionum, quæ reperitur apud Authores antiquos, tam Philosophos quàm Medicos, sic euoluo & explico, edoctus à *Camillo Baldo*, præstantissimo Philosopho Italo, lib. *de Vnguium inspectione*, paucis quibusdam mutatis, quæ mihi non arident. Vnguis est Tendinis mouentis digitos extremitas, extra carnem & cutem aëri exposita, ad firmandas & perficiendas digitorum operationes.

Huius duæ sunt partes, Vna interna, Viuens & sentiens, altera externa insensibilis: vtriusque eadem substantia, & continuitas, quæ producitur à tendone: ideoque cum Tendo sit ligamentosus, vt probatum alibi, similiter eiusdem naturæ erit Vnguis, sed solidior tendine, quia contactu aëris exsiccat & induratur.

Vngues humani alij sunt manus, alij pedis: Vngues manus sunt pulchriores, arque soli considerantur à Medicis & Chiromantis, ex quibus indicia quædam sumunt ad vitam & mores hominum, ideoque differentias Vnguium exacte scire & cognoscere conuenit.

Differunt autè inter se substantia, quantitate, qualitate, loco, actione, & passione.

Substantia consistit in duritie, mollitie, raritate, densitate, asperitate, leuitate.

Quantitas spectatur in magnitudine, paruitate, continuitate, & solutione.

Qualitas pendet à colore liuido, pallido, roseo, lucido, obscuro, vel maculis distincto.

Figura Vnguium alia est recta, alia rotunda, alia incurua, alia æqualis, alia inæqualis & scabrosa.

Ab actione Vnguium, quidam sunt robustiores, alij infirmiores. Actio est apprehensio. Verùm figura, siue forma Vnguium dependet à tendine. Color ab humoribus prædominantibus, vel deficientibus. Ideoque ex Vnguium constitutione naturali, vel contra naturam, licet dignoscere & prænoscerre multa in homine: si fuerit Medicus peritus, certiora quàm Chiromantes addiuinabit.

Porro, diuiditur Vnguis à Chiromantis in tres partes: Prima dicitur radix, in plurimis alba, quæ viuat infixæ carni & tendoni, & sensus particeps. Secunda est media, rubore suffusa in his qui bene valent. Tertia est ea, quæ nec viuat & sentit: continenter crescit, & refecatur insensibiliter instar capilli. Hæc despicitur in diuinatione ex Vnguibus. Chiromantici, qui subtiliùs addiuinant supra Medicos, dicunt manum dextram demonstrare fatum eorum qui interdiu nascuntur: sinistram, fatum eorum qui noctu ex vtero prodierunt.

Præter

Præter hæc digitos planetis attribuunt, Veneri pollicem assignant, Ioui indicem, medium Saturno, annularem Soli, Auricularem Mercurio: dextra manus demonstrat prosperitates, manus sinistra infortunia portendit.

Eleganter demonstrat *Camillus Baldus*, Chiromantiam, ac proinde Onychomantiam, penitus nihil veri, nihil sani conuenire, certiores esse prædictiones Medicorum ex vnguibus, ratione constitutionis naturalis, & contra naturam: Falsum tamen deprehendi, quod referunt *Aristoteles*, & *Plinius*, si mater falsioribus cibis vsa fuerit, fortum edere vnguibus carentem. *Hippocrates* vitalitatem fortis ex vnguibus cognosci prodidit, lib. de *superfetatione*, cum puer non vitalis futurus nascitur, caro ipsius vngues supereminet. Vngues verò rum in manibus, tum in pedibus deficiunt.

Cum autem vngues nobis viuentibus assiduè crescant, quando excedunt digitorum extremitates, refecari debent: olim non licebat vngues exscindere in nani, nisi ventis iratis, ait *Petranius in Satyris*. Apud *Plinium lib. 28. c. 2.* Vngues refecari nundinis Romanis tacenti, atque à digito indice multorum pecuniæ religiosum est. At verò *Hippocrates*, dum vnguium decorem, ac vtilem formam describit, illorum refecandorum terminos præscribit, *scilicet. 1. part. 20. Officina*, Vngues neque longiores, neque breviores sint digitorum summitatibus, immodicè longi, quia in se mutuo concidunt, exigua corpuscula exactè apprehendere non possunt, breviores verò digitorum extremitates ad apprehendendum inuvalidas efficiunt, qui autem summitatibus digitorum æquantur, firmam & tutam apprehensionem reddunt.

Vnguium vsus est, præter apprehensionis commoditatem, insergere ad fricationis suauitatem, vt testatur *Socrates in Phædono apud Platonem*, qui à vinculis solutus, priusquam sorberet cicutam, iucundissimam sibi fuisse fricationem lætabatur. Ex *Aristotele libro quarto de partibus animalium*, Vngues operimenti gratiâ tantum hominibus dati sunt, cæteris animantibus ad alium vsum, digitorum enim extremitates tegunt, ac tuentur.

Cæterum, vngues licet situ inter partes corporis extremam locum obtineant; dignitate tamen non infimum possident. Nam *Hippocrates* eruditam Onychomantiam proponit, dum morborum signa ex vnguibus depromit, inde salutis & mortis petit indicia, in tabe adunci sunt, quod etiam accidit in suppuraris peripneumoniacis: manuum ac pedum vngues contracti euadunt in hydrope. Si fiant liuidi in ægrotantibus, imminens mortis certum signum est. Quinetiam morum & ingenij, vitæ & mortis signa ex vnguibus petuntur, quæ omnia in *Physiognomonia Baptista Porta* declarantur.

### Finis Libri quinti.





IOANNIS  
RIOLANI  
ANTHROPOGRAPHIÆ  
LIBER SEXTVS.

DE FOETV HVMANO.

P R Æ F A T I O.



T omnia à veteribus Anatomicis tentata & vulgata fuisse intelligatis, ne quidem hanc partem doctrinæ Anatomicæ, quæ tractat de *Humano Fœtu*, intactam ac prætermiffam fuisse demonftrabo. Nam Fœtum humanum nondum editum, vel recentem natum diffeciffe, quin etiam vterum grauidum infpexiffe, patet ex *Galeno lib. 2. admin. Anat. cap. 3. vbi hortatur tyrones, vt relictis visceribus Fœtus, atque Vteri grauidi confectiõibus, mufculis cognofcendis incumbant. Et lib. 6. cap. 1. eufdem operis, explicatis generationis instrumentis, proximum eſſe de fœtibus adminiſtrandis dicere. Veteres quoque Anatomici infantes fœris expoſitos, in montibus perquirebant ad uſum Anatomicum, vt Galenus notat lib. 3. admin. Anas. Ipſemet Galenus librum de formatione fœtus conſcripſit. Et librum de diffectiõne fœtus citat, lib. de diffect. vulua. Primus autem Hippocrates huius doctrinæ arcana nobis aperuit, lib. de nat. pueri, lib. de fœtus exſectiõne, lib. de dentiõne, lib. de Oſſumeltri & Septimeſtri partu. Quinetiam Ariſtoteles fatetur ſe quamplurima animalia fœta diffeciffe, vt eorum generationem deprehenderet & obſeruaret, ac potiſſimum ſi fœtus ore ſugeret alimentum.*

Primus *Arantius* inter recentiores Anatomicos, libellum eruditum de ſetu humano ſcripſit, in quo miracula formationis fœtus, & Vteri prægnantis detexit & aperuit. *Fabricius ab Aquapendente* librum de formato ſetu. Iconibus elegantiffimis exornatum, anno 1630. in lucem emiſit. Ego verò antequam eius liber ad meas manus perueniret, ad imitationem *Arantij*, nouas cogitationes & obſeruaciones in lucem produxeram, quæ nunc auctiores & emendatioreſ prodeunt. *Spigelij liber de humano ſetu* editus abſurda multa & ridicula proponit, quæ ſuo loco examinabo.

Studium hoc Anatomicum commendat *Carpus Comment. in Anatomem Mundini*. Ad ſcientiam, inquit, Anatomicam acquirendam, incumbendum Anatomiz fœtuum diuerſarum ſpecierum animalium, quia multæ partes membrorum ſimplicium luci-

diffimz videntur per Anatomiam foetuum, quz in perfectis non apparent, nisi diminutè.

Sed valde decipiuntur, totoque cælo aberrant, qui ex foetibus animalium opinantur humani foetus cognitionem adipisci, quamvis id scriptum fuerit ab *Actio terribili 4. sermone 4.* si quis diligentius speculari ea quæ ad foetum pertinent desiderabit, capram, aut vaccam, aut geruam dissecare poterit.

Cæterum foetus humanos à veteribus inspectos & observatos fuisse non est dubitandum. Nam præter testimonia iam producta, in *Codice Iustiniano* lex extat lib. 2. ff. *de mortuo inferendo, & sepulchro adificando*, quæ illum neciscum iudicat, qui gravidam sepelierit, non prius extracto foetu, quod spem animantis cum gravida peremisse videatur. Sic legimus *Julium Cæsarem cæso* & aperto matris vtero prodiiisse: quin etiam ipsum *Æsculapium Medicinæ repertorem* ita natum, cecinit *Ovidius lib. Metam.* Vtinam ea lex nunc vigeret, nostroque sæculo renouaretur, sæpius extingz mulieri, foetus saluus & ineolumis eiperetur, qui cum matre viuis inferretur tumulo, infandæ eæde morte illius tyranni factâ, qui mortua corpora viuis iungebat. Etenim narrant *Gorgiam Epirotani* ex matre mortua, iamque elata in funus, viuum erupisse. Accidit *Madridi* in *Hispania*, vt ex gravida muliere ad locum subterraneum sepulcræ delata, foetus prodierit. Exemplum simile visum *Vvessemburgi*, filiz ab vtero exclusæ vagitus exauditus, vitæ & incolumitatis causa fuit, quâ nunc vivit, *Vvessingz* in *Marchionatu Badensi* degens. Consimilia exempla leges apud *Diomedem Cornarium*, in *historiis admirandis medicis hist. 14. & Ianum Matthæum in quæst. medicis, Fabricium Hildanum Centuria 3. Obseruat. Haratium Augustinum lib. de missione sanguinis.*

Sed humanæ salutis artem conseruatricem, crudeliter alium viuentium gravidarum incidisse, & considerasse nuspiam memoratur, quod olim artis magicæ horrendi facinus fuit, videlicet extra foetus ab vtero matris extracti scrutando. *Lucanus lib. 6.*

*Pulvere sic ventris, non quò natura vagabat,*

*Extrahitur partus, calidû ponendus in aris.*

Eius scelus accusatur *Maxentius Imperator*, apud *Ensebiû historiæ Eccl. sc. cap. 8. cap. 14.* post mortem *Juliani Caris* in officina artium veterarum, inter instrumenta quibus Imperator ad magicas vsus fuit, viderunt mulierem à capillis appensam, extensas manus habentem, cuius vterum aperuerat, vt *Perfarum* victoriam in iecore infantis inspiceret, vt refert *Cassiodorus lib. 16. cap. 48. historia tripartita.* Apud *Ammianum Marcellinum lib. 30.* Pollentianus à Valente in exilium missus, quod viuz mulieris ventre atque intempestiuo partu extracto, infernis manibus excitis, de permutatione imperij consulere ausus esset. *Aristoteles* vocat ferinos & inmanes habitus cap. 6. lib. 6. *Ethic.* qualis erat eius mulieris, quam dicunt gravidis mulieribus apertis pueros deuorare solitam. *Neronem* licet impium, & *Matricidij* crimine notatum, in hoc solo laudarem, quod matris mortuæ cadaver inspiceret, & primum illud hominis domicilium à quo ipse prodiiisset, contemplari voluerit.

Atque vnam Reges & Principes inde discerent, quàm friuola sit hominis animalium superbissimi origo, qui nihil aliud est, quàm spuma libidinis concreta, ac veluti fluor titillantis lasciuiz in vtero conglobatus, iacens & degens in sordido gurgustio, inter stercoreis vtres, & saccati humoris obscœnissimas serias, vt loquar cum *Arnobio*. Hinc collige & perpende, quàm sit splendidum primæ nostræ habitationis domicilium, vt ex fragili & peritura materia, nempe putri & corrupto semine inter stercoreus & vrinam nati sumus, & quod miserabile est, per nouimense spatium tanquam sus in sterquilinio, in vrina volutamus, & dum his cloacis & latibulis, quibus eramus incarcerati erumpimus & euadimus, podicem genitricis ægrè parientis, si mas, exosculamur: aut ex aduerso, vesicæ meatum, & obscœnas matris partes, & si quid est in corpore muliebri spurcius & sœdus, vultu & ore, si femina, circumuertimus & circumlambimus, ex opinione quorundam Anatomicorum. Cùm itaque Reges & Principes his principiis nascantur, corporum ortus & obitus sint planè consimiles, dum in cineres post mortem reducuntur cadauera. *Is demum profecto vitam aqua lan-*  
*te pensabit, qui semper fragilitatis humana memor erit. Plinius lib. 7. cap. 7.*

## FOETVS COGNITIO QVOMODO disci & doceri debeat.

### CAPVT I.



**Q**UOD Foetus humani historiam perfectè scire desiderat, is foetum nascentem & formatum considerare debet. Ideoque duplex constituenda foetus *consideratio*. *Aliqua generationis* vsque ad motus initium, partiumque discretionem manifestam: tum locus, & locatum diligenter debent obseruari. Locus est ipse vterus aliter conformatus toto conceptionis tempore iuxta formationis tempora. Locum est foetus, cuius principia semen & menstruus sanguis veniunt consideranda, simulque formandi foetum quatuor tempora, & quid vnoquoque accidat, & accrescat. Multae etenim spectantur partes, & eduntur actiones in corpore foetus, quae in alio tempore gestationis disparent. Nec eorum certa haberi potest cognitio. Proinde foetus non tantum extra vterum ciedus est spectandus, sed intra vterum diuersis temporibus, ut eius situm, vmbilici reuolutionem & dispositionem membranarum videre queas.

*Alter a consideratio* foetus est, quando formatus, & absolutus à seipso mensse vsque ad nonum prodit in lucem, vel in vtero moritur. Tum in eo considerabuntur partes proprias & communes. Propriae sunt, quae dumtaxat in foetu reperiuntur, quarum beneficio ipse foetus actiones in vtero exercet. Illae verò sunt externae, & internae. Externae ut placenta, membranae duae, chorion & amnios, vasa vmbilicalia vmbilicium constituentia, humores, & sordides lutosi foetui immediatè circumiecti. Partes propriae internae sunt vasa tria, vel quatuor vmbilicalia. Duae arteriae, vnica vena & Vrachus, atque excrementum nigrum intestinorum, anastomoses vasculum Cordis, quae omnia Foetu in lucem edito abolentur. Communes partes quas habet foetus cum adulto homine, nec vnquam abolentur, sunt reliquae corporis partes, quamuis paulò aliter conformatae appareant, grandiores enim crescente foetu euadunt, & mutationem aliquam accipiunt in substantia, qualitate, colore, figura, ut obseruare est in quibusdam partibus nutritiis, genitalibus, Cerebro, & ossibus.

## DE CONSTITVTIONE PARTIVM *Genitalium in muliere grauida.*

### CAPVT II.



**Q**UONIAM humani Foetus historia non satis commodè potest intelligi, nisi prius cognita & perspecta veri naturâ, in quo foetus generatur, conformatur, & absoluitur: Operae pretium duxi partium muliebrium historiam praemittere, prout spectatur in grauida muliere, quae partes istas aliter affectas & constitutas habet, quam mulier vacua.

*Muliebris vteri substantia* in aliis carnosa est, solida & dura, in grauidis sensim mollis, fungosa spongiosaque, red dicitur ita ut in multos cortices quatuor aut quinque, capax uero diuidatur. Haec substantia contra naturam aliarum membranarum, quanto magis distenditur, tanto magis augetur & crassescit, adeo ut instante partu pollicari sit crassitie, ut obseruauit *Sylvius primus*, ne quis putet ab *Arantio* id prius dictum. Quamuis multa in vtero praegnantis inuenerit aliis indicta. Sed circa elatiorem fundi partem duorum penè digitorum crassitiem aequat. Talem substantiam natura vtero tribuit, ut sanguinis tam venosi quam arteriosi, & spirituum copiam, pro Foetus vita & nutritione contineret, adnatæque vtero Placentæ toris in modum distribueret. Confert



quam expandatur ipsa. Tribus vel duabus ante partum septimanis, humore quodam viscido & glutinoso imbuitur, & intumescit, ut sine laceratione distrahi & dilatari posset, in partu enim ita dehiscit, & aperitur, ut vna prope cavitatis æqualis à fundo vteri ad pudendum appareat: cum sic patet, *Vteri Corona dicitur*, vulgò ab obstetricibus, & *Couronnement de l'enfant*, quia foetus dimidium caput eo circulo carneo coronatum, diu hæret in eo vestibulo. *Galenus* miratur, nec intelligere potest, quomodo foetus saluus & incolumis per angustam illam viam eluctari, & egredi queat, *lib. 14. de usu partium. & lib. 6. de locis affectis*. In muliere nobili tribus horis à partu mortua & dissecta, vidi orificium illud valde carnosum, & amplitudine sua æquale cavitati vteri, & in orificio externo propter summam illam dilationem, caruncula ibi collocatae prius erant oblitteratae, vaginæque pudendi substantia licet distenta, tamen carnosa, & mollis, absque vllis rugis spectabatur.

*Vteri cervix* gravidis sursum tracta, & in longitudinem ducta pressius quàm cæteris arctatur.

*Spermatica vena* ambò multò maiores sunt quàm *arteria*, præsertim parturiente iam muliere, ita ut emulgentibus venis magnitudine sint æquales. Inde cognosces istas venas, tum sanguinem ad nutritionem foetus deferre, nec seminalem humorem continere, à partu ad pristinam angustiam contractæ redeunt, ut proportionatum vtero & novo conceptui quantitate alimentum suppeditent, ex *Avantio*, qui notat, quod etiam observavi sæpius venas & artetias spermaticas à prima conformatione, priusquam in vterum perveniunt, inter se commisceri. In quibus verò venæ ab arteriis sciundæ ad vterum perveniunt, intra substantiam, vel potius inter duas membranas lateraliter & extrinsecus inter se permiscuntur, & si alteram venam insufflaris, observabis venas dextras & sinistras inter se coire & communicare, venarum autem & arteriarum hypogastricarum secundum latera vaginæ vteri & corporis vterini disperisæ, cum spermaticis vasibus uniuntur, ac veluti continuantur. Nec disseminantur per vteri substantiam, ut sic in aliis partibus, quia per tubulos seu fistulosos canales, quales in spongiis notantur, in ipsa vteri substantia exsculptos, sanguis distribuitur. Detracta membrana exteriori vteri, quæ facile separatur: Observabis vasculum à teste ad collum vteri descendens. An sit portio eiaculariorij vasis, vel arteria superiorem remeans, non potest id tam facile deprehendi, propter multiplicem vasorum intexturam. Animadvertit *Cornelius Gemma* vasa vteri post multiplices partus varicosa in mulieribus fieri, quod est verissimum, & accidit ex nimia vasorum distensione, quæ post partum contracta varicosa fiunt.

Anno Domini 1613. die 23. mensis Maij, gravidam mulierem dictam Genouefa Supplicem, omen in nomine, Lutetiam suspensam fuit. Illa cum esset obesa, pingui aqualiculo, & opulentiis mammis prædita, vacua nec foeta, ab obstetricibus & Chirurgis ad visitationem convocatis iudicata fuit, ideoque ob insignia furta extremo supplicio affecta fuit. Ipsa tamen muliere ad extremum usque vitæ spiritum pertinaciter asseverante, se gravidam esse, & motum infantis percellere. Cadauer à iudice criminalium causarum ad usum Anatomicum impetravi, & in Scholis Medicinæ multis Doctoribus Medicis præsentibus, & ferme trecentis tam Philiatris, quàm litteratis vicis ad hoc rarum & mirabile spectaculum confluentibus dissecui, atque per duos dies consequentes, quatuor lectionibus Anatomicam foetus humani historiam enarraui, atque demonstraui. Mulier quinque menses erat gravis, ut ex foetus magnitudine & perfectione cognitum & decretum fuit. Ante dissectionem in partibus externis multa observavi notatione digna, ex mammis pressis lac stillabat, papillæ areola multum amplificata erat, umbilicus foras prominebat, orificij externi carunculae subturnidæ erant, nec discretæ, sed membranofum veluti circulum simul iunctæ & vnitæ effingebant. Aperto ventre inveni testes plavios & albicantes, medij vteri lateribus accumbentes. Tuba vteri non erat amplior quàm in muliere vacua. Spermatica vasa deferentia minimi digiti crassitiem æquabant. Dextrum maius erat sinistro. Vasis eiacularis distributio manifesta erat, è medio testicula productum, cum pervenit ad fundum vteri, in tres furculos diuidebatur: Unus tubam vteri petebat. Alter fundum vteri penetrauit, tertius corpus vteri perreptabat usque ad orificium internum cervicis. Eiaculariorum sinistrum maius erat dextro. Vteri substantia ubique digito crassaverat, instar spongiæ fistulosa & carnosa. In fundo fistulæ & cavernulæ amplio-

res erant quàm alibi. Nulli per vteri substantiam venarum ramuli dispersi erant, sed euidenter conspiciebatur hypogastricarum venarum & articularum distributio, & ab infernis partibus ad superiores sanguinem efferri. Hypogastrica vena pollicari crassitie erat. Verum vteri collum durum erat, ac veluti callosum, mucosum tanquam glutine obduratum. Pudoris sinus venosus & carnosus, sed eius pars inferior rectè intestini agglutinata. Carnosior ac venosior apparebat. Vtero dissecto vidi Placentam fundo vteri affixam fibrarum interuentu, videturque toto suo corpore ab vtero exfugere sanguinem absque nutria venarum osculatione, siue anastomosi. Placenta verò digiti crassitiem æquabat. Incisis membranis tres aquæ libras eduxi vrinæ simillimas. Fœtus autem suis adhuc aquis innatans poterat in omnem partem moueri: nam digito pulsus huc & illuc celeriter instar globi reuolutus circumferebatur. Inde cognoui situm fœtus in vtero, qualem *antiores Anatomici* describunt fidum & commentitium esse. Duas tantùm membranas obseruaui, Chorion, & Amnion. Umbilicus sesquipede longus erat, circa pueri corpus nullomodo contortus. Fœtus verò sua membra sic habebat composita, pedum calcanea nates tangebant, manus complatæ erant, cubiti femoribus innixi, manibus supra genas positæ caput sustinebat.

## DE COTYLEDONIBVS.

### CAPVT III.



**PARTES**, quæ ad fœtum pertinent, vel considerantur, prout fœtum ambiunt, vel quatenus continentur intra fœtum. Quæ extra fœtum consistunt, *Sunt vasa, membrana, humores, & carnea substantia.* Vasa sunt duplicis generis, quædam umbilicalia, binæ scilicet arteria, vena, & *Vrachus*, alia sunt vteri. Quæ si iuncta sunt cum vasis umbilicalibus, eorum commissuræ & anastomoses *Cotyledones* dicuntur.

Membranæ sunt tres in brutis, in homine duæ, *Amnion, & Chorion.* *Allantois* brutorum est propria: *Humores fœtum ambiunt* sunt duo, sudor & vrina intra amnion conclusi, simulque mixti vnum humorem constituunt.

*Carnea substantia duplex est*, altera crassa & orbicularis iecoris parenchymati similis, quæ *Placenta* & *lecor Pterinum* vocatur. Altera caro est pituitosa, siue mucosa. *Vasa umbilicalia* instar tunicæ obuoluens, vel illis circumiecta. *Aristoteles* aliquos *apertus*.

*Partes*, quæ intra fœtum continentur sunt, *Nutritia & vitalia organa* aliter structa, & fabricata, atque etiam vasa tam Cordis, quàm Iecoris aliter conformata, & excrementa corporis nigra in intestinis coërcita. Denique in capitis ossibus, vt & reliquis totius corporis partibus, magnum discrimen apparet, vt postea demonstrabitur.

Sed inchoabo à partibus externis, & primùm inquiram de *Cotyledonibus*. Scribit *Gal. lib. de dissect. vulua cap. vlt.* mulierè eo tempore concipere, quo vasorum vteri orificia recluduntur, quod accidit fluentibus menstruis: tum enim tument ora vasorum, & ob eam asperitatem exceptum semen faciliùs vteri parietibus adhærescit, quod alio tempore irritum effluit: Vnde fit, vt ante mensium eruptionem femina rari concipiant, propter vteri leuitatem occlusis vasis, quibus apertis & fluentibus menstruis conceptio fit. Hunc vasorum tumorem & apertionem, *Hippocrates* *umidum* vocat, vel à figura herbæ *Cotyledonis*, vel à Polypi piscis *Cotyledonibus*, quæ sunt in brachiis duplici ordine dispositæ. Vtraque interpretatio profertur à *Galeno lib. de dissect. vulua cap. vlt. & lib. 1. de femine, cap. 7.*

De *Cotyledonibus* non minor fuit inter veteres, quàm recentiores *Anatomici* controversia. *Soranus Ephesus* negabat in vtero humano *Cotyledonas* reperiri, & *Diocles* opinionem irridet, qui volebat in vteri amplitudine, vel acetabula vel cirros, vel cornua esse: qui processus quidam mamillares sunt, lati quidem ad basim, in summo verò minoribus terminis definiti, vtrique lateri à natura magna prouidentia adiuncti, vt fœtus ante assuescat papillas mammarum exfugere, quam in lucem exeat. Sed qui sentiunt in dissectionibus falsi sunt, & omnino superuacanea est de eis instituta oratio, vt in commentariis de *genitura animalium* demonstratum est. *Erotianus* in *Onoma*.



*Athen* fus eludit etufimodi acetabula hæmorrhoidibus fimilia, ex quibus *Diocles* putabat embryonem nasci. Verum eos omnes mentitos esse alibi monstrabimus, inquit *Erasmus*. Temporibus *Galen*i nonnulli pro Cotyledonibus glandulosas carnes vasorum orificiis adnatas accipiebant, ut ipse notauit *Galenus*, commentario ad *Aphorismos*. 43. lib. 1. & lib. 2. de *semine* cap. 7. significat se ex professo demonstrasse, lib. de *Anatome secundum Hippocratem*, non vasorum orificiis circumiectas carnes pro Cotyledonibus vsurpandas esse, sed ipsa vasorum orificia concava. Idem in *Exerptis* Cotyledonas exponit ora vasorum, quæ in vterû desinunt, ut in *libris de dissectione secundum Hippocratis doctrinam* demonstrant. Idem docet lib. 11. de *vsa partium*, cap. 1. & pluribus verbis explicat lib. 31. *Aphorismos* 45. Ora vasorum venientium ad vterum, ex quibus secundæ pendent, acetabula nominauit *Hippocrates*, non sicuti quidam arbitrantur adnatas ipsi carnes glandulosas. Nam, ut ipse notauit, lib. 1. de *morbo mulierum*, si acetabula plena fuerint pituita, menstrua fiunt pauciora, & *Praxagoras* in *primo de naturalibus*: Acetabula, inquit, sunt ora venarum & arteriarum, quæ seruntur ad vterum. *Aristoteles* libro tertio de *historia animalium*, cap. 1. scribit quod cornigera, & vna parte dentata acetabula habent in vtero dum partum gerunt, atque etiam animalia vtraque parte dentata, ut lepus, mus, vespertilio, eadem acetabula suis continent locis. At cætera v-trimque dentata animalia, pedibus prædita, vuluam lauem omnia habent, & partus ipsi vuluæ non adheret per acetabula. Idem repetit lib. 2. de *generatione animalium*, c. 7. Sed lib. 7. de *historia animalium*, cap. 8. & loco citato lib. de *generat.* notat quibus conceptionis temporibus Cotyledones appareant. Quibus, inquit, in vulua sunt acetabula, foetu crescente ipsa minuuntur, postremo abolentur omnia. Ergo non omni tempore inuestiganda, nec in principio, nec in fine conceptionis, quia in principio sanguis non affluit ad vterum, sub finem conceptionis magis consumitur à foetu, nec amplius in istis tuberibus tanquam in mammis asseruatur, ut loquitur *Aristoteles*.

*Falsopius* in *Observationibus* post longam de Cotyledonibus disputationem, tandem fatetur in vtero humano nullas extare. Idem sentit *Arantius* lib. de *factu humano*, nisi forsitan accipias pro Cotyledonibus, spongiosæ vteri substantiæ poros. Idem *Arantius* affirmat se varia animalium genera secuisse, ut veram figuram Cotyledonum ab *Anatomicis* descriptam, putà vmbilico veneris, siue acetabulo similem obseruaret, quam in ouillo tantùm & caprillo genere vidit. Animaduerti etiam in vaccino. Sed in ouillo & vaccino genere notabile discrimen obseruauit, quoniam in ouibus Cotyledones ipsi vtero inhaerent, carnosæ tubercula vasorum chori excipientes. Alia reperitur in vaccis conformatio. Nam tuberosæ carnes ouales ex vtero protuberantes, à cauitatibus chori excipiuntur.

*Sylvius* in *de pulf. column. Vesalij*, Cotyledonas pertinaciter defendit, asseritque in muliere parturiente, aut recens enixa appetè spectari, si Chorion à propria vteri tunica clementer digitis diducatur, sanie quadam & paucò sanguine fluere vasorum oscula, quod si vterum inuersum post hanc separationem inlaueris, foramine per quod foetum extraxeris probè ligato, Cotyledonas apertius videbis, modo recens mortua sit mulier, & caleat adhuc vterus. Eadem fermè repetit *Cornelius Gemma*, sanctæque affirmat se Cotyledonas vidisse in vtero, & per venam inflato.

*Nicolaus Massa* doctus & peritus sua ætate Anatomicus, suam de Cotyledonibus vteri sententiam proponit. Non pauci decepti sunt, inquit, credentes Cotyledonas esse capita venarum apparentia in tunica intrinseca corporis matricis. Sed nota quod Cotyledones sunt quædam ligamenta Secundinam, matricis substantiæ, quæ ligamenta prodeunt ab ipsis cauitatibus venarum ad substantiam Secundinæ, & ipsam alligant matrici, quæ Cotyledones non inueniuntur nisi in prægnante, quas plures vidi alligantes secundinam, & separavi ab ipsa matricis substantia.

Existimat *Laurentius* omnes de Cotyledonibus vteri humani difficultates, hoc modo & sensu componi posse. In vtero Cotyledones non sunt, id est, tubercula papillis mammarum similia, ut in brutis: sed Massa quædam carnea ex infinitis venarum & arteriarum ramusculis miro artificio implicatis, & sanguine velut affuso contexta, earum vicem gerit. At cur tubera illa Chorion vtero firmiter alligantia non habent humani foetus? An quia tam numerosam prolem non gerit mulier? An quia quadrupedum vterus magis extuberat, qui nisi validioribus vinculis necciteretur, vix foetum posset gestare? Sed omnes istæ rationes sunt proflus inceptæ, 1. quia capra, ouis & vacca vnicum foetum edunt. 2. Deinde ista ligamenta debent esse externa ad

continendum vterum : At Cotyledones sunt intus collocatæ. Porro cum nullæ venæ per vterini corporis substantiam ramulosè distribuuntur, sed hypogastricæ & spermaticæ venæ vaginam, seu sinum muliebrem amplectuntur, & iuxta veram ceruicem infernè sursum sanguis vterum ascendat, qui per tubos & canales vt in spongiis dispergitur, nullæ possunt esse Cotyledones in vtero humano : sed placenta parietibus internis vteri affixa, ac veluti agglutinata, toto suo corpore sugit, proleatque sanguinem diffusum per vteri substantiam, quæ crasse sit istius sanguinis affusione, cuius effluxu post partum sensim contrahitur.

Non sunt igitur in mulieribus Cotyledones quales in brutis reperiuntur, inuestigandæ, sed eorum loco placentam inuenies, per innumeras fibrulas ligamentales vteri parietibus adhaerentem, qua dempta videbis partem illam vteri exasperatam, tuberculis granis milij similibus conspersam. Quinetiam obseruo faciem illam placentæ, quæ vtero agglutiniatur, tuberosis caribus intercisam esse, quæ formam Cotyledonum æmulari videntur, si tubercula carnosafumantur pro Cotyledonibus, nam defunt cavitates in vteri superficie interna, quæ excipiant istas tuberosas carnes placentæ.

## DE MEMBRANIS FOETVS.

### CAPVT IV.

**D**IVERSIONIS & generationis ordo iubet à membranis fœtus exordiri, dissecto enim vtero primæ occurrunt, primæ etiam omnium partium generantur, auctore Hippocrate, lib. de natura pueri, licet Arantius velit esse propagines membranarum abdominis in fœtu. Quoniam vasa vmbilicalia extra Vmbilicum prodeuntia duobus inuolucris vestiuntur, quorum vnum internum, quod immediatè vasa complectitur, à peritonæo producit : Alterum externum membranæ carnosæ soboles existit : Ex illis membranis Vmbilici, contendit Arantius tunicas fœtus propagari, sed inuerso situ & ordine. Nam interna membrana producit externam tunicam, nempe chorion, & externa constituit tunicam internam videlicet Amnion. Sed Chorion membrana cum sit crassior Amnio, à carnosâ membrana potius oritur, quàm à peritonæo. Deinde situs membranarum Vmbilici id attestatur. Denique membranæ fœtus procreantur, priusquam partes ipsius fœtus sint delineatæ.

Huic tamen opinioni de ortu tunicarum fœtus ex vmbilico, fauere videtur Hippocrates lib. de genitura. Cum ait, ex vmbilico protenso fiunt membranæ : & ipse in genitura Pfalteriz vidit ab vmbilico membranam productam, quæ genituram continebat.

Valcherus Coiter ortum membranarum cum Arantio confusè & obscurè describit. Chorion constitui videtur ab interna intestinuli, id est, vmbilici tunica dilatata, vt Amnios ex dilatatione intestinuli, siue substantiæ illius viscosæ : In cornutis manifestum exortum à cute dilatata consequitur.

Galeni opinio de membranarum origine non prorsus aspernanda videtur, eique subscribit Varesius. Illas videlicet generari sicut crusta in bellariis & placentis ab ignis calore in superficie suscitatur, concretescente seminis superficie, & in membranas abeunte. Quod antè docuerat Aristoteles, lib. 2, de generatione animalium, cap. 4. eùm erit corpusculum ; siue concretum, loquimur de fœtu, expellitur humidum, & membranæ ambiunt, ex siccatis partibus terrenis. Idque partim ex necessitate, partim finis gratiâ. Necessitas est, quia extrema eorum tam quæ calefiunt, quanto quæ frigescunt, siccantur necessariò. Finis est, quia fœtus non debet natare in humore secreto, sed separatus esse.

Verùm in numero, & natura, siue compositione membranarum, Galenus ex brutis manifestè deceptus fuit, easdem ac similes in humano fœtu esse ratus. Nam tres membranas fœtui humano adscribit, Chorion, Allantoidem, & Amnion cum iam Allantois in brutis tantùm reperiatur. Iulius Pellæx, Galeni contemporaneus,

lib. 2. *Onomastici*, duas tantum foetus membranas enumerat, Chorion, & Amnion. *Plinius* lib. 15. cap. 22 binario numero foetus inuoluta comprehendit. *Ruffus Ephesius* lib. 1. cap. vlt. duas tantum membranas constituit, Chorion & Amnion. *Majichio, author Græcus*, lib. de morbis mulierum, binas dumtaxat membranas foetus enumerat, Chorion, & Amnion: proinde ridiculus est *Spigelius*, dum *Galenum* & *Vesalius* concili suo adimplulari in addituenda Allantoide, quam adesse putat in humano foetu: si reperiatur in brutis, ergo in homine deprehendetur, si diuidantur membranz more *Vesalii*, incipiendo à placenta, sed nullo artificio potest probari & demonstrari Allantoide membrana in humano foetu. Hunc binarium membranarum numerum peritiores Anatomici *Fallopins*, & *Arantius*, & ab *Aquapendente* confirmant.

Quod attinet ad membranarum naturam, *Galenus* Chorion membranam brutorum describit, nec placentam, massam illam carneam orbicularem agnouisse videtur, qualis extat in homine. Nam lib. de diffinitione vulvæ cap. vlt. Chorion venarum & arteriarum contextum quendam esse scribit, camque membranam vulvæ adhaerescere: præter hanc alias esse duas membranas foetum inuoluentes, Allantoidem, & Amnion. Vasa autem quibus ramulosè Chorion ubique conspersum est à vasis Vteri enasci, itaut venæ Chorij à venis Vteri, arteriæ ab arteriis Vteri pares numero producantur, ut ipse testatur lib. 15. de usu partium, cap. 4. lib. de format. foetus cap. 2. quod tamen est falsissimum, ut capite sequenti demonstrabitur, proinde non potest *Fallopins* iure *Galenum* excusare, quod dixerit concretam esse circa vasorum officia carnem mollem, intelligens placentam massam illi in carnem, quæ vel est multiplex & continua, ut in homine, vel multiplex & diuisa in tuberosas carnes, ut in brutis. Sed *Galenus* non dixit carnem magnam circa vasorum officia concretam esse, sed carnes, cap. 4. lib. 15. de usu partium. In omnibus animalibus, in e suis sunt ad saluandam proclina, ut ceruicis, & capris, vasorum productiones matricibus sunt connexa, non per tenues modò membranas, sed cum eis etiam per carnes viscosas, velut pinguedinem quandam. Fabricius ab *Aquapendente* existimat *Galenum* hoc loco placentam intelligere: & eodem sensu, *Aphorism.* 41. lib. 1. adnatas vasis Vteri carnes adenosas accipit, pro carne mole: & lib. 1. de semine cap. 1. Carnes dixit, quæ quibusdam animalibus vasorum officijs circumiectæ conspiciuntur, quæ nec possunt, nec debent accipi pro Coryledonibus. Verùm placenta quâ parte Vterum respicit, eique adstringitur tuberibus carnosus, instar glandularum discretæ & intercisæ est, ut videre est in placenta recenter ab Vtero diuisa, & excreta in partu: Quâ parte foetum excipit polita est & æqualis, ex membrana Chorij circumiecta. Sicque placenta dici potest conglobata caro, ex portionibus carnis agglutinatis, internæ Vteri superficiei agglutinata. *Hippocrates* lib. de Genitura, videtur hanc massam carneam, siue placentam nomine carnis designare. In muliere pregnantis permanens ab universo muliebri corpore sanguis, omnis ex parte foris circum membranam diffunditur, isque una cum spiritu per membranam quâ perforata est, & extat, attractus condensatur, & in futuri animalis augmentum cedit. Succedente autem tempore rursus alia multa tenues membranz eo modo quo prima, intra primam protendantur, eaque ex umbilico dependentes mutuis inter se vinculis connexa sunt. Quod cum extiterit, ex delapso & concreto materno sanguine caro gignitur, ex cuius medio umbilicus extat, per quem spiritum & incrementum recipit, &c.

Scio quod apud *Hippocratem* uis, massam carneam nondum articulatam ex semine & sanguine constaram significat: ac proinde caro illa significat partem utruosam Chorij, siue rudimentum corporaturæ in foetu. Sed nihil vetat, quò minus istud nomen in descriptione membranarum etiam placenz tribuatur. Annon *Hippocrates* per *αἰματινὴν*, intellexit placentam, siue orbicularem illam massam carneam? Quippe eleganter ex *Hofmanno*, *αἰματινὴν* & *αἰματινὴν* significaret placentam. Si tria hæc verba ad eandem rem pertinerent, quæ apud *Hippocratem* lib. de nat. part. sensu diuiso aliud significant. Nam *αἰματινὴν* & *αἰματινὴν*, iecur denotare voluit *Galenus*, lib. de Formatione foetus. Attamen ibidem declarat euidenter se in genitura illa sex dierum excreta, obseruasse membranam exterioriorem, quare instar fuggillatorum suffusam, *ἡδὲ αἰματινὴν*. Eodem libro paulo post addit, quidquid sanguinis à matre descendit, & caro spirando attraxerit, & in incrementum cesserit, quodque non vile fuerit. Sic legit *Cornarius*, additâ particulâ, non, *αἰματινὴν*, in membranarum sinus

fecerunt, ubi in sinus excauatæ fuerint, & sanguinem exceperint, Tum rectè *χῆριν* secundæ appellantur, quasi diceret *Hippocrates*, carnem istam ex inutili sanguine produci, dum incipit ali fœtus.

Sed *Galenus*, libello *aduersus I. yem*, eleganter delineauit placentam. In formis quædam caro & mollis, sanguinis grumo affinis, primam fœtus formam quandam in se suscepit, creuenta instar fugillatorum habens, ex ipsa seminis substantia, cum ei candor addit, *ἀνθρωποειδὲς ὄψις* ut ait *παλαιὸν ὀφθαλμικὸν ἄρρην* *ἵεραιον*, *ἡδὲ γὰρ οὐκ ὀφθαλμὸς τὸ ἀνθρώπου ὄψιν*, *ὡς αὖτ' αὖτ' ἔχοντα, καὶ τὸ πρῶτον ἀνθρώπου ὄψιν ἀνθρώπου, ὡς τὸ πρῶτον ἀνθρώπου ὄψιν* *ἀνθρώπου*.

*Varolius* existimat Veteres placentam appellasse Chorium, id est, secundam, quoniam in prima conformatione non ex semine sit, sed ut secundarium quid ex sanguine posterius aduenit. Sed nominis *χῆριν* Etymon, non denotat quod *Varolius* intendit probare. Nihilominus mihi placet Etymon à verbo *χέω*, quia suppeditat alimentum. Nam apud *Iulium Pollacem*, *Antiphon* scribit *χέω* dici, in quo fœtus crefcit nutriturque, *ὡς τὸ ἵεραιον ἀνθρώπου, & ἔστιν*.

Præterea, cum placenta sit radicatio vasorum vmbilicalium, haud dubiè *χῆριν*; quod est *ἵεραιον* vasorum vmbilicalium, ex *Galenus*, & *χῆριν* *ἵεραιον* *ἢ ἵεραιον*, ipsamet erit placenta. Adde quod *Aristoteles* lib. 2. de generatione animalium, cap. 7. distinguit *χῆριν*, & *ἵεραιον*. Itaut *χῆριν* sit aliquid secretum ab ipsâ membranâ, quod etiam confirmat *Aristoteles*, lib. 7. de historia animalium, cap. 7. Chorium videtur à membranâ distinguere, quod ex animalibus, quædam intra Chorium, alia intra membranas generantur. Ac primum gignitur animal intra Chorium, mox aliz membranz obueiant: intra quas humiditas quædam aquosa, Ichoroidis, sanguinea continetur, quæ *μυῖνος* dicitur. Quod si Textus *Aristoteles* cap. 7. lib. 2. restitutor ex iudicio *Hofmanni*, non est dubium, quin *Aristoteles* per Chorium intelligat placentam, siue massam carnem, in qua continetur sanguis, tanquam in mammis ad nutritionem fœtus. *ἡ δὲ τὴν ὄψιν, & τὴν ἵεραιον τὴν χῆριν, & τὴν ἵεραιον αὐτὴν τὴν χῆριν* (*χῆριν*) *παλαιὸν οὐκ ἔστιν, ὡς αὖτ' αὖτ' ἀνθρώπου ὄψιν ὄψιν αὐτὴν οὐκ ἔστιν*. Reliqua quæ interiacent reponit sursum, ut sermo de Acetabulis sit integer.

*Hippocrates* distinguit Chorium à membranâ, & passim Chorium videtur accipere pro placenta, siue illa mole carnea, lib. de superfetatione, si secunde non faciliè prociat, *τὸ δὲ χῆριν τὸ ἵεραιον ἀνθρώπου*. sed valida ac indubitata est isthæratio ex *Hippocrate* deprompta, quæ gemellos vtero gestat, eodem die velut concepit, parit, vno tamen inuolucro utrumque fœtum continet, *ἔστι δὲ τὸ χῆριν τὸ ἵεραιον ἀνθρώπου*. Ergo *Hippocrates* per *χῆριν* videtur intelligere placentam. Nam quilibet fœtus proprias habet membranas, Chorium & Amnion.

Falsum est, quod annotauit *Amatus Lusitanus*, Centuria 7. curas. 36. masculorum & femellarum diuerfas esse secundas, quod masculorum secunda extructa in orbem redigitur: femellarum verò secunda tanquam sinus duos, aut manicas duas representet.

Dubitaret aliquis, num *Aristoteli* iudicium confirmet *Hippocrates*, lib. 2. Epidem. sect. 2. in historia uxoris *Coriary*, quæ cum peperisset, & liberata fuisset, nonnihil visum est membranz de secundis excretum quarto die, *ὅψιν τὸ χῆριν τὸ ἵεραιον ἀνθρώπου*. An ibi distinguit membranâ à Chorio, lector expendet.

Cur placentam Chorij portionem esse crediderint veteres in causa est, inseparabilis adhesio membranæ Chorij cum ista membrana carnea.

Cæterum mirari subit, cur *Hippocrates* & *Galenus*, si parientibus mulieribus adfluerint, placentæ substantiam carnem, eiusque molem & figuram non offeruarint, atque talem non descripserint qualem nunc cernimus. An quia verecundus *Hippocrates*, totum parturiginis negotium obstetricibus commisit, remotis viris administris, nam in partu etiam difficili vnicum adesse permisit ad deprimendos humeros ægræ parientis mulieris. Nec enim istis laboribus viros interesse lubenter ferunt verecundæ mulieres. *Galenus* verò cum ex libere vitam duxerit, raro, vel nunquam parientibus mulieribus interfuit: ideoque nullum de morbis mulierum commentarium ex professo scripsit: Atque pauca de morbis mulierum, & parturiginis laboribus literis consignauit. Imò, libellus de matrice, quem esse poto eundem quem video libellum de libris propriis nominatum, & editum in gratiam obstetricis, totus videtur ex veteris animalium descriptis: propterea humanis lectis condonabit meæ pietati erga *Hip-*

*pocratem & Galenum*, si conatus fuerim ostendere *hystoriam Fetus humani* aliquatenus priscis illis authoribus innotuisse: Nunc verò cuique liberum relinquo, quod libuerit amplecti, aut probare, aut repudiare.

*Fabricius ab Aquapendente*, carnez substantiæ, siue placentiæ discrimen varium proponit in animalibus. Cuius rei iudicium & examen curioso Anatomico relinquo. Carneâ substantiâ quædam animalia viuuntur, alia carent. Habent Homines, Cuniculi, Canes, Felēs, Mures, Sucula Indica, item Oves, & cætera animalia altera parte dentata. Carent Placentâ Sues, Equæ, Pennatæ, & Ovipara omnia, item Pifces. Vnicam præ se ferunt Homines, Mures, Cuniculi, Canes, Felēs, Sucula Indica. Plures habent omnia, altera parte dentata, siue Domestica, vt Ovis, Vacca, Capra, siue Syluestria, vt Cerua, Capra, Dama, & id genus alia. Rursum quæ vnicam habent carneam molem in iis, vel caro figurâ suâ Placentam imitatur, vt Homini, Cuniculis, Muribus, & Porcellis Indicis, vel Cingulum, siue Zonam, aut fasciam refert, corporis Truncum obuoluentem, vt Canibus, & Felibus. Item quæ vnicam habent Placentæ similem, etsi figura in omnibus similis, situ tamen dissimilis est. Nam Homini Vteri fundo adhæret, & longissimè, hoc est per longa vasa à Foetu distat. Muribus verò & Porculis Indicis, partim lumborum regioni, partim Thoracis lateri annectitur. At quæ plures habent carneas moles, hæc altera parte dentata sunt omnia, vt Oves, Vaccæ, Capræ, Ceruæ, Capreoli, & similes, in quibus hæc spectatur varietas. Nam Ovis Carunculæ magnitudine sunt nucis avelanæ rotundiores, rubentioresque vt papilla mulicrum. Vaccis verò maiores, planioresque sunt, & albidiores, spongioso corpori, siue fungis exiguis persimiles. Hactenus ex *Fabricio*.

Nunc cuiusque membranæ naturam exponamus. *Prima & extrema Fetus Tunica* dicitur *χών*, *χών* & *χών*, quod in ea vasa veluti in choro disposita sint, vel à verbo *χών*, quod est imperior, vel quoniam sanguis *χών*, peruenit ad Foetum, vt scribit *Stephanus Athenicus*, *Comment. ad librum Galeni ad Glauconem*: quod si scribatur *χών* per u, Foetus veluti *χών*, domicilium & sedes erit, vel quod vnâ cum foetu *χών*: utroque modo scriptum hoc nomen occurrit apud Auctores, & præsertim *Hippiocratem*, qui lib. de *superfatione χών* & *χών*, vocabulis in eodem sensu vtitur. Quinetiam legitur *χών* in hac significatione apud *Hesychium*. *Meschio* notat Chorion vocari *χών* & *χών*, eo quod hæc membrana prior rumpitur, posterior erumpit, quia etiam infantem includit. Chorij nervosa est substantia omni ex parte foetum ambiens. *Galenus* duplicem constituit Chorij membranam, vt per duplicatam vasa securè dissiminentur, quæ tamen interiùs magis sunt conspicua, quàm exteriùs, quia tunica exterior crassior est interiore, rotunda carnosa, nullâ membranâ obuoluta.

Huic superiecta est *Cara quædam orbicularis*, instar lienis substantiæ nigricans, numerosis valis, quæ sunt radices vmbilicalium implicita, cuius magnitudinem secundum suas dimensiones, sic describit *Vesalius*. Latitudo ex Foetus proportionem tanta esse potest, quanta longitudo ab ossibus illiis ad mucronatam cartilaginem, ampliitudo tanta est, quanta summa interioris Vteri superficiem extensio: ipsius crassities facillè pollicis crassitiem æquat. Non ex semine cum aliis partibus generatur, sed ex sanguine, qui post exactum trigessimam diem affluit ad nutritionem & incrementum partium, cuius rei veritas inde patet, quia in abortu triginta aut quadraginta dierum circa Vmbilici radices iam factas, nullum aut exiguum huius carnis vestigium apparet. Sed in dies sanguine & spiritu copiosius affluente crescit & amplificatur, vt crescenti foeti alimentum proportionatum suppediet, proinde quousque foetus ad maturitatem peruenerit, non aliter quàm vasa vmbilicalia incrementum capeffit.

Referam quid de placenta mihi videre sæpius contrigit. Orbicularis est moles carnea, pedis latitudinem in medio duorum vel trium digitorum crassitie, in ambitu gracilescens atrenuatur, quæ Chorij magnam portionem comprehendit, & absoluit. Nam in abortiuo foetu triginta dierum vidi tunicam istam Chorion dictam, totam carneam ac tenuissimam, foetum vndique amplexantem: Et in foetu bimestri crassiorē vidi, sed lateraliter intercisam, tumque separatam à membrana Chorion, & in orbem formari incipit. Deinde instante partu, vt in grauidis mortuis obseruavi, Chorion crassum, interdum in duas membranas diuiduum, circa peripheriam placentæ termi-

terminatur, solaque tenuissimâ membranâ supra placentam expanditur, quâ parte vtero non adhæret, quâ tamen sine laceratione diuelli non potest.

Notabis etiam Chorion vndique Vteri internæ superficiei interuentu tenuium filamentorum affixam esse.

Placentæ substantia carnea, non est similis carni musculorum, neque parenchymati viscerum, sed est sanguinis concreti moles carnea, quæ attritione in sanguinem liquari & resolui potest. Placentam eo sine factam putat *Vesalius*, vt venas & arterias Fœtus ab Vteri valis enatas exciperet, falciret, colligeret, & in pauciores redigeret, quod ante docuerat *Galenus*. *Arantius* & *Varolius*, alium usum agnoscunt, maternum scilicet sanguinem elaborandi, vt purior & defæcator Fœtui distribuatur. Et quod mirabile est, sanguinem tam venosum, quàm arteriosum matris, totâ suâ substantiâ exsugit, & excipit sine villo discrimine. Inde arteriæ vmbilicales arteriosum puriorem ac tenuiorem, venæ venosum & crassiorum sanguinem eliciunt, quod verò est impurius in accretionem Placentæ, siue carneæ molis facessit. Isthæc duplicis sanguinis permissio facta fuit, vt sanguis venosus purior & defæcator traderetur Fœtui: atque vt ab vmbilicalium vasorum radiculis capillaribus facilius exsugeretur, inquit *Arantius*, qui ab hoc elaborationis officio carneam hanc molem *Secur* Pteridium nominavit: à *Fallope* placenta vocatur, à *Columbo* orbicularis affusio.

*Fabricius ab Aquapendente*, lib. de Fœtu demonstrat aduersus *Arantium*, placentam non depurare sanguinem maternum, priusquam Fœtui tradatur, ac proinde vasa vmbilicalia Fœtus cum vasibus vteri, vt voluit *Galenus*, per anastomosis coire. Primam thesim sex rationibus probat. Prima est, Quod in Hepate Fœtus, potius id opus absolueretur. Secunda, Quod in placenta defæcati sanguinis excrementa extarēt, quæ nulla sunt. Tertia, Quod hæc caro à præcis neglecta fuerit, vel pro re nihili habita. Quarta, Quod non omnibus inest animalibus. Quinta, quod hæc carnes primo fœturæ tempore maiores sunt, Fœtu ad exitum vergente minores semper fiunt, ex *Aristotele*. At si defæcando sanguini inferuient, contrarium obseruaretur, quia Fœtus grandior vberiore indiget sanguine. Sexta ratio est, Quod porcinus & equinus fœtus nullam habeant carneam substantiam, ne quidem carunculas, sed vasa Vteri & vmbilicalia sese mutuo tangunt.

Verùm istæ rationes sat debiles & elumbes, haud absolutè demonstrant placentam non depurare sanguinem maternum. Ipsemet *Fabricius* fatetur & admittit sanguinem depurari quidem à placentalis, dum impuriorem sanguinis portionem in suâ nutritionem conuertunt, sicquæ sanguinem expurgant, non primò & per se, sed tantum per accidens. Sed cæteris validior ratio producitur à *Fabricio*, ex arteriis vmbilicalibus, quæ iunguntur arteriis Vteri ad hauriendum sanguinem vitalem, qui non eget depuratione, ergo neque venosus. Pergit tribus rationibus *Galen*i sententiam confirmare, de anastomosis vasorum vmbilicalium cum Vtero. Prima est, quod sanguis maternus sine vlla mora à Fœtu in Fœtum transire debet ad nutritionem & incrementum. Id autem perficitur per illas vasorum anastomosis sine vlla cunctatione in placenta. Secunda est, si arteriæ vmbilicales non iunguntur arteriis Vteri, quomodo spiritum vitalem & parum haurient, si intra placētam cum vitioso sit permissus. Tertia ratio est, quod istæ vasorum Vteri & vmbilicalium coniunctio à veteribus Medicis constituta fuerit, quam repudiare, est euertere veterum doctrinam. Cum igitur hæc vasa non sint continua, sed solum contigua, faciliè disiungerentur, præsertim si corpus graue, cuiusmodi est Fœtus, illis appendatur. Idcirco natura carneâ substantiam circa vasorum fines apposit, quæ ceu glutine ad partum vsque horum vasorum coniunctiones conseruaret.

Respondet *Arantius* ex *Aristotele*, in illis portionibus carneis conglobatis, quæ placentam constituunt, sanguinem velut in mammis conseruari. Inde vnumquodque vas sibi proprium & familiare succum prolektare, eo modo quo in eadem area telluris, diuersæ plantæ, diuersos succos eliciunt. *Spigelius* negat placentam defæcare sanguinem, & quasdam profert rationes iam à *Fabricio* ab *Aquapendente* productas, proinde existimat vasibus interiectam fuisse instar tomenti & fomenti cuiusdam, vt multiplices venas & arterias colligeret, ac veluti nexu quodam colligaret.

Quando hæc caro disiungitur antequam Fœtus profuerit ab Vtero, magna consequitur sanguinis profusio, quæ Fœtum enecat, quia vita priuatur, quam à matre præhebat. Inperfecto & legitimo partu, maturi fructus instar, ab Vtero descendit. In abortu tanquam immaturus fructus difficillimè separatur. Cum autem subsistit diutius,

frivissima profert symptomata, tandemque interitum Foetus inducit, nisi maturè excludatur.

Nonnunquam tamen totam Placentam per septem dies hæsisse Vtero, & putrefactam exiisse prodidit Hipp. & post eum Paulus Aegineta: quibus subscribit Fabricius ab Aquapendente: ideoque eius frustula exigua si resistant in Vtero, lethum puerperis adferre nequeunt. Quod si eas ex aliquo morbo tempore puerperij perire contingat, & in dissectis veteris eminentiæ quædam in loco inhaesionis placente deprehendantur: Ne putres esse portiones placente, cum sit propria Vteri substantia adhuc subhumida & subnigricans, ex illa connexionione placente cum vterino corpore, quæ sensim detumescit vacuatis lochiis. Ac sanè semper portiuncula placente ipsi Vtero affixa remanet, quæ tandem putrefacta secernitur, quod etiam observavi in prægnantibus propè paritaris placentam manibus euelli non posse, sine relicta residua quadam portiuncula circa locum adhaesionis.

Placenta non toti affigitur Vtero. Fallopius vult semper adnasci alteri parti, in quam definit foramen à meatu seminario veniens; ita ut foramen hoc, sit cætrum totius spatij occupati à placenta. Columbus in anteriore parte Vteri collocat, ut propugnaculi vicem gerat, foetumque ab externis iniuriis tueatur. Alij incertum esse huius partis situm & nexum dicunt. Quia nunc parte anteriore, nunc posteriore, modò dextra, modò sinistra iacet. Et tantum Vteri parti adnascitur ad quæ vasa tam spermatica, quàm hypogastrica cõtunt. Ideoq. partim elatiori, partim verò anteriori ipsius matricis parti, quæ mulicris peritonæum respicit, coherere solet. Ut plurimum ad Vteri fundum agglutinata est, magnitudine tanta, vbi perfecta est, quantum possis pollice & indice comprehendere, vel circulum efficere. Fabricius placentam superne appensam ad Vteri fundum esse scribit, ut esset remota ab vrina & sudore, nec pòdere suo cum foetu incubante vasa vmbilicalia comprimere. Carpus versus partem intrinsecam dorsi matris placentam, adhærentem tradit, quam carnositatem embryo dorso suo tangit, quoniam est tanquam stragulum embryoni, cuius calorem confortat sua cavitate. Ratione adhærentis placente, intelligendus est Aphorismus 48. lib. 5. De situ vario marium & femellarum, super ea re Galenum consules, in Commentario. Gemelli communem placentam habent, quæ vtriusque vasa vmbilicalia recipit.

Dicam liberè quid de situ placente deprehendi. Placenta primo mense graviditatis per tenue & breve ligamentum carneum alligatur alterutri angulo Vteri, sed paulò pòst, crassior & carnosior reddita; toto suo corpore adhæret antico & interno Vtero, interdù pòstico & interno, ut in grávida muliere octimestri mortua, & in aliis notavi.

Secunda tunica & interna Foetus vicina, quæ quasi amnion, vel amnion, à eandem & mollitiæ agnina, nominata fuit ab Empedocle. Autore 1. Palluce lib. 2. quod confirmat Rufus. c. lib. 1. Inde Eileithya Dea, quæ partui præest dicta fuit amnion. nõ à Cretæ (ut alij existimant) quodam portu. Vel propter mollitiem & teneritudinem, quæ dicitur, quasi amnion, vel à amnion, sine robore & firmitate. Apud Suidam, quæ non à amnion dicitur, vas quod victimarum immolarum sanguinem excipit, quasi amnion, vel à amnion, de quo nomine vide Henrici Stephani Thesaurum Græcum.

Est autem Amnion Chorio multo tenuius, cui firmiter adhæret, quæ parte sita est placenta, & interdum toti Chorio agglutinatur, sæpius diuisa spectatur. Connectitur etiam Foetui circa Vmbilici ex abdomine egressum. In ea tunica aquas ex vrina & sudore Foetus emanantes, ad parturiginis tempus asseruari statuit Atrantius, quod verissimum est, & à me sæpius observatum in Foetibus humanis.

Sed Fabricius ab Aquapendente demonstrat, ut in canibus; sic in homine sudorem ab vrina diuersis membranis secludi & conservari. Sudor in Amnio, Vrina inter Amnion & Chorium colligitur, quod priùs fuerat à Rufus Ephesio observatum, lib. 1. c. ult. Nos, inquit, hanc tunicam dissecantes, humoris cuiusdam longè illo, qui in Chorio continetur mundioris plenam inuenimus, accurateque æstimantibus veluti quidam Foetus sudor videbatur, per vrachum verò humorem quægdam in Chorio instat vrinæ transfundi cognouimus.

Fabricy experimentum tale est, verum quidem in brutis, non autem in homine. Si catellum, aut capite, aut pedibus apprehensum, suspensum teneas, videbis aduersa luce vrinam à sudore in particularibus membranis separatam, vrinam quidè exterius & inferius in Chorio, sudorem verò interiùs & superius in Amnio, separatim membranis cõgereri. Id autem evidentiùs conspicies, si caput potius quàm catelli pedes digi-







*dias, & aduocatis credulis vendunt, quo se putant iuari in declamando & perorando: Basilio Commens: super Camaner refert, Pratum clencum accusatum fuisse, & deprehensum cum isto pileo, quod à muliere acceperat. Ioannes Chrysostomus non semel in sermonibus suis obstrictices obiurgat, propter hoc genus præstigias & magicas impostoras.*

Hætenus veram tunicarū historiam ex fide recentiorum Anatomicorum tradidi, quam Syllus ut Galenum defenderet, paulò aliter describit, & in Foetu humano Allantoidem constituit, contra rei veritatem: propria eius verba referam in *Isagoge, & lib. de puf. calum: Vesali exarata*. Chorion duabus membranis constat, inter quas vasa ferantur: quarum interna sit tenuissima, externa aliquanto crassior, sed mollior, crassitate papyro bibulæ crassitie, mollitie, colore persimilis: nec crassitiem pollicarē habet tempore partus, quo est tenuissima, ne quidem vnguis crassitiem attingit. Allantoides tonica, *amw*, id est, intestino cuidam laxiori vtriusque contra.fo similis, piscium quorundam vtriculos patatorios refert, si horum cavitatem continuam intelligas: vel potius membranaceam arcuum thecam imitatur, quæ scilicet in medio est laxior, ad fines verò vbi sunt cornua arcuum angustior. Ex Vrachio dilatato vtriusque longius producto gignitur, sed mox paulatim ad fines ambos cornibus insertos contracto, totum Foetum non comprehendit, sed partibus tantum eminentibus capiti, naribus, pedibus superiecta. Amnios toti Foetoi vndique circumiecta, tenuis quidem, sed crassior & robustior allantoides, quæ non solum sudorem Foetus, acrimoniâ & foetore molestum continere debet, sed etiam Foetus arcuum motui obstitere, ne ab eo promptè compatur. Rationem inuestigandi membranas repetes ex *Syllis lib. 3. Isagoge Anatomica*.

## DE VASIS VMBILICALIBVS.

### CAPVT V.



**V**bi membranz Foetus efformatz sunt, facultas formatrix ex semine partium omnium fundamenta iacit. Sed ne opere in medio deficeret, & sic inopiâ materiz irritum naturæ opus remaneret, à cornibus vasa duo capillaria prodeunt, vtriusque vnum, quæ in summam & posteriorem coagulati seminis partem inferuntur. Hoc artificium primus observauit *Verolius*, & *Radices Dorsales Fetus* appellauit, quæ iactis & absolutis partium fundamentis obliuerantur. Num cognouerit *Auicenna*, expende. Donec continetur cum eo sperma mulieris ex duobus additamentis, quæ sunt duo cornua, familia ossibus dactylorum, & quum permiscetur sit ebullitio prædicta, & creatur vesica, & panniculus primus, & suspenditur sperma totum tenue cum duobus additamentis, quæ sunt ad duo cornua, & inuenit illic quod alit ipsum, dum permanet sperma vsquequo sumat ex sanguine menstruo. *Auicenna li. 3. Fen. 31. tract. 1.* Disruptis eiusmodi dorsilibus radicibus, earum loco ex ipso Foetu ad Chorion, vtriusque eamofum circa locum placenz, venæ & arteriæ producuntur, quas à vasis vteri generari putant *Vesalius*, & *Colombus*, Galenum in eo sequuti, *lib. de differt. vulua, & lib. 15. de vsu part. c. 4. & lib. de form. Fetus c. 2.* quamuis *lib. 6. de Placitis Hipp. & Plat.* contrarium scripserit.

Rectius autem ex semine umbilicalia vasa produci dicetur, quia ortu & generatione sunt prima, & ab iis venæ & arteriæ corporis propagantur. Quapropter *Galeni* opinio, *Vesalii*, & *Colombi* suffragiis corroborata, *Aranio* non probatur, quoniam venarum & artierum umbilicalium oseula non coeunt per anastomoses cum vasis & arteriis vteri, ob interiectam vterinam placentam. Quod autem alicui instrumento vel corporis particulæ futurum est principium, illi continuum esse necessum est. Adde quod si continua effecta fuissent hæc vasa, sequeretur in vnoquoque partu continuatis vasorum diuulsio, ac proinde immodica hæmorrhagia, quæ difficillimè fisti posset. Deinde vasa vteri non ramulosè distribuuntur, sed suum sanguinem effundunt tam venosum quam arteriosum in tubulos & elices, per vteri substantiam exsculptos ac disperfos. Placenta excipit, simulque confundit, vt ex tali permissione, crassus & impurus sanguis venosus ab arterioso renuior puriorque reddatur. Nihilominus in ista sanguinis confusione, venæ & arteriæ proprium sibi que familiarem sanguinem

attrahunt. Venæ sanguinem alimentarium ad radices venæ portæ deferunt: Arteriz sanguinem vitalem deducunt ad Iliacas arterias.

Cur autem arteriz ad Cor fontem vitalitatis, vel ad truncum Aortæ non perveniunt? Respondet *Galenus, lib. 3. de usu partium, cap. 4.* ne in isto longiore ductu pendulæ periclitarentur, præstitit eas ad Iliacas deduci, quia in isto itinere Vesicæ lateribus accumbentes, ab omni læsione securæ sunt. Interim notabis Arterias Vmbilicales Vesicæ lateribus affixas, binis vel tribus furculis obiter adhxere hypogastriciis Arteriis, maior verò furculus ad Iliacas sursum contendit.

Ex abortivis foetibus facile est probare, Arterias Vmbilicales in prima partium conformatione ab ipso Corde derivari, & bisidas ab aorta bipartita produci, eo modo quo Vena Vmbilicalis intra Hepar ex Vena porta enascitur. Tum enim cor & iecur contigua esse, & ex eadem substantia spermatica constari cernere est, sine vilo aut levi diaphragmatis discrimine, quod est telæ aranæ simile. At vbi corpusculum embryonis extenditur, exortus ille arteriz vmbilicalis sensim descendit ad os Sacrum: sic in foetu bimæstri manus formatas, & in digitos difcretas, scapulis affixas sine vilo aut levi rudimento brachiorum & cubitorum videbis, similiter pedes ossibus Ilium explantatos, sine vlla delineatione femorum & tibiærum. Quidni de Arteria Vmbilicali idem statuatur? Si quis obiiciat duas esse arterias vmbilicales, vnicam Venam Vmbilicalem, propterea non idem inferendum esse de Arteriis Vmbilicalibus, nempe ab ipsa aorta iuxta Cor prodire. Responderem arteriam inferiorem iuxta Cor fissam esse, ut duos ramos Iliacos effingeret, à quibus binæ arteriz vmbilicales producuntur, quæ sub iecore traducuntur, & infra descendunt secundum inerementa corporis. Tunc temporis anastomoses vasorum Cordis in foetu suo munere funguntur, quia solidum est Cor, necdum excavatum: Vbi verò omnibus suis numeris, & particulis est instructum & absolutum, iam Cor sanguinem vitalem elaborat & conficit, remanentibus tamen illis anastomosibus & arteriis vmbilicalibus, quæ crescent more aliarum partium, quia sanguine replentur & nutriuntur. Verùm in lucem edito foetu sensim exarescunt, tandiu enim hæc vasa deferendi sanguinis munere funguntur, quandiu foetus vteri latebris continetur.

Nam vbi lucem aspicit, inutilia tanquam vieta & emerita exolcseunt, & in ligamenta degenerant, quod admirabile Naturæ sapientiam testatur, quæ partes illas destruit, quæ utilitate sua privantur, ex *Galen. lib. 8. de usu partium*. Cæterùm licet hæc vasa in placenta numerosis radicibus spargantur, extra placenta omnes venæ & arteriz in vnum sui generis vasculum coeunt. Vena eum primùm abdomen penetravit simplex, interdum gemina, in Hepatis fissuram insinuat, & bisida inferitur in truncum venæ portæ & cauz, ut utrique sanguinem suppeditaret, quoquoersum distribuendum in omnes corporis partes. Nam si soli venæ Portæ inserta fuisset vmbilicalis vena, non potuissent reliquæ corporis partes quæ nutriuntur à caua, eodem frui sanguine. Præter hanc in Cane, & felle, aliz duæ venæ Vmbilicales ad Mesaraicæ abeunt, vna iuxta ventriculum, altera prope crassâ Intestina, ex *Fabryi* observatione.

Arteria ventrem ingressa, statim in duas dirimitur, quæ Iliacas Arterias adeunt. Itaque intra abdomen capacitate quatuor erunt vasa vmbilicalia si comitem Vtrūq. annumeres, extra verò abdomen tria, quæ membrana crassa viscida, ab *Aristotele vivunt Aquarius* dicta includit & conglutinat, locisque distinguit, ne mutua collisione, vel angustarentur, vel implicarentur, intercapedine tamen trium aut quatuor digitorum ab vmbilico, vasa hæc tria sic inuicem conglobantur & intorquentur, ac si quis tres aut quatuor cereas candelas funis instar contorqueret, ex *Fabryi*, quod prius observatum fuerat à *Carpo Comment. in Mundinum*. Nodi sunt & formantur ex portione carnosæ involucri, ibi crassiore, ad fortiorem colligationem Vasorum Vmbilicalium, & sanguinis cunctationem, ne impetuosè & affatim à foetu attrahatur. Ita contortus & conglobatus Vmbilicus tribus ramis, siue radicibus in medium placente implantatur, quæ deinde numerosis fureculis hine & inde fruticantur.

In toto progressu, siue ductu Vmbilici, apparent quædam maculæ veluti murium stercora continentes, quæ formantur à venis & arteriis ibi contortis & repletis sanguine atro, per tunicam exteriorcm transparente.

Componitur igitur Vmbilicus ex Vena, Arteria gemina, & Vracho. Vena Embrij nutricula laxior est Arteriis, initio latior, sub finem angustior, & in morem va-

ricum concorta & nodosa, quibusdam ex intervallis, ut diuturniore mora sanguis in longo & flexuoso itinere maiorem elaborationem acciperet. Si geminæ adfint venæ, inter utramque arteriæ progrediuntur. At Vrachus unus est, suspendendæ Vesicæ dicatur, & cuius fundo enascitur, exilis est, & vix dimidium cuiusque arteriæ crassitatem æquat, postquam duorum transversorum digitorum longitudine, abdomine egressus est, obliteratur in medio Umbilici, vel potius in arteria alterutra, ex quo patet Umbilicum ex Vrachio nequaquam constari, si diligenter expendas, continuabitis istud filum ad musculos pyramidales abdominis.

In brutis perforatus est, & abdomine egressus in duas vesicas oblongas expanditur, quæ Allantoidem tunicam constituunt. In foetu humano solidus est, nullo foramine peruius, ut docet *Walsh*, accedente *peritissimum Anatomicon* consensu, *Kallosy*, *Eustachij*, *Arantij*, *Parai*, *Varolij*.

Existimavit *Galenus* urinam in Vesica collectam per Vrachum apertum in Allantoidem deriuari, atque per collum Vesicæ nullo modo excerni posse, quia angustum & obliquum est, sphinctere constringitur, ut latius explicat *lib. 15. de v'su partium*. Cuius autoritate deceptus *Varolius*, tradit urinam in Vesica ad partum usque asseruari, quod fit, ut recens nati copiosam urinam effundant. *Fabricius ab Aquapendente* contendit Vrachum in homine perforatum esse, quamvis Allantoide careat, & à fundo Vesicæ enatum, in minutissimas fibras findi, quæ vnâ cum vasibus Umbilicum prætergressæ, urinam in Chorion tunicam inaspecificabili modo transfundunt, nec ignarus sum veterem hanc opinionem de perforatione Vrachii probari *Ruffo Ephejo*, & *Mesichiani*, qui urinam Foetus per Vrachion in Chorion deuari putant: sed *Arantius*, *lib. de Fœtu humano*, abunde demonstravit Vrachii soliditatem, nec per eam villo modo urinam traduci. Eius opinio confirmatur à *Correio*, eius discipulo, qui *Cæpius* adstrinxit *Arantio*, in Academia Bononiensi, rem istam demonstranti.

Longè ante *Arantium*, Vrachii soliditatem *Carpus* probauerat, *Commentario in Mundinum*, ubi ingenue profitetur, se studiosè & laboriosè inuestigasse Vrachii foramen, nec vnquam peruium & pertusum deprehendisse. Tandem post accuratum examen in diuersis Fœtibus, in eam descendit opinionem, quod primis mensibus Foetus forsitan possunt mingere per Umbilicum, sed in vltimis mensibus Vesica supernè est consolidata, itaut Foetus cogatur per Virgam, & non per Umbilicum mingere: & miratur *Auicennam* asseruare infantes recens natos per Umbilicum mingere, priusquam nodo ligetur. Sed facta diligenti perquisitione cognouit, id nunquam visum & obseruatum fuisse ab vltis Obstetricibus, quæ resecto Umbilico & compresso sumine, nullam aquositatem effluxisse retulerunt.

*Idem Carpus* respondet obiectioni *Galeni*. Foetum non posse urinam reddere per Vesicam, quia sphinctere constringitur, qui laxari non potest, nisi iussus à motrice facultate. Statim atque formatus & animatus est Foetus voluntatem habet, quia sensum habet. Tunc voluntas in infante mouetur à sensu, non autem ab intellectu. Ergo potest Foetus per virgam mingere, & quod maius est, vidit *Carpus* faeces emissas in membranas. Proinde miror *Spigelium*, Vrachii perforationem asseruare, & per eum canaliculum urinam Foetus in Allantoidem deferri. Si quæras, quare sit Vrachus datus hominibus? ut esset discerniculum arteriarum Umbilicalium, quæ simul iunctæ & appositæ fuissent in progressu suo, nisi fuissent discrimine isto disjunctæ: Vel ut esset suspensorium vinculum Vesicæ ad Umbilicum. *Oken*, *lib. de v'su, urina*, in Fœtu crassior est quàm in adultis, cum sit suspendendæ Vesicæ vinculum. In adultis hominibus non crassius est ac robustius quàm in pueris. Præterea cum nulla sit Allantois, Umbilicus extra abdomen deberet esse alicubi perforatus ad egressum urinæ. At superficies Umbilici vndiquaque continua est, nullo foramine percussa: ergo solidus est Vrachus, imperuius.

Quod verò obicitur de Hydropicorum aquis per Umbilicum excretis, ut multi obseruant, & ipse *Carpus* vidit, atque *Cabrolus* in virgine, quæ lotium per Umbilicum reddebat, ceruice vesicæ imperforata, facile diluitur ex *Varolio*. Scribit aquam hydropicorum interdum per venam Umbilicalem effluere, & nonnunquam serum in venis regurgitans ad Hepar remeare, & per Umbilicalem venam excreti: quæ vis est etiam in adultis suam cavitatem retinere, ac si adhuc venæ officio fungere iur ad nutritionem musculorum abdominis, ut *Falcherus* in virgine quadam obseruauit, & *Fabricius Hildanus* in homine quadragenario. Hæc via facilis est vrgente necessi-

tate, quinetiam in quibusdam naturalis fuit, qui per anum vrinam reddebant, vt obferuauit *Beniuennus*, & *Cardanus*. Aut Vesica & Intestinum difciffa erant, (quod citra mortem fieri nequit) aut ad Hepar exundans vrina remeabat: Inde per venam portam in Intestina deriuabatur.

Non diffimulabo, quod de Vrachi compositione obferuauit. Dum Foetus refecarem, inueni Vrachum solidum, fed in eius medio neruulum candidiffimum, quem ab interiori vesicæ tunica produci deprebendi: Exteriores verò Vrachi membranam ab externa Vesicæ tunica propagari. Videtur id *Galenus* obscure significasse *Introduclory* cap. 11. A venis, quæ secundas implicat, binæ prodeunt venæ, ab arteriis itidem binæ arteriæ, & à neruis neruus vnus, mutuo in vnum congressu, meatum Vrachum appellatum absoluunt, qui infans Vmbilico inferitur, ex quo enascitur, & fufpensus est. Ab Vmbilico autē venæ ad Iecoris portas sanguinem in Foetibus transmittunt, arteriæ verò iuxta Vesicam crassiori arteriæ, neruus hic spinæ inferitur. Verumtamen scribit *Galenus*, lib. 6. de Decretis, cap. 6. nullum apparere neruum ex Vtero in secundas dispersum, neque à Foetu in Vmbilicum, vel secundas distribui vllum neruum, cuius nulla erat necessitas.

Vmbilici longitudo admirabilis est, quæ licet in Foetu dum magnitudine mufcæ cernitur, recta fit & breuis, vixque in Foetu vnus mensis digito longior, in dies tamen producit, itaut in partu extensus Vmbilicus nostratis vlnæ dimidiæ longitudinem æquare possit. Interdum in ea laxitate ita se inuertit, & contorquet Foetus, vt nodus in medio contrahatur, qui in Foetu atrophix & mortis causa esse solet, propter commatuum alimenti interceptum. Ea Vmbilici longitudo, non absque magna vtilitate facta est: Sanguis enim & spiritus per longiorem ductum delati exquisitiùs elaborantur. Accedit altera vtilitas, vt Foetus in omnem partem se curè se mouere & contorquere possit. Tertiā vtilitatem assignant *Paracelsus* & *Arantius*, vt in partu secundæ, & Foetus alternatim exeant, quæ simul egredi non possunt sine magno Foetus & matris incommodo. Huius longitudinis beneficio cū laboriosus est, ac difficilis partus, Foetus in vestibulo matricis detentus, per Vmbilicales arterias viuit, quæ si breues extitissent, ante Foetus egressum effingi potuissent. Confert etiam hæc longitudo ad secundarū educationem, vt patet ex *Hipp. lib. de superfetatione*.

Si secundum non facile exciderint, sinendæ sunt maxime ad Foetum appendere, vt paulatim absque vlla violentia trahantur, mulierem in sella perforata collocabō, & Foetum super vtreū humore tepido plenum impones, vt mucronē tenuissimo compunctus vter, sensim confidat, ac vnā Foetum, & quæ ab eo pendet inuolucra deorsum trahat.

Vmbilicus hominis multo maior, proportionē considerata corporis humani Foetus, quàm cæterorum animalium, propter amplitudinem vasorum.

Ne autem in tanta longitudo Vmbilicus ruptioni esset obnoxius, nodis quibusdam ad robur distinctus est, non interceptus, ex quibus obfetrices mulieris fecunditatem cognoscunt. Cū mulier primum partum edidit, inquit *Aulicennas* & *Enchirius Rhodius*, Vmbilicus infantis inspicere debet, qui si in parte qua ventri proximus est, rugas seu nodos non habet, mulieri deinceps sterilitatem portendit. Sin verò rugas & nodos ostendit, tot partus ac liberos matri promittit, quot numero nodi seu rugæ in eo deprehenduntur. Alij addunt, si modico spatio inter se nodi distent, modica pariendi interualla significare, si longius, longiore etiam temporis interuallō matrem concepturam atque parituram esse. Præterea, nodi si rufescant, masculos partus, si candidiores sint, feminas significant. Quæ omnia ridicula putat *Colombus*, cū in extremo Foetu, tot vel plures nodi appareant quàm in primo.

Verū ne Vmbilicus incerto vagoque ductu fluctuaret, natura illum à sinistro tempore, ad dextrum per mediam frontem circumduxit, inde per occiput obliquè reflectitur, vsque ad sinistram ceruicis, & iuguli partem, dorsumque supra pectus progreditur, donec in medium ventrem inferatur. Hæ reuolutione Vmbilicus Caput firmat, & continet, ne ante perfectam maturitatem suo pondere deorsum decumbat. Quod si Foetus dum exitum parat, Vmbilicum per superiorem Capitis partem reuolutum excutere nequeat, sed ad iugulum descendat, collo obuoluto, ac si laqueum gestaret, egreditur, quod mulierculæ mali esse ominis vaticinantur, sed irritidet *Carpus*. Interdum tamen nisi remoueatur à collo, Foetum strangulat in exitu.

Cū primum ab ergastulo vteri Foetus emerit, refecatur Vmbilicus, nodoque

reliquatur, quod soletter & industriè faciendum, ad vitam & commoditatem infantis, quia iuxta cutem præcisus mortem adfert. *Helena soror Constantini, Iuliani Caesaris coniux*, in Galliis cum marem genuisset, infantem hoc perdidit dolo, quod obstetrix corrupta mercede, mox natum præfectu plusquam conuenerat Vmbilico necauit, vti refert *Ammianus Marcellinus lib. 16.*

Obiter id monebo, obstetrices infantibus imbecillioribus, ac pene emortuis prorsusquam rescindatur Vmbilicus, sanguinem intro repellere, vt muribundo vitam restituant, quod à nostris factitatur, & notatur ab *Aristotele, cap. 10. lib. 7. de historia animalium*. Nihilominus prudentia obstetricis requiritur in eo opere, ne sanguis maiore copia quam par sit, repellatur, quod vel suffocationem adfert, vel plurimis morbis occasionem præbet. Nam experientia obseruatum fuit, cum nato infanti secatur Vmbilicus, & è venis finitur sanguis copiosus effluere, prout vires suadent & tolerant, illum puellum postea variolis paucis tantisque ac salubribus tentari, de quo obstetrices monendæ essent, vt à morte pucros vindicaremus.

Ad vitæ commoditatem valde conducit iusta & legitima Vmbilici præsectio, quia Penis, & Vterus Vmbilici proportionem sequuntur: In feminis breuior Vmbilicus Vterum ad conceptionem ineptum reddit, laxior immoderatum coeundi desiderium adfert, inquit *Conciliator*, quod de Pene licet etiam affirmare. Huius rei veritatem facile est per Anatomem demonstrare. Vesica Vtero incubat, eiusque eueruci tenaciter adhaerescit, per Vrachum Vesica suspenditur, Vesicæ igitur tensionem vel relaxationem sequeretur Vterus, vel Penis in maribus.

Præcisum Vmbilicum nonnulli valere dicunt aduersus colicos dolores: eiusmodi remedium *Rhases & Trauiannus* commendarunt, eoque tanquam amuleto vtuntur. *Alexander Benedictus* memoriz prodidit Vmbilicum infantis sponte deciduum, quomodo in cibo vel potu sumptum, resibilem fecunditatem conciliare: In brachiis gestatum conceptum inhibere. Idem promittit sorbitione secundarum acfatarum & contritarum conceptus iuuari. *Hippocrates lib. 1. de morbis mulierum*, secundam laudat ventri appositam, non assumptam, ad proliis fecunditatem.

## DE CONFORMATIONE FOETVS.

### CAPVT VI.

**N**ihil in tota Anatome magis torfit, & exercuit doctorum Ingenia, quam nostri corporis conformatio, quam multò facilius est verbis explicare, quam ipsa construere. Nostra tamen verba sapientiæ nostri Conditoris longè inferiora sunt, vt ne quidem ea exponere possimus, quæ ille nullo negotio condidit. Hanc paucis accipe ex *Galeno, lib. 14. de vsu partium*. Vbi matrix ei aculatam virisemen excepit, in sese contraxit suum orificium exactè obsignat: Qui verò humor internam Vteri superficiem obliquit, in membranam conuertitur, quæ Spiritus Formator vndique conclusus, motus suos naturales expromit, tria puncta procreans, partes principes referentia, sed vnum micans & referens Cor alia duo præcedit, quæ caloris impetu inflata & distenta suos ventres seformant, Cor Thoracem, Cerebrum Caput, lecur Ventrem. Postea reliquæ partes figurantur & conformatur, tumque sensim affluit tenuis sanguis ad earum incrementum.

*Auicenna* generationis & conformationis partium progressus tam minutè persequitur, vt diceret illum operantem naturam spectasse. Primum semen vtero exceptum, sex primis exactis diebus in spumosum quid & butyro simile immutatur, mox post tres dies, quasi sanguinis guttæ, & rubra filamenta apparent, exactis quindecim diebus a conceptu, Foetus coagulatum sanguinem refert. Post alios duodecim spectatur caro, cum trium præcipuorum viscerum distinctione: postea spinalis medullæ initium cernitur, tandem post dies nouem caput ab humeris distinguitur, & laterum extrema ac venter sensu manifestè discernuntur, atque ita Foetus absoluitur, interdum tardiùs, nonnunquam celeriùs. De conformatione partium, quæ priùs, quæ posterius generantur, egit *Aristoteles, lib. 2. de gener. animal. cap. 1. & cap. 6.*

Scribit *Galenus lib. 1. de femine*, *Hippocratem* quatuor formationis tempora constituisse. Primum tempus est *vi*, in quo semen coagulatum dumtaxat, cernitur, alterum *viua*, rſdem aliquam partium principum delineationem ostendit: In tertio subſtancia carnoſa perficitur, & *ſuſcipit* dicitur, *ſui ſi in ſpina, ſi in utero*, Ex *Etymologico magno*. *Meletius* addit, quod cibum recipiat, qui *ſic* dicitur, ſive quod in homine conſiſtat, & degeneret, qui *ſpina* nuncupatur. In quarto perfecta eſt omnium partium deſcriptio, tumque *Fortus mulier* nominatur.

Hæc tempora certis dierum ſpatiis deſignare eſt impoſſibile, coniecturis tantum ex abortivis Foetibus aſſequi licet. Vidit *Hippocrates* in genitura ſexto die conceptionis excreti, quoddam partes delineatas. At negat *Auicennas* quidquam ante ſeptimum diem diſcretum apparere. Tantum tribuit ſeptimo dici: Cuius vini & imperium ipſemet *Hippocrates lib. de ſeptim. partu* in conceptione, abortu & partu agnoſcit. Eadem, inquit, temporum in conceptione, abortu, & partu ratio, quæ in morbis, ſanitate, & morte, partim ſecundum dies, partim ſecundum menſes, partim ſecundum dies quadragenarios, partim ſecundum annum. Quare ſicut in morbis maxime poſſunt primi & ſeptimi: ita & in Foetibus nō dies modo, ſed & quadragenarii circuitus & menſes. Cū igitur tanta ſit ſeptimi diei authoritas, an probabilior altera *Hippocratis hiſtoria*, Foetum ſcilicet ſeptimo die habuiſſe conſpicias oculorum regiones, aures, brachia, crura, manuum pedumque digitos, pudendum, & membra reliqua quæcumque corpus habere debet. Si vera ſit hæc narratio, cur alibi aſſerit, feminam non ante quadageſimum ſecundum diem conformari, marem verò triginta diebus abſolui, quod probat ex abortivis foetibus. Multæ mulieres puerum abortivum ante trigimeſimum diem edidere, ſed cum proſus indiſtinctum, atque inarticulatum, qui verò poſt eum diem, aut ipſo die eiecti fuerunt, viſi ſunt omnes bene figurati compoſitis articulatiſque partibus. Sic verò ſe res habet etiam in puella ad portionem duotum & quadraginta dierum, ſi quando abortu perit.

Viris doctis non placet *Hippocratis* ſententia, de vario formationis tempore in maribus & feminis: Non enim ſemella tardiùs maſculo efformari, alioquin diverſum eſſet, marem vel feminam pariendi tempus. Nam ſi duplicatum formationis tempus, ſit tempus parturitiſ, neceſſariò ſequitur feminam tardiùs moveri, & in lucem prodire. At videmus quotidie mares & feminas iſdem naſci temporibus. Itaque non eſt abſolutè vera *Hippocratis* ſententia de formatione Foetus. Fieri tamen poteſt, ut in mare & femina diverſa ſint formationis tempora, ſed uterque eodem tempore ſuam formam & perfectionem conſequatur.

Reprehenditur etiam in *Hippocrate*, quod genituram ſeptimo die perfectam, & omnibus membris delineatam in aqua conſpexerit: cū in effluſionibus nihil tale apparuerit oculatiſſimis viris, qui diligenter & curioſè id perueſtigarunt. Negat *Galenus*, ſtatim atque in vterum iniectum eſt ſemen, ſive primis conceptionis diebus, alterutrum pudendum formari, tertio, vel quarto menſe figuratur, ut ex abortivis Foetibus deprehendi. Itaque falſa eſt *Hippocratis* ſententia, ſi genituram ſeptem dierum in aquam coniciatis, omnes partes diſcretas & figuratas apparere.

*Ariſtoteles lib. 7. de hiſtoria animalium, cap. 3.* ſcribit Foetum maſculum quadageſimo die formari, & eſſe magnitudine formicæ maſculæ, omnibus partibus iam diſcretis, etiam oculis & genitalibus enatis, atque iſta omnia, ſi in aquam frigidam Foetus immittatur, manifeſtè ſpectari. *Straton Peripateticus, & Diocles Caryſſius*, ut reſert *Macrobius, Comment. in ſomniū Scipionis*, dicebant quinta hebdomade, id eſt, trigimeſimo quinto die, humanam figuram ſingi magnitudine quidem apis, ita tamen, ut in illà breuitate membra omnia & deſignata totius corporis lineamenta conſiſtenter. *Fernelius* Foetum quadageſimo die perfectum vidit, quo tempore Recentiores obſervarunt minimi digiti magnitudinem & longitudinem æquare, ſub ſinem tertij menſis palmarum eſſe longitudine, & circa quintum pedali, ſicque creſcit in dies ad partum vſque. Ex *Botallo, cap. 3. lib. de miſſione ſanguinis*, Foetus menſtruus tam eſt exiguus, ut recens eiectus vix accedat ad pondus drachmæ, ſeu coronati vnius, quamvis integerrime ſit formatus. Bi-meſtris autem vix attingat, vel ſuperet ſex drachmas, & tri-meſtris vncias tres vel quatuor.

Cæterùm, quæ de generatione partium corporis humani traduntur à Medicis & Anatomicis, ea in perfectis & abſolutis Foetibus contemplati ſunt, & adnotarunt, ut prudenter animaduertit *Vareolus*. Pauci, vel nulli productionem, ſive

procreationem partium, quæ sit ab eo tempore concreti seminis, usque ad mensem integrum obseruauerunt, & descripserunt. Ac sanè huiusmodi opificium nostris oculis imperium & inaspectabile, solo mentis discorsu, vel ex aliorum animalium fecundificatione deprehendi potest. Quis enim adeo crudelis & inhumanus, viuens mulieris aluum incidere, ad huius rei investigationem? In effluxu, siue abortu artificium structuræ sapius destruit, & ob paruitatem pusilli corpusculi, vel spernitur, vel non potest accuratè discerni delineatio, etiamsi conspiciat adhibeas, quæ res multiplicare & augere possunt.

*Galenus lib. de Formatione Fetus*, reprehendit Medicum, qui viso abortiuo Fœtu triginta dierum, suum audacè ferebat iudicium, quod tamen in pluribus aliis erat obseruandum, priusquam ea de re quidquam pronunciaret. Quoniam quæ particula generetur & consistat, dum Fœtus formatur, ipse nouit euidenter, qui formauit eam Creator, inquit *Galenus*. Ideoque ob rei incertitudinem in Fœtibus, neque expressæ formationis, neque motionis, neque absolutionis, neque egressus in lucem vnus præfinitus est terminus. Ex *Galeno, lib. de formatione Fetus*. *Auicenna* idem confirmat. Determinatio dispositione masculi & femine in distinctione speciei, est res, quam quædam pars Medicorum iudicat audacè, & stultè.

Verumtamen, si Fœtus generatio in utero mulieris, eo modo se habet, vt in pulificatione ex ovo, auctore *Hippocrate libro de Natura pueri*, quidni ideam ortus humani & productionis partium, ex ovis cognoscere licebit. Accedit quod *Theophrastus, lib. 1. de Causis plantarum, c. 7.* notauit naturam seminum ovis proximam esse: eam ob rem non ineptè *Empedocles* dixit arbores ova excelsis gignere ramis: intellagens semina. Itaque pulli productionem ex ovo proponam, vt inde agnoscatis Fœtus generationem. Ouum intra suam testam, siue corticem tres humores includit, *Vitellum, Albumen, & Chalazam* duplicem, in vtroque extremo sitam, quæ nihil est aliud quàm corpusculum album, pellucidum, nodosè concretum instar grandinis, vernaculè dicitur, *le germe*. Reperitur in ovo fecundo, siue gallum experto. Tres istos humores inuoluunt tres membranæ, quarum duæ sunt albumini & vitello communes. Tertia est ipsi vitello pecoliaris.

Nunc tria considerari debent in pulli generatione, *Efficiens, Materia, & Alimentum*. Efficiens est gallinæ incubantis calor, Materia & Alimentum intra ouum continentur.

Nolo scrupulosè inquirere & examinare, ex qua parte oui pullus procreetur, an ex vitello, vt voluit *Hippocrates*, an ex albumine, vt statuit *Aristoteles*. Atamen certum est & indubitatum ex Chalaza pullum procreari, vitellum, & albumen cedere & facessere in alimentum pulli: Itaut ex albumine materia partibus spermaticis, ex vitello partibus sanguineis suppeditetur. Propterea Chalazam cum spermate eandem naturam habere rectè censuit *Aldroandus*. Rationes quasdam profert *Fabricius ab Aquapendente*. Nec sine certo experimento vulgus Gallorum Chalazam vocat, *le germe de l'œuf*, quod ex eo humore reliquæ partes germinet, & expullulent. Itaque principium & fundamentum pulificationis erit *Chalaza*, quæ corporatur & conformatur à spiritu genitore, qui oui cortice inclusus est, quem Gallina à Gallo mutuatur, & vitellis communicat, dum à vitellario seu primo utero, in ouarium, siue secundum uterum illabuntur. Neque mirandum, si pullus ex Chalaza corporaturam suam accipiat, quamuis tale principium sit admodum exiguum, quia rerum omnium principia mole sunt parua, virtute maxima.

Vt autem in dies oculis tuis intuearis partium productionem in pullo, ex pluribus ovis gallinæ suppositis, quædam quotidie secabis & examinabis, vt exêplo *Hippocratis & Aristotelis*, quos imitati sunt *Falcherus Cæter, Aldroandus Vlysses, & Fabricius ab Aquapendente*, totum pulificationis artificium inuestigare, & adnotare queas. In ovis incubatis, & fotis à gallina, secundo die rupto cortice, & fustice scissis membranæ, deprehendes globulum, siue corpusculum album, mediocris lentis magnitudine. Tercio die in medio corpusculi punctum apparet, quod vix dimidiâ grani millij partem æquaret. Punctum istud manifestè saliens obseruatum fuit ab *Aristotele*, ex pulsatione *Cæ* esse certò colligitur. Idem visum *Falchero Cætero, Aldroando Vlyssi, & Fabricio*. Quarto die ab eo puncto, quod pro Corde acceptum & iudicatû fuit, filamenta rubra enasci videbis, quæ ad vitellum & albumen protenduntur. Quinto die duo alia puncta Cordi assidue micanti adiuncta sunt, quæ referre videntur. *Caput*



et *Iecur*. Sed punctum illud, quod Caput esse debet, celerius crescit ipso Corde & Iecore: itaut reliquis diebus in ouis ruptis, Capitis amplitudo ferè reliqui corporis molem adæquet. Simul autem cum Capite spioa producit, etique costæ adnexæ expullantur, & quod multos trahit in admirationem, *Oculi* simul cum Capite efformati, reliquis partibus celerius perficiuntur & absoluntur. Sexto vel septimo die pulcherrime animatus, & omnibus suis partibus delineatus in albumine fluctuans observatur. Tunc punctum illud saliens, quod habetur pro Corde rubet, puncto altero Iecoris adhuc albicante. Totus autem truncus corporis delineatur priusquam extremitates, alæ, & pedes emergant: quia pertinent ad motum, cuius nulla est necessitas. Decimo sexto die intra Ventriculum substantia chylosa deprehenditur, decimo septimo die, Arteria Umbilicalis visa est pulsare, & in Cor inferi transcendens ventriculum, ut venæ in Porta ramos inferuntur longè ab Hepate. Inde cognoscens pullum instar Fœtus humani nutriri per umbilicum. Tandem vigesimo intra testam pipiens pollos auditur, quo tempore Cor & arterias validè pulsare videbis. Exacto vigesimo voce sua exundi necessitatem matri significat, quæ rostro corticem frangit, ut pullo exitum præbeat. Interea notabis à quibusdam quarto die observatas fuisse bullulas puncto saliciori adiunctas, pellucidas instar crystallini, quia sunt aquæ, ex quibus Cor & Cerebrum procreari nonnulli iudicant. *Hærens* auriculas Cordis esse contendit.

Ex hac pullificationis historia, si magna parois componere licet, Fœtus humani generationem manifestè demonstrabo. Vtrumque semen virile & moliebre cauitate Vteri exceptum & comprehensum, ovo simile est, cuius torticem refert yterus, seminis verò excrementum, albuminis & vitelli rationem habet. Nam semina plantarum & animalium ex iudicio *Theophrasti*, non iocèptè *Empedocles* comparavit ouis: quoniam semina omnia aliquid in se alimenti continent, quod vñ cum georandi principio Natura profundit sicut io ouis. Id in seminibus stirpium verum esse demonstrat exemplis, quod etiam in animalium genere verissimum statuit. Neque enim quod ab his emittitur, totum semen purum sicerumque arbitrandum est.

Hoc posito sequitur in semine humano duplicem substantiam contineri, vnam purissimam & paucam, ex qua constatur corporatura: Alteram excrementitiam copiosorem, quæ cedit in alimentum, & incrementum corporaturæ, vel in alios usus coouertitur, putà ad productionem membranarum geoituram inuoluentium. Itaque generatio partium in Fœtu humano, ab vno puncto inchoatur. Punctum illud ex purissima feminis materia constatur. Reliqua feminis materia excrementitia, partim conuertitur ad alendum & augendum punctum istud, partim ad constituenda inuolucra, quibus punctum illud informe includitur.

Quodnam sit punctum illud: An Cor, an Iecur, an totius corporis ideam & corporaturam præ se ferat, questione dignum? & à nobis postea examinabitur, ubi auctoritate & exemplis probauero Fœtus humani generationem à bulla vel bullato puncto incipere. *Hippocrates libro de natura pueri*, testatur se in geniturâ sex diebus conceptâ globum vidisse instar oui erudi: detracto putamine trans membranam pellucebat humor, in quo continebatur corpusculum rubrum, rotundum, præterea fibræ crassæ & albæ cum sanie crassâ & rubeote, conuolutæ & implicatæ erant membranæ. Quale fuerit corpusculum illud, an Cor vel Iecur non exponit *Hippocrates*. *Aristoteles libro septimo de historia animalium*, refert Fœtum masculum quadragésimo die formari mole formicæ maiusculæ, omnibus iam partibus discretis, etiam oculis, & genitalibus enatis: At si quadragésimo die ea magnitudine spectatur primis conceptionis diebus, minorem fuisse corporaturam, & à puncto inceptisse probabile est.

Ad huius rei confirmationem exempla inchoatæ fecundationis proponam ex *Parrelis*, notatione digna. Vidit in abortu viginti dierum hominem confusè figuratum sub magnitudine grani hordei, in quo caput ventres extra collum prominentes formam minimi phascoli repræsentabat. Exteriùs vero brachiorum nulla profus appaiebant vestigia. Vidit præterea in abortu quadragiota dierum, hominem distinctè formatum, sub apicis magnitudine, in quo oculi, nares, auris cavitates, Cor, pulmones, costæ, dorsum, Hepar, diaphragma, ventriculus, renes, Intestina, membrum virile, omnesque partes conspexit, & aliis quam plurimis demonstrauit. Extremitates verò incipiebant pullulare.

Sic autem *Anicetus* formationis exordium in Fœtu describit. Cùm matrix se



colligit circa sperma, prima seminis actio est spumofitas, quæ sit ope virtutis formatricis, quæ spiritus latentes excitat, & promouet ad actum, à quibus semen vbi exsufflatum fuerit ad medium humiditatis, præparatur locus Cordi, deinde formantur in latere eius dextro & sinistro duæ Velicæ, quasi ramificatæ ab eo, & discernuntur, ex prima formatur Cor, ex altera nempe dextra creatur Hepar, postea formatur vmbilicus. *Hærens* tamen contemdit istas vesiculas adstantes & adherentes puocto, esse Cordis auriculas.

Quod spectat ad illas ampullas, siue vesiculas, quæ reperiuntur in genitura, Recentiores Medici & Anatomici non duas, sed tres obseruauerunt. *Corpus commentarius in Mundinum*, trium ampullarum mentionem facit, quas vidit in Foeto humano, *Philolominus, cap. de Iecore*, tres quoque notauit in genitura, sed ex illis tres partes principes formari putat. *Parvus, sine aliis auctor, lib. de generat.* Eleganter tres illas ampullas describit, & accommodat ad procreationem partium principum, refereos quoque ab obstetricibus sibi tales ampullas in genitura vnus mensis demonstratas.

Narrabo quid de vesiculis in genitura obseruauit. Cùm mihi ab obstetrice, præsentente *D. Carlo, Professore Regio eruditissimo* oblata fuisset genitura vnus mensis, ooo gallinæ similis detricto cortice membrarum, quarum exterior tota erat candida, tometotofa, ac veluti fibrosa, spermaticæ substantiæ, principium ac fundamentum placentiæ: hac discissa membræ, conspicuæ erant tres ampullæ, inuicem continguæ, instar racemi vux, vesiculis istis aqua pellucida continebatur, & in vna ampulla media, cernere erat corpusculum quoddam instar formicæ, & tenuissimum filamentum ab eo productum. Corpusculum istud haud dubiè foetum referebat, indifferens, informem, quantum oculis auidissimè miraculum istud spectantibus deprehendere licuit. Filamentum verò rubicundum denotabat vmbilicum.

Ex hac historia, & alia consimili à me obseruata, cognoui tres adesse vesiculas. In media corpusculum contineri, quod vel est Cor, vel fundamentum totius corporis, in aliis vesiculis nihil præter aquam pellucidam continebatur, quæ forsitan concreti seminis, & in corpus formati excrementum est, proptereaque ex illis partes aliæ nobiles fingi formarique nequeunt. Inde cognoui generationem foetus incipere à puncto: illud punctum, siue fuerit Cor, siue totum corpus delineatum, ex pauca seminis parte præstantiore constatum fuit. Vnde coniecere licet reliquam seminis partem copiosioris excrementum esse, quod in membranas conuertitur, vel ad nutritionem & conseruationem istius corpusculi.

Memorable est, si verum, quod solus obseruauit *Parolius*: scilicet vbi concretum est semen, & corpusculum illud factum, à duobus locis vnde semen muliebre prodit, duo vasa capillaria, & vix sensibilia emanare, quæ in extremitatibus huius concreti seminis, siue formati corpusculi, & in posteriorem eiusdem partem, quæ dorsum futura est inferuntur: ideoque radices dorsales foetus vocat. In hac enim primafiguratione foetus, necessarium erat nonnullas formati radices, quibus infans in vtero conclusus, veluti plantæ quædam nutriri posset. Quare ruptis istis dorsalibus radicibus, vbi nutriri debet sanguine, aliæ procreantur radices vmbilicales: huius autem primæfigurationis perfectionem existimat ipse *Parolius* fieri, vbi infans peruenit ad magnitudinem muscæ. Cùm sub magnitudinis apis apparet, filamentum rubrum, vmbilici rudimentum spectatur, itant rationi consentaneum sit existimare principium nutritionis, ex sanguine ipsi esse, vbi magnitudinem paulo maiorem grano hordei, & paulo minorem ape, qualis est magnitudo muscæ adeptus fuerit.

Neque id absurdum videri debet, humanum foetum adeo pusillum omnibus partibus figuratum esse, siquidem culices, pediculi, alique *Riolæ* interris nascentes, plurimis organis inter se distinctis præditæ sunt, quæ cibariis externis nutriuntur, motuque progressiuo iocedunt, & tamen vniuersum eorum corpus aliquando sensum effugit.

Nunc autem non lenis quæstio examinanda venit, *An partes corporis humani simul procreentur, an successim, ordine quadam necessitatis & dignitatis seruato, & in eo ordine quænam pars prima producat?* Scripsit enim *Hippocrates*, hominis generationem similem esse circulo, in quo neque finis, neque principium obseruatur, quia virtus formatrix est agens vniuersale, quod extendit se æqualiter ad omnes partes, patiens nempe semen, est essentialis materia ideam omnium partium in se continens: præterea partes mutuis auxiliis inter se stare & iungi debent, quia partes sunt inter se essentialiter

fenfualiter per vnā formā connexa. Denique si aliqua pars princeps ptima generaretur, frustra existeret, quia non haberet vsum, cum non propter se, sed propter alias partes formata fuerit.

*Galenus libella* probat omnes corporis partes simul, & eodem tempore formari & perfici, necessitatis & vtilitatis ordinem a natura seruari, sed ille lecur primum produci sustinet, *lib. de formatione Fetus, & lib. de femine*: Idque probare nititur auctoritate *Hippocratis*: ex illa genitura sexto die excreta, in qua punctum rubrum notatum fuit ab *Hippocrate*, quodnam fuerit nunquam ipse designauit. *Galenus* tamen cōtendit lecur esse: *Antennas* contrā sustinet esse Cordis rudimentum. *Scaliger, Commentario ad caput 6. lib. 1. de causis Plantarum Theophrasti*, scribit Cor prius lecore formari, cuius opera non indiget, non enim alitur, quod nouum vel est, vel fit. Itaque necesse est prius creari *in Aquilone*, Cor, quā *in Capite*, lecur. Adde quod pusillum corpusculum, siue punctum, quod apparet in albumine oui saliens selesque mouens, est ipsum Cor, ex *Aristotele*.

*Crematius, libro de principiu partium*, multis rationibus probat Cor primum generari & perfici, cuius rationes paucis comprehendam. Insubstantialium generatione datur principium temporis, & principium magnitudinis: hoc posito impossibile est viuientis rationem non esse ordinatam: ita ut in partibus, ex quibus est constituendum corpus, assignari debeat prioritas & posterioritas, ergo dabitur aliquod principium, prima scilicet pars genita, à qua reliquæ deprehendebunt. Quoniam entia non sunt sine necessitate multiplicanda, & in omni genere est vnum primum, quod est mensura omnium in illo genere. *Et 12. Metaphysica*, vt prioritas principum dominantium in eodem regno perniciofa, sic prioritas principiorum sibi inuicem noceret. *Aristoteles libro secundo de generatione animalium, cap. 4.* Fœtus generationem comparat plantarum productioni: Semina, inquit, intra se continent, quod sit principium plantæ, & istud primò excernitur, quod postea secretum producit radicem & germen: eo modo fit conceptus animalis, ac proinde hominis. Rationem assignat, cur ita fieri debeat, quoniam partes aliquæ sunt aptiores ad exortum: atque vt in semine sunt omnes partes in potentia, sic in conceptu humano: Vna tamen est magis in potentia quā altera, quæ debet primò ad actum traduci. Inde collige. Illa pars princeps & prima generatur, cuius corporea constitutio in se includit aliarum partium structuram, at corporea Cordis constitutio est eiusmodi. Cor autem esse primum quod actu secermitur, notum esse tam sensu, quā ratione, docuit *Aristoteles*, & ideo appellat Cor, *situm emancipatum*, qui curam debet habere sui ipsius, dum propriis viribus fulcitur, sine auxilio facultatis formatricis.

Præterea, si Cor vltimò moritur, primum debet oriri, ac proinde viuere: Nam illa pars ex *Auerrohe*, quæ suppeditat aliis calorem natium, sine quo, nec agere, nec viuere possunt, prima generari debet: atqui Cor est eiusmodi. Adde quod pars illa debet esse prima tempore, quæ potentia, & virtute alia membra in se includit. Cor est eiusmodi: Nec immeritò, dicit *Aristoteles*, Cor esse quasi totum animal. Denique illa pars debet esse prima ortu & generatione, per quam fit, & conseruatur dispositio, & ordo in omnibus aliis membris. Hæc autem dispositio consideratur, vel dum fit corpus, vel dum factum est: dum fit, formatrix facultas vtitur calore, tanquam instrumento. At caloris fons & scaturigo Cor est, conseruator factum corpus per animam: at illa vtitur calore, tanquam proprio instrumento, ergo Cor primò generatur & formatur.

Finiam hanc quæstionem postrema hæc ratione. Cor dicitur *Philosophia*, magis esse in potentia, quā cæteræ partes, quia semen masculi, quod habet virtutem actiuam ad generandum, procedit à Corde, & ab ipso recipit virtutem genitalem: Ac proinde prius generabitur pars illa, cum qua habet similitudinem, & à qua procedit. Ita dicendum est de femine semine. Mirari subit, quomodo fateatur *Columbus* in iis animalibus, quæ ex ouis nascuntur primum quod oritur esse Cor: Negauit tamen in homine, sed lecur prius formari, vt illi non semel, sed sæpius intueri & animaduertere contingit. Verum, si credimus *Harnæ*, cum in embryone penè nullus sit vsus lecoris, vena umbilicalis lecur manifestè integra pertinet, vt venis committatur: quinetiam in prima fortis conformatione lecur posterius perficitur, & in fœtu humano obseruauit perfectè delineata omnia membra, imò genitalia distincta, nouum tamè lecoris posita pene rudimenta, quod non crediderim. *Außer libri de Anatomia vniuersal.*

sic adscriptis Galeno, statuit id quod in pullo primum apparet & formatur, caput esse. *Fabricius ab Aquapendente* existimat lecur vñ cum Corde gigni, sed latere, quia non palpat ut Cor: nam & ipse *Aristoteles*, lib. 3. de partibus animal. cap. 4. in prima partis generatione, lecur & Cor pari ratione gigni conspicique assueverat, ita ut si Cor est, & lecur existat, air *Aristoteles*: ergo si Cor & lecur eodem ferme momento generantur, & reliquæ partes eis subservientes postea producuntur, prout earum necessitas & usus exigunt. Propterea pedes & manus postremæ generantur & expullant.

Inde cognoscis falsas & fictitias esse picturas apud *Pinaum*, quæ representant fœtum vigesimo die, etiam & duodecimo omnibus partibus externis exquisitè formatum, cum vigesimo die adhuc massam informem & conglobatam sine aruum prominentia præ se ferat: Nec vnquam visus est quadragesimo die fœtus magnitudinis digiti auricularis viri perfecti, ut asserit *Pinaus contra Aristotelem*, qui non maiorem formicâ maiusculâ constituit.

Leuis inter *Hippocratem* & *Aristotelem* contrarietas notatur de tempore formationis. Ille, lib. de Natura pueri, masculi formationem completam statuit triginta diebus ut longissimè: ut plurimum enim hoc tempore, aut breviori, aut paulo longiore articulo ipsi contingit: *Aristoteles* verò marem quadraginta diebus absolvi scribit, etiam si maiusculæ formicæ magnitudine appareat, feminam verò, si intra mensem tertium prodeat, iudicandam esse, nec nisi quarto mense separata membra possideret quod manifestè aduersatur *Hippocrati*, & quotidiana experientia docet, mares & feminas formari, & discerni iisdem temporibus, ut pater ex abortivis fœtibus. Ne quis autem putet ridiculum esse, pullificationem ad hominis generationem traduci, is sciet id ab *Hippocrate* prius factum, divino & aureo labe de natura pueri, quem sequutus est *Aristoteles*, lib. 6. de hist. animal.

## DE NATURALIBVS FACVLTATIBVS.

### CAPVT VII.

**P**ERACTIS & absolutis partibus nutritur Fœtus, ut singularum partium moles alimentis accessione augeatur. Ista nutritio non eodem modo perficitur, quo nobis editis in lucem. Nam Fœtus in utero per umbilicalem venam alimentum trahit, extra uterum ore sumit alimentum. In utero sanguinem maternum prolestat, editis in lucem lacte velcitur: Vtrumque alimentum cognoscit *Hippocrates*, lib. de natura pueri, & sanguinem in Fœtu per Umbilicum, ad Hepar deferri testatur.

*Alexand* antiquus Philosophus, qui inventor Anaxomes perhibetur, putabat corpus Embryonis spongiosum esse & laxum, & per vniuersum corporis ambitum sanguinem exsugere. *Democritus* & *Epicurus* existimabant Fœtum ore alimentum sumere, referente *Plutarcho*, lib. de Elucis Philosoph. Quod ipsemet *Hippocrates* voluit, lib. de carnibus, (si germanus sit *Hipp.* liber, forsitan *Democritus*.) Id etiam approbauit *anitholabri*, an animal sit, quod in Utero continetur. Sed cum Fœtus aquis vndiquaque circumfundatur, si ore alimentumumat, fieri non potest, quin simul cum alimento viciam suam reorbeat. Propterea obseruarunt Recentiores, Fœtui quadrimestri nondum ora nascere patere. Non aliam igitur in Fœtu alimenti viam agnoscimus præter umbilicalem venam, quæ sanguinem ad Hepar quoniam officinam deducit, vbi noua coctione elaboratus, suisque excrementis repurgatus, per vniuersum corpus distribuitur. Non *Alexand* Dea beneficio, quam vereres nutriendi Fœtus curam suscipere credebant: Sed partim Hepatis robore amandatur, partim singularum partium vi attractiue prolestat, ut lacturam triplicis substantiæ refarcat, & cuiusque partis molem iusta magnitudine augeat.

Obiiciet aliquis, si sanguis maternus purissimus, nutriendi formâ præditus, dulcissimus quoque Fœtui suggeratur, quid opus est noua hæmatosi? Maternus sanguis est matri purissimus, atque perfectus, non Fœtui alendo idoneus. Matri quid est aptus, sed Fœtus ineptus, nisi propriâ lecoris facultate & idiosyncrasia fuerit alteratus, ut Fœtui magis de viis matris, & consocialis reddatur, puritas & dulcedo sanguinis materni

non immunitatem, sed facilitatem adferunt coctioni, quia ex noua forma foetus, noua facultas acquiritur ad noui corporis nutritionem.

Tertius est locupletissimus *Galenus*, sanguinem maternum ab Hepate Foetus purgari, *lib. 15. de vfu part.* quod etiam luculenter confirmauit *Fernelius*, *lib. 7. Physiologia cap. 1.* At si repurgatur, vt cystis felle turgidula. Inreftina meconio, siue crassa sanguinis illuuiæ plena, vesica lotio disflentia manifestè testantur, Cur non admittitur actio publica Hepatis? Cùm enim excrementa æquè certa sint signa coctionis, vt cineres exustionis, teste *Aristotele*: & secretio nulla fiat nisi prægressa coctione: de noua Hæmatosi in Foetu non est dubitandum. Scribit *Galenus*, *lib. 2. de semine*, *cap. 9.* cocepto animali, tot & talia excrementa existere, quot & qualia absoluto iam à puluere Foetu fieri consueuerunt. At cùm membra omnia formata & distincta sint, non tantùm vrina, verumetiam sterces producuntur, statim verò à principio ex toto Foetu exhalat vapor, qui sudori perfecti animalis proportionè responderet. Similiter *auctor libri quod animal sit quod in Vtero est*, docet Foetum, aduectum sanguinem sibi concoquere, coctionis excrementa in partibus colligi, & asseruari vsque ad parturitionis temporis: Nihilominus tamen *Fabricius ab Aquapendente* nititur probare Foetum nullam actionem publicam exercere, sed tantùm priuatam in sui commodum, id est, ad incrementum corporis, ac proinde leceur sibi tantùm consulens, nullam actionem publicam & officialem edere, nec sanguinem maternum sibi per Vmbilicalem aduectum defecare. Non video validius argumentum ab eo productum, quàm de Corde otiante & immobili in ipso Foetu, quod si moueatur ex sui natura, & temperamenti proprietate pulsaret ad solam vitam conseruandam. Sed Cor statim atque inchoatum micare, & quò magis conformatum est & absolutum, eò validius moveri certum est, vt postea demonstrabitur, propterea corrumpit istud *Achilleum Fabricij* argumentum.

Nos verò duplicem in Foetu coctionem admittimus, *nudum, & ingens*. Alij tertiam addunt *ætiæ*, quia in ventriculis abortiuorum, vt Catulorum, Porcellorum candidissimus chylus inuenitur. *Valcherus* opinatur sanguinem maternum per venas mæfaraicas Foetus ventriculum ingredi, ibique nouam coctionem subire, quia ventriculus statim atque conformatus est, actionem suam officialem exercet: Hoc agit quod natus est agere. Cuiusque coctionis sua sunt excrementa. Quidam primæ coctionis excrementum faciunt *atrum illum sanguinem*, qui ad parturitionis tempus asseruatur in intestinis. *Varolius* crassi & impuri sanguinis excrementum esse statuit, quod in intestinis tandiu moratur, donec inspirato aëre motus intestinorum peristalticus excitetur. Quidam negant *Meconium* hæmatoseos esse excrementum, sed superfluum sanguinem, quem obstetrix, vbi Foetus emerfit, contracto vmbilico introPELLIT ad Foetum animandum: Vnde quibus maiore copia sanguis repulsus fuerit, abundantius Meconium excernunt: Sed falluntur, quia in omnibus Foetibus intestina isto atro humore difflata reperiuntur, qui nisi maturè eliminetur, conuulsiones sæpius excitare solet.

Istud excrementum per nouimæstre spatium, quo Foetus in Vtero delitescit, in appendice cæci intestini colligi putant *Varolius & Bauhinus*, atque huius particulæ vsum in pueris perquirendum esse, quia nobis editis vnà cum vasis vmbilicalibus exsiccatur. Plures abortiuos Foetus secui, quibus gracilior erat hæc particula, quàm adultis hominibus. Nec aliud est appendix ista, quàm nodus duorum ligamentorum quæ Colon intestinum amplexantur. Nam diuulsis & separatis ligamentis appendix cæci obliterari videbis.

Mihi valdè placet *Spigelij* opinio, hunc humorem atrum generari in Intestinis, ex permixtione bilis & cysti fluentis, & pituitæ multæ delabentis & capite in ventriculum, quod *cap. vit. huius libri* subolfeceram, quorum exacta millione ex diutina morâ, & à calore facta, acer hic humor generatur. Pituitam & Capite copiosam defluere in stomachum foetus, probatur ex *Hippocrate*, *lib. de morbo sacro*, dum agit de Epilepsia, quæ in Foetu intra locos muliebres adhuc latente procreari potest. Locus est insignis, notatione dignus: quod si à venis reclusis stillaret hic acer sanguis, non sine noxa Foetus id fieret, quia natura non sinit sanguinem effluere & venis sine dispendio vitæ, nec cum certa moderatione, venæ recludi & obturari possunt.

Secundæ coctionis excrementum est vrina, quæ per renes in vesicam percolatur, & per vtrethram in Amnion excernitur.

Tertiz coctionis excrementa sunt *Sudor*, & *Sordes*: Vtrumque per habitum corporis effluit. Sudor in Amnio tunica cum vrina permiscetur, Sordes cuti externæ adherent, itant Fœtus lutosa quadam & subfaua forditie obductus appareat.

Hic se offert non levis de *Sudore* dubitatio, quo modo tenellus Embryo Sudorem emittat, quem homines non nisi violento motu profundunt. Si sudor sit excrementum tertiz coctionis, siue è præcordiis humidis & calentibus in habitum corporis effundatur, vt voluit *Fernelius*, non prodibit antequam Fœtus nutriatur. At quadagesimo die formicæ magnitudinem non excedit, nec adhuc alitur, attamen humoris rribus vel quatuor vaciis circumfunditur, quas Fœtum tam pusillum per fordores depoluisse non est verisimile. *Mercatus lib. de morbis mulierum* exultimam, esse pingue quoddam excrementum ad salutem Infantis à natura excogitatum. *Bellonius, lib. de Piscibus exarctis, pag. 39.* probat liquorem fœtui circumfusum, non esse Fœtus excrementum vrinale, sed à natura certis de causis ibidem potestatum.

Ego verò hunc humorem generari puto, partim ex vitroque semine, partim ex sero materni sanguinis, quia semen humidius, aquosius, conformationi ineptum est, vt videre est in cæcis, qui coagulari non possunt, nisi secreto feto. Cùm vtrumque semen fermentatione quadam effascit & compingitur, vapores excitantur, qui in Amnio concresecunt. Sic moles carnea placente, dum ex effusione sanguinis conerefcit, plurimum serum refundit, Fœtui circumfusum. Altera huius humoris causa est serum, quod vbi sanguinem ad venas capillares perduxit, suo munere perfundit, per habitum corporis digeritur, & per poros cutis in Amnion tunicam exsudat, quemadmodum æstare, & motu corporis plurimus sudor excitatur, quia rum tarescenda est tota cutis. Sic Fœtus corpus, propter cutis raritatem, & calorem vteri ambientis, tenui excremento, nempe sudore vndiqueque diffuit. *Galenus lib. 1. de semine*, notat statim à principio conformationis, è toto Fœtu exhalare vaporem, qui sudori perfecti animalis proportionem respondet.

At dicet aliquis. Negat *Theophrastus lib. de Sudoribus*, infantes sodare, quia nondum cutim porosam habent. In illis serofus humor per aluonem aut vesicam effluit. *Theophrastus* opinionem confirmabit *Galenus, lib. 2. de Temperam.* vbi quærit, cur infantes pilis careant. Quia, *inquit*, meatus adhuc nullus in cute reperitur. Fatcor infantes non facile sudare, quia cutis spiracula, siue pori ex cuticula circumfusa sunt oclusi. Sed non inde sequitur Fœtum, cuius corporis habitus rarissimus est, sine cuticula non sudare.

Est igitur probabile, aquosum humorem in Amnio contentum, prima sua origine, partim ex coneretione placente secretum, partim ex sudore manantem colligi intra membranas, atque Fœtus vrinx æcessione in dies augeri. Cuius humoris in vteri gestatione, & partu, magna est necessitas. Fœtus enim aquis innatans leuior est, quamuis rideat *Galenus* istam rationem, quia Fœtus cum matre gestatur. Sed leuior est aquis innatans Fœtus, & minùs dolorifica eius gestatio, quàm si in sicco degeret: quia non tangit, neque lædit vterum, dum narabundus in aquis reuoluitur. In partu effradis tunicis collum vteri humore isto perfusum faciliùs dilatur, & elocantem puerum commodiùs finit elabi. Quod si ante tempus parturiginis effluat, Fœtus in sicco remanens, vel exstinguitur, vel partus laboriosus consequitur, vt notauit *Hipp.*

Præterea hic humor magnâ naturæ providentiâ intra membranas coacervatus est ad securitatem Fœtus, ne à matre offenderetur, dum vestimentorum angustia ventrem arcè comprimit & constingit, vel cadit, aut impingit ventrem duro corpori, sic enim repulsus Fœtus, aquarum ambitu protegitur, quæ obuiau Fœtoi procedunt. Deinde aquis innatans Fœtus faciliùs conuoluitur, vt situm conuenientem quærat. Nec enim Fœtus semper eodem loco stare & quiescere potest. Apposicè *Democritus apud Plutarchum*, Fœtum suis aquis innatantem naui comparabat, quem vmbilicus velut anchora nauem, sistit.

Porro duplex humor serofus videtur in vtero contineri. Alius à sudore viscidus, & quodammodo oleosus, alter aqueus & vrinx similis. Ambo interdum simul, interdum scorsim excernuntur, quos tactu solent discernere obstetrices, si hoc verum sit, vnus intra amnion continetur, alter inter amnion & chorion reconditur. Notat *Fabricius* sodorem quintuplò aut sextuplò copiosorem esse vrina, quod in Fœtu belloino faciliè discernitur, non in humano, quoniam humores non diuersis membranis

distinguantur, sed simul immixti intra amnion coaceruantur, vsque ad parturiginis tempus.

Præterea corpus Foetus humore vntuoso & oleoso inundatum apparet, ne ambientis humoris acrimoniâ offenderetur, atque vt sic delibutum, facilius euadat ab ergastulo suo.

## DE VITALI FACULTATE, ET admirabili structura vasorum Cordis in Foetu.

### CAPVT VIII.



ADmirabilis structura vasorum Cordis in Foetu, occasionem dedit inquirendi, quo fine facta fuerit, An ad fabricam & nutritionem Pulmonum, quiescente Corde, quandiu Foetus Vtero gestatur? An ad alios vsus fabricata fuerit ab initio conformationis, palpitante Corde? Hæc quæstio à Viris doctis, *Laurentio, Medico Montpelienſi doctissimo, & Simone Pietreo, Parisienſi Medico eruditissimo, & Professore Regio animosè disceptata* fuit, & ante illos anno 1574. à *Baptista Carcano, Medico & Anatomico Titimeno peritissimo, edito libello* secundum doctrinam *Galen*i proposita fuit, atque nuper ab eruditissimis Medicis Germanis, *Nymmano & Vincero* renouata, & agitata philosophicè, sed non satis pro dignitate rei anatomicæ discussa, necdum perfectè explicata fuit.

Est enim res magni momenti ad humani generis conseruationem scire, *An Cor in Foetu propriâ vitali facultate sit præditum, & moueatur?* quæ ad Medicum, Iurisperitum & Theologum pertinere videtur.

Nam si Cor in Foetu vitali facultate præditum moueatur, citra materni Cordis communionem, per aliquod tempus potest viuere, quo temporis spatio extinctæ matris foetus adhuc viuens, secundo vtero eripi potest saluus & incolumis. Sic natum dicunt *Æsculapium ex Matre Coronide*. Sic natum *Cæsarem* secundo matris Vtero. Sic *Gorgiam Epvrotam, Scipionem, Manlium, & alios* in lucem prodijisse. Est enim inhumanum post obitum matris, foetui pereunti & suffocari parato, auxiliare manus denegare, & sæpe viuentem adhuc, cum matre mortua eodem tumulo contegere, & obruere. Idcirco *Iurisconsulti* eum necis reum damnant, qui grauidam sepelierit, non prius extracto foetu, quod spem animantis cum grauida peremisse videatur.

Interest quoque Theologo scire, *An Cor in Foetu moueatur, vt extinctæ matri superstes, baptismi particeps fiat, & ad cælos rediens, in beatorum sedibus Dei conspectu fruatur*, quia nunc Parisiis consueuimus in moribundis, atque etiam mortuis grauidis, si digito in sinum pudoris intruso, caput infantis hianti osculo matricis oppositum deprehendatur, aquâ benedictâ aspergere, vel digito intincto rigare, prolati verbis baptismi, quem conferre, & administrare ridiculum foret, si mortuus esset infans.

Deinde si contingat mulierem nono mense grauidam morbi violentiâ perire, vel in ipso pariendi conatu conuulsionibus enecari, si parentes, amici, coniux prolem desiderent, consueuimus statim atque extincta est mater, ex Medicorum & Chirurgorum assstantium certo iudicio, & accurato examine, baculo in os indito, matris mortuæ ventrem aperire, vt foetus extrahatur: sicque vidimus plures saluos & incolumes educos fuisse, atque *Cæsares, siue Cæsares* ita dictos. quod matris mortuæ secundo vtero in lucem prodierint, authore *Festo*. Hæcque pia & salutaris foetui, nequaquam mulieri mortuæ crudelis operatio, fieri debet in qualibet prægnante mortua, iuxta edictum Iurisconsulti.

Deinde in Geldria, pater hæres est prolis suæ, quæ ex matre mortua prodierit & superuixerit. Ideoque nuper in eriscunda hereditate familie de Bergh, in Hollandiæ curia, hæc quæstio agitata fuit, & à scholis Medicorum variis exposita, & variè definita, vt sub finem capitis ostendam. & nostrum super ista quæstione iudicium proponam. Quapropter cum hæc quæstio accuratè pensitari & examinari debeat, nostras super ea re cogitationes liberè proponemus.

Vitalis facultas nihil est aliud quàm actio Cordis, ad spiritus vitalis generationem. Actio ista perficitur perenni motu Cordis, quod si quiescat in foetu, vt nonnulli arbitrantur, nulla erit vitalis facultas, aut saltem otiosa manebit, donec inspirato aëre frui possit. Hoc aut verum sit, paulò diligentius inquiramus.

Peripatetici, vt vitam à nutritione non distinguunt, ita nec vitalem facultatem à naturali. Duo tantum principia facultatum constituunt, *Naturam, & Animam*. Proinde duas tantum facultates sedibus, instrumentis, & actionibus differentes, *Naturalem & Animalem* admittunt. At Medici solius hominis animam contemplantur, non animam in genere vt Physici, quam in tres facultates sedibus, instrumentis, & actionibus differentes diuidunt. Animalem in Cerebro collocant, Vitalem in Corde, Naturalem in Hepate: Earum omnium *summa* & integritas vitam constituit, quæ simul atque conformatum est corpus, foetui inspiratur. Tum eum singulæ facultates suis officiis funguntur. Naturalis in nutritione & accretione occupatur, vitalis in generandis spiritibus, animalis in sensu & motu. Si igitur Hepar & Cerebrum suas actiones exercent, cur otiosum erit Cor, cuius actio ad vitam æque est necessaria, atque Solis ad mundi conseruationem? In Corde nativus calor velut in foco conseruatur, proinde animalium, quæ Corde carent calor est tepidus, qualis in domibus æstate percipitur: sed quemadmodum domus accenso igne calidior redditur, ita animalium corpus ex Corde caliditatem acquirit maiorem eâ, quæ iecori & venis insita est. Itaque nisi Cor ad augendum calorem moueretur, suis excrementis pet nouiculis temporis spatium immerfus, aut putresceret, aut saltem grauiter laderetur.

Præterea si foetus moueatur & sentiat, necesse est à Corde sanguinem arteriosum Cerebro suppeditari ad generationem spiritus animalis, quia sanguis venosus impurus, generandis spiritibus istis ineptus est, ex matre nullus arteriosus sanguis purus ad foetum perlabitur.

Audiamus nunc ex *Nymmano*, rationes philosophicas, quibus probatur vitalis facultas in foetu. Si potest ipse solus præstare quod est maius, poterit etiam id quod minus est, quia maius est opus, actiones animales exercere, quàm vitales functiones, Animales supponunt Vitales: si foetus in Vtero matris propriam habet formam corpus informantem, nempe animam rationalem prorsus diuersam à matre, per quam constituitur, atque etiam operatur, absurdum erit dicere aliquid constare per formam essentialiam, & per alteram operari, & viuere: Nam Vita cùm sit duplex, *essentialis & accidentalis*: Prima nihil est aliud, quàm anima corpus informant. Accidentalitatis Vita, est actus animæ secundus, seu eius operatio. Quæro nunc quam vitam à matre deprompta fruatur foetus? Nemo dicet essentialiam esse, quoniam essentialis forma matris, non potest foetui communicari, quæ est inseparabilis à suo subiecto. Multò minùs accidentalitatis intelligi potest, quæ non datur & existit absque propria & essentiali vita. Si quid communicaretur foetui à matre, esset vitalis facultas, quæ est potentia seu facultas animæ: At illa est accidens: Accidens non migrant de vno subiecto in alterum. Itaque cùm essentia animæ non possit communicari foetui, neque etiam potentia, seu facultates: Certum est à matre communicari sanguinem & spiritum, at illa nec viuere, nec vitam largiri possunt, sed animæ dumtaxat operationibus inseruiunt. Quod autem facultates animæ matris, & animæ foetus sint diuersæ, inde probatur, quod motus in foetu sæpe accidit dormiente matre, & eadem vigilante sæpius quiescit: quinetiam matre extincta aliquamdiu superstes viuit, & inrerdu viuis ereptus fuit. Accedit quod foetus non est pars matris integrans, neque essentialis, quia detracto foetu, mater non dicitur mutilata & imperfecta. Pars essentialis non aufertur, nisi destructo corpore, atqui foetus extrahitur sine damno, imo magno matris commodo. Denique si pullus formatur solo incubatu gallinæ, & propriâ vitâ viuere possit, quidni etiam foetus humanus fouebitur in Vtero, tanquam pullus in testa oui, calore matris, vnde foetus à foetu nuncupatur. Insuper pulli Cor ex se moueri, & proprias actiones vitales obire nemo nescit, & antequam in homine corpus sit conformatum, tertio vel quarto die conceptionis animam rationalem infundi contendit *Fleenus*, quod multas turbas in Philosophia & Medicina excitauit, variis disputationibus agitata.

Notat *Aristoteles*, libro *tertio de partibus animalium*, cap. 4. In prima partem generationis statim Cor palpitare, quasi animal sit, & principium eorum quæ sanguinem



habent. Ipse deprehendit in ouis triduo incubatis à gallina punctum saliens, quod repræsentat Cor, & lib. de Inuentute cap. 3. testatur Cor animantium sanguine præditorum primum gigni. Addit quod per ea constat, quæ fuimus speculati in hisce, quæ dum adhuc ficerent, nobis vidisse contigit. Idem lib. 6. de historia animalium, se dum observaret in ouis partum productionem, animaduertisse post tres dies, totidemque noctes in quibusdam ocyüs, in aliis tardius, Cor in albumine sanguinei puncti, quod punctum saltit, & mouet se, ac si esset animatum. Inde discat Galenus, quamvis Hippocratis auctoritate fultus, lecur non prius Corde generari.

Quare cum primum formatur Cor moueri incipit, vt docet Aristoteles, cap. 4. lib. de spirita, quærens quænam ex tribus motionibus, respiratione, pulsu, & alimentis aductione, siue nutritione præcedat, sic statuit. Quamuis attractio mensuri humoris ad formationem fœtus sit necessaria, respiratio postrema succedat, pulsus tamen per initia statim in constitutione Cordis emergit: id quod in sectione viuorum, & pulli formatione ex ovo deprehendere licet, atque per actionem calidi in humidum, feruorem hunc, & pulsus agitationem cieri manifestum est. Quare Cordis primus erit motus. Id satis superque declarat motus arteriarum vmbilicalium, quæ cum sint arteriis vterinis, nec contiguz, nec continuatz, vim tamen pulsatilem à Corde fœtus mutuantur. Quoniam motus Cordis, & arteriarum matris est improportionatus calori ipsius fœtus, itaut idem rythmus ambobus nequaquam conuenire queat, siue alternatim cum Corde agitentur arteriæ, siue Cor & arteriæ in motu eundem sequent rythmum, eodem tempore per eandem motus speciem.

Præterea scribit Galenus, lib. 15. de vsu partium, Fœtus facultates emanare à semine, non ab vtero matris. Adde quod in formatione pulli Cor statim palpitans non à matris arteriis vitam accipit, sed à seminis facultate insita Cordi, postea diffundente spiritus vitales. Quod memorabili experimento Galeni confirmatur lib. 6. de Placitû Platonis & Hippocratis, cap. 6. & lib. de vsu partium: si arterias vmbilicales reuincias, vel digitis comprimas, omnes secundarum arterias confestim pulsu & agitatione omni carere spectabis: arteriis tamen supra ligaturam pulsantibus. Quod si motionis principium daret Vterus, contrarium accideret. Ergo si vis pulsfica arteriarum vmbilicalium à Corde manat, Cor in fœtu non otiatut.

Si non fueris contentus Galeni demonstratione altero experimento, & αἰσθητῶς certissimâ rei veritatem comprobabo. Si secte ouis, vel capræ viuens vterum secueris, intactis membranis, videbis trans membranas Cor agitari, & oculis, & manu apressa thoraci. At nondum respirat fœtus, quia sunt integra inuolucra. Quod si intra membranas intactas & illaceras os fœtus apprehendas, & ardè constringas, vt nequeat ore vel natis aërem inspirare, & discissis membranis thoracem momento incidas, Cor ipsum micare deprehendes: quod sæpius à nobis obseruatum & publicè demonstratum. Hoc etiam experimentum Bellonius testatur fecisse in Camela prægnante: nam discisso thorace pulmones, & Cor moueri vidit: ideoque intra secundinas fœtum spirare statuit, quod insciatur Aristoteles, lib. de spirita.

Spiritus fatetur Cor fœtus micare, nec per arterias vmbilicales spiritum vitalem à matre depromere, sed ab ipso Corde motum excitari, cui facultas vitalis inest; postea diffundi in omnes corporis partes: artamen anastomoses vasorum fœtus conditas fuisse censet ad nutritionem pulmonum, arterias verò vmbilicales sanguinem tenuiorem & calidiorem in placentam deferre, vt motum sanguinis materni per venam vmbilicalem accelerarent, atque prohiberent attenuando, ne concreseceret, quæ omnia mihi videntur valde ridicula, nec refutatione digna.

Quidam doctrina & eruditione clarissimi, Cor in fœtu otari & quiescere volunt: quia si mouetur ad vitalis spiritus generationem, necesse est ei materiam suppeditari, aërem scilicet, & sanguinem: At fœtus vtero conclusus non respirat otante pulmone. Dissimilis est vasorum Cordis structura, quomodo igitur moueri poterit? Respondeo, non esse necessarium aërem ad generationem spiritus Vitalis, multis in locis demonstraui Galenus. Nec potest aër ad Cor permeare, si credimus Casalpino, cum nulla sit communio brônchiorum cum riuulis arteriæ venosæ: tantum inspiratur ad refrigerium pulmonis, qui qualitatem suam Cordi communicat.

Annotauit Aristoteles, lib. 10. de historia animalium, circa os vteri inferum reperi canaliculum quendam, per quem vteri clausi respirant, quidni in forura per eundem canaliculum fœtus respirabit. At hic si quis adest, non potest esse alius,



quàm productio vasis semen eiuculantis. Sed aërem ad Cor non pervenire probatur ex *Aristotele*, libro primo de *historia animalium*, ubi arteria aspera instatur, haud satis constat in certis animalibus, an Cor subcat spiritus, quod in maioribus evidens est.

Cùm autem Natura in fœtu, vt in editis, per easdem vias sanguinem Cordi subministrare non possit, quia solidum primo & secundo mense: nec satis excavatum, admirabilem vasorum structuram excogitavit, cuius beneficio Cor, & pulmones formari: sed primùm Cor sanguinem admittit, & elaboratum ad vtilitatem partium refundit. Er quoniam vmbilicales arteriæ sanguinem arteriosum ad Cor deferre non poterant, hunc primis mensibus in aortam prope Cor, non in Iliacas arterias regeſcit, qui ad Cordis basim delatus non potest subire Cor, nondum excavatum, vel à valvulis ibi affixis aditu prohibetur: Proinde repulſus ad pulmones diuertit per canalem brevem, qui aortæ ramum descendentem venæ arterioſæ connectit, cùm igitur Cor arterioſo sanguine nullo, aut paucò fruatur, alia via perueſtiganda, quæ sanguinem Cordi communicare possit.

Venæ Cauæ truncus Cordi affigitur, vt sanguinem in dextrum Cordis sinum effundat, quando formatus fuerit: iuxta istud ostium, foramen apparet, obtensâ membrânâ tanquam valvulâ dimidio clausum, ad eum finem efformatum, vt sanguis venosus ad pulmones transmittatur. Vbi vero Cor probè excavatum est, tum sanguis venosus dextro ventriculo Cordis exceptus, per medium septum in sinistrum illibatur, vbi vitalitatis charactèrem accipit, quem deinde per aortam, eiusque tubulos, siue ramulos vniuerso corpori distribuit, quo singularum partium fugax viuacitas reparatur. Fœtu in lucem edito huiusmodi vasorum vsus aboletur, canalis enim exciscatur, & foramen clauditur. Inrerdu post tres vel quatuor menses remanet integra anastomosis cauæ cum arteria venosa, licet angustior, sæpius in suspensis cadaueribus curiosè inuestigans istam anastomosis, apertâ deprehendi: Quamvis vasa suum vsu, in alium permutarint, eandem tamen substantiam retinent, quam ab ortu acceperunt. Vena arterioſa propter suam originem ab aorta, arteriæ tunicam retinet, non vsu vt in fœtu, arteria venosa, quia videretur suum ortum traxiſſe à vena cauâ, venæ tunicam ſeruât, non vsu. Motu quoque & pulsatione caret, etiam si læuo Cordis ventriculo inferatur, nec aërem admittit, cuius rei demonstrationem profert *Galenus*, libro septimo de *usu partium*, cap. 9. si mortuo animali per laryngem insufflaueris, implebis alperas arterias, & pulmonem distendi manifestè videbis, cùm inrerim arteriæ læues magnitudinem suam retineant.

Quapropter de vsu duarum anastomosis sic statuo. Altera, quæ ab aorta cum vena arterioſa perficitur, ad nutritionem & vitalitatem pulmonis amplissimi visceris comparata est, qui cùm sit ex renui & spumoso sanguine concretus, eodem efficiendus erat: propterea scriptum ab *Hippocrate*, pulmonem contrarium alimentum trahere, reliqua membra simile. Altera anastomosis venæ cauæ cum arteria venosa ad distributionem sanguinis venosi, cùm non possit iungi venæ arterioſæ, propter interiectam aortam, constructa est, vt sanguis effusus in sinistrum Cordis ventriculum, vitalis fiat, & in aortam refundatur. Itaque cùm sanguis venosus & arterioſus à Corde suppeditari non possit ad procreationem pulmonum, quia Cor primis conceptionis mensibus solidum est, sensim excavatur, spiritu infuso ibi concluso, & parenchyma distendente. Idcirco natura per alia diuerticula, nempe per illas anastomosis, sanguinem venosum & arteriosum deduxit. Venam arterioſam aortæ coniunxit, arteriam venosam venæ cauæ copulauit, propter vasorum contiguitatem, quia semper venæ arteriæ comes adiungitur, atque ita vasa Cordis sunt alternatim disposita, vt venæ cauæ & venæ arterioſæ sit inrerposita aorta: Inter venam arterioſam & venam cauam, arteria venosa media consistat. Vbi verò Cor excavatum est, & in duos sinus discretum, tum suscipit sanguinem, & eo modo distribuit quo in adultis.

Dolissimus Medicus & Anatomicus *Hæruens*, admittit quidem Cor in fœtu moueri, sed ex illo fundamento quod verum esse statuit, scilicet infantibus in lucem editis sanguinem per pulmones traduci, anastomosis vasorum Cordis in fœtu factas fuisse iudicat, ob defectum respirationis, & pulmonis immobilitatem. Ideoque sanguis cùm è dextro Cordis ventriculo expulsus, nequeat permeare polmonis parenchyma densum & immobile, in sinistrum Cordis ventriculum deferatur, per anastomosis venæ cauæ cum arteria venosa. Altera portio sanguinis è cauâ transmissi in dextrum Cordis ventriculum, per alteram anastomosis venæ arterioſæ cum aorta labitur in

aortam, atque ita sanguis in utrumque ventriculum Cordis, tunc temporis perque capacem & amplum æqualiter recipitur, ut amborum ventriculorum æqualis sit actio. Eandem opinionem sequitur *Hallens*, cui respondi in *Examine duarum eius epistolarum*.

Ut autem omnis dubitandi occasio rescindatur, *Galenus* dissentientes locos super ea questione componere oportet. Scribit *lib. de format. Fetus*, ipsum Foetum in principio suæ generationis, neque arteriarum, neque pulsum, neque Cerebri, aut Cordis utilitate indigere, quod plantæ more vivat. Id verum est, donec Foetus suæ perfectionis motus edere incipiat: Nam, ut ipse ait, *lib. 7. de usu partium, cap. 12.* Cor non tantum in perfectis, sed etiam in Foetibus suppeditat arteriis vim quā moventur. Id quotidie obstetrices deprehendunt in ligatis vasis umbilicalibus. Idem confirmat *lib. 1. cap. 8. de femine*, de Foetus Corde loquens. Arteriæ umbilicales ad calidissimum viscus, id est, Cor feruntur, quod ob excellentem caliditatem moveri non cessat. Cæterum, Foetum in utero spirare scripsit *Hippocrates, lib. de Principiis*. Insans in utero alimentum & spiritum trahit. *Ibidem*, Cor spiritum trahit ex omnibus in homine. Idem, *lib. de Natura pueri*, sufficit Embryoni modica spiratio, pro suo modulo: *Galenus* notat in Foetu transpirationem vices spirationis obire, transpirationem fieri non tantum per arterias, verum etiam per anastomoses venarum cum arteriis. Idem tamen scripsit, *lib. 7. de usu partium*: forsitan Cor in Foetu ex arteria magna spiritum ducere. Obiecit aliquis: Si Foetus ore non respirat, qui sit, ut adhuc erga latus uteri conclusus, vocem eiulantem distinctam emittat, non tribus tantum diebus antepartum, sed & mense, & amplius, ut pluribus historiis probat *Libanius, lib. de Virgine uer-rino*. *Albertus magnus lib. 10. de Animalibus, & Solinus cap. 1.* antequam Embryones quosdam plorasse in utero. *Linus lib. 24.* narrat infantem adhuc in utero matris de triumphale clamasse: quod dictum sit obiter aduersus *Aristotelem*, qui *cap. 10. lib. 7. de historia animalium*, negat Foetum vagire, antequam utero egrediatur. Quid si dicamus pullos adhuc oui testa inclusos vno aut altero die ante exclusionem pipire, testibus *Aristotele & Aldrando Physicæ*, ut voce sua necessitate exeundi matris significent: Non intra testam respirant, & fruuntur aëre interno. Responso ad istam objectionem extat apud *Hippocratem lib. de genit.* quod ovum totum & incubatum à gallina adeo tenerum & perspirabile euadat, ut pullus externo aëre frui queat: ait enim aërē per foramina corticis oui subire, quibus etiam recens ovum igni ad motū sudat. Priusquam manum ē tabula tollam, Obiectiones qualdam, quæ vim facere possent nostri & opinioni subnectam, paucisque refutabo.

*Obiectio prima.* Si Cor mouetur in Foetu, diastolem & systolem habebit: per diastolem dilatatum attrahet aërem & sanguinem, per systolem contractum fuliginem & sanguinem arteriosum expellet, ut in editis accidit: at Cor Foetus in diastole non attrahit aërem, quia non respirat, nec sanguine venoso fruatur, quia totus in arteriam venosam deriuatur. Deficiente finali causa, quæ cæteras mouet, non dilatabitur Cor: ergo si diastole nulla, pariter nulla erit systole, sunt enim motus consequentes & successiui, quorum vno sublato, alterum perire necesse est. *Respondet.* Fateor equidem Foetum non ore spirare, sed transpirationis vii beneficio. Cor mouetur in piscibus, & tamen non respirant: sic instar piscis, suis aquis immersus vivit Foetus, ita ut vitam incipiat à pisce, postea ut quadrupes vivat, tandem ut bipes animal rationale. Quamvis venosus sanguis dextro Cordis ventriculo receptus, partim in venam arteriosam feratur, magna tamen eius portio ex causa per arteriam venosam defertur in sinistram Cordis ventriculum. Dissimilis structura vasorum Cordis euer-tit istam objectionem.

*Obiectio secunda.* Si Cor in Foetu mouetur, ut in editis infantibus, diuersa vasorum Cordis structura inutilis erit. Inutiles quoque arteriæ umbilicales: sufficiebāt vena umbilicalis Embryi nutricula, maternum sanguinem ad Hepar deferens: Inde ad dextrum Cordis sinum transfusus, per venam arteriosam ad nutritionem pulmonum abunde suppeditari poterat, atque per medium septum traiectus, & in sinistro specu elaboratus, ut fiat vitalis, per aortam in vniuersum corpus distribui poterat. *Respondet cum Aristotele*, Foetum vitam vivere plantæ, deinde animalis, Cor etiam nondum penitus absolutum virtute insita, ab anima tamen directe moueri, ut id agat, quod natum est agere, id est, natium calorem suo motu conferret, & aliquantulum spiritus impertiat huic pusillo corpusculo. At ubi Foetus proprio sanguine nutri in-

capit, Cor excavatum est, ut sanguinem intra se recipiat, & partibus corporis refundat. Itaque perfectum & optimè conformato Corde, quod accedit, dum incipit moveri in Foru, ut in edictis, per easdem vias sanguinis in Cor ingreditur. Sed antequam suis cavitatibus probè instructum fuerit, vasa quatuor habet sanguinem deferentia, qui cum adire & subintrare Cor solidum, necdum excavatum nequeat, natura in istis vasis diuertricula formavit, per quæ sanguis materius distribuitur ad pulmonum & Cordis conformationem, & reliqui corporis nutritionem. Vbi Cor perfectum & absolutum suo munere fungitur, cessant illæ anastomoses vasorum, remanentes tamen in edictis puerulis vsque ad duos vel tres menses & ultra.

*Obiectio tertia.* Si Cor mouetur ad confectionem sanguinis, spiritusque arteriosi, fuligines excludi necessum est, alioquin natiuus calor in proprio lare suffocaretur: Nam si in hæmatosi segregantur excrementa sæctus, quidni in elaboratione sanguinis artetiosus? Non potest adeo esse similis foetui sanguis arteriosus matris, quin habeat aliquid dissimile, sordidum, ac fuliginosum, si fuligines remigrant in arterias, purissimos spiritus conspurcarent. *Respondet*, fuligines beneficio transpirationis effluere per habitum corporis, & in aquam conuerti, quæ foetus circumfusus est.

*Obiectio quarta.* Quod si è Corde in aortam delaberetur sanguis arteriosus, duplex inenanco aortæ descendens sanguis contineretur, perfectus superne defluens, alter imperfectus ad Cor ascendens, quod fieri non potest sine permissione & confusione substantiarum. *Respondet*. Quid inde detrimenti possit accidere non video. Isti duo sanguines bene inter se conueniunt. Deinde duplicis humoris per eundem canalem transitio possibilis, ut vini & aquæ in istis duobus vasis, quæ nostrâ linguâ *Pessum* nominantur. Quid si dicerem, vbi Cor suo fungitur officio, non amplius sanguinem arteriosum ad Cor ascendere.

*Obiectio quinta.* Si fetus proprias & vitales functiones exerceret, quouis mense natus etiam post quintum viveret, vitalisque seruari posset. *Respondet*. Partes adhuc imbecillæ esse, nec satis roboris & corporaturæ obtinere, ideoque per legitimum tempus à natura præscriptum manere debet in vtero, ut robur & incrementum adipiscatur. Interdum abortiui foetus, quinto, sexto, & octauo mensibus viuere possunt. Imò etiam tertio mense editus embryo, vitæ suæ ex motu oris & labiorum signa profert. Interdum per horæ spatium viuit.

*Obiectio sexta.* Anima rationalis, quæ includit sensitiuam, & vegetatiuam, non introducitur priusquam sit formatus foetus integer, quod accidit trigésimo in matre, vel quadragésimo in femella, non viuit autem pars vlla sine anima. Infunditur illa formati omnibus partibus, ergo vna pars non viuit prius altera, & quamuis Cor prius sit formatum, non propterea dicendum prius viuere. *Respondet ex Aristotele, lib. 2. de anima*, animas se habere instar numeri & figuræ, ut binarius comprehenditur ternario, & trigonum tetragono, sic formæ per ordinem & successionem quandam introducuntur, ita ut rationalis vtrasque sub se comprehendat, etiam si rationis officia non exerceat.

Itaque de vsu anastomoseon vasorum Cordis, & eius motu sic statuo, his iactis & constitutis fundamentis. Certum est venas & arterias vteri non expandi & dilatari in tor ramos, quot sunt rami vasorum vmbilicalium in placenta: nec possunt eadem vasa extendi vsque ad fundum vteri, vbi placenta adhærescit, quoniam vasa hæc non sunt eiusdem naturæ, qualis est substantia spongiosa vteri. Propterea sanguis maternus, tam venosus quam arteriosus effunditur in vteri substantiam spongiosam, & per tubulos ac elices quoquo uersum distribuitur. Hoc posito verissimo fundamento, arteriæ vmbilicales nun coeunt, & vniuntur vasis vmbilicalibus per anastomosis. Ideoque arteriæ non exsurgunt, & eliciunt sanguinem vitalem maternum nisi permixtum, & venoso confusum intra placentam. Inde sequitur istum sanguinem, licet puriorem & subiliorem venoso, exuclis ab arteriis vmbilicalibus, indigere præparatione noua, ut reddatur foetui proprius & consocialis. Ut id fiat, Cor & ante suam excavationem, & postquam excavatum est, moueri debuit ad eam adionem perficiendam. Quapropter anastomoses vasorum Cordis, quamuis vsque ad partum & ultra, peroriz & integræ remaneant, cum dumtaxat vsum habent, quem præscripsit *Galenus*, donec Cor fuerit excavatum. Quod accidit eo potissimum tempore, quo mouetur foetus: Tunc Cor incipit moueri ad elaborationem vitalis spiritus. Atque hoc modo exponenda videtur *Galeni* sententia de vsu anastomoseon, & de motu

Cordis, quod deberet esse immobile, si ad partem vique fluxet ac permanceret vsus Anatomicæ vasorum Cordis, qualis à *Galeno* describitur.

Quoniam video istam quæstionem de vitali facultate Foetus inter doctissimos Medicos Germanos, *Nymmannum* & *Vinclerum*, philosophicè, & inodestè agitatam fuisse, cumque *Nymmannus* fateatur me ci occasione dubitandi & inquirendi dedisse: cogor eius opinionem, meamque defendere aduersus *Vinclerum*, cuius rationes prorsus inualidas demonstrabo, iactis prius his fundamentis, tanquam hypothesibus certis & indubitatis. In primis scire conuenit, venas & arterias matricis per eas substantiam non distribui, vt in reliquis partibus carnosis, sed vti ad vterum peruenere, in vacua muliere, & in prægnante inter membranam communem & propriam carnosam extrinsecus excurrunt, rorisque iussu suum sanguinem effundunt, sine ulla vasorum apertione, vt in hæmorrhoidibus, qui crassa & spongiosa vteri substantiâ exceptus, postea exurgitur à placenta carnosâ, quæ parietibus vteri toto suo corpore firmiter agglutinatur. Inde cognosces vasa vmbilicalia non esse propagines vasorum maternorum, ne quidem coire cum vasis matris eiusdem generis, nisi ante formationem placente. Itaque vasorum vmbilicalium, scilicet venæ, & duplicis arteriæ, cum aliunde repetere oportet, & vnumquodque à viscere suo, à quo dependet, proficiscitur. Postea, ex placenta carnosâ, sanguinem sibi proprium & familiarem vnumquodque viscus per sua vasa prolecat, ex quo faculas formatiæ viscous conpingit, & efformat. Deia ubi suam conformationem est adeptum & idoneum ad actionem propriam edendam, sanguinem matrem per tubulos proprios attractum, sibi reddit proprium & consuetalem noua quadam alteratione.

*Secunda hypothesis.* Statuere oportet diuersam esse molem vasorum vmbilicalium in longitudine & crassitie, pro ratione corporaturæ, & conceptionis tempore. Cteantur enim ex semine, & primo mense ortum ducunt iuxta Cor, quod pisi magnitudinem æquat. Dux sunt arteriæ vmbilicales propter necessitatem materiæ tenuioris & calidioris, quæ maiori copia adferri debuit ad Cor & pulmones constituendos, cum autem subire & penetrare Cor nequeat nondum excavatum, per diuerticula, id est, per anastomoses vasorum Cordis ad pulmones deriuator sanguis venosus, & alter arteriosus non tantum pulmonibus, sed etiam toti corpori distribuitur. Istæ vasa vmbilicalia, & vasa Cordis crescente fœtu extenduntur, & crassescunt, atque discedunt à Corde, itaut in abortiuis fœtibus diuersorum mensium reperias arterias vmbilicales modò iuxta Cor nasci, modò prope diaphragma, modò iuxta renes. Deinde nono mense inuenies emergere ab iliis, tandem post biennium, vergere ad hypogastricas deprehendes. Itaque de anastomosis agendum, non quales reperiuntur in fœtu noui mœstis perfectò & absoluto, sed prout apparent in prima partium conformatione, & secundum gradus incrementi corporaturæ.

His positis fundamentis, facile erit docere vitam fœtus absolutè non pendere à matre, & tres principes partes in fœtu certo quodam tempore suas facultates obire. Admittit quidem *Vinclerus*, vitam neque essentialem, neque accidentalem à matre communicari fœtui, nihilominus sustinet animam materiam circa fœtum non nihil occupari, quod probat ex imaginatione matris, quæ notas mirabiles imprimit fœtui, quouis tempore graviditatis, quod non fieret, nisi anima fœtus & facultas formatrix aliquo modo determinationem acciperent ab anima matris.

Respondeo, *Vinclerum* ex motu violento & operatione spirituum à matre prodeuntium, & præter naturam violenter impulsorum, malè demonstrare e cursum & operationem, quæ sit secundum naturam. De hac quæstione tractant Physiologi, vnde prodeat illa impressio stigmatica in fœtu, quam non examinabo; he longior sim.

Alterum argumentum faciliè soluitur ex ista insitione sarculi in stipite, vtraque pars ex *Tutij* & *Semprony* vegetante anima prædita est, hæc ex *Tutij* auulsa, sic pars *Semprony*: ita Sarculus stipiti insitus, quamuis emittat flores, fructus, folia similia arbori, vnde reuulsus, tamen per insitionem stipiti agglutinatur, sitque pars arboris.

Pergit vterque *Vinclerus*. Si primis mensibus fœtus spiritibus matris vitetur, quidni reliquis? Non est verisimile duplici modo viuere Infantem in vtero matris, manent eadem instrumenta, descendent arteriæ vmbilicales etiam vltimis mensibus,

manet eadem materia, spiritus vitalis iam elaboratus, consequens est igitur eandem manere actionem.

*Respondet*, sanguinem maternum primis mensibus tanquam materiam ad compositionem corporis confluere, regi tamen à facultate formatrice fœtus, sed ubi corpus est absolutum, principes partes id præstant, quod natæ sunt agere, quia tum corpus est perfectius, & perfectiore sibi que consociali materia nutrizi & augeri debebat.

*Nymmani* altera ratio est: si Fœtus Cerebrum spiritus animales elaborat ad motum & sensum vniuersi corporis, quidni Cor spiritus præparat ad utilitatem totius conferendam? id autem efficere non potest sine motu, ergo Cor in Fœtu mouetur. Admittit *Vinclerus* Cerebrum spiritus animales præparare, & negat Cor spiritus vitales præparare, quia Iecur non elaborat sanguinem in Fœtu, at ille nescit venam vmbilicalem ad Iecur sanguinem maternum deferre, vbi vltiorem præparationem acquirit. Cur igitur affirmat sanguinem arteriosum matris per solam arteriam Coronariam Cordi subministrari, nec subire Cordis penetralia, cum vena caua præter anastomoses illas copiosum suppeditare queat, in Corde excavato, acritè & conuenienter efformato? Anastomoses illæ vsum habent insignem priusquam Cor excavatum fuerit, quem amittunt, cum sanguis eo modo traducitur, vt editis in lucem.

At inane est, quod obijcit *Vinclerus*: si Iecur sanguificat, ergo ventriculus chylicat, quia sanguificatio supponit chylicationem. *Respondet*, otiosum esse in Fœtu ventriculum, vt reliqua intestina, quæ carent petistaltico motu. Sic videmus quasdam partes & facultates otiosi ad tempus etiam in editis, vt cernere est in partibus genitalibus, quæ non nisi pubertatis tempore suas vires exerunt. Pergit *Nymmanus*: positis causis naturalibus in actû, impossibile est non sequi effectum: ac in Fœtu adest anima, Cor autem optimè conformatum, materia conueniens, nempe sanguis, quidni Cor edet actionem vitalem?

Dubitât *Vinclerus*, an Cor sit legitimè conformatum, ex actis primis mensibus ad istam actionem vitalem obeundam, quemadmodum ventriculus ad chylicandum. *Respondet*, ventriculum defectu alimenti non posse chylicare, quamvis pituita multâ sit refertus, sed Cor habet materiam ad opus suum, & ob id mouetur.

Instat *Vinclerus*. Nequit in Corde tenellulo tanta sanguinis copia recipi, quæ sufficiat ad spiritus vitalis procreationem. *Respondet* paucum sanguinem sufficere, qui in Corde spirituosus euadit, & prout Cor augetur diuersis temporibus, sic cauitatum amplitudo.

*Nymmani* ratio altera. Arteriz vmbilicales funiculo constrictæ, pulsant supra ligaturam versus Fœtum, immota & quiescente ea parte, quæ est infra ligaturam versus secundinâ: ex quo colligitur vim pulsificam arteriarum manare à Corde Fœtus. Respondet *Vinclerus*, arterias vmbilicales enatas à secundinis micare, antequam producat Cor, sicque vis pulsifica ipsis insita est. Negamus arterias ante Cor extructas esse, & micare: sunt enim illius propagines, quæ nullum habent vsum, nisi Corde prius delineato. Aderunt quidem tanquam canales sanguinem puriorem, ad corporaturam Cordis effingendam, tumque non micant arteriz, quia non deferunt sanguinem arteriosum purum, directè ab arteriis depromptum, aut si tenellulæ istæ radiculæ micant, Cur etiam salire facendum est, vt ex pulli generatione *Aristoteles* probat. Deinde non possunt arteriz vmbilicales Fœtus, vim illam pulsificam à matre obtinere, quia non sunt arteriarum maternarum continuationes.

Dubitât *Vinclerus* de isto experimento, quod sit per ligaturam arteriarum, & ecludit alio experimento de cane vociferante, & progrediente extracto Corde: sed hoc fit eodem instanti: experimentum ligatz arteriz in Fœtu ad horam durare potest. Itaque cum arteriz vmbilicales Fœtus sint diuersæ ab arteriis matris: Fœtus, & matris arteriz diuerso tempore mouebuntur. Ac prinde facultas vitalis Fœtus, distincta erit à facultate vitali matris, quod non credit *Vinclerus*, qui ridet comparationem pulli in ovo cum Fœtu in vtero, qua tamen vtrius *Hippocrates*, & post eum *Aristoteles*, vt demonstrat Fœtus humani generationem. Idem *Vinclerus* dubitat de illo experimento *Nymmani*, quod sæpius fieri, & *Bellinus* nunc adhibuit, vt vitam Fœtus dignosceret, & Cordis motum inuestigaret. Scio eam reprobari à *Vesalio*, cap. ult. *suæ Anatomiz*, vbi negat Fœtum ex vtero educitum intra secundinâ respicere,

rare. Concedimus quidem non respirare, sed affirmamus Cor moueri absque respiratione in Foetu.

Pergit *Vinclerus*. Vbi nulla est inspiratio ad mouendos pulmones, ibi nulla est Cordis dilataio. At Foetus non respicit, nec mouetur pulmones. Respondet *Nymmanus* Foetum in utero posse respirare, & infantes in utero plorasse, ergo respiciunt. *Vinclerus* istum vagitum & ploratum vterinum eludit, nec ordinarium esse scribit, & ex raro, & particulari exemplo, non potest vniuersale probari: quidni Foetus spirabit trans membranas attracto aëre ex aluo materna, qui per tubam vteri subire poterit vteri cavitatem? Quod si non mouetur pulmo, non est opus aëre ad spirituum vitalium generationem, nec ipse aër à pulmonibus attractus in adultis, ad Cor ipsum permeare potest.

Insistat *Vinclerus*: si Foetus spiritus vitales in proprio Corde elaboraret, frustra daretur arteriæ vmbilicales. Respondet *Nymmanus*: primis gestationis mensibus magnam esse utilitatem arteriarum vmbilicalium, sed conformato & absoluto Corde peruias adhuc manere, etsi sanguinem ad Cor non deferant, reuehant sanguinem Foetus ad placentam si regurgitet. *Vinclerus* addit arterias Foetus, sic coherere arteriis matris, ut videantur ex matre deriuari. Concedimus tantum primis conceptionis mensibus istam connexionem vasorum reperiri: sed vbi placenta formata est, seiuncta sunt vasa Foetus & matris, per interpositam placentam.

Urget *Vinclerus* duabus rationibus, quas putat validas: prima est. Ad Cor non deferitur materia ad publicam actionem edendam, quia arteriæ vmbilicales non inseruntur Cordi: sed arteriæ magnæ, manifesto argumento prius distribui sanguinem arteriosum in corpus, quam ad Cor foetus perueniat. Respondet materiam, putà sanguinem in Hepate elaboratum deferri in dextrum Cordis ventriculum, vbi Cor excauatum est & absolutum, & arterias vmbilicales ab ipso Corde iuxta Cor nasci in exordio primæ conformationis.

Altera ratio *Vincleri* est, si Cor in Foetu mouetur, pulmo etiam mouebitur, quia vnum alterius actioni inseruit. Et quia sanguis à Corde pulmoni non communicatur, credibile est etiam, vicissim cordi ex pulmone nihil communicari. Quod verò sanguis à Corde pulmoni non communicatur, probatur ex anastomosis vasorum Cordis in Foetu.

Respondet, Cor moueri sine pulmone in Foetu, sed pulmonem non posse moueri absque Corde, & Cor suppeditare pulmonibus sanguinem, sed à pulmonibus nihil recipere, quandiu in utero Foetus continetur, atque structuram vasorū Cordis fabricatam fuisse à natura ad conformationem Cordis & pulmonis, vt latius demonstrauit.

Tandem concludit *Vinclerus*, vitales actiones Foetum in utero non exercere, nisi quatenus spiritus vitales à matre acceptos, anima foetus vterius in Cor distribuit, & singulis partibus, quantum pro vita sufficit, dispensat, sed ipsos spiritus vitales Cor in embryone non elaborare, nec moueri, ac proinde non esse falsam communem opinionem Medicorum, quando Foetum vitæ matris quandiu in utero moratur viuere asseuerant: fatetur tamen propriè loquendo, propriam vitam habere, quatenus propria illi, quæ principium est vitæ, contigit anima, haud aliter ac furculus vinit per propriam animam, qui tamen vitæ stipitis, cui insertus est, viuere dicitur, quatenus nutrimentum ab illo mutuatur.

Nos verò sustinemus Foetum propriâ vitâ viuere, vitales actiones edere, ac proinde Cor moueri, & comparisonem illam de insertione fuculli in stipite, cum fiat in utero matris conclusio, non probè conuenire inter se, quia furculus sit pars stipitis, elque vnitur, at foetus omnino distinctus est à matre, & viuit separatus: deinde ad corroborandam nostram sententiam, quæ *Vinclerus* adduxit veterum testimonia faciliè refutantur.

*Aristoteles* nunquam foetus actiones retulit ad animam matris, contra sua principia, si anima est, id quo viuimus, & quo sentimus, & intelligimus, ex lib. 3. de Anima. *Galenus* non putat animam Foetus otiosam esse, nam in ipso operatur, à nullo edocta, & per se ipsam. *D. Thomas* refutauit eos, qui operationes foetus animæ maternæ adscribunt, libello de motu Cordis. *Fernelius* lib. 7. *Physiol.* c. 1. Cordi motum tribuit in Foetu. Itaque his rationibus & autoritatibus fultus, Cor moueri in Foetu auidè sustineo, & propria facultate vitali viuere, quamuis à matre alimentum deprimat, & cum ea magnum habeat commercium, quasi ab ipsa dependens, quoad nutritionem, vt plan-

ta ex tellure vivit, sed per propriam animam, si quoque intelligendus Hippocrates, lib. de natura pueri, quæ ex terra nascuntur, ea omnia ex terra humore vivere ostendit, & quemadmodum terra humorem se habet, ita se habere, quæ ex ipsa vitalis: sic puer in utero ex matris vivit, & ut vult mater, ita & puer. Qui rectus diligenter notandus & examinandus in morbis gravidarum mulierum.

Supereft ad elucidandum hoc caput adiungere memorabilem & admirandam questionem, quæ nobis propofita fuit Benvenis, anno 1633. & nostrorum iudicium exoptatum. Sic autem meam sententiam declaravi, super ista narratione:

Supponitur mulier gravida feptimeftris, quæ convulsiva epileptica die Loui circa nonam vespertinam suffocata fuit. Die Veneris spuma ex ore matris prodit, & vocandus mater moribundus, quasi vagientis infantis in utero matris, tumque venter ab aspidendibus obformatus nulli ac depremi. Die Sabbathi circa decimam matutinam profusum sanguinis coegit afflante demum corpore, & intra femora matris prolatus infans deprehenfus adhuc calidus, tandem ante quasie, quæ nobis excutienda & indicanda proponitur.

## AN FOETVS EXINCTÆ MATRIS AMDIV

superstes fuerit, ut post triginta sex horas ab interitu matris, vivum suæ impetu ab ergastulo suo erumpere potuerit?

**I**D E ista questione ita censemus & decernimus: Foetus extincæ matri aliquamdiu superstes esse potest, quia mater Foetui dumtaxat sedem, fontem, & pabulum suppeditat. Foetus ut peculiarem habet animum, sic propriam vitam fruitur: Ideoque post obitum matris, vel potest vivum ex utero matris erumpere, vel per sectionem Cæsarem vivus extrahi. Sed spatium illud moræ & mansionis in utero triginta sex horarum ab interitu matris, quibusdam suspensum esse potest. Nam si die Loui mater extincta fuit, omnes corporis partes exanimatae, ac proinde omni sensu, motuque privatae fuere, quomodo orificium internum vteri referari ac dilatari potuit ad exclusionem Foetus, quomodo sœterni placenta à corpore vteri, cum sanguis dumtaxat ex illa diuisione profusus?

Itaque in ipsis convulsionibus in corpore parturiente mater, tumque relesatum ac dilatatum fuit orificium internum vteri, sed in ipso conatu pariendi extinctam fuisse matrem, & post aliquot horas foetum suæ impetu ruptis membranis, quibus conclusus erat vivum adhuc erupisse censemus. Sanguinis verò istud profusum, quod die Sabbatho observatum fuit, ab utero matris mortuæ sanguinis pleno mansisse, ut in quibusdam cadaueribus tertio vel quarto die ab interitu, sanguis ex ore, vel naribus magnâ copia profuxisse visus est.

Quod si relationi certa fides adhibenda sit, & iuxta narrationem pronuntiandum.

Verisimile est mulierem post illas convulsiones epilepticas & hystericas, spiratione, sensu, motuque orbatam, habitam ac derelictam fuisse pro mortua, ut in mulieribus hysterics & epilepticis sæpissimè accidit, quæ ad funus elatæ requirere. In istis convulsionibus orificium internum vteri sufficienter ad partum dilatari potuit, & foetus imbecillus subsistere & morari in utero per 24. horas & ultra, ad recuperandas vires in istis convulsionibus matris prostratas. Attamè vixisse sub finem diei Veneris, & matrem, & Foetum, mulieris corpus adhuc calens, vagitus vterinus & abdominis subsultus, ac elevatio manifestè indicant & attestantur: sed vagitus infantis morientis matris index fuit, & propriam calamitatis intermonitus, atque tum mater obiit cum spuma ex ore prodit. Ac proinde potuit Foetus septimeftris die Sabbathi suæ impetu, ruptis membranis tenerrimis, & iam extensis, vivus ab utero emergere, prius tamen mortuæ & extinctæ matre. Mirabilis naturæ potentia egie nos, nihil non de ipsa credere. In rerum natura, inquit Averboes, monstra & miracula sunt. Consultum Benvenis die 1. Julij, anno Domini 1633. & subfignarunt Medici Parisienses, Andreas du Chemin, Primarius Regina Matris Medicus, Nicolaus Pietre, Doctor Medicus Parisiensis, Joannes Riolanus, Doctor Medicus Parisiensis, & Medicina Professor Regius, Abel Branneus, Primarius Regis Medicus.



## OBJECTIONES QUÆ MOVERI POSSUNT,

*si quæstio aliter explicetur.*

STA quæstio quæ dubia & valdè controuersa est, necdum certò iudicata ac definita, non potest aliter probari, nec sustineri, præsertim cum agatur de Fœtu septimestri, quem volunt ab interitu matris, triginta sex horarum spatio in vtero mansisse, & viuum in lucem produisse. Nam si in pari casu dubitant authores de Vitalitate nouimestris Fœtus, multò magis de vita septimestris Fœtus dubitandum, quia longè debilius est. Deinde vagitus infantis in vtero conclusi in Fœtu nouimestri, negatur à quibusdam etiam in viuente muliere, multò minùs in septimestri Fœtu, & matre mortua admitendus. Quæ de re *Libanius in Singularibus*, & *Merculius in Decade quæstionum medicarum*.

Præterea, si mater conuulsionibus epilepticis die Iouis circa nonam vespertinam extincta fuit, ubi euolauit anima, simul etiam calor natiuus euauit: ac proinde in horas refrigeraro corpore, mater non potuit spatio triginta sex horarum, sedem, fœtum, & alimentum Fœtui suppeditare, quibus destitutus, non potuit viuere tanto temporis intervallo.

Nam extincto calore natiuo Vterus emortuus ac refrigeratus, non fuit amplius hospitium Fœtui, sed potiùs sepulchrum, neque Fœtum fuit, sed potiùs suffocauit, aquis tum frigidis immersum, quate defectu transpirationis à matre manans per vmbilicum, ore forbere coactus fuit, atque inopia alimenti ipsum Fœtum petire necessum fuit. Fateor equidem Fœtum propriam vitam habere, sed ea conseruatur à matre, dum sedem, fœtum, & alimentum assiduè suppeditat.

Adde quod si mater die Iouis circa nonam vespertinam extincta fuit, post triginta sex horas ab interitu, non potuerit partes genitales iam refrigeratæ, collum & orificium internū vteri, ossium pubis connexio, & ossis sacri cum Ilibus symphyis dilatari sufficienter ad exclusionem Fœtus, cum sint effectus caloris natiui in partibus viuentibus, non externi & alieni opus: & quamuis à calore Fœtus morantis & viuents adhuc in vtero calerent partes genitales, quia exanimis & emortuæ, omni sensu motuque priuantur. Ac proinde non possunt dilatari ad partum, nisi priùs viuente matre talis apertio facta fuerit, quæ in eodem statu per aliquod tempus ipsius Fœtus calore fouetur & conseruatur. Neque Fœtus opis marernæ indigus, hoc opus solus præstare potest, quantumuis calcitrando effringat membranas, quibus cinctus & obvolutus est. Dilatio partium genitalium opus est naturæ, non Fœtus.

Præterea, cum sanguis profluat ex placentræ diuisione à parietibus vteri, isthæc separatio fieri non potest, nisi in viuente vtero, qui placentam tanquam sarcinam inutilem secernit, & excutit. Nec sanguis profluere potest ab his locis, nisi calidus fuerit.

Deinde, si die Sabbathi circa decimam matutinam, immodicum sanguinis profluuium, quod currebat supra pauimentum, index fuit Fœtus ab vtero exeuntis, qui lustrarunt corpus, referunt quidem de mollitie & caliditate infans, Scrori corrugatione, nec quiddam narrat de vmbilici continuitate, aut ruptura, de placentræ exclusione, aut retentione, ac suppressione intra vterum, de partibus genitalibus adhuc hiantibus & cruentis.

Si ad exprimendum vultum mortuæ mulieris, sculpror vel pictor accersitus fuit, dabebant etiam obstetricem, aut Chirurgum, vel Medicum aduocare, qui totum illud negotium rarum & insolens exploraret, & examinaret, atque de illo exactè referret, & attestaretur.

Denique spatium illud diuturnioris moræ & cunctationis in vtero per triginta sex horas est impossibile: Nam Fœtus subsidio materno destitutus, vix per duodecim horas propriâ vitâ viuere potest, quandiu incarcerationis vteri ergastulo detinetur. Ideoque extincta matre, nisi confestim exeat, aut per sectionem Cæsaream eximatur, diu superflus esse nequit, atque ex viginti prægnantibus in enixu morientibus,



vix vnus aut alter Fœtus secto matris vtero extrahitur viuens, multò minùs viuus & incolomis seruatur in vtero.

Atqui authores, qui epilepticas & hystericas mulieres spiratione, sensu motuque orbatas reuixisse dicunt, tam longum temporis interuallum nunquam definire. Verisimile est vltra duodecim horas in tali casu mulierem non posse vitam producere. De infantibus posthumis ab vtero matris mortuæ prodeuntribus, qui exempla dedere, vt *Dionedes Cornarius, in historia medica mirabili: Schenckius, in Observationibus, & Marcellus Donatus, in historia Medica*, tam longum temporis interuallum ab interitu matris non describere: Soli Deo competit trium dierum sepultura, & resurrectio, & de *Lazaro resuscitato*. Itaque aut ficta est hæc historia, alieno Fœtu supposito intra femora matris mortuæ, aut non potest aliter explicari, quàm à nobis fuit pronuntiatum ac determinatum.

## DE FACULTATIBVS ANIMALIBVS.

### CAPVT IX.



ERTVM est Fœtum humanum perfectum & absolutum esse animal, à matre distinctum, quod non est pars vteri, neque matris, vt integro libello, siue *Galenus*, siue *alius author*, doctè & cumulatè probauit, nec ipse *Galenus sub finem lib. Definitionum Medicarum* ab ea opinione recessit, illudque animal, nempe Fœtum, instar alterius animalis viuere prodidit. Quod si Fœtus agit vitam sensitiuam, quis dubitat eum esse præditum Animalis Facultatè?

Est autem Animalis faculras, actio Cerebri ad voluntarias functiones edendas. Quæ duplex statuitur, Princeps & Ministra: Princeps in tres diuiditur, Imaginantem, Ratiocinantem, & Recordantem: Ministra quoque duplex, Mouens & Sentiens. Animales Facultates Principes in Fœtu otiantur, ex *Galeno, lib. de Formatione Fetus, cap. 3.* cum nulla imaginationis, nulla cogitationis & memoriæ sit necessitas. Itaque puelli, vt robore corporis, sic anima imperfecti nascuntur, quia facultates animæ non antè suo funguntur officio, quàm instrumenta perfecta fuerint. Solæ ministræ facultates agunt, nimirum sentiens & mouens. Mouetur enim Fœtus in hanc vel illam partem, vigilat quoque & dormit, quinetiam matris doloribus comparitur, & frigus ventri materno assusâ aquâ frigida persensit, sic enim vitam infantis explorat *Cardanus*.

Ad sensum pertinent Somnus & Vigilia, versantur enim *ubi dicitur in capite dicitur*. Num autem Fœtus dormiat & vigilet, controuertitur. Non putat *Auicenna* Fœtum istas functiones adhuc exercere: Matres ramen referunt le manifestè percipere vigilantis Fœtus motum, eiusque sopiti & dormitantis quietem.

Præterea queritur, an vigilia priùs insit Embryoni quàm somnus. Respondet *Mantius*, Embryonem animal non esse, antequam sentiat: Atqui somnus sensuum quies dicitur, ergo vigilia præcedit somnum.

Sed *Aristoteles, libro quinto de generatione animalium, cap. 10.* somnum priùs inesse statuit his rationibus, quod Fœtus progrediente ætate magis expergisci videntur, tum etiam quod transitu à non esse, ad esse, per medium fieri solet, somnus autem talis suâ naturâ esse videtur, vt viuendi & non viuendi interliminium sit, & neque omnino sit, qui dormit, neque non sit, &c. Ex pulli generatione id etiam probari potest. Idem scribit *lib. 6. de hist. animal.* ante vigesimum dormire pullum: quod si moueatur expetendus, & respicit, & mouetur, & vocem edit, & tum eius Cor, quasi spirantis simul cum vmbilico restat. Inde colligitur *Philosophum* attribuerè pullo somnum naturaliter, vigiliam per accidens, vt & morum & vocem. *Scaliger in Comment.* notat pullum non semper dormire, sed & moueri suo certo motu, cerro tempore, sicut & Fœtum animal.

Motionis tempus *Hippocrates* in maribus constituit tertium mensem, in feminis quartum. At *Fernelius*, motionis tempora incerta esse pronuntiat, quia siue mas, siue

femina geratur, aliz prægnantes semper die quadragesimo, aliz mense tertio, aliz nonnisi gestationis cursu Fœtum luo dimoueri sentiunt. Eadem quoque prægnans aliàs secundo & quadragesimo die, alias quarto mense cum dimidio primos motuum insultus obseruat, cùm quasi volitantis mulsæ excussionem, vel titillationem percipit: Tanti causa discriminis non sexui, sed robori, bonæque constitutioni Fœtus, vel prægnantis naturæ tribuenda est.

## DE SITV PVERI IN VTERO.

## CAPVT X.

**S**CRIBIT *Aristoteles*, libro septimo de historia animalium, cap. 3. situm omnium quadrupedum in utero extensum esse, bipedum ut auium inflexum piscium obliquum, solius hominis situm contractum esse & conglobatum, tum propter loci rotunditatem, tum ut minimum spatium Fœtus occuparet, nec tam altè ascenderet, atque ut in partu facilius deorsum inclinaret.

Sed in eo situ, quomodo Fœtus in utero partes compositas habeat, inter Medicos controuertitur. *Hippocrates* libro de natura pueri scribit puerum in utero collocari, ut manus habeat ad genas. Alij scribunt ad genua, ut *Calanus*, *Gorriæus*, & *Mercuriales*. Ideoque legunt, *ut si manus in non possunt esse, ut manus in non possunt*, pro *si manus*, Caput pedibus propinquum, quod tamen difficile est iudicare, etiam si puerum in utero videas, utrum caput sursum an deorsum vergat. Attamen lib. de Ollimestri partu asseruerat Fœtum in utero caput habere sursum, & capite in lucem prodire. *Aristoteles* lib. 7. de historia animalium, cap. 8. notat caput primo gestationis tempore superius esse, postremis mensibus deorsum inclinare: quod confirmavit cap. 9. lib. 4. de generatione animalium. Eleganter *Aristoteles* ibidem situm Fœtus sic describit. Homo in semet conglobatus, sic gestatur, ut nasum intet genua, oculos super genua, aures extra genua habeat. Quod confirmat scripturam *Hippocratis* de genibus, loco genarum, Nam si oculi genibus incumbunt, non potest Fœtus habere manus ad genas, sed genua manibus amplexabitur, & eo sensu utraque scriptura *Hippocratis* & *Aristotelis* conciliabitur.

*Galenus* iacentis Fœtus in utero situm, ita describit: Caput in elatiore uteri parte continetur, brachiis ac tibiiis contractis, genua cubitis sunt proxima, manus manui superposita, tibiaque alteri subiicitur, pedesque introrsum ita sunt flexi, ut plantis clunes attingant, quod fit, ut recens nati tibiae introrsum flexas, pedesque maxime ad interiora curuatos habeant, quod deligatione propter partium molliem facile colligitur. Hanc opinionem *Galenus* videtur approbare *Arantius*.

*Fernelius* aliter Fœtus situm in utero describit. Infans utero gestatus incuruus totus ac contractus talos ad nates adaptat, manibus genua apprehendit, inque caput sic demittit, ut oculi manus pollicibus veluti affixi hæreant. Nasus verò inter genua procumbit. Vnde fit oculi genibus affectis condoleant, propter veterem illam locietatem, ut ait auctor lib. de ordine partium, qui *Galenus* adscribitur, itaut viri fortes & generosi dolentibus genibus lacrymari cogantur.

Sed Fœtus non est ita conglobatus, & in orbem conuolutus, ut genibus faciem, Talis verò nates attingat: quoniam hæc figura cùm sit extrema omnium, est laboriosissima. Videtur eam artuum figuram seruare, quæ inter extremam flexionem & extensionem media sit, minimè laboriosa.

*Vesalius* in picturis pag. 386. situm Fœtus in utero depingit, & exponit in picturæ interpretatione his verbis. Fœtus spectatur ea propemodum figura, quæ primum in utero recumbit, & qua omnibus partibus pulchre videtur mediâ, lassitudinique minus obnoxia, at factum toto corpore panium incuruatum cubitos implexos habentem, itaut manus sinistra dextram genam tangat, dextra verò manu sinistram genam comprehendat. Pedes etiam implexos habet paulum incuruatis genibus. *Gorriæus* eodem in lib. de nat. pueri, tacite perstringit *Vesalium*, quod contra *Hipp.* atque *Auicennæ* sententiam, Fœtum iacere in utero per mediam figuram solam doloris expertem scripserit. Prius erat pendendum, in-

quis, sitne is quem statuit *Hippocrates*, situs extremus, an medius, aut non longè distans à medio. Deinde an sit Foetus laboriosus, & molestus: postremò vtrum magis expedit hoc modo, quem describit *Hippocrates*, vel quæmple depingit collocatum esse.

Equidem medium esse existimo, cuius cùm multæ sint inter duos extremos situs differentiæ, si non exactè medius est, inter summam extensionem, summumque flexum: Attamen ita medius est, ut Foetus dolorem non pariat, qui tamen fortè in iuvene, vel etiam in puero, dolore non vacaret: est enim Foetus qui vtero geritur admodum mollis & tenellus, atque in omnem partem ductilis, flexibilisque, eamque ob causam, ut detur etiam posituram hanc non esse exquisitè medium, Naturæ libuit hoc modo vtrumque collocare, quod præter eos indolentiam, mater quoque hoc modo faciliùs multo ferat, nec tot incommodis premitur à longiore & assurgente Foetu.

Præterea ex illo situ, quem *Hippocrates* Foetui assignat, accedit etiam utilitas, a chore *Anicenna*, quod sic faciliùs instante partu Foetus inuertatur, & in caput ferri possit.

*Fabricius ab Aquapendente, lib. de Fetu humano*, paucis describit Foetus humani situm in vtero. Videre est, inquit, Foetum hominum conglobatum & inflexum, itaut ambo crura sint inflexa atque contracta, ut propter huiusmodi situm, nunquam necessarium, potissimum pedes ab obstetrice conformari, alioquin retortis ad interiora pedibus deambularent, sed cùm in picturis tres differentes Foetus positiones in vtero delineauerit, non exponit, quænam sit naturalis, & aliter artus compositos depingit, quàm descripsit.

*Platerus* Foetum in vtero sic compositum describit: brachia pectori admoventur, & manus dextra sub dextra aure, cervici expansa, sinistra verò sopra sinistram mammam & faciem semixtensa est, pedes sursum attracti, ventri applicantur, ut pes dexter calce nates, latiore verò parte reflexa pudenda occultet, sinister verò pes hominum dextrum tangat, sed hic membrorum situs, non potest non esse laboriosus, imò est impossibilis. Sed publicè demonstraui in cadauere mulieris prægnantis, Foetum sic habere membra composita, ut pedum calcanea nates attingant, manus complicatæ sint, cubiti femoribus innixi, manibus verò supra genas positæ caput sustineant. Nec iniucunda & inutilis ista Meditatio, cur nascentes homines manus complicatas habeant, velut omnia lucraturi, quas laxamus morientes, quasi omnia reliçuri.

*Columbus* tres tantum infantis positiones obseruauit, quarum prior frequentissima est, capite deorsum verso & inclinato. Secunda rarior capite sursum elato. Tertia rarissimè cernitur, cùm Foetus transuersus iacet: in priore sito infantes capite præcedente in lucem prodeunt, in secundo pedibus, & *Agrippa* nominantur, in tertio natibus, atque omnes faciem coccygem versus habent, Ideo falsum conuincitur, quod de diuerso marium & feminarum situ narrat *Fernelius*, dum ex eunt, ut ab obstetricibus didici. Prior, inquit, abdominis pars in matris abdomen, posterior in dorsum vergit, si mas oritur. Nam feminæ aduerso situ collocantur, anteriore parte matris dorsum respiciunt, posteriore abdomen, proinde cadauera feminarum prona in aquis, masculorum supina fluitant. Notat *Carolus Stephanus* Gemellos contrarium situm obtinere, Vnum in posticam vteri partem conuersum esse: Alterum anteriorem vteri partem spectare. *Varolius* contra omnium *Anatomicorum* opinionem asserit, puerum non iacere supinum, sed lateri sinistro inniti, itaut dorsum Foetus, dextrum matris hypochondrium, abdomen sinistrum hypochondrium respiciat.

Cur in situ Foetus describendo sint adeo discrepantes Medici causa est, quod in prægnantibus mortuis ex violentia morbi, & parere enitensibus, diuersos situs infantum obseruarint, quo tempore agitato infans potest sua sede dimoueri, & membrorum, siue artuum situm naturalem immutare.

## DE PARTU.

## CAPUT XI.



**E**OSTVS circa nonum mensem iam factus grandior, copiosiore egens alimento & spiritu, diutius se coucludi non patitur: proinde primum sese conuoluit, caputque declinans pudendo offert, crura ac reliquos artus in sublime distendens. Id autem nonnunquam molitur vno mense ante partum, at sic se inuertens nihil effringit, quod laxior sit vmbilicus duos plerumque cubitos longus.

Instante partu ad eam actionem multa concurrunt. Imprimis æqualis Fœtus & Fœtæ contentio: Fœtus enim actionem istam inchoat, disruptis membranis crebra manuum & pedum agitatione. Vterus partim humoris effusi acrimoniâ stimulatus, partim puelli pondere grauatus, sua vi expultrice sarcinam istam excutere conatur, suamque orificium, quod per nouem menses exquisitè connixerat, ita recludit, vt per id Fœtus elabatur.

Quomodo id fiat, ignorat *Galenus*, & admiratur. *Recentiores* autoritate *Hippocratis* & *Auicennæ* ossium pubis diductionem agnoscunt, quam alij reiiciunt, nec fieri posse contendunt. Mater verò huic operi non medioeriter opitulatur, cohibito spiritu per glottidis & arytæuoidis adstrictionem fortem, contractis intensisque Epigastrij Musculis, & Diaphragmate.

Secunda naturalis partus conditio est, vt Fœtus in caput exeat, cuius figuræ hanc affert rationem *Hippocrates*, quia superiores puelli partes grauiores sunt, ex vmbilico appensæ tanquam ex latere: quod similiter expressit *Aristoteles*, cap. 4. lib. 4. de generat. animal. Adde quod caput primò exiens reliquis partibus viam parat, reliquum enim corpus faciliè sequitur, quâ caput egressum est. Sic igitur Fœtus liberè sine vilo partium impedimento profilit, facie vt plurimum ad podicem matris conuersa, ne ab ossibus pubis nasus comprimeretur. In exitu propter loci angustiam, secundas exiit & inuertit, quæ & mox Fœtum sequentes, vmbilicum foris habere cernuntur, ex inuersione membranarum.

Tertia conditio est, vt legitimo tempore prodeat, septimo vel nono mense, nisi enim septimum mensem expectauerit, rarè vitalis esse potest, uondum post conformationem sufficienter auctis & roboratis partibus. Si igitur istum terminum præuertat, Abortus, vel Effluxus nominatur: Abortus, si Fœtus dearticulatus appareat, Effluxus, si semen liquidum, vel coagulatum intra septimum diem excernatur, inquit *Aristoteles*, libro septimo de historia animalium, quo tempore ad prolem numerosam vitandam, conceptum semen eicere permittit, quod *Hippocrates* Plaltræ cuiusdam meretrici consuluerat: hoc tamen facilius Christiana religio prohibet, & graui supplicio expiat, quia iudice *Tertulliano*, libro de anima, capite 9. procurare ne Fœtus nascatur, non solum habetur pro homicidio, verumetiam pro homicidij properatione.

Frequentissimum & ordinarium pariendo tempus est nonus mensis, si tamen in decimum aut vndecimum protrahatur, nihilominus legitimus erit partus, quia *Hippocrates* statuit decimum mensem, vel principium vndecimi, terminum gestationis longissimum. At videmus aliquando naturales partus in duodecim, tredcem, quatuordecim, quindecim menses vsque ad biennium incidere, vt innumeris historiis demonstrat *Schenchius* in *Observat. Medicinalibus*, quod est rarum, admirabile, & valde suspectum.

Fœtus ex vtero in lucem proiectus vitam ab eiulatu auspicatur, cùm propter ambientis aëris contrarietatem, tum vt vagitu suo testetur miserum vitam genus quod ingreditur. Fabulosum puto, quod refert *Plutarchus*, eos non vociferari, quos mater in nau perierit. Neque ereo Fœtum carere vnguiculis, si mater falsioribus cibis vsa fuerit: si talis in lucem prodeat, vitalis esse non potest, auctore *Hippocrate*, lib. de superstitione. Quidam malè ominantur matri & puello, si ipse, vbi in lucem prodierit, rideat. Nam herculè risus præcox ille celerissimus, nulli ante quadragesi-

rum diem datur. Legimus tamen *Zerastrum*, eodem die quo natus est risisse, præ-  
sagio futuræ scientiæ.

Curis in puello vsque ad quadragesimum diem rubicunda est, quippe albescit,  
partim æris inspirati, partim ambientis beneficio. Oculi omnium puerorum statim  
à partu cæsiu seculi sunt, postea mutantur in eam naturam quæ futura est, quod in cæ-  
teris animantibus non euenit, inquit *Aristoteles*, *cap. i. lib. 5. de generatione anima-  
lium*. Cùm nascitur infans, si vena quæ in cubito est, pulsauerit, furiosus ille & ira-  
eundus euadet, si sensim mota fuerit, lentus. *Hippocrates lib. 2. Epid.*

## VTRVM IN PARTV OSSA PVBIS distrahantur.

### CAPVT XII.



**Q**UÆSTIO est inter *Anatomicos* valde controuerfa, dum rationibus  
certatur neglectâ experientiâ, quæ sola hanc litem potest dirimere. Ad  
eam igitur ianquam ad veritatis tribunal prouoco. Sed prius rationes  
quibus istorum Ossium diuulsio eluditur proponam, hisque paucis sa-  
tisfaciam.

Si Ossa pubis in partu laxarentur, frustra natura hæc à virilibus in peluis capaci-  
tate, atque exitus spatio differre voluisset: sunt enim ossa illium in mulieribus am-  
pliora, eorumque costa longius ad latera exporrigitur. Pubis ossa breuiore linea in-  
ter se committuntur, & infernæ partes sub ipso connexu magis à se inuicem distant,  
quod spatium à *Cordao* Crena vocatum, eo sine conditum est, vt partus tempore vi-  
rethra eò se reciperet, ne ab exeunte puello lzderetur. Mulieribus Ischij spina an-  
teriorum reflexa, peluis exitum ampliorem, quàm in viris efformat, & ne Capitis  
magnitudo partum remoraretur, Natura quibuscumque futuris frontem & occiput do-  
nauit, quarum beneficio in Vteri limine caput angustatum facilius erumpit.

Præterea, non est verisimile ossium compagem firmam & strictam laxari, quæ  
scalpello acutissimo vix potest separari.

Quod si Ossa pubis in partu abscederent, id tactu facile esset explorare. & ab  
ea relaxatione mulieres claudæ impotentes redderentur. Scribit *Hippocrates libro  
tertio de fracturis*, Ossa quæ bina inter se coniunguntur, vbi dehiscunt, non faci-  
le in pristinum locum redeunt, sed necesse est ossibus sic diductis partem reddi  
tumidiorem.

Accedit *grauissimorum Medicorum* autoritas, qui Ossium pubis diuulsionem elu-  
dunt. *Columbus* illorum sententiam, qui Ossa pubis diduci credunt, risu potiùs  
quàm reprehensione dignam iudicat. *Volcherus in Obstetologia infantium*, non putat Os-  
sa pubis in partu disungi, in eadem est sententia *Fuchsius*, huic etiam opinioni sub-  
scribit *Carolus Stephanus*, id quoque confirmat *Ingraffias*, apertè negans Ossium pub-  
is diuulsionem in parturientibus. *Cordæus Medicus Parisiensis* suum calculum his  
etiam adiunxit.

His & similibus rationibus & autoritatibus oppugnatur Ossium pubis relaxa-  
tio. Quibus ita breuiter respondeo.

In Ossium pubis & illium conformatione, Naturæ erga mulieres singulare bene-  
ficium elucet, quæ omni arte parturientium doloribus prouidit. Ossium pubis sym-  
physim ad partus facilitatem laxari voluit, plures futuras in Fœtu non eo sine con-  
struxit, vt caput in partu contractius euaderet: sed magna ossa Capitis ex variis par-  
tibus composuit, quia integra & continua efficere non potuerat.

Fateor quidem in viris cartilagineam copulam Ossium pubis duram esse, quæ ta-  
men si culter per copulam exactè ducatur, nullo negotio separatur. At in mulieribus  
mollior est, & in grauidis paulò ante partum vinctuoso humore imbuta, crassior ap-  
paret.

Tactus & visus manifestè percipiunt. Ossium pubis diuulsionem. Nam si puer-  
peræ mulieris recenter enixæ alterum crus attollas, spinam Ossis pubis alteri emi-  
nere conspicias.

Quod obicitur de claudicatione falsum est, & locus ille *Hippocratis*, de cubiti & radij diuisionem intelligendus, quæ quidem ossa ab inuicem distracta difficillimè reuniuntur & coaptantur.

Superest auctoritate & experientia rei veritatem confirmare, vt auctoritatem auctoritati opponam. Imprimis producam in medium *Hippocratem*, lib. de *Natura pueri*. miratur quæ in eo videntur, iuncturæ de his inquit in & lib. 2. de *Natura pueri*. toto corpore laborant vehementissimè, sed præcipuè lumbos, siue os sacrum, coxasque dolor occupat, si quidem coxæ illis diducuntur, id est, Ossa pubis. Adiungo *Anticennam* opinionem omnibus notam, lib. 3. *Fen 21. tract. 1. cap. 2.* & quando aperitur matrix apertione tali, cuius similem efficere non valet in suo simili, necessarium est, vt separentur quædam iuncturæ, & sustententur adiutorio Dei excelsi, possillud redcunt in proximo ad continuationem naturalem, & est operatio illa de operationibus fortibus naturalibus.

Auctoritas alios in auxilium aduocat. *Atetium qui tetrab.* 4. serm. 4. cap. 22. scribit ossa pubis nimum conferta pariendi difficultatem facere, dum in partu dilatati non possunt, neque enim velut in viris, ita in mulieribus Ossa pubis conferantur. *Jacobus Carpus, Comment. in Mundinum* pluribus probat ossa Ancharum in pectine, & circa os sacrum aperiri, seu separari ab inuicem in partu naturaliter, cum alio tempore sint firmissimè iuncta. Idem statuit *Alexander Benedictus*, lib. 5. *sua Anatomes cap. 3.* quo tempore Fœtus amplior est, sponte hiant, & ad Fœturam consentiunt, Pecten, addit & os sacrum. Ea tum à partu paulatim in naturam suam redeunt: altero ex his vel pluribus renitentibus partus difficiles fieri, etsi cætera tutè respondeant. Subiungit *Aristoteles* testimonium. Cum mulieres, inquit, lib. 7. de *historia animalium*, parturiunt, dolores multas quidem in partes incumbunt, & plurimis ad alterutrum femur, aliz lumbos dolent, aliz imum ventrem. *Sylvius in Isagoge Anatomica* scribit in recens Fœtis aut parturientibus, cartilaginem Ossa pubis connectentem molliorem esse & laxiorem, vt vi parua secando facillè separetur.

*Fernelius lib. 6. Pathol.* inter causas difficilis partus recenset Ossium pubis firmiterem compactionem, quamuis lib. 7. *Physiologia cap. 10.* neget contra *Anticennam*, in partu Ossa pubis diduci. Sed in suis opinionibus sæpius inconstans fuit *Fernelius*, & interdum eorum quæ demonstrauit, obliuiscitur, vt cum agit de mola, lib. 7. *Phys.* siue maris congressu generari asserit: at lib. 6. de *partium morbis*, sibi contradicit, atque nullam vnquam visam fuisse mulierem sine maris molam concepisse asseuerat. *Galenus quidem lib. 14. de vfu partium*, admiratur infantis exitum, quod nulla vulnerrata particula, neque membro exarticulato prodeat, sed non improbat Ossium pubis relaxationem. *Gorrhaeus comment. ad hunc locum Hippocratis*, lib. de *natura pueri*. Mulieres in partu toto corpore laborant vehementissimè, & maximè lumbos coxasque dolor occupat, siquidem coxæ illis diducuntur. Notat quidè laxari iuncturas, non exarticulari. Solui tamen iure dici possunt, quod summa illa dissentio, species quædam solutæ continuitatis esse videatur. Admittit quidem *Spigelius*, in difficili partu diduci, & hiare Ossa pubis, laxato ligamento interiecto, quinetiam laxari ligamenta quæ nectunt Ossa Ilium cum Osse sacro, cum in mulieribus istæ connexiones sint laxiores, & nervosiores quàm in viris. Fatetur *Pannius*, in difficili partu & violento dehiscere hæc ossa, sed nugatur, dum scribit obstetricibus nonnullis in more, puellis primùm natis, pollice hunc locum premere, sicque harmoniam hanc dissoluere. Tales mobile semper gerunt hoc os.

Sed quid opus testibus in re tam manifesta? sola experientia fidem faciet, cui Medicus plus debet tribuere quàm rationibus. Sæpius atque plursquam trigiesies in mulieribus mox à partu extinctis, vel paulò ante enixum, vel præsentibus Medicis & Chirurgis, cartilaginem quæ Ossa pubis colligat, minimi digiti latitudine diductam, itaut hiuala pubis Ossa apparerent, si digito intus attrectarentur. Quod etiam ante dissectionem cadaueris innotescebat, vno crure sublato, sic enim ossa pubis mobilia deprehendes, vnumque alteri supereminere. Atque anno 1631. mense Ianuario, cum publicam Anatomen administrarem mulieris, quarto die à partu suspensio strangulatæ, præsentibus & spectantibus trecentis auditoribus, in scholis Medicis demonstrauit, commissuræ Ossium pubis interiectam cartilaginem digiti latitudine laxatam, quinetiam Ossis Sacri cum Ossibus Ilium commissuras mobiles admodum scalpello tenuissimo facillè separauit. Ossibus Ilium & Ossis Sacri loco cartilaginis,

interiecta erant ligamenta crassa rubicunda, quæ cauiculis vtriusque Ossis inculcata erant, ossibus pubis cartilago crassa interposita erat.

*Parus senex, suis libris postremo editis*, ingenue fatetur se istam Ossium pubis diuulsionem in multis parturientibusprehendisse, quam adstruit, & verissimam esse contendit, licet iunior aliter scripserit. Verum peruiacæ & incredulos lubenter ad greges ouium ablegarem. Nam in ouibus prope parituris Ossium pubis symphyse laxam ex emollita & distenta cartilagine obseruauit, vt sæpius publice demonstrauit: Si hoc in brutis reperitur, quidni in muliere?

Non possum probare eorum opinionem, qui negant Ossa pubis in partu distrahi, cum tamen admittant Ossium Ilium ab Osse Sacro diuulsionem, quæ difficilior est: etiam si *Vesalius* id scripserit, & ante illum *Gentilis super Anicennam*, & *Gabriel de Zerbis in sua Anatome*, qui omnes Ossium diuulsionem in partu de Ossibus Ilium & Osse Sacro intelligunt.

Sed lubrica & admodum periculosa est posticorum Ossium distractio, quia totus corporis truncus huic articulationi innititur, quam natura validissimis vinculis constrinxit, quæ à tubere Ischij in extremum Ossis sacri pertingunt. Quapropter admittendum potius Ossa pubis à se inuicem disungi, siue abscedere relaxata cartilagine intermedia, quàm Ossa Ilium ab Osse sacro diduci.

Poterit hæc controuersia etiam ipso sensu componi. Accipe perfectæ mulieris Ossa Ilium antè inter se per symphyse, & retrò Ossi Sacro iuncta. Si per hoc foramen amplissimum Caput Infantis recens nati liberè traducatur, fatebor Ossa pubis non diduci: alioquin sustinebo, non sine maxima Ossium pubis dilatatione Fœtum egredi, quia spatium illud angustius reddit caro intus circumiecta.

In cartilagine crassa Ossibus pubis interiecta foramen apparet, quod notabis antequam Ossa separentur: per istud foramen vena penetrat rigatura istam cartilaginem.

## COMPARATIO PERFECTI FOETVS humani & Infantis cum perfecto Homine, in qua Ossium & Partium internarum discrimen declaratur.

### CAPVT VLTIMUM.



*GALENVS* in re difficili ab *Hippocratis* dictione tanquam à Dei voce semper auspicatur. Ab ea igitur imitatione *Galenus*, nostri sermonis ducam initium.

Conformatio Fœtus eo proceedit ordine, vt primùm carnes, deinde ossa generentur, quæ tum duriora sunt, & excuantur virtute spirituum, eùm Fœtus in membra distingui digerique incipit. Vbi autem Ossa cauitatem adeptæ sunt, attrahitur è carne quicquid pinguißimum est. Ac quemadmodum summa arborum postrema seinduntur, & dirimuntur in ramos: sic tandem extrema ossa finduntur, digitique puerorum in manibus & pedibus à se inuicem abscedunt: Ac demum extremis eorum partibus vngues adnascuntur.

Ossa quorum vsus est in Fœtu necessarius, prima apparent, cuiusmodi sunt, costæ, maxilla inferior, clauis vtræque, os hyoides, femora, tibiae, brachia, quæ omnes partes in Fœtu bimestri osscam duritiem habent, quia his opus habet Infans cum primùm in lucem editus est, ad deglutitionem & inspirationem. *Aristoteles* Rachim omnium Ossium principium esse statuit. Et *Calanus* in publico theatro demonstrauit Rachim primam ex Ossibus conformari, vt sit reliquorum fundamentum ac firmamentum. Cætera Ossa cartilaginea sunt, vt sternum, maxilla superior, extremæ manus & pedes, Ossa tamen Ilium, scapularum, & Os Sacrum, & quæ lata esse debent, iam aliquod in medio rudimentum Ossis habent. *Grandiora* enim Ossa non ab extremitatibus, sed à medio sui corporis osscam naturam acquirunt. Inde versus fines producantur, donec iustam magnitudinem obtinuerint. In principio *nulla Apophyses, & Epiphyses* apparent, crescente Fœtu Apophyses emergunt cartilagi-



ossis, quatum nullæ nisi exacto biennio in Ossa perfectissima degenerant. Ita mutatio cum fiat calore per motum & attritum articularum in pueris ambulantibus excitato, non incipit ab Ossis, cui connectitur, sed à centro ubi primam acquirit soliditatem, inquit *Vesalius, in Exam. Observat. Fallopij*. Verum hæc natura ætæna coniectura potius quàm nimis, & scientifica demonstratione cognoscuntur, cum nemo operantem naturam inspexerit: quæ dedit sapientiam visceribus inquebat *Iob, nisi Deus*. Quomodo ignoras, inquit *Ecclesiastes*, quæ sit via spiritus, & qua ratione compingantur Ossa in ventre pregnantis, sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium. Quum autem pifci viderent partium conformationem opus esse divinum, atque ex Ossibus, reliquarum partium figuram pendere, quandam Deum fecerunt, cæloque locarunt, quæ Ossium curam susceperet. Dea, inquit *Crematius lib. 4.* quæ durat & solidat infantibus parvis Ossa, *Ossidago*, ipsa memoratur.

Sed in Ossis constitutione ita natura operatur, ac sitelam esset effectura, primò enim fibras carneas, tanquam intentum flamen per longitudinem productas disponit, deinde per transversum tanquam subtegmen cæneum apponit, fibras scilicet transversas, quod clare in infantium & abortiuorum cranij Ossibus parumper decoctis intueberis, imò Ossa in primo ortu membranæ sunt, nequaquam Ossa.

Quod ad partium conformationem attinet, *Galenus lib. de formatione Fetus, cap. 3.* scribit, *Cerebrum, & quæ ad faciem spectant*, omnia postrema formari, quo tempore brachia & crura absolutam iam distinctionem acceperunt: & omne etiam quodeumque membrum ad perfectam constitutionem pervenit. Nam *Capitis Os* post omnia alia ossa conefciscere perspicuum est, cum adeo tenue sit, & imbecillum circa sinciput, ut per ipsum, in lucem nuper editis infantibus, cerebri agitationem, non solum tactu, sed etiam visa percipiamus. *Galenus* opinionem falsitatem convincit experientia, quæ docet Caput cum cæliquis partibus conformari, & in quolibet formationis tempore semper reliquis partibus grandius apparere. Proinde iore *Albertus Magnus, lib. 4. de Anima*, scripsit *Hominem in Vtero* solam habere Capitis magnitudinem: forsan legerat apud *Aristotelem, lib. 2. de generatione animalium, cap. 4.* & quarto de partibus cap. 10. pueros esse in utero pumiliones, quia caput habent proportionem ad corpus valde magnum, contra quam in brutis inanimantibus accidit, quæ in vtero parvis inferioribus superioribus maiores habent: quia ubi natæ sunt, pedibus indigent ad victum querendum.

Cur autem homini Caput cæteris partibus grandius Natura concesserit, hanc affert rationem *Morcellius*. Caput sedes est animæ, quæ simul atque corpori infunditur, suum domicilium architectatur, exornat & amplificat, quod tamen ad tertium vsque mensem male figuratum cernitur, simile prorsus simiæ capiti, quale vidit *Valcherus Coiter* in abortivo Fœtu, qui vix longitudinem digiti æquabat, caput erat proportionem corporis valde magnum, oblonga figurâ, simiæ capiti non dissimile. Observavit *Fernelius*, in Fœtu quadragesimali caput par auellanae, maius quàm pro reliqui corporis ratione, quod non credo.

Fœtus in lucem editus eam ferè capitis magnitudinem per annum retinet, quam secum attulit in mundum, sed ossa quæ ante partum erant tenuia & mollia sensim indurantur, exceptâ parte illâ superiore capitis ad concursum futuræ sagittæ & coronalis, quæ membræna est, nec antè induratur, & in os mutatur, quàm Cerebrum sicciusevaferit: & si credimus *Aristoteli*, non corroboratur ante primum sermonis exordium: ista pars vulgò *Fontanelle* dicitur, *Aristoteli* immò *imbræ*. à *Plinio palpitans vertex* nominatur, quia vni homini infantia palpat: Zoroastro tantùm palpitabat, ut impositam manum repelleret, futuræ præfagio scientiæ. *Plin. lib. 7. cap. 16.* Capitis os, quod calvariam vocant, ferè admodum induratur, quia sensim feruidi fumidique vapores exhalant, quod nulli ex cæteris animantibus sanguine præditis, præterquam homini evenit. *Aristoteles lib. 2. de partibus animalium, cap. 7.*

Ossium capitis *symphyse*, tam laxæ sunt & hiantes, ut harmoniam potius quàm futuram referant, sagittalis semper ad summas naves excurrit vsque ad septennium.

Os frontis in duas partes separatur, & interdum os occipitis, si linea sagittalis à summis naribus recta secundum capitis longitudinem ad spinalis medullæ foramen descendat, auctoribus *Vesalius & Sylvius*. Quod pernegat *Fallopius, in Observat. Anatem*. Admittit quidem in iis, qui nondum semestri vitæ spatium exelsere, os occipitis



in apice quandam diuisionem obtinere, quæ nunquam ad spinalis medullæ foramen peruenit.

*Temporum ossa* futuram habent, quæ squammosam partem à lapidosa determinat. Lambdoidis futura varia est, & multiplex. *Occiputale* os, ut plurimum in quatuor partes dirimens: Prima est maior & superior, secunda & tertia foraminis magni latera efformant, continentque coronas: Quarta additamentum illud constituit, quod sphenoidei committitur: Ex pluribus ossibus conflatum fuit occiput, ut ex eorum intervallis cartilago efflueret, quæ instar ligamenti caput primæ & secundæ vertebræ connectit.

*Ossa sinapius* integra sunt, nisi quod superiore parte ad concursum sagittalis & coronalis hiatus insignem relinquunt, quem *Fontanelam* nomenclari diximus.

*Ossa temporum* manifestè secernuntur in lapidosas, & petrosas partes, quarum in Fœtu diuersa est compositio: Nam *Meatus Auditorius* in ossis petroso excelsus, rotatus est cartilagineus, quemadmodum & osseus iste circulus, cui tympanum alligatur, qui sine coctione faciliè separatur.

*Ossicula tria*, nimirum Incus, Malleolus & Stapes, sunt siccissima & durissima, æqualisque magnitudinis atque in adultis.

*Mammillaris processus* nondum apparet, neque adhuc styloides apophysis cernitur.

*Quarta apophysis ossis temporum*, quæ intra caluariam consistit, in puerulis ab ossis squammoso prorsus secernitur, & acie cultelli faciliè auellitur, suæque sede dimouetur: ut etiam in adultis indicat diuisionis rudimentum.

*Os Ethmoides* totum cartilagineum est, cuius medium cristatum primò fit osseum.

*Os Sphenoides* quatuor partibus coalescit, quæ non sunt ita obscuræ, quod voluit Fallopius, ut prorsus obliterentur. Duæ ossis partes, alares processus constitunt, tertia nervis opticis traiciendis destinatur, quarta sellam equinam continet.

Sinus in ossis frontis, sphenoide, & maxilla superiore nulli sunt, quoniam hæc ossa à primo ortu solida generantur, ut materia extendendis & amplificandis ossibus præsto esset, dum Cerebrum augetur.

*Inferior maxilla* per harmoniam in duas partes diuiditur, quæ tandem coalescunt pereunte harmonia.

*Palatum* in pueris ex quatuor Ossibus constructitur, quæ determinant tres suture, sunt enim duæ transversæ, quarum una ad utrumque caninum dentem producit, quam *Vesalius*, & *Valerius*, in pueris tantum patere volunt, in adultis aboleri, quod falsum docet *mirus*. Altera futura in fine palati iacet inter apophyses pterygoideas, & dentem postremum, quæ interdum in maioribus craniis reperitur.

*Dentes* formati intra gingivas latent, & eo modo perficiuntur, quem ex *Enstachio* recitavi, libro de *Ossibus*.

*Ossis hyoidis basis*, ossis spectatur, ut fulciet linguam, epiglottidem, & deglutitionis organa firmaret, cornua verò sunt cartilaginea.

*Omnès vertebrae* à ceruice usque ad coccygem numerando, per integrum annum ex tribus portionibus constantur, prima corpus vertebræ, reliquæ duæ foraminis latera constitunt, atque processus cartilagineos expromunt. Nonnunquam prima ceruicis visa est Fallopio quinque partibus constructa: magno intervallo distat à secunda, hæc autem secunda vertebra præter illas tres portiones omnibus vertebris communes, quartam habet, nempe epiphyisim odontoidem.

*Coccyx cartilagineus* usque ad septimum annum permanet, quo tempore osseus euadit.

*Costæ omnes* sunt osses, versus extrema cartilagineæ.

*Scapularum ossa* à quibus brachia dependent perfecta cernuntur, in ambitu nonnihil cartilaginea, cuius naturæ sunt acetabuli labra, acromion, & ancyroides apophysis.

*Sternum* constat ossibus mollioribus cartilagine multa inter se disjunctis, quorum septem totidem costas excipiunt. Octauum os in gratiam cartilaginis xiphoidis fuit conditum. Hæc ossa usque ad septennium distincta manent, sensimque solidiora redduntur. Celerius ossium speciem superiores quam inferiores, & mediæ secundum latitudinem citius, quam extremæ partes assumunt,

*Humeri processus* inferni sunt cartilaginei, huiusque naturæ particeps est trochlea, quæ citissime in os connectitur.

*Cubiti duo processus*, qui trochleæ obuoluuntur, in edito Foetu apparent cartilaginei, sed anterior citius induratur, posterior *Olecranon* dictus, ad septennium manet cartilagineus.

*Carpi ossa* dum Foetus nascitur ex vna cartilagine constantur, cum ossam duritiem acquirunt, à se inuicem separantur. Octauum os carpi fit osseum.

*Ily ossa* in pueris ad septennium ex tribus partibus componuntur, quas *veteres Anatomici* propriis nominibus designarunt.

*Tres processus superii femoris*, nempe Caput & Trochanteres duo in puerulis, & recens natis facile separantur, inde cognoscens epiphyfes esse, quæ progressu temporis in apophyses degenerant. Processus etiam inferni femoris sunt cartilaginei, quemadmodum tibia & fibula. Patella in principio tota cartilaginosa est, & pluribus mensibus talis permanet.

In pede omnia *Tarsi ossa* ad plures menses, vt in carpo cartilaginea sunt, excepto calcis osse, quod in medio quid ossi ostendit.

Scribit *Aristoteles*, lib. 7. de hist. anim. c. 10. cæteris animalibus discrimen ossium nullum esse, sed omnia perfecta iam inde à natiuitate prouenire. At pueris sinciput molle est, seroque duratur, & cum cætera animalia nascantur cum dentibus, pueri septimo mense dentire incipiunt.

Nec tantum ossa Foetus, & infantis ab ossibus perfectorum hominum differunt, verum etiam partes internæ, structuræ varietate plurimum inter se discrepant.

*Cutis Foetus* rubicundior, substantiâ rarior, potis laxioribus, & tactu mollior.

*Cuticula* tenuissima est, & simplex Cutis vtrumque albescere incipit exacto octauo die, vsque ad hoc tempus flavescere solet. In Cute pectoris obseruabis *mammæ Infantis* recentis nati, si paulò habitior fuerit, vbi lacte exsaturatus fuerit, interdum lac exstillare per papillam, vt in mulieribus: id quod multoties obseruavi, ne quis putet lac ibi generari, vel esse materiam purulentam partis, cum mammæ non dolescant, neque tumeant. Reliquorum membrorum discrimina recensere, secundum tres corporis regiones, & incipiam à Capite.

*Pericranij propagatio* à dura meninge, per suturas cranij transiit facile cognoscitur.

Mollissimum est *Cerebrum*. *Ventriculi* anteriores Cerebri priori parte pueris quam plurimis, aliarum ætatum paucis, in foramina ethmoidea peruij sunt, ex *syluis*, quod nunquam obseruare potui.

*Nervi Cerebri* in puerulis æquè crassi sunt, vt in adultis, & processus mammillares in ea ætate maiores & ampliores apparent, iuxta cristam ossis Ethmoidis, quàm in proeectoribus.

Infantes non vident, quamvis oculi sequantur lumen obiectum. Agnus quidem recentis natus distinctè videt, non infans propter nimiam humiditatem Cerebri, quod spiritus viuos, subtiles & siccos non potest suppeditare: Adde etiam humorum in oculis inconstantiam, qui varios colores induunt, dum ex nigris cælij, vel flauj sunt.

Pulmo totus est ruber, Hepatis parenchymati haud absimilis, quia non mouetur, nec aërem inspirat, motu enim & aëris influxu albescit, & rarefcit.

*Vasa Cordis* in Foetu aliter constructa sunt, aliisque officiis inferuiunt, vt in *hystoria Foetus* demonstraui.

Vasa habet Foetus in ventre inferiore dicta, Vmbilicalia, Vena Vmbilicalis: *Arteria dua vmbilicales*, quæ magnum vsum & commoditatem Cordi præstant, vt in *historia Foetus* declaratum est: sæpius vnicam vmbilicalem arteriam deprehendi iuxta renes, aortæ insertam.

Intra *Pericardium Aqua* continetur.

Ventriculus dexter Cordis spissior est sinistro, vel potius vtriusque ventriculi parietes sunt æqualis crassitudinis, & æqualis amplitudinis, *Auricula* sunt etiam æquales amplitudine, imò *sinistra* videtur latior.

*Iecur molle* & rubicundū sua magnitudine vtrumque hypochondriū opplet, ad cælerius infretumētū corporis, ita ut puer triēnio dimidiā corporis longitudinē acquirat.

*Fesicula* bile tumet & turgescit, & Hepati excauato insculpta, at in homine adulto cum Hepar sit adæquatum, videtur Hepati applicata, non immerfa.

*Ventriculus* mucosâ pituitâ plenus est, quæ vel ipsius ventriculi excrementum est, non chylus, vel est pituitosus humor Cerebri excrementitius, è capite delapsus in ventriculum. Inflatu eleganter corneam musam exprimit.

*Splen* colore & consistentia similis est Iecori.

Meconium, siue sanguis niger, quo plena sunt intestina, sanguis est crassus, siue purgamentum sanguinis crassum, quod Lien & Iecur per ramos splenicum & mesentericum in Intestina deponunt. Ideoque non in sola appendice cæci intestini colligitur & coëctetur, ut scribunt *Varolius & Banhinnus*: Nam appendicula hæc in Fœtu non est amplior, quàm in adultis, inò sæpius angustiozem deprehendi. Et miros *Spigelium* in re tam manifesta deceptum, *lib. de Fœtu*, quia pro cæco accipit hanc appendiculam lumbrico contorto similem.

*Intestina* Meconio sunt differta, quale sit exposui suprà: & quia Intestinis deest motus peristalticus, ideo per totum gestationis tempus asseruntur in intestinis.

*Omentum* est exiguum ac tenuissimum instar telæ aranearum, quoniam ex nutritione pinguescit, & incrementum capit.

*Intermemus adeps*, ut subcutaneus nullus apparet, vel paucus, isque durus potius, quàm mollis.

Ut venas omnes ab umbilicali propagari cognoscas, venam umbilicalem inflabis in Fœtu, vel puellorècens edito: Nam portam & cauam venam insufflato aëre distendi obseruabis, omniaque viscera, suscipientia per venas & arterias aërem: Inde cognoscas communionem vasorum inter se, scilicet venarum & arteriarum.

In venâ umbilicali infantium recens natorum, ex sanguine residuo & putri, vermes generari notatum ab *Hedwettero, lib. 2. Obseruat.* Inde forsan tormina dirissima, quibus cruciantur & jugulantur infantes.

Cuticula in Fœtu facillè abraditur & euellitur, propter corporis diuturnam immersionem, siue natationem in aquis.

Cutis rubicunda apparet, & tribus à partu diebus flauescens, signum & augmentum vitalitatis futuræ, octauo die, vel nono albescere incipit.

Expendes an *Vrachus* sit continuoatio tendonis pyramidalium musculorum priusquam aperiatur abdomen.

*Arteria umbilicales* in Iliacas & hypogastricas arterias inferuntur, post duos vel tres menses ab ortu, coniunctio illa cum iliacis abruptitur, remanente altera insertionem cum hypogastricis.

*Renes glandulosi* sunt instar pineæ nucis, ex pluribus glandolis conglobati, quæ figura in editis vsque ad duos vel tres menses permanet, Fœtoi humano & bubulo tantum peculiaris, cæteris animalibus denegata: vide *Rondeletium lib. de Piscibus*.

Intra tunicam Renis *glandula ista* plana adipi similis in Fœtu & puerulis collocata est supra renem, fungitur officio adipis renibus circumiecti: quum temporis paucus est circumfusus, ad excipiendas sordes renalium partium: in adultis adipi immerfa oblitescit.

In partibus externis puellæ recens editæ, obseruabis *labra pudendi* subtumida sine vlla nota Nympharum, sed earum locum intra labra occupat membrana rubicunda, aliquantulum carnosa instar valvulæ supernè deorsum protensa, quæ stylo indiro eleuatur, eoque profundius introducto in vesicam vel in vterum penetrabis.

Dubitare posset aliquis, num ista membrana ætatis progressu referat verum hymena, vel filia degeneret in nymphas, aut ctingat ista carnosa tubercula, quæ pro carunculis vsurpantur: Ac sanè, si partes istas externas genitales exactè perlustremus, non leue discrimen secundum ætates in illis annotabis, ut in partibus internis.

Nam vsque ad decimum quartum annum & ultra, corpus vterinum applicatur & agglutinatur fundo vesicæ, & vaginæ pudendi cavitatis, latior est ipso corpore vterino. Quæ pro paruo rene habetur *glandula* euidentior est in Fœtu perfecto & maturo quàm in adultis.

*Vesica* magna est in Fœtu, ventriculi ambitum dupla magnitudine superans, lotio multo distenta est, & compressa per penem emittit. Hoc modo constructas partes internas multiplici Fœtuum dissectione deprehendi, & inde cognoui naturam in quibusdam corporibus celerius aut tardius partes formare, discernere, & absoluerè.

Anno Domini 1605. Fœtum circiter semestrem ab obstetrice oblatum accuratè dissectui. Omnibus externis partibus perfectus & absolutus erat, iam os erat discissum, patebant nares, aures foris descriptæ, sed nondum perforatæ. Palpebras unitas obseruavi, ut in talpis, subtus oculis optimè conformatis, quos tamen in Fœtu quadrimestri iam apertis palpebris videram. Larebant inera peritonæum testiculæ inguinibus proximi. Vesica dura erat, sed exigua cauire prædita. Vrachum fili crassitie magnum noravi. Renes pinæ nuci similes, ex pluribus glandulis conglobatos vidi. Manifesti erant vretres. Iecur suâ amplitudine vtrumque hypochondrium occupabat. Vena umbilicalis in venam portam inferebatur, & ventriculus parte sua superiore hoiæ venæ adharebat, mucoso humore distentus. Tenuia & superiora intestina liquida erant, ratione humoris nigricantis contenti. Ampliora crassius inreftinis, quæ humore albicante turgebant. Pulmones candore niuem æquabant, atque iecore solidiores apparebant. Cordis substantia rubicunda erat, minùs tamen quàm in adultis, & auricula sinistra Cordis, dextrâ (quæ tota albicans est) amplior apparebat, maioremque sanguinis copiam continebat.

Fœtum trimestrem inspexi, in quo digiti pedum & manuum erant discreti, penis nota conspicua erat, os patebat, nares erant ocluse, itemque palpebræ, & aures, quæ paulò infra oculos sitæ sunt, caput reliquo corpore grauidius & ponderosius deprehensum. Quod spectat ad ossa, quæ cranium constituunt, erant condita inter se diuisa, & circa verticem, vbi fontanella consistit, magno hiatus membranæ intercisæ, clauiculæ, costæ, omoplatæ, ossa humeri, cubiti, & reliqua manuum norati poterant, quin etiam os ischium, os femur, rotula, ossa tibiarum cum malleolis, atque pternâ, totaque trunci spina apparebant. Vena umbilicalis intra Hepar venæ cauæ & venæ portæ inferebatur. Iecur infra umbilicum descendens vtrumque hypochondrium occupabat. Ventriculus cauus moco repletus erat, cui lien lentis figura & mole adharebat. Renes pisum maiusculi molem æquabant, pulmones candidi erant, & duri. Cor excavatum erat, sinister ventriculus nigrius cauus dextro. Lingua iam formata erat, ossicula auris internæ fermè æqualia ossiculis adultorum. CrySTALLINUS humor oculo totus erat liquidus. Cerebrum verò totum mucosum, crassiori pituitæ persimile.

Anno Domini 1608. vidi Fœtum vnus mensis, quem malum germen adhaerens suffocauerat. In eo partes omnes externæ iam descriptæ & conformatæ erant, quæ tamen non apparebant, nisi merso in aquam Fœtu. Tum licebat intueri oculis duobus punctis nigris designatos, pro aotibus duo apparebant foramina, ipsi oculis inferiora: Os iam parebat, tota manus perfecta erat, in digitos secta, pedes tamen erant imperfecti, breuioribus manu, nec in digitos fissi. Inter femina rimulam obseruabam, quæ locum vulvæ referebat: Internæ partes obscuræ visebantur. Umbilicus imo ventri inferebatur, radix dorsalis (per quam placenta tenuis adhuc alterutri angulo vrenti appenditur) opposita erat umbilici radicationi. Choriū totum carnosum spectabatur eiusdem ferè substantiæ cum placenta: cuius substantiæ aliquid retinet, cum dilatatur in eam amplitudinem, quæ cœtatur in partu. Placenta chori portionem constituit & absoluit, ut in dissectione grauidarum obseruavi. Hoc anno vidi alterum Fœtum circiter bimestrem, cuius cranium erat membranosum, Cerebrum totum mucosum, duo puncta oculis designabant, aures nullæ erant conspicuæ, punctum oris locum notabat, manus extabant humeris affixæ absque brachiis & cubito, pedes etiam ossibus illiū adharebant sine vlllo vestigio femorum & ribiarum. Iecur totius ventris capacitatem occupabat. Intestina erant exilissima, Cordis & Iecoris parenchymata consimilia deprehendi in colore & duritie, nec vltra inspicere licuit propter ténacitatem partium, quæ attrectatæ dissiliebant, & liquecebant in aqua.

Anno frequenit alterum Fœtum inspexi bombycis magnitudine, eique figurâ planè similem, exceptis artubus, qui velut filamenta candida, è trunco corporis explanata apparebant: Manus quidem in digitos diuisa erat, pedes autem integri. Suis rudicis inuolutus erat, atque flauescenit circiter ad uncias tres immersus. Corporis verò superficies muco velut albumine oui obducta, quæ coltri cuspidè sublata, membrang speciem referebat. Torus umbilicus mucosus erat, ex tribus filamentis confatus, quæ membrana circumdabat à chorio prognata. Caput reliquo corpore grandius apparebat. Pro oculis bina foramina, quibus interiectum erat spatium naso destinatum. Aporum foramina oculis paulò inferiora. Quæ quidem omnia non nisi Fœtu in aquam merso conspiciebantur.

Cæterum, id in membranis notatu dignum obseruau: Chorij dimidiam partem mediocriter candidam extrinsecus tomentosam, alteram carneam & rubeam excipientem radica menta venarum & arteriarum, quibus interfusus sanguis concreuit in eam molem carneam, quæ *Placenta* dicitur: Tumque placentæ portio membranosa sensim increfcens in membranam crassam & candidam degenerat, qualis spectatur in secundarum retentione. Vidi in Fœtu bimestri partes genitales masculas prominentes, & formatas, digitos manuum & pedum diuisos, nondum patebat os, nares, oculi, & aures, intra membranas trium ferè vnciarum aquis circumfusus erat. Nuper obseruau fœtum bimestrem longitudine & magnitudine vermiserici maioris, cuius caput erat conformatum, mole sua reliquum corporis truncum æquans. In capite duo puncta nigra oculos designabant. Discretum erat os, prominebat umbilicus, manus & pedes veluti puncta supernè, & deorsum extabant: nihil præter ea potui animaduertere, & hæc patebant Fœtu aquæ limpidæ immerso.

Anno 1633. mense Martio, vidi Fœtum quadraginta dierum, magnitudine muscæ maioris, inuolutum membranâ candidâ foris tomentosâ, intus sesquiunciâ aquæ continebatur, Fœtus erat continuus, sine vlla sectione partium, moles corporea paruum phaseolum æmulabatur, scilicet incuruata: In extremitatibus extabant manus & pedes, qui referebant remos nauigij, vt corpus carinam nauis: umbilicalis vena iuxta Cor inferebatur, duo puncta nigra iuxta nares designabant oculos, hæc tantùm notare potui. His finem facio, quod decursâ & planissimè exposita iam videantur omnia, quæ ad historiam humani Fœtus Anatomicam pertinent.

*Finis Libri sexti.*





IOANNIS  
RIOLANI  
ANTHROPOGRAPHIÆ  
LIBER SEPTIMVS.

VIVENTIS ANIMALIS  
*Observationes Anatomica.*

CAPVT PRIMVM.

**P**OSTQVAM eo more & ordine, qui hoc libro describitur, vi-  
ri & mulieris Anatomen integram, suisque numeris absolutam de-  
monstravi, Fœtus structuram in humano Fœtu, & oue Fœta osten-  
do, quibus peractis, ad sectiones viuencium animalium, scilicet o-  
uium, canum & filium me conuerto. Hac enim serie res omnes A-  
natomicas tractare consueui. Nunc superest ad operis Anatomici  
perfectiorem, Viuentis Animalis Anatomen exponere, quod dum exequor, non  
piacula, neque cædes & homicidia suadeo, procul abist à Medicis ista crudelis &  
scelerata doctrinæ Anatomicæ curiositas, nec cadit in quemquam tantum scelus.  
Homo sum, nihil humani à me alienum puto, sed more & exemplo *Galen*i, Anato-  
men illam viuam in brutis exerceo innocentiorē doctrinæ studio, vt quarundam par-  
tium obscuras & incomptas actiones explorem, atque dignoscā. Exemplo illius  
apud *Poëtam*,

-----pecudumque reclusis

*Pelleribus inhians, spirantem consulis exta.*

*Galenus cap. ult. artis parua citat librum à se editum de dissectione Vinorum.* At qui nunc  
extat de *Anatomia viua* spurius est, & à barbaro quodam conscriptus.

Ad hanc Anatomen aptiora sunt grandiora animalia. Sues deligebat *Galenus*, vt  
votis organa demonstraret, quoniam altius & diutius quàm cætera animalia vocifera-  
rantur. Sed ob grunitum auribus asperiosem, & colli obesitatem, à nonnullis re-  
pudiantur, Canibus in eorum locum succenturiatis, in quibus tota hæc Anatome  
peragitur. Sed plures canes, tres, vel quatuor ad manum habere oportet, vt quod in  
vno celeriter inter tormēta expirante non licuit obseruare, in alio videre queas. Prius-  
quam animalia secentur, quæ demonstrare velis, breui sermone recensēbis, vt inter  
secandum vno verbo & digito, rem spectatoribus designes, & ostendas.

M m lii)

Imprimis de motu Cerebri, magna est inter Anatomicos dissensio, dum assue-  
rant alij moueri Cerebrum, per diaetolem cum attollitur & intumescit, per systolem  
dum contrahitur, ac deprimitur. Alij omnem motum Cerebro detrahunt, & sub-  
stantiam ipsius Cerebri per se immobilem esse contendunt, pulsationem illam duræ  
meningis, quæ precipitur in Fontanella, seu palpitante vertice infantum, & in fra-  
cturis cranij obseruatur, *Anatomicis* imposuisse, qui hunc motum à Cerebro profici-  
sci existimauerunt. *Galenus* hac in re dubius & incertus fuit, modò Cerebrum moue-  
ri scilicet, alibi immobile esse statuit, quod ut magis notum & exploratum haberet,  
viventis animalis caput aperuit, ut motum Cerebri, & sensum membranarum cog-  
nosceret. *Marinus* dubitabat, an pulsatis Cerebro inesset motus, & num spiritus  
quem trahimus ad id perueniret. *Volcherus Coster* agnotum, hædorum, & canum  
viventium capita dissecuit, ut motum Cerebri deprehenderet. At nullum in iis mo-  
tum obseruauit, quod autem Cerebrum in magnis vulneribus simili cum arteriis mo-  
tu agitari videatur id arteriis, non substantiæ Cerebri adscribi debere putat. Idem  
*Coster* brutorum viuientium cerebra detexit, vulnerauit, & linctis neruis, eorum-  
demque principio, & ventriculis mediis illæsis exemit. At nullam, vel vocis, vel res-  
pirationis, vel sensus aut motus læsionem in iis deprehendit, etenim absque Cere-  
bro aliquandiu viuunt, ut quilibet in gallinis, vel pullis gallinacis experiri potest,  
si rostrum superius cum dimidia capitis parte abscidit, Cerebrumque maiorem par-  
tem exemerit. *Fallopis* in *Observationibus Anatomicis* fatetur se motum Cerebri, neque  
sensu affectu potuisse, neque in viuorum brutorum Anatome, neque in maximis ca-  
pitis vulneribus vnquam uidisse, sed sinus superioris longitudinalis palpitatione de-  
ceptos fuisse Anatomicos. *Vesalins summus doctriua Anatomica magister*, Cerebrum  
moueri incipiat, & *Galen*i argumenta contrarium suadere putat. Attamen *Colum-  
bus* & *Piccolaminus* Cerebrum perpetuò moueri probant ex vulneribus capitis, in  
quibus motus capitis manifestè spectatur. Addit *Laurentius*, neminem nisi amentem,  
aut in re Anatomica omnino imperitum id negaturum. Ego verò sæpius in oue vi-  
uente, ablata magna cranij portione, Cerebrum moueri vidi, quin etiam in iis, qui-  
bus lues veneræ magnam cranij portionem eraserat, extra sinus duræ meningis  
iuxta tempora Cerebrum subilire & attolli obseruauit.

Præterea scitu & consideratione dignum est. An Cerebri motus cum Cordis mo-  
tu coincidat, id est, ambo eodem tempore & instanti moueantur: existimat *Columbus*  
vtramque partem eodem momento cieri: Alij verò motum Cerebri contrarium esse  
Cordis agitationi prodidere. Nam ubi per systolem Cerebrum comprimitur, Cor  
per diaetolem attollitur, quod obseruatum fuit in quodam, qui dimidium cranium  
detectum, & à lue veneræ erosum habebat. Notabis etiam apertis Cerebri ventricu-  
lis anterioribus motum amitti, qui mox occlusis, ac Cerebri reductâ substantiâ re-  
cuperatur.

Incipiat *Aristoteles*, caput abscissum loqui, & eludit exempla, quæ proponun-  
tur ad huius rei probationem, quia fieri non potest, ut caput præcisâ arteria, & sine  
pulmone loquatur. Nec apud *Barbatos*, qui capita summa cum celeritate abscin-  
dunt, tale quid vnquam euenisse accepimus. At hæc in cæteris animalibus, cur id  
non aliquando fiat: Corpus tamen detractò capite progredi non temerè credi potest.  
Nam ea quidem quæ sanguine carent, vel viuere diutius possunt truncata capite, ex  
*Aristotele* cap. 10. lib. 3. de partibus animalium.

A Cerebro ad vocis organa descendes, ac primum dabis eani potum coloratum  
ebibendum, ut aperto thorace indagare queas, num aliquid potulenti in asperam ar-  
teriam decurrerit, quod est *Hippocrati*s experimentum. Deinde demonstrabis vim  
mouitum laryngis à Cerebro deferri, per duplicem neruum recurrentem, quorum si  
vnus laqueo constringatur, vel rescindatur, semiuocales redditur animal, laqueo re-  
soluto vox illico restituitur, quod si uterque amputetur, omnino morum euadit,  
consuetaque plagâ viuere potest inoffensis partibus thoracis, nec immixta, vel  
aliquantulum oblixa respiratione. Sed non existimo ad motum Cordis nervos sextæ  
coniangationis quidquam conferre, eorumque repentina obtotatone animal subito  
extingui, ac suffocari, uti literis consignauit *Baehnius*, cum multoties istis nervis  
resectis, animalia viuere & currere demonstrauerim: quod si laqueo quatuor vasa  
Cordis comprehensa constringantur, deinde Cor abscindatur, audies canem absque  
Corde vociferari, & quod magis admirabile, progredi & ambulare videbis. Inde



cognosces vocem neutiquam à Corde proficisci, id à Galeno sæpius factitatum, ipse testatur, *lib. 2. de Decretis Hippocratis & Platonis, cap. 7.* Intra capacitatem thoracis aperi, observabis motum pulmonum, Cordis, arteriarum, & diaphragmatis. Pulmones aperto thorace etiam aliquandiu moventur, vt inde liceat cognoscere motum illum non à thorace pendere, qui tamen discinctus motu suo priuatur, pulmonibus suoapte impetu agitat. Dein discisso Pericardio aquam in eo contentam videbis.

Postea motum Cordis explorabis, qui per diastolem & systolem perficitur, quibus duobus motibus duplex quies interiecta est, perisystole dicta, vel *diastole*, tanquam intermissio, sed in Corde quatuor motus loco & tempore differentes observabis, quorum duo ad auriculas Cordis pertinent. Alij duo ad ventriculos referuntur. Est enim motus auricularum & ventriculorum Cordis omnino contrarius, dum enim ventriculi dilatantur & attolluntur, auriculæ subsidunt. Rursum ventriculis contrahis & concidentibus, attolluntur & implentur auriculæ, itaut auricularum diastole, ventriculorum systoli, & auricularum systole, ventriculorum diastoli respondeat. At maiore dignum est admiratione, resectum Cor & tabulæ impositum palpitare adhuc enim auriculis, quæ postremæ pulsant, itaut motus Cordis in iis elanguescat, & emoriatur: quin etiam ventriculo sinistro vulnerato, nec amplius palpitante, mouetur adhuc dexter, qui si vulneratus fuerit, motus remanebit in septo, tandemque pars Cordis vltima palpitans, basis observatur. De Cordis motu, & auricularum leges Hippocratem *lib. de Corde, & Galenum lib. 7. admissi. Anatomic, cap. 15. Verulamio lib. de vita & morte*, memorabilia exempla profert de Corde euulso, & adhuc palpitante. Meminimus, inquit, vidisse hominis Cor, qui euisceratus fuerat supplicij genere apud nos versus proditores recepto, quod in ignem de more iniectum saluabat in altum, primò ad sesquipedem, & deinde gradatim, ad minus durante spatio, vt meminimus, septem aut octo minutarum. Etiam vetus & fide digna traditio est, de boue mugiente sub euiscerationem. At magis certa de homine, qui eo supplicij genere, quod diximus euisceratus, postquam Cor auulsum pectus efferet, & in carnificis manu, tria aut quatuor verba præ se, auditus est proferre.

Sed quandiu Cor mouebitur, observabis, quo modo fiant Cordis diastole & systole. Multi ex Galeni doctrina Cor dilatari credunt, quando mucro ad basim reclusis fibris retrahitur, contrahi cum mucro à basi recedit reclusis fibris laxatis, & transuersis quæ Cor ambiunt orbiculatim, impensè collectis & arctatis. Contraria est *Volcheri Cæster* observatio, scribit enim in diastole basim corrugatam constringi & ad conum trahi, vicissimque in systole conum ad basim trahi. Sed basim deorsum ferri sursum erecto & ascendente cono, qui leniter ferit pectus. In hoc motu, quod de sua latitudine Cor amittit, in rotunditate recuperat. Sed in systole Cor tenuius, latius, longius, flaccidius atque pallidius euadit: Ego verò sæpius obseruavi in animalibus. Cor instar folliis distendi, & comprimi. Distenditur & dilatatur in diastole, dum sanguinem venosum & ærem admittit. Constringitur in systole, dum fulgines & sanguinem arteriosum expellit, etenim conus non potest ob duritiem ad basim reuolui, neque basis forti nexu valis adstricta ad conum potest reduci. Quod sperat ad illam pulsationem, quæ sentitur ad læuam pectoris papillam, *Platerius* arbitrat Cor corpore suo sensim versus anteriora pectoris procedere, eamque regionem sterni, vbi sexta & septima costa articulantur respicere, idque reclusis sine dubio in homine viuente, licet in mortuis deorsum nonnihil grauitate sua dependeat, & ad sinistram latus, propter arteriæ illic affixæ pondus retrahit videretur, quod etiam occasionem multis præbuit credendi Cor in viuentibus eundem situm obtinere, sicuti & illud quod sinistro latere illius pulsus, præsertim sentiatur, qui tamen cum à sinistro illius ventriculo, atque arteria magna ibi locata perficiatur, nihil certi in Cordis situ declarare poterit, sicuti probare videtur Cor Salmonis piscis exemptum, quod manifestè reclusa sursum in motu eleuari, atque ad latus declinare videmus. Sed cum Cordis conus ex adhesionē pericardij ad diaphragma deorsum dirigitur, non video, quo modo pectus cono ferire queat. Nam resupino corpore, & retrò paulum incuruato, eodem tempore binos ictus percipies, alterum in cartilagine xiphoidē à Cordis cono centrum nerueum diaphragmatis percutiente, alterum in pectore à Cordis basi sublimata, vel potius à trunco aortæ partem illam feriente. Interea expendes opinionem *Columbi* de motu Cordis, quod dum sursum trahitur, & tumescere videtur, tunc con-

stringitur. Cùm verò relaxatum deorsum vergit, tunc est systole. Propterea quod facilius suscipit, minoreque labore: at cùm transmittit, maiori opus est robore. Subiungit: Neque hoc floccifacias, etenim non paucos reperiis, qui eo tempore Cor dilatari certò opinantur, quo verè constringitur.

Deinde observaabis, num vis pulsifica artiarum pendeat à Corde simul agitante arterias. An diversis temporibus Cor & arteriæ moveantur. Ac sanè motus illi alternatim perficiuntur, constricto & expellente Corde, arteriæ dilatantur ad excipiendum, & vicissim Corde dilatato, systolem patiuntur arteriæ, quod manifestè videbis, si Cor & aortam simul apprehendas. Nec vis pulsifica ipsis arteriis tantum insita est, sed etiam emanat à sanguine arterioso, quem Cor in arterias refundit. Nam in elato & tumido aneurismate ex incisa arteria genito, tumoris pulsatio, non aliunde quam à sanguine arterioso proficiscitur. Ventrículo Cordis incisis, explorabis intro digito, an sinister dextro sit calidior.

Dein in alio cane venæ arteriosæ, & arteriæ venosæ micaciones observaabis, & num sanguis in arteria venosa, vel solusaër contineatur.

Abdomine resecto, diaphragmatis motum observaabis, quod tensum constringitur, & in sese contrahitur in inspiratione: laxatum amplificatur, & latefcit in expiratione.

Motum quoque peristalticum intestinorum contemplator, quæ instar magni lumbrici, aut longioris serpentis more cientur, per partes alternatim agitas: hic autem motus ex *Galeno Comment. ad particulam 33. lib. 3. de vultu in acutis*, duplex est: Vnus secundum naturam, qui incipit à superioribus, ipsoque ventriculo, sensim compellendo intestina ad fæcum excretionem. Alter est præter naturam, incipiens ab inferioribus partibus, vbi sedem circulariter ambit musculus, qui contractus cum intestino recto excrementa regurgitare facit ad superiora, vt accidit in voluulo. Proinde ad observandum, & observandum animi, siue observandum animi, propriè pertinent ad intestina, dum motu compressorio mouentur ad excrementorum descensum, & chyli distributionem, vt *Erasistratus* rectè sentiebat apud *Galenum libro tertio de naturalibus facultatibus*, cap. 4.

Quod spectat ad motum artiarum vmbilicalium, & Cordis in Foetu palpitacionem, iam de his actum est in *historia Fetus*, ad quam recures. Ista in oue prægnante demonstrantur. Cæterum magna contentione certatur inter Medicos Anatomicos, de chyli traductione ad Hepar, an fiat per quasdam venas mesenterij huic officio destinatas, an per omnes certis temporibus inferuentes, quia per easdem vias sanguis ad nutritionem intestinorum distribuitur. *Dolysimus Medicus & Anatomicus Tienensis Asellius*, nuper edito libello, istud negotium composuit, & demonstravit in venis, quas à candore *lacteæ* appellat, & vala probat esse, separata à venis mesaraicis, propaginibus portæ, quæ destinatæ sunt alendis intestinis, vt vasa lactea devehendo chylo ad Hepar. Propterea quartum esse genus vasorum statuit, quæ dispersa per mesenterium intestinis applicantur ad exsugendum chylum, quem deducunt ad cauum Hepatis prope venam portam. *Herophilus* istas venas subolfecisse videtur, dum alias ab Hepate in intestina deriuat, alias ab intestinis ad Hepar deferri scribit. Quinetiam *Erasistratus* in hœdis lactentibus, viderat arterias imi ventris lacte referatas, referente *Galeno, lib. 7. de administr. Anatom. & lib. an sanguis in arteriis continetur, cap. 5.* Id observare oportet in cane, felle, agno, vitulo, oue, porco, modo hæc animalia antea abundè pasta fuerint, & convenienti tempore, nempe trihorij spatio ab esu, viuientia aperiantur. Istam congeriem venarum lactearum dissecto abdomine primo intuitu conspicias in mesenterio, prope intestina, vel in pancreate, modo animalis abdomen non fuerit obesum. In his admiratione dignum, quod pluribus vasculis, siue ostiolis venæ sint intercisæ, non modò quæ committuntur intestinis, sed etiam in reliquo ductu, quæ impediunt refluxum chyli ad intestina referente *Asellio*, earum venarum nulla in ventriculum inferitur, quam plures in icinum intestinum & Ileon, pauca in reliqua intestina: instar hirudinum spongiosis capitulis, quæ radicum vicem obtinent intestinis applicatæ, prolestant chylum, & inter duas mesenterij tunicas, modò seorsim, modò cum aliis venis mesentericis portæ progrediuntur. Omnes pancreate suffultæ, iuxta portæ latera ad iccoris caua geminæ ascendunt per iccoris fissuram traductæ, vbi in varias fibras per cius visceris substantiam disperguntur.

Inuentum *Asili* suspectum quibusdam esse posset, quia si concursus & complicatio vcnarum lactearum fit in pancreate, quod eodem officio fungitur, quo placenta in foetu, complectens vasa vmbilicalia: istud corpus in sanis & habitioribus corporibus deberet esse amplum ac tumidum. At illud semper in sanis, vix sextam aut octauam Hepatis partem æquare deprehenditur. Præterea lordities chyli quò abit? An ibi retinetur ad nutritionem pancreatis? An aliò secedit, & per quas vias? Adde quod pancreas videtur destinatum sustinendo, & fuscando trunco portæ, & ramo splenico deducendo ad lienem. Denique si admittantur venæ lacteæ, corrui isthæc tantopere celebrata anastomosis radicum venæ portæ cum radicibus venæ cavae intra Hepar, quia chylus per Hepatis substantiam dispersus, tunc contactu ipsius Hepatis roborem contrahet, & à radicibus venæ portæ & cavae seorsim exsugetur: Ergo non à vena contra per istam anastomosis transfundetur in cauum, vt recentiores opinantur.

## CONCLUSIO OPERIS,

## CVM ACTIONE GRATIARVM AD DEVM,

*& Exhortatione ad studium Anatomicum, quod non potest comparari sine Preceptore. Ingratitudo discipulorum erga Preceptores. Laudatio victima Anatomica, siue corporis suspensi.*

## CAPVT II.



Vñ Angelus Tobiam per varias mundi regiones deduxisset, eique Dei & Naturæ miracula in hac mundi fabrica demonstrasset: Tobiam Patrem, & Filium hortatur, ad laudanda & celebranda Dei summi opificis opera. *Benedicite Deum cali, & coram omnibus videntibus confitemini, qui fecit vobis misericordiam suam. Etenim sacramentum Regis abscondere bonum est, opera autem Dei revelare, & confiteri honorificum.*

*Sic nos immensum spatium confecimus aequor,*

*Et iam tempus equum spumantia solvere colla.*

Cunctis enim microcosmi regionibus diligenter exploratis atque perlustratis, instar illius Calebantis apud *Potam*,

*Descripti radio totum nunc gentibus orbem,*

humanæ fabricæ:

Æquum est ingentes quantum humana potest fragilitas, Deo Optimo Maximo gratias rependere, qui nobis studij Anatomici amorem ingenerauit, intellectum dedit ad penetrandam naturæ humanæ adyta, carne multa & caligine mersa. Qui manum deduxit per ambages viarum in densissimis rei Anatomicæ tenebris, ad perscrutanda, & in apertam lucem proferenda naturæ humanæ mysteria: Calamum quoque suppeditauit, utcumque apparatus, ad publicanda suæ diuinitatis admiranda opera. Proinde ingratus essem erga Deum, qui nos tantis beneficiis affecit, & tanquam *inuidiam* inuidiæ crimine laborarem aduersus Naturam humanam, quæ nos chara cæro & effigie sua insigniuit: si quæ Deus benignitate sua nobis patefecit absconderem, aliisque inuiderem: ita certe recondunt, qui pauca aliqua nouere, inuidentes aliis, & neminem docere in auctoritatem scientiæ est, tantum ab excogitandis nouis, ac iuuanda vita mores absunt, summumque opus ingeniorum diu iam hoc fuit, vt intra vnumquemque rectè facta veterum perirent. *Æquè* mihi displicet, ac *Plinio, Linny*, Auctoris celeberrimi superbum istud historiæ suarum exordium. *Satis sibi iam gloria quæsitum, & potuisse se desinere, ni animus iniquis pasceretur opere: Profecto enim populi gentium viciis, & Romani nominis gloria, non sua composuisse illa decuit. Maius meritum esset, operis amore, non animi causâ perscrutasse, & hoc Populo Romano præstitisse non sibi.* Ego verò iam dudum in rebus Anatomicis spectatus, quas per annos triginta in hac Academia operose ac studiosè tractaui, non ad aucupandam ex hoc labore gloriam, non animi recreandi gratiâ, sed operis Anatomici amorè, ac publicæ vtili-



foi façoli, *Democritum* intelligens, rebus Anatomicis additum. Homines, inquit, quærunz veritatem in Microcosmicis suis, non in mundo maiore.

quærent veritatem in Microcosmicis suis, non in mundo maiore.  
 Refabulat antiquitas sphingem, horrendum & crudele monstrum, in Phycæ colle  
 residens, singulis hominibus prætercuntibus obscura ænigmata proposuisse, quæ  
 capiebat à Mulis. Quicumque solvere nequibat, sphingis vnguibus laniabatur.  
 Erat autem fato statutum, tum esse sphingimoriendum, cum quæ propositum æni-  
 gma fuisset interpretatus. Inter varia ænigmata illud difficillimum Thebanis enu-  
 cleandum proposuit,

*Qui Bipes, & Quadrupes foret, & Tripes, Omnia solus.*

[illegible]

Anatomici affectum. Omnium rerum cupido languescit, cum facilis occasio est, & differimus tanquam sepe visuri, quod datur videre quoties velis cernere.

Porro ad comparandam nostræ naturæ & conditionis notitiam, Dcus nobis sup-  
peditauit artem Anatomicam, donum potius Dei, quàm hominum inuentum, cui-  
us ope & ductu homo plus inuenit, quàm in seipso cognoscebat. Vnde peritior &  
prudenter factus, modos excogitauit & inuenit, quibus assidæ naturæ humanæ  
succurrere queat. Idcirco Medicis ex hominis cognitione maior vtilitas deriuat-  
ur, & accedit: cum vniuersa medendi scientia ipsius Anatomæ ambitu coëreatur.  
Nam si quis eam quæ à partibus fumiatur indicationem ademerit, nihil obstat, quo-  
minus aliquis Medicinam vniuersam sex mensibus cum *Thessalo*, sed etiam sex diebus totam  
perdiscat, authore *Galeno*, lib. 3. meth. med. cap. 20. Quippe curandi ratio, pro labo-  
rantium partium natura diuersa est, eodem authore. Iplemet *Hippocrates* lib. de flatibus,  
morbos specie causaque conuenire, solis dumtaxat partibus affectis differre statuit.  
Vnde patet cognitionem partium corporis humani Medico summè necessariam esse  
ad curationem morborum, & ex Anatome repetendam esse. *Galenus*, libro quod  
optemus Medicum sit philosophus, inter causas ignorantie Medicorum, qui ad apicem  
illum doctrinæ *Hippocratis* aspirare nequeunt, hanc præcipuam causam assignat, quod  
ille naturam corporis, quam totius Medicinæ ordinis principium statuit, optimè  
cognoscendam esse præcipit. At illi in ea re ita studium ponunt, ut non modo vili-  
us ex partibus corporis substantiam, aut formationem, aut magnitudinem, aut nex-  
um, sed ne posituram quidem uoscant. Proinde errores *Asclepiadæ* non aliunde  
manant, inquit *Galenus*, quàm ex contemptu Anatomæ. Hic enim *Herophilus* dis-  
sectiones respuebat, *Erasistratus* Anatomicum condemnabat, huic sordebat *Hippo-  
crates*. Denique veterem Medicinam, propter studium Anatomicum, mortis medita-  
tionem appellabat.

Addo ex *Aristotele*, sub finem lib. 1. de partibus animalium, ad commendationem  
huius doctrinæ Anatomicæ, scientiam animalium & stirpium, cælesti doctrinæ longè  
præstare, quoniam stirpes & animalia propter consuetudinem melius, quàm cæle-  
stia illa cognoscimus. Cum enim Ars Anatomica sensibus ipsis regatur, quis negaret  
esse certissimam? quia sensus non possunt refelli. Quamuis homo viuens anima ra-  
tionali præditus, sit incomprehensibilis, ex doctrina Sceptica, ac proinde nulla pos-  
sit eius haberi certa cognitio: Tamen hominis corpus, quale spectant Anatomici, ut  
res determinata potest comprehendi. Audite quæso, non subtilem, sed valde futi-  
lem & absurdam, de hac re *Sexti Empirici* Philosophiam. Non est omnino ciuf-  
modi, ut possit comprehendi. Iam verò ex iis qui quæsierunt, de notione dubi-  
tauit *Socrates*, ignorans quidnam ipse esset. Nescio, inquebat, an sim homo, an  
alia fera Typhone magis multiplex ac varia. Dubium istud Scepticis, & *Socra-  
ti* exemisset Anatome, si ad eam tanquam ad veritatis regulam confugissent. Vos  
igitur omnes quibus meliore luto finxit præcordia Titan, ad naturæ humanæ  
cognitionem, quæ per Anatomem comparatur, iterum inuito & exhortor. Ne  
vobis obiciatur, quod *Propheta Regius* singulis hominibus exprobrauit: *Homo  
cum esset in honore non intellexit, comparatus est iumentis, & similis factus est ei*. Nam  
si studium Anatomicum Medicis proprietarium, cæteris vsufructuarium, spernitis,  
magno Artis Medicæ detrimento, & artificum infamia: id vobis contingeret, quod  
priscæ narratur fabulæ, apud *Nicandrum in Theriacis*. Iupiter mortales dono perpetuo  
iuuentutis beatos reddiderat, defatigati donum istud Asini tergo imposuere, qui  
dum siti magna premitur, caudam trahente serpente, ab eo precibus obtinuit, ut  
placide biberet, securus ab omni molestia, modò grande hoc depositum excuteret,  
eique committeret. Inde dono iuuentutis callidè surrepto versipelles fruuntur ser-  
pentes, ac per inertiam ac vecordiam, miseros mortales senium malorum ferax infe-  
stat & aggrauat. Ut igitur donum istud immortalium deorum Medicis concessum,  
ignorantiâ quorundam neglectum, & quibusdam ignaris hominibus demandatum  
recuperemus, strenuè & sedulo rebus Anatomicis incumbendum, adhibita fre-  
quenti corporum humanorum dissectione. Nam hominis structuram non possum  
rimari, nec admirari, nisi per alterius consimilis inspectionem & compara-  
tionem.

*Plato in Timæo* *Loacrofi* ad vniuersi huius descriptionem cognoscendam, tam ne-  
cessariam esse iudicat similitudinem considerationem, ut apertè fateatur, fieri non posse,

vt explicatio structuræ huius mundi perfectè cognoscatur, absque rerum confirmatiliū comparatione. *Est in Phædro*, de Anima hominis scripsit, illam penitus non posse cognosci, nisi spectetur in altero quopiam, cui analogia respondeat. Sic purpura ad purpuram collata facilius dignoscitur, *ut est in Proverbiis*. At non est vnum vni, tam simile tamque par, quàm omnes inter nosmetipsos sumus, ait *Tullius*. Propterea qui seipsum nosse cupit, & hominis structuram exquisitè notam & perfectam habere, in cadaueribus nocentium & suspensoꝝ hominum se diligenter exercebit, quæ ab æquissimis iudicibus ad vsum Anatomicum Medicis conceduntur, ne suspenſa terram contaminent, vt Deus præcepit *cap. 21. Deuter.* *Quando peccaveris homo, quod morte plendum est, & ad iudicatus mortis appensus fueris in patibulo, non permancebis cadauer eius in ligno, sed eodem die sepelietur, quia maledictus à Deo est qui pendet in ligno, & nequaquam contaminabit terram, quam Dominus Deus dederit tibi in possessionem.*

Verùm, vt breui peritus Anatomicus euadas, doctos & peritos in hac arte Magistros docentes auscultabis, secantes obseruabis, & demonstrantes spectabis. Hac enim methodo compendiosa plurima comprehendes, quæ diuturno & improbo secandi labore, atque assidua librorum Anatomicoꝝ lectione tibi comparanda forent. Quare cùm in artibus quæ manum & inspectionem desiderant, diuersa hominū ingenia perpendo, mirari subit, cur alia sint sublimia & perfectæ, quibus nihil ignotum & occultum esse potest, eorum quæ ad artem spectare videntur: Alia sunt humilia & imperfecta, multis erroribus obnoxia, quæ nonnquam artis perfectionem assequuntur. Hanc ego causam cum *Galeno* agnosco, quod quædam sint *imperfecta*, ab optimis magistris formata & instituta, alia sint *imperfecta*, quæ sine præceptoribus artis præcepta didicere, propterea non insciè illud vulgo dictum est, inquit *Galenus*, optimam esse doctrinam, quæ viua voce traditur, neque quemquam ex libro Nauclerum, aut alterius artis opificem euadere, libri etenim sunt iis, qui antea eruditi fuere monumenta, non rudium aut idiotarum doctrina perfecta. Eam ob rem moneo alibi *Galenus*, in operibus artis sapius errare, qui nunquam præceptoribus vbi sunt, si qua in arte necessaria est sub præceptoribus institutio, potissimum in Medicina, maior eorum necessitas adest, cùm neque ligna, neque lapides, vel coria sint artis Medicæ materia, vt aliarum in quibus experiri & exercitari multis modis impune conceditur: At in Medicina quæ pro subiecto habet hominē, de cuius vita conseruanda agitur, non licet vt in bello, his peccare: ideoque priusquam tanta librorum suppellex & multitudo nobis suppetere, ex quibus nonnulli sperant fieri Medici, cogebantur qui ad hanc artem aspirarent, ab ipsius Medicis artis præcepta repetere. *Galenus*, quamuis à patre in humanioribus literis ad decimum quartum ætatis annum eruditus & enutritus fuerit, ab eoq; tempore ad philosophiam perductus, vbi se dedit Medicinæ, præstantissimos in hac arte professores atque præceptores, per omnes Græciæ regiones inuestigauit, adiuit, & audiuit. Postquam in patria, *Pergamo*, sub *Satyro*, peritissimo Anatomico sedulam dedisset operam rebus Anatomicis, varias & longinquas peregrinationes terrâ marique suscepit, vtr in *Smyrna*, *Pelopem* : *Corinthi*, *Numesianum* : In *Alexandria* Medicos rebus Anatomicis clarissimos auscultaret, & in vnaquaque secta præstantissimos præceptores adhibuit. Inter Medicinæ partes, quæ præceptorū operâ & institutione indigent, omnium iudicio censentur Anatome, Chirurgia & Pharmacia, quæ olim erant artis Medicæ primordia & tyrocinia, in quibus pueros domi à teneris annis erudiebant. Nam ex *Hippocrate*, *modum* in Medicina necessaria est, huicque à teneris assuescere multum est: Idcirco vndecimo ætatis anno Medicinæ sacris pueros initiabant, eisque Anatomia, Chirurgia, & Pharmaceutica, quæ sensatam apodixin requirunt, demonstrabant. De Chirurgia & Anatome quas docebant pueros, testem habemus *Galenum*, *lib. 2. admin. Anatom. cap. 1. & lib. 1. de articulis, Comment. ad periculis. 23.* De Pharmacia, *Xenophon lib. 2. de pædia Cyri* Testatur pueros eorum vim, quæ è terra nascuntur ediscere, quò vtilibus vterentur, & à perniciosis abstinere. Nunc verò videntur discere, vbi mala quàm plurima perpetrent. Sed vbi matura doctoluerat ætas, scilicet exactis septemdecim circiter annis, subtiliorem illam Anatomē, quæ parrium causas inuestigat, & exponit, totamque Physiologiam comprehendit, arque causas morborum, qui manu tractantur, & vsum medicamentorum ad curationem morborum edocebat: Nemo etenim doctus fieri potest Anatomicus, neque peritus Chirurgus & Pharmaceuticus, nisi ductorem & præceptorem habuerit, qui veluti mann ducat, & digito indicet, tales partes corporis humani ita nominari, tales



operationes manu sic perfici, tales herbas, & talia medicamenta sic appellari, eligi, preparari & misceri. Quare *Galenus*, lib. 3. de *locis affectis*, cap. 3. monet neruorum cognitionem non esse diuinantium moro à diis petendam, sed ab experto Anatomeo discendam.

Proinde *Aluianus* noster præceptor, lib. de *articulis*, prudenter admonuit, Chirurgiam scriptis exquisitè mandari non posse, sed ex his quæ scripta sunt, dumtaxat formam ac imaginem concipere, & haurire licet: quasi diceret vanum esse laborem eorum, qui libris Chirurgicis inuigilant & incumbunt, vt Chirurgiam ediscant, nisi præceptoribus vtantur, à quibus operandi modos debent accipere.

Sed in tanta discipulorum ingratitude, quæ nunc vexat docentes, quotusquisque docendi munus subire velit? *Hippocratis* quidem zuo tantus erat erga discipulos præceptorum amor, ac veluti *numina*, vt discipulos tanquam liberos diligere, vicissimque discipuli præceptores parentum loco haberent, vt liquet ex sollemnium iareinrando *Hippocratis*, cui præstare fidem solebant, qui Medicinæ sacris adijittebantur, vti testatur *Uianus Hieronymus*, & *Scribonius Largus*. Audite quæ microsanctum illud *Hippocratis* summi Dictatoris, edictum, vestris animis penitus insculpendum. *Tuto & ex scriptis spondeo præceptorem, qui me hanc artem eduxerit, parentum loco habituram, rique ad uitam, tam etiam ad usum necessaria grato animo communiaturum & suppeditaturum, etique posteros apud me eodem loco, quò Germanos fratres fore, eosque si hanc artem addiscere voluerint, absque mercede & syngrapha educturum.*

*Di maiorum umbra, tenuem & sine pondere terram,  
Vernansque camas, & in urna perpetuam Vcr,  
Qui præceptorem sanctis voluere parentis  
Esse loca.*

Sed ô tempora! ô mores, quibus hodie viuatur! tanta nunc viget in Medicina discipulorum erga præceptores ingratitude, vt pudeat profiteri per quos profecerint, nec alios magis oderint, quàm præceptores, adeo vt meritò magistri querimonia apud *Terentium*, inter Medicinæ professores locum habeat.

*Contrini in docendo vitam, atque aetatem meam,  
Nunc exalta atate, hoc fructu pro laboribus, ab his fero  
Odium.*

Hoe vitij genus videtur Medicis insitum & congenitum, vt perpetuo inter se dissideant odio, & inuidentia pliusquam caninâ sese mutuo mordeant, atque conficiant, præsertim si in eadem vrbe eademque vicinia morentur, quia *seculus sigula inuidet, mendicus mendico*: sic nulla supra Medicorum inuidiam maior inuidia, quàm *Hippocrates*, sui sæculi & sapientissimus & eruditissimus ab ipsis Medicis expertus est, quoniam eiusdem artis artifices, vt ait ille, testimonium de eruditione alterius probare nolunt, inuidia enim obstat.

*Artem, & opes, & rara, frequens donabit amicus,  
Qui velit ingenio cedere, rarus erit.*

Quæ tamen inuidia inter Medicos pragmaticos, lucriperas, quibus conuectare iuuat prædas, & viuere raptò, vtcumque toleranda esset, quia nunc querenda pecunia primùm, virtus post nummos: nisi transiret ad scholas, & inter docentes, & discipulos foueretur. Nam nonnulli maleficiati, sed bene faginati, instar pullorem aduersus matrem recalcitrantium præceptoribus insultant, professorem linguam obiciunt, & tanquam munus prædagogicum vituperant, quod potius laudare deberent: Nullum quippe munus Reipublicæ adferre maius meliusve possumus, quàm si doceamus, atque erudiamus iuuentutem, ait *Tullius* lib. 2. de *Distinctione*. Sic *Hippocrates* multos discipulos habere voluit, quos in pestilentis per Græciam grassantibus, in diuersas regiones mittebat, vt publico inferuissent. Nihilominus tamen *Galenus* coactus fuit à docendi officio prius abstinere, cum *uideret* à nonnullis haberetur, & operibus artis suam industriam probare maluit, quàm in docendi munere diutius perseuerare & consensescere: Itaque,

*Si scirem doctar vdissem Inve sorores,  
Nomina caliori perniciofa suo,  
At nunc tanta meo comes est insania morbo,  
Sæxa memor refero, rursus ad illa pedem.*

Quamvis ab his laceffitus fuerim, quibus lac Anatomicum instillavi, & huius artis arcana parefeci, ab illis verò fannis & conuitiis clanculum exceptus, quos non in grege discipulorum habui, sed propriâ ac peculiari curâ direxi ac formavi: dum me secantem cadauera in his scholis, lanienam exercere iactitant, & insolenter exprobrant: dum me Chirurgi partes obire dicunt, cui ex officio incumbit Anatomem administrare, atque demonstrare: sufficere Doctori, si de rebus Anatomicis ex commentario, & de re sibi ignotâ publicè Phyci more concionetur. His & similibus conuiitiis quantumvis impetitus, non desinam exemplo *Galeni*, qui generosè contempsit aliorum Medicorum inuidiam, de Republica Medica bene mereri, docendo, & demonstrando Anatomica: securus contra lycophantas & vitiligarores istos, verè laudis expertes, quorum scœmmata sinam præterfluere. *Galenus* non fuit alia de causa, quàm ob assiduam Anatomæ studium exosus, & conuitiis exceptus, quod affeclaret gloriam artis Anatomicæ supra veteres Anatomicos, dum multa innexit & descripsit in suis libris *Anatomicis*, quæ vel omnino non extare, vel quæ prioribus Anatomicis ignorata non fuisse crederent. Tandem, cùm nullus esset conuitorum finis, ab amicis compulsus, publicè multis diebus demonstrare cœpit, se nusquam falsa tradidisse, sed prioribus Anatomicis indicta & ignorata multa tradidisse.

An laniam & thearricam carnificinam exerceo, dum propria manu seco cadauera? quod eorum opinione vile ac seruire opus est, proprium Chirurgi ministerium. Fateor equidem hoc opus nostris discipulis & auditoribus magis fructuosum fore, quàm nobis gloriosum. Sed nihil sordidum & indecorum, quod salutis humanæ causâ suscipitur. *Epaminondas* munus sibi demandatum, quod erat sordidum, ac ignobile, reddidit splendidum & ambitiosum. Potestne Medicus de rebus Anatomicis perfectè disscere, nisi eas diligenter oculis contemplarus fuerit, & solerti manu indagauerit? videnam cognitionem & inspectionem repetet? an ex pictura inani & fallaci? An à Chirurgo, qui tunc Medici præceptor erit, ex cuius ore & manu pendebit, & sapiet? Quid si Chirurgus rudi notitia rei Anatomicæ tinctus & imbutus fuerit, non erit Medicus doctior ipso Chirurgo? Nam si Medicus ex librorum Anatomicorum lectione quædam proponat, supra captum & ingenium secantis Chirurgi, ista confectum negabit extare, quamvis ab aliis reperta & producta. Si Medicus de ea re dubitet, aut urgeat demonstrationem, Chirurgus scalpellum offerret, & rogabit, vt manum operi admoveat, & ipse oculis & manu, quæ profert inuestiget. Sic honestè inuitatus Medicus, aut acquiescere debet, aut rem ipsam peruestigare, quod non poterit exequi, nisi in dissectionibus manus exercitatus habuerit.

Merito de rebus Anatomicis dicere possum, quod *Plinius* de re herbaria, quare non plures herbarum nascantur, causa est, quod agrestes, literarumque ignari experientur, aut qui soli inter illas viuunt. Præterea securitas querendi, obuia Medicorum turba. Itaque non potest Medicus res Anatomicas docere, neque demonstrare, ac perfectè describere, nisi fuerit in secandis cadaueribus diu multumque exercitatus. Ac sanè, doctrinæ Anatomicæ possessio & professio Medicis est proprietaria, Chirurgis tantùm vsufructuaria: Nam apud *Aegyptios* libri circumferebantur à Mercurio conditi de constructione corporis humani, qui solùm discebantur ab illis Medicis, qui erant *ἰατροί*, inquit *Clemens Alexandrinus*, pallium enim gestabant Medici elegantiores, distincti à vulgo Medicorum. *Galenus* Romæ res Anatomicas tractabat, absque Chirugi ministerio, quamvis Vrbs ipsa Chirurgis abundaret, quibus res Chirurgicas pro more ciuitatis commisit, quas in patria sua solas exercebat. Dum isthæc conuiuia æquo animo perferre apud me constitui, me recreat & consolatur, *Lyrici* Poëta suauis illa recordatio,

*Inuidiam placere parua virtute relicta,  
Contemnere miser, vitanda est improba Siren,  
Desidia, & quicquid vitâ meliore parasti,  
Ponendam aquo animo.*

Eam ob rem Manum & Mentem vobis deuotissimam in administrandis Anatomicis offero, atque puliceor, hoc solo præmio contentus, quod sapiens *Thales* poscebat à *Mandrato Priensi*, quèr cùm noua quædam & subtilia de cælo & Solo docuisset, offerente illo mercedem, quam & quantam vellet: Hoc pro omni mercede estis, inquit, vt quoties apud alios ista proferes, *Thaletem* non ceteris anshorem. Quæ enim alia nobis merces quàm Honos ex hoc studio Anatomico valde laborioso, quem si præ-

Na ij

sens ætas denegarit, cum *Metrodoro* ad posteritatem prouocabo. Paucis natus est, qui populum suæ ætatis cogitat, ait *Seneca*, multa annorum millia, multa populorum superuenient, ad illa respice, etiamsi omnibus tum viucentibus silentium liuor indixerit, venient quæ sine offensa, siue gratia iudicabunt. Sed finio nostram quetimoniam aduersus discipulorum ingrati tudinem. Pergamus ad laudationem victimæ Anatomice, seu corporis Anatomici.

Cum spectaculum diuinitatis nullum maius esse queat quàm ex homine, sic nulla pietas maior elucet, quàm in homine.

Vos igitur, qui spectatores fuistis corporis in vestram vtilitatem resecti, eiusdem animæ apud Deum bene precari debetis, vt in beatorum sedibus æuo sempiterno fruatur. Id à vobis reposcunt manes cadaueris, quibus parentare, atque iusta hæc persolvere pietatis officium est. Quamuis enim terrenum hoc corpus dum viueret, telluris inutile pondus exiit, & tanquam carcinoma, membrumque vitiatum ab hominum consortio resectum fuerit, suspendio tamen exaltatum, vt aëris ventilatione ab inquinamenti repurgaretur, ac ipsa mortis specie glorificatum, moriendo magis profuit, quàm viuendo, vt ille nebulo furcifer gloriabatur, qui in *Mensensii Academiæ* suum corpus iampridem Anatomice delinauerat. Etenim suspensus vitæ priuatus, evisceratus, atque exinanitus fuit, vt admirabilem vestri corporis structuram ex aliena cognosceretis. Quippe omnes similes nascimur. *in vniuersum* in *ipsum* formatur, inquibat *Empedocles* apud *Platonem*.

-----laniatum corpore toto

*Deiphobum vidisset, lacerum.*

Atque ita disceptus, varias Medicinas suppeditat ad sanitatem aliorum conseruandam. Ex adipe pretiosus liquor paratur, sedandis doloribus efficacissimus. Ossium medulla tabidis membris certo experimento auxiliatur. Elixiorum ossium spuma supernatis faciei maculas delet & abstergit. Ex cadauetibus suspensorum optimam confici Mumiā affirmant auctores. Scribit *Plinius* extare commentationes *Democriti*, quibus docet hominis noxij ossa de capite plus prodesse quàm alterius. Et *Artemon* ex caluaria suspensi hominis Catapotia commendabat, contra canis rabidi morbum. Et à recentioribus Medicis cranium puluerum epilepticis conferre perhibetur, ossa crurum cremata sanguinis profluvium sistunt, & laxiorem aluum adstringunt, ex *Galeno*. Crines suspensi eum inuisibilem reddunt, qui gestarit, si credimus *Mixaldo*. Nec vtilitate sua caret laqueus strangulatorius, auctore *Plinio*: Nam temporibus circumdatus, dolorem capitis sedat. Frustrum paubuli valet ad amatoria, & positum in columbario sanas & integras seruat columbas, teste *Palladio*. Ossa verò terfa & mundata, non tantum ad mortis meditationem conferunt, verumetiam ad etudiandos alios in rebus Anatomicis inferiunt. Quinetiam peritis Anatomicis rerum obliuam memoriam renouant: idcirco merito possem ad Anatomem præsensque institutum referre, quod *Hippocrates lib. de Insomniis* edixit de *anatomia*, siue resolutione cadauerum in sua principia, *ut in vniuersum* in *ipsum*, & *in vniuersum*, & *in vniuersum*. A mortuis alimenta, incrementa, ac semina suppeditantur ad vsum medicinæ. Cùm igitur tot sint, ac tantæ vtilitates suspensi hominis, corpus istud ad vestram vtilitatem resectum, vestra humanitate & pietate dignum erit, quod apud vos aliquam inueniat gratiam. *Respha* concubina *Saulis*, vt legiur *lib. 2. Regum*, miserabilem sortem suspensorum amarè fleuit, & tandiu eorum corpora custodiuit, donec stillaret aqua de cælo super interfectos. Vos pari humanitate affectos esse decet erga suspensum hominem, cuius corpus per octo, vel nouem dies obseruauistis, ab eo nefas est discedere non inuocato Spiritu sancto, vt roris cælestisq; imbris modo, super hoc cadauer depluens, ac delapsus, dignum efficiat cum anima cælesti gloria in die resurrectionis, *ut in vniuersum* in *ipsum* in *ipsum* in *ipsum*, & *in vniuersum*, & *in vniuersum*, & *in vniuersum*. Maxima ergo & sceleratissima peccata Deus expiat, & purificat, tutelæque nostra existit, ait *Hippocrates, lib. de morbo Sacro*. Qui verò neglectum habuerit hoc cadauer ad vestram vtilitatem resectum, caueat ne propter hanc inhumanitatem, vel potius impietatem, vtrices Dei manus experiatur. De hoc pietatis officio neglecto, & consequuta Dei vindicta, elegans extat in *Anthologia Epigramma*, imitatum, & sic expressum ab *Ausonio*.

*Abscissa in trini inhumati glabra iacebas*

*Testa hominis quodum iam cute caluitum.*

*Fluerunt alij, fletu non motus Achilles,  
Insuper & silectis verbere disscunt:  
Eminus ergo isto rediit lapis ultor ab esse,  
Auctorisque sui frontem oculosque percut.*


Interea præuideo ex hoc Opere, quod mihi multis vigiliis & laboribus constat, facilius inuisurum aliquem, quam imitaturum, quod de sua tabula metuebat *Zennus*, apud *Plinium*. Sed ab ingenuis & cordatis Medicis, quibus placere studeo, id opus Anatomicum ut spero, non sine gratiarum actione laudabitur, & commendabitur. Reliquum erit omnium vestrum, vel eorum qui audierint hoc opus, omitta quod dem artis, veniâ dignari, inuenta multâ prosequi gratiâ, ut de se loquitur *Aristoteles*, lib. 2. *Elenchorum*, cap. ult. Dialecticis suis sermonibus finem imponens hæc clausulâ, *καὶ οὐδὲν ἔτι ὑμῖν, ἢ ὅτι ἀναρτήσιν ἕξουσιν αὐτὸς ἐπὶ τῇ ἀνατομικῇ τῆς παλαιᾶς ἀρχαίας, καὶ ἐν ἀνθρώποις καὶ ἐν ζῴοις ἔστι.*

*Forſitan hunc aliquis verboſum dicere librum  
Non dubitet, forſan multo præſtantior alter  
Pauca reperta puiet, cùm plura inuenerit ipſe.  
Deſes & impatiens nimis hæc obſcura putabit.  
Pro capto lectōris habent ſua ſcia libelli,  
Sed me iudicij non paritet, hæc bene vobis  
Commiſi, quibus eſt amor & prudentia iuxta,  
Et labor in ſtudiis ſemper celebratus inheret.  
Vos ſequar, in veſtro ſatis eſt examine cantum.*

Ex Terren-  
tiano Ma-  
ro.

Finis Anthropographiæ.





I N  
LIBRVM GALENI  
DE OSSIBVS.

AD TYRONES COMMENTARIVS  
Didacticus, & Apologeticus, pro Galeno,  
Aduersus Nouitios & Nouatores  
Anatomicos.

*SIMIÆ OSTEOLOGIA, VT DISCRIMEN  
Ossium Hominis & Simia innotescat.*

OSTEOLOGIA EX HIPPOCRATIS LIBRIS  
eruta, collecta, & in ordinem digesta.

PER IOANNEM RIOLANVM, FILIVM,  
*in Academia Parisiensi Anatomæ, Pharmacis, & rei  
Herbariæ Professore Regium.*







# PHILIA TRIS

## LECTORIBVS,

### ET AUDITORIBVS SVIS,

## IOANNES RIOLANVS.

*Cum me Phæbus amet, Phæbo sua semper apud me  
Munera sunt Ossa, & suæve rubens hyacinthus.*

**M**ibi provincia docendi Anatomen obtigerit, totus sum in ossibus conuoluentis, & contemplandis, atque vobis caninum istud ferculum offero. Toto, an serio, dubitabit aliquis. Cum enim Rex Alexander lusam sibi quæret, sportulam ossium plenam Diogeni dono misit, ut refert Lærtius, accepit eam Cynicus cum ista responsione. Caninus quidem hic cicibus est, sed donum haudquaquam regium. Si quis fastidiosus & respuat Ossium hoc munus, tanquam horribile, sordidum, ac indignum honestis viris, ad canes ablegandum, is manifestè declarat suam insentiam, & animi mollietiem, indignam Medico, qui larnarum ossuarum terriculamentis haud debet commoveri: quamvis Aristoteles, sub finem lib. 1. de partibus animalium scripserit, ea ex quibus constat corpus humanum, putà Carnes, Ossa, & reliqua, non sine quodam horrore & saltitio inspicì. Apolcius Magia accusatus, quod scelerum sibi fieri curasset, ita se tuctur in Apologia. Tertium mendacium vestrum fuit, macilentam, vel omnino emiseratam formam diti cadaueris prorsus horribilem & carnalem, lego excaernem: quod si compertum habebatis, adeo evidens signum de agia, cur mihi ut exhiberem non denunciaſti? Et paulò post: quod me atant ad Magica maleficia, oculta fabrica ligno exquisitissimo comparasse, ut cum sit secleri forma, turpe & horribile tamen impendio colere, & Græco vocabulo nuncupare *tanina*, Roma cum Odci fundamenta tot veterum sepulcrarum sacrilega collocauerint, quingentorum fere annorum ossa adhuc succida, & capillos olentes populos exhorruit, inquit Tertullianus, lib. de resurrexione. Nec tantum Ossium conspectum & contactum veteres reformidabant, verametiam loca polluta & imman-da reddi credebant, si ossa humana reciperent: sic Iostas, Rex Indarum, cum vellet idolorum templa contra Dei legem exstruèla profanare, & omnem locis religionem adimere, mortuorum Ossa in illa intulisse scribitur, lib. 4. Regum cap. 23. Obseruo tamen diis olim ossa sacrificata fuisse, & Os Sacrum, inuè ipso, inde nomen traxisse, quod in sacrificiis pro cæteris ossibus offerrebat, inquit Meletius, ex quo dixit Menander, *ὡς ἐν ἱερῷ ἅπας δίδωται*. Fingit Heliodus in Theogonia, Prometheum studio affectato fallendi Iouem, bonis carnes ab ossibus separasse, & unumquodque cario dolosè contexisse, ut eligeret, quod sibi liberet. Iouem verò non ignarum doli, de industria opertum illud ossium accepisse, & ab eo tempore ossa diis offerri solita.

Εκ τῶ δὲ ἀπολείπειν ἐπὶ τοῖς φῶλ' αἰ. Ἰφύτων,  
Καίτοι' ὅσα λείπειν ὑπέρτατον ἐμφανέτα Ζεῦ.

*Non igitur sordere debet Officium hoc ferculum, quod vobis apponitur, si diis placent ossa, si diuinus Hippocrates Apollini, Medicina parentis, cadaveris humani craterem ossum dicat. Quamuis ossa sint canum suauissima fercula, quidni veitra? si Ely estis Æsculapij, eiusque Orgiis initiati. Fingunt enim Poëtæ Æsculapium, à capra & cane enutritum fuisse, propterea hinc comitem, sine adstitem canem dederunt, quia sagax & ingeniosum est hoc animal, heri sui observantissimum. Et significarent Æsculapij filius Medicina studiosi, conuenire sagacitatem, & erga præceptores cultum & observantiam.*

*Præterea, Egyptij cum vespillonem, sine pollinilorem, & morticina stratiem designare vellet, canem pingebant. Quapropter vos Anatomica doctrina delitios, tanquam canes Æsculapij humanis ossibus inescabo, & alliciam ad studium Anatomicum, tanquam epulum Philosophis inmundissimum, sed Medicis utilissimum. Prima diuinitas Egyptiorum Anubis, parens Isidis & Orisidis, quibus innocentia Medicina tribuitur, per canis effigiem signata fuit. Xenophon venationis & canum inuatum Apollini Medicina apud Græcos inuentari assignauit, qui pariter canis munere Cheironem præstantissimum Medicum afficit. Quorsum ista propono? ut intelligatis Apollini, Æsculapio, Cheironi attributos fuisse canes, quibus significatur Medicos in venatione & peruestigatione morborum & remedium, canum venaticorum sagacitatem & fidelitatem imitari debere. Tullius Philosophos speculatores, & canes venaticos rerum naturalium appellat. Verum canes ossibus succidia & medullis delectantur. Est enim medulla suauissimum edulium, & gula oblectamentum: quanam ergo voluptas & oblectatio in aridis & emedullatis ossibus, qualia vobis offert? Sed pro medulla tale doctrina succulentia & medullosa condimentum adhibebo, ut etiam nascentem stomachum allicere, & oblectare queat.*

*Forſan aliquis nostros sermones tristes & ferales indicabit, more Præficarum, quæ conditæ mortuos collaudant, & eodem sarcasmo nos excipiet, quo Cato veteres Philosophos perſtrinxit. Vos Philosophi mera estis mortualia glossaria, namque colligitis lexicidia, res tetras & inanes ac frivolas, tanquam mulierum voces Præficarum. Lubenter patiar ob assiduum artis Anatomica studium, Mortuale Glossarium me vocari, non mortuum & elingue, sed vocale, omnes Medicina studiosos ad studium Anatomicum inuans & conuocans. Insuperissimam Asclepiades, è Rhetore factus Medicus, maligna garrulitate veterem Medicinam cunctis inuisam & exosam reddere tentauit, dum Hippocratis, eiusque saculi doctrinam contumeliosè Mortis Meditationem appellauit, *Deinde paritèr dicitur mortuum inquit, cap. 4. lib. de Venæ sectione aduersus Erasistratum. Cum enim præcipuum Hippocratis studium fuerit, in ossium natura, figuris, & positionibus explorandis, ad eorum fracturas, & luxationes restituendas, inter ossa & cadavera perpetuò versabatur, de mortis effigie, nempe scieto humano assidue cogitans. Atque ut extaret æternum Ossicologia à se restituta ac inſtituta monumentum, Apollini Delphico, scietum humanum are fabricatam reliquis consecrauit, teste Pausania, lib. 10.**

*Nostri Præceptoris exemplo, omnes Medicinæ studiosos ad hoc studium inuito. & exhortor, quod multis rationibus utile & necessarium esse demonſtro. Nam ad bene beateque viuendum sapiens obiecta mortis imago, virtutis speculum & incitamentum oris. Memorare nonſima, inquit Ecclesiastes, cap. 10. & in æternum non peccabis. Non alia sunt hodie porum hominum spectacula, in qua nollu & interdum defixos habent oculos. Nec alio ſine veteres Egyptij in conuiuiis publicis scietum hominis aſſentabant, ut assidua mortis cogitatione, à vitiis reuocarentur. In conatione, ſine ſtibadio, Cæſaris Domitiani, quod propter exiguitatem ipſe vocabat Micam auream, è tholo pendebat cranium, ſine larna qua Martius admoneret, ut eſt apud Martialem lib. 2.*

*Mica vocor, qua ſim cernis conatio parna,*

*Ex me Caſareum ſuſpicu inde tholom?*

*Frangere toros, pete vina, roſas cape, tingere nardo,*

*Ipſe iubet mortis te meminiffe Deus.*

*Sepulchra dicuntur Monumenta, & ideo ſecundum viam poſita, quò præteruntes admoncant, & ſe fuiſſe, & nos eſſe mortales, ait Varro, lib. 5. de lingua Latina. Eam ob cauſam omnis ciuitas, omne caſtellum, ut eleganter docet Diuus Chryſoſtomus, ante ingreſſum ſepulchra habet, ut qui ingreditur in ciuitatem, qua imperat, & ſtoret diuitis aliſque dignitatibus, priuſquam intueatur, quod animo concipit, vidoat humana conditionis ſortem. Ante portas ſunt ſepulchra, ante agros ſunt ſepulchra, utique ante oculos occurrit noſtra humilitatis Schola, ut intelligamus id, in quod tandem reducimur. Quapropter qui poſſitam habet ob oculos mortis effigiem, nihil inſepe & ſtagitiſſim indignumve homine pio & Chriſtiano perpetrabit:*

*Scriptum est à Platone recte philosophari, esse mortem meditari. Sic Pythagoras, philosophiam mortis meditationem appellabat, quod docere prohibitus fuit à Ptolomeo Rege, quia multi eius discipuli radio vite præsenti, sibi mortem inferebant, ex Clemente Alexandrino. Vita sapientis, inquit Divus Hieronymus, est mortis meditatio. Vincere tota vita discendum est, & quod fortasse magis miraberis, tota vita discendum est mori, ait Seneca. Vixit memor mortis tanquam brevis transiurus, sic adversus eius truces minas, & horrendos aspectus impavidum & constantem animum tibi comparaber. Id autem ab Osteologia, Ossium humanorum speculatione consequi licet. Vobis igitur scelestam humanum spectandum offere, ut simul cum pietate, sancta & salubri mortis meditatione, artis Anatomicæ fundamenta ediscatis. Ad hoc spectaculum per aliquot dies oculos & animum advertite, quatinus mortalitas huius simulachri figuras & lineamenta radio describam, & demonstrabo. Sed ne vestris animis alius insideat & hæret impressa mortis imago, interdum ab his cogitationibus & sceleribus studiis animum relaxate, ne quibusdam melancholicis simile infortunium accidas, quod Phayllus Phocensum dux expertus dicitur, apud Pausaniam lib. 3. Is cum attentius scelestum animum Hippocratis inspexisset, se similem factum somnians: Inde paulo post marce contabescens, somni euentum complevit. Eam ob rem ne vos diuturno, & nonnullis formidabile mortis spectre terram, instar illius Cerberi, qui apud inferos,*

*Ossa super recubans antro semesa cruento,*

*Eternum latrans exanguis territat umbras.*

*Pancis expeditum & abstinam hanc Osteologiam. Adiste oculis & auribus, & instar Cleanthis Philolophi, qui Ossibus inscribebat, quæ à Præceptore Zenone dicebantur. In ipsa Ossibus, quæ dicturus sum diligenter observabis, & Galeni librum de Ossibus ad Tyrones cum meo Commentario coniungetis.*

*Sed ut novam de Ossibus doctrinam, quadantenus à vetere, vera quidem, sed innumeris difficultatibus obscura discrepantem discernatis: Brevem & perspicuam Osteologie Ilagogen ex præceptis recentiorum Anatomicorum, meisque observationibus conditam & continuatam prius legite. Hæc viam sternet, ac præparabit ad librum Galeni, multis contrariis implicatum, quas omnes in meo Commentario solutas enodatasque facilius intelligetis, iam ex Ilagoge rudem Ossium cognitionem adepti, utant hac repetitis hand satyra sit inutilis & infructuosa. Quem etiam ordinem in docendo sequar, ut prius demonstratus Ossibus, postea secundum expositionem Galeni, eadem ossa sim repetiturus. Hunc Aulicorum elegitiam quam antequam, & Anatomicorum Antistitem, atque ut ostenderem Galeni doctrinam de Ossibus hoc loco descriptam, falsam & iniunctam à iunioribus Anatomicis, Vesalio, Columbo, Fallopio reprobantem, atque repudiatam fuisse. Illi enim Anatomem Galeni in nulla parte magis erroniam & falsam esse indicant, quam in Ossibus, quam si veram & probabilem demonstrarant, quis non animadvertet & fatebitur, falsum esse ex ipsa Galeno, artis Anatomicæ sinte oberrantem doctrinam purissimam haurire, quam rivales recentiorum exagteret & confutaret,*

*Ipsi sapit solus, reliqui velut umbra vagantur.*

## AN GALENVS AVTHOR HVIVS LIBRI.

### CAPVT PRIMVM.



**Q**UONTAM multi libri veteribus falsò adscripti fuere, ab eo tempore quo Pergameni, Alexandrinique Reges, Attalus, & Ptolomæus magno pretio libros antiquos compararunt. Officium interpretis esse censect *Galenus* diligenter inquirere: An liber sit Authoris illius, quem interpretari suscipit: ut in optimis libris studium operamque suam collocet, suique Authoris sententiam, quantum rei veritas patitur, sustineat, atque defendat. Nam antiquus Author amicè potius excusandus, quam hostiliter infestandus est, Capite 5. libri secundi de *Symptomatum causis*. Atque veteres scripturas *Galenus* semper retinere maluit, licet difficiliùs explicarentur, quam novas proferre vel excogitare, lib. 6. *Epid. sect. 3. part. 31*. Idcirco *Galenus* in explicatione alicuius libri *Hippocratis* curiosè inuestigat. An sit legitimus *Fœtus*, ne spurius liber pro vero & germano supponatur & introducatur. Quare nobis incumbit demonstrare hunc

librum esse *Galeni*, ut illius verbis maior fides adhibeatur. Librum esse alicuius authoris, ex styli genere, expositione simili, & Authoris testimonio comprobatur, ait *Galenus*, *Comment. ad Aphor. 63 lib. 7.* At scriptura *Galeni* in hoc libro, & aliis prorsus consimilis existit, Ossium expositio & demonstratio eadem ubique reperitur, sæpius nominat, & adducit librum de Ossibus ad Tyrones, quinetiam *libello de ordine suorum librorum* indicat, quæ ætate illum conscripserit, nempe circa 34. annum. Profectetur *seçãoe secunda de artic.* hunc librum ad lectionem doctrinæ *Hippocraticæ* viam parare, & *libro primo administ. Anatom.* ob exquisitam rerum indagacionem, interpretationis facilitatem, & perspicuitatem, reliquis *Anatomicorum* libris anteponit. Veruntamen *Fuchsius in Insultu. Anat.* hunc librum spurium esse scribit, multis in locis corruptum, & extremè fœdaturum: idque animaduersum fuisse à *Ioanne Cæso Britannno*. Quare fatetur *Galenum* similem librum conscripsisse, sed hunc qui iactatur, & omnium manibus teritur, adulterinum & supposititium esse opinatur. Ut intelligatur ex comparatione textus de *Gynglymo*, quæ aliter recitat, *lib. 1. de Fracturis*, quam continetur *hoc libro de Ossibus*. Sed *vanus* dormitabat *Fuchsius*, quando hæc scripsit, quia utriusque loci doctrina, & scriptura consimilis legitur. Præterea cùm *Oribasius Galeni amulus*, vel potius *summa*, hunc librum transcripserit, ipsaque verba aliis in libris *Anatomicis* expressa legantur. Nemo inficiari, vel dubitare potest, aut debet, hunc librum esse *Galeni*. *1. Cæsi Britannni præfatione in hunc librum Græcum Galeni, & Comment. in lib. 2. administ. Anatom.* conqueritur, quod *Galeni* liber de Ossibus in capita discerptus fuerit, cum in vetustis exemplaribus non ita dissectus appareat. Id fecerunt Typographi ad imitationem Latini Codicis, inde factum, ut titulus, & ipsæ incepti insertus fuerit, cùm ea sección pertinere debeat ad vertebrae lumborum.

## DE INSCRIPTIONE LIBRI

### CAPUT II.



**L**IBRUM *Plinius* superbos titulos, quos Græci mira felicitate suis libris præfigebant, admirandas scilicet inscriptiones, propter quas vadiumonium deferri posset. Nam cùm intraueris nihil in medio inuenies. *Galenus* simplici titulo contentus fuit, *lib. 1. in vino vendibili* non est opus suspensa hedera. Imo *Galenus* affirmat *libro de lib. prop.* suos libros plerumque sine titulo edidisse, quemadmodum illi pingendi fingendique conditores, absoluta opera, & quæ mirando non satiamur, pendenti titulo scripserunt, ut *Apelles* faciebat, aut *Polycletus*, tanquam inchoata semper arte & imperfecta, ut contra iudiciorum varietates, superesset artificii regressus ad veniam, velut emendaturo quidquid desideretur, si non esset interceptus. Certum est inscriptionem libri à *Galeno* factam esse, cùm sæpius ab eo citatus & memoratus fuerit cum tali titulo: ut *señ. 2. de art. part. 1. & lib. 1. admin. Anat. cap. 2.* quo in loco notat veteres suos libros inscripsisse, *in uariis*. Alios *uariis*, nonnullos simpliciter de Ossibus, ut ipse fecit. Noster *Hippocrates* librum suum de Ossibus, inscripsit *de natura Ossium*. Est autem hic liber *Galeni* Tyronibus artis *Anatomica* dictus, ut præ se fert titulus, & extremo capite huius libri testatur. Consuevit enim suos libros distinguere in *Isagogicos*, & *Perfectos*: *Isagogicos* Tyronibus, *Perfectos* prouectis conuenire scribit, *libro de lib. propriis*. Sic *Hippocrates libro de Medic.* Medicinam aliam facit Tyronum *lib. parauimus*, quæ manuum opera administratur: qualia sunt *Anatomica*, & *Chirurgica* opera. Aliam prouectorum in arte *lib. propriis*, qui eorum quæ fieri debent causas & occasiones norunt, tam in externis, quàm internis affectibus. Cùm igitur in usum & gratiam Tyronum *Galenus* hunc librum euulgaret, omnia perspicuè & breuiter tradit, & exponit.

*Quidquid præcipias esto breuis, ut cæci dicta  
Percipiant animi doctes, teneantque fideles.*

Notauit *Galenus*, *Comment. ad part. 4. libri de Fracturis*, orationis & explicationis duplex esse genus, *Synopticum*, & *Diexodicum*: utroque usum fuisse *Hippocratem*, quod etiam in *Galeno* obseruo. Est autem huius libri explicatio *synoptica*, quæ ad memo-

memotiam valet, vt Diexodica ad perspicuitatem, quam in *Commentario* adiungemus. Quod si *Galenus* in hoc libro plurima prætermiserit necessaria, quæ ex aliis libris suppleri possunt, noluit *Isagogæ* terminos excedere. In hoc imitatus *Hippocratem*, qui in *Officina* (Liber est *Isagogicus*) non omnia Chirurgiæ opera declarauit, quæ in Medici officina aguntur: sed ea tantum proposuit, quæ addicere debent, qui primas institutiones aggregiuntur.

*QVOD GALENVS IN REBVS ANATOMICIS,  
ceteris preferendus est, & quid in eius lectione Anatomica sit obseruandum.*

CAPVT III.



**C**UM mihi persuasissem diuinum *Hippocratem*, ac eius Interpretem *Galenum*, maxima post *Apollinem* & *Æsculapium* Medicinæ numina, & lumina, vndequaque absolutissimos esse: nihilque vnquam, nec in Physiologia, nec in cæteris Medicinæ partibus scripsisse, quod non esset verum, aut probabile, quia nec fallere, rarè falli vnquam potuerunt: ægè & impatienter tuli, *Galenum* à iunioribus Anatomicis miserè disceptatum, & iniquè flagellatum fuisse. Proinde mearum partium esse duxi antipetragiam illam, summamque gratitudinem, quam in discipulis requirit *Hippocrates*, Præceptorum *Galeni* tendere, vestigia sequutus optimi *Sylui*, mei Antecessoris, qui iam dudum hoc pietatis officium *Galeno* præstitet. Verumenimutro, quum in vniuerso orbe,

*Nulum sit locus, quo plus se iactet Apollo,*

Quàm Academia Parisiensis, in hac *Galenus* semper inuenit, & habet adhuc suæ doctrinæ fautores ac defensores acerrimos Medicos Parisienses,

*Qui proprium decus, & partem indignantur honorem,*

*Ni teneat Galenus, vitamque volunt pro laude pacisci,*

*Me quoque principibus permixtum agnoscunt Achenis.*

Intet illos non mediocrem rei Anatomicæ peritiam improbo labore consequutus, quantum in me fuit elaborauit, vt *Galeni* doctrina Anatomica sacra tecta conseruaretur. Omnem idcirco lapidem moui, quò possem calumnias in *Galenum* euomit asmoliri, & spicula quibus pungebant, in ipsos retorquere: quod feci non contradicendi studio, sed veritatis tuendæ gratiâ, quam vnice *Galenus* dilexit, & omnibus Medicinæ studiosis commendauit: arque vt posteris innotesceret, *Galenum* peritissimum fuisse Anatomicum, quem sequi & imitari omnes debeant. Sunt enim optima exemplaria quæ vetera sunt, quod *Cicero* de antiquis Romanis dixit, eos in Republica constituenda ranta fuisse sapientia, vt satis superque sint sapientes, qui illorum sapientiam non dico assequi, sed quanta fuerit perspicere possint. Idem de priscis Medicis *Hippocrate* & *Galeno* in rebus Medicis verè dici posse iudico. Laudatur à Poëta *Æneas* quod

*-----faciles oculos fert omnia circum*

*Æneas, capiturque viris, & singula latas*

*Exquiruntque, auditque virum monumenta priorum.*

Apud Platonem in Timæo Solonem sic affatur *Ægyptius* sacerdos, *O Solon, Solon, vobis Græcis semper puer iuuenisque est animus, in quo nulla est vetustatis cognitio, nulla comæ scientia.* Quare liceat mihi cum Plauto

*Qui videntur vino vetere sapientes puto,*

*Et qui labenter veteres spectant fabulas, libros:*

*Antiqua opera, & verba cum vobis placent,*

*Æquum placere est ante veteres fabulas, libros*

*Nam nunc noua qua prodeunt comedia, Anatomix,*

*Multò sunt nequiores, quàm nàm noui.*

Quàm sancta sit *Platoni* Priscorum authoritas *Hippium* declarat, qui semper præferre consuevit priscos homines recentioribus, vt & viuientium inuidiam, & defus-

etorum indignationem euitaret. *Socrates in Philebo* censet priscos nobis præstantiores, disque propinquiore, oracula nobis tradidisse: apertius *Plato in Timæo*, priscis viris credendum est, quia diis geniti parentes suos optimè nouerant: Impossibile est deorum filiis fidem non habere, licet nec necessariis, nec verisimilibus rationibus eorum oratio confirmetur, ut in ætatis autoritatem habet *Senectus*, sic in exemplis testimoniisque antiquitas, ad faciendam fidem autoribus, ex *Cicerone*. Ac sane, si quædam scimus in particularibus, in methodo sciendi ab antiquis vimimus. Itaque dicam cum *Salomone*, quod sapientiam omnium antiquorum exquirat sapiens, ac proinde quærenti, quo modo peritus & doctus *Anatomicus* euasurus sit, cum *Zenone* respondebo, *ἐν τοῖς παλαιοῖς νῦν ὑπάρχει*.

Præfagit animus, quamplures non defuturos prauis quorundam documentis imbutos, qui *Galeni* Anatomen imperfectam esse obiciant, propter inopiam vel raritatem cadauerū, quæ priscis sæculis quamprimum rogo imposita cremabantur: quoniam etiam cruci vel patibulo suffixa, lex *Mosis* intra bidduum, aut triduum inhumari, vel aduri iubebat, aut etiam eodem die, ut habetur *Deuteronomij* cap. 21. Quæ consuetudo cremandi corpora illico post obitum, introducta fuit apud *Romanos* temporibus *Marij & Syllæ*, lata lege ob bella ciuilia, ne quis sæuiret in mortuos. Propterea cum non liceret habere cadauera humana *Vercibus* *Anatomicis*, ipsique *Galeno* minùs exacta explorataque fuit corporis humani structura. Sit ita vi volunt, unde quæso *Vesalius* suos discipulos *Anatomicos* expiscatus est: nisi ex vberissimis *Galeni* fondibus? nihil est à *Vesalio* dictum, quod non prius à *Galeno* dictum fuerit: nec immerito possem illi obicere, quod olim *Alexander Ephellioni* in *Abundo* exprobrasse fertur: quæ sunt tuæ opes, aut quod tuum facinus, si quis *Alexandrum* tibi demat? Similiter si quis ex libris *Vesalii* doctrinam *Galeni* exemerit, titulum mouebit cornicula alienis acfurtiuis nudata coloribus.

Si vellem ingenium *Galeni* supra cæteros *Anatomicos* admirabile exprimere, deberem imitari *Timanthi* industriam, qui *Cyclopem* in parua tabula cum pingere, eius magnitudinem designare cupiens, pinxit iuxta *Satyros* *Thyrso* pollicem eius metientes. Sic reliqui *Anatomici* *Galeno* comparati, infantes & nani videntur, qui docente & dictante *Galeno* loquuntur. Quapropter, si quædam pauld aliter constructa in corporibus nostris appareant, quàm fuerint à *Galeno* descripta, verisimile est longam temporum atque æuorum seriem in humanis corporibus multa immutasse, quod *Vesalius* ipse confitetur, atque agnoscit, atque à vereri typo veluti defludentem atque laseuientem naturam, in variando opificio, & hoc tanquam figlino vasculo variè dissimiliterque compingendo, suam artem & potentiam demonstrare voluisse.

*Ludit in humanis diuina potentia rebus.*

Verùm ut umnis controuersis, & dubitationis occasio rescindatur: *Tria sunt in Galeni lectione Anatomica considerata.* Tempus quo libros *Anatomicos* edidit, doctrinæ modus, personæ, siue eorum conditio, quibus scripserit,

Temporis nomine intelligo ætatem, & scriptoris ordinem. Nam cum ætate cre-scit ingenium, senescentes quotidie doctiores euadimus, discipulæ sequens præcedentis magister est. Fatetur lib. de libris propriis, se per ambitionem iuuenilis ætatis multa dixisse. Itaque *Galenus* iuuenis trigésimo ætatis anno scripsit de matris digestionem, de pulmonis & thoracis motu: circa trigésimum quartum ætatis annum, in lucem emisit libros de ossibus, de venarum, artellarum, & nervorum digestionem: deinde ad libros administrationum *Anatomicarum* se contulit. Libros autem de multarum digestionem & motu, antea scripserat, quia in libris administrationum *Anatomicarum* passim remittit suos lectores ad istos libros. *Hæc omnia*, inquit *Galenus*, *neceffe habui commemorare, ut agnoscerent illi, qui sunt aliquando meos libros lecturi, quæ ætate quisque scripserim, & quam ob causam. Inde intelligere poterunt, quæ sunt tanquam imperfecta, ab illis quæ elaborate absoluta sunt discernenda.*

Doctrinæ modum diligenter obseruabis: Nam pleraque proficeret se scripsisse in gratiam amicorum, non ad editionem, ne quidem facta nominis sui inscriptione, nec scripto relicto, quod festinante calamo exarauerat. Propterea quædam implicite & perspicuè tradit, quædam ex professo tractat, alia obiter & perfunctoriè. Idcirco *Galeni* textum clariorem, obsecro & breui præferes, atque eum qui ex professo institutus fuerit, alteri qui obiter & alieno loco expostus est.

Exemplis id clarum euadet. *Galenus libro secundo de fracturis part. 1.* notat à quibusdam pedis Ossa viginti septem, ab aliis viginti sex numerari. At hoc libro de Ossibus, viginti sex tantum enumerat, *libro quinto de locis affectus capite sexio*, dum recenset omnes musculos abdominis, testos prius nominat, dein transuersos, postremo obliquos, contra ordinem positionis arque dissectionis, quem *libro quinto admittit*. *Anatom.* retinuit. Nam primos constituit obliquos, dein testos, postea transuersos collocat, *libro decimo tertio methodi, capite decimo septimo*, scribit lienem nutriri limoso & melancholico sanguine: *At libro quarto de usu partium*, ubi ex profecto tractat de actione & vsu partium, air lienem attahere hunc succum, sed longa mora conficere, immutare, & quidquid tenuissimum est, sibi que familiare in suos vsus conuertere, quidquid alienum est in ventriculum & aluum ablegare.

Deinde considerabis personas quibuscum *Galenus* agit: Nam si suos commentarios Tyronibus dicauerit, non erunt exactè elaborati: si peritos edoceat, omnia perfectè tradit. Eam ob rem *suos libros* diuisit in *Isagogicas & Perfectas*, vt *Aristoteles* suos libros in *Exotericos, & Acroaticos*. Sic *Galenus* in gratiam Tyronum librum de Ossibus condidit, & librum de matrice ad erudiendam obstetricem composuit: Nec mirum si exquisitam doctrinam non contineat.

Sed non semper debent, neque fortè cum magno emolumento possunt, quasi ad notam vniuersa exigi, sicut in operibus fabricæ & officinæ facere homines consueuerunt. Neque à *quibus*, hoc est, limatum accuratumque in omnibus disputationibus pariter requiritur, est ubi popularis doctrina, qua res tractatur crassiore *Minerva* plus proficiat, capitibus discientium magis accommodata, quam docendi viam *Galenus* in hoc libro sequutus est.

Cùm autem *Anaromen* ex purissimis *Galen*i fontibus tepetendam esse dixi, non tamen *Recentiorum* riuos sicco pede transeundos esse, neque posteritatis ingenia contemnenda puto. Nam in omni genere scientiarum, & summis admiratione venerationeque, & inferioribus merita laus contigit. Cum *Alexandro* persuaderent nonnulli, vt Græcis sicut amicis, barbaris velut hostibus vteretur, prudenter respondit, hostes & amicos fidelitate & perfidiâ discernendos esse: Complures enim Græcos barbaris deteriores existere, vicissimque barbaros plures fidelitate Græcos superare: Similiter quidquid à Græcis proditum est, velut ab oraculo profectum semper amplectendum esse neutiquam existimo. Imo non tam persone, quam rei delectum, & rationem habendam esse, quàm *Aristoteles* ait, inquit *Aristoteles*, & apud *Platonem* in *Charmide* *Socrates* monet, vt non attendas, quis dicat, sed quid dicatur.

Ego verò *Galen*i defensionem suscepi, quantum rei veritas patitur, & quando manifestè falsa prodidit, liberè profiteor: Ne quis eodem errore decipiat, quo ille antè fuit deceptus. Nunquam autem hallucinari supra captum hominis est, sed quàm minimè aberrare solius artificis est, authore *Galeno*. Nullum magnum ingenium est sine venia, ait *Seneca*. Inter cætera mortalitatis incommoda, & hoc est, caligo mentium, nec tantum necessitas errandi, sed errorum amor, ex *Seneca*. Quod si *Fabius* inter virtutes Grammatici, numerat quædam nescire, quanto magis nobis Medicis, vt non dicam necessarium, saltè cum maiorum venia erit, in rerum tam reconditarum indagine nonnulla ignorare. Siquidem vnus homo cuncta videre vel obseruare nequit. Neque natura suos thesauros eodem sæculo recludit, vni que homini parefacit. Quamvis enim ars Anatomica recentiorum diligentia, & industria videatur consummata, semper tamen in corpore humano, *Resstabit*, ventura quod atque *querat*, & vt studio se quando exerceat sibi.

Quocirca, si *Galenus* omnia spectare & inuestigare non potuit, si quædam ignorauit, aut aliter exposuit: Hæc illi condonare, & pro laboribus immensis posteritati reliquis illius manibus bene precari oportet. Cùm in recentiorum Anatomicorum scriptis *Vesali*, *Fallopi*, *Laurentij*, *Columbi*, forsan plures errores, & maiores hallucinationes offendantur, quàm apud *Galenum*, quæ minus in illis tolerabilia qui *Galen*i laboribus adiuti, in tanta cadauerum humanorum copia, peritiores & persectiores esse debebant. Sed in amicorum vitii acutum cernimus, in propriis cæcutimus.

Porro quæcumque pro *Galen*i defensione produxi, non possunt spectari aut demonstrari in vno eodemque sceletro: plurima sunt inspicienda, in quibus diuersa

quædam notabis, quæ verisimile est *Galenum* vidisse, dum hæc commentaretur, aut *Ossa* diuerforum cadauerum habuisse.

Deinde prisca nomina partibus indita retinenda sunt, nec remere pro arbitrio immutanda, & ad alias partes transferenda, cum non habeamus *Anatomicos*, *Hippocrate*, *Aristotele*, *Galen*, *Ruffo* *Ephesio* antiquiores, quorum opinionibus standum & acquiescendum est, quippe nominum commutatio magnas lites & obscuritates in re *Anatomica* excitauit, vñ cum agitur de coccyge, quam appellationem cartilagini ossis *Sacri* adaptant, contra sensum & doctrinam veterum *Anatomicorum*.

## DE QVIBVS OSSIBVS AGIT GALENVS.

### CAPVT IV.

**G**ALENI scopus est de hominis Ossibus agere, ne quis confundat *Ossa* Simiæ cum humanis, id aperte docet in *Fraurnis*, cum dicit non posse Ossium fracturas & luxationes recte intelligi, ignorata Ossium natura, Medicus autem luxata, & fracta non in Simiis, aur id genus brutis restituit, sed in hominibus.

Adde quod paulò post definit sceletum, Ossium corporis humani syntaxim, alibi hunc librum condidisse tantùm de hominis Ossibus, tanquam omnium perfectissimis affirmat.

Ridiculi sunt, qui putant *Galenum* suam Osteologiam de hominis pariter, & simiæ Ossibus scriptam voluisse, & demonstrant ex libro tertio de artic. vbi monet *Ossa* exploranda esse in sceletò hominis, vel illius defectu in simiæ Ossibus. Nam hoc modo capiti humano ceruicem simiæ iungeret. Quamuis enim simia Ossium numero, figura, situ nobiscum valde consentiat, sunt tamen quædam in singulis prope Ossibus dissimilia, vñ hominis sceletum simiæ sceletò comparantibus euidenter apparebit, quod etiam demonstro post hominis Osteologiam.

*Hippocrates* librum de Ossibus composuit, quorum numerum ex humanorum Ossium inspectione collegisse asseuerat, atque ad perpetuam memoriam sceletum ære fabricatù, quasi primitias sapientiæ *Anatomicæ* *Apollini* *Delphico* consecrauit.

*Galenus* duorum hominum sceleta habuit, in quibus Ossium figuras, & positiones potuit obseruare, ergo non est dubitandum, quin hic liber de hominis tantùm Ossibus sit compositus.

## AN AB OSTEOLOGIA INCIPIENDA

### Anatome.

### CAPVT V.

**Q**UEMADMODVM in Grammatica priùs literas nosse conuenit, quam legere, siue literas coniunctas exprimere queas: & in Geometria priùs scire oportet quid punctum, superficies, linea quàm theorematà possis intelligere: sic in doctrina *Anatomica* priùs *Ossa* cognoscenda, quæ totius *Anatomies* abecedarium, seu elementale constituunt. Hæc nisi præcedant quidquid ediscimus & ædificamus, caducis & infirmis superstruitur fundamentis. Vt ergo peritus Architectus primum fundamenta domus firma & solida iacit, postea parietes, tabulata, ligna & reliqua, quæ illis innituntur, adiungit: sic in texenda & effingenda corporis humani structura ab Ossibus auspicandum est, auctore *Galen*. Etenim quod in tentoriis præstant pali, & in ædificiis parietes, id in animantibus Ossium substantia efficit: quod etiam *Hippocrates* iis verbis innuere voluit, capitis exemplo, Ossium naturam ex capite æstimare oportet, deinde nervorum, venarum, carnis & reliquorum.

Quemadmodum enim corporis partium fulcra sunt *Ossa*, sic eruditionis solidæ in



rebus Anatomicis sunt fundamenta, atque vt ad iouandam memoriam, locorum, & imaginum subbolum querimus, vt eorum quæ didicimus recordatio, facilius nobis recurrat, sic partium omnium cognitionem nobis reuocat Ossium perfecta cognitio: cum omnes corporis partes ab Ossibus dependant, atque incumbant, vel in eas desinant, aut ab iis includantur.

Quocirca Ossibus primum locum in disciplina Anatomica decernimus, cum ab his *calculis* ordiendum esse censuerit, quamuis carabibus operantur. Nam vt in magno mundo, terra pars illius infima, aliorum elementorum ambitu obuoluta, prima patet sensibus, ita in microcosmo terræ analogæ Ossa, licet carum viscerumque incubu, et obuoluta, statim sese offerunt: cum ob soliditatem, tamen quia molem vniuersi corporis sustinent. Demum, vt terra quoddam quasi fundamentum est magni illius mundi, ita Ossa quæ telluri respondent, sunt instar fundamenti, ad erigendam & fulciendam totam corporis substantiam. Ideo *Poeta*, qui fabularum inuolucris rerum naturalium arcana occultare solent, fingunt ex lapidibus: Deuotionis iactis & sparsis renatos homines, id est, ex Ossibus, quibus sursum & conformatur vniuersa moles corporis humani. Nec caret mysterio, quod in sacra Scriptura, ubi partes corporis humani recensentur, Os semper primo loco ponitur.

Certum est in disciplina Anatomica *Osteologiam* multo prius cognitam fuisse, quam cæteras illius partes: quod minus operosa sit, quod nusquam deesse copiam creberimè Ossa inspicundi. Sanctorum Patrum Ossa diu in sepulchris asseruata, inter eorum alio transferebantur, quemadmodum Ossa Iosephi in Palæstinam ex Ægypto. Quin etiam carne sua spoliata vniuersis recondebantur, & solent in hodiernum diem Iudei, suorum cadauerum ossa asseruare, quod quidem *ipse Bellonius* vidit, vt ipse refert lib. 6. de aduersariis.

Sed & in conuiujs quotidie ad spectandum proponebantur, vt in Ægypto. In cœnatione seu stibadio Cæsaris Domitiani, è tholo pendeat *Cranium murini*, quod mortis admonerat. Præterea non est dubium à veteribus Medicis Chirurgiam primum excultam fuisse, & inter illius partes eam, quæ circa Ossa facta & luxata versatur, prius exercitam & introductam, de qua tam egregia monumenta posteritati reliquit *Hippocrates*, quæ non tam accurate conscripsisset, nisi Ossium hominis positus, figuræque diligenti inspectione didicisset.

Vt autem partes similes generatione sunt primæ, quia ex his dissimiles componuntur, authore *Aristotele*: ita ordine doctrinæ prius explicari debent. Inter partes similes primum locum sibi iure vendicant Ossa, cum sint totius corporis fundamenta. Natura artifices nauem conditores æmulator, inquit *Galenus*, lib. an omnes partes simul fiant, carinæ loco ponens spinæ vertebrae, quibus tum costas, brachiaque eruaque, velut asseres, transita, & reliqua ligna adaptat.

Accedit, quod Ossa in generatione partium prima formantur, quamuis vltima perficiantur. Quem naturæ ordinem Deus ipsius naturæ Author, in constituendis corporibus humanis semper obseruauit. Nam in formatione Euz, Os Adami, nempe Costam, pro fundamento reliquarum partium accepit: Atque resurrectionis exemplar *Ezechiel* demonstraturus, corporum ædificationem ab Ossibus inchoauit, quibus reliquam opificij molem superinduxit. Apud *Ezechielem*, cap. 37. Vidit enim Propheta, Ossa quæ iam exaruerant coniuncta, & in suum locum coaptata fuisse: Mox nervis adstricta, carneque induta sua, & ad decorem inuestita cute, tandem formati, & in habitus humanæque species figurati corporibus, spiritum qui circumferret ea infusum fuisse.

Cum igitur Ossa sint nostri corporis fundamenta, nisi *Osteologia* præmitteretur, obscurus atque etiam inutilis foret de reliquis partibus sermo, cum omnes ab Ossibus oriantur, & in eas desinant, iisque adhæreant, vel incumbant. *Aristoteles* lib. 2. de generatione animalium, cap. 4. ex Ossibus accretionis modum sumit, secundum incrementum Ossium augentur animalia. Atque si credimus *Hippocrati*, purgationum circuitus perseuerat, donec Ossa suam soliditatem adeptæ fuerint. *Galenus* lib. 1. de admin. Anat. cap. 2. Ossium imitatione cætera in animante effingi, morarique scribit, quibus caput maximum, his Cerebrum amplissimum, quibus thorax angustus, his pulmo & Cor contractiora: quin etiam pro defectu, vel additione Ossis, partes nostri corporis venæ, arteriæ, nervi, & muscoli, vel augentur, vel decrescunt, aut deficiunt.

Idcirco veteres Medici hanc partem potissimum excoluerunt, cum hoc fundam.

mento totam Anatomem niti cognoscerent. In Ossibus præcipuum fuit *Hippocratis* studium, incertem Osteologiam, ut reliquam Anatomem crexit & maturavit, atque in hulus rei memoriam hominis sceletum æneum Apollini Delphico consecravit, teste *Pausania in Phocia*. Nec minorem operam & diligentiam *Galenus* adhibuit in natura Ossium explicanda, ut ex lib. de Ossibus intelligitur.

Obiicit aliquis *Galenum* Anatomicam doctrinam tradidisse duobus voluminibus, nempe libris de usu partium, & administr. Anatom. in quibus non incipit ab Ossibus. Deinde videtur Anatome eo modo docenda, quo administratur. Respondet figuræ partium externarum, & internarum adhesiones cum aliis, sedes & progressus cognosci non posse: nisi prius perfectis Ossibus & exploratis. Cur *Galenus* à manu sit exorsus suos libros Anatomicos, leges *Hofmanni* argumentum in lib. 1. de usu partium, & *Laurentium* lib. 1. sua Anatomes.

Præterea dicimus cum *Piccolomino*, duplicem esse ordinem tradendarum cognoscendarumque rerum, alterum qui sequitur sensum ducem, alterum qui sequitur perspicuitatem rerum explicandarum: priore res explicantur eo ordine quo sensui occurrunt, ut sit in administratione Anatomica. Secundo ordine res illæ prius explicantur, per quas aliæ perspicue fiunt, & sine quibus nequeunt intelligi. Primo ordine, musculi prius sunt exponendi, quàm Ossa (carnibus illis obvoluta. Secundo, Ossa prius sunt explicanda quàm musculi, quod musculorum origo, progressio, terminatio, intelligi nequeant sine cognitione Ossium.

Adde quod duplex est docendæ & cognoscendæ Anatomes methodus, synthetica, & analytica. Illa à simplicissimis partibus sensum ad compositiones progreditur, donec totum assequuta fuerit. Altera totum in suas partes résolvit usque ad minutissimas. Prima methodus aptior est ad docendam Anatomem, altera confirmat & demonstrat sensu, quæ prior theoreticè docuit.

## OSTEOLOGIÆ DIVISIO.

### CAPVT VI.



**O**STEOLGIA duplex est, vna Ossium infantis recens editi usque ad septennium: Altera Ossium adulti perfectique hominis. Horum enim Ossa inter se multum discrepant, ut seorsim in vnaquaque Osteologia demonstratum est. Vtraque Theoretica est & Practica. Theoreticam voco, quæ versatur in disquisitione conformationis & usus Ossium, eaque in Ossibus atidis separatis vel compactis, & colligatis demonstratur. Practicam appello, quæ manum adhibet ad secanda, mundanda, & colliganda Ossa, eaque versatur in humidis adhuc Ossibus cadaueris, suis carnibus spoliati. Inde constituo duas illius partes, *Osteotomen* sine *Osisfragium*, & *Osisilegium*. *Osteotome* ex fractura & diuisione artificiali abditas & internas partes singulorum Ossium inquirat, simulque connexiones Ossium inter se. *osisilegium* est ratio parandi & conficiendi sceletum.

## COMMENTARIVS IN PRÆFATIONEM huius Libri.

### CAPVT VII.



**G**ALENVS hoc præcæmio generalem doctrinam proponit, omnibus Medicinæ partibus accommodatam, quod scribendi genus veteres & recentiores Medici obseuasse testatur ipse, *Commentario in lib. Hippocratis de Ossibus*. quem librum, quia totius artis commune principium in limine declarat, ea de causa cæteris præmittendum esse monet. Talem enim docendi viam continet, qualem in suis libris quos primas institutiones appellant, recentiores aliqui addiderunt. Exordium autem illud *Hippocratis* loco citato,

simile est ei quo vixit *Galenus*. Scribit ille naturales Ossium affectiones & habitus cognoscendos esse, vt duplex eorum vitium cognoscatur.

Imprimis consideranda Ossium natura qualis per se sit, hoc est, quænam ipsorum temperatura, conformatio, & partium inter se vnio: deinde Ossium mutua syntaxis, siue connexio obseruanda: Prioris habitus vitium, *fractura* dicitur: Secundi morbus, *luxatio* est. Hoc enim ordine naturales Ossium affectiones contra naturam declarantur ab *Hippocrate*: qui primùm de fracturis, postea de luxationibus egit. Hæc autem duo in genere Ossium absolutè priùs examinanda sunt, nempe qualitas, & syntaxis, quæ postea in singulis Ossibus ordine perquirentur. Itaque *Galenus* notat priùs sciendum quid, & quale sit Os, quàm Syntaxis exponatur.

### De Qualitatibus Ossium.

IN Ossibus, vt in omnibus corporis partibus tria considerari debent, auctore *Galenus*, libro primo de vfu partium, cap. 9. Primò substantia, deinde quæ substantiæ succedunt, vel accidunt. Propriam partium substantiam *Temperamenta* complent. Ossa enim id quod sunt, & reliquæ partes id quod sunt, habent à temperamento. Temperamentum igitur partibus inest secundum substantiæ rationem, quam sequuntur mollities, durities, sapor, odores, colores: accidunt verdè eidem necessariò magnitudo, numerus, figura, situs, & connexio. Hæc omnia qualitatè Ossis constituunt.

### An ad Medicum pertineat Osteologia?

IRE quæri potest, An Ossium doctrina pertineat ad Medicum, cùm ipse *Galenus* dixerit Osteologiam Medico vtilem ad fracturas & luxationes curandas. Soli hodie Chirurghi fracturas & luxationes tractant, & si quæ pars Medicinæ Chirurgicalis est, ea potissimum censetur à *Celso*, quæ in Ossibus curandis occupatur, de qua libros accuratissimos edidit *Hippocrates*. Accedit, quod non tantùm Osteologia, verumeriam tota Anatomie Chirurgis addita, ac veluti proprietaria videtur. Nam cùm Anatome absque corporum dissectione, neque doceri, neque disci queat, incisio verdè sit operatio, quæ manus operam requirit, non est dubium, quin Anatome ad Chirurgiam referenda sit.

Siquidem ex operationibus Chirurgiæ, aliæ morbos iam factos patefaciunt, aliæ venturos docent ex cognitione partium, cuiusmodi sunt Anatomicæ administrationes. *Galenus* libro secundo de placitis, cap. 4. Thoracis incisionem Anatomicam, vocat Chirurgiam: similiter libro de vfu partium, cap. 2. Cordis viucentis sectionem Chirurgiam appellauit. Responde *Galenus* iis in locis latiore significato vsurpare nomen Chirurgiæ, pro omni operatione quæ manu perficitur, vt ipse docet lib. 1. de vfu partium, cap. 7. Ac sane olim, quando cum materno lacte linguas imbibeant, statim à teneris medicæ opera, nempe Anatomica, Chirurgica, & Pharmaceutica, quæ sub sensum visus & tactus cadunt, & non secus atque Mathematica sensatam apodixin habent, edocebantur. Testatur *Galenus* in veteri Asclepiadarum familia Anatomem pueris demonstrari solitam: & *Comment. in lib. 1. de Officina*, scribit quæ hoc libro continentur, ad Tyrones, & discipulos pertinere. Quocirca merito conquiretur, quod à Medicis neglecta fuerit Chirurgia, *Comment. ad part. 23. lib. 1. de artic. Hippocratis* faculo Medici optimè artis præcepta discerant, atque ea præsertim quæ ad manus operationem pertinent, ea nunc à Medicis, vel nullo modo discunt, vel certe exiguo temporis spatio. Idem *Galenus* libello, quod optimus Medicus sit Philosophus, inter plures causas, ob quas nemo æqualis Hippocrati efficitur, tantique viri doctrinam assequitur, hanc esse præcipuam scribit, artis Anatomicæ contemptum & ignoranem. Ille naturam corporis, quam totius Medicinæ ordinis principium statuit, optimè cognoscendam esse præcipit: vt isti in ea re ita studium ponunt, vt non modo vilius ex partibus corporis substantiam, aut formationem, aut magnitudinem, aut nexum, siue cum propinquis communicationem, sed ne posuerint quidem noscant.

Cùm igitur olim tres Medicinæ partes ab vno eodemque homine exercerentur, non mirum, si *Galenus* Osteologiam Medico conferre dixerit ad fracturas & luxationes curandas, exemplo *Hippocratis*, qui monet Ossium doctrinam Medico necessaria.

riam esse ad eorum fracturas & luxationes cognoscendas, atque restituendas, *lib. 2. de fracturis: & in epist. ad Thessalum statim.*

Porro nemo dubitet, aut inficiatue Hippocratem in rebus Anatomicis, & Chirurgicis apprime versatum fuisse, ut fidem faciunt diuina illius monumenta: *Galenum*. Chirurgiam exercuisse omnibus notum est, & de se proficitur, in patria sua Perga, morandis gladiatoribus à Pontifice præfectum fuisse: *Isipsum Comment. in libris de articulis & de fracturis* operandi modos, quibus vteretur, exponit.

### *An ad Fracturas, & Luxationes curandas tantum necessaria Osteologia?*

**H**oc dubium mouere posset aliquis ex verbis *Galen*i, sed non absolute Osteologiæ utilitatem fracturis & luxationibus Ossium circumscripsit: latius patet illius utilitas ad vulnera, vlcera, tumoresque curandos. Præterea, cum omnes corporis partes Ossibus adnascantur & stabiliantur: Et ex *Galen*o in hoc capite, formam, habitumque naturalem ab illis acquirant: quis non animaduertit summè necessariam esse Osteologiam in curatione omnium morborum? Nam quo modo solum nequique viscerum cognosces, ignoratis Ossibus? quo modo muscularum cognitionem habebis absque exquisita Ossium præcognitione? sed priusquam fracturas & luxationes curare incipias, Ossium perfectam notitiam comparare oportet, quod *Galenus* præcipit *Comment. in lib. de artic.* Nemo accedas ad lectionem librorum Hippocratis de fracturis, & luxationibus, nisi prius in fideleto, qualia sunt Ossia singula diligenter inflexerit.

Propterea iubet Hippocrates, libro de Officina statim initio, ut Medicus primum similia intueatur, deinde dissimilia, id est, primum naturalem cuiusque partis constitutionem obseruet, ut si quid præter naturam acciderit, consilium agnoscat. Nam, ut inquit *Aristoteles lib. 1. de Anima*, Rectum est index sui & obliqui, opus est aliquo ad cuius normam & regulam deprauata corrigas: proinde si prauam Ossium constitutionem cognoscere & emendare velis, eorum naturalis consuetudo imprimis cognoscenda. Idcirco voluit Hippocrates vitiatam corporis partem ad eam, quæ integra est conferri, ut quantum à naturali recesserit, intelligatur: & eodem libro monet illum prius racheis naturam nosse debere, qui huius partis morbos curandos suscipit. Necesse est, ait *Galenus, lib. 2. meth. cap. 4.* ut in omnibus, quæ ad Medicinam pertinent, id quod secundum naturam est, primum cognoscatur. Nam cui id ignotum est, is neque ubi à sua natura partes affectæ distrahuntur, neque qua ratione ad id, quod secundum naturam est adduci debeant, intelligit.

Cæterum, quantum ad artem Medicam conducit Ossium doctrina, declarauit Hippocrates in Epistola, ubi suum filium Thessalum ad Ossium doctrinam hortatur, asseritque ad multiplicem eorum affectionem, & articularum luxatorum repositionem, & Ossium contritorum reparationem, & perforationem, & compositionem, & vltionem, atque reliquam curationem, maiore industria vsum illum, qui nouerit qualis est locus, quale est Os, quod luxatum fuerit.

### *Ossis definitio.*

**O**mnis à ratione suscepta de re aliqua institutio, à definitione proficisci debet, ut intelligatur id de quo disputatur. Propterea *Galenus* à definitione Ossium incipit.

Duplicem autem cuiusque rei definitio assignari potest. Una nominis quæ Etymologia dicitur. Altera qua res essentiam declarat. Nominatur Os, Græcis ὀστέον, ὀστέον, ὀστέον, ὀστέον, ὀστέον, ὀστέον. Latinis Ossia dicta sunt ab ὄσσω, quod cremarentur ab antiquis, vel potius ὄσσω dicuntur à Græca dictione ὀστέον, ὀστέον, ὀστέον, ὀστέον, ὀστέον, ὀστέον. Nam Ossium vetus est nomen, quo designatur Os apud *Platum*.

Vera ossium definitio proponitur à *Galen*o: Sunt durissima & siccissima animalis partes (vel vno verbo) maxime terrestres. Quam definitionem nonnulli abundare perperam existimant, & sufficere si diuisset, ossa corporis esse partes maxime terrestres. Inde sequitur aridissimas esse, & si sunt aridissimæ, erunt etiam durissimæ.

Sed *Galenus* in gratiam Tyronum scripsit, quibus facilia & intelligibilia proponenda sunt, ex *Hippocrate lib. de vet. medicina*. Idcirco Ossis naturam clariùs expressit, quando durum pronuntiavit Os, quia siccum: Siccum verò, quia terrenum. Propterea addit *Galenus*, & sic autem ut patet.

Si quis obiciat debuiffe *Galenum* præmittere siccitatem duritiæ, quæ est effectus siccitatis, vt mollities humiditatis, ex *Aristotele de generat. & corrupt. cap. 2.* Responde duritiem nobis esse notiorẽ siccitate. Deinde cùm Os sit vile propter duritiam, idcirco primum durissimum à *Galeno* dictum fuit, dein aridissimum. Cùm, inquit *Galenus*, libro primo de usu partium, cap. 9. cuiusque particulæ vtilitatem inquis, diligenter examinabis, an propter actionem sit utilis, an propter ea quæ temperamentum consequuntur, vt Os propter duritiem.

Dicerem adhuc duritiem qualitatem esse Ossis magis aptam & propriam, quàm sit siccitas, quæ primo conuenit ex *Galeno & Anicenna*, Pilis, qui sicciores existunt Ossibus: ideoque durum præmittere debuit siccitati, quia ex veris partibus nostri corporis Os est durissimum, auctore *Galeno*, libro secundo de temperam. capite primo. Adde quod *Galenus* voluit explicare, qua ratione Os esset durum. Nam aliquid durum tribus modis fieri, & existere scribit libro quinto de facultat. medicam. repletionem, concretione, & siccitate: Os autem durum est siccitate.

Porro Ossis siccitas longè differt à siccitate terræ, quæ est purum & simplex corpus in suo centro, vbi perfectum reperitur, friabile: Os verò mixtum & pingue, ad cuius constitutionem, non solum seminis crassamentum requiritur, verum etiam quid pingue & ærium, quod Ossis substantiam siccissimam, alioqui friabilem & dissipabilem vniat & compingat.

Si quis obiciat ex *Galeno*, Temperamenta propriam partium substantiam componere, quia vnumquodque tale est, & existit per temperamentum calidum, vel frigidum, aut humidum: Caro enim & Os, id quod sunt, habent à temperamento: Ossis autem temperamentum frigidum & siccum est, auctore *Galeno*, quomodo definitur Os in definit. medicæ. Respondeo *Galenum* hoc in libro tyronibus scribere, quibus euidentiora proponi debent. At quæ sub sensum tactus cadunt manifestiora sunt, quàm quæ intellectu comprehenduntur. Idcirco maluit Os definire per duritiem, quæ vel est ipsum Ossis temperamentum, vel ab eo immediatè procedit. Cuius duritiæ causa, vtilitatem præstat corpori, itaut quæ durissima sint, eadem frigida & sicca deprehendantur. Scribit *Aristoteles*, libro secundo de generatione animalium, cap. 4. in omnibus animalibus duriora esse Ossa marium quàm feminarum. *Galenus* lib. 1. de sem. cap. 10. tradit vnum idemque Os in medio minus aridum, ac proinde minus durum esse.

### Cur Ossa durissima.

**A**ristoteles libro secundo de generatione & corruptione, capite secundo, naturam duri & sicci his verbis declarat. Vt mollia, inquit, humidis subiiciuntur, sic dura siccis: quare vt humida non sunt in mollibus, sed in humidis mollia: vicissim sicca non sunt in duris, sed dura in siccis. Discrimen autem ponit inter aridum & siccum. Nam aridum est, quod admodum siccum est, vt etiam concretum sit humoris penuria, quasi aridum quid esset supra siccum, cuiusmodi sunt ossa siccissima. Præterea, durum definit, id quod concretum est, & quod concretum est, durum existit. Durescunt autem & coguntur corpora, inquit *Aristoteles*, lib. 4. Meteorum, partim à calore, partim à frigore. Calor enim humorem exsiccat, frigus verò calorem extrahit. At ea quibus hoc evenit humoris inopia, humore liquari solent, nisi fortè ita cogantur, vt introitus in eis minores, quàm qui aquam accipiant, relinquuntur, vt lateres: idcirco Ossa liquari non possunt, sed aduri, fumumque emittunt, vt ipse docet *Aristoteles*, lib. 4. Meteorum, cap. 9.

Ex his præmissis clare intelligitur, quanta sit Ossis durities, quod nec aqua diluatur, vt terra quæ fit lutum, nec igne liqueatur, aut molliatur: cùm tamen multa vrente igne fiant molliora, vt cornu. Causam assignat *Aristoteles*, libro quarto de generatione animalium, quæ parum in se humoris & caloris habent, & dum hæc euaporant, indurantur, igne molliuntur, quia calorem excipiunt, qui humorem liquat induratum. At quæ à calore interiore dura fiunt, vt siccescens humor instar testæ

excoquantur, ea nullo igne molliori aut liquari queunt. Prioris generis est cornu, posterioris Os.

Scribit *Galenus*, libro primo de semine, cap. 10. vt Offa fierent dura, materiam seminales crassam & terrestrem à calore torrefactam, ac prorsus arefactam fuisse: Ob eam duritiem & terrenam consistentiam à porosis Ossa comparantur lapidibus, ex quibus à Deucalione iactis renatos homines fingunt. Summam esse Ossis duritiem satis ostendit comparatio illa, quam adduxit *Galenus*, lib. 1. administ. Anat. cap. 2. quod in tentoriis præstant pali, quod in ædibus parietes, id in animalibus efficit Ossium substantia. His enim, vt addit hoc libro, subiiciuntur, ac veluti fundamenta quædam reliquæ corporis substantiæ subhærescunt: Quippe omnia Ossibus adnascuntur, atque stabiluntur. Durities autem non est in omnibus Ossibus æqualis, quædam enim sunt lapidosa, vt ossa temporum, alia pumicea, vt ossa spongiosa natiui, alia molliora, vt ossa sterni, alia cartilaginosa, vt ossa Coccygis.

### Cur Ossa Siccissima?

**D**Vbitare posset aliquis, num Ossa sint siccissimæ corporis partes, cum ipse *Galenus*, libro primo de Temperamentis, cap. 9. Pilos Ossibus sicciores esse tradiderit, quod etiam *Anicennus Fenus. doct. 3. cap. 2.* asseuerat, tribusque rationibus confirmat, quæ viris doctis videntur inualidæ ad probandum id quod intendit. Nam *Galenus* de industria Ossa partes animantis dixit, forsan vt Ossa distingueret à pilis, quæ sunt excrementa corporis: quippe *Galenus* naturam, & temperiem partium, quatenus existunt in viucentibus expendi voluit. Proinde Ossa non corporis, sed animalis partes esse prodidit.

Deinde *Galenus*, loco citato de Temperamentis, sibi non contradicit, nam eorum quæ cutis inuolucro teguntur Os siccissimum esse scribit, vt eorum quæ à cute expellantur pilos esse siccissimos. De hac quæstione consulendi sunt *Anicenna interpretes*, *Genetilis*, *Baptista Montanus*, & *Ioannes Costeus*.

### Cur Ossa terrestria, & an sentiant?

**O**S omne, inquit *Aristoteles*, capite secundo libri tertij de partibus animalium, & quidquid Ossis speciem gerit, terrenum est, ob id Ossa sunt grauiora. Negat tamen *Piccolominus* Ossa grauiuscula esse ob elementi terreni abundantiam, quia cinis post Ossium exustionem minus ponderat, quàm cinis reliquarum partium: quod argumento est terræ minus, quàm cæterorum elementorum Ossibus inesse, sed idcirco grauiuscula & terrena esse Ossa, quod aer & aqua in illis sint maximè concreta & condensata, vt aqua concrefcit & condensatur in gelu: At verò in marmoribus atque lapidibus plus terræ, quàm cæterorum elementorum inest, quandoquidem post eorum combustionem plurimus remanet cinis.

Veruntamen *Aristoteles*, libro secundo de partibus animalium, cap. 4. Ossa maximè terrena esse prodidit, quod elementum terræ in eorum mixtione prædominatur & exuperat: quinetiam ex terrea & pingui portione feminis constari scriptum est ab *Hippocrate*. *Galenus* autem de industria à terrestre in definitione adiunxit, vt tacite significaret Ossa sensus omnis expertia esse, cum à durissimis & siccissimis, maximeque terrenis sensus abesse soleat.

Quod eleganter declarauit *Aristoteles*, sub finem libri tertij de anima. Tacitum non esse terrenum, sic probat: quod omnium tactilium tactus sit veluti mediocritas, & susceptiuum sensorium omnium qualitatum, tam primarum quàm secundarum: propterea Ossibus & pilis, & huiusmodi partibus non sentimus, quod terræ sint, & plantæ, propter hoc nullum habent sensum, quod terræ sint. Contra pertinaciter inficiatur *Colomèus*, Ossa, quia terrena non sentire; sic enim dentes durissimi & terreni non sentirent, sed quia per eorum substantiam nulli nerui disseminantur. Alij Ossa non sentire putant, quia per eorum substantiam membranæ tactus instrumenta non sparguntur: Ossibus tantum circumiectæ sunt, ne quid alienum & inimicum in Ossa penetraret, & influeret sine sensu.

*Galenus* variis in locis demonstrat Ossa per se, naturaque sua non sentire, sed ratione membranæ circumfusæ, quæ *obuius* nuncupatur: id manifestè declarat libro

*secundo ubi ubi capite 2. membranarum, quæ Ossibus circumiectæ sunt dolores profundius sunt, & Ossium veluti dolentium imaginem inducunt. Hinc est, quod à plurimis nominantur, ac si ipsa Ossia sentirent. De hac quaestione legendus Scaliger exercit. 291. & Bartholinus Eusebii libello de dentibus, cap. 24. lege Arctium lib. 21 Chron. cap. 12.*

*De generatione Ossium, ac imprimis de Materia.*

**C**uiusque rei cognitio per suas causas perfecta comparatur: Tum nos rem scire dicimus, cum per suas causas cognoscimus. Vt igitur *Ossium natura* clarè nobis innotescat, operæpretium est generationis Ossium causas diligenter examinare.

*Ossiam materia duplex ab Aristotele constituitur, libro secundo de Generatione animalium, cap. 6. Vna generationis, Altera nutritionis. Materiam generationis vocat, ex qua in vtero Ossia cum aliis partibus gignuntur, quale est semen. In semine autem duæ partes considerantur: aliz sunt tenuiores, humidæ & aërez, aliz excrementitiæ, crassiores & terrestriores, ex quibus generantur Ossia.*

Omnes quidem Medici & Philosophi fatentur ex crassa & terrestri seminis portione Ossia constari quæ sit excrementitia, & ex qua aliquanto tempore semen nutriatur. Scribit enim Theophrastus, lib. 1. de causis Plantarum, cap. 7. Semina omnia aliquid alimenti in se continere, quod vni cum generandi principio Natura profundit, sicut in ovis, quæ de causa non ineptè Empedocles aut arbores, oua ex cellissimis ramis gignere, quia seminum natura ovis proxima est.

Sed num illa seminis portio, sit pinguedinis particeps, vel egena controvertitur. Scribit Galenus, naturam Ossia, quæ in ortu erant pinguisima, absorpta & exsiccata pinguedine terrestria, atque arida reddidisse, quod videtur desumptum, quæ Hippocrate. Turbatus & confusus elementis, quidquid fuit ex terra pinguedine & pingue, & paucissimum humidi habens, celerrimè exstumeſcit, & facta sunt Ossia. Contrarium tamen scripsisse patet, ex lib. de carn. Vbi pinguis plus, quam glutinosi existit, Ossia formantur. Requiritur ergo seminis crassamentum pingue, quod partes Ossis sicciores veluti visco conglutinet, & compingat.

Ad solvendam hanc difficultatem dicam, Os duobus modis considerari, ut fœtus, aut factum. Si in ortu suo spectetur, non potest durissimum effici ex crassa & terrestri seminis portione pinguedinis experte: necessaria igitur est pinguedo ad firmiorem substantiæ compactionem. At si in sua perfectione consideretur absoluti & perfecti Ossis substantia, omni prorsus pinguedine caret, quia per calorem expressa & exsiccata fuit.

Empedocles Ossis materiam longius repetit ab elementis, dum Ossia ex octo elementorum partibus constari prodidit, duabus terræ, vna fluidi, hoc est, aquæ & vna luminis, id est, aëris, quatuorque Vulcani, hoc est, ignis, & ideo esse alba & sicca, alba propter ignis vbertatem, sicca propter terram, hæc enim duo abundant elementa: Empedocles opinione tribus versibus expressam recitat Aristoteles, libro primo de Anima. Nec Plato in Timæo rectius Empedocle Ossis materiam exposuit, dum Ossia ex medulla & terra simul permixtis constari scribit. Excusandus tamen verbis Macroby, quod in rebus Anatomicis parum exercitatus fuerit.

*Materia nutritionis, ex qua Ossia genita nutriuntur, alimentum est naturale, quod ex Aristotele duplex existit: alteram nutriendi, alteram augendi. Nutriendi quoque materia duplex existit, remota, & proxima. Remota est sanguinis pars crassior, terrestris, seu melancholica, per venas in Ossia influens, quæ in epiphyſibus tanquam ventriculis excoquitur, atque præparatur: probat hoc medullaris succus, qui in principiis Ossium cruentus apparet. Materia proxima est medulla in Ossium cavitatibus contenta; quam Ossium alimentum esse: statuit Galenus, cum Hippocrate, quamvis enim omnes partes sanguine nutriantur, ad partem tamen appolſus alteratione quadam vis naturæ & colorem induit, & acquirit, atque quò magis distat sanguis à parte nutrienda, eò longior est illius præparatio, quæ sit in cavitatibus rectis, aut anfractuosis. Quare cum sanguis ab Ossium natura multum diffideat, in ipsorum cavitates repositus, sensim elaboratur & excoquitur, ut in Ossis substantiam conuertatur, propterea natura magnis ac durissimis Ossibus maiores cavitates dedit, minoribus Ossibus*



bus ac spongiosis cauernulas, in quibus succos medullaris, siue sanguineas medulla continetur.

Efficiens Ossium causa, authore *Polybio*, siue *Hippocrate*, libro de *natura pueri*, spiritus est semini implantatus, quæ sequuntur absurda, arguunt librum non esse *Hippocratis*, nempe per inspirationem & expirationem sensim ingreditur & egreditur, ut omnes animalis partes fiant. Rectius alibi *Hippocrates*, libro de *principiis*, scripsit calidum naturale & immortale, id est, animam vegetantem, quæ semen animatum est, ossa indurare: *Aristoteles* libro secundo de *generatione animalium*, cap. 4. tradit Ossia calore interiore perfici exarcescente humore, quare ab igne liquari & emolliiri nequeunt.

*Galenus* ad ossis procreationem caloris facultate opus esse scribit, quæ torteanator, ac prorsus ærescens: sequutus in hoc *Hippocratem*, qui Ossium generationem per exuilionem fieri decernit, & quamuis calidum illud sit moderatum, quia tamen in densiore materia diu moratur, vires easdem habet, quas intensissimus calor, ut vere videatur. Idem *Galenus* libro primo de *naturalibus facultatibus*, cap. 6. causam ossis effectricem accuratius exponit, dum air naturam in prima partium generatione similiares partes creare, vrendo facultatē generatricē & alteratricē, quibus famulantur elementares qualitates, excalescens, refrigerans, humectans & exsiccans, ex quarum permixtione nascitur & exsurgit particularis quædam facultas, quæ partibus creandis scorsim destinatur, ut est ossifica, nervifica, venifica. Cæterum hæc omnia licet appareant diuersa, in idem tamen recidunt, remque eandem significant.

Certum est, & indubiatum genitorem spiritum semini insitum ossa cum aliis partibus delineare, spiritus autem calidus ælesti igne perfusus est: ergo calidum naturale & immortale ex *Hippocrate*, causa efficiens esse potest. *Galenus* libris de *facultatibus naturalibus* demonstrare voluit facultatum magisterio nostrum equeus gubernari, ac proinde spiritum & calorem seminis, melliori formæ mancipari, nempe formatrici facultati, quibus etiam seminalis humoris qualitates elementares subseruiunt: & dum illa facultas formatrix in generatione huius vel illius partis similis occupatur, variis nominibus indigeratū potest, ad doctrinæ facilitatem, ut efficiens causa proxima designetur. Veteres quandam deam Ossium formatricem constituerunt, quæ *Osiago* dicebatur, ut legitur apud *Arnobium*.

Forma Ossium duplex à Medicis assignatur, *Essentialis & Accidental*. *Essentialis* illa dicitur, quæ dari esse Ossi, & à qua denominatur. Hæc quidam colligunt ex *Aristotele* esse animam, quia facies, ut ait ille, non est facies, nisi animam habeat, libro secundo de *generatione animalium*, cap. 4. ac proinde Os cadaueris, non eam formam retinet, qua viuens præditum erat. Quod tribus rationibus demonstrat *Scaliger* exercitatione 6. Viuens & non viuens toto genere differunt, ac distant, ideoque caret cadaueris Os, ea forma, qua præditum erat viuens. caret etiam sine, nullum enim eius officium, ut prius, non igitur idem. Quinetiam, an sit eadem materiā, dubitatur. Neque enim, ut in arte factis, eadem est lorice & vomeris materia, mutata forma. Nam si materia Cæsaris, non est materia Bucephali, quia sunt sub diuersis formis, non etiam cadaueris materia eadem numero, quæ fuit viuentis: longè enim magis distant, quam materia Cæsaris & Bucephali. Hæc enim sub propinquiore sunt genere, quippe sub animali. Illa sub remotiori, nempe sub corpore. *Iurysunt* autem reuerti abesse dicunt, quamuis maneat corpus, si forma mutetur, lib. de *verborum significatione*, lege *Mulier*.

Illas omnes rationes locus apud *Aristotelem*, lib. 4. *Meteor.* destruit ac evertit. Rerum omnium formæ actione cognoscuntur, quæ destruitur perit forma. Non enim cadauer homo est, nisi homonymus, ut homo pictus. Quod in perfectis naturæ functionibus multò magis evidētius est, quàm in imperfectis. Carnis, ut obscura est functio, ita ignoratur forma, propterea caro quæ venditur in macello, non minùs caro dici debet, quàm si esset viuentis. Ira de Osse, cæterisque homogeneis sentiendum videtur. Cum igitur viuentis Ossis forma ignota sit, eandem formam mortuum retinebit, quàm viuens possidebat. Si ignoretur nostræ mentis imbecillitati tribuendum. Apud *Aristotelem* lib. 1. de *anima & intellectu*, cap. 4. Caro, & Os tam materiā, quàm forma dicitur: & paulò post, videtur inferre Carnem, & Os in cadaueri suum nomen potiùs tētere, quàm pedem, & brachium.



*Archangelus Piccolominus in prælect. Anatomicis*, formam Ossium essentialem statuit, propriam eorum animam vegetantem calido innato insidentem. *Fallopins* vult esse soliditatem, quæ in tota substantia sibi similis sit. Apud *Galenum* partium similiarum forma Essentialis Temperamentum est, similiter Ossis forma substantialis erit temperies frigida sicca: vel calida: si *Empedocles* & *Alberto Magno* Ossia calida sint. De qua controuersia consulendus *Laurentius in Anatomicis quest.* Quare siccitas & frigiditas formam Ossis essentialem expriment, atque constituent.

*Forma accidentalis* Ossium est varia, pro ratione figuræ cuiusque Ossis rotundæ, oblongæ, vel trapeziæ, sed omnia corporis ossa ferme sunt rotunda, istamque rotunditatem seruant, vel in sua longitudine, vel in extremis, vel in cavitatibus. Imo capitulis Ossia, non tantum inrer se iuncta retinent istam rotunditatem, sed etiam separata in circuitu suo, vel sua depressionē concaua retinent istam rotunditatem.

*Finis Ossium*, Vfus est, non Actio, quam nullum Os exerceat. Ciborum enim contritio, siue masticatio, non est actio dentibus propria, quia per se non mouentur ad eam actionem perficiendam, sed ope & ministerio maxillæ inferioris, à musculis condudæ, non aliter inferuiunt masticationi, quàm lapis molaris ad frumenti contritionem. Si quis obiiciat ex *Galeno* vsum ab actione dependere, id verum esse respondebo in partibus organicis, non similiaribus.

*Finis, Communis* est omnibus Ossibus, vel *Particularis*: hicque vel quibusdam Ossibus simul, vel singulis seorsim. Communis Ossium finis, quem *Galenus* Vsum appellat, duplex est: Primus, vt sint omnium partium fundamenta ad erigendum corpus vniuersum. Secundus ad motum, progressionem, & inflexionem totius corporis, vel alicuius partis, ne serpentum more diuinum animal reptet.

*Particularis* vsum Ossium multorum simul, multiplex existit. Primus est partes principes ab iniuriis externis tueri, vt caluariz octo Ossia simul Cerebrum ab externis incursionibus defendunt: sic costæ & Ossia sterni salutis viscerum causâ simul coniuncta sunt. Secundus est, vt tutum transitum quibusdam partibus præbeant, vt vertebrae spinæ omnes simul, spinali medullæ transitum & munimentum largiuntur. Tertius vsum est, vt articulos laxos constringant, sistantque, vt patellæ duæ cum Sesamoideis ossibus. Particularis cuiusque Ossis vsum, seorsim diceret suoloco & ordine.

### De Ossium Diuisione.

**I**N constituendis Ossium *differentiis* magnam video apud *Anatomicos* confusionem, quique sibi placet in fingendis nouis differentiis, quas omnes scrupulosius persequi, vanum & inutile iudico: Cum nihil conferant, tam variz & multiplices differentiæ ad perfectiorem Ossium cognitionem, quæ auctore *Syluo* spectandæ sunt, ac etiam tactu explorandæ potius, quàm legendæ fusiùs, aut audiendæ, præsertim cum Ossia ipsa, & ea, ex quibus differentiæ huiusmodi sumuntur, lectori adhuc sint incognita.

Propterea prudenter *Galenus*, tres Ossium *differentias* proponit: quarum prima est à magnitudine, vt alia sint parua, alia magna. Secunda sumitur à cavitatibus, siue substantia caua & solida, vt alia sint Ossia concaua, alia solida. Tercia est differentia, quod alia medullam habeant, alia verò careant. Contrà *Fallopins Comment. ad hunc locum*, existimat *Galenum* dumtaxat Ossium magnorum & parvorum definitionem tradidisse, vt demonstraret magnitudinem non esse metiendum secundum tres dimensiones. Os enim *Galeno* magnum dicitur, quod non solum quantitate magnum est, sed ampliter concauum, ac medulla plenum, qualia sunt Ossia femorum, tibiz, & humeri. Erit autem Os paruum, non tantum mole sua, sed quod etiam solidum est, & sine medulla. Sic Ossia scapularum, & coxendicis licet videantur magna, erunt tamè parua: Quæ verò quantitate parua sunt, si cavitatem & medullam habent, parua non erunt, sed mediocria: atque hoc pacto *Galenus* defendi potest à calumniis *Vesalij*, qui obiicit parua Ossia excavata esse, & medullam continere. Respondet *Fallopins*, parua quidem esse, quantitate, sed cum ceteræ conditiones definiant, absque medulla & cavitatē, potius mediocria dici debere. Quamuis subtile hoc *Fallopins* commentum ad verba, & incnem *Galeni* aliquatenus accedat, vt legenti rextum apparebit: cumque *Galenus* adiungat grandioribus Ossibus datas fuisse epiphyfes, quæ cavitates occultarent, & medulla confunderent: & alibi dixerit Ossia parua omni cavitatē & medulla

destitui: non est tamen recedendum à *Syluij* sententia, videlicet hoc loco Ossium tres differentias proponi: quamvis continuata serie & coniunctim magnum, cauum, & medullosum describantur, quoniam paralleli modo tres illas differentias opposuit. Adde quod magnum id appellant Anatomici, quod triplici constat dimensione, auctore *Galeno*, libro tertio administrat. *Anatom.*

Quod attinet ad obiectionem *Fesaly*, parua etiam Ossa cavitatem, & medullam habere, etsi secus scripserit *Galenus*, lib. 11. de *usu part.* c. 12. Responde *Galenum*, alibi contrarium ostendisse, lib. 3. de naturalibus facult. cap. 15. qualis carnibus sanguis, talis Ossibus medulla, scilicet in his quæ parua sunt, sinusque expertia, cauernulis eorum inspersa: in magnis verò & excauatis simul collecta. Vt igitur contradictio illa tollatur. Notandum medullam genericè, vel specificè, siue metaphoricè, vel propriè usurpari. Metaphoricè medulla vocatur Cerebrum, eiusque propago spinalis medulla, vt variis in locis notauit *Galenus*, & potissimum lib. 8. de *usu part.* cap. 4. propriè medulla sumitur, pro succo candido, qui in cavitatibus ossium continetur. Rursum propria veraque medulla dupliciter sumitur, larè & strictè, latiore significatio medulla dicitur succus omnis ossium, siue albus, siue cruentus: sed strictè loquendo medulla nominatur succus candidus, condensatus, & in ampla cavitare conclusus: succus cruentus, vel albicans, Ossium cauernulis inspersus, dicitur medullaris. De hac questione legendus *Rorarius* *contradictionum Galeni* 112.

### *Cur Ossa sint Caua.*

Naturæ Architectonicæ in condendis Ossibus industriam & sapientiam licet admirari, quæ omnia ferme concava esse voluit ad facilitatem, & agilitatem mouendi, quamvis enim domui conueniat firmissimum, & solidum fundamentum, sintque pavimenta tantò solidiora, quantò fundamenta fuerint solidiora atque duriora, non sic ramen expediebat ossa produci. Nam si præter duritiem solida fuissent, pondere suo membrorum agilitatem retardassent, & affixissent humi diuina parietum auræ. Nec tantum ad leuitatem corporis excauata sunt, sed vt intra se medullam recondant pro nutrimento, vel potius vt in ipsius cavitatibus sanguis elaboretur & excoquatur. Nec tamen omnia Ossa caua medullam continent, quædam sunt vacua solo aëre plena, vt octo cavitates cranij, quæ sinus dicantur, & sunt tanquam *æthereæ* vasa ære in fornicibus theatri scenici apposita, ad differentiam sonorum, vt vox scenici clamoris his valis excepta, & cum incremento aucta resiliat clarior, & resonantior ad aures spectatorum perueniat. Ossium medullarium 89. enumerat *Ingrasius*: At eorum quæ caua sunt absque medulla, 39. constituit, denres annumerando. Excavantur autem ossa, vi & impulsu genitotis spiritus, qui non aliter distendit ossium materiam, quàm vitrarius insufflando in materiam vitris conficiendis aptam & idoneam.

### *Cur Ossa sint Medullosa.*

Scribit *Hippocrates*, libro de natura pueri, Ossa postquam cavitatem adepta sunt, ad se trahere è carne, quidquid in sanguine pinguisimum est: quasi diceret ossa puro & sincero sanguine nutriri. *Auicenna* statuit melancholicum esse alimentum Ossium, vt simile simili alatur. *Hippocrates* & *Galenus* medullam assignant nutriendis ossibus, quam tamen *Aristot.* lib. 2. de part. anim. cap. 6. & *Auerboes* 2. collect. cap. 8. nutrimenti Ossium excrementum esse volunt, non quidem inanime, sed vile, pingue quidem & calidum, quod in terream ossium substantiam conuerti & absumi non potuit: quam opinionè sequutus est *Consiliator differentia* 52. Nec ab ea recedit *Galenus*, *Comm. ad Aphorism.* 39. lib. 5. quia si medulla alimentum esset ossium, deberet esse frigidior, siccior, atque crassior ipso sanguine. quia non datur transitus ab vno extremo ad aliud nisi per medium: Ossa sunt frigidissima & siccissima, ergo sanguis Ossa nutriturus, quando in medullam conuersus est, oporteret ipsam medullam esse frigidam & siccam, quæ tamen omnium Medicorum consensu calida est, pinguis, & inflammabilis: Quare medulla in ossibus reposita viderur, ad humectationem Ossium, ne continua corporis agitatione nimium exarescant, vel incallescant. Vel potius crederem cum *Hippocrate*, purissimum sanguinem in Ossa deriuari, vt in pinguem & oleosum humorem conuertatur, qui rotis vel olei modo per densam &

solidam Ossium substantiam venulis carentem diffunditur, simulque calore suo languidum Ossium calorem, siue natium temperamentum fouet, & conferuat.

*De Epiphyssi.*

**E** *Epiphyssi*, vt verbum Græcum sonat, ab *ἐπι* & *ὄσσω*, superscisci, est alterius Ossis additamentum, siue Ossiculum alteri superiectum, quasi natura sui oblita Os breuius fecerit, quod deinde producit & adauget Epiphyssi addita. Desinitur à *Galenus*, alterius Ossis ad alterum vnio. *Hippocrates* sæpissime vocabulo Epiphyseos vtitur, interdum *ὄσσω* appellat, vt notauit *Galenus in Exagoga*.

Coniunctio Epiphyseos cum Osse maiore in pueris manifesta est, & perquirenda, licet adhuc in adultis vsque ad vigesimum annum, & vltra, in duobus obseruauerim, qui corpus alacre habebant, quales erant fures & saltatores agilissimi. Hic autem coarctus perficitur in pueris interuentu cartilaginis per symphyism: qua quidem cartilagine sensim exsiccata, Ossiculum tam firmiter alteri Ossi cohaeret, vt postea sit inseparabile: Tumque symphysis illa fit sine medio.

Præterea, coniunctio Epiphyseos cum altero Osse non absoluitur per planam extremitatem superficiem, sed per motuum ingressum, qui veluti gynglymoidis est.

Porro differunt inter se *Infantium* & *Adultorum Epiphyssi*, quod in illis sint cartilagines, deinde duræscences pumicosæ fiant. Osseam enim naturam acquirunt calore per motum & attritum articularum excitato: quamuis autem in adultis sint omnes osses, intrinsecos tamen, quavis parte Ossis molliores remanent. *Vesalius* & *Columbus* obiciunt, *Galenum* dixisse appendices Ossibus duriores esse *libro duodecimo de vfu partium*. Responde cum *Caprinio in methodo Anatom.* non totam epiphyssim intelligendam esse, sed tantum partem extimam & superiorem, quæ alterum Os contingit. Hæc enim pars frequenti assidueque articularum motu non attritur propter densitatem, inquit *Galenus*, quod alij tribuunt cartilaginis incrustationi. Vel dic cum *Piccolomino*, *Galenum* habere; *manu à viciis*. densas ac solidas esse epiphysses: densum autem longè differt à duro. Densum dicitur, quod *measus habet paruos*: Dutum, quod est concretum & aridissimum, ex *Aristotele libro secundi de generat. cap. 2.º*.

*Vfus Epiphyssi*, alius in adultis, alius in infantibus consilruendus est. In adultis quintuplex obseruatur: *Primus* vt sit Ossium meatorum & medullam continentium operculum: *Alter* est ad firmandam articulationem. Firmatur autem duobus modis, dum Ossa quæ sunt assidue mouenda epiphyssi coronantur, ne mutuo attritu deterantur & minuantur: vel per epiphyssim Ossa dilatantur, vt tutior efficiatur articulatio, dum pluribus partibus Os vtrumque committitur. *Tertius* vsus est, vt tendinum capita custodiat, veluti in tendonibus interioris manus obseruatur. Sed hic vsus quamuis à *Galenus* traditus fuerit, competit tamen appendici, non quatenus appendix est, sed quatenus eminet, quod etiam apophysi conuenit: *Quartus* vsus est, vt Ossium fissuras in longum factas listat, ne in articulos procedant, vel ne fractura in epiphyssi facta, subiecto Ossi communicetur: Nè ex attritu mutuo Ossium medulla eouclula exarescat, aut iucalescat. *Quintus* vsus est, vt ex coniunctione epiphyseos per synchondrosim facta, articulum amplectentia ligamenta producantur: quem vsus *Columbus* & *Falsopius* inuenisse gloriantur, cum tamen designatus fuerit à *Galenus*. Inde *Falsopius* deprehendit ligamenta non excedere epiphysses longitudinem, quod non est absolute verum: siquidem constat ligamentum epiphyssi etiam absente oriri.

Notabis ex *Vesalia*, Os, cui epiphyssi committitur, nulla sui parte mollius & infirmius esse, quam circa ipsum connexus: Ibi enim pumicis spongizæ modo multis cauernulis intus præditum est, & ipsa cavitatis, quæ medullam continet, priusquam Os epiphyssi necatur, deficit.

*Vfus epiphyseos* in infantibus duplex assignatur. *Primus*, vt infans in vtero conglobatus melius conuolui & inflecti queat sine luxatione, idcirco epiphysses extremis Ossibus duobus simul appositæ, si iunctæ essent, partem Ossis duram longitudine superarent. Alter est, ne in crebro lapsu puerorum aliquando Ossa prope fines frangerantur, quorum fractura ferulis aut spleniis commodè tractari non potest.

His de natura epiphyseos prælibatis, quoddam scrupulos ab *Ingrassis* propositos

enucleabo. Scripsit *Galenus*, grandiorum Ossium plurimās appendices in extremis partibus appositas esse, ut tacite refellat quorundam opinionem, qui artuum capita omnia epiphyfes nuncuparunt: quod ipse uotauit, *lib. 11. de usu partium, cap. 8.* quamuis autem *Galenus* dixerit grandiorum Ossium plurimas in extremo agglutinas esse epiphyfes, non inficiatur aliis partibus affigi posse, quia trochanteres extremitatibus Ossium femoris non adnascuntur: licet extremum recte sumi queat, pro eo quod est extra medium, vel quod parum distat ab extremo. Fateor *Galenum* dumtaxat Ossia grandia epiphyfis donata enumerasse in exemplum: nec licet inde infetere ex illius opinione minora carere epiphyfis, nec plura quam duodecim Ossia epiphyfis terminari. Nam videmus minora Ossia etiam medullæ expertia epiphyfes habere, atque multo plura quam duodecim Ossia epiphyfis abundare. Itaque respondet *Sylvius*, *Galenum* hic verissimas epiphyfes, easque in exemplum adduxisse: vel dic *Galenum* de perfectis tantum agere, quæ in adultis reperiuntur, non autem de epiphyfis puerorum. Quocirca *Galenus*, merito duodecim tantum enumerat Ossia, quibus appendices in extremis adnascuntur, hæcque grandia & medullosa, cuiusmodi sunt Humerus, Cubitus, Radius, Femur, Tibia & Fibula, quæ sunt sex: totidem in altero latere consistunt. Cuncti simul iuncta efficiunt duodecim: in quibus appendices dumtaxat viginti reperiuntur, Vna est in superiore humero: secunda in cubito infero: tertia & quarta in Radio superiore & inferiore: quinta & sexta Femori inest: septima & octaua Tibiæ: nona & decima Fibulæ supernæ & infernæ, quæ omnes simul collectæ decem sunt epiphyfes: Totidem sunt in altero latere, ergo viginti tantum epiphyfes *Galenus* agnoscit & admittit.

*Ingraffias aduersus Galenum*, multo plures esse appendices demonstrat, & ea Ossia à *Galeno* commemorata pluribus abundare epiphyfis. Quare præter duodecim Ossia à *Galeno* nominata, scribit alia esse, videlicet centum triginta duo, quæ iuncta cum duodecim Ossibus *Galeni*, erunt centum quadraginta quatuor, quibus si addas dentium viginti octo appendices, ut falsò existimat *Ingraffias*, erunt 172. Non vacat scrupulosius inquirere de numero Ossium, quæ duas habent epiphyfes (si scimus examinari *Ingraffias*) sunt 91. Neque quot Ossia tres emittit epiphyfes, quæ sunt quinque. Neque quot ossia quatuor habent epiphyfes, quæ sunt sex. Neque quot quinque epiphyfes recipiunt, quæ sunt septemdecim. Ista perquisitio inutilis est: Contentus ert examinare ab *Ingraffia* factum proposuisse. Sceletum diuidit in quatuor partes, in caput, dorsum, siue Truncum; manus & pedes. Prima pars sex appendices obtinet: Secunda centum sexaginta & vnam: Tertia octoginta duas continet: Quarta octoginta duas, quibus omnibus epiphyfis simul collectis inuenies 331. quas tamen in pueris, non in adultis perquires.

### De Apophysi.

**A**pophysis, siue processus, definitur à *Galeno* ossis totius pars, non addita ut epiphyfis, sed ab ipso osse prognata, ac veluti protuberans. Differt à corpore ipsius ossis, quod sit angustior, & ab eo expulsetur, ut stolones ex arbore.

Differentia autem *Apophysum* plures sunt. Aliæ sunt Styloides, Mastoides, & Coracoides. Aliæ rotundæ, vel longæ. Si rotunda fuerit *Apophysis*, Caput nominatur, si longa, & capite siue tuberculo terminata, *Cervix*. Caput vero, vel est elatum & excelsum, quod absolute caput dicitur. Vel humile & depressum, quod *Caudylus* vocatur: quod si caput absque ceruice fuerit, non proprie caput, sed *Tuberculum*, aut *Apophysis* nominatur.

Cæterum apophyseas appellatio propria est, vel impropria. Propria dicitur, ubi ipsius ossis pars est, à primo ortu protuberans, ut in infantibus. Impropria ubi osculum adnatum sit continuum, quod apophysis dicitur, ut cum in adultis epiphyfes degenerant in apophyses. Vera igitur proprietates apophyseas in ossibus infantum perquirenda.

Quod ad *Vsum Apophysum* pertinet, *Rotunda* ad ossis articulationem comparata fuit. Reliquæ apophyses acuminatæ, aut varix figuræ ad originem & insertionem musculorum, necnon vasorum, aut tendinum securiorem transitum destinatæ sunt.

*Quid σκελετός, eiusque diuifio.*

**A** Nimal est politicum, homo, natus ad ciuilem societatem, & varias actiones obeundas, qui si vnicō continuoque osse compactus fuisset, rigidus & immobilis, velut Marpesia cautes stetitisset. Talis erat ille, quem viuentem, & mortuum in Xenodochio vidit *Calanus*, viuens nihil præter oculos, linguam, penem, abdomen, thoracem mouebat. Defuncto homine inuenti sunt omnes articuli, à capite vsque ad pedes continui. Ad motuum igitur varietatem, corpus ex pluribus & variis ossibus efformatum obtinuit. Nec tantum ad motum, verumetiam ad perspirationem, transitum cuiusdam substantiæ, partium discrimina, securitatem, & dyspatheiam. Moralis est ratio, quam profert *Lactantius*, lib. de ira Dei. Nempe Deum solidamenta corporis, quæ ossa dicuntur, nodata, inuicem adiuncta nervis alligasse & constringisse, vt si mens excurrere aut resistere velit, illis tanquam cerinaculis vteretur.

In cadauere detractis carnibus, vniuersa ossium coagmentatio, siue syntaxis, *anatomis* dicitur, vt in viuente homine omnium partium vnicō & compages, *anatomia* vocatur à *Galeno*, libro primo de vfu partium. Bis autem definit sceletum, in *duo* huius libri, & sub finem, vt indicaret se dumtaxat agere de Ossibus, quæ sceletum hominum componunt.

*Anatomis* autem dicitur, à verbo *anō*, quod est attenuo, exsiccō, ideoque sceletos est propriè cadauer exsiccatum, exemptis carnibus. *Tertullianus* cadaueris cratem appellat: *veteres Medici* eiusmodi scelecta, siue ossa inter se coherentia & coaptata habuisse, & Tyronibus ostendisse, patet ex *Galeno*, libro primo admiuisti. *Anatom.* capite secundo, dum ait se cadaueris arefacti sceletum inuenisse, ossibus adhuc inter se strictim coherentibus, quale Medicus ipsum, ad adolescentis disciplinam de industria præparasset.

Communiter sceletos diuiditur ab *Anatomicis*, *Ingrasia*, *Valchero*, & *Laurentio*, in caput, truncum, & artus. Capitis nomine *Caluam*, & *Faciem* comprehendunt: *Facies* duas continet maxillas, superiorem & inferiorem. Per truncum intelligitur *totā spina*, eique adhaerentia ossa, *costa*, *sternum*, *scapula*, *ossa ilium*, & *clauicula*. *Artus* sunt manus, & pedes. Quæ diuifio ex *Aristotele* desumpta videtur, qui corpus diuidit in Caput, Truncum, & Artus. Hanc sceleti partitionem sequutus est *Galenus*, quamuis differre non expresse, sed ex capitum serie manifestè colligitur. Attamen scapulas à trunco coniunxit, atque etiam clauiculas, quia spinæ non coherent, & propter manus actiones videntur comparatæ. Similiter Ossa ilium à trunco separauit, & ad pedes reuocauit. Quibus autem titulis inscripserint *veteres Medici* libros suos de Ossibus, declarat *Galenus*, lib. 1. admiuisti. *Anatom.* cap. 2.

*Quid Articulus?*

**A** *Πῶς* Græcis dicitur, *ἀπὸ τοῦ ἀρτίζω*, quod videlicet per ipsum partes ad inuicem continuè accommodentur, atque coeant, vel inde dictum volunt, *ἀπὸ τῆς ἀρτίως λέγειν*, quod concordī quadam copula inuicem firmentur, conueniant, atque constringantur, inquit *Alextius*, de nat. hom. Etymolog. Græcum *ἀρτίζω* deriuat, *ἀρτίζω*, quod est eleuo, & attollo, quoniam ab articulis portamur & mouemur, vel *ἀπὸ τοῦ ἀρτίζω* vel *ἀρτίζω*, quod est suspendo, coniungo. Authores verò Latini per articulum intellexerunt minimam corporis particulam, quod nomen ab artubus deriuatum est. Nam articulus apud antiquos propriè significat os paruum, sicuti artus partem ossis magnam denotat: postea translata fuit vox articuli ad ossium capita, imitatione Græcorum, vt legitur apud *Celsum* & *Plinium*, qui ossium capita, siue nodos appellant articulos. Nerui ligant nodos, quos Latini articulos dixerunt. *Plinius*, lib. 11. cap. 37. *Plautus* artui dixit, & deartuare: Sic apud *Poëtam* vsurpatur, lib. 5. *Æneid.*

*Et magnos membrorum artus, magna ossa lacerisq;*

*Exiit.* Forfan dicitur articulus, quod eius ope duo Ossa inter se arcentur authoritate *Fesso*, vel à Græca dictione *ἀρτίζω*, Latini articulum dixere.

Articuli apud *Hippocratem* multiplex acceptio, interdum denotat Ossis extremum, non quodlibet, sed rotundum, quod in cauitatem alterius inseritur, vt lib. de ossi. docet *Galenus*, & *Comment.* 2. in lib. de Fracturis. Sic *Hippocrates*, lib. de arte. Bea-

chij Caput superius *ἀνω ἄρτην* appellat, & eodem libro laterales vertebrarum processus, *ἡ μεσσήνη ἄρτην*. Eisdem autē *ἡ ἐξω ἄρτην* coxendix *ἄρτην* dicitur, lib. de Carnibus: & Aristoteles in voce, *ἄρτη* : & *ἄρτην* vocat vocis distinctionem & explanationem, libro quarto de historia animalium. Galenus variis in locis docet articuli nomine ab Hippocrate appellari, aut ipsam Ossium conjunctionem, aut ex Ossibus, quæ inter se committuntur, non cauum proximi Ossis caput, vel extremum recipiens, sed Os alterum subiens. Verumtamen Erotianus in Onomastico notauit vtrumque Os, ex quo articulus extrahitur, *ἡ ἄρτη* nominari ab Hippocrate, cum ait in coxendicibus, *ἡ ἄρτη* duo sunt, quæ *ἄρτην* appellantur, propterea Galenus prudenter ex Hippocratis doctrina, adiunxit hoc libro *ἄρτην*. frequenter, minime, ab Hippocrate nuncupati, alterius coherentium Ossium finem rotundum, in Ossis propinqui cavitatem insertum: non absolute ægans, quod alibi fecit, nomen articuli nullo modo conuenire cavitati Ossis, quod alterum admittit, ad articulum constituendum. Bartholemeus Eustachius, insignis ille Anatomicus, Scholius in Onomasticum Erotiani, ex infinitis Hippocratis locis demonstrat, Articuli nomen, etiam cavitatibus Ossium attributum fuisse.

### Doctrina Galeni de Articulis accuratè explicatur.

**G**aleni doctrina de articulis multis difficultatibus intricata est, quæ peritos Anatomicos valde torquent & exercent, dum alij Galeni partes tueri nituntur, alij impugnare. Fuchsius in hac causa clypeum mutat, Danaumque insignia sibi adaptat, & ad excusationem profert spurium esse Galeni librum de Ossibus, multisque in locis deprauatum. Posset aliquis cum Galeno dicere, curiosum vocabulorum studium non fuisse apud veteres in explicandis articulis, atque lites & controuersias illas de nominibus esse. Verumtamen demonstrabo verissimam esse Galeni doctrinam, & in omnibus locis sibi consentaneam.

Imprimis scire conuenit non esse de essentia articuli, vt motum habeat, quamuis apud Hippocratem & Galenum, super eare non leuis discordia obseruetur. Nam Hippocrates, lib. de arte, *ἄρτην* vocat, in *ἄρτην* *ἡ ἐξω ἄρτην* *ἡ ἐξω ἄρτην*. In quibus Ossium quæ mouentur compages, ac commissuræ vertuntur: Forsan intelligit per *ἄρτην*, cavitates Ossium, in quibus alia ossa mouentur & vertuntur, sic cavitates coxendicum *ἄρτην* nominauit: & lib. de vultu capitis, Maxillæ caluæ articulantur in temporibus, ibidemque sursum & deorsum articuli in modum mouentur. Eripsemet Galenus, notat Hippocratem *ἄρτην* vocare eorum quæ mouentur. Verumtamen Hippocrates sibi contradicit, lib. de locis in homine, vbi articulos appellat, *ἡ μεσσήνη ἄρτην*, simpliciter, ossium commissuras: quæcumque ossa inter se committuntur, ea omnia articulos efficiunt.

Quod spectat ad Galenum, fatetur lib. 11. de vsu partium, cap. 12. propter motum extructos fuisse articulos, sed non solius motus gratia, quoniam ob perspirationem aut transitum cuiusdam substantiæ, aut partium discrimina, aut securitatem, ac patiendi difficultatem factos esse censet. Hispositis & constitutis fundamentis, pergo veritatem doctrinæ Galenicæ demonstrare. Scribit ille conjunctionis Ossium modum in genere duplicem esse, alium per articulum, alium per symphysin, vt ostenderet articulum à symphysi differre, seorsimque existere. Nempe articulum esse sine symphysi, & vicissim symphysin dari absque articulo. Nam articuli vera essentia & natura consistit in sola contiguitate Ossium, siue per ingressum, aut receptionem, siue per planam superficiem fiat, vt in Harmonia. Quod manifestè declarauit Hippocrates, lib. 4. de articulis sub finem. Imprimis nosse conuenit Ossium commissuras, vt plurimum ex capite & acetabulo constare, ac in quibusdam cauum acetabuli formam referre, & oblongum esse. In nonnullis verò sinus leuiter esse depressos. Ex eo loco notabis Hippocratem scripsisse, commissuras Ossium, vt plurimum ex capite & acetabulo constare, quasi diceret alias dari, quæ non eo structuræ modo componuntur, sed per planam superficiem, cuiusmodi sunt harmonia & futura. Itaque definitur articulus *naturalis Ossium syntaxis*. Symphysis verò *naturalis Ossium vni*, vtrique adiunxit dictionem, naturalis, vt doceret in articulo requiri solum contactum extremorum, & in symphysi medium naturæ, quale in prima conformatione duobus Ossibus interiectum est. Idcirco licet Ossa luxata, vel subluxata inter se cohereant, fractaque callo inducto vniantur, id tamen non est secundum naturam: quia Ossa duo inter se di-

stant, nec se contingunt, & Ossium fracturæ callus non prima naturæ intentione, sed secunda generatur: & quamvis post fracturam Ossa callo unita appareant, intus adhuc separata manent. Præterea, Ossium per fracturam unio non potest esse naturalis, quoniam à primo vitæ ortu hæc diuisio non fuit à natura sic extructa: Propterea licet fracta callo uiuantur, non possunt dici iuncta per symphysim.

Articulus duas sub se comprehendit species, *diarthrosim*, & *synarthrosim*: *Diarthrosim* est cum motu manifesto & euidenti. *Synarthrosim* cum motu obscuro, aut nullo. Sed motus manifestus & obscurus hoc loco, pro magno & paruo sumitur. Alibi nempe, lib. de motu musculorum, Galenus motum manifestum appellat, qui causam manifestam habet, ut musculum: Motum obscurum, qui causam dubiam vel obscuram. Cum igitur diarthrosis, & synarthrosis differant inter se pro motus quantitate, in textu Galeni pro ut utrinusque, legendum mihi, qualitate, id est, specie. Quoniam in diarthrosi motus est euidens & voluntarius: In synarthrosi obscurus vel nullus. Interea notabis Galenum per motum euidentem intelligere motum voluntarium. Per occultum & obscurum motum, non voluntarium: quemadmodum istos motus exposuit Author quicumque fuerit istius libelli de motibus manifestis & obscuris. Propterea Ossa quæ musculis habent ad motum, & seorsim mouentur, sunt iuncta per diarthrosim. Quæ verò aliorum Ossium motum sequuntur, per synarthrosim coherent, ut Ossa quædam carpi, & metacarpij. In pede Tarsi Ossa, & fibula cum tibia. Proinde in diarthrosi motus manifestus & euidens erit, in synarthrosi obscurus & inaspectabilis.

Forma quidem structuræ laxa vel stricta, confert ad motum, sed non est efficiens causa motus, ut musculi. Propterea Ossa inter se iuncta ratione structuræ, erant vel enarthroses, vel arthrodiz, vel ginglymi. Si voluntarium motum habeant ex musculis propriis, pertinebunt ad diarthrosim. Eadem verò articulationum species si fuerint immobiles, vel cum motu exiguo aliunde dependente, referuntur ad synarthrosim, ut videre est apud Galenum, libro secundo de usu partium, cap. 8. & tib. 1. administr. Anatom. cap. 10. exemplo Ossium carpi inter se, & secundi ordinis Ossium carpi cum metacarpio, quæ obscurè mouentur, licet careant musculis propriis ad motum, sed in summa flexione, totius manus motum sequuntur. Hippocrates in synarthrosi nullum motum admittit. Maxillam superiorem capiti iunctam esse per synarthrosim scribit, & duorum Ossium maxillæ inferioris connexionem, quæ synarthrosis est, symphysim vocat, quia nullo modo mouentur, ut Ossa, quæ symphysi iuncta sunt. At diarthrosis apud Hippocratem semper est cum motu euidenti, vel obscuro. Id patet ex Galeno Comment. ad part. 32. lib. 1. de fracturis. Totum id appellatur diarthrosis, ubi committuntur extrema Ossium, quæ in flexu & porrectione mouentur. Galenus lib. 12. de usu partium, huic opinioni subscribit, cum diarthrosim vocat Ossium compositionem propter motum voluntarium comparatam. Tradit etiam Galenus, lib. 3. de articulis part. 37. Antrōdū vocabulum apud iuiores Medicos vlitatum esse, quo significant Ossium commissuras, quibus talis inest motus, ut sensu aliquatenus percipi possit. Si quis obiciat obscurum articuli motum ad synarthrosim pertinere, ex Galeno, qui alibi definit synarthrosim iuncturam Ossium, quæ vix aut nullo modo mouentur. Respondebo id etiam reperiri in differentiis synarthroseis: Nam Ossa capitis obscure & insensibiliter moueri instar conchylij notauit Galenus. Vidit etiam laxari & constringi suturarum compages. Dentes interdum laxati mouentur, qui postea tenaciùs adhærescunt.

Synarthrosis verò, quia pro motus quantitate, differt à diarthrosi, præter illas tres enartatas differentias adhuc sub se recipit *Suturam*, *Harmoniam*, & *Gomphosim*: sic enim interpretandus Galeni locus, capite 13. huius libri, cum scribit costarum partem cartilagineam & condylosam, cavitatibus glenoideis sterni committi, quia motus adeo exiguus est, ut synarthrosis appellari queat: subiungit, in multis siquidem aliis corporis partibus de structura Ossium ambigitur, incertumque, an ea per synarthrosim vel diarthrosim copulentur, quia modus coniunctionis factus cum cavitatibus & capitulo, articulatione diarthrosi adiudicat: sed motus obscuritas ad synarthrosim reuocat. Inde colligitur in articulationibus considerandam esse motus qualitatem, quantitatem, & structuræ formam. Nam multi sunt articuli, qui ratione structuræ sunt differentie diarthroseis, sed ratione motus obscuri & inaspectabilis, pertinece videntur ad synarthrosim. Hanc synarthroseis significationem illustrat locus in:



signis apud *Galenum*, *Comment. ad partic. 14. lib. 2. de articulis*, qui reperitur *Comment. ad partic. 9. eiusdem libri*.

Quæret aliquis, an *sutura* & *harmonia* motum aliquem habeant, *Galenus Comment. ult. sect. 3. de Officina*, *suturas capitis naturaliter disungi & coardari demonstrat*, vi tamen quadam molliter impellente, cum turgescit *Cerebrum* non spontaneo motu, idque probat ex *Hippocrate*, quod etiam euenire scibit in *Ossibus* per *harmoniam* iunctis.

### *Species Diarthrosæ & Synarthrosæ.*

**P**rudenter *Galenus* in definiendo articulo motum prætermisit, ut hæc definitio speciebus articuli, nempe *diarthrosi*, & *synarthrosi* conveniret. Quippe *synarthrosis* ex *Galenus*, *lib. 2. de artic. part. 9.* est cum motu obscuro, vel nullo. At hoc loco in definienda *synarthrosis* motus priuationem obmisit, ob eam causam corruptum esse locum censet *Ingrasias*. Alij pro *diarthrosi*, legunt *diarthrosi*, qui vix oculis, aut nullo modo deprehendi potest, ut hic locus alteri prædicto consentiat. Adde quod *Galenus*, capite duodecimo *Introduktionis*, *synarthrosim* propter quietem & stabilitatem factam esse prodidit, quod de aliqua, non omni *synarthrosi* est intelligendum. Ridiculus enim fuisset *Galenus*, si definiens *synarthrosim* cum motu, differentias assignasset planè immobiles, *suturam*, *harmoniam*, & *gomphosim*. In quibus *Ossa* inter se connexa sunt, non propter mutum, sed quietis causa, propterea *Hippocrates* *synarthrosim* etiam *symphylium* appellavit, ut demonstraret etiam immobilitatem in *Ossibus*, per *synarthrosim* iunctis.

*Diarthroses* tres species *Galenus* constituit, *Enarthrosim*, *Arthrodiam*, *Gynglymon*, quas quidem appellationes veteribus Medicis parum vsuatas, à recentioribus introductas fuisse memorat. Verumtamen apud *Hippocratem* nomen *Gynglymi* extat, *lib. de articulis*, & *lib. de iactis in homine*, & apud *Aristotelem*, *lib. 3. de Anima*. Alibi, *lib. 2. de partibus animalium*, cap. 9. *Aristoteles* duobus tantum modis *Ossa* connecti tradit: primus est cum vnum *Os* cauum, alterius rotundum caput excipit: aut utrumque cauum, medio *Osse* veluti clauo continetur. *Enarthrosis* & *Arthrodia* consimiles sunt articulationes, quæ tantum inter se differunt, secundum magis & minus. Vtraque perficitur cavitae *Osis*, & capite rotundo alterius *Osis*. In *Enarthrosi* cavitae est profunda, caput oblongum. In *arthrodia* cavitae est superficialia, caput depressum: Vel si differunt, dicendum est *arthrodiam* esse, quando caput amplius est cavitae, ut exemplo *arthrodiz* humeri cum *omoplate* comprobatur, quod *Galenus* adduxit, alioquin si totum caput cavitae comprehendatur, ut in articulatione femoris & *cotyles* *Ilchij*, *enarthrosis* erit.

*Ingrasias* existimat in textu Græco omisam esse particulam *synarthrosæ*, quam suo loco restituit, *ὅτι δὲ τὰ τὰ ἐπὶ διαρθρώσεως, & συνάρθρωσεως*, ut tres illæ *diarthroses* species commemoratæ, videlicet *enarthrosis*, *arthrodia*, & *Gynglymus*, referantur ad *synarthrosim*. Nam si *diarthrosis* & *synarthrosis* dumtaxat pro motus quantitate inter se differunt, ut docet *Galenus* in proœmio huius libri, & cap. 13. & *lib. de dissect. masc. cap. 22.* easdem species obtinebunt, ut exemplis ex hoc libro depromptis probari potest, nimirum plurima *Ossa*, quæ exiguum & obscurum habent motum, vel nulum, per *synarthrosim* connecti, quæ tamen ratione structuræ sunt *enarthrosis*, *arthrodia*, & *gynglymos*. Costæ cum sternone per *arthrodiam* articulantur, sed quia motus huius articulationis exiguus est, ad *synarthrosim* pertinet, capite duodecimo. Carpi octo *Ossa* inter se immobilia per *synarthrosim* copulantur cap. 17. quæ tamen articulationes, partim sunt *enarthroses*, partim *arthrodiz*. *Metacarpij* *Ossa* parum mobilia ex *Galenus*, *lib. 1. administrat. Anatom. cap. 10.* & cap. 1. *lib. 2. de usu partium*, cum carpi *Ossibus* per *synarthrosim* iunguntur, ut cap. 17. docetor, quamvis sint *arthrodiz*. *Sura* *tibiae* iuncta est immobiliter per *synarthrosim*, cap. 21. *Ossa* *tarsi* minora per *synarthrosim* copulantur immobiliter, ex cap. ult. huius libri. *Gynglymi* bina exēpla proponit *Galenus*, quorum vnum cum motu manifesto, ut *gynglymus* cubiti cum inferno humero pertinet ad *diarthrosim*. Alterum exemplum cum motu obscuro, referatur ad *synarthrosim*, ut *gynglymos* vertebrarum, ubi *Syluij* interpretationem emendabis, qui *ἄντικυ* Latine reddidit, supra & infra appositionem, cum propriè signifi-



cet mutuum ingressum, retributionem, quare ubi legit *Sylvius*. Nam in *Spondylis medius* in utrumque supra & infra oppositum subit, quia nullus est gynglymos, cuius dicitur mutua receptio & intentura, sic leges: nam in *Spondylis medius* mutuum ingressum cum utroque circumstante habet. Altragali caput rotundum oblongæ cervici adnatum, casus scaphoidis ossis connectitur, quod est enarthrosis pertinens ad synarthrosim. Sterni ossa inter se per synarthrosim copulantur ex *Galeno* in hoc libro. At ex eodem libro, septimo administrat. *Anatom.* per harmoniam. Ergo harmonia species est synarthroseos.

*De Gynglymo particularis Observatio.*

**G**alenus duplicem gynglymum constituit, ratione structuræ differentem: vel enim fit ex duobus Ossibus, ut in humero & cubito, femore & tibia, vel ex tribus componitur, sicut in vertebra. Nam vertebra in medio sedens superiorem admittit, & ab inferiore vicissim excipitur. *Vesalius* secundum gynglymi modum reprehendit, quem tamen *Galenus* gynglymo quodammodo similem esse scripserat: quia gynglymos unicum edit motum, At vertebra præter flexionem & extensionem, habent etiam lateralem motum. Respondeo hunc lateralem motum, non pendere ab articulatione omnium vertebrarum inter sese, sed ab articulatione dumtaxat undecimæ vertebræ cum duodecima perfici. Addit *Vesalius* superiorum vertebrarum usque ad undecimam, diuersam esse articulationem ab illa inferiorum. Sed quamuis articulationes vertebrarum supra undecimam diuersæ sint, ab articulationibus vertebrarum infra undecimam, nihilominus semper in istis articulationibus mutua est receptio, quæ fit in tribus vertebra. Denique si gynglymos iste vertebrarum admittatur, in aliis etiam Ossibus constituendus erit, quæ parte una excipiunt, & altera excipiuntur: cuiusmodi sunt prima digitorum Ossa, quæ superiori sede per Enarthrosim postbrachialis Ossibus iunguntur, & ima parte Ossis secundi sinus subeunt. Hanc postremam obiectionem præuiderat *Sylvius*, quam ita diluit, in *Comment. de Ossibus*, hoc loco videtur desiderari commissura utrimque duplex, reliquorum Spondylorum supra & infra decimum. Imo si credimus *Fallopio Comment. de Ossibus*, solæ vertebra iunctæ sunt per gynglymum. Ideoque *Galenus* suæcenset, quod de natura & perfectione secundi gynglymi dubitauerit, quem verum esse gynglymum ita demonstrat. Gynglymos significat cardinem & clauum, quibus ianua continetur. Nam antiquius utriusque extremo valvæ infixus erat clauus, qui aptis caviatibus recipiebatur: similis est gynglymos vertebrarum, quæ utrimque vicinis Ossibus connectuntur. Ipsemet *Hippocrates*, cuius opinioni stare oportet, gynglymum duplicem agnoscit, brachij & cubiti, femoris & tibiæ articulationem gynglymum vocat, & lib. de artic. vertebra inter se per gynglymum colligari scripsit. Si desideras gynglymi accuratam descriptionem, lege *Galenum Comment. ad partic. 10. lib. 2. de fracturis*. In *Græcissis Comment. in lib. Galeni de Oss.* quadruplicem gynglymum proponit. Primus est verus & proprius, cum Ossa duo in eadem parte per mutuum ingressum sese inuicem subeunt, ut in cubito & brachio apparet. Secundus minus propriè dictus, est duorum quoque Ossium mutua, sed duplex articulatio, per mutuum ingressum in distantibus locis facta, ut accedit in radio & cubito, fura & tibia. Tertius magis remotus & alienus, fit ex dupliciter Ossium articulatione, in qua medium Ossedens una parte suscipit, & altera suscipitur, ut in vertebra observatur. Quartus est duorum Ossium in eadem parte, per duplicem & consimilem articulationem facta coniunctio, qualis in vertebra cervicis cernitur. Quintum gynglymum ex *Celso* profertur de maxilla inferiore, quam dixit cardinis modo iungi. *Aristoteles lib. de motu animalium*, commissuram Ossium in genere gynglymum appellat, eodem sensu, lib. 3. de Anima cap. 2. gynglymum accipit: in eo conuexam quandam partem esse statuit, alteram concavam, quarum una finis, altera principium est, una quiescit, altera mouetur: quem locum imitatus est *Galenus*, lib. 1. de motu animalium. Inde apparet *Aristotelem* gynglymum accipere pro ea articulatione, quam Enarthrosim vel Athrodiam vocamus: quas quidem articulationes consimiles esse credit, quoniam inter se tantum differunt secundum magis & minus. Scripsit *Galenus*, lib. 2. administrat. *Anatom.* Ossium capitis commissuram cardinis in modum fieri, *γυγγλῖμος ὁμοῖον*. Et apud *Aristotelem libro quarto de historia animalium*, legitur Patellas esse bifores, *ἰσὺν γυγγλῖμον*. Apud *Xeno-*

*phontem in lib. de re equestri, commissura est extantium rerum ad curuitatem, cavitatemque aliquam, ut in brachijs, & vultus, inquit Scaliger. Quomodo sit accipiens gynglymos, docet I. Caius Britannus, Scholius ad lib. 2. administr. Anat. Galeni, & minor ex ea interpretatione Cay, Fuchsinum suspectum habere Galeni librum de Off. cum ipse Caisum tanquam germanum agnoscat, & reprehendat Vesalium, qui in prima editione suae Anatomies in folio, malè descripserit, & depinxerit gynglymum, quod immutauit in secunda editione.*

### De Trochoide Articulo.

**D**iarthroseos tribus differentiis *Fallopianus* quartam addit, quam *Throchoidem* nuncupat. Cum os cauum rotæ instar, processum alterius tanquam axem admittit. Talis est primæ vertebræ cum secunda articulus, in quo conuersionis motus manifestè deprehenditur. Sed imperitè meo iudicio hanc nouam articuli speciem *Fallopianus* adiunxit. Quia similitudo claudicat, & imperfecta est, cum desit conuersionis motus. Nam prima vertebra supra secundam obliquè, & ad latera tantum mouetur, non circulariter, ut rota circa axem. Deinde dens *Pyrenoides* vix tertiam cavitatis partem opplet. At axis crassities cauo rotæ æqualis est. *Platerum* perperam hunc articulum ad *Enarthrosim* refert. Nam ubi caput oblongum, ibi profunda cavitates adesse debet. Ego verò statuo esse *arthrodiam*, quia tuberculum dentis *Pyrenoidis*, recipitur à leui, & superficiali cavitare *glenoide* primæ vertebræ. *Vesalius* diceret esse gynglymum, qualem describit, & apparet in ossis, ubi clauus crassior parieti affixus, verticillum ossis subit. Interim notabis hanc articulationem ab alijs planè diuersam esse, neque vllam in toto corpore similem extare. Nec enim per extremorum contactum perficitur, sed per latera, & caua, & capitata,

Noctatione dignum est ex *Vesalio*, *Enarthrosim* & *Arthrodiam* pluribus & varijs motibus insinuire: *Gynglymum* verò solam flexionem & extensionem pati. Quod priùs animaduersum fuerat ab *Hippocrate lib. de fracturis*, cum agit de cubito. Obseruabis etiam in magnis, & liberis articulationibus, ut *Femoris*, *Humeri*, *Carpi*, *Altragali*, ossa capitata, quæ excipiuntur moueri ad libertatem motus, in alijs articulationibus minoribus ossa sinuata quæ excipiunt, moueri.

### Particularis explicatio Capitis, Cervicis & Cavitatis, in Ossibus.

**C**um in his tribus articulationibus ossa duo coniungantur, quorum vnum cauum est, alterum orbiculatum & capitatum, quid capitis, & cavitatis nomine intelligendum veniat, *Galenus* explicat. Caput, inquit, est prominens, vel depressum, *caput æquius, vel curu.* verumque caput ad ceruices referens, quasi diceret prominens erit caput, si ceruix oblonga fuerit, depressum caput diceretur, si ceruix brevis adfuerit. Caput verò sine ceruice, non propriè caput, sed tuberculum apud *Anatomicos* recentiores vocatur. *Galenus* *istius* appellat libro primo de motu musculorum, cap. 9. Capita Ossium quæ non committuntur profundæ cavitati, sed leui & *glenoidi istius* appellarem cum *Galeno*, qui hoc libro capita gemina inferioris humeri, & inferni femoris ita nominauit: similiter *Hippocrates*, extremitates digitorum *istius*, nodos appellauit.

*Vesalius Galenum* reprehendit, quod tres illas voces, *Caput*, *Condylum* & *Epiphysim* confundat, dum lib. 12. de usu partium, cap. 15. Artuum capita, epiphyses, ac condylos vocari tradit. Respondet *Fallopianus*, *Galenum* loquutum fuisse tantum de magnorum Ossium capitibus, quæ artus magnos constituunt, in quibus epiphysis & caput idem sunt, ut in femore, humero, & tibia, quod significasse videtur *Galenus*, dum scribit, ceruices esse tenues Ossium apophyses, quæ terminantur in crassum orbiculatum extremum, quod caput nominatur. Terminatio illa quæ fit extremo orbiculato denotat caput non esse portionem huius apophyseos, sed quid oppositum instar clausuræ. Inde colligitur ceruices esse Ossium apophyses, capita vero epiphyses.

Ceruices autem sunt tenues Ossium apophyses capite terminatæ, quæ referuntur

ad capita, ut capitis eminentia, & depressio reuocatur ad ceruices. Quando verò apophysis in acutam extremitatem desinit, non amplius ceruix, sed *apex* dicitur, deducta similitudine à rostro cornicis, vel cornu, aut à similitudine extrinorum arcus, quæ *apex* nominantur. Reprehenditur *Galenus* à *Vesalio*, quod contra propriam coronas, occipitalis ossis tubercula, quæ primæ vertebræ articulantur, coronas appellat, cum sint capita, dicere orbiculata: At hæc tubercula sunt oblonga, & in mucronem desinunt, *apex* illa non est erecta, sed transuerso situ occipiti appressa.

Pro capitum varietate, cavitates quoque diuersæ sunt, cum illis proportionem respondeant. Alia est profunda, quæ *cupula* dicitur, acetabulum, siue acceptaculum, vulgò pyxis. Alia cavitates parum sinuosa & superficialia, quæ *fovea* & *foveolæ* nominantur. *Cotyle* mensura est caua liquidorum, Latinis hemina: *cupula* etiam apud *Hippocratem* significat poculi genus concavum, ut docet *Foetus in Oeconomica Hippocratis*. Veteres hoc nomine quamlibet cavitatem alterius Ossis caput excipientem designarunt. Nam *Galenus* hoc libro, & *Ruffus Ephesus*, cavitatem omoplatæ *cupula* appellarunt; *fovea* dicitur à figura sinus, seu cavitatis, quæ circa oculos palpebris clausis formatur à superciliis, & superiore maxilla.

Cavitates quædam dicuntur *scutula*, cuiusmodi sunt cavitates, quæ trochleæ inferioris brachij accumbunt, in quas cubiti processus, seu cornices ingrediuntur, ex *Galeno*, libro tertio de usu partium, cap. 15. *Læpius* apud *Hippocratem*, *scutula* significat quamlibet cavitatem, ut videre est in *Oeconomica Foetus*. Dicitur *scutula* à *scuto*, quod est gradior, & ascendit per scalam.

Porro cavitatum circumferentia eminentiis circularibus & cartilaginosis adaugentur, quæ quoniam instar labiorum prominent, *labia* appellantur. Cum autem cavitates sint magis, vel minus profundæ, profundioris labrum, siue supercilium magnum, & altum erit, quod *cupula* & *cupula* dicitur: ab olla seu patinæ supercilio, ut in cavitare Ischij habetur. Varias huius nominis significationes profert *Foetus in Oeconomica Hippocratis*: dicitur etiam *scutula*, quod oculorum superciliis assimiletur. Cavitatis parum sinuosa & superficialia supercilium *scutula* nominatur, siquidem *scutula* partem extremam scuti significat, quæ levis est *cupula*, cuius supercilium leue & depressum est, quale existit superciliis cavitatis in omoplate. Cæterum non omnes cavitates, seu sinus Ossium articulationis gratia constructi sunt, sed ut tendones musculorum, vel aëri per eos traducerentur, vel inde orthogonalimenta tenacius haberent. Nec omnia capita Ossium articulationis gratia parata sunt, quædam absque articulatione, musculorum exortibus & insertionibus destinata sunt. Ceruices quoque insertionibus musculorum, & articulationibus inferuiunt, ut in maxilla inferna, & cubito superiore, & ceruice femoris videre est.

### *Synarthrosee species sigilla m enarrantur. \**

*Synarthrosis* præter tres illas, diarthrosi communes, habet tres alias peculiare, *Suturam*, *Gomphosum*, & *Harmoniam*. Idcirco *Ingrafias* putat mendum irrepsisse in textum *Galeni*, aut omissam fuisse particulam, atque ita legendum existimat, *in Synarthrosis autem, & alia tria sunt species*. *Synarthrosee* autem, tum hæc, tum aliz quoque tres sunt species, quod exemplis demonstrari potest. Suprà probatum ex *Galeno*, quædam *Enarthroses*, *Arthrodias*, & *Gynglymus*, ratione motus obscuri pertinere ad *synarthrosim*. Idem *Galenus* libri 2. secundum locos cap. 1. *Suturam* capitis *synarthrosim* vocat, & lib. 9. de usu partium, cap. 1. scribit caput futuris coarticulatum *synarthrosim*, *Ossa sterni* inter se per *harmoniam* iuncta esse, notat lib. 8. administrat. *Anatom.* cap. 1. hoc libro simpliciter *synarthrosim* dixit suppressa *synarthrosee* specie. *Harmoniam* quoque maxillæ inferioris *synarthrosim* vocat *Comment. ad partem. 9. lib. 2. de fract.*

*Sutura* est compositio confusis tebus similis, qualis in Ossibus cranij conspicitur. Solam hanc *Galenus* agnoscit, sed ad eius clariorem, & faciliorem explicationem varias similitudines adduxit, ut videre est in hoc textu, & libro nono de usu partium, cap. 1. quas similitudines nostri *Anatomici* pro differentiis suturarum perperam acceperunt. Huic errori occasionem dederunt *Falsopium* & *Columbus*, qui triplicem futuræ differentiam constituunt, vel potius comminiscuntur. Quarum prima est confusis

rebus similis, *ut ipse dicitur*, secunda serratilis, *ut supra dicitur*. Tertia ad vnguem structa, *ut supra dicitur*: quando gibbz partes ad vnguam figuram structæ, sinus rotundos sibi idoneos subeunt. *Celsus* more veterum, futuras capitis in vnguem committi scripsit, *lib. 8. cap. 1.* Hunc futuræ modum *Columbus* excludit, & rarissimum esse fatetur.

Harmoniz nomen apud *Hippocratem* vsurpatur pro futura, *lib. de off. nat. capitis* commissuræ *omnium* dicuntur. In Cerebrum iuxta commissuras, *ut de epilepsia*, multæ tenues venulæ radices egerunt: quinetiam apud *Galenum* latè sumitur, pro quavis commissura Ossium, siue sit futura, siue gomphosis, ut expressit sub finem libri *tertij de Officina*, à verbo Græco *ὀσσην*. Dehiscunt, inquit, in capite, quæ *ἰσσην* dicuntur, cum ubi Ossia capitis se tangunt, propriè dicuntur *ὀσσην*, sed translatò vocabulo, *ἰσσην*. Calvaria enim Ossia ad vnguem inter se *ὀσσην* committuntur, atque idcirco ipsorum contactus, *ut ἰσσην* committi meritis deceat, & à similitudine eorum, quæ sumuntur *ἰσσην*. Hac autem facile interdum hiant, & interdum dolorem mouent. Idem passim futuras vocat harmonias, rationem reddit capite tertio huius libri: Syntaxim dentium harmoniam vocat, *lib. 11. de vsu partium, cap. 8. & lib. 3. secundum locos, cap. 8.* Sterni Ossia inter se per harmoniam iunguntur, ex *Galeno, lib. 7. admiuiss. Anatom.* & corpora vertebrarum inter se committuntur per harmoniam, ex *Galeno lib. 12. de vsu part. cap. 16.*

Numquid autem Gomphosis, ea sola Ossium syntaxis, in qua alterum clauo simile est, iudicanda sit: An hoc nomen illi etiam compositioni congruat, quæ potius ad firmitatem, quàm ad figuram clauì propius accedit, ut in carpo & tarso, temerè definire non audeat *Eustachius, libro de Dentibus*. Vix tamen adduci potest, ut credat veteres *Anatomicos* hanc ancipitem articuli speciem dentium tantum causa excogitasse, augctque illius suspicionem verbum *ἰσσην*, quod coniungere & conglutinare significat, quomodo ab eo *ἰσσην*, clauus & cuneus deriuntur: Gomphosis autem ex *Galeno*, non absolutè ad synarthrosim pertinet, sed etiam ad symphyim reuocari potest, quod verbum illud *ἰσσην* vsurpatum à *Galeno* indicat, nec alia ratione ad symphyim reduci potest, nisi quod fiat cum medio interiecto, quo carent futura & harmonia, quæ per solum contactum absque symphyi perficiuntur.

### De Symphyi.

Scriptit *Galenus* ex doctrina *Hippocratis*, Ossia necti inter se per *ὀσσην*, & *ἰσσην*. Vtrumque seorsim exiit, & diuersos affectus patitur, qui diuersimodè tractantur. Morbus est, *ἰσσην*, siue *ἰσσην*. Morbus symphyseus, est *ἰσσην*, siue *ἰσσην*. Apud *Hippocratem* scilicet *lib. 3. lib. de Offic. med. part. 31. & 36.* Vbi *Galenus* notat, *ἰσσην* esse cum Ossia, quæ citra diarthrosim, *ἰσσην* harmonias, naturaliter se contingunt, ex affectu quopiam diducuntur. Nam in opere de artic. & fract. *Hippocrates* nominatim mentionem facit de Ossibus, quæ inter se diducuntur, ut de cubito & radio, & in extrema manu, de his quibus illa consistunt, & in crure de his, quæ in pede ad calcem accedunt. *Hippocrates* particula 26. eiusdem libri, Diastases vocat in harmoniis, cum Ossia capitis dehiscunt, & docet, quibus fasciis quæ sunt *ἰσσην*, non *ἰσσην*, curandæ *ἰσσην* & *ἰσσην*, extrema iuicem adducendo, ut se moderatè contingant. Et cum loquitur *Hippocrates, lib. de articulis*, de diductione maxillæ inferioris in mento, bis vititur verbo *ἰσσην*, & alibi, *ἰσσην*, si discedat, quæ in mento est symphysis, & *lib. de natura pueri* in partu Ossia pubis diduci notat, *ἰσσην* & *ἰσσην*. Idem sub finem *lib. 3. de fract.* naturam symphyseos docet, & eius morbum curatu difficilem esse, præter symphyim radij & cubiti. Nulla alia duorum Ossium symphysis, vbi dimota est, facile in pristinam sedem reponitur. Nam necessum est in illa diastasi partem reddi tumidiorem. Si quis obiciat diastasim non soli conuenire symphyi, sed etiam futuræ, ut liquet ex *partic. 36. lib. 3. de off.* Is intelligit futuram ex *Hippocrate lib. 1. de artic. partic. 33.* abusiuè symphyim appellari, propter arctam commissuram, nequaquam sponte mobilem, quamuis vera symphysis longè differat, ratione structuræ, ab ipsa futura Patitur tamen diastasim, & congruenter, *Galenus* ad mentem *Hippocratis* definit in *1. sagitt.* Ossium duorum separationem, quæ lunguntur per futuram, aut per symphyim. Foras alius opponet exempla Ossium per symphyim iunctorum, quæ scriptit *Galenus* ad *part. 31. lib. de Officina*, per diastasim separari vel diduci, cum tamen pertineant ad synarthrosim, ex *Galeno lib. de off.* Cubiti finis uterque, validis ligamentis radio colligatur, *ἰσσην*. Carpi Ossia inter se iunguntur per synarthrosim, non per symphyim, & Carpi Ossium

ordo secundus cum metacarpio per synarthrosim copulatur. Perone tibiz iungitur per synarthrosim, Ossa tarsi minora per synarthrosim committuntur. Respondet Ossa per synarthrosim immobile iuncta, quæ ratione structuræ non sunt Euarthroses arthrodiz, & gynglymi ad harmoniam pertinere, quæ per simplicem contactum perficiuntur. At Ossa per harmoniam iuncta apud Hipp. loc. cit. lib. 2. de artic. part. 9. 31. & lib. 3. de effig. part. ult. diastasis patiuntur, atque harmonia pro symphysi tum usurpatur, ut notauit Galenus, in Comm. Propterea prudenter Galenus hoc libro symphysim opponit articulo, eamque definit naturalem Ossium vnionem: per quæ non oportet intelligere solam continuitatem, sed etiam contiguitatem strictam immobilem, quod sensu vnus usurpatur in definitione epiphyseos, quam fatentur omnes esse ossiculum alteri adnatum & separabile, adde quod vnio suble comprehendit continuitatem & contiguitatem, ut demonstrauit Galenus, lib. de differentiis morborum, nam morbus communis, est vnionis solutio. Vnio autem conuenit partibus similaribus, quæ sunt continuæ, & organicis quæ sunt contiguæ: vnde nascitur *metastasis*, morbus contiguitatis. Ergo in symphysi adest contiguitas ossium, nec non continuitas.

Symphyseos nomen ambiguum est. Nam Aristoteles, lib. 1. de ortu, cap. 9. usurpat pro continuitate, vbi enim probauit actionem & passionem fieri inter ea, quæ sunt contigua, subiicit, quod vnum est per symphysim, pati non posse. At lib. 5. *Metaph.* rerum contiguarum coalitum symphysim esse statuit, sic aëta & stabilis conuexio, ut hoc libro usurpatur, intelligitur ab Hippocrate libro secundo de artic. Tertia acceptio symphyseos est, pro copulatione, ut videre est, lib. 5. *Physic.* & lib. 4. *Metaph.* cap. 6. vbi fasciculus vinculo & glutine vniri & continuari dicitur.

His præmissis symphyseos acceptionibus, facile est intelligere Laurentium in explicanda symphysi Ossium, ex mente & doctrina Hippocratis & Galeni, turpiter hallucinari, dum pro colligatione Ossium inter se coheræcentium per articulum accipit. Postquam enim falsus est ex Galeno, in articulo Ossa esse contigua, in symphysi esse continua, mox usurpat symphysim pro colligatione Ossium, & omoplatæ exemplum adfert, quæ per Syssarcosim Ossibus colligatur, ideoque symphyseos naturam Laurentius non intellexit. Nec Vesalius, & Columbus, cum ratione possunt omnes Ossium coniunctiones sub articulo & symphysi comprehendere: si ad symphysim referant futuram, harmoniam, & gomphosim. Nam Ossa pubis inter se, Ossa ilium cum Ose Sacro connexa, maxillæ inferioris Ossa ad mentum iuncta, Os sphenoides cum occipitis coronis, non possunt reuocari ad futuram, harmoniam, & gomphosim: quoniam ex Galeno pertinent ad symphysim, ut patet ex hoc libro de Ossibus. Itaque cum Hippocrates & Galenus sint auctores huius connexionis Ossium per articulum, & symphysim, atque exempla seorsim proposuerint, nihil in doctrina veterum innovandum erit, & imprudenter agunt, qui nomina priscorum retinentes, in alium sensum detorquent.

Verum est in vluentis corporis Ossibus symphysim quandam dari sine articulo, latè sumendo nomen symphyseos. Nec improbanda sunt exempla in Ossis hyoidis & omoplatæ suspensua colligatione, quamuis à Galeno non fuerint producta, qui tamen musculorum istorum actiones accuratè descripsit, sed falsum est in Osteologia, siue doctrina ossium in scelecto aliam symphysim reperiri cum articulo, quando Ossa inter se mutuò coaptata, triplici vinculorum genere in sua sede continentur: atque symphysim Galenum articulo adiunxisse, ut duplicem Ossium morbum indicaret, quem passim Hippocrates de artic. annotauit, videlicet Ossa luxari sine symphysi soluta, symphysim dirimi, vel extendi sine articuli luxatione. Articulationis morbi sunt, *disiunctio* & *distorsio*, symphyseos morbus *trismus*, ut explicat Galenus, Comm. ad part. 4. l. 2. de artic.

Porro Galenus ossa examinat in scelecto, quo etiam vtimur ad ossa demonstranda, in quibus nullæ sunt colligationes, nec sunt necessariae ad formam articuli exprimendam, sufficiunt extremorum commissuræ, sed tantum ad continendum in sua sede, ut in viuente homine: adde quod carnes musculosæ Ossibus circumiectæ, non sunt primario ad colligationem comparatæ, sed ad motum ossium, ideoque ista coniunctio non potest verè dici Syssarcosis: At verè symphyseos media, etiam detractis carnibus & ligamentis circumiectis, plurima in ossibus scelecti recentis, nonnulla in ossibus aridis, remanent interiecta non circumfusa. Sed eiusmodi symphysis mobilis est: contrà demonstrabo apud Galenum hoc libro symphysim aliter accipi, videlicet pro conti-

nuitate & contiguitate adeo stricta, vt sit prorsus immobilis. Scribit *Gal. lib. de artic. part. 3.* Ossa maxillæ supernæ iungi inter se per symphysem ex *Hipp.* ratione immobilitatis, cum tamen sit vera synarthrosis ratione struaturæ, ergo symphysis non est, colligatio Ossium ad constituendum articulum: id etiam clarius demonstratur, *lib. de off. cap. 17.* vbi Ossa carpi inter se per synarthrosim, non per symphysem iungi scribit: ergo si symphysis acciperetur pro colligatione circumtensa, qualis reperitur in istis Ossibus, non sciunxisset symphysem à synarthrosi: id etiam manifestè intelligitur ex his verbis *Gal. Gomphosis* est, cum os ossi clauis modo infigitur. Verum id quodammodo ambigit, & prope ad symphysem accedit, cum scilicet quidpià exquisitè infixum est, vt ne tantillum quidem dimoueat. Scribit *Galenus*, gomphosis prope ad symphysem accedere, non tam ob immobilitatem, quàm quod fiat cum medio, quod quidè medium debet esse vnum, vtrique ossi commune, atque interiectum. Reliquorum ossium extrema cartilagine in crustantur: quia vnumquodque propriam habet cartilaginem, ipsaque Ossa sunt mobilia. Deinde symphyseos triplex medium, quod omnes *Anatomici* demonstrant, est Ossibus circumiectum. Quærimus cum *Galeno*, medium duobus Ossibus interiectum.

Symphysis autem sit absque medio, vel cum medio, quæ sine medio aspeçtabili perficitur, apparet in coalitu epiphyseos, in qua est *irunt*, ex *Galeno*. Cernitur quoque in coniunctione maxillæ inferioris ad mentum, quam per symphysem vniri dixit *Gal.* quinetiam tria Ossa Ilium sunt sine medio iuncta, & tamen per symphysem vnita apud *Galenum*. Ossa occipitis & sphenoidis inter se coaluerunt sine medio apparente. Symphysis cum medio (nimirum manifesto diutissime remanente) spectatur in commissura Ossium pubis ex *Galeno*, & in Ossis Sacri, & Ossis Ilium commissura. Si quis obiciat, nullum os alteri iunctum sine medio reperiri, propterea symphysem absque medio non dari. Respondeo *Galenum*, de Ossibus aduultorum agere, in quibus Ossa, quæ in pueritia erant diuisa, coaluerunt, non apparente medio, vel obliterato, quod imaginari tamen oportet.

*Symphysus* cum medio triplex est differentia pro diuersitate medijs interiecti, nimirum *Syffarcosis*, quæ fit mediante carne, *Syneurosis* interuentu ligamenti, *Synchondrosis* intercedente cartilagine: cuiusque exempla in Ossibus demonstranda sunt. *Syffarcosis* exemplum apparet in coniunctione dentium, videlicet gomphosis, quæ inter articulum & symphysem media & ambigua est, ex *Galeno*. *Syneurosis* exemplum cernitur inter corpora vertebrarum, quæ per symphysem iunguntur ex *Galeno*, *lib. de Ossibus*, quibus interiacet ligamentum Neurochondroses. *Synchondroses* exemplum videre est in varijs commissuris Ossium, vt pubis inter se, atque vertebrarum Ossis Sacri. Cæterum, vt per symphysem vniantur Ossa, debet illud medium extremitatibus Ossium interiectum esse synonymum, id est, consimilis naturæ, & ab ipsis Ossibus prognatum. Nam ex *Aristotele*, *lib. 6. cap. 3. Physic.* omne quod continuum est, eam vim habet, vt interiectum sit eius extremitatibus aliquid eiusdem generis, atque hoc modo, iuxta *Mathematicorum* axioma, quæ *vniantur vni tertio, ea sunt inter se continua*. *Galenus* appellationes triplicis symphyseos à *Recentioribus* introductas fuisse notat, etiam si veteribus cognitz fuerint tres istæ symphyseos, vt docet, *lib. 2. admin. Anatomic. cap. ult.* vbi tradit Ossa inter se vniri triplici modo, instar glutinis per cartilaginem, instar luti per carnem, instar funis per ligamentum. Cæterum notabis *Hippocratem*, synarthrosim interdum vsurpare pro symphyssi, & vicissim symphysem pro synarthrosi, vbi Ossa spontaneo motu carent, licet iuncta per articulum, quia symphysis prope accedit ad eam articulationem, quæ fit per synarthrosim immobilem, eiusque speciem, quæ harmonia vocatur.

### De varia Nervi appellatione.

**N**ervus, aut est voluntarius, & à Cerebro dorsali que medulla enascitur, aut ligamentalis ex Ossibus prodiens, aut ex musculo productus, & *Tendo* vocatur, ex *Gal.* quod prius animaduertum ab *Herophilo*, referente *Ruffo Epheso lib. 3. r. ult.* dixit *Herophilus* aliqua esse *istæ nervorum*, quorum à Cerebro & spinali medulla sit origo, aliquos nervos, qui ab Ossibus orientes in Os inferuntur, aliquos à musculo in musculum (an legendum in Os) transeuntes, qui articulos etiam copulant. *Aristoteles*, *lib. 3. de historia animalium*, triplex nervorum genus proponit, sed obscure admodum, nec sine Codicis depravatione, vt animaduertit *Scaliger*. Sed clariùs, *lib. de spiritibus, cap. 5.*

& s. describit. Postquam enim exposuit, neruum natura sicum esse, nec villos meatus habere, cap. 7. neruos qui colligant, enumerat, tendones, & ligamenta intelligens. Inde cognosces triplicem esse nerui significationem, quam ex Hipp. declarauit Gal. Commun. ad part. 2. sect. 1. lib. 6. Epid. qui à Cerebro & dorsi medulla prodit, neruus, & ionus dicitur: qui ex Ossibus, copula, qui ex musculis, tendo. *Posterior Medici*, Primum neruorum genus lentens, atque electorium, appellarunt: secundum genus colligatorium. Tertium aponeurosim. *Galenus lib. 1. de motu musculi*, istud dictum putat, *similiter*, quod est nutare & scētere, & *similiter* *similiter*, quod significat tendere.

*Articulorum Doctrina, ex Aristotele.*

**N**illum Os seotum per se habetur, sed aut pars continui est, aut tangit atque annectitur, *si pars est continui, & si annectitur, & annectitur*, vt Natura & tanquam vno, & tanquam continuo, & tanquam distinctis utatur ad flexionem, cap. 9. lib. 2. de part. anim. & cap. 7. lib. 1. de hist. animal. quibus in locis Articulum, & Symphysim designare videtur, quamuis nomina non expresserit.

Duobus autem modis coniunguntur Ossa, aut alterum cauum est, alterum rotundum, aut vtrumq. cauum medio Astragalo, quasi clauo coniungitur, sic enim fit flexio & extensio, cap. 9. lib. 2. de part. anim. quo in loco intelligi Enarthrosim & gynglymum differētes inter se articulationes. Nam Arthrodia ab Enarthrosi differt tantum structura quantitate, quod in Enarthrosi magna sit cauitas excipiens magnum caput, in Arthrodia, exigua cauitas excipiens paruum caput. *At lib. 3. de animal. cap. 10.* gynglymi naturam aliter explicat, nec medij Ossis interiecti duabus cauitatibus vtriusq. Ossis mentionem facit. Sed *Aristoteles* ibi agit in genere de motu, & gynglymi exemplum profert. In quo est vnum Os mobile, alterum quiescens, vt in Enarthrosi, sic ait. Id quod mouet, vt instrumentum ibi est collocandum, vt idem principij rationem finisque subeat, vt in gynglymo fit, hic enim conuexum & concuum est, quorum alterum principium, alterum finis est: Quapropter alterum quiescit, alterum mouetur, sunt quidem ratione, diuersa, magnitudine verò non separantur, vniuersa namque pulsu tractuque moventur, ex *Aristotele*. Idem lib. de motu animal. 2. docet & copiose probat in omni motu ossium alterum stare, alterum quiescere, Motum verò fieri per flexionem & extensionem, quam appellat, *anaglysis* & *isaglysis*, siue *similiter*: Flexio verò ex eodem, est ad curuum, aut ad angulum mutatio, lib. de animal. incesso. Triplicis functionis causa Ossa existisse scribit, lib. de spiritui, cap. 7. qui liber à nonnullis tribuitur *Theophrasto Aristotelis discipulo*, vt *Dan. Furlanius* monet in suis Comm. ad Opus. *Theophrasti*.

Ossa alia ad motum, alia ad fulciendum, alia vt contegant & excipiant, quantum inter hæc genus, quod tanquam principium motus est, veluti polus, *ut si quis* *ut si quis*. Sed cap. 9. lib. de partibus animalium, Ossa data fuisse scribit, aut scētendi gratiā, si moueretur, aut consetuandi gratiā, si fuerint immobilia.

COMMENTARIVS IN CAPVT PRIMVM LIBRI,  
ac imprimis de figura naturali, & deprauata Capitis.

CAPVT VIII.

**A**CTVS communes Ossium affectiones, siue proprietates cum *Galeno* exposui. Nunc ad particularem cuiusque Ossis historiam digredior. Vnde & à quo incipiendum sit, iure dubitari potest. Nam si ab eo Osse exordium sumas, quod prius generatur & conformatur, *Peripatetici Medici* inchoandum esse à spina dicent, quæ sedes & origo reliquorum Ossium, ab *Aristotele* statuitur, libro secundo de historia animalium, cap. 9. eam idcirco Veteres carinæ in nauigio primum iactæ comparauerunt, cui ceu fundamento latera, prora, puppis innixa coherenti, ex *Galeno*. Similiter in homine corporis moles, spinæ ope stat, & erigitur. At Medici doctrinæ *Hippocratis* addicti, nonquam dabunt *Aristotele*, spinam in vtero primam generari & conformari. Quoniam na-



tura quorundam opinione tres primum ampullas producit & excitat, quæ tres partes principes referunt, inter quas caput eminet, quod reliquis celerius augetur, ita ut Fœtus usque ad quartum mensem, totum caput appareat: Quo nimirum tempore solum caput reliquis partibus simul iunctis præponderat. Propterea prudenter scriptum fuit ab Hippocrate 6. Epid. ex capitis magnitudine reliquorum Ossium naturam dependere. Rachis enim siue spina corporis Truncus, ex capite velut à radice germinat, ex spinæ reliqua Ossa velut rami à trunco procedunt. Cum igitur caput ortu, dignitate & situ primum existat, ab eo videtur inchoandum, exemplo Galei, quem sequuti sunt omnes Anatomici, etiam si Fernel. & Platani à spina suam Osteologiam exordiantur.

Caput autem apud Latinos dicitur, quod inde corpus, aut homo capiat initium. Primum enim hoc membrum formatur, postremum absoluitur. Primum ex utero ergastulo in lucem erumpit, *κεφαλή*, Græcis vocatur, *κέφαλον*, quod est excavari, vel *κεφαλή* à *κεφαλή* à *κεφαλή*, quod siccitate præditum, quia ossium. Vide *Etymologicum magnum* Græcum.

Capitis pars anterior *κρίνον* à mollitie dicitur, *κρίνον* à *κρίνον*, à *κρίνον* *μυρς*, & *κρίνον* *μυρς* *κρίνον*. Ex *Etymologico magno* Græco. Posterior, *κρίνον*, quod inde oriuntur nervi *κρίνον* enim filamenta sunt, quibus nervi contextuntur, *κρίνον* à *κρίνον*. *κρίνον* *μυρς* *κρίνον*, quod esse, & constitutionem corpori tribuant. Media pars vocatur *κρίνον*, veretudine, à puncti similitudine, circa quod cælum vertitur. Vel quod eo loco capilli fe in gyrum vertant *κρίνον*, Latini *Occiput* vocant, quasi ob caput quiddam additum esset. Nec *κρίνον* potest appellari sinciput, quia significat dimidians capitis partem, quasi scissum caput, neque sinciput opponitur occipiti. Censuris legis interdicta cornis sincipitia verrina, ait *Plinius*, ibi pro capitis parte posuit, quia in capite verrino nihil sapidum præter rostrum & aurem. Vertex *κρίνον* dicitur ab *Aristotele*: Inde *κρίνον*, bi-vertices apud eundem, sunt non Osse gemino, sed capillorum explicatione. *Iulius Pollux* notat, eiusmodi homines præcorum auctoritate longævus iudicatos fuisse. Quod inter oculum & aurem, ac verticem interior, *κρίνον* Tempus, quod temporis, id est, ætatis, indicia præbeat, *κρίνον* verò à *κρίνον*, & *κρίνον*, quod pulsus ibi evidens, vel *κρίνον* à *κρίνον* *κρίνον*, quod sepulchrum denotent.

Interea notabis *κρίνον*, aliter vsurpari in divisione capitis integri, amicti sua cute capillata, aliter in Osteologia. Nam priore modo extenditur bregma usque ad radicem capillorum in fronte. At secundo modo Os frontale discernitur ab Ossibus, bregmatis, per futuram coronalem, proptereaque Ossa bregmatis ferme mediam & maiorem, ac supremam capitis partem constituunt. Nec sinciput potest denotare *κρίνον*, nisi pro dimidia & laterali capitis parte sumatur. Vertex autem *κρίνον*, à *κρίνον* à *κρίνον*, denotat, dumtaxat exiguum spatium in cute capillata, ubi capilli in gyrum vertuntur, sed spatium illud non potest designari in crânio: ideoque apud Hipp. lib. de vulner. capitis, *κρίνον* partem posticam capitis significat, nempe Os occipitale.

Porro caput dicitur id totum, quod collo superimpositum, primâ vertebra terminatur, quo significato utimur, cum alicuius caput abscindi dicimus, inquit *Galenus*, lib. 3. de placitis cap. 8. Dividitur in *Cranium*, & *Faciem*, quæ duas maxillas comprehendit, *κρίνον* appellatur, quasi *κρίνον*, quod instar galeæ tegat & inuoluat, vel *κρίνον* à *κρίνον*, *κρίνον*, & *κρίνον*, vel *κρίνον* à *κρίνον* à *κρίνον*, vel Cerebrum. Latinis calua & calvaria ab accidenti, quoniam pilis deciduis caluam facit hominem.

Est autem crânium, *Corpus ossium*, *globosum* & *concauum*, *Cerebri conceptaculum*, à quo *duæ maxilla dependent*, orbiculari forma tornatum est pluribus de causis, imprimis quia homo ad vniuersi orbis habitum & formam constructus est, idcirco conueniebat sublimem hanc partem cælo respondere. Sic enim *Plato*, caput ad mundi rotunditatem essefistum esse voluit. Secundò, cum animæ domicilium sit in Cerebro, quod crânio continetur: anima autem de cælo defluat, continens, & contentum rotundum esse debebat. Deinde membro nobilissimo figura conueniebat nobilissima: At nulla nobilior orbiculari, quia capacissima est, minus iniuriis obnoxia, & facillè volubilis. Causam reddit *Sealiger exerc. 30.* quia rotundum, est continuum, & vniliueum, neque punctum habet cognitum, aut designatum, quod sit principii dissolutionis. Quapropter Cerebrum hominis amplissimum, non aptiore conclaui, quam rotundo coerceri poterat: Nec melius externas iniurias declinare & amoliri, neque celerius in omnes partes circumagi, quam in hac figura rotunda. Quæ tamen non est ad amussim orbicularis & spherica, seu quadamtenus oblonga, antrosum & retrorsum protuberans,



vt Cerebrum & cerebellum contineret, & nerui secundum Cerebri longitudinem seriatim enascerentur. Quam quidem longiuitudinem effingit lateralis compressio ad tempora, vt oculi ad latera prospicerent. Itaque *naturalis figura capitis*, ex *Galenus* ad oblonge sphaera similitudinem constructa est, vel vt latius exponit, *libro de arte parua*, Ac si excogetares sphaeram exquisitè rotundam ex cera fabrefactam, paulum vtrimque compressam. In hac necesse est, vt partes anteriores & posteriores magis prominant, quàm sphaerae conueniat.

Hanc figuram Caput à Cerebro habere opinatur *Galenus*, quod reprehendit *Resalius*, quia Cerebri figura non obstat, quominus cranium exactè rotundum fieret, sed oblongum factum fuisse duabus de causis existimo, partim ad faciei venustatem, partim ad faciliorem capitis gestationem. Nam si exactè rotundum fuisset deficiente antica proiectura, maxilla inferior, atque superioris extremas indecorè prominuissent, & oculi nullo munimento defensi fuissent. Antica verò proiectura angustior & contractior est, vt musculis temporalibus, & articulationi maxillæ inferioris sedem ac locum præberet, quorum additione & explicatione posticæ adæquatur. Quæ quidem latior & capaciore facta fuit, vt caput staret in æquilibrio.

Deprauata Capitis figura *¶* dicitur à *Galenus*, quæ dictio pro capite supernè acuminato sumitur: generaliter tamen vsurpatur à *Galenus*, pro quauis figura vitia capitis. Est autem hoc vitium duplex, vnum magnitudinis, quando dicitur magnum, mediocre, & paruum caput. Alterum conformationis, quando caput absolute *¶* existit.

Huius prauæ conformationis, *quatuor sunt figurae*. Prima est, quum ambæ proiecturae, frontis scilicet, & occipitis abolerentur, caputque exquisitam sphaerae rotunditatem æmulatur, quali capite depingitur *Thersites* ab *Homero*, *Iliados* 2. quum omnium qui ad Troiam venerunt stolidissimum esse scripsit. Secunda figura capitis est, in qua deest antica proiectura seruata postica. Tertia est, quando postica eminentiâ percurrente, seruatur antica. Quarta figura capitis profertur, cum ad viramque aurem caput magis protuberat, quàm in fronte & occipite, id est, latius ad aures, quàm oblongius efficitur, quæ figura dari quidem potest, sed nunquam superstitie animali: quia Cerebri fabrica penitus euerteretur, & tanquam monstrum viuere non posset: talem figuram videre non licuit diligentissimis Anatomicis, *Fallopio*, *Eustachio*, & *Columbo*, *¶* *Resalius* tamen illam in tribus notauit, vt ipsemet testatur, *lib. 1. cap. 5.* eam quoque *Conciliator* differentia 79. & *Hugo Senensis* *Comment. in artem parua Galeni*, in quibusdam obseruauerunt. Sed rara est, & potius naturæ impietant, quæ autem rara sunt, inquit *Aristoteles*, *cap. 15. lib. 3. de historia animalium*, in artem referri non debent. Quinta capitis figura addi potest ex *Hippocrate* *Tricoronis*, *urindis*, similis pani faccharato, quando caput in acumen superius assurgit, quales erant *panisquam*, descripti ab *Hippocrate*, *lib. de Aere, Agni & Locis*.

Alteram deprauati capitis figuram addo, si verum sit, quod narrat *Cardanus*, *lib. 8. de varietate rerum*, *cap. 24.* In India Occidentali incolas Prouinciæ Portus veteris quadratum caput habere non arte, sed naturâ tale. Quoniam ab his quorum caput ab initio inter tabulas figuratum fuit, vt quondam Macrocephalis productum, eiusmodi formam contraxerant, quæ primùm artificialis fuit, tandem beneficio procreationis, naturalis & gentilitia facta est.

Nec sine summa ratione istas Capitis figuras proposuit *Galenus*, ex *Hippocrate* ad dignotionem & curationem fracturarum cranij. Nam rotundo capiti oblongum vulnus, non nisi profundum accidere potest, quia sphaerica figura tangi non potest, nisi in puncto. Vt ergo fissuræ extrema medium exquant, telum profundè penetrasse necessum est: scelus accidit in oblongo Capite. Licet enim in tali cranio longam rimam telum incusserit, non inde sequitur profundè adactum fuisse, ex *Hippocrate* *lib. de vulnere capitis*. In postico offe Capitis, & læsiones, & tela sunt æqualia.

Alium vitium deprauati capitis est in magnitudine, quando magnum, aut paruum existit. Scribit *Galenus*, *libro artis parua*, paruum Caput semper vitiosum esse, magnum non semper laudabile, quod si propter facultatis propriæ robur magnum effectum fuerit, melius erit, quàm si à materis vbertate. Verumtamen *Aristoteles* hominem capite paruo præditum prudentissimum esse prodidit, *Problem. 3. sect. 30.* contrarium scripsit *Meletius*, *lib. de natura hominis*, qui exiguo capite præditi sunt flagitiosi Cerebri indicium ostendunt, etenim breue caput habentes, præ eius breuitate

priuantur facultate perficiendi ea, quæ magnum caput habentes perficiunt, quoniam exiguum caput plurimi spiritus capax esse nequit, & cum Cerebrum angusto conclusum comprimatur, in eius angustiis animum spiritum demergi, extinguique, & cum eo viuiceras, quæ ab eo sunt actiones contingit. Respondeo utrumque Caput, tam paruum, quàm magnum, si reliquis membris proportionatum, id est, membra in magnitudine, aut paruitate capiti respondeant, non esse vituperandum. Id autem cognosces ex concinna, & naturali figura capitis & cervicis æqualitate, quia si magno Capiti crassa ceruix subiiciatur, illud Caput erit laudabile, si parua malum, & è contrà.

Cùm autem Medici ex figura deprauati Capitis, maxima morum & sanitatis argumenta sumant: quænam inrer eas sit laudabilis & vitiosa, ex *Galeno* declarabo, *lib. 6. Epid.* exigua capita semper praua sunt. Magna verò licet rarò, nonnunquam bona iudicantur, tam ob facultatis formatricis robur, quàm ex materie vnde creata sunt vbertate: quali capite *Pericles Atheniensis*, vir prudentissimus fuisse traditur. Nec enim grandius Caput vituperandum, si naturalem figuram retineat, & ceruicem validam, atque oculos acutum cernentes habeat, sed acuta capita vitiosa sunt, cùm scilicet anterior, vel posterior proiectura deficit, aut quàm deceat longior est. Improbatur Caput acutum ex imminuta proiectura, non autem illud quod adauctum habet. Imprimis considerabis decoram incrementi formam, quia deformia incrementa praua sunt. Deinde uotabis, quantum posterior proiectura anteriore superer. Melior enim est postica, quàm antica, ibi namque nobilissimus Cerebri sinus, & spinalis medullæ principium continentur. Postea ceruicem inspicies, imbecilla sit, an robusta. Nam si proiectura, neque indecora fuerit, nec ultra modum grandis, validumque eam collum sustineat, huiusmodi Capitis acumen probabis, atque istos homines aliorum membrorum, sed præcipuè Ossium viribus pollere comperies. Verùm, ut animaduertit *Hippocrates*, Cephalalgia sunt opportuni, auribus fordidis, palato concamerato, maxillis disræctis, nec inter se ad amissum compositis.

### *An pro varietate figurarum Capitis, suturarum numerus & situs immutetur?*

**Q**uestio hæc difficilis admodum existit ab *Anatomicis* magna contentione dissecta. Primus *Hippocrates* huius controversiæ author extitit, qui in *initio libri de vniuersis Capitis*, Suturarum sedem, & numerum mutari scripsit, quandocumque proiectura Capitis deficiunt. Itaut si antica vel postica deficit, duæ tantum appareant futuræ in modum literæ T excusulpe. Quod si Caput exactè rotundum fuerit, duæ illæ futuræ decussatim in modum X sunt interiectæ. Sin verò Caput antrosum vel retrorsum promineat, tres futuræ reperiuntur in modum H inuersæ. *Galenus* hoc *lib. 6. de usu partium*, *Hippocratis* doctrinam approbavit, quæ tamen nullo probabili, aut verisimili nititur fundamento, neque in nostris craniis expressa deprehenditur: Quia licet antica, aut postica proiectura deficiant, semper tres futuræ remanent. Sic quædam dantur capita fronte prominente absque futura coronali, quædam occipite protuberante sine lambdoide futura. Quod si proiectura essent causæ futurarum, cùm deficiunt proiectura, tum futuræ non extarent, quod nunquam obseruatum fuit. Quod si suturarum situs & numerus, pereuntibus proiecturis immutaretur, Ossium capitis numerus, maior vel minor foret, eorumque figura differens. Atqui ex *Hippocrate* & *Galeno*, Cranium Ossibus octo compactum est in omnibus hominibus: ergo nunquam futurarum numerus & situs immutatur.

Cùm autem *Hippocrates* in Ossium doctrina egregiè versatus fuerit, ut seculum æneum *Apollini Delphico* consecratum, ipsiusque testimonium de suo studio in Ossibus examinandis manifestè declarant: Estne verisimile, tam excellentem *Anatomicum* adeo turpiter errasse, qui nec fallere, nec falsi unquam potuit, iudicio *Macrobij*. Quid igitur ad defensionem, aut excusationem *Hippocratis* proferemus, quem *Galenus* peritissimus *Anatomicus* etiam hac in re sequutus est. Cùm videret *Hippocrates*, hominum capita nulla inter se similia ratione figuræ, quæ vel est exactè rotunda, aut prælonga, eamque longitudinem capitis, non ex vno, vel duobus Ossibus naturaliter

confari posse, sed ex tribus, quæ variis in locis expressit, atque nominavit libro de vulneribus capitis, nimirum Os frontale, Ossa duo sciuntis, Os occipitis. Existimavit in prælongo capite plura reperiri Ossa, nimirum tria: in rotundo pauciora, videlicet duo, atque cum futuræ sint intervalla, seu discrimina Ossium, quod plura erunt Ossa, plures erunt futuræ, quod pauciora Ossa, pauciores erunt futuræ. Ergo si antica aut postica dicitur proiectura capitis, longitudo erit brevior, sicque duæ futuræ sufficiunt in modum T descriptæ: Exempli gratia, si deficiat antica proiectura, Ossa bregmaticæ procedent vique ad nares, osque frontale confluent. Fieri etiam potest, ut in formatione capitis ex abundanti materia, quæ propter imbecillitatem formatricis non fuit extensa, Caput malè formatum euadat, deficiente alterutra proiectura, quæ in parte crassius erit, citius futura, siue coronalis, aut lambdoides obliterabitur. Nam sagittalis raro deperditur, & vltima remanet: quare probabile est Hippocrati eiusmodi capita senum obseruasse. Quod si caput exactè rotundum fuerit, coronalis futura in medium caput incidet, mediamque sagittalem secabit, sicque remanebunt duæ futuræ ad angulos rectos sese interfecantes: hanc opinionem confirmavit Sylvius, qui coronealem futuram summa sui parte, nunc fronti, nunc vertici magis propinquare scribit. Vidit etiam Fœsius, Cranium præacuminatum & præaltum, in quo plures erant futuræ in fine occipitis, & in toto cranio erat vna futura ab aure, vna ad alteram delata. Chyasmum illum futurarum ad angulos rectos fieri vult Galenus, cui se respondet Fœsius. Litera X angulos internos acutos, externos obtusos habet. Ergo veterum X aliter descriptum erat, aut Y literæ similitudinem potius refert. Sed apud Mathematicos Chyasmus dicitur, siue ad angulos rectos, siue ad obliquos fiat, ut explicat Hoffmannus, Comment. in lib. Galeni de vitiis partium, pag. 218. Cæterum, Hippocrates pro figurarum varietate futuras eodem modo præposuit, libro de vulneribus capitis, ne in fracturis cranij deciperemur, ut ipse fuit deceptus in Antonino, qui cum fuisset percussus in scincipite ad futuram, decepit Hippocratis asperitas similis fracturæ: ut igitur certiores simus de præsentia & absentia futuræ coronalis & lambdoidis, proiecturas obseruabimus, quæ si desint, scilicet cadens in locum proprium futuræ, minus erit periculosus, quia vel decurrunt futuræ, vel striæ agglutinatæ erunt.

Posset aliquis ad defensionem Hippocratis, principium libri de vulneribus, tanquam spurium reuocare, cum Galenus ipse fateatur multa adulterina in libros Hippocratis irrepsisse, nec ab eade labe immunem fuisse librum de vulneribus capitis. Huic suspicioni & coniecturæ locus esset, nisi Galenus, eandem doctrinam bis retinuisset, & ex professo monuisset, eos qui libris Hippocratis aliquid inseruerunt, ut in hoc lib. de vulneribus capitis, non principium, sed vltimis libri adfuisse & derisipisse, ne tam facile ad plumbaturam detegeretur.

Recentiores Anatomici, Fallopius, Eustachius, Columbus, hac in re ab Hippocrate & Galeno dissentiunt. Negant futuras variari, propter veriusque, vel alterutrius proiecturæ defectum, quod etiam fatetur Sylvius, aliàs acerrimus opinionum Galeni propugnator. Vnde mirari subit, cur Galenus Hippocratis dogmati tam pertinaciter hæreret, cum ipse lib. 6. Epid. mentionem faciat capitis figuræ, in qua scincipitis & occipitis proiecturæ iustò maiores erant, futuris tamen à naturali figura non immutatis.

Equidem fateor hoc effatum Galeni, pro capitis figura, futurarum numerum, & positum immutari, non esse perpetuæ veritatis: non omnino tamen falsum. Vidit enim Volcherus Caser, Bononia, apud Arantium, insignem Anatomicum, Caluariam anteriore proiectura, & coronali futura, atque squamiformi priuatam, quod dictum sit contra Fallopium, qui asseuerat nunquam visas fuisse scilicet futuras coronealem, & lambdoidem, propter alterutrius proiecturæ defectum.

Observatione dignum est, quod scribit Parvus, lib. 4. cap. 4. in nonnullorum cranij tubercula eminere præter naturam, in rotundum aut angulos acta, quæ figuram situmque futurarum immutant. Scribit Sylvius, coronalis futuræ situm in nostris cranij non eundem semper obseruari: extremis finibus nunc in futuram sphenoidi & Offi petroso communem incidere, nunc anterius, nunc posterius, & summa parte sua nunc fronti magis propinquare, nunc vertici: Sylvius domi habebat cranium, in quo duplex erat lambdoides, etiam trium digitorum intervallo distita, & vtraque aliis duobus futuris æquidistantibus coniuncta. Vidi etiam cranium duplici lambdoide

præditum. *Omnium rerum sunt quadam in alto secreta, & suo cuique Corde pernenda, quid quod mutantur sæpe indicata quæque, ac diu comperta. Plinius lib. 7. cap. 4.*

### De Suturis Capitis.

**C**Aput, inquit *Galenus*, libro septimo de usu partium, cap. 1. trunco corporis suffultum est, veluti tectum quoddam calidæ domui superimpositum, ad quod fuliginosa partium subiectarum excrementa feruntur. *Hippocrates* verò lib. 4. de morbis, & epist. ad Democritum, Caput amplè cucubitalæ comparat, quoniam ab infernis partibus vapores & fuligines attrahit, quibus Cerebrum glandolum imbitur & inebriatur, ut notat ipsemet *Hippocrates*, lib. de Glandulis. Istæ autem cum sint contra naturam, & retenta in Cerebro lethales morbos inducant, ad eorum evacuationem natura varios ductus efformavit, ut liberior eiusmodi excrementis pateret exitus. Superiorem capitis partem suturis distinxit ad fuliginum expirationem. Inferiorem manifestis ductibus perforavit, ad humorum expurgationem.

De suturis capitis cum *Galenus* adhuc prius explicandum, quid futuræ nomine intelligi debeat, & an plures illius sint differentię, ut opinantur recentiores *Anatomici*. Cum ex pluribus Ossibus cranium compactum & coagmentatum sit, eorum connectiones, quia dentatæ ferræ more, suis eminentiis quasi dentibus peñinatum sunt intertæ, vel pannorum confutorum similitudinem referunt, ob id futuræ nominantur.

Definitur futura à *Galenus* precedenti capite, compositio quædam confutis rebus similis, & affert exemplum, ut in capitis Ossibus habetur. Subiungit, quam explicare volentes nonnulli erratam syntaxim, alij ut vnguem factam compagem definiunt, quod ab antiquis dictum fuit maioris perspicuitatis gratiâ: ex hoc loco malè intellecto, recentiores *Anatomici*, tres futuras ratione texturæ differentes imperitè constituunt. Dum vnam faciunt confutis rebus similem, Alteram ferratilem, Tertiam ad vnguem structam, nam similitudines pro specificis differentiis perperam vsurparunt, ut supra dictum est. Quinimo *Galenus* commissuras Ossium capitis, potius esse harmoniâs dixit his verbis, sub finem lib. 3. de Officina *Hippocratis*. Cum Ossa capitis se tangunt, propriè dicuntur harmoniæ, sed translato vocabulo futuræ, Caluarie Ossa ad vnguem inter se committuntur, atque idcirco eorum contactus per harmoniam fieri merito dicitur, & à similitudine eorum, quæ sunt futuræ.

Cur autem connexiones Ossium capitis dicantur harmoniæ, subtiliter explicat *Galenus*, cap. 3. Recentiores, inquit, factas per harmoniam syntheses futuras quoque appellare consueverunt, idque merito. Non enim craniorum omnium futuras omnes ferratis exactè compagibus similiter structas deprehendes: sed aliquando in ipsa Ossium syntaxi cernere est, alteri quidem cranio futuras inesse, alteri harmoniâs.

Sunt autem futura cranij propria, vel communes. Propria dicuntur, quæ Ossa cranij, à se inuicem discernunt: Communes, quæ Ossa cranij, & Ossa maxillæ superioris determinant. Propria sunt vera, & spuria: Vera dicuntur, quæ pannorum confutorum figuram æmulantur, quod est futuræ proprium & adæquatum signum. Tres autem propria futuræ in capite bene constituto descriptæ sunt: Quibus, inquit *Rufus*, vetusta nomina desunt, sed nuper à quibusdam *Ægyptiis Medicis*, Græcam linguam male doctis imposita sunt. Anterior vna, quæ coronalis dicitur & Arcualis, & puppis futura, Græcis νεωιδία, quod ea capitis parte mulieres olim coronas gestare solerent, non quales sunt Regum, sed crinium strophia in modum coronæ contorta, ad fouendam fontanellam, mollem, & delicatam, ut notat *Fallapius*. Quod probari posset, ex *Prudentio* in *Psychoma* his.

*Turrum tortis caput accumularat in altum  
Crinibus, extrinsecos augetet ut addita cirros  
Congeries, celsumque apicem frons ardua ferret.*

Sed obseruo frontem, siue os frontale in conuiuiis publicis coronatum fuisse apud veteres fertis & corollis, ut docet *Casabonus* Comment. in lib. 15. *Athenas*, in paruo 3. in p. 1. Et passim apud *Virgilium*, obseruabis olim tempora coronari solita *Æneidos* 5. & *Elegia* 8.

--- bacchari frontem  
Cingite ne vati noceat mala lingua futuro.

Hanc futuram vocavit *Arist.* his in lib. de hist. anim. nuncupati, futuram in orbem, quam habere scribit mulieres. Sic *Iulius Pollux* nomen ait esse intervallum, quod sumitur ab *Osse* iuncti & *Apophysis* & *in*, quod etiam *monismus* dicitur. *Posterior futura lambdoides* appellatur, à literæ λ similitudine. Huius partes inferiores *Apophysis* mastoideis conterminæ, aurisque trago subiectæ, lambdoidis additamenta dicuntur, veteribus prædictis occipitij *cornua*, quibus adhiberi iubent pytoicum. Sed locus ille periculosus propter nervosam musculi mastoidei insertionem, nec aptè & commodè vinculo stringi potest. Partes verò superiores inuicem coeunt prope verticem, ad angulum obtusum non rectum, inquit *Fallopins*. Inter vtramque iacet sagittalis, Græcis ὁ σφαιρικός & *lambdoides* dicta, quæ per Capiis longitudinem exporrecta, semper in puerulis etiam vsque ad septennium, interdum in viris, frequentius in mulieribus, inueto *Vesalio*, vsque ad summas nares prorepat, & nonnunquam in infantibus vsque ad spinalis Medullæ foramen descendit, authoribus *Vesalio* & *Sylvio*, quod prius animaduersum fuerat à *Galeno* libro 11. de usu partium cap. 9. ut omnia capitis ossa geminiferent. Hoc negat *Fallopins* in Observationibus. Admittit quidem in iis qui nondum semestre tempus attingere, Occipitij Os in apicē quandam diuisionem obtinere, sed quæ nonquam ad medullæ foramen pertingit.

Suturam sagittalem in caluariis nunquam abesse *Galenus* asseruerat, cui suffragatur *Vesalio*: Attamen *Enslachius* quindecim habuit caluarias in quibus ista sutura non apparebat: *Columbus* quoque quibusdam craniis deperditam vidit. Habebat caluariam *Vernusianus*, cuius sola sagittalis sutura obliuata erat, reliquis duabus coronali, & lambdoides integris, comment. in lib. Hippocr. alii etiam notant. Tres istæ futuræ simul iunctæ figuram literæ H repræsentant, auctore Hippocrate lib. de vuln. ibus capitis. Verisimilior est Hippocratis quàm Aristotelis opinio, qui lib. 3. de hist. animalium cap. 7. scribit in maribus tres ad summum verticem ascendentes suturas in trianguli speciem conuenire; eûdem positis illæ cum futuris squammosis quadrati schema referant. Attamen lib. 1. de hist. animal. cap. 7. Tres futuras viri in vnum magna ex parte coire notat, nulla facta mentione trianguli.

*Hippocrates* lib. de Ofsium natura futuras Capitis veras, modò tres, modò quatuor reperiri prodidit, quod multis falsum & absurdum videtur. Capita futuras habent alia tres, alia quatuor, quæ quatuor habent vtrinque vna est iuxta aures, tertia ab anteriore, quarta à posteriore capitis parte. At in eo capite quod tres obtinet, nulla sutura in posteriore parte reperitur. Veritatem huius loci sic demonstro: *Hippocrates* futuris squammosis quas nos vocamus spurias, futuræ nomen denegauit. Tradit enim *Galenus*, lib. 8. de usu part. nullum ex antiquis futuras appellasse, ipsumque Hippocratem earum nullibi mentionem fecisse: quia coronalis partes esse credidit. Quando igitur Hippocrates quatuor futuras constituit, coronalem duplicem facit, quia dirimitur à sagittali, ad summas vsque nares excurrente. Reliquæ duæ futuræ, sunt sagittalis, & lambdoides: sed in eo capite quod tribus tantum futuris præditum est, lambdoides posita non apparet; quæ propter crassitiem & densitatem Ossium, prima in craniis obliteratur.

Ternarij numeri verarum futurarum elegans est demonstratio apud *Galenum* lib. 9. de usu part. lib. 17. Quia longitudo capitis latitudinem foperabat; si natura æqualem futurarum numerum effecisset, inæqualibus æqualia tribuisset. At illa iustissima, teste Hippocrate, inter duas futuras transversas mediam rectam collocauit, ut Ossa capitis essent inter se æqualia, & futuræ inter se quandam æqualitatem seruarent: quod ex earum commensuratione facile est intelligere. Cum autem furoris dura meninx adhæreat, ut Cerebri molem sustentans, ventriculos ab omni compressione liberaret, ea de causa futuræ talem in capite situm obtinuerunt. Quippe futura coronalis supra ventriculos anteriores sita est, sagittalis iacet secundum tertij ventriculi longitudinem: lambdoides supra quartum ventriculum consistit. *Galen.* cap. 7. lib. 9. de usu partium. Et huic futuræ dura meninx firmius alligatur quàm coronali: quia cum moueatur antrosum caput, ne vacillaret Cerebrum, debuit posteriore parte fortius alligari.

Sunt ergo tres veræ futuræ, Coronalis, Sagittalis, & Lambdoides. Duæ tantum spurie, quæ nomen futuræ non merentur, propterea veteribus dictæ *osseus* & *membranæ* sunt, *squammosæ* agnitiones, quod squammatum modo & imbricatum committantur; à situ Temporales dicuntur, à figura squammosa; & à futura media sine sagittali

*Galen.* li. 9. de usu part. cap. 11

æquè distant, auctore *Galenus*. Istorum Ossium vnionem *Columbus* ad harmoniam potius quam ad futuram refert, *lib. 1. cap. 4.* Cur per ferratam compagem non coniunguntur? An quia rara & cauernosa oportebat esse Ossa verticis, vt his crassa meninx adhæretet? Ossa verò temporum dura & densa, vt extremas Ossium verticis oras cõtegerent ac munirent? Atqui rarum & cauernosum Os, cum duro & denso coalescere non poterat. Idcirco eiusmodi Ossa imbricata apposita fuere. An quia Ossa temporum tenuissima sunt & solida, Ossa bregmatis crassiora & densa, propterea squammatim agglutinari, & committi necesse fuit, cum dissimilis substantia, & superficies crassa & ienuis, per mutuum extremorum conactum vniri non possent. Ac proinde Ossa bregmatis & temporum, squammarum siue imbricum more conipacta fuere. Os verò temporum superna parte extenuatum fuit duabus de causis, primum ad leuitatem, quia musculo temporali operum, atque propter maiorem huius Ossis portionem, formandis aurium cavitatibus absumptam & occupatam. Arbitratur *Vesalius*, propter musculi temporalis situm, eo contextu coniuncta fuisse Ossa verticis & temporum: nam quibus partibus per futuram veram connexa sunt Ossa, non adhæret musculus temporalis.

Cæterum, notat *Fallopini*, futuram temporalem aliarum futurarum naturam non imitari, quoniam aliis deficientibus hanc abesse non est necesse, quas omnes semper peritissè vidit, remanente temporali.

*Communes futurae*, quæ cranij Ossa ab Ossibus maxillæ dissimulant iudicio *Galenus* sunt duæ, Recentiores tertiam addunt. *Prima sphenodea* vocari potest, incipiens à media parte coronæ occipitis, osque totum sphenoides circumscribit, quod à nonnullis inter Ossa cranij numeratur, ab aliis ad Ossa genæ supernæ reuocatur, & hac ratione communis futura dicitur. *Secunda futura* nominatur *Frontalis*, Os frontale à superna maxilla secernit, eam viam tenet, quam *Galenus* in textu designauit. *Tertia futura* recentiorum, *Ethmoidea* vocatur, quia circumdat Os Ethmoides: propriæ futuræ nomen potius meretur, quàm communis, quoniam Ossibus propriis capitis incuneatum, & vndique cinctum est Os Ethmoides.

Plures futurarum vsus ab *Anatomicis* memorantur. *Primus* est ad fuliginum expirationem, & humiditatis excrementitiæ expurgationem, quare *Pharmacopola* apud *Galenum*, *lib. de siccis*, cum coïdam caput fascia strictius obligasset, tanta suborta est capitis inflammatio ex retentione fuliginum, vt oculi suâ orbiâ projecti fuerint. *Alter* futurarum vsus est, vt per eas dura Cerebri membrana egrediatur, ad pericranij generationem, & quibusdam vas caluam ingredientibus & egredientibus via pateat. *Tertius*, ne capite alicubi percusso, fractura propter Ossis continuitatem, toti capiti communicetur: qua ratione motus *Fallopini*, *vnixum*, quintam fracturæ cranij speciem, cum *Paulo Ægineta*, *lib. 6. cap. 100.* & *Gundone de Cauliaco*, *cap. 3. doct. 2. tract. 3.* excludit. Quam alij viderunt in his, quibus vel decerant futuræ, vel naturali situ non erant collocatæ, vel admodum confertæ & coniunctæ, vt vnum veluti Os ex multis coaluisse videretur. *Quartum* vsum assignat *Galenus*, *lib. 13. meth. cap. 22.* vt medicamepra topica ad penitiores capitis partes penetrarent. Denique propter Ossium discrimina structas fuisse futuras putat *Auicennas*, quia opus erat, vt quædam Ossa essent crassiora, alia tenuiora, alia dura, alia fungosa, quæ substantiæ varietas ex vno & eodem Osse consilari non poterat.

De futuris inter *Anatomicos* duæ ortæ sunt controuersiæ. Prima, si quædam extent capita solida nullis futuris distincta. Altera, num ea sint salubriora? *Aristoteles libro tertio de historia animalium*, *cap. 7.* & *1. de historia animalium*, *cap. 7.* scribit sua ætate inuentum esse eranium sine futuris, illudque habet pro miraculo. *Herodotus* etiam refert in clade *Platensis*, inter *Persica* eadavera caput inuentum nulla futurarum compage solutum. Eiusmodi capita plurima vidit *Aratus Poeta*, vt ipse testatur: & *Arrianus*, in vita *Alexandri Magni*, *Ethiopum* capita nullis futuris esse laxa prodidit. *Fallopini* rarissima illa esse statuit, in quibus omnes futuræ intereïdant: interdum quidem in caluarii senum futuras ubliterari fatetur. At semper in pueris cœlatae coalescant, cum illis vertebrae vniri consaccique videamus, sed *Galenus* admonet *cap. 3. huius libri*, omnium caluariarum futuras nun perpetuò serratis compagibus structas esse, nam in quibusdam futuræ sunt, in aliis harmoniz.

Notatione dignum est, quod scribit *Notans*, *lib. 4. cap. 3.* in quibus omnes futuras,

vel duas petiæ contigit, vnum aut duo foramina non exigua, secundum lambdoidem in bregmatis Ossibus apparere, quæ tamen interdum cum futuris teperiuntur, & sæpius in vertice obliuati.

*Estne Caput solidum, nullis futuris præditum salubrius? Non videtur Hippocrati, lib. de locis in homine. Quò quis plures capitis futuras habet, eò saniores vitam ducit. Ex libello spurio de structura hominis: Caput tres futuras habet, inuenitur tamen & solidum absque futuris, & illud quidem humidum. Hippocrati Celsus manifestè repugnat, lib. 8. cap. 1. cum ait, rarò caluariam sine futuris esse, locis tamen æstuosis faciliè inueniri, & id caput firmissimum, atque à dolore tutissimum esse, ex cæteris, quò futuræ pauciores sunt, eò capitis valetudinem commodiorem esse. Facile est Celsum Hippocrati conciliare, & hanc litem componere. Caput enim solidum nullis futuris discretum firmitus est, & offensionibus externis potentiùs resistit, sed propter fuliginem & vaporum retentionem, morbis internis opportuniùs existit. Vnde fit, vt quibus calua est æstus, hi cephalæa miserrimè torquantur, vt docet aliquot exemplis, Columbus lib. 1. cap. 5.*

Si quis obiciat caput solidum sine futuris, offensionibus externis magis esse obnoxium, quia videtur natura capitis Ossa per futuras distinxisse, vt fractura in Ossè laxò terminaretur, ac proinde caput solidum & continuum, alicubi percussum, vniuersum findi. Respondebo comparationem fieri debere inter res eiusdem generis, internas interperies cum externis comparandas esse. Quando igitur Celsus scripsit caput sine futuris firmissimum, id est, durissimum, atque à dolore tutissimum, id est, Cephalalgia: non intellexit à percussionibus, vel fracturis securum & immune, quamuis Ægyptiorum capita, vt multi opinantur, nullis futuris prædita, tam firma sint, vt ictu lapidis elidi nequeant, quod de Indis Hispaniola recitat Fernandus Oniedas: propterea Hippocrates capita sana laudat, propter duritiem. Idem Auctor scripsit grauiores esse percussiones capitis circa futuras, quàm alibi, quâ motus ratione Valerius asseruit, nihil aduersus iectus conferre futuras, quia multò magis vnicum Os capitis iniuriis obsteret, quàm plura diuisa, quod est falsissimum.

Obseruatione dignum est futuras capitis interdum hiare, siue diduci in vehementissimis doloribus capitis, quod ab Hippocrate priùs obseruatum fuerat, *partic. vlt. lib. 3. de Off. & à Galeno, in Comment.* Sed plenius eam rem tractat & examinat, *lib. 3. meth. med. cap. 13.* vbi notat se in iis vidisse, quibus eam fuerat capillitium, inter mandendum commissuras Ossium coronalis futuræ manifestè moueri. Sic vt faciliè apparetur hominibus illis laxam esse eiusmodi Ossium capitis compositionem. Inuenio apud Galenum, *lib. 13. de vsu partium, cap. 8.* Ossa capitis iuncta per futuram obscurè moueri: Capitis Ossibus, *inguis*, nullus motus conspicuus inest, spinalis autem medullæ Ossibus vehemens.

### De Ossibus Cranij.

**G**alenus expositis Cranij futuris Ossa suis limicibus circumscribit, sed figuram cuiusque simul confundit, deinde substantiam singulorum seorsim explicat. Imprimis numerum Ossium Cranij senarium esse coniicitur ex his verbis: *Sex sunt*, inquit, *Sphenoidæ excepto, capitis totius Ossa:* quasi dubitaret de Sphenoidæ, quod paulò antè dixerat à nonnullis inter capitis, ab aliis inter genæ superioris Ossa numerari, postea sex tantum Ossa suis terminis describit, & eorum substantiam definit. Hunc numerum Aristoteles *lib. 3. de hist. animal. cap. 5.* antè proposuerat. Hippocrates *lib. de vlnneribus capitis*, sex tantum Ossa capitis enumerat, omisso Sphenoidæ & Ethmoide. Verumtamen Galenus *alibi, libro 17. de vsu partium, cap. 20. & Isagores, cap. 11.* septem Ossa Cranij constituit, adiungens Os Sphenoides. Recentiore Anatomiçi octo adscribunt cranio, adiecto Ethmoide.

Cuiusque Ossis substantia diuersa est, sed cuncta id habent commune, quod duplici tabula siue lamina consent, inter quas substantia quædam ossia & fungosa continetur, vt sanguinem effusum absorbeat ad nutritionem Ossium. Hippocrates venas sanguine plenas inter vtrumque tabulatum disseminari scripsit *lib. de vlnneribus capitis.* Gemina hæc squamma cum medullis fungosa & rubro, in resecto cranio hominis nuperimè mortui manifestè conspicitur, & spatium duabus tabulis interiectum cuiusmodi apparet in fronte. Idem Galenus *lib. 9. de vsu partium*, Capitis ossiam substan-



tiam non valdè densam & tenuem à natura factam fuisse scribit, ne tam facillè finderet, neque crassam & densam, ne nimis ponderaret, sed crassam simul, raram & cauernosam constructam fuisse: Crassa est ad securitatem & robur: Cauernosa, ne sit oneri: Rara ob transpirationem. Attamen *Hippocrates* annotauit *lib. citato*, Caluariam duplicem esse à fronte vsque ad verticem, eiusque densissimum & durissimum Os esse, tam infernè quam supernè.

*Idem* *Præceptor* vniuersi capitis tenuissimum & infirmissimum id Os esse statuit, quod est in anteriore parte capitis, & quod sub temporibus conditur reliquis Ossibus infirmius: maiorem esse durtiem in occipite, ac secundum aures, quàm in sin-  
cipite.

Contrà *Galenus* hoc capite Oss frontis firmius & densius scribit Osse fincipitis, quin etiam *verba Hippocratis* contradictionem implicare videntur, vt legenti textum apparebit. Substantia Ossium temporalium multiformis est, vt annotauit *Galenus*: Vna est tenuis & squammosa, altera inferior petrosa. *Aristoteles* 1. *de hist. animal.* aduersus *Hippocratis & Galeni* opinionem, Os occipitis tenuissimum esse annotauit, quod est verissimum in pueris, & adultis, si Oss frontale non fuerit excavatum, tum frontale reliquis crassius apparet, deficientibus cavitatibus.

Quod attinet ad figuram Ossium capitis, *Galenus* duorum tantum Ossium, temporalis & Bregmatis figuras profert. Os temporale trilaterum, Os Bregmatis quadrilaterum facit, sed os frontale circulare iudicatur ab *Anatomicis*: Os occipitale triangulare esse ex *Galeno* colligitur, ratione suturæ Lambdoidis qua circumscribitur Os Sphenoides: ab *autore Introductionis* dicitur *triangulare*.

Præter substantiam & figuram atque limites à *Galeno* rectè constitutos, rursum in singulis Ossibus quædam veniunt obseruanda. Imprimis quod illud Os ad Cranium pertinet, quod eius globum ac rotunditatem complet ac perficit. Vel quod maiore sui parte cerebrum tangit. Atqui os Ethmoides est eiusmodi, ergo ad cranium referri debet. Interdum nouem Ossa reperiuntur, quando Sagittalis sutura ad summas nares excurrens, Oss frontale medium in tersecat, quod in adultorum craniis frequenter occurrit.

Ex illa diuisione Suturarum in Communes, & Proprias, à *Galeno* proposita, *Recentiores Anatomici* distinxerunt *Ossa cranij in Propria, & Communia*. Malè meo iudicio, siue enim Os commune voces, quod futuris communibus circumscriptum est, siue quod suis extremis maxillam superiorem tangit: Nescio qua ratione Ossa Sphenoides, ac Ethmoides communia constituantur, cum Sphenoides maxima sui parte Osibus cranij sit inunctum, iisdemque Ossibus Os Ethmoides vndique cinctum & obvallatum. Meliori iure Os frontale, quod sutura secunda communi secernitur à maxilla superiore, quàm etiam maiore sui parte tangit, commune diceretur.

Inepia igitur & malè constituta Ossium cranij distinctio in propria, & communia. Quod si commune dicatur Os, quod ab omnibus cranij Ossibus, & pluribus maxillæ tangitur, hoc sensu nullum aliud teperies præter sphenoides, quod Os occipitale, Os frontale, Ossa duo temporum, Ossa duo bregmatis tangit, ac proinde Os ethmoides rectè reiecit *Galenus*, nec meretur nomen Ossis communis, quia sutura communi non secernitur ab aliis, neque tangit omnia, aut plurima Ossa cranij & maxillæ. Rectius Os frontale communis Ossis appellationem meretur, quàm ethmoides. Propterea *Platerus* Ossa cranij propria, non commissa maxillæ superioris Ossibus, neque illam attingentia, enumerat Os occipitis, & Ossa duo verticis. Communia cranio & maxillæ superiori, recenset Os frontis, Ossa duo temporum, & Os cuneiforme.

*Primum Os cranij*, in anteriore parte situm, *Frontale seu Coronale* dicitur: quod semper in pueris, nonnunquam in adultis sagittali sutura ad summas vsque nares pertinente diuisum cernitur. Coronali sutura, & secunda communi distinguitur: in medio huius Ossis prope supercilia, *duæ cavitates vacuæ* conspiciuntur, quæ nullæ sunt *autore Fallopio Comm. in lib. Gal. de Ossibus*, in pueris, & simis, & quibus fons diuisa fuerit, quod falsum docet *av. p. 10*. Nam & iniis quinaribus sunt sinus & depressis, & quibus fons dissecta erat, inueni *Idem Fallopius, lib. de vulner. c. 12.* notat huius Ossis cavitatem fracta, internam laminam nunquam vniri & consolidari, sed apertam remanere, propter Ossis siccitatem, & continuum inspirari aëris per fracturam egressum, semel vidit in adolescente curatam fungo cameo repleta cavitatem, quod habet pro miraculo. Et quoniam infantes illis cavitatibus carent, quidam eas constari  
putant.



putant necessitate materiz, in extensionem Ossis frontalis absumptæ: Alij finalem causam assignant, videlicet ad vocis formationem & explanationem, unde quibus illæ defunt,

*Rancidulum quiddam balba de nare loquuntur.*

Vel, vt in illis tanquam penu & promptuario aer recondatur, & asseruetur, ad spiritus animalis generationem, cuius aeris affluxu per maiorem canthum arentes oculi humectari possunt. Vel potius ibi continetur aer insitus propter odorem, vt in oculo & aure. Vel etiam aer ibidem asseruetur ad expulsiōem excrementi pituitosi mucosi, quod in Ossibus spongiosis aceruat, si credimus *Carpo*, qui tales cavitates vulneratas tūd elui monet, quia per narces liquor effluit.

*Pro secundo & tertio crany Ossē*, numerantur *Ossa sincipitis*, quadrilatera, omnium rarissima & debilissima ex *Hippocrate*, quæ in pueris mollia, & circa coronalis & sagittalis futuræ concursum membranæ, non antè indurantur, & in Os mutantur, quàm Cerebrum siccis euaserit: Nec corroborantur ante primum sermonis exordium, *si credimus Aristoteli*. Anteriore parte futura coronali; posteriore lambdoide, inferiore futuris squammosis discriminantur.

His succedunt *Ossa temporum*, quæ pro quarto & quinto computantur, ea circularia sunt, non tilatera, vt placet *Galeno*: Terminantur, supernè futuris lepidoidibus, infernè & interiùs prima communi futura, posterius lambdoidis additamentis. *Pro varietate substantia diuiduntur* in partem superiorem *squammosam*, & inferiorem *petrosam* rupi præruptæ similem, quæ apophysis quatuor extuberat, quarum tres sunt externæ, interna vnica. Externa prima acuta *Hylæides*, siue *graphoides* dicitur, quam *Fallopianus* contra *Vesaliū* appendicem esse contendit, atque epiphysim esse obseruauit in elixatione Ossium, quia separatur. Factam esse ad faucium diuisionem, Auctor est *Galenus*, in *Introduciōis*. Altera obtusa, caneriosa, *vaccini vberis* papillam referens *Mastoides* vocatur, siue *mammillaris*. Tertia lata & reflexa zygomatic portionem constituit. Interna petrosa & inæqualis, intra caluariam, ex inferiore Ossis squammosi sede emergit. In puerulis epiphysis est distincta & separabilis. Nam cultri cuspidē facillè dimouetur & auellitur, quod etiam in caluariis ouis, vituli, canis, porci, felis obseruare licet. Hac epiphysis detrahâ, vniuersa auris structura vno intuitu conspicitur. Huius diuisionis in adultis extat rudimentum.

*Gal. tres Ossis temporalis partes describit. Prima & infima Mastoide* vocatur, quia rupi præruptæ similis. In ea styloidis est apophysis, & altera epiphysis meatū auditorium continens, quæ vel est circulus osseus, cui appensum est tympanum, vel auricularis apophysis interna, quam haud dubiè *Galenus* intellexit, quia ossium circulum ignorauit. *Secunda pars* & media Ossis temporalis comprehendit apophysim mastoideâ, & zygomaticam. Tertia suprema est, versus tempora squammæ modo attenuata. Interea notabis, si *Mastoide*, ab *Anatomicis* cranij diuersis partibus adscribi. *Russus Ephesus lib. 1. cap. 19.* scribit proxima auribus Ossa ob firmitudinem *Mastoide* dicta fuisse, alij pro-pendentes in occipite eminentias *Mastoide* appellant, idque non rectè, inanes enim & cauernosæ, & minimè solidæ, nomini non respondent. Ex *Galeno in hoc libro* à nonnullis *Mastoide* dicitur apophysis illa auditoria, quæ est intra cranium. Nescio, cur *Sylvius* *Comment. ad librum Galeni de Ossibus*, agens de ethmoide scripserit à *Galeno* propriè *Mastoide* vocatum fuisse, quod non inuenio apud *Galenum*. *Vesalius cap. 7. lib. 1.* monet non tantum infernam partem Ossis temporalis petrosam *Mastoide* dici, verum etiam inferiorem occipitis partem, quæ medulla dorsalis è caluaria delabatur, sed propriè conuenit inferiori parti Ossis temporalis.

Præterea in Ossē temporum due cavitates spectantur. Externa condylum maxillæ inferioris excipit. Interior altera meatum auditorium efformat. Cuius ambitus osseus in puerolis fecernitur. Iuxta latera futuræ lambdoidis quædam portio temporalis Ossis in pueris per harmoniam, in adultis per ferratam compagem iuncta, forti percussione cranij dissoluitur, ita ut sæpius obseruauerim, Os temporale in adultis ex duobus partibus contextum, in pueris ex quatuor, si duabus istis addideris Ossium circulum meatus auditorij, & internam apophysim, quæ in pueris epiphysis est.

*Extremum Os occipitale* dicitur, futura lambdoide circumscriptum, durissimum & crassissimum est, ad securitatem, & tutelam quasi ventriculi, & spinalis medullæ: quæ sub eo Ossē latent. Huic crassities non omni ex parte æqualis existit, maiorem

in medio obtinuit, addito oblongo, & instar lineæ exprorecto tuberculo, qua parte quatuor sinus sanguinem vitalemque spiritum deferentes concurrunt: in adultis vnicum est & continuum, in pueris portionibus quinque diuisum, vt ex earum interuallis effluat cartilago, quæ ligamenti vice caput primæ & secundæ vertebræ connectit, ex *Columbo lib. 1. cap. 1.*

Notatione dignum est huius Ossis apophyses condylosas, quas rectè *Galenus* cornas appellauit, quia versus sphenoides in acumen non altum, sed planum desinunt, magna ex parte constructas esse ex sphenoidæ, cuius commissuræ vestigium in adultis penitus obliteratur.

*Septimum sphenoides* vocatur, cui si quis, quod cunei modo se insinuet inter *Ossa capitæ*, & genæ supernæ. *Basilare* dicitur, quia basim & fundamentum caluarie constituit. In pueris non est simplex, sed ex quatuor partibus, quæ post mensem septimum ab ortu non sunt ita obscuræ, quod voluit *Fallopins in Obseruat.* vt earum nullum remaneat vestigium. *Prima pars* ab occipitis cornis vix digiti latitudinem excedit. *Altera Ossis portio* sellæ equinæ circumscribitur. *Tertiam & quartam huius Ossis partem* componunt pterygoidei processus, & illi qui ad caua temporum feruntur. At in adultis vique ad duodecimum annum gemino Osse constat, quorum primum ab occipitis cornis protenditur, vsq. ad apophysim clinoidem posticam, alterum reliquam sphenoidis portionem comprehendit.

Ante *Galenum*, Os sphenoides veteribus *Anatomicis* ignotum, aut saltem inditum fuit, quantum ex lectione veterum *Anatomicorum*, qui nobis supersunt colligere possum. Huius Ossis nomen non expressit *Hippocrates*, quamuis delineasse videatur. Neque *Rossus Ephesius* illius mentionem fecit.

In hoc Osse duas facies, siue *Tabulas* considerabis, internam & externam. *Interna* duabus apophysibus extuberat, quas à similitudine pedum lecti, *munditi* vocant. Inter eas spiritum relinquunt glandulam pituitariam excipiens, quod cum duabus apophysibus sellam equinam repræsentat. *Externa facies* quatuor educit apophyses, ex his *duæ caua pterygoideæ* dicuntur, ab effigie alarum. Aliæ duæ planæ ad tempora continentur. Inter eas tabulas gemina continetur cauitas inanis & vacua, medio septo disclusa, quæ in adultis tantum, nec in omnibus reperitur: quoniam in pueris Os sphenoides solidum est, nullis cauitatibus præditum: Quæ cum extant, duplici ductu perforatæ sunt in narium amplitudinem, nullo modo frontalis Ossis cauitatibus continuæ, vt credidit *Columbus*, à quibus duorum digitorum latitudine distant. Constructas fuisse putat *Vesalius* ad leuiatam, quemadmodum illas frontis & maxillæ. At *Columbus*, ærem existimat in illis asseruari ad animalis spiritus generationem: quod reprehendit *Fallop.* in *Oss.* Nec fortassis malè quispiam iudicaret extructas fuisse ad vocis resonantiam, quemadmodum cauitates in musicis instrumentis.

Cæterum eos sinus in crassioribus tantum craniis inuenies, in quos pituitam per foraminula tabulæ superioris transfusam colligi & coaceruari, inde ad palatum transmitti opinatur *Sylvius*, & demonstrat ex *Galen.* Quam excrementorum viam contra *Galenum*, *Vesalius*, *Columbus*, *Fallopins*, *Valerda* reiciunt: & per vicina & accumbentia sellæ sphenoidæ foramina excerni contendunt. *Galenus* ratio hæcerat, satius esse excrementa transcolari, & in istis sinubus aliquatenus aceruari, quam continuò expuere, & os apertum tenere. Profert ad *Galenus* defensionem suam experimentum *Sylvius*, in calumnia secunda depulsiōe contra *Vesaliū*. Verba *Authoris* transcribam, quia liber rarus est. Hanc controuersiam de via pituitam Cerebri in palatum & nares educente facilius & certius dirimes, si glandulam vbique ima parte circumhærere spectaris, nullo meatu relicto fictis canalibus: Si præterea in choanam adhuc calentē, aut fortu aliquo siccō recal factam insiles, aut aliquem coloratum humorem, sed tenuem & calentem infundas. Ex isto enim palato deprehendes, prædictas materias excerni, per manifestos & latentes sensuum meatus, qui tamen etiam apertè in coryza, & cum sæpe & multum mungimus, & interdum inspirando, & cum in magna siti lenitè bibimus, deprehenduntur sonitu quodam reciprocantium per ea materiâs. Præterea, si Os sphenoides, quæ sunt dida nuper foramina, cultello, vel pugione, vel terrebello perfores, deinde immisso tubulo humore instaris, aut sine humore ærem susurros inibi multos transmeantis ex sinubus materiæ in nares & palatum audies, nisi pituita multa, crassa, lenra eos sinus impleat: quod si scalpro fortè aut ferra palatū eximas, deinde insiles, vt prius materiâs, cum multo strepitu effertis audies, ac spectabis.

Quin si lacius parte superna hos sinus aperueris, Osse illo tenui late execto, vt tota appareat subiecta cauitas sinuum, foramina spectabis, quàm plurima in fundo sinuum foramina palati respiciente: imò & aliquoties tam magnum inueni, vt calamus scriptorium facile reciperet. Quæ omnia in recenti cadauere sunt exploranda.

Hæc *Syluij* experimenta speciosa sunt, & sola ratione comprehensa, valida videntur, nisi fallacia & inania demonstraret. Infinitas vidi caluarias, in quibus Os frontis, & sphenoidis erat solidum sine vlla cauitate: Et in quibus caluariis Os frontis cauitatibus destituitur, Os sphenoides solidum est, sine vllis cauernis. Quod planè conuincit eiusmodi sinus ad leuitatem esse conditos, nec absolute necessarios, alioquin quandocumque desint, vitium esset in conformatione partis.

*Euchysus lib. 1. Instit. Anat. c. 9.* maluit in Osse sphenoidis codicis errorem accusare, quàm ipsum *Galenum* ignorantie arguere, conaturque textus emendatione *Galenum* excusare. *Ingrasias lib. de Ossibus* adductis pluribus locis, quibus probatur *Galenum*, Os palati cribrosum fecisse, tandem *Galenum*, sic interpretatur. Os palati Ethmoides, non ea tantum parte, qua glandulam excipit, esse perforatum, sed aliis propinquis partibus. Ego verò existimo *Galenum ex veterum Anatomicorum* opinione loqui, cum scribit sphenoides, qua parte continet glandulam, esse pertusum. Nam *lib. 9. c. 3. de usu part.* scribit veteres *Anatomicos* ignorasse, cur non statim pituita ex Choana per palati foramina effluat. At ipse *eodem lib.* meatus patentes agnoscit, per quos pituita defluit in os. *Sic loquitur.* Qui verò meatus grauius deorsum vergentia excrementa erant euacuaturi, eos natura fecit decliues, & amplios admodum, vt quos multorum & eorumdem crassorum humorum veluti riuus quidam & canales erant futuri. *Et paulò post subiungit.* Cæterum decliues Cerebri meatus, tum per palatum in os, tum per nares conspicuis, ac magnis orificiis sensibilibus & crassa eruant excrementa.

Quamuis enim *Galenus, lib. 9. de usu part.* Os sphenoides cribrosum esse scripserit, eique nomen Ethmoidis aptius conuenire, quàm ossi in summis naribus collocato, quod cum *Hippocrate* spongoides vocat: Perforatio tamen illa sphenoidis cribro similis, non quaerenda in tabulis, sed in circuitu sellæ equinæ, vbi duo foramina notare licet, quæ choanæ canales quatuor admittunt, ad expurgationem pituitæ comparatos. Non est verisimile per tenuia foramina tabulæ superioris, si quæ sint, pituitam percolari, quia crassior tantum per os sphenoides expurgatur, auctore *Galeno*. Adde quod *Galenus* hos specus, atque illos frontis ignorauit, vel saltem eorum nullibi mentionem fecit, quando *Galenus lib. 11. de usu part. cap. 19.* palati os capiti & maxillæ supernæ interiectum, scripsit continere in se meatus Cerebri purgantium foramina, probabile est intellexisse, Os vulgò dictum Ethmoides, quod putauit esse portionem sphenoidis. Nam *hoc libro* nullam mentionem facit huius Ossis, atque nullibi inter capitis & genæ supernæ ossa numeratur à *Galeno*, quinetiam *lib. 9. de usu part. c. 5.* Ossis narium appellat Ethmoidea, quæ intellexit, *cap. ult. huius libri*, quum scribit superfluum esse commemorare ossa quæ sunt in naso, quæ melius spongioidea cum *Hippocrate*, quàm *nummi* nominari sæpius annotauit, quod cumulatius *lib. 8. de usu part. c. 7.* explicat. Adde quod in craniis aduultorum ossis sphenoidis antica pars cum tabula cribrosa Ossis Ethmoidis adeo strictè coalescit, vt nullum diuisionis vestigium appareat. Interea notandum *Galenum hoc libro* Os sphenoides etiam ad genam supernam reuocasse, vt patet ex *cap. 3. huius libri*, itaut sit ambiguum, cranio & maxillæ commune.

*Ossium & vltimum Os cranij Ethmoides* appellatur, in ima frontis sede locatum, partes habet substantia dissimiles: Prima est pars illa cribrosa obliquis foraminulis pertusa, cui altera protuberans insidet cristam galli referens. Huic intra cranium parte anteriore adiacet rimula, quæ crassam meningem firmat, & aërem frigidiusculum ad Cerebrum recta dirigit. Cristæ galli continua est pars altera inferior, laminæ speciei summas nares diuidens, Secunda Ethmoidis portio spongiosa cauernulis prædita, vtramque narum cauitatem opplet: partemque orbis iuxta magnum angulum constituit, quæ non est os distinctum, vt existimant *Columbus, & Vesalius*, (qui ossibus maxillæ supernæ hanc Ethmoidis portionem attribuunt) quod etiam fecit *Fernelius*, addens præterea spongiosa ossa construi, & componi ex tribus ossiculis cauernosis feriatum contextis, itaut vnum alteri superiectum sit. Tertia pars huius ossis plana & leuius interiore oculi orbitam perficit.

Cum autem natura in nostro corpore nihil frustra molita sit, quo sine conditum

fuert os Ethmoides dicam. Primò factum est ad aëris attractionem, & fuliginis excretionem. Secundariò ad Cerebri expurgationem. Foraminibus obliquis donatur, quæ obstant, quò minùs aër frigidus & impurus Cerebrum confestim transiret. Impe'diunt quoque, ne nobis iniuris mucus inhonestè effluat, qui in spongioso Ossè congeritur, donec qualitate, vel quantitate molestus, vehementi exsufflatione, vel pinnarum nasi compressione excernatur.

Præter hæc os Oculi calvariz, Ossis *Andermacus Comment. 2. p. 209. de veteri & noua Medicina*, noui cuiusdam officuli meminit his verbis, officulum verticis triangulare, ad formam lapidis piscis cyprini, vulgò carpinis dicti, in caluariz vertice, vbi saturæ committuntur, intus subsistit: Id vbi scalpello penetraueris, statim foras profluit, *Anatomicis* hæcenus incognitum. Istud officulum triangulare fortassis intelligit, quod nonnunquam duplicata lambdois excludit, cui *Paracelsus* dotes admirabiles tribuit aduersus *Epilepsiam*.

Animaduersione dignum in quibusdam craniis portiones ossæ, propriis futuris omnino separatas ab ossibus cranij iam commemoratis reperiit, circa fines futuræ lambdoidis inter os petrosum & occipitale, quæ tamen portiones ossæ, nec debent, nec possunt augere numerum Ossium cranij octonarum à nobis constitutum.

### *Quid in Ossibus Capitis Galenus omiserit, vel ignorauerit.*

**G**alenus tres Cavitates, quæ in apophysi interna, siue auriculari ossis petrosi continentur, & tria officula auris ignorauit, varias etiam Ossis sphenoidis & ethmoidis particulas prætermisit, quæ omnia facillè suppleri possunt ex aliis *Anatomicis*. Imprimis libro octauo de usu partium, cap. 6. & lib. 9. cap. 2. & libello de venarum distributione cap. 6. reprehendit *Veteres Anatomicos & Philosophos*, qui nullum esse mearum ad Cerebrum ab aure opinabantur, deceptos fuisse scribit, quod cum sectam porcinam, aut filum in aurem introduxissent, non penetraret, nec per alterum foramen exilliret, quod euenit propter anfractus obliquos & labyrinthos huius foraminis. Vnde licet agnoscere *Galenum* istas cavitates aurium subolfecisse, & leuiter adumbrasse.

Suprà *Galenum* gloriari potest *Aristoteles*, de quodam meatu, qui ab aure in palatum tendit, ex opinione *Alcmeon* cap. 11. libri primi de historia animalium, cuius beneficio surdi, aperto aure audiunt. Præterea *Galenus*, sinus seu cavitates frontis, sphenoidis, & maxillæ superioris subiecit, forsan quod non reperiuntur in omnibus craniis.

### *De Cavitatibus, & Officulis Auris internæ.*

**N**efas est Ossis *Temporum Cavitates*, & quæ in ipsis continentur officula silentio inuoluere. Ingrediamur, & lustremus antrum illud auris internæ, veteribus inaccessum, in quo magnum Naturæ artificium elucet. Huius admirabilis structura, *Galenus & veteribus Anatomicis* indicta & ignota fuit, forsan quod aures simiarum inspexerint, aliter extructas & conformatas, in quibus desunt hæc officula, testante *Casserio*, quod est falsissimum. Nam in aribus cercopitheci, tria officula, maleum, incudem & stapedem humanis figura, non mole sumillima deprehendi: Cor enim simia careret his auditus instrumentis, quæ etiam piscibus dara fuere, auctore *Rondeletio*.

Lapidosum Os temporum quatuor Cameris discernitur: quarum prima foris obuia semperque patens, *utque aures dicat*, tympano terminatur. Huius cavitatis *officulus circularis*, siue ambirus, in puerulis vique ad septimum mensem coctione facillè secedit, & in recens naris media parte & exteriori cartilaginosa, interiore ossæ, annulum refert, non omnino absolutum, cui tympanum affigitur. Altera *Cavitas*, propter amplitudinem, *Vesale*, *Felus*, dicitur *Fallopio*, *Cochlea*, à conchyliorum similitudine, continet aërem insitum vernaculū, ambiendi consociat, & tria officula, de quibus paulò post agemus. Intus autem iuxta tympanum versus occiput foramen angustum apparet, quod sensim dilatat in cavitatē asperam & spongiosam, quæ cōmunicare videtur, cum mammillaris processu interno specu. *Vesale* in *Exam. Obseruat. Fallopij*, hoc antrum assimilabat fodinæ amplæ, à qua plures cuniculi & vix princi-

pium habent, & in eandem circulatim huc illuc incedentes regrediuntur. In cavitatis extremo, quod directè opponitur tympano, duo foramina seu fenestella occurrunt, quarum maior & ovalis basi stapedis occlusa, aditus est ad tertiam cameram. Altera minor & rotunda ( argussior in homine, quàm in brutis ) quarta camera principium existit. Ambitus huius foraminis nonnihil extuberans, in cliuulum quendam editum affurgit, qui in labyrinthum sub cliuo furtim agitur. Fenestellarum vsus existimatur species audibiles ad sequentes cavitates traicere, & excrementis Cerebri viam præbere, saltem per fenestellam Cerebro adaptatam.

Tertia cavitatis labyrinthus vocatur, propter varios anfractus in eandem cavitatem, idemque compitum redeuntes, ab aliis *Fadina*, quia pluribus cuniculis scatet eo sine constructis, ut aer internus per angusta loca transiens acutior magisque sonorus euadat. Vel ut placet aliis, sonus in concha, velut in echo ingeminatus, sensum in istis mixandris & circulationibus elanguescat & commoriatur. Tres autem ductus, siue semicirculi in labyrintho reperiuntur, qui ita feruntur, ut duo ad angulos quasi rectos sese interfecerint, ex opinione Anatomicorum: ego verò sex inuenio intra labyrinthum. Iuxta fenestram ovalem foramen adest, in quartam cavitatem peruium, etiamsi hæc cavitatis alium habeat ingressum, quæ fenestra minor dicitur. Quarta cavitatis Cochlea nominatur à flexuosa meatus obliquitate. Est enim anfractuosa, & quibusdam focus excavata. Eam cavitatem quidam exeam esse putant, nullumque exitum habere. Alij in medio, ea nimirum parte, cui spiræ innituntur, peruiam esse dicunt. *Cassirius* cochleam assueverat interposita Offica lamina prætenui in meatum nervi auditorij desinere, nullum autem alium egressum reperiri. *Galenus lib. 8. de usu partium*, reprehendit ceteros Anatomicos, qui auri foramen cæcum esse dixerant, quasi nullum egressum haberet. Sed *Ruffus Ephesius* respondet veteres cæca dixisse foramina, quæ non erant in rectum excavata. Idcirco, quia flexuosus est auri meatus, propterea cæcus dictus fuit. Inuenio intra cochleæ spiras, rimulam per quam sonus ad Cerebrum traicitur, & biliosum Cerebri excrementum in aurem defluit.

Porto, in concha tria ofsicula continentur, quæ ex figuris rerum artificialium elegantissima nomina sortiuntur. Primum Ofsiculum longiusculum *Malleus* nuncupatur, in quo plures particule notari debent, Cauda, Capitulum, & duo Processuli, cauda seu pedunculo membranz tympaniti attenditur, suo tuberculo leuiter excavato per ptyngulum incumbit mediante cartilagine inartienlatur, ex apophysis longior tympano incumbit. Altera exilior musculus, & chordam excipit. Cauda verò nonnihil reflexa & incurua tendit in musculi admittit. Alterum Ofsiculum, incus, siue dens molaris dicitur, non tantum à figura, verum etiam ab vsu, quod incudis modo, malleoli perimoti, ac percussu ictus excipiat. Parte superiore lata, & sinuata malleoli capitulo committitur, inferiore definit in duos processus, crassitie & longitudine inæquales. Processus crassior & breuior tympano affirmatur, alter longior & tenuior ad extremum leuiter inflexus stapedis apici obligatur. Est autem *Stapes*, tertium Ofsiculum triangulare, in medio percutum, ne aëri & sono aditum ad labyrinthum præcluderet, intus in ambitu striatum sua basi latiuscula ovalem fenestram occludit. Cur huic operi solidum Os præficatur? An quia sonus in molli substantia exceptus oblitescit, per solidam & ossicam substantiam delatus robur & puritatem acquirit? *Varolius* hoc ofsiculum auditus pupillam appellat, ut enim per pupillam visiles species admittuntur, ita per foramen stapedis sonores species traducuntur, quod antea declarauerat *Author Anatomia viderum*. In interiori cavitatis Osis petrosi manet aer quietus, ibi autem discernuntur omnes vocum differentie, & se habet illa pars interior Osis petrosi ea comparatione ad auditum, in qua se habet crystallinus humor ad visum, & est foramen ad ipsam aurem in comparatione pupillæ ad oculum. *Parvus* dubitat, num *Stapes* membranz cæci foraminis appositus fuerit, ut illam sustineat ad perfectiorem audiendi facultatem.

Admiratione dignum est ista ofsicula in recens natis & adultis æquali magnitudine prædita esse: sed in illis molliora, & in medio cartilaginosa esse dixerunt, (quod non est verum) quo fit, ut infantes obtusius audiant: solidiora verò per ætatem facta, non omnino medulla & equitate destituuntur, ut notauit *Columbus*, quod est falsissimum. Cur autem horum ofsiculorum substantia dura sit ac densa, à ceteris ofsisibus planè distincta, tres proficiunt rationes. Prima est, quod periosio non cingantur,

ne ad soni receptionem forent inepta. Deinde quod in recens naris iam sint perfecta, & eandem quam in adultis magnitudinem retineant. Tertia est, quod suspensa & librata tenentur à ligamento, vt percussa ab aëre interno, externi violentia commoto, sonum acutorem edant.

Cæterum, hæc officula in concha collocavit Natura ad stabiliendum & firmandum tympanum, quod alioquin aër extrinsecus vel internus lacerare & disrumpere potuisset. Propterea malleolus cum altero in cunctis crure tympani innititur, & quoniam huic officio solus malleolus non suffecisset, alia duo ossa in auxilium adiuncta sunt, ob cavitatis inæqualitatem, quibus enim animalibus auris cavitates rectæ sunt, vt asneri, vnicuique officulum natura concessit. *Volebamus* alios duos vsus assignare, vt sonum per tympani agitationem illis communicatum, ad neruum auditorium deferrent, atque vt ex illorum commotione neruus, siue chorda pulsata aërem implantatum ciceret, atque excitaret ad sonum percipiendum. Siquidem à membrana non ita vehementer agitari poterat neruus, atque ab Ossibus. *Columbus* facta esse asserit, vt ex mutua collisione strepitum edant, & sonorum modulationi inseruiant, quod si ita esset, vt doctè animaduertit *Varolius*, sonus ille internus externum impediret & confunderet, vt in tinnitu aurium obseruare licet. Aliis placet hæc officula cum chorda externi aëris appulsu vibrata, & ad membranam allisa, perinde ad distinctionem sonorum conferre, atque dentes ad vocis explanationem.

Præterea, in auris structura obseruari debet *Fallopj aqueductus*, canalis scilicet *offensis*, neruo quinti paris deducendo paratus, cuius principium est intra concham, extremitas ad radices apophyse *n. pterygoideæ*. Est *alius ductus*, per quem etiam *neruus plani distinctus ab auditorio traducitur*, oritur ab interna & anteriori caluarie parte satis angusto foramine, tenuissimaque ossea squamma à subditis antris sciungitur, & secundum anteriora labyrinthi procedens, statim eius cavitatis initio in eam adaperitur, sed ubi ad concham peruenit, deorsum reflectitur per *Os petrosum* delatus, egrediturque caluaria iuxta auriculæ radicem, inter styloideam & mastoideam.

### De Cavitatibus Cranij, nempe Fossis, Foraminibus, Sinubus.

**C**avitates cranij diuiduntur à *Syluis* in *fossas*, *foramina*, & *sinus*.

*Fossa* est cavitatis, veluti vallis quædam Ossibus, seu collibus vndique conclusa. *Fossæ* autem sunt *Interna* & *Externa*. *Interna sex*, *Dux* ad nares & oculos, in parte Ossis frontalis inferna, *Ethmoidis* crista eminepre differet sunt *omnium minima*. *Totidem* in occipite *omnium maxima*: *Dux* ad aures situ & magnitudine mediæ.

*Externa sexdecim* numerantur, *Dux* iuxta aures, maxillæ inferioris capita excipientes: *Dux* in apophysi pterygoide: *Dux* ad sextæ coniugationis foramen: *Dux* supra, totidem infra palatum: *Dux* sub zygomate in temporum cavitare: *Dux* postremo in oculorum orbita: *Dux* intra nares.

Alteræ cavitatis differentia *Foramen* dicitur, *ductus* utraque parte peruius. *Foramina*, vt fossæ diuiduntur in *interna*, quæ cranijs capacitatem subeunt, & *Externa*, quæ caluariam non penetrant, sed in eius ambitu, & maxilla superiore consistunt. *Interna* sunt tredecim coniugata, & *vnus azygos*. Cuncta ferme in Osse sphenoidæ, aut illius circuitu continentur, paucis exceptis, nempe *Ethmoideo*, *Carotico*, & *Acoustico*, quæ in apophysi interna Ossis temporalis consistunt, & duobus aliis Ossis occipitalis: *Primum* in Osse cribroso cernitur, quod licet sit multiplex, pro vnicuique tamen habetur. *Secundum* in sella sphenoidis consistit, quæ opinione *Sylui*, foraminulis quibusdam pertusa est, & pro duobus numerantur, verimque vno, sed in cranijs adultorum nulla sunt foraminula, aut rara reperiuntur: *Tertium* optico neruo exitum præbet. *Quartum* scissura est oblonga initio angusta, in basi latior & rotunda, nervos oculum mouentes, arterias & venulas transmittit, quæ per vicinam rimam in basi orbitæ exculpram cranio excidunt sub zygomate. *Quintum* exiguum & rotundum priori subditum, portionem quinti paris in temporalem mufculum emittit. *Sextum* amplius & larius tertio pari præparatum est. *Septimum* vnicuique, interdum duplex coniguum, quarto pari dicatum est. *Octauum* prægrande & lacerum venam ceruicalem admittit. *Nonum*, ac veluti fornicatum, aut canalis modo excavatum, arteriam carotidem excipit. *Decimum* quintam neruorum coniugationem ad aures

traducit. *Undecimum* inæquale, & veluti geminum sextam nervorum coniugationem ad aures traducit. *Undecimum* inæquale, & veluti geminum sextam nervorum coniugationem educit, & iugularem internam excipit. *Duodecimum* leptimo nervo traiciendo destinatur, obliquum est, ac declivè, quo citius septimi paris nervus sexto pari committeretur, ut ambo simul coherentes deorsum tutò descenderent, ex *Vesalio*. *Decemumtertium* exile sæpius vnicum, pari & opposito deficiente posterius in radice processus occipitis latet, cervicalis venæ, & arteriæ reliquias admittit: interdum utrumque deficit, tum ab 11. foramine solivolatore fuscipiuntur. Obseruavi illis deficientibus, foraminula duo, utrimque vnum in parte media & laterali Ossis occipitalis, quæ perforato cranio foris delinebant, pone mastoideum apophysim. *Primum* foramen amplissimum sine coniuge, spinali medullæ exitum præbet.

Præterea notanda veniunt, pone mastoideum in futuræ lambdoidis additamentis duo foramina utrimque vnum, interdum ex utraque parte duo sunt, quæ foras separata intus eandem cavitatem efformant: venulas iugulares externas, ad sinus duræ meningis transmittunt, nonnunquam in vertice secundum lambdoideum, duo etiam foramina reperiuntur, quæ falso *Parvus* putat futuratum defectum supplere, quia sæpius sinit suturas comitantur.

*Externa foramina sunt decem. Primum* in oculorum supercilio. *Secundum* infernæ oculi orbitæ subiectum est. *Tertium* in magno cantho, glandula obturatum, in nases atque palatum peruium.

Hoc, ut probaret *Galenus*, profert plurimos ocularia medicamenta, non multò post inunctionem expulisse, alios emunxisse, quod falsum asseuerat *Columbus*. Sed *Galenus* testimonium confirmabit *Plinius*, lib. 7. cap. 6. cùm scribit ex *Aristotele*, fecunditatis in feminis prærogatiuam accepimus, inunctis medicamine oculis saluam infici. Authoritas verò *Hippocratis* hanc litem terminabit, *Galenus* fide & assertione corroborata. Consultit lib. 6. *Epid. part. 3. sect. 2.* in epiphora humores in fauces euocate. Notat *Galenus*, in *Comment.* *Lycum* longa oratione demonstrasse, ab oculis in palatum vsque, meatum quemdam pertinere, illorum excrementa per hanc regionem euacuantem, hunc meatum prope maiorem angulum situm esse. Præterea ex parte *Galenus* stat grauissimorum Medicorum experientia, *Thadæus Dunnus*, ut ipse refert, lib. 4. de *venæ sectione*, cùm suis oculis laborantibus collyrium album *Rhasis* adhibuisset, post horæ quadrantem non sine fastidio sareo collæ amaritudinem in palato sensit. Sed omnem admirationem superat, quod narrat *Rungius* in suis *disputationibus*, de *visus symptomatibus*, & *Smetius* in *Miscellanis*, huius foraminis beneficio quandam *pusillum*, crotis glandulis ex malè curato oculorù ulcere per patentes narium meatus vidisse, itaut proxima quæque obiecta dignosceret. Supra istud foramen in intima oculi orbita, *Quartum* occurrit, in Os Ethmoides & frontis cavitates peruium. *Quintum*, in palati initio cernitur infernè simplex, supernè duplex. *Sextum* ad finem palati prope apophyses, pterygoides inscriptum est. *Septimum paruum & cæcum*, inter apophysim mastoideam & styloideam latitat. *Octauum* est scissura longa sub zygomaticæ. In rima hiatus antico latete sub zygomaticæ duo foramina continentur à *Syluis* descripta, quorum vnum superius, alterum inferius, quæ diligenter scissuram intuentibus apparent à tergo apophyseon pterygoidæon, per inferius foramen pituita ab oculis in palatum defluit. Hæc duo pro nono numerantur à *Syluis*.

Cùm autem foramen auris internum, & illud externum auris non sint directè opposita, sed cavitatum interiectarum intervallo quodam ambigioso disiuncta, meo iudicio foraminibus externis, *Foramen externum auris* addi posset.

Tertia cavitatis species *Sinus* appellatur, quando *Cavitas ab ore angustè in amplitudinem latet*. *Octo sunt sinus*. Duo in Osse frontis ad supercilia. Duo in Osse sphenoidæ. Duo in apophyse mastoide. Duo postremi in superiore maxilla.





oem enumerat in *Isagoge* duodecim ossa maxillæ supernæ tribuit. Huius contrarietatis causam esse statuit futurarum multitudinem, aut paucitatem, quæ numerum ossium minuit, vel adauget, quippe *lib. 11. de usu part. c. 19.* De futuris supernæ maxillæ & palati dubitalle veteres notauit, quam controuersiam composuit in *libris disquisitionum Anatomicarum.*

*Galenus* futuras maxillæ supernæ nonario numero comprehendit. *Prima sutura* ab exitu zygomatici nascitur, supra minorem oculi angulum, & per zygomatici cauum descendens comuni futuræ sphenoidæ copulatur. Huius futuræ portio altera à scissura, quæ est in orbita anteriore ad latus minoris anguli exorta, atque per mediam & inferiorem orbitam producta, in margine orbitæ terminatur, ibique transversariam scinditur: quæ tripartita scilicet falsa & commentitia iudicatur ab *amabuso Anatomico*: quam tamen verissimam esse comperies, si in textu Græco, *ἰνὴν, pro ἄνῃ* legeris. Nam huius diuisionis prima pars ab anguli maioris interna parte ad medium intercilium prorepat, fecatque eum angulum in duas partes: altera portio per concauum orbitæ sub eodem angulo iuxta nares aliquantulum progreditur, mox sese erigens ad communem capitis futuram ascendit: tertia portio secundæ videtur productio ab eo puncto, quo supernæ secunda recurrit, incipiens, interius ad imum tendit, ubi comuni futuræ sphenoidæ committitur.

Ex ea futurarum distributione credidit *Galenus*, tria ossa in orbita contineri, nec male per magnum & medium os orbitæ, neruum qui maxillæ superæ datur traduci prodidit. *Secunda sutura* ex margine orbitæ infernæ prodians, obliquè ad latera maxillæ incedit. *Tertia* ab inferna & media maxillæ parte, incipiens, per medium palatum secundum eius longitudinem recta procedit: ea in nostris craniiis frequentissima est, quam tamen *Galenus* absentem vidit, vnitis & connatis istis duobus Ossibus quæ semper interiant. *Quarta & quinta* à medio superciliorum emergunt, & iuxta nares incidentes, ac inter caninum & incisores dentes obliquè delatæ, in mediam palati futuram terminantur. Illæ in humanis craniiis *Galenus* frequentissimè obseruauit, *Sylvius* in quatuor craniiis integræ erant & perfectæ, in plurimis quidem imperfectæ sunt, & tantum deducæ ad curriculum sui dimidium, sæpe in foramen inferius orbitæ subditiua desinunt, fors quidem, sed sæpe intus perfectæ. De his *Sylvius* disputat contra *Vesalium de pulsione quinta*. *Sexta sutura* in fine palati iacet inter apophyses premaxillares, & dentem postremum, quæ hac parte sphenoides dirimit, tandemque in capacitatem foraminum palati vanescit. *Septima & octaua* à medio superciliorum descendentes, ossa nasi ab alris fecerunt. Has futuras *Eustachius* contendit ex *Galenus* eas esse, quæ à medio superciliorum prodeuntes, ac iuxta nasum delapsæ, inter caninum & incisores desinunt. Sic enim scribit *Galenus*, hoc capite. Nasi quoque ossa duo sunt, quæ futuris à medio superciliorum descendentes discernuntur, has duas esse in maximorum Ossium enumeratione diximus. Atque ita *Galenum* ab errore & calumniis recentiorum liberari putat. *Nona & vltima sutura*, ossa nasi à se inuicem distinguit. *Decimam futuram* addo in palato transuersim ad verumque caninum pertinentem, quam *Columbus & Vesalius* in pueris tantum parere volunt, in adultis obliterari, nullumque sui vestigium relinquere: quod falsum conuincit *Wasse*. Sed miror *Fallopius* in *Observationibus Anatomicis*, hanc futuram non admittere: Quia, inquit, Os ab Osse non separat, neque in exterioribus apparet, nec Os cum Osse coniungit, quod minus est futurarum.

Sunt igitur decem suture in maxilla superiore, *Nonem*, ex *Galenus doctrina*, quæ si omnes manifestè non appareant, non ideo *Galenus* erroris est accusandus, quandoquidem verarum futurarum proprium est, Os ab Osse diuidere iorsus, & extia apparere: non cuiusvis lineæ, quæ cum sit, dumtaxat futura, vel harmonia inchoata minimeque absoluta, vestigium tantum futuræ, vel harmoniæ repræsentat. Sunt enim aliqui muscoli quales circa aures habentur, qui propter exiguitatem & imperfectam naturam suo munere frustrantur. Ita huiusmodi lineæ vsom futurarum & harmoniarum non præbent, sed tanquam signum, seu vestigium à natura imprimuntur. Ex *Eustachio* in *Examine Ossium*. Hactenus de futuris. Pergo ad Ossium historiam.

Maxilla parte superiore latior & protuberans, inferiore angustior, in homine, & reliquis animantibus immobilibus cernitur, exceptis Psittaco, Cocodilo, & Phœnicoptero: In homine stabilis est ad faciei decus & venustatem, atque oculorum commoditatem: Quippe si motum habuisset, oculis maiore circulo inspecturis, & nari-

bus odores excipientibus magno fuisset impedimento, & sua continua agitatione vicinum Cerebrum perpetuo succussatum plurimum offenderet, ciborum quoque duriorum contritionem exquisitam impediisset: Nam ut in molendinis ad comminuendum triticum lapis vnus immobilis persistit, supra quem alter celeri circumsatione mouetur, simili modo ciborum contritio in homine periclitatur.

Ex pluribus Ossibus efformatur, non tantum ad patendi difficultatem, ne scilicet vna parte laborante vniuersa infestaretur: Verum etiam, ut ex eorum intervallis ligamenta prodirent musculi continentia, auctore *Columbo*. Numerum Ossium maxillæ supernæ prius ex *Galeno* percensebo. *Tria sunt in orbita oculi*, quibus capiti maxilla committitur, horum maximum est *Zygomaticum*. *Secundum* situ & magnitudine medium portio est ethmoidis, nervos ad superiorem genam tendentes transmittit, & continet, ut scribit *Galenus*, quod non convenit huic Ossi, sed portioni Ossis maxillæ, quod inferiorem partem orbitæ effingit. *Tertium* omnium minimum iuxta magnum oculi antrum locatum est. *Quartum* omolium maximum, medietatem dentium comprehendit, cuius portio Ossi zygomatico commissa, *Os malum* vulgo, sed male appellatur. Fatetur *Galenus*, dentes excipere, exceptis incisoriis, quod est falsum. *Quintum* Os in extremo palato consistit. *Sextum* est, os nasi proprium. *Septimum* in genæ superioris extremo dentes incisores comprehendit. Animaduertis tamen id os quorundam iudicio simplex esse, aliorum opinione duplex. In brutis osistum manifestè patet, nihilominus in erantili puerulorum notatur, futura ab vno dente canino ad alterum per medium palatum protensa: In adultis adhuc manifesta, qua forsitan deceptus fuit *Galenus*. *Octauum* Os *Alveus*, est *sphenoides*, quod modo cranio, modo maxillæ tribuitur.

Quod si pauciora velis Ossa constituere, erunt tantum octo, vtriusque tria coniugata, & duo sine pari. Primum est zygomaticum, prætermisiss duobus, quæ sunt intra orbitam. Secundum est Os nasi proprium. Tertium Os maxillare: Duo quæ cæteris coniuge, sunt illud Os dentes incisores comprehendens, quod antea geminum esse diximus, & alterum Os in extremo palato situm, quod ante duplicatum esse proposuimus: quibus addere licet os sphenoides, sicque erunt novem. Quo sensu octonarius numerus huius libri, cum novenario libri 11. de usu partium, componi potest.

*Recentiores Anatomici* quinque ex utraque parte, & unum impar constituunt, ex *Fallopio* in *Observationibus*: cuius sententia mihi præ cæteris probatur. Primum Os minimum oculi angulum, portionem zygomaticæ, atque partem rotundæ apophyseos constituit, quam *Hippocrates* *ὀφθαλμικόν* vocat, auctore *Galeno* in *excepsi*. Sed ab ipso *πύλον* dicitur. Secundum osiculum quod dicitur *Fungus*, in maiore canino consistit, vbi foramen est in palatum & nares peruium, excipitque carunculam lachrymalem. Tertium omnium maximum medietatem dentium comprehendit, & portionem inferioris orbitæ, latiusque nasi iuxta magnum angulum constituit. Quartum in imo palato continetur.

Est autem palatum pars oris superior connexa, fornicata, multis scabra asperitatibus. *Plinius* crenas appellat. Constat quatuor Ossibus duris & densis, cum ad aeris reverbationem, seu loci resonantiam, tum ne ab excrementis Cerebri continuò fluentibus breui putrescerent. Hæc in lue venerea sèpissimè perforantur magno vocis detrimento, quam confusè & obscurè reddunt. Huic vitio succurritur, si palati lacunam obturaueris argenteâ vel aureâ laminâ tenuissimâ, cui spongia hærebit, qua parte Cerebrum respicit: Nam spongia lacunæ indita statim humorum affluxu targebit, sicque lacunam implet, ut excidere lamina nequeat, sed ibi tanquam defixa hæreat. Primus *Amatus Lusitanus* excogitavit hanc curandi rationem, ut ipsemet testatur, *centuria 5. curat. 14.* quam ab eo reliqui desumpserunt, *Fallopius*, *Alexander Petronius*, & *Parvus*.

Quintum maxillæ os, nasum efformat tenue & solidum: *Fallopius* & *Columbus* os addunt (quod ab aratri forma *Vomerem* appellant) inter palatum & sphenoides interiectum, sphenoidis basi bifurcatum innititur, & ad nares intimas protensum eas septi modo diuidit. Istud sepimen *Arabes* *Os crystallinum* vocant, fortassis propter sublimitatis tenuitatem, Græci verò *Diaphragma*.

De numeris inventionem gloriatur *Fallopius*, cum tamen prius animaduersum fuerit ab *Hippocrate*, lib. 6. *Epid. sect. 1. pars. 4.* Quibus *Os à palato decidit, hinc medius nasus*

subsidet, quibus autem id unde dentes enascuntur, extremus nasus. Reliqui *Anatomici*, excepto *Valuerda*, Columbi discipulo, eiusmodi Os, ac si nullum esset, vel potius continuatio septimarium, silentio præterierunt, vel obiter explicarunt, cum ramen sit os separatum, quod per elixationem secedit, mirorque à *Spigelio* ignoratum fuisse, cum ramen ebullitione longa à reliquis ossibus separaretur. Ante *Falopium*, *Fernelius* vomerem obseruauerat, quem eleganter his verbis exprimit. *Parte inferiore alterum existit palati interstitium, quod mala propago quadam est, ut ipsa quoque mala geminum. Id à supera palati parte natum, cum innectitur pede firmissimo, sursumque sese erigens, donec natum interstitio occurrat, & committatur.* Vomerem autem geminum esse aliquis suspicari posset, quia basis eius bifurcata est, & sæpe inter duas tabulas inanis cavitatis concluditur, quæ Ossis duplicitem manifestè ostendit. Suis autem extremitatibus septum narium cartilaginolum excipit, velpotius intra geminas illas tabulas septum narium demittitur.

In margine maxillæ insculptæ sunt cavitates, alueoli, locelli, *præspina* dicuntur, in quibus deotes ordine dispositi reconduntur, quæ licet Ossa videantur, molles tamen & quodammodo cereæ sunt, nullumque certum numerum & formam seruant. Nam ex his quædam renascuntur, aliæ pereunt, & dente euulso nisi nouus succedat, ita constringitur, & occæcatur alueolus, ut ipsius nullum remaneat vestigium: Si verò in dentis depediti locum alter exoriatur, nouum sibi parat alueolum, ex *Falopio* in *Observationibus*. Hoc si verum sit, admirabile mihi videtur, quod refert *Parvus*, in dentis auulsi locum extemplo alium substitutum, velut actis radicibus alueolo adhæsisse. *Falopij* opinionem non probat *Coffius*, quia si mollem illam substantiam quæ maxillis infixæ erat, dentium posteriorum quibus erat continua, materiam esse verum est, ex eodem profectò alueo, in quo prior includebatur, emergete dentem quoque posteriorem oportet, qui in prioris locum subrogatur.

## COMMENTARIUS IN CAPVT

### quintum libri: De Dentibus.

#### CAPVT XI.



ETVS fuit inter *Anatomicos* controuersia de natura Dentium, puta, si Dentes Ossibus annumerari deberent. Sophistis ut credo, non deerant rationes, quibus suam opinionem confirmarent. Nonnullas in medium adducam, & dissoluam, ut discussis rationum tenebris, rei veritas magis innotescat.

*Prima ratio hac est:* Nullum Os ex Osse alio tanquam matrice nascitur. At Dentes ex *Hippocrate*, lib. de *Carnibus*, non generantur ex crassa seminis portione, verum ex pingui viscidâque maxillis præparata. Quippe si Dentes ossa essent, cum aliis Ossibus conformarentur, sed in pueris mense septimo à partu foras erumpunt, & interdum maturius, quorum nutrices lac habent calidius.

*Alterâ ratio est,* quod Ossa omnia à primo ortu vsque ad interitum corporis perseverant, maiorem in dies soliditatem adepta. Dentes contra orti statim decidunt, rursumque solidiores & duriores renascuntur. Est enim triplex dentium generatio ex *Hippocrate*, Vna in vtero ex semine, altera ex lacte, quæ fit mense septimo, Tertia anno septimo perficitur, cum iam puer solidioribus alimentis vescitur.

*Tertiâ ratio ab Ossium incremento petitur*, quod certis annorum spatij definitum est, sed dentes continuò crescunt vsque ad extremam vitæ periodum, proinde *Mabiolus* cap. 6. lib. 2. asserit, si glitibus seu muribus alpinis dentes eruantur, eos vna die renasci tantos. Narrat etiam *Scaliger exercit.* 271. in *Tandana insula* iuvenes sibi dentes secare ad radices vsque, hoc modo firmiores, atque densiores euadere, quemadmodum arbores decuminas, vberiùs crescere & crassescere videmus. Imo si credimus, *Auulsi mirabilium*, etiam mortuis dentes crescunt.

*Quarta ratio ab Ossium alimento desumpta est*, Ossa eo medullari succo quem continent aluntur: Dentes verò cum medulla careant, solo sanguine nutriuntur.

*Quinta* adduci potest à dentis substantia, quouis Osse duriore, & veluti lapidea, vnde *Philosopho* soli dentes ferri aciem respuunt, nec sculpi possunt, *lib. 3. de historia animalium, cap. 7.* Insuper corpora defunctorum condita in lapide Sarcophago, intra quadragessimū diem absumuntur, exceptis dentibus, qui etiam ignibus inuicti sunt, nec cremantur cum reliquo corpore: quinetiam incorrupti perennant, vt sint semina fructificaturi corporis in resurrectione, auctore *Tertulliano lib. de Resurrectione.* Ideo hominem priusquam genito dente cremari mos gentium non erat, inquit *Plinius, lib. 7. cap. 16.* veteres idcirco valde solliciti erant de sepultura dentium, ex quibus reliqua Ossa regenerari sperabant, vt colligitur ex *Martiale, lib. 8. de Picente.*

*Sexta ratio,* Dentium procreatio longè diuersa est ab Ossium generatione, siquidem Ossa formantur per indurationem cartilagineæ substantiæ, Dentes ex conuersione muconis in dentium substantiam, nullo interueniente medio. Idcirco dens non est os, sed peculiare corpus, osse durius, candidius & solidius.

*Septima Ratio.* Denique sensum ossibus natura denegauit, asseritque *Scaliger* sibi Ossa exemisse sine dolore. Curigitur dentibus, tam exquisitum sensum tribuit natura, vt etiam cum lingua de saporibus iudicent? *Galenus cap. 2. lib. 16. de vsu partium.*

*Octaua Ratio.* Accedit, quod dentes nonnullis affectibus tentantur, quibus reliqua Ossa non sunt obnoxia. Dentes phlegmone laborant, non aliter quàm carnosæ partes. At Ossa phlegmonem non patiuntur, auctore *Serapione.* His vel similibus rationibus quidam dentes ex Ossium censu excludunt.

*Galenus libro sexto de vsu partium,* Sophistas vocat, qui distinguunt, separantque dentes ab Ossibus. Cum enim ad nullum genus partium similiarium commodius, quàm ad ossa referri queant, prudenter enumeratione partium similiarium demonstrat dentes esse Ossa, sed in sua specie. Nam quoad materiæ qualitates, nimirum duritiem, soliditatem, læuorem & candorem cum aliis Ossibus conueniunt, in quibusdam tamen discrepant, quia soli inter Ossa exquisitè sentiunt, vt notauit *sub finem capituli.* Soli ad extremum vitæ tempus augentur & renascuntur, quinetiam nudi sunt, nullo periosio velati, ne mutua collisione & contritione dolor excitaretur. Quare sapienter *Aristoteles, libro primo de generatione animalium, cap. 4* scripsit dentes & ossa secundum genus, & materiam consentire, differre secundum speciem & nomen: nam ita dicitur ab *itu,* quod est comedo, Latinis dens, quasi edens: & *libro tertio de historia animalium,* Dentes Ossium naturam habere dicit, quamuis *lib. 1. eiusdem operis,* dicantur *idone inani.* Videtur breuius *Scaliger exercit. 291.* adductis rationibus satisfacere, *Dentes Ossa sunt in sua specie,* Ossium enim haud vnus modus intelligitur, sicuti neque carniū.

*Responsio prima.* Nunc superest, ne quid insolutum remaneat, contrarias rationes diluere, & expugnare.

Dentium, vt cæterorum Ossium prima generatio à semine ducitur, illorum incrementum, & eruptio extra gingiuas pendet ab alimento, quod maxilla suppetat.

*Resp. 1.* Certum autem est partes omnes simul delineari & conformari, quia natura nihil portionibus agit, sed non omnes simul absolui, quædā enim priores absoluntur propter maiorem earum necessitatem. Cæterum dentes lactentibus pueris non erant necessarii, cum solida alimenta non conficiant, nec adhuc voces expriment, quos si natura tribuisset lactenti puero, nutricis papillam suis dentibus vulnerasset, ipsamque nutricem ab eo humanitatis officio deterruisset, quæ doloris impatientia vbera sua præbere reformidasset. Quosdam tamen legimus apud *Plinium, libro septimo cap. 16.* dentatos in lucem prodiiisse, quod olim ominosum habebatur. *Linus lib. 41. sua historia* refert puellam Oximi natam cum dentibus. Infeminiis ea res inauspicati fuit exempli Regum temporibus. Cum ita nata esset *Valeria,* exitio ciuitati in quam delata esset futurum, responso aruspicum vaticinante *Suessam* Pamettam illa tempestate florentissimam deportata est, veridico exitu consequuto. *Plinius lib. 7. cap. 6.*

*Resp. 3.* Dentium mutatio in pueris accidit ex *Aristotele cap. vii. lib. 1. de gener. animalium,* ratione materiæ dentificæ, quæ progressu temporis solidior reddita, priores dentes excutit, nouosque solidiores, atque duriores substituit: quæ etiam ætate reliquorum Ossium portio dentibus æqualis, prima naturæ intentione reparatur. Præ-

terea

tereâ, cum incisorijs & canini dentes in ea ætate multum atterantur, & molares qui debent esse asperi læuigentur, necesse fuit illos propelli ab alijs, qui subtus iactis profundioribus radicibus prodeunt. Solus inter Anatomicos *Eustachius* negat hanc triplicem generationem, quia si Fœtus maxillam secueris, in vtraque incisores caninos, & tres molares secundum, tertium, & quartum reperies: partim mucosos, partim ossæos, quibus detractis tenuissima lamina nondum ossæa apparet, eaque remota, alij subitrati dentes in iisdem alueolis latentes occurrunt. Hæc autem dentium in vetulis generatio rara est, & iis qui consistentem ætatem adepti sunt: Non desunt tamen exempla, quibus id probetur, sed si noui dentes exoriantur, sunt perexigui, tenues & imbecilli, vt in prima ætate, quod testatur *Sauertius*. Porro dentes nati per totam vitam augentur, quia ex mutuo attritu plurimum attenuantur. Sed in ista accretione pristinus tantum status conseruatur, quandiu substantia quam attritione quotidie amittunt, alimento reparatur.

*Responsio quarta.* Non aluntur dentes medullâ, veluti magna Ossæa, sed sanguine; vt minima Ossæa.

*Responsio quinta.* Reliquis Ossibus duriores esse debuerunt, propter continuam, quam exerceat actionem. Quod verò de Sarcophago lapide obicitur, vix crediderim, quod si verum sit, id sit propter dentis substantiam durissimam & solidissimam, cuius beneficio indomiti sunt ignibus.

*Responsio sexta.* Scitæ iam supra satisfactum.

*Responsio septima.* Dentes quidem exquisitè sentiunt, sed num Ossibus leuis & obsecrus sensus inistit docti dubitant. *Galenus cum Hippocrate*, Ossæa quæ cruri iunguntur dolere testatur, & lib. 2. de morbis, *Hippocrates*, Os teredine dolere notauit, nisi enim sentirent, frustra per animam sentientem existerent, nec à plantis seiungerentur. *Galenus libro quarto de vjs partium*, scribit naturam visceribus tantum sensus tribuisse, quantum ad vitam conseruandam conueniebat, vt à plantis discernerentur, ciscntque animalis particulæ, cur non eodem naturæ beneficio Ossæa fruenter, vt fiant animantis partes?

*Responsio octaua.* Non solos dentes, verumetiâ Ossæa phlegmone affici probat *Largius*, lib. 1. epist. 42. auctoritate *Hippocratis*, *Galenî & Auicennæ*, & *Antonij Benincensii* cap. 79. abditorem, exem plo coxx.

Sunt igitur dentes Ossæa sui generis omnium durissima, vocis formenda, cibique comminandi instrumenta.

Consistant dentes duabus partibus, quæ foris eminet extra gingiuas. *Basis* appellatur, quæ verò in alueolis latitat, *Radix* nuncupatur. *Basis Syluæ, Vesaliæ, & Colombo* creditur epiphytis, quæ in pueris auulsa, relicta dentis radice promptè repullulat, alioquin si dentes radicibus eruantur, nunquam regenerantur: Ideo semper in pueris dentes per transversum fiangendi sunt, non filo trahendi, vt in alueolo radix remaneat. *Fallopins in Observationibus* negat dentes appendicibus donari. Erroris causam docet, quod circa septimum annum detracti dentes, imperfecti sine vllis radicibus appareant. Linea verò quæ dentis partem extra gingiuam prominentem cingit, ab oris alueoli, & gingiuarum adhæsiōe efformatur, eaque deorsum nullum diuisionis vclligium deprehenditur, inquit *Eustachius*. Huic opinioni suum calculum addidit *Vesalius*, in *Examine* *Observat. Fallopij*. Nec me mouet, quod vidit *Syluius*, cuidam quadragenario epiphytes à molaribus omnibus putredine quadam excidisse.

Infixi sunt dentes cauernulis, siue locellis in ambitu vtriusque maxillæ exaratis, tanquam clauus ligno impactus, per eam articuli speciem *gomphosim* dictam, quæ non ab soluitur absque medio, vt reliquæ species *synarthrosæ*, sed cum medio carne per *syssatcolim*, qua ratione inter *synarthrosim* & *symphytim* ambigua est, auctore *Galenæ*.

Dentes enim colligantur, suisque alueolis adhærescunt Interuentu carnis gingiuarum, sed cum ea non sit intrusa & inculcata alueolo, solamque partem prominentem dentis stricte complectatur, *syssarcoseus* verè nullum dari posse exemplum putant *Anatamici*. Idcirco volunt etiâ à neruis & membranulis ligamentosis dentes retineri & agglutinari. Itaque dentes superni pendent, inferni sedent, & per *gomphosim* infiguntur suis alueolis, carne gingiuarum, & ligamenti validissime firmati. Contra naturam est, si in palato prodeant, vt in nonnullis notarunt *Alexander Benediclus & Eustachius*, tum scalpello incidi, & candente ferro exuri debent: quibusdam

tamen animalibus, vt Scaropifci, naturaliter in palato enascuntur.

*Naturalis dentium compositio* in ambabus maxillis admirabilis est, vt singuli quamuis figura diuersi, quasi Lyre clauiculi extra gingiuas nudi promineant, eodemque ordine & simplici circulum collocati choream bellè imitentur, Superioribus & Inferioribus inuicem commissis, ita tamen, vt in morsu inferiores, non ad superiorum acutiem, sed elatius ad ipsorum corpora impellantur, vnde fit, vt alimenta à dentibus forficis instar abscondantur. Contra naturam est, si in duos ordines distribuuntur, vt in Timarcho Cyprio, & Drypetine, Laodice, Mithridatis filia, vel in ires, vt in Hercule Thebano, qui *Amazys* dicebatur, & in Phœbo *Columbi Anatamici* filio, quod falsum docet *Fallopins in Obseruat.* exempla plurima profert *Iulius Pollux lib. 2.* Quia interdum primoribus dentibus nondum excussis, alij strata sibi via per nouos alueolos etumpunt, videturque nouus dentium ordo exortus. Verumtamen in certis animalibus naturale est, plures dentium ordines habere, nam Mantiora bellua Indica, triplici dnetium serie prædita est, ex *Aristotele*, & *Moraxus* pisces triplici dentium ordine armatur: Obseruauit *Fallopins*, viperas in aquis dulcibus degentes in superiore maxilla duplicem dentium seriem habere, quas maxillæ inferioris vnicus ordo ingreditur.

*Ista dentium series quibusdam interuallis*, modò longioribus, modò breuioribus distinguitur, à quibus *Philosophus lib. 1. de historia animalium cap. 7. & 8. & 9. & 10. Problem. 48.* longioris & breuioris vitæ sumit indicia, quod eludit *Scaliger*, exemplo *Augusti* cædenti & longæui. Ex eiusmodi spatiis magna accedit vtilitas, ne scilicet vno dente, aut vi, aut vicio pereunte, aut etiam dolente, affectus alius communicetur: vel vt stridat confertis dentibus, vt accidit in phreneticis & conuulsis, liquida facilius in ventrem iniiciantur. In plurimis obseruatum est dentes continuari sine vllis spatiis, quibus Os erat continuum pro dente, vt *Prusia filia*, *Pyrrho Ep. rotarum Regi*, atque *Eucryptelmo Cypriarum Regi*, *Euripho Cyrenao*, *Pœta Phœcrati*, *Sicinio*, ex *Iulio Polluce lib. 2.* & virginis quam in aula Principis Ernesti Lunzburgeris vidit *Melanchthon*, & aliis quàm plurimis. Quidam Lujetiz, dum dentem euellit, simul & partem maxillæ, & vicinos dentes detrahit, hæmorrhagia sequitur periculosa: vocatus in ius Chirurgus liberatur, quia inuenti sunt dentes non infecti, sed omnino maxillæ continuari. Ex *Halleri Obseruat.* *Eustachius* nunquam videre potuit vnicum Os pro dentibus, tres quidem, aut quatuor molares non aliter quàm in pecudibus continuatos aliquando obseruauit. Sed subulofum non est quibusdam animantibus secundum naturam, Os esse continuum pro dentibus, vt Hyenæ, Testudini & Crocutæ.

*Numerus dentium varius est pro ratione ætatum*, in adultis qui annum septimum exceßerunt, *triginta duo* reperiuntur, quatuor incisores, Canini duo, Molares decem. Interdum 36. vt notauit *Galenus*, vel ad minus 28. At in his, qui nondum quartum ætatis annum attigerunt 30. tantum numerantur, quales sunt incisores 4. canini duo, & quatuor molares, tumque nutrices iactant pueros, suos omnes dentes habere, cum viginti obtinuerunt. Qui sit hoc, cum dentes omnes in gingiuis formati latent? auctore *Hippocrate*. An quia maxillæ vtriusque spatium angustius est, quàm possit fedecim comprehendere? Propterea reliqui dentes maxillæ superioris versus tempora reconduntur sub Osse iugali. Maxillæ verò inferioris dentes, vt puncta in suis alueolis delitescunt, nec erumpunt, nisi exacto quadriennio, quo nimium tempore maxillæ suum naturale incrementum sortiuntur, tumque descendunt molares malæ, vt aliis dentibus sese adiungant & associant, seruatò ad amissum ordine.

*Numerus dentium in adultis non semper æqualis reperitur*, longiores maxillæ octo molares continent, breuiores quatuor, interdum pro quatuor incisioribus supernis, vel infernis duo tantum adfunt, tam lati, vt quatuor æquare possint. Notauit *Hippocrates lib. 2. Epid.* eos longioris esse vitæ, qui plures dentes habent. Numerus iste dentium vtriusque maxillæ in tres ordines, seu differentias distribuitur, ratione triplicis officij in ciborum diuisione, vt patet ex hoc capite. Quidam molles cibos incidunt, alij duros effringunt, alij cibos omnes comminuunt & atterunt. Primores quaterni in anteriore maxillæ parte siti incisores dicuntur, quia sunt acuti, & cultri modo cibos secant.

*Incisores primi* erumpunt citius in maxilla superiore, quàm inferiore, eorum basis latior ad extremam vique aciem sensim extenuatur, foris gibba, intus sima: Radix quæ ad lateribus compressa, in extremo leuiter inflectitur.



His proximi sunt *Canini*, non tam à figura, quàm ab usu & duticie sic appellati. In homine duo sunt utrimque unus, in rapacibus animalibus, ut Lupis, Leonibus, Canibus multò plures; sed natura sciebat homini animali politico & mansueto, duos esse sufficere, præsertim cùm manus dederit, quibus cum malleo duriora quæque comminuere & secare potest. Quibus in dextra parte gemioi supernè *Caoini*, fortunæ blandimenta pollicentur: sicut in Agrippina Domitij Neronis matre, contra in læua: *Plinius lib. 7. cap. 16.* Canini maxillæ supernæ altissimas habent radices, quæ nervis per foramen oculi orbitæ infernæ prodeuntibus occurrunt. Vnde fit, ut altero ex iis deotibus avulso periculum nonnunquam immineat, ne parte aliqua offendantur oculi, propterea vulgo *Ocularij* dicuntur: magnum dum nascitur dolorem infantibus insugunt, ex *Hippocrate lib. 3. Aphor.* & si quando de fluxio à Cerebro in eam gingivæ partem infuderit, io quam implantantur, vel nato grandioribus totius genæ, & oculi dolorem pulsatorium non sine febre suscitatur. Ex *Cerebro Stephano in Anatome*, quod prius animadversum fuerat à *Celso, lib. 7. cap. 12.* Dens hærens cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco movetur. Idque etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora avulsæ concutere.

Caninis succedunt *Molares*, quod his cibis ut molis frumentum conteratur. Ampli basi & aspera & inæquali constant, *maxillæ* vocat *Ruffus*, quæ tandem attritione longa læsæ ligatur. In vnaquaque maxilla *Molares sunt decem*, quem numerum percipiunt intimi & extremi duo *Genuini*, Græcis *νευθίντι*, quod eo tempore quo moderantes temperantesque esse oportet, seu cùm sapere incipimus, oriuntur, auctore *Ruffo*: Vel, ut inquit *Melesius, lib. de natura hominis*, quia in ortu suo prudentiæ percipiendæ tempora pæris adducunt. Erumpunt auctore *Varrone* anno septimo/malè apud *Plinium* octuagesimo) consueta lege naturæ, quamvis decrepitis eruperint, vel ut placet *Aristoteli*, anno decimo, vel post usum Veneris. *Ariceannus* non ante trigessimum annum apparere scribit, & in maxilla potius superiore quàm inferiori. Hos dentes nullum animal mutat, nisi quid præter naturam contingat. Prodeunt interdum, inquit *Vesalius*, cum magnis cruciatibus: id quod Medici, parum observantes, aut alios dentes euellunt, aut humorum vitio eos infestari sibi persuadentes, ægros catapotiiis, atque id genus pharmacis obruunt, quum dolore affectis oculum leui gingivarum ad postremum dentem scarificatione, ac interdum Ossis pertusione præteritus remedium adferri possit. Negat *Aristoteles*, maxillares dentes renasci, quem sequutus est *Plinius*. Hoc falsum docet *Fallapius*, qui à se euulsos in puero renatos vidit. Quippe omnes maxillares dentes mutantur & renascuntur præter genuinos, qui si exciderint, nunquam regenerantur.

Cæterum dentes molares *quatuor* dicuntur, quod pluribus, quasi *quatuor*, id est, caninis, seu clavis, radicibus nempe suis in præsepia sua, siue loculamenta insigantur, quid autem propriè significet *quatuor*, explicat *Gesnerus in hystoria quadrupedum, capite de Cervo, in litera G.*

Scribit *Galenus*, dentes molares sopernis tribus radicibus constare, molares inferiores binis. Inde colligit *Ingrasias Galenum* credidisse nolos molares vnicam radicem habere, cùm tamen secundus superior molaris, & inferior sæpius vnica radice nitantur, in ultimo dentitionis tempore, sed inepta est coniectura, & consequentia. Nam præcepta traduntur de his quæ sæpe fiunt: atqui rariùs accidit, ut dentes molares vnicam radicem emittant.

Iniusse quoque reprehendit *Galenum*, quod cap. 8 lib. 11. de usu partium, parvis molaribus vnicam, maioribus duas infernas, quatuorque maximis dentibus inesse dixerit, nulla facta distinctione maxillæ, quod si verum esset, sequeretur molares superioris maxillæ pares obtinere radices, cùm tamen vna radice superent molares inferioris maxillæ. Sed *Galenus* discrimen illud non expresseit; quod alibi, *pateat lib. de ossibus* exposuisset. Porro quando *Galenus* scribit, præsertim duos omnium primos interiores, tres vel quatuor habere radices, numerare oportet ab extremitatibus maxillæ, non à dente Canino.

Dentium magnitudinem metiuntur Anatomici, radicum numero. Magnus appellant Dentes, qui pluribus radicibus abundant, *Parvos* qui paucioribus donantur. Neque ex radicis longitudine, vel breuitate dentis magnitudinem, vel paruitatem æstimare oportet, quia ferè longior radix breuiorem dentem edit, ait *Celsus, lib. 8.*

Dentes autem inferiores à superioribus radicem numero vincuntur, in vtraque maxilla incisores & Canini vnica radice constant. Sed molares maxillæ supernæ, quia penduli, tribus radicibus firmantur. Molares verò maxillæ infernæ, quia sensiles, duas tantum obtinent in directum suis alueolis infixas, quod si supernæ maxillæ dentes quaternas radices obtineant, similiter inferni dentes tres radices consequentur.

Porro *dentium Radices sunt simplices, vel duplices, aut triplices. Raræ sunt quadræminæ.* Earum aliz sunt rectæ, aliz incurvæ ad stabilitatem firmiorem: quæ si quando in euulsione dentis mediæ effringantur, intolerabiles afferunt cruciatus furculo ibi remanente, vel si vi euellantur, porcionem maxillæ secum eripiunt propter curuitatem.

Verùm ne moles ista dentium ponderosa esset, *radices excavatae sunt*, nec tantum ad leuitatem, sed etiam ad commodiorem dentium nutritionem, & vasorum penetrationem. Dentis enim cauitatem subeunt *nerui, vena, & arteria*, vnde & dentes cauari durorum contactu sanguine fluunt, arque dolorem in dente pulsatorium *Galenus* percepit. Obseruauit *Valerius* dente auulso ex arteria substrata vberim sanguinem fluxisse, vt rivulus è fonte manans videretur.

Dentium cauitatem intus oblinat tenuissima membrana ex vasorum confusione nata, si credimus *Vesalio*, fortassis à tenui meninge producit. Continua est palato, ventriculo atque adeo intestinis, vt satis indicant symptomata, quæ dentientibus, pueris superueniunt, ab *Hippocrate lib. 3. Aphor. 25.* descripta.

Cùm igitur dentes neruos & membranas habeant, *exquisitissimo sensu præditi sunt*, & dolore vexati acerbissimos cruciatus adferunt. Propterea dentis extractio sæuisissimis annumeratur tormentis, quo supplicij genere torquebantur olim Christiani, vt *sanctus Apollonia. & beatus Blasius*, quibus dentes vi detracti fuere. Vidit *Galenus* quosdam famulos, quibus ab iratis dominis dentes effracti fuerant, oborta inflammatione conuulsos petiisse. Quare miraculo reputo, vel dæmonis præstigio fieri arbitror, quod narrat *Nicolaus Monardes, cap. de sarzaparilla.* Quædam est regio in *Quito*, Prouincia noui Orbis, cuius incolæ edentuli sunt, quoniam in more habent, vt sibi dentes eximant, quos suis idolis offerunt, dicentes optima quæque eis offerri debere, hominem verò nihil præstantius, nihil magis necessarium dentibus habere. Vel falsa est hæc historia, aut eiusmodi populis laxa est, & mobilis dentium gomphosis, aut pueri dentes euelluntur.

Monet *Cælius Aurelianus, lib. 2. tardarum passionum cap. 4.* non esse à periculo remotum doloris tempore dentes auferre, & maximè integros, hoc est, qui non fuerint erosi, vel corrupti aut mobiles. Consensus etenim superiorum partium necessarius sequitur, & musculorum, & oculorum. *Hierophilus* denique & *Heracleides Tarentinus* mori quosdam detractione dentis memorauerunt. Nam *Erasistratus* plumbeum habuit, *odontaggon*, quod nos *Dentiducum* dicere poterimus, apud Delphum in Apollinis templo ostentationis causa propositum: quo demonstratur, oportere eos dentes auferri, qui sunt faciles, vel mobilitate laxati, vel quibus sufficiat plumbei ferramenti conamen ad summum. Itaque si corrosus fuerit, dens & mouetur, eximatur: si verò non corrosus est, neque mouetur, dolorem autem infert, per vulsionem resciccat, &c. *Hippocrates lib. de internis affect.*

Cæterùm hominum dentibus quoddam virus inest, nam speculi nitorem ex aduerso nudatè hebetant, ait *Plinius, lib. 17. cap. 37.* quod de iratis hominibus intelligendum, atque non semel vidi gangrenam ex morfu irati hominis, siue viri, siue mulieris obortam. Scripsit idem *Plinius*, morsum hominis venenatum esse aliis animalibus, vt nullum sit venenum, quod non in homine reperiatur. An dentibus humanis virus inest, & morsus hominis venenatus, inquit *Glandorpheus in specula Chirurgica.*

## COMMENTARIUS IN CAPVT SEXTVM

## De Ossibus maxilla inferioris.

## CAPVT XII.



X omni animalium genere humo inferiorem maxillam pro magnitudine corporis breuissimam adeptus est, quia facies illi data fuit rotunda non longa, vt cæteris animantibus, quæ prona pabulum assumunt. In homine & reliquis animantibus duobus constat Ossibus, in media maxilla per symphyum iunctis.

Cuius nota in pueris hæc biennium manifesta est, in adultis penitus aboletur, quia tam stricte agglutinantur duo maxillæ ossa, vt antiquæ diuisionis nullum vestigium remaneat, quod veteribus Anatomicis occasionem dedit dubitandi de illa sectione maxillæ inferioris, teste Galeno, libro undecimo de vsu partium, cap. 9. quippe fatetur in Ifagoge, maxillam inferiorem, quorundam opinione, duobus ossibus in mento per harmoniam vnitis constare: aliorum iudicio vnicum Os esse. Vt hoc dubium eximeret, lib. 1. Epitom. Anat. ex Marino, non vulgari diligentia discruit, num ex vno vel pluribus Ossibus constructa esset maxilla inferior, vt ipse testatur, lib. 4. de libris propriis, quod sibi se fecisse apertè tradit, lib. 11. de vsu part.

Non est igitur noua hæc dissensio, sed vetus, quam Hippocratis, summi Dictatoris iudicio de finire oportet. Ille lib. de locis in homine, maxillatum coniunctionem, mirandum, in medio mento fieri scribit, & part. 36. sect. 1. de Articulis, maxillam inferiorem duobus Ossibus in mento iunctis constructam tradit, eamque iuncturam interdum dissolui, in Comment. confirmauit Galenus: quod etiam à nostris Chirurgis obseruatum fuit: Nempè maxillam saxo illisam sæpius ea parte discindi, quæ inuicem ossa coharebant. De maxilla inferiore, dixit Hippocrates, part. 19. lib. 2. de fracturis, lib. 4. de iunctoribus: et vnde illud significat, quod non scripsisset, nisi Os duplex esse credidisset. Quo sensu, scripsit Aristoteles, libro primo de historia animalium, in nazibus duo ossa in medio mento, à se iuncta sunt. At verò verum dicitur, in animæ descriptione.

Ceterum, maxilla utrimque bicornis, duabus apophysibus terminatur, quarum altera utrinque dicta, tendonem musculi temporalis excipit. Altera oblonga, vntum cavitati temporum articulatur. Inde Columbus occasione arripit reprehendendi Galenum, quod lib. de Ossibus, articulationem maxillæ fieri deat sub mammillari processu, cum ab eo longissimè distet. Eodem telo Galenum pungit Ingrassias, idque verum esse in similibus alluciat, quæ mammillarem processum zygomati proximum habent. Sylvius respondet cavitatem illam sitam esse in Osse temporali sub meatu auditorio, ante apophysim mastoideam, vnde hoc loco Atticè significare videtur, vt Larinè sub horam tertiam, id est ante, vel infra denotabit.

Tota verò maxilla etiam durissima, vt validissimos motus in mandendo & mordendo sustineat, est tamen excavata & medullosa sine vlla epiphyse: Rationem reddit Galenus in præmio huius libri, & lib. 11. de vsu part. cap. 18. quia partes maxillæ ita sunt connatæ, vt vna sit operculum alterius. Accedit altera ratio, quod epiphyseon vsus primarius sit ad geuerationem ligamentorum, quibus musculorum origo firmetur. Cum autem ab extremis maxillæ partibus nulli musculi oriantur, frustra illic apposita fuisset apophysis. Quippe cum extremitates sint durissimæ, & ab omni fractura securæ, nulla erit appendicis necessitas.

Notatione dignum est, quod referunt Enstachius, lib. de dentibus, cap. 28. & Columbus lib. 15. Romæ adulti hominis caluariam repertam fuisse, cuius maxilla inferior omni penitus articulo & motu earebat. In ea inferni & superni dentes sese contingebant. Valcherus Cæter in Obseruat. Anatom. testatur se Monspeßili vidisse caluariam, cui connata erat maxilla inferior.

Maxillam inferiorem bisulcari esse, binis Ossibus in mento per symphyum iunctis constare scribit Galenus, Contradicunt recentiores Anatomici, vnum simplexque os esse sustinentes, quia diuisionis nulla nota conspicitur, nec longa ebullitione in duo

Ossa dirimuntur. Nemo tamen potest inficari in pueris ex duobus Ossibus compactam esse. Querendum superest, an Ossa duo simul cubarent, ut fiat vnum, & quo tempore coactis abluatur. *Galenus* admittit maxillam infernam in adultis, Os vnum sensibus apparere, quia extremæ illius partes circa mentum per symphysem absque medio coalescerunt, ut docet *Præfatione huius libri*, sed Ossa per symphysem unita, longa ebullitione dissoluiqueunt, propterea scribis Os genæ infernæ non esse simplex, ut qui'piam putauerit, quod adiecit, ut quorundam obiectioni occurreret, quia maxilla præsertim in puerulis, longa coctione dissolvitur in mento, ob idque ipsam ex duobus Ossibus coaliisse manifestè apparet. *Galenus* opinionem pluribus argumentis demonstrare & corroborare licet. Debet esse duplex Os in maxilla inferiore, ut corpus esset geminum: commissuræ fidem aliquam facit eminentia circa mentum insignis, deinde medullosa cavitas, quæ non est ab vno extremo ad alterum continuata, sed in medio, & sæpius ante medium intercepta. Adde quod limæ si genæ eminentia interior abradatur, mox apparet veluti cuiusdam lineæ rudimentum, idque in medio, quod naturalem quandam diuisionem ostendit.

Præterea, si genam è terra ossillam, & iusto tempore putrefactam frangere manibus volueris, in medio dehiscet & frangetur. Ad hæc cum in feris ferè omnibus bisos sit maxilla, cut in homine eadem diuisionis ratio non recipitur? Quia verò genam infernam ad mandendum etiam recens nati firmam requirunt, idcirco post annum clapsum tanquam vnica esset, striâ è conglutinantur, ita ut nullum aut leue tamenat pristinæ diuisionis vestigium.

Quod si aduerarij dicant *Galenum* delusum fuisse à simiis, in quibus conspicua est duplicis Ossis in mento commissura, quod tamen falsum est, sed in homine vnico Osse constare, ut validissimos & continuos motus in mandendo & loquendo sustineat: Opponant canes, qui duriora, quàm homines mandunt, Ossa dentibus atuentes, & tamen maxillam habent duobus Ossibus extructam. Totam hanc controuersiam *Galenus* locus insignis componet, lib. 4. *admirat.* *Anatomic. cap. 4. Hippocrates,* inquit, maxillam inferiorem duobus Ossibus in mento unitis consistere dixit, quod fecerunt alij omnes, qui accuratè Ossium naturam explicauerunt, non tamen in simiis omnibus manifestè poteris ostendere maxillam commissuram, verùm in canibus euidenter sensus apparet.

Porro in hac maxilla quædam partes notandæ sunt ad musculorum doctrinam valde necessariæ. Inferior ambitus maxillæ dicitur *Basis*, cuius media pars *Mentum* est, intus & foris tubere quodam exasperatum, ad commodiorem musculorum insertionem, & adhæsiōnem. Extremitates basis *Anguli* dicuntur. Ab his latera sursum exprorecta in duas apophyses desinunt, quarum vna acuminata *Cornu* nominatur, sub zygomate recondita musculus temporalis tendinem excipiens. Altera oblonga & capitulata *Condylodus* vocatur. cavitati Ossis petrosi inarticulata: iuerim cum sic excreuit hæc maxilla, prope angulos foramina habet, per quæ neri, venæ & arteriæ in maxillam traducuntur dentibus distribuendæ, quarum portio per externa foramina prope mentum cœmpit in musculos labij inferioris expansa.

### De Osse Hyoide.

OS Hyoides *Galenus* omisit in sua *Osteologia*, uti fecit etiam *Columbus*, quoniam in sceletonon apparet, nec cum aliis articulatur. Commodè tamen ad Ossa Capitis referetur, quandoquidem in faucibus sub maxilla inferiore latitat, suisque cornubus ad apophyses styloides appendum est.

Dicitur hyoides à figura literæ Græcæ, *υ*. eamque formam obtinuit, ut spiritibus & alimentis liberum daret transitum & comitatum, ab aliis *Pharyngæon*, & *Os Gutturis*, *Herophilus* *Os mentis* appellat, quod Lingux & laryngi affideat, Ex *Ruffo Epheso* lib. 1. cap. 24. Est enim firmamentum musculorum Lingux & laryngis, & huic Os tanquam fundamento Lingua innititur.

Quamuis autem pro vnico Osse computetur, non est tamen simplex, sed ex pluribus Ossibus constructum, quorum minimus numerus trium est, maximus vnde eim, vt plurimum in adultis ex septem officulis exurgit & coalescit, opinione quorundam *Anatomicorum*. At sæpiissime Os hyoides partibus quinque contextum inueni, interdum septem officula notauimus, quorum medium latiusculum *Basis* dicitur, foris gibbum, intus cauum. Basis cavitatis versus thyroideam conuersa multo adipe obrita, ex-

capit epiglottidem. Basis verd latus supernum linguam admittit, & vice fundamenti sustinet. Cavitare hyoidis sola epiglottis excipitur. Ex basi utrimque duæ epiphyses prodeunt, *Cornua* vocant *Anatomici*. Breuior & inferior vnico Osse structa in apophyses supernas rhyoidis cartilaginis inseritur, altera longior & superior simplex interterdum, duobus ossiculis inuicem colligatis constata, ad styloidem apophysim ascendit.

Quod si desint istæ appendices, vt accidit potissimum in mulieribus, earum vicem gerunt *Ligamenta*. Notat *Fallopianus* longiorem appendicem Ossis hyoidis vnico Osse constare, nec styloidem apophysim attingere, sed illi per ligamentum neruicem adhærere, quod verum est.

Interea notabis falsum esse, quod scribit *Aristoteles*, libro tertio de historia animalium. Osse cum ab vno debeant omnia, tum inter se sunt continuata, quemadmodum venæ, segregarum Os nullum inuenies: & lib. 2. de partibus animalium, nullum Os seorsim per se habetur, sed aut pars est continui, aut tangit, & annectitur, vt natura tanquam vno continuatoque Osse, & tanquam duobus distinctisque ad flexum vtatur. Nam Os hyoides est omnino sepatatum ab aliis, & solum per carnes musculosas, & ligamenta Ossibus adhærescit.

## COMMENTARIVS IN CAPVT SEPTIMUM,

### De Rachis.

#### CAPVT XIII.

**G**ALENVS absoluta prima parte sceleti, ad secundam progreditur; quæ *Truncus* appellatur ab *Anatomicis recentioribus*. Quo nomine intelligunt quidquid dempris artubus, & auulso capite remanet. Vulgo *diuiditur* in partem anteriorem, scilicet *Thoracem*, & partem posteriorem, siue *pyxis*: *Galenus* truncum corporis intellexit nomine *Rachis*, quia basis & fundamentum aliorum Ossium existit, arque respondet carinæ nauis, vt a libi docet.

Rachim autem longius porrigit *Galenus*, quàm fecit *Hippocrates*. Nam ille lib. 3. de articulis, vt animaduertit *Galenus*, *Comment. ad part. 1. & 4. libri citati*, nomine *pyxis* dumtaxat, comprehendit Os Sacrum, lumbos, & dorsum, reiecta ceruice. Apud *Aristotelem*, libro primo de historia animalium, pectoris pars posterior dorsum appellatur, dorſi partes scapulæ duæ, & *pyxis*. ergo spina pars dorſi. *Galenus* verd *pyxis* metitur ab occipite vsque ad coccygem, itaut spina definiri queat *fistula Ossea*, *spinalis medulla vasculum*, siue *conceptaculum*, ab occipite vsque ad coccygem exportellâ. *pyxis* autem dicitur, quasi *πῆξ* *αἰ* *τῆς*, vel *πῆξ*, quasi *πῆξις*, ex *Meleto*, & *Erymo*, vico magno *Græco*.

Figura spinæ admirabiliter expressa fuit ab *Hippocrate*, libro tertio de articulis, à particula 41. vsque ad particulam 46. quæ diligenter notanda, ne in *videtur* & *visum* spinæ diuidenda decipiamur: est enim *pyxis* *dumtaxat*, recta & incurua, in posteriorem & anteriorem partem inclinans: Nam ab Osse sacro vsque ad lumbos, est *incurua*, inde ad septum transversum *curuatur*, ex rectitudine protuberans, ab ea parte vsque ad summam humeri partem est *directa*. Ipsa ceruicem commissa in anteriorem partem repanda, *directa* est.

Rachis autem omnium Ossium sedes & origo creditur, primaque in vtero conformatur, ex *Aristotele*. Hanc enim scitè veteres carinæ in nauigio primum iactæ compararunt, cui ceu fundamento costæ, tanquam curuatæ trabes inuicem cohærent: Cuius ope totius corporis moles stat, & erigitur, quoties spina secundum rectitudinem curvibus accommodatur.

Ex pluribus Ossibus orbiculatis coagmentatur (quæ *vertebræ* *Græcis* dicuntur, *Latinitis Vertebra*, à perenni motu & conuersione dictæ) ad motuum varietatem, vt in omnem partem flexi & torqueri posset. Nam si vnico continuoque Osse constructa fuisset, rigida & immobilis permanisset. Nec tutum erat spinam ex tribus vel quat

tuor Offibus componere. ne vno luxato, medullæ compressio angularis sæpe functa contingeret. Est enim apud Hippocratem, vnius vertebræ luxatio periculiosior quàm plurium. Multas igitur vertebrae Natura condidit ad securitatem, numero viginti quatuor. Hunc numerum designauit Hippocrates, lib. de locis in homine, & lib. de Offium natura. Galenus tam opinionem sequutus est, lib. de Offibus, cum tamen ibidem, Os Sacrum spinæ vertebrae adscribat, quod in senas vertebrae dirimit. Propterea Fernellius, aliique Anatomei triginta vertebrae constituunt, Os Sacrum inter vertebrae referentes, quod longa ebullitione in oleo feruente, in quinque vel sex partes secatur. Sed Hippocrates & Galenus Os Sacrum vertebrae non accensent, quia vnicum & continuum est, vertebraeque planè dissimile.

Vertebrarum series, siue continuïtas in quatuor partes distribuitur, Cervicem, dorsum, & lumbos, quibus fundamenti vicē subiicitur Os Sacrum: Sensim latefeit & amplificatur, itaut succedens sit antecedente amplior ac robustior, siquidem id quod gestatur, minus esse oportet, eo quod gestat. Sed in ista vertebrarum amplificatione gradatim facta, inferiores vertebrae eandem seruant foraminis capacitatem, quam habent superiores, vt contendit Fallopius in Obseruat. Licet enim medulla in propagandis nervis exhausta, sensim immuatur, implent tamen supernas cauitates membranae crassiores, non tantum ad firmiorem Ossium colligationem, verumetiam ne in vehementioribus ceruicis agitationibus spinalis medulla collideretur. Nec totamen primæ vertebræ cæteris amplius est, quia dentis ingressu minuitur, & aliis adæquatur. Hoc significasse videtur Hippocrates, lib. de Offium natura: Vertebræ interna parte inter se sunt æquales. Ac proinde falsa est Galeni doctrina, cum scribit, quod magis spinæ medulla in gignendis nervis absumitur & attenuatur, eò inferiora vertebrarum foramina minus & coarctari.

Dignum est consideratione, quod animaduertit Ingrassias, hanc foraminum æqualitatem in quibusdam vertebrae perturbari, vt in 5. 6. & 7. ceruicis, 1. 2. thoracis. Ibi enim ampliora sunt foramina, vt crassior existens medulla spinalis, generationi magnorum nervorum sufficiat, qui inde expromuntur manum irrigatori. Maior etiam capacitatis obseruatur in 3. 4. & 5. lumborum vertebrae, eodem fine & instituto facta, ne in productione magnorum nervorum qui in pedem feruntur, medulla spinalis exhauriatur. Hoc notandum adhuc occurrit, quod vbi vertebrarum capacitatis amplior fuerit, ibidem foramina lateraliora esse.

Cæterum obseruanda sunt quædam vertebrae communia, ac primùm quod quilibet vertebra suum habet corpus parte interna situm, reliquo Osse crassius, & eò fungosius, quò grandius. Plurimis etiam foraminibus patet, quæ vasa nutrimentum deferentia excipiunt: in basi corporum appendices obseruandæ sunt, quas Fallopius, ligamentum cartilagineum induratum esse putat. Sed cum reliquæ appendices in iuuenibus cartilagineæ sint, postea verò indurentur, cur nomen appendicis illis denegabitur? Secundo, in singulis vertebrae tres apophyseæ differentie notari debent, Obliqua, Transuersa, & Acuta. Obliquæ quatuor sunt, duæ accliuæ seu superne, totidem decliuæ, seu inferne. Transuersæ duæ sunt, vnica acuta posteriorem partem occupans, cuius extremitati adhæret cartilago, quæ violentiis ictibus obstitit. Post eandem, spondylus cum altero articulatus foramen lateraliter ad egressum nervi efformat.

Quisnam spondylus ad foramina efformanda magis tribuit? Vterque, inquit Galenus, in collo meatui æqualiter confert, in cæteris spondylis superior, aut magna ex parte, aut omnino meatui absoluit. Contrà sentiunt alij Anatomei, quia enim colli vertebra inferior magis in ea est, dorli vertebrae æqualiter confert. At in lumborum vertebrae totus sinus in superiore vertebra excavaus est.


Colligantur inuicem vertebra per corpora, interuentu ligamenti cartilaginei ab ea membrana, quæ geminas spinalis medullæ tunicas ambit, producti: quod quidem diffidentibus & confidentibus vertebrae cedit.

Articulantur per apophyses obliquas, quæ ideo Articularia dicuntur Sylui. Articulus iste vertebrarum est syndymus composuit, ex Hippocrate & Galeno, lib. 3. de art. part. 34. & hoc libro de Offibus. Attamen ipsemet Galenus, lib. 12. de usu partium, cap. 16. notat vertebrae parte anteriore per harmoniam iunctas esse, parte posteriore articulis non paruis diuisas esse. Vertebrarum corporibus interiectum est mucosum & nervosum ligamentum, à cartilaginibus enatum, quod penetrat vsque ad medullam: lege Hippocratem & Galenum, lib. de art. part. 30.

Porro, non levis occurrit difficultas apud Hippocratem de vertebra magna, quam modò in lumbis, ut textu 41. sect. 3. de artic. modò in collo constituit, ut textu 44. eiusdem sectionis. Galenus Comment. ad part. 2. sectio. u. eiusdem, pro magna vertebra cervicis secundam accipit, quam Hippocrates interdum Dentem appellavit. Sed qui diligenter initium libri de Ossium natura legerit, ubi spinæ figuram delineat, cognoscet Hippocratem per magnam vertebra inferioris spinæ, intelligere ultimam lumborum, quam ab Osse Sacro distinguit; & per magnam vertebra cervicis, ultimam colli designare. Ut quinta lumborum est omnium vertebrarum amplissima, ita septima cervicis reliquis amplior existit. Deinde Hippocrates, non tantum ad magnitudinem, verum etiam ad usum respexit, utraque suæ partis vertebra sustinet. Ex Pollace vertebra magna, ad Os Sacrum refertur.

# COMMENTARIUS IN CAPUT. octavum, De Spondylis Colli.

## CAPUT XIV.

ALENVS hoc capite multa de articulatione & coniunctione Spondylorum Colli rectè & subtiliter edisserit. Imprimis docet primæ & secundæ cervicis vertebra articulationes ab aliis prorsus differre, eas quippe laxas nullis ligamentis, seu mediis interiectis constructas esse, ac proinde mobiles. Vocat illas articulationes diarthroses per Enarthrosim tactas, inter primam & occipitis coronas: At verò per arthrodiam, inter primam & secundam vertebra. Cæteræ vertebra per synarthrosim articulatæ sunt ratione motus obscuri, quamvis forma coniunctionis sit gynglymos tribus vertebra compositus. Quinetiam vertebrarum corpora forti ligamento inter se reuincta sunt, quod quidem enatum ab ea membrana, quæ geminas dorsalis medullæ membranas ambit, inter duarum vertebrarum corpora sese insinuat, officium vinculi præbens. Negat igitur Galenus, duabus vertebra cartilagineam interiectam esse. Cùm tamen scripserit Hippocrates, lib. 3. de articulis, part. 30. vertebra inter se colligari mucoso ac nervoso ligamento, quod à cartilagine orsum, usque ad spinalem medullam progreditur. Responde ligamentum istud medium non esse purè cartilagineum, sed mixtum, neurocartilagineum. Galenus in Commentario ad eum locum lib. 3. de articulis, fatetur innatum esse vertebra mucosum ac glutinosum ligamentum pituitæ plenum, ut vertebra promptius moueantur, ipsumque vinculum minis lædatur: atque etiam spinalem medullæ membranam durissimam esse & crassissimam, ne Ossium duritiæ & contactu, in motu spinæ offenderetur spinalis medulla.

## De Motu Capitis.

**G**ALENVS posito fundamento, quod duæ primæ vertebra sint mobiles, alio modo quàm reliquæ articulatæ: Id factum fuisse à natura docet propter motum capitis. Motus autem capitis duplex est, unus Rectus, qui fit annuendo & renuendo: Alter obliquus, caput ad latera circumagendo. Priorem spondyli secundi apophyses pyrenoides dirigit. Alterum primi spondyli cum occipitis coronis diarthrosis. Aduersus Galenum omnes Anatomici insurgunt, inter quos significet Vesalius, cui cæteri committunt & suffragantur. Rectum motum super prima vertebra edi volunt. Obliquum verò perfici primam vertebra supra secundam motà, & circa dentem pyrenoidem, velut ad axem circumductà. Quod demonstrant ex articulatione primæ vertebra cum secunda, quæ ab aliis diuersa est. Nam nisi prima vertebra supra secundam vcrtilis esset, natura apophyses obliquas & supermas secundæ vertebra magnas & latas non efformasset, sed paruas & angustas, ut in reliquis vertebra. Quorum dens pyrenoides eminet, nisi ut rotæ axem referat, circa quem motus obliquus perficitur: quippe non attingit occiput, ab eoque distat digiti intervallo, ideoque caput sustentare nequit. Denique tam possibile est caput supra primam vertebra



immo tam circumagi, quàm circum duobus distantibus locis asseri infixum circumduci sine loci mutatione. At si in obliuatione capitis coram sua dimoueretur sede, caput luxationibus valde foret obnoxium, nec ad illud retinendum tria ligamenta sufficerent. Accedit, quod *Ambrosius Intruductory*, siue *Galenus*, aut *Hierophilus*, eorum opinioni fauet, dum scribit capitis coronas finibus primæ vertebræ iungi, & circa processum secundi spondyli velut super axem caput in latera moueri.

Quod etiam confirmari potest ex antiquis duarum primarum vertebrarum appellationibus. Nam prima ab illis *Encephalus*, secunda *Ala* dicta fuit. ex *Ruffo Ephesia lib. 3. cap. 2.* Prima colli vertebra capiti motum habet, reliquæ sunt immobiles, similiter *Iulio Polluci, lib. 2.* vertebrarum prima, quæ cum collo vertitur, *Encephalus*, *Hippocrates* verò eandem, etiam *Dentem* nominare videtur. Vertebrarum secunda immobilis existens *Ala* dicitur: Ex hoc capite cognosces non intellexisse *Pollicem*, quam vertebram *Hippocrates, Ala* vocari, non est prima, sed secunda.

*Galenus* præiudicat dissensiones *Anatomicorum* exorturas super motu capitis: doctis tantum scribere voluit, quia suam doctrinam de motu & articulatione capitis, tam certam & firmam esse confidit, ut eam nemo sanæ mentis oppugnare possit, vel ausit. Itaque ab illis inuulsi ac temerè damnatum fuisse *Galenum*, ex mente ipsius male intellecta facile est ostendere.

Nam id ipsum quod contendunt, *Galenus* apertè variis in locis proposuit. Illius fuit institutum demonstrare omnes capitis motiones fieri per articulum capitis cum prima, & secunda vertebra. Nam cum secunda caput rectos habet motus, quorum dux est ipsius cum capite articulus: ita ut prima vertebra cum apophysi pyrenoidæ non tantum caput sustineat ad annuendum & renuendum, sed etiam subleuata ac depressa moueatur. Similiter in obliquo motu capitis existimauit *Galenus*, caput non tantum supra primam vertebram in vtrumque latus conuerti, ac si illa profusus quiesceret. Voluit enim primi articuli beneficio caput cum prima vertebra ad latera moueri, obliquumque motum maximè fieri per vtriusque lateris partes obliquas, cum primi spondyli, tum ipsius capitis, ut habetur in textu.

Id rationibus ex *Galeno* petitis, facile demonstrabitur, quia capitis articulus, neque simplex est, neque cum vno tantum Osse fit, sed cum duobus. Idcirco ipsius quoque motus necessariò est multiplex. Cum autem in generatione sit duplex, *Rectus & Obliquus*, repugnetque securitati capitis ex duobus obliquis, atque simplicibus vnum rectum, ut in manibus & carpis efficere: propterea obliquum à recto multum distare Natura voluit, & ex duobus articulis diuersis, cuiusmodi sunt vlnæ, & radij in cubito, vtriusque obiri. Ergo si in cubito radius circumuertitur, & vlna extenditur, atque flectitur: cur non primam vertebram cum ipso capite obliquè moueri? Secundam verò recto motu agi non affirmabimus? Accedit, quod *Galenus* duas primas vertebrae liberè moueri scripsit: ideoque ligamento intermedio, planè solutas esse, ut in textu annotatum est. Hinc fit, ut connexio secundæ cum capite, inquit *Galenus*, à prima quamuis interiecta sit, nihil quidquam habeat negotij, neque item primæ à secunda aliquid impedimenti, vel moræ inferatur. Quod profectò accideret, si cæterarum vertebrarum modo anteriore parte inter se colligatæ essent.

Deinde motus iste secundæ vertebræ probatur adhuc à *Galeno*, quando magnam vertebram idcirco ab *Hippocrate* appellari suspicatur; quia magis potest in priora virgeri, atque inde rursus magis repelli: propterea in vehementioribus capitis motibus luxari potest, id est, dens pyrenoides extra septum primæ vertebræ exire, quod anginam lethalem infert, ex *Hippocrate lib. 2. Epid.*

Sed non oportet ita accipere rectos capitis motus à secunda vertebra fieri, ut prima quæ interiecta est antè & retrò non moueatur. *Galenus* enim fatetur rectos motus duos, potissimum secundæ commissos fuisse, non tamen negat duas primas vertebrae cum ipso capite, tum inter se moueri, primamque vertebram postica apophysi spinæ ideo destitutam esse, ne dum caput renuendo secundam tangit, & cum ea strigitur, muscoli ibi existentes, velut ab aculeo contundantur, atque vulnerentur. Si rectum capitis motum secunda vertebra obit, sequitur obliquum ex *Galeno* à prima vertebra necessariò fieri.

Sed obliqui motus duæ sunt differentię. Vnus est *Transuersalis*, quando caput ad latera supra humeros incuruat: Alter verò *Obliquus*, cum versus humeros ducitur,

quem motum faciliè intelliges, si transversam lineam ducas & protrahas ab humero vno ad alterum, quam directè secabit altera, antè & retrò per frontem & occiput traducta: si inter hæc duastertiam ducas, obliqua erit, & motum capitis obliquum designabit: qui *ad* ducitur à *Galen*o, medius inter rectum & transversum. Quos motus obliquos intelligere videtur *Galenus*, quando scribit paruos musculos, qui antè & retrò positi sunt, & quosdam alios, caput cum parua inclinatione ad latera mouere. Vbi autem hæc obliqua flexio, aut extensio efficitur, id est, transversalis motus, tum altera capitis coronæ cum subiecta cavitatē stringi, alteram oppositam dehiscere & subleuari: sed in obliquo motu prima vertebra non manet immota. Nam simul cum capite circa pyrenoidem velut ad axem circumagitur, præsertim in maiore capitis obliuatione, quod manifestè docuit *Galenus*, dum ait Naturam prouidam ex infernis partibus, aut ex transversis apophysibus primæ vertebæ nullum neruum emittere, ne in vehementioribus motibus, in quibus eadem vertebra positionem plurimum variat, neruus contunderetur, vel diuelleretur. Adde quod musculos obliquos capiti adscribit. At maior obliquus à spina primæ vertebæ enatus in apophysim transversam primæ inferitur, vt eam obliquè ducat ex *Galen*o.

Nec tantum obliquus motus paruus super prima vertebra editur, verum etiam magnus, quando in alterum latus supra humeros caput rectum, sine vlla inclinatione contorquetur. Nam motus ille à ceruice proficisci non potest, cum ipsæ vertebæ per strictum gynglymum inter se coniunctæ sint, & corpora imbricim enaginata. Quippe ceruicis motus obliquus cum inclinatione capitis, dum mentum tangi humeros, dependet ab articulatione septimæ vertebæ cum prima dorsii. *Syluius de pulsione* 4. *alumnarum Vesalii*, opinionem *Galen*i tuetur, quam musculorum capitis insertionem confirmat, atque *Vesalius* deceptum fuisse asserit, ex male intellecta significatione verbi *obliquus*, quod passim apud *Galenum* accipitur pro leui capitis obliuatione, sed tandem fatetur istas articulationes certis motibus non esse addictas, in agendo sibi mutuam præstare operam.

Si cui non probetur hæc opinio *Galen*i de motu capitis bis expressa, *lib. de Ossibus*, & *lib. 12. de vsu part.* vbi copiosè demonstratur, licebit cum eodem *Galen*o, alteram opinionem de motu capitis sequi. Nam ille *lib. 4. administ.* *Anatomic.* testatur rectum capitis motum super prima vertebra fieri, per articulationem capitis cum prima vertebra, quæ postrema fuit *Galen*i super motu capitis cogitatio. Composuit enim *libris administ.* *Anatomic.* longè post editionem librorum *de vsu part.* Quare cum *Galen*o statuo diarthrosi coronæ capitis cum prima vertebra, motum tam rectum, quam obliquum perfici, quem impedire non potest cavitatis & coronæ obliquitas, quandoquidem motiones capitis, quæ immota ceruice fiunt, breuissimæ sunt, auctore *Galen*o. Neque repugnabit axioma *Galen*i, motus diuersos neutiquam ab vno & eodem articulo perfici, neque valet exemplum de articulatione cubiti adductum. Nam in cubito, qui constat duobus Ossibus ad diuersas actiones destinatis, necessaria fuit duplex, & diuersa articulatio, nempe gynglymos, & arthrodia. At iam demonstratum est in articulis, ab arthrodia & enarthrosi diuersos motus perfici, gynglymon solam flexionem & extensionem pati. Cum igitur articulatio primæ vertebæ cum occipitis coronæ sit Arthrodia Diarthrosis, cur caput super prima vertebra immobili rectè & obliquè non mouebitur? Scripsit *Galenus*, eminentiam cum in cavitatē vertitur, solos motus obliquos ad latera effigere, quod verò fit ex duobus obliquis, si positi simul fuerint rectum motum esse. Id etiam confirmat, *lib. 12. de vsu partum*, agens de articulatione capitis, querit quando præstat ex duobus obliquis motibus rectum vnum compositum efficere? Cum obliqui à rectis parum differunt. Quando verò non est melius? Cum partem longius oportet in vtrumque latus abducere. At obliquo capitis leuius est, & ferè insensibilis, parumque à motu recto differt: circumductio illa capitis ad humerum à ceruice sola dependet.

Itaque sic apud me statuo, *Rectus & Obliquus motus capitis* ab vno & eodem articulo perfici, in istis motibus immobilem manere primam vertebra, aut leuiter moueri, tam in recto, quam obliquo motu. Quæ quatuor locis secundæ vertebæ affirmatur, parte inferiore per apophyses obliquas, parte anteriore denti exactè colligatur ope transversæ ligamenti, ita vt non possit antrosum, neque retrorsum flexi: parte postica tuberculo quodam firmatur in locum spinæ addito, quod sinulum subiectæ spinæ ingreditur.

## Reliqui Capitis explicatio.

**G**alenus duo tantum ligamenta dentis pyrenoidis enumerat. Cum tamen alibi, *lib. 11. de usu partium cap. 40.* Caput primis duabus vertebrae per tria ligamenta reuinctum & adstrictum esse tradiderit. Tertium illud maximum ac latum totam articulationem extrinsecus in orbem amplexatur: Sed Galenus duorum tantum mentionem facit, quæ pyrenoidi apophysi firmandæ, & capiti colligando inseruiunt.

Reliquum caput multa dubia & controuersa continet, in quibus inuisitè damnatur Galenus à recentioribus. Imprimis, quod scripserit vertebrarum cavitates inæquales esse, latiores supernas, angustiores infernas. Secundò, quod transuersas apophyses septimæ vertebrae solidas & imperforatas dixerit. Tertio, sextam vertebram ceruicis reliquis maiorem esse. Quarto, quod foramen laterale ad emittendum nervum ab utraque vertebra constari proposuerit. Quibus omnibus obiectionibus pro Galeno breuiter satisfaciam.

Negat Fallopius, vertebrarum cavitates inæquales esse, quoniam inferiores vertebrae eandem & æqualem habent cum superioribus capacitatem. Nam superiorum vertebrarum cavitates implent membranæ crassiores, ut reddantur æquales inferioribus. Nec primæ vertebrae cavitates cæteris amplior est, quia dentis ingressu minuitur, & aliis adæquatur. Remitto Fallopium eiusque sequaces ad *an. 15. ut* diligenter vertebrarum inspectione cognoscant, verissimum esse, quod scripsit Galenus. Quinetiam *per* medulla, quanto magis in gignendis nervis consumitur, & attenuatur, tanto inferiorum spondylorum foramina, siue cavitates magis minuuntur. Nec ad mentem Galeni disputat Fallopius. Nam agit de cavitatibus vertebrarum cadaueris, non autem de vertebrae sceleti, de quibus agit Galenus.

Affirmant Vesalius, & omnes recentiores Anatomici, septimæ vertebrae apophyses transuersas esse perforatas, contra Galeni doctrinam. At ille non negauit, sed rædè perforatas esse dixit. Syluius fatetur semper in homine, & sceletis simiarum pertusas esse. Ego verò in sceletis sæpius imperforatas obseruavi, vel vnicam tantum apophysim pertusam. Plerique suspectum habent hunc locum, quia nullibi Galenus hanc sententiam repetiuit, imò omnes ceruicis vertebrae perforatas esse scripsit, *lib. 13. de usu partium.* Quinetiam Orbasius, Galeni simia, in sua Osteologia, quam ex hoc libro transcripsit, nullam huius rei mentionem facit.

Scribit Galenus, sextum spondylum ceruicis maximum esse, quod explodit & irridet Vesalius. Responde Galenus, sextum spondylum cum superioribus conferre, non cum septimo.

Quod si quis obiiciat Galenum, *lib. 3. de articulis, ad particulam 48.* expressè dixisse sextum septimo maiorem esse. Responde sexti magnitudinem cum Galeno ad proceres transuersos aliis latiores referendam esse. Sexto, inquit, spondylo duplices apophyses transuersæ manifestæ sunt, cæterarum omnium maximæ, sicuti & ipse spondylus maximus est: quare interna portio latior est, intellige apophyse non transuersam, non corporis vertebrae.

Negant recentiores Anatomici, Vesalius & Fallopius, utrumque spondylum meauri æqualiter conferre, quod asserit Galenus, & repetit, *lib. 13. de usu part. cap. 3.* Inspiciant diligenter sceletum, ut suum errorem agnoscant. Nam in ceruice utraque vertebra ad meatum formandum æqualiter contribuit.

Structuram ceruicis persequor, quam septem vertebrae componunt suis nominibus appellatz. Prima Athlas dicitur, quia ut Athlas Mathematicus, cælum suis humeris gestare fingitur, ita hæc totum caput sustentat: dicitur etiam *tripoletis*, conuersus, quia super ea caput verti creditur. Secunda *Atlas* & *manubis*, ab apophysi turbinata, quia nucleum oliuæ refert. Epiphysim esse mauile Fallopius: *id est* vocatur ab Hippocrate, quæ luxata parte anteriore, anginam lethalem inducit: cuius meminit Hippocrates, *lib. Epidem. & Galenus lib. de locis affectis, cap. 3.* Reliquæ carent nomine, excepta Septima, quam nonnulli Athlantiem malum appellare, quia caput & reliquos spondylos sustinet, & in ferendis oneribus potissimum laborat.

In ceruicis vertebrae hoc peculiare notatur, quod apophyses transuersæ sunt bisideæ, ad muscolum exortum, & neruorum tutelam, quos adhuc molliores canaliculo quodam excipiunt & deducunt, exceptis duabus primis. Exdem apophyses perfo-

ratæ sunt, vt aditum præbeant arteriis, & venis cervicalibus Cerebrum petentibus. Septimam Galenus excipit, quam in suis secleris continuam sine vlllo foramine vidit. Cervicis quoque vertebrarum spina bicornis est, ad musculorum exortum & insertionem.

Cervicis corpora longa sunt, lata & plana, vt firmius eis incubent Oesophagus, & aspera arteria. Ad articulationis securitatem imbricatim coniunguntur: sed prima vertebra hoc habet peculiare, quod omni spina careat, ne superficlos musculos laceraret. Corpus obtinuit intus leuiter cauum, vt dentem foris gibbum, qua parte iungitur, laeuem & planum exciperet.

Galenus lib. 12. de vsu part. in colli vertebriis 11. apophyses obseruat, in reliquis 9. sed in prima colli tantum 7. in secunda 9. agnosco. Prima est corpus vertebræ deorsum prælongum, vt in subiectam cavitatem admittatur, quod tamen excipitur à Galeno. Secunda est spina quæ duplex est, deinde transuersæ duæ, quatuor articulatione, atque duæ superius ac extremis finibus corporis vertebræ adiectæ. In prima vertebra pro septima apophysi computatur apophysis illa anterior, quæ dentem pyrenoidem admittit. In secunda dens non æstimatur pro apophysi, quia ex corpore vertebræ emergit, ipsumque corpus constituit.

## COMMENTARIVS IN CAPVT NONVM.

### De Spondylis Dorsi.

#### CAPVT XV.



ACHILLES altera pars Dorsum dicitur, ἄχος & ἄσπετος, quia opponitur sterno, ἄχος δὲ τὸ πόνος, quod est tergiuerfari, vel quod magis quam alia pars pondera sustinentes sudore madescat, ἄσπετος δὲ τὸ ἰσχυρὸν ἐμπίπτειν. Dorsum nuncupatur, quod ea pars corporis deuersa sit deorsum, ex Felso. Antiqui dicebant Dossium, quod nos Dorsum, vnde Dossuaria iuuenta à Varrone dicta, quæ dorso vehunt.

Duodenas continet vertebra, quarum prima ἰσθμὸς dicitur à dictione ἰσθμὸς, quæ apicem seu cristam galæ significat. Vel quod aliis præster, vel quia ἰσθμὸς dicitur superius guttur, cui illa subiaceret. Secunda ἀγκύλιος, Axillaris appellatur, Reliquæ nouem consequentes ὀστέα, Costales, quia maximæ Costæ illis annectuntur. Vndecima dicitur ἀσπίς, in neutram partem inclinans. Duodecima δόρυ, præcingens, quod ea parte cingamur.

Cæterum dorsi vertebræ discrepant à vertebriis colli, mole & processibus. Dorsi vertebræ maiores sunt. Spinas habent longas, & deorsum tendentes, in mediis vertebriis acutas, iuxta lumbos, & cervicem obtusas: Latas verò & solidas habent transuersas apophyses, nonnihil retrorsum sursumque eductas. Quinque vertebrarum dorsi corpora infra secundam non sunt rotunda, sed acuta, vt venæ cauzæ ascendenti & aortæ descendenti sedem præbeant. Triangularem figuram referunt, & internum latus corporum omnium spondylorum dorsi excauatum est.

Decima vero dorsi vertebra hoc habet peculiare, quod sit ἀσπίς, in neutram partem inclinet. In nostris hominibus frequentior est vndecima, & hac crebrior duodecima. Cum enim rachis fornix instar constructa sit, eius clauis vndecimus spondylus, aut duodecimus, nutantes spondylos sursum & deorsum figit ac firmat, non aliter quam lapis triangularis reliquos lapides compingit. Huius vertebræ articulatio primæ aduersatur. Hæc enim excipit, & non excipitur, illa excipitur vndique, & non excipit, finitimis per arthrodiam in articulatæ. Idcirco suas apophyses obliquas leuiter capitulatas obtinuit, quas apophyseæ descendendum decimi spondyli, & duodecimi ascendendum cavitates excipiunt. Ratione huius vertebræ, claudicatione in alterutrum latus accidit, vel vtrimque, prout nutarit hæc vertebra.

Sed cur diuersa est huius vertebræ articulatio? quia superiorum & inferiorum vertebrarum contrarius est motus; superne spinam antroorsum inflectunt, inferne eandem retrorsum incuruant. Propterea spondyli vndecimo interiecti contrario modo dis-

penfantur, superiorum accliuus processus protuberant. Decliuus sinuantur, inferiorum contra processus arctius excipiunt, decliuus excipiuntur.

Si quæras, cur in decima vertebra metaphreni medium spinæ collocatur, id verum esse intelliges, si Os Sacrum senis portionibus constat, spinæ adscribanur, & coccyx pro tribus spondyliis numeretur. Nam & coccyx etiam *anatum* dicitur.

Tria sunt, quæ in hoc capite reprehendunt *Anatomici*. Imprimis, quod scripserit *Galenus*, in dorso duodenas vertebrae rarius abundare, quam deficere. Secundo, quod affirmarit decimam vertebrae esse *ijm*, in nullam partem inclinare, transuersis apophysibus carere, & alio structuræ modo cum vicinis articulari. Tertiò, quod tradiderit vertebrae dorso post decimam transuersas apophyses, & spinas superne vergere. Quas omnes obiectiones facile est diluere.

Naturalis numerus vertebrae dorso duodenarius est, quod non inficiatur *Galenus*, si vnica superabundat, vel deficit, contra naturam est. At sæpius vnâ deficere, quam abundare, scribit *Galenus*, quia numerus costarum sequitur numerum vertebrae. Atqui frequentius vndecim costæ, quam tredecim reperiuntur. Quod si decima tertia costa occurrat, sæpiissime vnita & connata est alteri, quam separata, vt in sceletro grauidæ mulieris in *Scholis Medicorum Parisi* anno 1612. dissectæ obseruatum est, quæ in dorso vertebrae tredecim, totidem ex vtroque latere costas habebat. Sed secunda ceruicis cum tertia continuata erat: octo vertebrae collum componebant, tredecim dorsum, quibus affixæ erant pari numero costæ, lumbi quatuor vertebrae constabant. Alterius mulieris anno 1613. dissectæ, dorsum vndecim constabat vertebrae, nec plures habuit, quam vndecim costas ex vtroque latere. Habeo sceletum grandioris hominis, cui tredecim ex eodem latere sunt costæ, & tamen spina 14. tantum vertebrae comprehendit, sed collum senis dumtaxat vertebrae constat, ergo cum superabundant, aut deficient vertebrae dorso, numerus vertebrae totius rachæ non semper immutatur.

Existimo hanc particulam de vertebrae dorso scriptam, ad vniuersam *ijm* posse referri, quia frequentius tredecim vertebrae separatæ, quam viginti reperiuntur. Atque falsum est, quod volunt *Vesalius* & *Fallopius*, tredecim costis extantibus, vnâ vertebrae in rachi superabundare. *Fallopius* tamen, & *Ingrasius* existimant transposita esse verba *Galenii*, & legendum frequentius reperitur, vt desit vna vertebra, quam superfit. Sed cum vertebrae dorso numerus costarum numero respondeat, sicuti costas rarius vndecim quam tredecim reperiri scribit *Galenus*, lib. 8. *admiris*. *Anat.* cap. 1. ita hic legendum transpositis vocibus, *si rachi non abundent minus vnâ*, deesse, quam superesse rarius.

Quod *Galenus* tribuat decimæ vertebrae apophyses transuersas, & spinas rectas, atque articulationem primæ vertebrae colli contrariam: id in simiis & canibus *Vesalius*, & *Fallopius* verum esse fatentur. Alij æquiores, duodecimæ dorso vertebrae conuenire dicunt, nec ipse *Sylvius* diffitetur, & abnuat in *Commentario*. *Enschius* ita *Galenum* excusat. Posterior vertebrae apophysis duplici linea superiore & inferiore circumscibitur, superior in homine brevis est vsque ad decimam, quæ vertebra supra cæteras spinam terminatam habet crasso & rotundo tuberculo, & hac nota vno intuitu ab alijs distinguitur. Infra decimam lineæ illæ sunt longiores, & ab infima parte spinæ superne vergunt. Vel *Galenus* respexit ad naturalem spinæ totius structuram, in qua spinæ duæ inferne dorso, & aliæ Lumborum superne vergunt. At fursum & deorsum ferri, situs sunt differentia, non figura.

Sæpius obseruavi duodecimæ vertebrae apophyses transuersas deesse, quamuis haberet spinam rectam: sed vndecima vtriusque apophyses obliquas, tam supernas, quam infernas condylosas obtinet. *Galenus*, cum vidisset decimam vertebrae parte postica latiore esse subiecta, & præcedenti vertebra, quintetiam apophyses transuersas superne vergere, cum ceteræ superiores deorsum inclinent: spinam quoque decimæ vertebrae tubere crasso & rotundo terminatam: propterea ei tribuit, quod vndecimæ conuenit. Mendum accusarem in textu, nisi hæc lectio ex alijs locis similibus confirmaretur: Leuis tamen error *Galenii*.

Quod ad spinæ rectitudinem attinet, si locus *Galenii* diligenter expendatur, non exprimit decimam habere spinam rectam.

COMMENTARIUS IN CAPVT X.

De Lumborum Spondylis.

CAPVT XVI.

**D**ORSO succedit *Lumbus*, sic nominatus à *lubidine*. Nam veteres lubet & libet, & lubidinem dixere, vel quia solutior hæc pars est, cum cætera spina sit rigidior, aut quia caro ab Ossibus illis faciliè soluitur, inquit *Scaliger*. In parte posteriore ad cincturam est, *in omni*, inquit *Aristoteles*, libro primo de historia animalium, quod nomen accepit, quasi inquit, ab *in* & *omni*, quia lumbus æquali ferè spatio, tam à pedibus, quàm à capite distat. Vel *in omni* dicitur, quasi *in omni*, ex *Apollodoro*, quod sit *Ossa*, vel quia carnes Ossibus istis adeo tenaciter intrusæ sunt, & inhaerescunt, vt ab Ossibus enasci videantur: *hinc* etiam vocatur apud *Suidam*, & carnes huius partis *hinc* siue *non in omni*, vel *non in omni*, quia *non in omni*, renes in illis iacent, vt est apud *Suidam* & *Pollucem*. Dicitur etiam *in omni*, quasi *in omni* à robore, ac si in lumbis consisteret corporis robur & fortitudo. Sic Latini vocant elumbes, debiles, qui nequeunt incedere, aut erigere corpus, & delumbare, lumbos frangere significat. Inde nomen Gallicum *crâne*, non tam ab hernia, quàm è rene dicitur.

Lumbus autem tertiam spinæ partem constituit, & quinque vertebrae constat, quas nullum animal præter hominem, ne simia quidem pari numero obtinuit, inquit *Galenus*, *Comment. in sect. 3. lib. de articulis*. Earum prima *proxima* dicitur, quod ex aduerso renum sita sit, *ultima aquarum*, fulciens, *Media æquæ*, brutorum propria.

Lumbarium vertebrarum apophyses transuersæ sunt aliis longiores & tenuiores; costularum vicem & officium subeuntes, exceptis prima & vltima, hæc ab Osse ilium impedita, illà, ne motum thoracis obliquum, hoc loco maximum, impediret.

*Galenus* lumbos vertebrae quinque constare scribit, quem tamen numerum mutari notant recentiores *Anatomici*, prout dorsum vndecim, vel tredecim vertebrae comprehendit. Nam si ex ceruice, vel lumbis vna accedat thoraci, necessum est collam, vel lumbos pauciores habere vertebrae. Inde fit, vt collum sex vertebrae, vel lumbi quatuor constructi sint. Obseruaui tamen anno 1614. hominis spinam 35. vertebrae instructam, cuius Lumbi quinque vertebrae constabant.

Præterea occurrunt in hoc capite duæ particulæ, quas reprehendunt *Anatomici*, in simiis & canibus veras inueniunt, neutiquam in homine: quod dixerit *Galenus*, omnes apophyses supernè spectare: Deinde præter septem apophyses omnibus vertebrae communes, alias duas adiunxit.

Primæ reprehensioni satisfecit *Sylvius in Comm.* quamvis omnes transuersas lumborum apophyses supernè vergere sæpius obseruari, ac potissimum tres inferiores. Secundam reprehensionem in gratiam *Galenus* *Columbus* diluit & evertit. Istas tamen apophyses, non in omnibus apparere fatetur. Testatur *Sylvius in Comm.* apophysim metapilorum officulo similem raram esse, sed in homine circa radices infernarum transuersarum apophyse= lumbarium, quædam tubercula magnitudine, figuraque metapilorum nucleos referentia sæpe reperiri, quæ cum in canibus & simiis reperiantur, *Galenus* per apophyses duas, ea tubercula intellexit.

Superest de foraminibus internis vertebrarum agere, quæ venis recipiendis destinata, nullo ordine disposita esse scribit. In cæteris spondylis, vel nulla esse, vel exigua spectari. Certum est, duo vel tria foramina intra cavitatem cuiusque vertebrae apparere, sed maiora sunt, & euidentiora in vertebrae lumborum, minora & obscuriora in reliquis vertebrae, tam dorfi quàm ceruicis.

COMMENTARIUS IN CAPVT,  
undecimum.

DE OSSE SACRO.

CAPVT XVII.



**L**VNIS *Os Sacrum* subternitur, vt sit spinæ veluti quoddam fundamentum, & vtrunque *Ossa* coxendicis excipiat, crurumque ad *Ossili* articulationem firmet, atque inferioris ventris contenta viscera sustineat: denique vt nervorum coniugationibus in crura distribuendis originem præbeat. Propter magnitudinem *Sacrum* appellatur. Græcis enim *σπονδυλόν*, & Latinis *Sacrum*, magnum denotat, fortassis, quia membra *Sacra* generi propagando dicata includit, inde nomen adeptum est: vel quia in *Osse* isto aliquid *Sacri* arcanique contineatur. dum partus tempore eius cohesio cum *Ossibus* *Illi*um, diuinitus adaperitur, eductoque Foetu miro quodam naturæ officio solidescit. Vel quod vitæ farum obrineat, siquidem eo malè affecto animal in discrimen vitæ adducitur, vt notauit *Hippocrates*, lib. de *Gland.* & lib. 3. de *fract.* testatur *Os Sacrum* exulceratum difficillimè sanari, quod etiam in *Comm.* confirmauit *Galenus*. Vidit *Longus* duos viros nobiles *Ossis Sacri* putredine, & incredibili doloris tyrannide diu emaciatos, tandem contrabuisse & interiisse, *epist.* 42. lib. 1. Posset aliquis suspicari, inde suum nomen traxisse, quod in sacrificiis solum hoc diis offerri consueuerat, vt inquit *Meletius*, ex quo dixit *Menander*, *ὅτι δὲ τὸ ὀστέον ἅπας θύωνται*.

Vt vt sit, *Os* est latissimum, triangulare, cauum anteriore parte, vt amplior esset hypogastrij capacitas; posteriore gibbum: *Apophyses* emittit quinque, quibus quatuor interiecta sunt foramina, nervis educendis præparata. Ex *Ossibus* quinque, alias sex coagmentatur, quæ in pueris coctione faciliè separantur, in adultis tam arctè coherent, vt vnum *Os* appareat. Notat *Fallopius*, *Ossium Sacri* numerum immutari ratione coccygis. Nam quoties *Os Sacrum* sex vertebrae constat, ex tribus *ossiculis* coccyx constituitur, & quando coccyx ex quatuor compactus est, tum *Sacrum* ex quinque vertebrae constat.

In hoc *Osse* tria sunt inter *Galenum* & *Anatomicos recentiores* controuersa. Imprimis quod *Galenus* *Spinæ* *Ossis Sacri* *spinis* similes esse scripserit. Secundum quod *apophyses* transversas grandes & amplas assignauerit. Tertium, quod tribus *Ossibus* *Os sacrum* contextum & coagmentatum esse dixerit. Quæ omnia *Ossi Sacro* *Simix* & canum conuenire *Anatomici* contendunt, nequaquam homini.

Quod ad primum articulum attinet, *Galenus* initio capitis proposuit *Os Sacrum* *spondylis* dumtaxat analogum esse. At quod est analogum supponit aliquod discrimen, quamuis postea dixerit *Ossis Sacri* *spinam* aliis consimilem, indicare voluit *Os Sacrum* *spinis* præditum esse, vt analogiam inter *Os* istud, & alias vertebrae demonstraret, idcirco subiungit, *ipsius transversæ apophyses sunt grandes & amplæ*. Obiiciunt tamen, alibi, lib. 12. de *usu partium*, tradidisse *Ossis Sacri* transversas *apophyses* esse tenues: *Galenum* exulat *Fallopius*, quod illic intelligat tenuitatem, quæ opponitur crassitudini. Possit esse corpus latum, quod tamen erit tenue. Ego per magnitudinem *Galenus* intelligit latitudinem, vt ipsemet exponit, *sunt apophyses grandes & amplæ*, vel vtraque lectio defendi potest hoc modo. Id *Os* grandes *apophyses* obrinet, si species earum amplitudinem, sed si magnitudinem referas ad altitudinem, siue crassitiem, superiores *apophyses*, quibus cauitas *glenoides* inest, crassiores erunt inferioribus vertebrae.

Cum autem videret *Galenus* in *Osse Sacro* tres tantum emicare *spinæ*, tres quoque *apophyses* grandes & parentes, idcirco *Sacrum* *Os* ex tribus portionibus tanquam propriis quibusdam *spondylis* constructum esse proposuit, quod fecit imitatione *Hippocratis*, qui superiorem partem *Ossis Sacri* *Os latum* appellat, extremitatem caudam. Nam *diuinus Præceptor*, libro quarto de *visu in acut.* part. 83. cum agit de musculis



spinalibus, eos ad *os sacrum* vergere tradit. *Galenus in Commentario* notat appellari *os sacrum* Ossis Sacri extremum. Præterea *Galenus* pro Osse Sacro accipit tria Ossia superiora, quæ committuntur Ossibus Ilium, quod ex textu facile probatur. Nam apophyses transuersas grandes & amplas esse scribit, quibus cauitas glenoides inest, in quam ossa Ilium recipiuntur. Subiungit, id Os ex tribus particulis tanquam propriis *syndylis constructum* esse. Atqui cauitatis illius glenoidis tres tantum particule Os Sacrum constituunt, & iis solis Ossa Ilium coniunguntur. Accedit, quod tria tantum nervorum paria ab Osse Sacro exilire scribit. Deinde *Galenus* musculum Iliacum externum pyramidiformem, *libro 15. de usû partium*, ab Osse Sacro prodire notat, & libro secundo *administrat. Anatomie*, emanare scribit à coccyge. Priore loco Ossis Sacri nomine comprehendit coccygem: Posteriore loco per coccygem, intelligit tres inferiores Ossis Sacri vertebrae.

Si quis obiiciat *Galenum, lib. 12. de usû partium, cap. 16.* Os Sacrum ex quatuor Ossibus componere, quod directè pugnat, & aduersatur huic capiti. Responderem id verum esse, atque nonnunquam Os Sacrum tribus constare portionibus, interdum quatuor, quibus adhuc tria subiecta sunt ossicula, ut passim in sceletis obseruare licet, quando septem portionibus constatum est Os Sacrum. Vel dicerem *Galenum*, nomine quarti Ossis intellexisse coccygem, cuius ibi nullam facit mentionem. Accedit, quod *Galenus lib. de ossibus*, scribit Ossa Sacrum. & coccygis, coctione dissoluta, similem cum vertebri structuram referre, cum vulgaris coccygis Ossa etiam sine coctione sint mobilia, & separabilia, solis ligamentis, ut caudarum Ossa inuicem connexa. Quapropter non ineptè & inscienter *Galenus* prodidit, à coccyge, siue extremitate Ossis Sacri nervos deriuari, qui in femur tibiamque disseminantur.

Nec mirari oportet, si tribus Ossibus propriis inter se coagmentatis Os Sacrum constare scripserit, quibus coccygem velut quartum adiunxit: quia vnum idemque Os diuersa nomina sortiri potest. Ipse humerus parte à nobis spectabili *epomiu*, parte spinæ suæ summâ *acromion*, parte latâ *omoplata* vocatur. Coxendicis Os vnicum est, tribus tamen nominibus distinctum, vbi lateribus Ossis Sacri annectitur, *Os Ilium* dicitur, ad coxylem *ischion*, antica & superiore parte *Os pubis*. Rectè igitur poterit Os Sacrum parte superna dici, inferna coccyx, cum ipse *Ruffus Ephesus antiquior Galenus*, Ossis Sacri vltimum ossiculum coccygem appellaret. Et ex *Iulio Polluce*, Os Sacrum à nonnullis dicitur, *ἡ ὀπίσθηστος*, perforatus coccyx, interpres imperitè veritit tertius coccyx.

Interea notandum Os Sacrum vtrimque Ossibus Ilium per gynglyformem articulationem, vel potius per symphysem iunctum esse. Nam Ossis Sacro cauitas glenoides inest, in quam Ilium Ossa ingrediuntur, vicissimque tubercula Ossis Sacri à cauitatibus Ossis Ilium excipiuntur.

## COMMENTARIVS IN CAPVT XII.

### De Coccyge.

#### CAPVT XVIII.



**O**SSIS Sacri extremo attextitur Os paruum, quod à similitudine rostri cuculi auis, *Coccyx* dicitur, vel à voce de sono facta, eo quod crepitus, qui inde per sedimentum exeunt, ad id Os allisi, cuculi vocis similitudinem effingunt, siue quod tale Os Ossis Sacro sit adglutinaturn, quod illi *uincula* dicunt, *in uincula*, *uincula*, & ab his deriuatum *uincula*, illud vero Os colon appellatur, quia mutilum & decurtatum, ex *Meletio*.

Musculum ani leuatorem firmat, & intestinum rectum, propter natam amplitudinem extra peluim proiectum sustinet, atque extremum spinæ foramen obturans spinalem medullam ab aëris iniuriis tuetur. Denique idus & contusiones molliter excipiens, efficit ne qua fractura ad Os perueniat.

Concrefcit ex tribus vel quatuor ossiculis fungosis, & stemi modo rubicundis, præsertim in iunioribus. Si figuram eius & structuræ specès, ex ampliore basi in mu-

cronem definit, qui viris introrsum incuruatur, mulieribus extrorsum, ut minus impedit Fœtus exclusionem.

Pro coccyge *Galenus* accipit Os quartum Ossis Sacri, tribus ossiculis compactum, quæ alter conformata sunt. Quippe spinâ carent, breues & exiles habent apophyses transuersas, posteriori squamma medullæ spinali obtenfa carent, & simul iuncta in caudam desinunt, cui attexta est cartilago pendula, quæ vulgo *Coccyx* dicitur.

Id corpusculum cartilaginofum intellexit *Galenus lib. 13. de usu partium*, eûm ait, Os Sacrum in fine cartilaginofum, habere epiphysim, eiusdem utilitatis gratiâ, cuius pectus habuit, & torius dorfi spina, ac notharum costarum capita, & partes omnes corporis nudæ ac prominentes. Ergo si pro coccyge cum *Galenus* tria ossicula inferiora Ossis Sacri accipias, quis inficiatur tres nervorum coniugationes à coccyge prodire. Sed in textu legitur *ex posterioribus partibus non omnes prodire*. Si quis conserat ea, quæ *Galenus* de foraminibus coccygis hoc loco scribit, cum iis quæ leguntur *libra de dissectione nervorum*, non dubito, quin subit mendum in hoc textu, & alteram dictionem deesse. Nam *libra citata de nervorum dissectione*, ex internis, externisque Ossis Sacri foraminibus, singulis partibus ad extremum vsque medullæ spinalis, in Os coccygem attenuatum nervos dispensari prodidit. Ac sanè, si diligenter textum *Galenus* cum sceletis quibusdam comparemus, solam primam coniugationem deprehendes antè & retrò produci, reliquas à posterioribus & laterilibus partibus emergere. Habeo sceletum, cuius Os Sacrum cum coccyge, planè quadrat, & respondet in omnibus *Galenus* doctrinæ, ne quis putet cum *Vesalio & Fallopio* similiis tantum convenire.

## COMMENTARIUS IN CAPVT XIII.

### De Thoracis Ossibus, Costis & Sterno.

#### CAPVT XIX.



**Q**UOD est impetus, qui movet, vel ducit, quod impetum moueat, vel ducit, quod est salire & moveri, vel quod est instar lorice, unde *Suapiano*, id est, armare, & *dupeis*, verbum *Hippocratis*. Thorax partium vitalium conceptaculum, comprehendit anterius, quodcumque est à clauibus vsque ad cartilaginem xiphoidem, posterius totam costarum compositionem, quæ à prima dorfi vertebra ad lumbos protenditur. Affigitur ad eam spinæ partem, quæ *Dorsum* dicitur, tanquam navis ad carinam. Quare necessario eius longitudo æquabitur dorso, latitudo erit pro vertebrarum magnitudine. Natura in eius fabricatione alios scopos sibi proposuit, vocem scilicet, respirationem, cordis ac pulmonis magnitudinem, & pro horum necessitate, Thoracis longitudinem & latitudinem effinxit. Figuram Qualem obtinuit ad loci capacitatem, movendi facilitatem, & partium internarum securitatem. Ideo partim osseus, partim carnosus efformatus fuit, muscularis & Ossibus alternatim commutatis, ut in aeris inspiratione & fuliginis expiratione commodius attolli & deprimi posset. Torus enim osseus si fuisset, ad respirationem dilatari & constringi non potuisset. Attamen ferunt eiusmodi structuram Thoracis. loctatori *Protophanti Magneto* in Olympia eodem die pancratio, & lucta victori contigisse. Huic ut in aliis hominibus costæ non erant discretæ, sed Os vnum continuum à iugulo vsque ad ultimam costam, teste *Pausania, lib. 1.* quod tempore *Adriani Imperatoris* erutò cadavere confirmatum fuit. Id autem de lorica ossæ thoracis non est intelligendum, sed de crate penitus ossæ, cuius costæ prope sternum erant cartilaginossæ, qualem structuram in quibusdam deprehendi, non tantum senibus, sed etiam iuvenibus, qui nondum trigessimum ætatis annum excefferant, atque id nuper in Principe generosissimo, *Mecenate* meo æternum mihi lugendo *Alexandro de Fandis*, obleravi: cuius Cor erat insigniter firmum & compactum: An quibus tale Cor obigit, talis etiam structura concessa: At si Thorax totus carneus constructus fuisset, in sese considens, Cor & pulmones

compreffisset, nec iustum ipsis spatium ad motum reliquisset. Quapropter admirabili naturæ providentiâ factus fuit, partim osseus, partim carncus: Ossa carnicibus adiuncta sunt, non tantum ad firmandas sustinendæque claviculas, scapulas, brachia, verumetiam, ut ab illis musculi thoracis & abdominis enascerentur.

Thoracis nomen est homonymon, & eius genetis, quod ab vno ad aliud dicitur. Nam interdum *Hippocrates* & *Aristoteles*, pro vniuerso trunco corporis Thoracem accipiunt, quem à iugulo ad pubem vsque metiuntur. Mediei vocant Thoracem cum *Galeno*, quidquid costis circumscribitur, parte anteriore habens sternum, posteriore dorsum, lib. 6. de usu partium, cap. 2. & lib. administrat. Anatom. Similiter hoc loco thoracis Ossa constituit sternum, costas, & spinæ vertebas, quæ in dorso sunt. Excludere videtur claviculas, quas seorsim exposuit, quia desunt in pluribus animalibus, quæ tamen thoracem habent. Propter vltimæ manuum multi opinantur datas fuisse, ideoque post omoplaram de elauu egit. At tamen lib. 3. administrat. Anat. monet in animalibus, quæ clauiculas habent, supremum thoracis terminum clauiculas esse, ut infimus est in omnibus animalibus septum transversum.

Nos igitur sequuti mentem *Galeni*, tria thoracis Ossa constituimus, Sternum, Costas, & Dorsæ Vertebas. Thoracis latera efformant Costæ, quæ ideo Græcis *τῶν ὀστέων* dicuntur, quod *ὀστέον* constituent, aut *τῶν ὀστέων*, quasi *ὀστέον*, à *ὀστέον*, quod est spiro, *ὀστέον*, quia remorum modo dispositæ sunt: Hanc seriem costarum *Crætem* vocat *Lactanius*, lib. de opificio hominis. At vulgus Latinorum costas dictas putat, quod interna custodiant, vel quia simul constant.

Earum numerus incertus est: modò vndecim, modò tredecim costas *Columbus* inuenit, quod pernegat *Falsopius* in *Obscurat. Anat.* & accusat eorum incuriam, qui dum sceletum pararent, vel inter coquendum duodecimam amiserunt, aut nimia coctione colliquerunt. Siquidem rarissima 13. costa occurrit, atque adhuc rariùs vndecima, atque hæc ita rara sunt, ut inter mille vix vnum tali costarum numero inuenias, ait *Galenus*, lib. 8. administrat. Anat. Sed si costæ naturalem numerum excedant, vnica tantum in altero latere, altera deficiente reperitur. Habeo tamen sceleta, quæ vndecim ex utroque latere costas habent, & vnus sceleti dorsum vndecim constat vertebis, alterius dorsum duodecim vertebas recipit. Vidi & alia, quæ tredecim costas vtrinque ostendebant: Vt plurimum tam in viris, quam in mulieribus ex utroque latere duodecim numerantur. Septem superiores vera & perfecta sterni per arthrodiā articulatz, quibus interdum adiicitur octaua, quæ in quorundam resectionibus non semel inuenta est, ad cartilaginis mucronatæ radicem alligata, quæ causa est, cur *Aristoteles*, quem *Plinius* imitari non dedignatur, sedenas veras constituit. Multum laborat *Hofmannus*, ut *Aristotelem* taceat, de octauis costis vtriusque lateris. Inferiores quinque, *Nothæ*, *Spuræ*, imperfectæ dicuntur, quia nequiquam ad Os pectoris perueniunt. Ex costis veris duæ supernæ & primæ *anteriori* à *Palluce* vocantur, quasi retortæ: Duæ sequentes *primæ*, solidæ, propter firmitatem, tres vltimæ *myriæ*, Pectorales.

Costarum substantia ferme tota est ossea, versus sternum cartilaginea, sed in medio ductu osseam naturam reliquo Osse duriorem obtinuit: quâ verò desinunt in Os pectoris, fungosam & cartilagineam, ne dura cum mollibus immediatè coirent: tum ut ex assiduo motu minus læderentur, & in thoracis eleuatione ac depressione facilius obsequerentur.

Omnes figurâ suâ arcum referunt: sed supernæ magis incuruantur, quàm infernæ. Homini inter animalia maximè flexæ sunt costæ, & eorum modo quæ curuæ sunt, ut animaduertit *Hippocrates* 3. de artic. & confirmavit *Galenus* in *Comment.* Id etiam repetit *Hippocrates*, lib. de Ossium natura. Costæ anteriore parte ad pedus laxæ, & molle extremum habentes, formâ præ cæteris animalibus maximè recuruâ cernuntur. Hac enim parte homo mole est angustissima. Mediæ verò costæ longiores sunt, ac latiores extremis costis, sed omnes parte superiore, quàm inferiore crassiores existunt, quo signo dextræ à sinistris distingui possunt. Iuxta radicem omnes exasperatæ cernuntur, ut inde prodeant ligamenta, quorum beneficio costæ cum vertebrarum corpore, earumque transversis processibus articulantur, exceptis vndecima & duodecima, quæ per vnicum articulum corpori vertebræ copulantur propter apophyses transversas breuiiores, quod etiam frequenter in prima costa obseuauimus. Sunt autem ex *Galeno*, sterni Ossa numero septem, quot costæ cum eo per diarthrosim ob-

mittuntur. *nisi sit in cavo*, quod sit solidum, *nisi à clauo*, quod est stare, quia immobile, *Larinis pectus*, quasi compactum vel pectinatum: vel à Græca voce *manè*, compactus: Inde formatum pectus: ita enim solidum factum est sternum propter intersectionem mediastini, & costarum connexionem.

Hic textus tres difficultates continet de numero Ossium sterni, ipsorum articulatione mutua, & altera articulatione cum costis. Sterni Ossa septem in omnibus sceletis *Galenus* obseruasse, vel ex hoc apparet, quod non scripserit interdum plura eius Ossa esse, interdum pauciora, vt in dorsi spoddyli & costis numerum variare notauit hoc libro. Vel *Galenus* istum numerum in pueris obseruauerat, quorum sternum septem Ossibus compactum est. Aut dicendum cum *Euilachio*, quod septem Ossa tribuit sterno, non ad transuersas diuisiones respiciens, sed ad eos sinus, in quos costarum fines cartilaginosi & condyloides inferuntur. Sunt autem numero septem, quot costæ cum sterno diarthrosi committuntur. Idcirco subiungit, *singularam costarum pars cartilaginosa in caput condyloides desinens, singulis sterni Ossibus cauitatem superficialiorem foris, diarthrosi inarticulatur*. Ac sanè numerus Ossium sterni varius est in adultis: Asseruo sternum quod ex quatuor Ossibus componitur. Aliud habeo quod tribus constat: Aliud quod quinque separata ostendit. Aliud in quo sex apparent, atque Ossis latissimi, ac superni in duo diuisi rudimentum extat. Nam Os istud in duo interdum directum apparet, vt existit in pueris.

Quare perperam Os sterni supernum, maximum esse scribit *Vesalius*, & extendit vsque ad costam secundam. Prima etenim costa ad Os supernum firmatur ac terminatur, & secunda costa ad finem secundi Ossis articulatur. Quod si neges Os latissimum in duo diuisum esse, quia coaluerant, pariter negabis maxillam inferiorem duobus Ossibus constare, nec Os illium ex tribus portionibus extructum. *Galenus tamen lib. 8. administ. Anatom.* expressis verbis asserit in adultis sternum Ossibus septem componi, vt singulis costis ad mutuam articulationem singula pectoris Ossa responderent. Quando igitur ille 7. Ossa sterno attribuit, non tam ad transuersas eminentias respexit, quam ad eos sinus, in quibus costarum fines cartilaginibus insiguntur, sternoque per articulum coniunguntur. Sic enim *Euilachius* defendit *Galenum*.

Veteres existimabant sternum esse dumtaxat continuitatem costarum, quæ ex *Hippocrate, lib. de locis in homine*, posterius ad vertebrae alligantur, antèrùs inter se committuntur. At medium intercedit sternum, sed ipsum sibi ipsi coherens, ait *Hippocrates*, discriminationes habet obliquas, qua parte costæ annexæ sunt: Ac proinde credit *Hippocrates*, tot partibus sternum constare, quot in eius lateribus reperiuntur obliqua discrimina, quæ designant costarum articulationes, & sterni cohesionem. Fortasse propter huius Ossis administrationem, septem Ossibus sternum constare credidit: quod veteres secundum longitudinem ducto scalpello, ex punice malo per Os medium pectoris secabant. Quemadmodum *lib. 7. administ. Anatom. cap. 3.* se fecisse fatetur *Galenus*. Itaque cum sternum tribus lineis manifestis & transuersis omnium confessione vtrimque diuisum sit, tria pectoris Ossa geminata, sex erunt, quibus si alterum addideris, quod xiphoidem excipit, septem habebis. Ex *Cerolo Stephano in sua Anatomie*.

Totum sternum triangulare est, vel vt loquitur *Celsus*, vtrimque lunatum, superne ab angusto principio sensim in amplitudinem latescit. In homine latum, ad mutuos amplexus, in reliquis animantibus acutum & carinatum, quia ab anterioribus cruribus plurimum angustatur. *Laëntius lib. de opis. hominis cap. 10.* alteram rationem assignat, nullum animal præter hominem in tergum iacere potest: Cum igitur brutæ animantes in alterutrum laius decumbant, ex eo sibi pectus illis angustum & compressum euadit: Homini verò patens & rectum, quia plenum rationis à celo datum, humile aut indecens esse non debuit, *transversum autem & angustum*, inquit *Galenus, lib. 3. de artic.* cetera verò animalia *oblonga*.

Huius Ossis extremo adhæret cartilago *Epiphys* dicta, cuius figura accuratè perscrutandis varia occurrit: nunc simplex & triangularis est, nunc bifida, & in modum Hippoglossi herbe maiorem partem minori incumbentem habens, semel aut bis tripartita visa *Euilachio*: Interdum bifida in modum rastri interuallum obtinens. Illic appositam esse putat *Galenus*, ad stomachi, & septi transuersi tutelam. Sed cum stomachus ab ea parte longè distet, solius diaphragmatis gratià constructa videtur,

cuius læsio hæc in parte propter Cordis viciniam, & venæ cavæ truncum ascendentem in hac parte tendinosa situm, periculosa existit, vel ut sit ligamenti Hepar suspendentis sedes.

Septem ossa sterni inter se per synarthrosim iungi *Galenus* scripsit. Synarthroseos speciem non expressit, quam alibi, lib. 8. administrat. Anat. designavit. Sternum Os unum quidem apparet, *duo* tamen *duo* apertum *apertum*: membranis autem dextris septem ossa talia nantur, quot cum eo costæ articulantur, quarum anterior finis non nihil attenuatus inferius fini singularum sterni Ossium inseritur, in modum scilicet harmonia receptus. At verò Ossa sterni cum ipsis costis articulantur per diarthrosim, quæ licet sit obscura, non est tamen imperceptibilis. Cernitur enim demptis ligamentis membranosis, quibus vndique contegitur. Nam ibi singularum costarum extremitas cartilaginosa in caput condyloides definens, singulis sterni ossibus cavitatem glenoidem fortitus per diarthrosim articulat. Sed tam exiguus est costarum cum sterni motus, ut hæc articulosi synarthrosis appellari queat.

Siquidem in multis aliis partibus corporis synthesis ossium ambigua est, adeo ut dubites, an ea per diarthrosim, vel synarthrosim inuicem iungi dicenda sint. Inde cognoscitur easdem esse differentias synarthroseos, vnam & eandem articulationem adscribi posse diarthrosi & synarthrosi, differenti tamen ratione. Diarthrosis erit ratione structuræ, synarthrosis ratione motus obscuri. Quamvis essentiam diarthroseos constituat structura laxa, quæ motum manifestum edit, ut essentiam synarthroseos compages stricta, quæ motum obscurum profert. Potest tamen quædam diarthrosis ratione structuræ referri ad synarthrosim, propter motum obscurum, itaut ambigere videatur. Sed nulla synarthrosis referri potest ad diarthrosim. Nam tres sunt propriæ differentię synarthroseos ratione structuræ, & motus obscuri, aut nullius, nempe futura, harmonia, & gomphosis. Aliæ tres differentię diarthroseos propriæ, synarthrosi conveniunt propter motum obscurum. Ex hoc loco pudenter intellecto licebit multas difficultates articulorum enodare, & *Galenum* ab infinitis recentiorum calumniis vindicare.

Quod attinet ad figuram sterni, *Galenus* notat gladio consimilem esse, ob idque sternum ipsum à nonnullis xiphoides appellatum fuisse: quamvis hoc nomen ab aliis tributum fuerit cartilagini, quæ sterni extremo inferiori attexta & annexa est, intra spurias costas orificio ventriculi obtensa instar clypei, ut ab externis ictibus protegeretur. Figuram pugionis sternum exquisitè refert, demptis vtriusque cartilaginosis ramulis, qui sunt partes costarum, pugionis manubrium erit in parte superiore, cuspidis in cartilagine xiphoidæ.

Septem tantum costas veras *Galenus* hic constituit, quamvis alibi, lib. 8. administrat. Anat. octavians quæ interdum iungitur cartilagini xiphoidi dici posse veram scripserit, sed hæc reprehensio infusa est. Nam utrumque verum est, & à recentioribus Anatomicis animadversum, & à me pluries observatum, septem vel octo costas veras reperiri.

Sed maior difficultas sequitur de duplici costarum articulatione cum vertebra, quam *Galenus* omnibus vertebra attribueret videtur, quia nullum discrimen assignavit. Recentiores Anatomici, *Fesalius*, *Fallopianus*, infra nonam costam, vndecimam & duodecimam, unica simplicique articulatione copulari ad corpus vertebræ notarunt, decimam mutare ordinem, ut aliquando duobus, aliquando vno simplicique articulo iungatur. Adde, quod *Galenus* duas ultimas dorsi vertebra transuersis apophysebus carere supra dixit, quo modo igitur costæ his vertebra per duplicem articulationem conducerentur? Responde cum *Enfacha*, *Galenum* eiusmodi apophyses transuersas non absoluit, sed quia breues sunt, eas interdum nullas esse dixisse, nihilque inconstantiæ aut repugnantie habet, quæ ipse de duplici costarum articulo scribit. Quamvis enim postremæ costæ tuberculum habeant. quod in processum transuersi extremum leuiter conicitur: hæc enim ratione duplici articulo carere dici possunt. Nihilominus eæ perinde, ac ceteræ alię duobus vinculis annexæ sunt, altero cartilagineo circa radicem transuersi processus, altero quod exactum est ligamentum, ab eiusdem processus extremo ad costam obliquè sursum ascendente, & hanc ob causam *Galenus* libro tertio de articulis, Comment. ad part. 37. sic scribit: *typorum costarum commissuram quodammodo duplicem conspeximus, quam rem Hippocrati prætermisissæ, vel quod*

non ex toto uniuersam naturam commissuræ fuerit intinitus, vel quod tam diligentem eius inquisitionem ad propositum non pertinere existimamus. Quamuis Galenus scripserit primam dearticulationem ad radicem transuersarum apophyseon fieri, nihilominus de ipsis transuersis apophyseis, id non est intelligendum, sed vertebræ corpus iuxta radices apophyseon accipere oportet. Cavitates autem illæ articulatoriæ in prima vertebra tribusque ultimis vertebrarum singulis corporibus propriæ sunt. In secunda verò septemque aliis subsequentiis, communes sunt superiori inferiorique vertebræ, ut de neruorum foraminibus dictum est: eleganter Syllius hunc locum interpretatur *Comment. in hoc caput.*

## COMMENTARIVS IN CAPVT XIV.

### De Omoplatis.

#### CAPVT XX.

**G**ALENVS Omoplatam ab ossibus thoracis seiuunxit, nam præcedenti capite dum ea recitaret, prætermisit omoplatam, quod ad constitutionem & perfectionem thoracis nihil quidquam conferat. Costis innatans, & à nullo osse dependens, nisi per commissuram acromij cum clauicula, sed musculis dumtaxat, veluti vinculis astricta suspendatur, quod genus syntheseos *syndesis* dicitur, non *syssarcosis*, quæ sit per carnem interiectam eis circumductam, ut in dentibus.

Quapropter emensis duabus Sceleti regionibus, Tertia superest perlustranda; quæ *Artus, membra extantia, Manus* scilicet, & *Pedes* complectitur. Artus autem Græcis dicuntur, quoniam membra hæc veluti periodis dissecta sunt, à *ῥαῖς*, quod est sisto, quia membrum quibusdam terminis circumscribitur.

Nos à *Manu* exordiemur, exemplo *Galeni*, quia situ & dignitate prior est. Tota verò *Manus* vulgo in tres partes dirimitur, *Brachium, Cubitum, & Extremam Manum*, quibus addam *Omoplatam*, siue *Scapulam*, cum nihil conferat ad perfectionem thoracis, & ab ea tota manus dependeat, ideoque in quatuor partes tota manus secabitur, cuius primam partem constituet omoplata.

Dicta est, quod sit lata sub humero, à *ῥαῖς* cui ἵστος ἔστω. Latinis, *Scapula*, quia cavitatem suam Scapham refert, *Scoptula* operata à *ῥαῖς*, quia parte posteriore costas operiunt, ideoque scuta Cordis dicuntur. Vel scapula dicitur ob concauitatem, vel ἵστος ἔστω, vel quia scapula, seu scopolus existit in humano corpore. Comparata est ad brachij articulationem, musculorum exortum, & costarum munimentum, ex *Galeno*, 19. de *usu partium*, cap. 10. Ab aliis ossibus non dependet, sed costis innatans occipiti, & colli ac dorsi vertebris: & ossi hyoidei per carnes musculosas inhærescit. Quamuis enim clauiculæ committatur, nequaquam tamen ab ea suspenditur, sed potius retrorsum pellitur, ne in pectus incidat. *Figuram habet Trapeziam*, quodammodo triangularem, auctore *Celso*, latam ut plures costas operiret, foris gibbā ad securitatem, intus cauam, ut costarum conuexa exactè complecteretur: Tum etiam, ut subscapulari musculo locum præberet, qui costis & omoplata interiectus est, ut supra costas faciliè & absque sensu doloris omoplata deduceretur.

In Omoplata nonnullæ partes obseruantur, quæ ad musculorum originem & insertionem plurimum conferunt. Ac primùm *Basis* secundum longitudinem dorsi exposita, quæ duobus angulis superiore & inferiore terminatur. Ille secundum & supernam dorsi vertebram & costam secundam. Hic nonam & infernam costam attingit, partes illas ad spinam expositas, *Spinæ, ala*, Scapularum dicuntur *Hippocrati*, 6. *Epid.* Quibus scapulæ in modum alarum prominent, hi in tabem proni sunt. Basis verò latera *Costæ* dicuntur, quorum altera est superior, altera inferior. Processus ille per medium scapulæ productus, *Spina* dicitur, cuius extremum clauiculæ articulationem *Acromium* vocatur: ex utraque parte spinæ cavitās habetur dicta *interscapulum*, *intercapulum*, pars scapulæ crassior & angustior *Cervix* appellatur, quæ

velut exscoto capite in cavitatem rotundam & superficiariam glenoidem definit, à *Galeno* dictam, *σπυνοειδῆ*. Impar & improporcionata est humero excipiendo ad motus facilitatem & libertatem. Sed cartilagine labra eius cavitatis coronante augetur. In eam humeri caput inseritur, quæ articulatio propriè *ἀγκυρ* dicitur. Cerauci incumbit *ἀποφυῖς*, quæ in pueris epiphys est, à similitudine nostri cornicis & anchoræ, *ἀγκυρὶς* & *ἀγκυρῶν* dicitur.

*Iulius Pollux lib. 2.* partes omoplatae sic distinguit, scapularum utraque & marginales partes *ὀστέα*, laterales partes *μυοστέα*. extensæ circa ceterum partes *πρόσθιον* nomenclantur, *πρὸς τὸν αἰμῶνα πέγει*: legendum potiùs *πρὸς αἶμα*, quia spina est superiecta mēse, huius medium secundum longitudinem vsque ad lumbos in ergo excavatum *κοίτη* dicitur, lego *σπίς*, aut *σπῆς*. Interea notabis à *Laurentio*, & ab aliis *χρῆμα* appellari gibbosam partem scapulae, cum ramen istud nomen nunquam huic parti attributum fuerit, sed dorso, vnde & thorax *χρῆμα* dicitur ab *Hippocrate*.

In hoc capite vnica difficultas occurrit de *acromy* significatione. An scapulae cum iugulo articulationem, vel vtriusque colligationem, vel ossiculum ambobus interiectum denotet? *Galenus* duplicem opinionem profert, nihilque decernit. *Hippocrates lib. 1. de articulis*, os esse distinctum pronunciauit, & in hac parte hominem à brutis discrepare. *Galenus in Comment.* modò cartilaginofum ligamentum, modò ossiculum esse scibit, quod ipsi luxarum fuit, dum iuuenis in palestra luctaretur. *Ruffus Ephesius* acromium clauis & omoplatae syndesmum esse credidit, quamvis *Eudemus* ossiculum perexiguum esse dixerit. *Vesalius* magnà imprudentiâ *Galenum* insultans, inconstantiam & ignorantiam in eo accusat, atque os istud confinxisse affirmat, quod illi quantumuis diligenter secanti nunquam apparuit. Propterea credit acromion esse commissuram omoplatae cum clauis, siue cartilaginem vtrique ossi interiectam, donec in homine tertium id os cartilaginofum illi occurrat. Liceat mihi nunc exclamare & obicere, *ὅς τὰς κακὰς ἀνθρώπων μύθους, ὅς τὰς κακὰς ἀνθρώπων μύθους, ὅς τὰς κακὰς ἀνθρώπων μύθους*. Possem si superstes esset, aut reuiuifceret *Vesalius*, illi demonstrare acromion esse ossiculum omoplatae spinæ adnatum, quod vnguis pollicaris latitudinem & longitudinem adæquat. Fateor in pueris cartilaginofum esse, sed in adultis vsque ad vigesimum annum, istud ossiculum seunctum deprehendi, quo simiam priuaram esse verè prodidit *Galenus*, idque ex decreto *Hippocratis, lib. 2. de articulis, part. 62.* et si secus scripserit *Vesalius*. Propterea frustra laborat *Comes Montanus, lib. 5. de morbis*, vt ostendat, *Galenum* non dissentire à *Vesalio*, mirorque *Sylvium* in *Vesalii* opinionem quodammodo inclinare.

Inde colliges quadruplicem esse *Acromy* significationem. Triplex fuit à veteribus producta. *Prima*, vt sit articulatio scapulae & clauiculae. *Secunda*, ligamentum cartilagineum duobus his ossibus interiectum. *Tertia*, quod sit ossiculum distinctum. Nonnulli recentiores *Anatomici*, extremitatem latam spinæ in omoplata pro acromio accipiunt, quia est *ἀγκυρὶς ὅμοια*. Interea in textu Græco mendum est, dum post *ἀγκυρῶν* addit *ἀγκυρῶν*. Delenda hæc dictio *ἀγκυρῶν*, nec legitur in *Codice Orbasii*, quamvis nonnulli nitantur autoritate *Galeni*, qui *lib. 3. administ. Anat. cap. 3. ἀγκυρῶν* dixit, subintelligendo harmoniam. Propterea vbi legitur *ἀγκυρῶν*, simpliciter, intelligi debere harmoniam, siue *ἀγκυρῶν*, aut *μυοστέα*, aut *αἰμῶνα* notat *Ingrassiam*. Vnde colligit *Galenum*, per acromion semper intellexisse scapulae & clauiculae commissuram. In hoc capite adhuc notandum cavitati glenoidi omoplatae subiectam partem angustiorē, *Ceraucem* appellari, licet capite careat. Nam *Ceraux*, vt in *proemio* notauit, est os paulò angustius ante caput, sed cavitates ad apophyses pertinent. Nam ab eminentius ossium sunt, atque eiusmodi eminentiæ orbiculares, capitis formam æmulantur.

Verè scripsit *Fallopins*, coracoidem esse epiphysim, quæ in pueris euidentior est acromio, quod tum est cartilaginofum, sed in adultis sensim progressu ætatis coracoides epiphys degenerat in apophysim, crescente & amplificato acromio, quod vigesimo anno epiphysicos naturam reginere vidi, cum tamen coracoides esset vera apophysis.



## COMMENTARIUS IN CAPVT XV.

## De Clauis.

## CAPVT XXI.



**S**PRIMUM Osthoracis sterni & acromio articulatum, *Clauis*, siue *Clauicula* dicitur, quod thoracem claudat, vnde iocosè & venustè *Philippus Rex Macedonum* suo Chirurgo clauiculæ penè petcuratæ præmium postulanti respondit. *Accipe quantum volueris, Clauis tene*: Nam ex *Aristotele*, lib. 5. *Ethic. cap. 2.* Clauis, os claudens thoracem, & instrumentum quo aliquid clauditur, significat. Vel quia clauis modo firmet & stabilizat cum sterni omoplatam. In Architectura clauis appellantur ligna aliis firmitudinem præstantia. Iugula quod iuga bouum referant, *Furcula* barbarolatini, quasi parua furca, & furca quod sit fulcrum, *κλίσ* dicitur Græcis, *κλίσ* ἢ *κλίσ*, quia iungit incurua. Aliis placet à claudendo, *κλίσ*, claudo.

Clauiculæ una pars *ἐπὶ*, *ἐπὶ* dicitur, ex *Polluce*: concursus vtriusque clauiculæ *ἐπὶ*, *ἐπὶ* dicitur, quod ea in parte viciū mactarentur.

Clauis autem omoplatæ opponitur, ne latum istud os in thoracem incidens, varios humeri motus impediret. Ideo in homine humeri articulus longius à thorace distat, vt ampliore spatio brachium liberè moueatur, & lasitudo thoracis maior, quàm in cæteris animalibus constituitur. Nec absurdè dixit *Picolesimus*, propter manus actiones datas fuisse clauiculas, quia nihil conferunt ad perfectionem thoracis, cùm bruta thoracem habeant, & penè cuncta clauiculis careant. Eleganter *Rossus Ephesus*, lib. 1. cap. 9. scribit, imo collo ossa sunt cum pectoris osse commissa, scapulas ne in pectus cadant prohibentia. Nam cætera animalia iugulis priuata sunt, quocirca latissimi pectoris homo est. Clauem omoplatæ subiunxit *Galenus*, vt demonstraret illam à thorace separatam esse, nec ad illius perfectionem quidquam conferre. Nam propter manus data fuit homini, vt repelleret omoplatam in posteriora, ne in pectus incidens thoracem comprimeret, manusque actiones impediret. Ideoque simia ridiculum hominis exemplar, quia manus habet, clauem obtinuit, quamuis vero acromio careat.

Cauernosam esse clauiculam, scribit *Galenus*, ex *Hippocratis*, lib. 1. de fracturis, cui reclamat *Columbus*, solidam esse sustinens in medio, sed in extremis fungosa est, ex duobus semicirculis veluti constructa.

Figuram / literæ Italicæ refert, vel vt loquitur *Rossus*, lib. 7. Clauis est ad tribuli formam efficta, instrumento illi, quod catheter dicitur persimilis. Quid sit *tribulus* *ignis* *tribulus*: non facile est assequi. An intelligat caulē tribuli herbæ aquaticæ, non terrestris? An verò lupatum quod ab equo manditur: Illud enim flexuosum est, & *tribulus* dicitur, ex *Julio Polluce*. Nam prope sternum introrsum caua est, extrorsum conuexa, vt venis iugularibus neruisque sextæ coniugationis, atque asperæ arteriæ locum præberet, versus scapulam introrsum conuexa, extrorsum caua cernitur, vt axillaribus venis, arteriis, neruisque in brachium progressis sedem accommodaret. Est autem clauicula ex duobus semicirculis constructa, vt esset firmior, minusque fracturis obnoxia. Verumtamen viris magis incuruatur, quàm mulieribus, quò fit, vt brachiorum agilitate inferiores sint. Sed hoc incommodum natura partis pulchritudine compensauit. Nam foveæ, quæ in viis supra pectus conspiciuntur, in mulieribus nullæ sunt, aut vix apparent. Vnde *Zopyrus Physiognomon*, *Socratem*, stupidum & bardum iudicauit, atque mulierosum, quod iugula concina non haberet. *Cicero* lib. de fato.

Connectitur suis extremitatibus, vtrimque ossibus, interiecta cartilagine crassiore, quæ ossibus non adnascitur: Sed per ligamenta articulum amplexantia ibi firmiter continetur, vt in motu brachij & scapulæ nonnihil cedere possit. Nec enim peculiari motu mouetur, cùm propriis careat musculis. Motum clauiculæ cum sterni *Hippocrates* *κλίσ* vocat, *κλίσ* ἢ *κλίσ*: cuius est *Motacilla*, quæ perpetuo caudam agitat.

COM

*De Brachio.*

## CAPUT XXII.

Præterea, interdum Offa potius ab usu & officio, quàm à mole & pondere magna dicuntur. Proinde non erit absurdum dicere humerum maiorem reliquis Offibus excepto femore, quoniam ab variis, magnasque actiones obeundas plurimum confert. Tradit *Galenus*, finem inferiorem humeri in condylos definire in duas partes, quarum externo radij caput per diarthrosim articulat, interno autem nullum Os committit. Ob id maior apparet, tam naturali amplitudine, quàm quod sit detectus. Imprimis notandum *Galenum* per condylos non intelligere eas partes quas vulgò usurpamus, nempe apophyses illas à quibus omnes scè musculi radij, carpi & digitorum emanant. Harum interna & infera apophysis latior est, ac maior superna. Sed intelligit tuberosas extremitates trochleæ humeralis. Nam subdit condylus interior & tam esse cavitatem, deinde radius tuberosam extremitatē huius trochleæ contigit, huic per arthrodiam articulat. Horum condylorum internum maiorem esse scilicet externo, quod est absolute verum. Nam amplior est ac clarius, nec ab articulatione cubiti contigit. Deinde si condylorum spatium & amplitudinem metiaris à media

linea trochleæ, maius intervallum infra lineam quam supra comperies. Idem repetit *Galenus, libro de usu partium, cap. 15.*

De humeri figura non minor extat apud *Anatomicos* contronerfia. Scripsit enim *Galenus, lib. de Ossibus, & lib. 2. de usu part.* Humerum non esse rectum, sed gibbum antèrius & extèrius, sùmm verò postèrius & intèrius. At *Hippocrates, lib. de Ossium natura*, ipsum extèriore parte incurvum & anteriore obliquum, & ad cavitatem rectà non ferri. Brachium dum oritur ab externa parte gibbum est, *lib. 2. de fract. part. 3.* Còtrà *Vesalius*, rectam esse figuram humeri contendit, *Galenum* erroris & inscitiz accusans, quam tamen designatam fuisse à *Galeno* cognosces, ex *Comm. ad part. 31. lib. 2. de art.* cylindri forma, quæ columnæ rectæ imaginem refert in nullo Ossè reperitur, magistamen in femore atque humero, quàm in aliis Ossibus conspicitur.

Figuram humeri qualem scribit *Galenus*, passim in variis sœcletis observavi. Sed convexitas magis apparet ad inferiorem & interiorem humeri partem, quia ibi humerum incurvari oportuit, ad amplexus & apprehensionem, quemadmodum cubitus & radius paululum incurvantur, & reliqua manus Ossa, ut facilius apprehendant, quod est illius proprium officium. Nonnunquam etiam humerum vidi foris convexum iuxta superius extremum: itaut literæ / Italicæ figuram exprimeret.

In pueris humeri sunt recti, sed ubi manus exercere incipiunt, paulatim incurvantur, ut sæpiusprehendi. Quare merito *Sylvius* suspicatur in nostris corporibus vitiatam esse figuram humeri, fasciarum compressu per infantiam, dum nutrices & obstetrices brachia adhuc cerea arctioribus & durioribus fasciis augere & constringere solent, quod vitium factum fuit naturale, ut figura capitis acuminata in macrocephalis.

Insicenter *Columbus* imponit *Galeno*, quod in parte inferiore humeri epiphyfes non agnouerit, cùm tamen *Galenus, lib. 2. de usu part. cap. 15.* ubi describit caput inferius humeri, apertè dicat epiphyfism habere duplicem, à quibus oriuntur ligamenta, quæ totam articulationem constringunt.

Notat *Aristoteles, c. vit. lib. de anim. incesso*, maiora & robustiora esse dextra, quasi natura vellet dextra à sinistris distinguere, ideoque observavit *Amazones* *Lusitanum cent. 4. cent. 100.* Os humeri dextri in statera librarum, præponderare Ossì sinistri humeri.

## COMMENTARIUS IN CAPVT, XVII.

### De Cubito.

#### CAPVT XXIII.



QVO inter brachium & carpum consistit, *Cubitus* dicitur, duobus constans Ossibus sibi inuicem incumbenribus, quorum infernum & longius *καχλῦ*. & *αἰών*, Latinis *Cubitus*, siue *Vlna* nominatur: supernum brevius *αἰών*: *καχλῦ* autem dicitur, *καὶ τὸ πρῶτον αἰὼν τὸ δευτέρῳ*, quod extremo brachij compactus sit, ex *Etymologico magno*: *αἰών* *καὶ τὸ ἑῷ αἰὼν* *αἰώνος* *καὶ αἰώνος*, quod ab ipsa opera peragantur, perficianturque, ex *Meletio*: inde Latinum nomen *Vlna* deriuatur, *αἰών* *αἰὼν* *τὸ πρῶτον* *αἰώνος*, *αἰών* *αἰὼν* *τὸν*: Vel *αἰὼν* *αἰὼν* *τὸν* *αἰώνος*, & per transpositionem *αἰών*: dicitur etiam *αἰώνος*, vel *αἰώνος*, ex *Polluce*. *Radius* Latinis à nota & figura textoris radij nominatur, *αἰών* autem significat duorum Ossium ad brachium commissuram, ex *Hippocrate*. *Galenus* in *Excessi* exponit Os cubiti, & cubitus, *τὸ αἰώνος* *καὶ τὸν*. *Discorides* verò *αἰώνος* *τὸν* *αἰώνος*, sic nominari scribit. Norat *Erosianus* dictionem illam *αἰώνος*, ex *Bacchio* tribui osculo cubi formam habenti in calcaneo, *αἰώνος* *τὸν* *αἰώνος*. *Hippocrates lib. de locis in homine* scribit, tum Os, tum radius in idem commissa, articulum in *αἰώνος*. siue cubiti gibbo faciunt, & eodem sensu bis vsurpat, *αἰώνος*, eodem *lib. de locis in homine*. Eadem particula, referente *Polluce* à *Medicis* *αἰώνος* vocatur, ab aliis *αἰώνος*, ut ab *Hippocrate*, *αἰώνος*, quod quidem nomen est *Doricum*, & eorum qui in *Sicilia* *Dares* sunt, vnde *Epicharmus* *αἰώνος*, cubito ferire dixit, ex *Isido* *Polluce*, & *Ruffo* *Ephefio*: *αἰώνος* autem dicitur, *καὶ τὸν* *αἰώνος* *αἰώνος*, & *αἰώνος*, ex *Etymologico magno*: vel à *αἰώνος*, quod multos habet angulos.



iecta ceruix appellatur. Huic vicina est protuberans asperitas, musculo carpi flexanti dicata, parte inferna tenuem apophysim educit, & in ambitu quatuor sinibus calatur, per quos musculorum tendines transversus obducti ligamenti tanquam per annulos traiciuntur.

In cubiti historia duo reprehendunt *Recentiores Anatomici*: quod *Galenus* cubiti supernas apophyses coronas appellari: Deinde quod apophysim styloidem dixerit carpo articulati, & motus obliquos dirigere. Primæ calumniæ author *Columbus* turpiter hallucinatur, dum cubiti apophyses triangulares obtuso potius, quam acuto angulo terminari affirmat, ac proinde perperam à *Galenus* coronas appellari. Fateor apud *Galenum* apophyses acutas coronas dici, sed si diligenter inspexisset, apophyses illas in acumen desinere vidisset. Neque necessum est illud omne, cui vox ista accommodatur esse acutum. Nam à curvitate & à rotunditate quædam Ossium partes coronæ appellantur. Maxillæ apophysis acuminata coronæ est, occipitis tubercula instar glandium depressa, cavitatibus primæ vertebrae articulata, coronæ dicuntur; ut à curvitate apophyses cubiti coronæ vocantur. Sunt autem apophyses illæ magnitudine inæquales. Posterior est maior, antica minor, quod à quibusdam imperitè, & contra rei veritatem negatur.

Altera calumnia quæ *Vesalius* autorem habet, & *Columbum* fautorem, faciliè diluitur. Negant styloidem apophysim quidquam conferre ad motus obliquos manus, siue motus obliquus sumatur pro laterali, ut in digitis, siue pro conuersione manus in pronum & supinum, ut semper *Galenus* eo sensu accepit, itaut nunquam inconstans fuerit, ut iniquè censuit *Vesalius*.

Quinetiam addunt falso scripssisse *Galenum*, sequenti capite, primum carpi Os sinuat esse, ut styloidem apophysim exciperet, quia hæc apophysis lateralem motum, qui fit inclinatione manus in utrumque latus, impediret: nec ipsam conuersionem in pronum & supinum regere potest, quia separatur à carpo interuentu cartilaginis. Adde quod Os illud carpi caret cavitatē ad excipiendam styloidem: inde concludit *Vesalius*, falsam esse *Galenus* doctrinam.

Æquior fuit *Ingrasius*, qui styloidem apophysim fatetur auxiliari obliquis motibus, non per diarthrosim, sed potius per symphysim syneurodim, cum per ligamentum ipsi officulo connectatur. Idem sentire & scribere videtur *Sylvius in Comment.* Ego verò duplicem motum obscurum manus agnosco. Vnum quando manus pronatur & supinatur. Alterum quando manus pronata, siue quando palma superficiem tangens rursus versus pollicem resupinatur. Motus ille obliquus quodammodo circulatoris est, quamuis uterque motus fiat ope radij: Plurimum tamen iuuat secundum motum obliquum, siue circularem styloides apophysis, cui tota manus tum firmatur & innititur.

Præterea in quibusdam sceletis obscurauit officulum tertium carpi leuiter excavatum, ut styloidem apophysim admitteret. Sed hæc diarthrosis laxa est, & fortissimi ligamenti interuentu perficitur, quod innuisse & significasse *Galenum* euidenter apparet his verbis, *lib. 1. administr. Anatom. cap. 10.* Considerabis in hoc cubiti processu, quem rectè ad paruum digitum porrectum graphoidem appellant: is docebit te, si totum articuli nodum in latera circumagas, quo modo obliquis motibus minisset, quos extremæ manus circumductu molimur. Quare *Vesalius* & *Columbus* immeritò *Galenum* reprehendunt, quod tradiderit carpi portionem cubiti cavitatē glenoidē excipi, quia totum carpum ad radium pertinere volunt, quod est falsum. Nam alibi *Galenus*, *cap. 11. lib. 2. de vsu partium*, agnoscit duplicem articulationem cubiti ad carpum, vnam ipsius cavitatis, alteram apophyseos styloidis, quod sequenti capite declarat.

## COMMENTARIUS IN CAPVT XVII.

## De Carpo.

## CAPVT XXIV.

**D** XTERMA manus *αρσεν*, in tres partes diuiditur, in *Carpum*, *Metacarpium* & *Phalangem digitorum*. Est enim manus duplex acceptio, vel sumitur à scapulis vsque ad digitos, & tum diuiditur in tres partes magnas, *Brachium*, *Cubitum*, & *manum extremam*: vel *manus* accipitur pro eo spatio, quod ab extremitate inferna cubiti ad digitos vsque porrigitur: & iterum diuiditur in tres partes minores *Carpum*, *Metacarpium*, & *Digittus*. *Aristoteles libro primo de historia animalium*, Manus partes constituit *Νύκ* & *Δακτύλ*, Volam & Digittos: *uiris* verò ab eodem definitur, brachij manusque articulatio: *αρσεν* à *αἶρα*, & *αἰρῖν* *αἰρῖν*. Sic dicitur, quasi *αἰρῖν*, à dictione *αἶρα*, quod est desiccio, quia carpus est aridus & excarnis. Vide *Etymologicum magnum Græcum*: *καρπὸν* verò vocatur à *καρπῶν*, capio, vel *αἰρῖν* à *καρπῶν*, quod ea pars facile agat, vel potius *καρπῶν* ab utilitate nomen accepit, ex *Μελέτιο*, & *Etymologico magno*.

*Manus* autem Latinis dicitur à manando, quod ex brachio dependeat, vel quod ex ea digiti emanent: vel manus totius corporis munus est. Putabat enim *Anaxagoras* hominem, quia manus habet, animal esse sapientissimum: Sed *Aristoteles* homini, quia est animal sapientissimum, manus datas fuisse iudicauit. Manus, si credimus *Scaligerum*, dicitur à dictione *μῖν*, vel à *μῖν*, quæ dictio manum significat, & *μῖν* à *μῖν* deducitur, quia manus est in ramis digitorum diuisa. Manus pars secunda *Aristoteli*, *Νύκ* dicitur, à *Νύκ*, quod est verbero. Verùm ex *Galeno*, *Comment. ad part. 20. lib. 1. de fract.* prominentiores palmarum partes *Νύκ* dicuntur, *Νύκ* verò Latinis dicitur *Vola*, à iactu *πῦρ* ex *βῆμα*, inde volares lapides, & volena pyra apud *Virgilium* 2. *Georgic.* Tota manus expansa dicitur *Palma*, & *μαρὰ* *Græcis*. Externa pars manus nervosa nomine caret ex *Aristotele*, à recentioribus Anatomicis Græcis *Metacarpium* vocatur.

Est autem manus instrumentum apprehensionis, cuius prima pars *Carpus*, octo constat Ossibus, solidis, inæqualibus, quæ propterea *Ruffus Ephesus*, *μετακάρδια* vocat, quod pineæ con nucleum forma oblonga, & inæquali referant. Dura sunt & inæqualia, ad dyspathiam, & motus facilitatem. Quod autem est inæquale & multiforme, extrinsecus occurrentibus facillè cedit, eorumque violentiam exoluit, quod est planum & vniforme, citius patitur. Tamen inuicem colligantur, vt Os vnum appareat, foris conuexum, intus cauum, quò securè vasa, & musculorum tendines transmittantur.

In duos ordines digesta sunt, vt diuersis articulorum modis cubito & pollicari articulentur, quò expeditius variis manuum functionibus inseruiant. Nam vnica serie collocata deformem *Carpum* reddidissent, & manus actionibus incommodasset. *Prima acies tribus Ossibus* constituit, altera ex quatuor Ossibus constat: *Ossa nam Os* superest extra ordinem, sed cum *Sylvio* & *Vesalio*, ad primum ordinem referetur, cum Ossi tertio primi ordinis insideat. Sunt autem inter se iuncta per *synarthrosim*, non vt quidam putant, per *symphysem* connata, atque ligamentis nervocartilagineis connectuntur.

Hoc loco *articulationis speciem* designat, *synarthrosi* est ratione motus obscuri, & sub finem capituli secundum ordinem carpi metacarpio iungi per *synarthrosim* scribit, propter motus obscuritatem, quemadmodum primus ordo cum cubito & radio articulator per *diarthrosim*. Atqui Ossium carpi inter se connexiones, sunt partim *arthrodiz*, partim *enarthroses*.

Quare *synarthrosi* præter proprias tres differentias, alias adhuc sub se comprehendit ratione motus obscuri, non structuræ. Vel Ossium carpi inter se *synarthrosi* harmonia erit, ex *Galeno*, *lib. 2. de vssu partium*, cap. 8. *Columbus* quoque animaduertit *Brachialis Ossa* inter se motu non carere, etiam si nullos habeat musculos ad motum.

Contrà *Fallopius* primum ordinem cum secundo iungi affueat, laxo quodam articuli genere, in quo aliquis adest motus, & satis manifestus, præcipuè ad posteriora, atque omnia ferme Ossa inter se iuncta esse per diarthrosim, potius quàm per synarthrosim. In ea opinione est *Eustachius*, qui primam aciem cum secunda per diarthrosim articulari putat, eumque motum flexione & extensione fieri, non minus quàm prioris aciei evidentem esse, & magnam partem ad eum obcundum conferre.

Obiiciet aliquis *Galenum*, lib. 2. de usu partium, cap. 8. Ossa carpi per diarthrosim coniungi proposuisse, cum tamen hic contrarium scribat. Responderem *Galenum* hoc libro obsecrum & latentem motum spectasse, alibi ad nexum satis laxum respexisse.

*Galenum* carpi *Columbus*, quod Ossa carpi solida & medullæ expertia dixerit, imò cauernosa & medullosa suslinet. Dicuntur à *Galenis* solida, quia pumicosa, cauernulas, non cauitates habent, abundant succo medullati, non medulla: quo sensu *Galenus*, lib. 1. de usu part. digitorum Ossa cauitate & medulla carere dixit, quod reprehendit *Vesalius*: cum tamen *Hippocrates*, propter duritiem & soliditatem Ossa digitorum difficillimè frangitauerit, scit. 2. de fracturis, part. 9.

*Galenus* hoc libro, & alibi, disertè octo tantum Ossa carpi constituit, & enumerat, quæ in duos ordines disposita esse scribit. Nec pudet recentiores *Anatomicos* adhuc accusare inconstantiam & dubietatem *Galenis*, qui modò octo, modò nouem assignauerit. Quod malè collocauerit octauum numero, siue quartum Os carpi, ordine & situ, dum ordini secundo adscribit & attribuit. Quinetiam incertus est, quodnam primum vel secundum Os appellari debeat, & quo numero illud Os extra ordinem aliis insidens sit indigetandum.

Quod ad primam obiectionem attinet, scio *Galenum*, libro secundo de usu partium, cap. 12. mentionem facere cuiusdam officuli sesamini, positi ad primam aciem carpi iuxta magnum digitum: *Nonum*, inquit, aliquis poterit hoc carpi Os numerare, sed non est numeratum ab *Anatomicis*. Nec ipse *Galenus* adstruit, & adiungit, quia reperitur tantum in simiis: *Fallopius* istud Os in homine nunquam deprehendere potuit, suspicaturque hunc locum corruptum esse: nec inferri potest ex hoc capite nouem carpi Ossa *Galenum* proposuisse, quando tertium primæ classis Os triuè esse voluit. Nam ista vox non tantum geminum, sed etiam bisdum significat, quale est Os in medio angustum, in extremis tuberosum.

De numero Ossium cuiusque ordinis, siue aciei contronertitur. Nam *Galenus* tria in primo ordine ponit, quatuor in secundo, quibus adiungere videtur octauum. Sic *Fallopius* secundo ordini quinque tribuit, ex mente *Galenis*, quamuis in *Commentario sequenti* capitis se retractet, & ad primum ordinem referat, quantumque nominet. Manifestè declarat *Galenus*, se id officulum ad Os primi ordinis referre. Portio carpi inferior suis quatuor Ossibus metacarpi per synarthrosim articulator, quintum verò Os ei parti insidet, quæ iuxta styloidem apophysim maximè sita est, quare officulum illud erit quartum primi ordinis, non octauum secundi ordinis. *Galenus* quidem libro secundo de usu partium, cap. 12. hoc officulum octauum appellauit, sed ad nullum ordinem reuocauit, aliis superiectum esse scribit. Quapropter qualibet classis quatuor constabit Ossibus, quamuis primæ classis tria tantum cubito & radio coniungantur, quartum illud extra ordinem primo superstat & incubat.

Quæritur adhuc vnde numerari debeant, vbi primum vel secundum assignare possis. Inutilis prorsus hæc quæstio, quam tamen mouit *Fallopius*, vt demonstraret *Galenis* contrarietatem, qui hoc capite incipit ab Osse, quod styloidem respicit, succedens Os vocat, secundum, tertium quod est triuè, à radio comprehensum. Contrà, libro secundo de usu partium, primo loco ponit Os, quod subicitur pollicis, vt tertium facit, quod styloidi subternitur. Vtrumque Os tertium nominari potest, prout in eo operis numerare vel describere ossa. At tamen *Fallopius* iudicat illud Os, quod radio suppositum est, respicitque pollicem, quia maius & præstantius ratione pollicis, primum locum mereri.

Falissimum est, quod *Vesalius*, & *Columbus* *Galenis* imponunt, nempe prodidisse quartum carpi officulum excavatum esse, vt styloidem exciperet. *Galenus* expressis verbis intelligit primum Os primæ classis carpi, & ante me *Fallopius* hanc imposturam derexit in *Observationibus*. Huic Ossi, quod dixit esse quartum, quidam *Galenus* adscribunt, quod ipse nonquam somniauit, in simiis quendam sinum adeste, cui vlnæ processus styloides dictus aptatur. Verùm in simiis non reperitur, neque *Galenus* vn-



quam id in dicto Osse cogitauit, verum tertio primi ordinis Ossis assignauit, uti plane in simiis obseruatur. Ego verò non tantum in simiis, verumetiam hominibus huius Ossis cavitatem glenoidem obseruari, possumque in quibusdam sceletis demonstrare, quæ cavitates cartilaginei ligamenti interuentu in viuientibus augetur, & ab ea cavitare oritur ligamentum, quod styloidem apophysim huic Ossi connectit & adstringit.

Reprehendit *Galenum*, quod medium, siue secundum Os carpi cubito & radio interiectum esse dixerit, cum tamen totum excipitur cavitare radii. *Responderem* cubitum attingere extremitate sua.

## COMMENTARIVS IN CAPVT XVIII.

### De Metacarpio, & Digitis.

#### CAPVT XXV.



**A**RTO succedit Metacarpium, quinque Ossibus extructum, si *Celso*, & *Rasso* credimus, quibus non obscuri nominis *Anatomici* suffragantur. Quia primum Os pollicis Ossibus metacarpij annumerant, quod cum aliis palmam constituit, & Brachiali iungitur, & in diuisione manus cum reliquis digitis continetur. Lieet enim euidentiùs moueatur, quàm communia metacarpij Ossa, non ob id ab Ossibus metacarpij excludi debet, cum quintum Os, quod minimo digito subiicitur, manifestum motum habeat. Supra infraque appendicibus donatur, ex quibus ligamenta prodeunt ad continendam articulationem, quæ cum digitis enarthrosis est, cum carpo gynglymos.

Hæc Ossa intus lima, & secundum longitudinem angulosa, foris gibba sunt, quin etiam fistulosa, ut medullam contineant, suisque extremis exactè coniuncta in medio dehiscunt, ut musculus interossei sedem præparent, & digitis fundamentum præbeant, externa facie nonnihil, quàm interna latiora sunt.

*Digitis sic appellati*, quod sint decemter innecti, vel à *Διόδο*, tanquam *Διόδο*, vel à *Διόδο*, id est, *Διόδο*, accipio, quia digitis, & ostendunt, & accipiunt. Græcis *Διόδο*, vel à *Διόδο*, vel à *Διόδο*, vel à *Διόδο*, quasi *Διόδο*. Inter digitos manus, *Pollex* dicitur à pollendo, Græcis *Πόλlex*, quia est inftar alterius manus. Huius raris est præstantia, ex *Aristotele*, libro quarto de partibus animalium, ut quemadmodum, si manus non esset, apprehensio non esset, ita si pollex decisset, apprehensio non esset. Hic quim cum ex aduerso sit oppositus reliquis, vnus brevis quidem non longus, velut ille ab inferioribus sursum agit, reliqui à superioribus deorsum.

Sunt autem *Digitis* numerus quinque, singuli 30 Ossibus seriatim, & velut in acie dispositis constant. Vnde *Πόλlex* & *Μετακαρπίον* dicuntur. Vel quia sunt rotunda, quæ enim à *Πόλlex* & *Μετακαρπίον* significat, quo baiuli ferendis oneribus vtuntur, ita & *Μετακαρπίον* baculum denorat. In digitis, inquit *Aristoteles*, libro primo de historia animalium, *καρπίον* videtur, à *Μετακαρπίον* quæ est. Dicitur autem *καρπίον*, quasi *καρπίον* ut de, quia in flexu vacuatis apparet, vel *Πόλlex* ut *Πόλlex* *Μετακαρπίον* ut de, ex *Μετρίο*, & *Ετυμολογία* Græca. Digitorum Ossa ex ampliore basi in mucronem coarctantur, itaut primum Os secundum, & secundum tertium longitudine, crassitie, & latitudine superet.

Prima phalanx Ossium cum metacarpio per enarthrosim iungitur, reliquæ inter se per gynglymum articulantur. Nec vera est *Galen*i sententia, ut rectè animaduertit *Columbus*, prioris Ossis caput in subsequenti sinum semper inferi per arthrodiam, nisi de prima articulatione hoc intelligatur.

In hoc capite duo notatione digna occurrunt: primum de numero Ossium metacarpij, alterum de articulatione Digitorum. Prudenter, & cum ratione *Galenus* ab Ossibus metacarpij Os primum pollicis seianxit, quia cum carpo per diarthrosim articulatur, quæ non conuenit aliis Ossibus metacarpij per synarthrosim cum carpo iunctis. Propterea pollex motum manifestum habet, & *Πόλlex* nominatur: quam rationem de industria *Galenus* adiunxit, ne quis cum *Aristotele* crederet Ossibus quinque

metacarpium constare: quod etiam *Endemus* proposuerat, ratus similem esse plantæ & metacarpi structuram, utrumque Ossibus quinque contextum esse, quod reprehendit *Galenus*, libro tertio de usu partium, cap. 8. Minorque nostros sagaces Anatomicos, *Vesalius*, & *Columbus* in eundem errorem lapsos, primum Os pollicis ad metacarpium referentes: Quia, inquit *Vesalius*, tota sua forma metacarpi Ossibus respondet, & eadem articulationis specie committitur, teste *Columbo*. Addit *Platerus*, palmam cum aliis constituere, nec phalangem digiti maioris, ut in reliquis efformare.

Ossa metacarpi longitudine & crassitie sunt inæqualia, *Galenus* primum indici digito præpositum longissimum & crassissimum esse prodidit: contra *Columbus* tertium longissimum esse statuit, sed æqualia longitudine, si commensurentur inuenies.

Reprehendunt *Vesalius*, & *Columbus*, quod similem articulationis formam omnibus digitorum Ossibus *Galenus* tribuat, quando scribit priorem semper phalangem in cavitatem subsequenti insinuari, cum tamen sit gynglymos, non arthrodia. Sed hoc non ignorauit *Galenus*. Nam libro primo de usu partium, omnes digitorum articulos per mutuum ingressum fieri scripsit, quapropter existimarem hæc verba interpretanda esse de prima articulatione digitorum. At dices? Ossa metacarpi phalanges erunt. Quidni? cum primum Os pollicis, quod modò metacarpio attributum, modò separatum, phalanx à *Galeno* dicatur. Vel referte poteris hæc verba (priori semper phalange in cavitatem sequentis subeunte) ad pollicem, de quo prius egerat, cuius prima phalanx cum secunda per arthrodiam iungitur, eademque phalanx carpo per gynglymum, idcirco ab aliis digitorum phalangibus differt, ut mox demonstrat.

## COMMENTARIUS IN CAPVT XIX.

### De Ossibus cum Osse Sacro commissis.

#### CAPVT XXVI.



VERIADMODUM Omoplatam ad manum reuocari, sic magna illa ossa, quæ truncum Corporis sustinent ad pedem refero, quoniam ab his dependet, & a iunctis, totum crus, siue *crura*, ex *Aristotele*, libro tertio de historia animalium, cap. 7. Imo totum Corpus sustinent vice fundamenti. Sunt enim immobilia, dum spina seorsum mouetur, vel femora mouentur ad incessum, ut suprà, & infrà hæc Ossa reliquorum motus ederetur. Nam superaliquo quiescente motus fieri debet, ex *Aristotele*, lib. de progr. animal. Interdum tamen hæc Ossa iuncta cum Osse Sacro, constituunt compagem quandam Ossium, quæ seorsum mouetur in actu venereo, ut copiosè demonstravi, lib. 5. *Anthropographia* cap. 31. isthæc Ossa ex *Orbasio* sunt innominata, ab aliis Ossa Ilium, vel ischij dicuntur. Posterius Ossi Sacro, antèrius per symphysem inter se connechtuntur. Separata ab Osse Sacro figuram muliebris ventilabri quodammodo æmulantur.

Quamuis continua in adultis appareant sine vlla diuisione, sunt tamen tripartita in pueris vsque ad septennium, & eiusmodi portiones in vnum coalescentes propriis nominibus & limitibus discernuntur. *Posterior* pars tenuis Ossis latitudinem constituens, & ad medium acetabuli exprorecta, *Os Ilium* vocatur, *ἰλιάσιον*. Altera portio in duas partes secatur, dimidiata & superior pars *Os pubis* vocatur, *ἰνὸν* *ἰνόν*: cuius conjunctio cum altero congenere efformat Ossa, *Les Os barres*, nostrâ linguâ dicta. Altera dimidiata pars, & inferior, *ischij*, siue *Os ischij* nominatur, vel *Os Coxendicis*, *Celsi*, simpliciter *Coxa*, *ἰσχίον* verò, quasi *ισχίον*, robur, vel ab *ἰσχίον*, contineo: vel dicitur, *ἰσχίον* *ἰσχίου*, quod sustineat sedentes, vel *ἰσχίον* *ἰσχίου*, & *ἰσχίον*, quod ea pars sit admodum gracilis & extenuata, apud *Pollucem* *ἰσχίον* dicitur, vel neruosum ligamentum necens femur coxæ, atque hic articulus eodem nomine vocatur, quæ quidem articulatio etiam *ἰσχίον* dicitur à *Galeno* in *Exercitiis*. Apud *Hesychium*, *ἰσχίον* & *ἰσχίον*, ab *Homero* *coryle* ipsa vocatur *ἰσχίον*, ut docet *Galenus*, *Comment. ad part. 10. lib. 2.*

de fracturis. *Coxa* nominatur, quasi *Costa*, quod sit veluti columna corporis, vel à *cogendo*, quod femur cogat, id est, coarctet, unde *incoxare*, in *coxam* sedere.

Ex tribus istis partibus prægrande acetabulum, siue acceptabulum Græcis *ὠμα* efformatur: In quod femoris caput tereti & validissimo ligamento copulatum concoluitur. Huius cavitatis supercilia, acuta & foris aspera, validissimum ligamentum producunt, quod totam articulationem (quam à *ertebrum* vocat *Celsus Aurelianus*, à conuersione; vnde que amplexatur.

Hæc *Ossa* triplicem vsum præstant, truncum corporis fundamenti vice firmant & sustentant, pudendi ligamentis & musculis partium subiectarum originem præbent, & ambo iuncta, cum *Osse Sacro* peluim efformant, quæ intestina, vesicaus, & in mulieribus vterum continet, & obuiat.

*Os ilium* amplissimum est, intrinsecus cauum, foris conuexum, circa pyxidem, & *Os Sacrum* rotundius causâ crassius. In eo ad musculorum doctrinam multa notant & obseruant *nostra Anatomica*. Supernam periphæriam *Costam* vocant, cuius margines, tam externæ quàm internæ *Labra* dicuntur. Proinde labrum erit internum, quod ventrem respicit, alterum externum foris eicctum. Præterea in *Ossè ilium* versus anteriora dua *spina* sunt, una inferior acetabulum incubans, altera superior costam terminans, quæ quidem posterius terminatur *spina* notabili, qua parte *Ossi Sacro* committitur. *Galenus dorsum* vocat, quod nos *Costam* dicimus, & *spinam* quod ab anteriore costæ *spina* vsque ad *Os pubis* extenditur.

In *Ossè pubis* *spina* obseruatur, prope summam ipsius cum altero congenere commissuram, cui maximum foramen subiectum ab ostij similitudine *dupudis* appellatum. Pubi adscribitur *Galenus* ischio leuitatis gratiâ factum est, duraque membranâ exactè clauditur, quæ verimque incumbentes musculos obturatores determinat. In foraminis parte superiore *Sinus* quidam obliquè decliuus adest, per quem vena & arteria cruralis, & vasa spermatica deferentia demittuntur, atque ei aculantia supernè remeant. Excutebat *Colombus*, dum cum sinum in mulieribus reperiri negauit.

In ischio notari debet *spina* cotylæ subiecta, & sub ea tuber eiusdem *Ossis* crassum, quibus interiacet profundus sinus, in istis *Ossibus* appendices duas osseas obseruabis. Nam *costa* *Ossis* *ilium* epiphyssi cartilaginea coronatur, tuberculum quoque ischij epiphyssi cingitur, quæ in senibus coalescunt, & in propriam *Ossis* substantiam degenerant, in corporibus ætatis medix adhuc separatæ manent.

Quidquid in hoc capite traditur, ab omnibus laudatur & recipitur, hoc solum miratur *Fallopium*, cur veteres huius *Ossis* tres partes nominibus propriis distinxerint, cum non sint distinctæ. Gloriatur se primum hoc detexisse & significasse, quia in pueris tribus partibus constat. Id tamen tacitè declaratur à *Galeno*, cum scribit *Os* istud corporis latissimum non habere nomen proprium, quia non est vnum, sed triplex. Cuius pars latior intra ventrem recondita *Os Ilium* dicitur, pars inferior post ingressum femoris *Os Ischium*, pars anterior, cui penis affixus est. *Os Pubis* nominatur: paulò post, grande illud acetabulum ischio tribuit, quamvis recentiores *Ossi* *pubis* grande foramen, quod obturatores occludunt, adscribant. *Ossa* *pubis* inter se coniungi per symphysim notat *Galenus*, quæ non impedit *Ossium* *pubis* disunctionem in partu, quam in multis mulieribus, tam in enixu, quàm post partum mortuis obseruauit.

Hæcque symphysis in viris, atque mulieribus non est adeo stricta, atque voluit Recentiores, vt dirimi nequeat, nisi vi adacto scalpello: Nam qui commissuram exactè deprehendere potest, scalpello acutissimo, cuius dorsum æquale sit aciei, facillimè separabit, tam in viris, quàm mulieribus. Fundum cotyles exasperatum est, & labrum cavitatis iuxta foramen ouale *Ossis* est abruptum, ac velut interitulum, vt huic parti ligamentum robustissimum adnascetur. Nec per eam fissuram tendo musculi obturatoris cavitatem subit & ingreditur, vt perperam opinatus est *Carolus Siphonius*.

## COMMENTARIUS IN CAPVT XX.

## De Crure.

## CAPVT XXVII.

**P**EDES ambulationis organa manibus proportionē respondent. Horum enim causā homo bipes factus, ideoque solus inter animalia stare, & sedere potest ad omnes manus operationes honeste exercendas, ex Galeno, lib. 2. de usu partium, cap. 2. & 3. Sed pedis, ut manus non est duplex acceptio, vna lata, quæ ab Osse ilium ad digitos pedis extendatur, ut in manu, quæ à scapula ad digitos vsque porrigitur. Altera stricta, quæ *ἄνω πὺν* vnde significet, ut Plato vocat, quandam enim similitudinem habent inter se totius cruris & brachij partes, qualis enim est humerus in brachio, tale est in crure femur, quale item in brachio est, id quod inter cubitum & manum, tale in crure, id quod inter genua & pedem. Reliqua verò pars manus pedi respondet.

Cæterum manus apud Græcos non inuenit nomen distinctum à toto brachio, sicuti Pes. Quare Hippocrates meritò pedem simpliciter *πῦν* vocauit, *ἄνω* vocabulo non adiecto. Sed manum dixit *ἄνω πῦν*, ex Galeno, Comment. ad part. 3. lib. 2. de fract. & cap. 2. lib. 3. admin. Anatom. Totum illud quod toti manui opponitur, Aristoteles, libro primo de historia animalium, *πῦν* appellat, quod Latine reddidit Crus. Cuius partes sunt ex eodem, Femur, Tibia, & Pes, *μῦς*, *κνῖς*, *μῦς*. Ex Iulio Polluce, *μῦς*, ex Femore, Genu, Tibia, Malleolo, & Pede constat. Quod verò ex Femore & Tibia, *κνῖς* & *μῦς* vocatur. At *μῦς* dicitur à *μῦς*, quod est diuido, vel *μῦς*, quasi *μῦς*, siue *μῦς*, quod ista pars per excellentiam sit eximia. Femur Latinis dicitur à ferendo, & Crus à currendo.

Est autem Pes instrumentum ambulationis, *πῦν* *αὐτῶν*, Pedum enim est officium tutò & securè incedere, ut scribit Aristoteles, libro quarto de partibus animalium, cap. 10. arque basis & fundamenti vsum præstant corpori, quinetiam propter conformationis similitudinem cum ipsa manu: Pes est instrumentum quodammodo apprehensorium, ut historiz docenteorum, qui in defectu manuum, pedibus vsi sunt. Nec ineptè nonnulli Pedem, manum inferiorem vocant.

Femur à coxendice incipiens, est Os omnium in corpore humano maximum & longissimum. In brutis breuius est tibia, maioriq; ex parte intra ventrem delitescit, & absconditur, insigniter fistulosum est ad leuitatem, & medullam pro alimento asseruandam. Anteriùs conuexam, posteriùs cauum ad sedendi commoditatem, & ambulationis firmitatem. Galenus lib. 3. de usu part. cap. 9. Femur ex Aristotele lib. 1. de hist. anim. est *ἄνω πῦν*, ratione vtriusque extremi capitati.

In vnoquoque quædam obseruanda veniunt. Ac primùm in superiore notari debet Caput rotundum coxendici articulatam, quod Hippocrati, lib. de Ossium natura, epiphyfis est, ex qua nascitur Nervus, qui Femur acetabulo colligat & adstringit. Huic substrata pars gracilior Cernix dicitur, quæ acetabulo foris extriorum abscedit, ut musculus inferna parte collocandis, itemque magnis venis, arteriis, nervis & glandulis vasorum diuisionibus præpositis locum relinqueret, inquit Galenus, lib. 3. de usu partium.

Ceruici adiacent duæ epiphyfes, quæ in pueris epiphyfes sunt, quam naturam in adultis sæpe retinent, præsertim minor, quæ interdum ex motu diuulsa fuit obseruata ab Ingrassia. Quinetiam maiorem epiphyfis diuulsam in qua dragenario, Param obseruauit: attamen citiùs in apophysim degenerat minor, quàm maior, quam sæpius in adolescentibus vsque ad decimum octauum, & vicesimum separatam vidi. Istæ apophyses à femoris reuolutione *ἑρῶν*, rotatores Anatomici nuncupant, *ἑρῶν* *ἑρῶν*, quod est *ἑρῶν*, ex Suida, qui musculos obliquis motibus præfectos excipiunt. Apophysis superior *ἑρῶν* maior dicitur, & Galeno, *ἑρῶν*, quod nomen Meletius tribuit capiti femoris, Etymologica magno cotyle, & *ἑρῶν* *ἑρῶν*, habens ob leuitatem, ex Meletio, & Etymologica magno Græco, *ἑρῶν* etiam dicitur Iulio Polluci, ca-

put femoris, & *unusquisque*, à cavitare ischij, quæ constituit istam articulationem. Altera apophysis veluti mammillaris, & *minor* appellatur. Ab ea per longitudinem positi femoris aspera quædam linea, seu columella producit, musclicorum origini & insertioni dicata, quæ videtur etiam ad robur incuruati femoris apposita, ne pressum trunci pondere, medium effingatur. Ratione huius columellæ ridiculè *Achilinus* existimauit, Os femoris in dextrum & sinistrum diuisum esse, in femina lumine opposito apparet ligamentum, in masculo non. Sed coquendum os vsque ad consumptionem ligamenti, ad separationem ossium, tum apparet in masculo ossis dualitas.

*Alterum femoris extremum inferius*, priusquam in duo capita inæqualia findatur, paulatim latefcit & crassescit, vt basim latam & amplam his capitibus suppeditare possit: quibus antè & retro cavitare interiaret. Anterior leuiter pressa ingressu patellæ oppleretur, posterior profunda est, sed vacua & inanis, quam intellexit *Plinius*, lib. 11. nat. histor. cap. 45. In ipsa genu utriusque commissura, dextra lanque, à priore parte, gemina quadam buccarum inantitas inest, qua perfricta, cum ingulo spiritus fugit. Gemina hæc capita tibie per gynglymum laxum articulantur, qui permittit tibiam ad latera contorqueri. Huius articulationis pars anterior *syn*, posterior opposita *syn*, Latinis *Poples* dicitur. Inter omnes articulationes solam quæ in genu est, exactè iustam scripsit *Hippocrates*, libro tertio de fracturis. Neque enim femoris & coxæ articulatione recta est, sed obliqua: Neque ipsum humeri caput è regione scapulæ situm est. Quod si cæteras species commissuras, nullam inuenies habere eam æqualitatem, quæ in genu obseruatur, ait *Galenus* in Comment.

Cæterum, femur non tantùm ambulationis, verumetiam stationis & reſtitutionis causa est. Nam propter femora ad perpendicularum spinæ subiecta, hominem rectum esse pronunciauit *Galenus*. Si quis huius articulationis naturam noſtæque reſtitutionis causam attentè considerauerit, vtrumque plenum admirationis inueniet. Femur per apophysim incuruam, quæ *Cervix* dicitur, coxendici obliquè articulat. Hæc apophysim medium coxendicis non attingit, vt corpus stare in æquilibrio, sed extremo coxendicis affigitur, tanquàm interpenſua trabes è parietibus producta, quemadmodum cephoræ mitulorum ad ſuſtinendas colluquias: Sic ischia gestantur à femoribus. Coxendix enim non est spinæ subiecta, sed erecta, ac veluti vallum obiecta ventrem circumdat, nec femur ad perpendicularum coxendicis, nec spinæ subiicitur. Cùm igitur totius trunci pondus in posteriora vergat, inæqualiter totum corpus ſuſtinetur, quod vernaculè dicimus, *il est porté à faux*. Verùm si natura femur mediæ coxendicis appoſuiſſet, corpus quidem fuiſſet in æquilibrio, sed non tutè & commodè in alterutram partem inclinaretur. At cùm omnis actio in anteriora fiat, ponderis æqualitate faciunt interanea omnia, quæ anteriorum vergunt. Præſtitit itaque coxendicis articulum eo modo componi, vt mouenti facultati, quæ anteriorum corpus inclinat, trunci moles & pondus retrorſum obſiſterent: ſic enim à ſpina tanquam ab aduerſo pondere, truncus in ſtatum reducit. Reniſus quoſdam habent partes inter ſe in ipsis flexuris, ait *Ariſt.* de motu anim. & omnino ad depreſſum id quod deprimi, quamobrem *Pentathli* plus ſaliunt, ſi halteras habeant, & qui currunt, celerius feruntur, ſi manus commouerint. *Ibidem* ſcribit animal, quod erectum ambulat, neceſſariò eſſe bipes, & ſupernas corporis partes habere breuiores inferioribus: Ob eam cauſam ſolus inter animalia homo erectus exiſtens, crura habet ad ſupernas corporis partes ex pedeltribus maxima & firmiſſima. Hominibus & quadrupedum generi, ſi ab exigua ſtatu coxa eſſet femur, & reliquum crus, valde proſecto ad lapſus pronum eſſet corpus. Nunc autem longa exiſtens ad medium vsque protenditur ventrem, quamobrem ibidem ſuſſulta crura vniuerſum geſtant corpus, ex *Ariſtotele* cap. 11. lib. de animalium inſeſſu.

In femoris historia diuerſi *Anatomici* diuerſa reprehendunt, quæ ſigillatim annotabo, & expendam. Caput femoris eſt epiphyſis, atque trochanteres ſunt epiphyſes, etſi dicantur apophyſes exiguæ, quod eſt verum in homine, quia ſimilia maiores habet proportionem femoris. *Eulaſchius* hic mendum ſubeſſe pntat, & hunc locum reſtituit. Nam pro *ſimilioris de iſte dicitur pntat* cum nro ſi nro, id eſt, apophyſes habet duas paruas ſub huius ceruice, legit, *ſimilioris de iſte dicitur pntat*, cum nro ſi nro, id eſt, apophyſes habet duas parum infra huius ceruicem, quod verum eſt. & cum iis, quæ alibi ipſe ſcribit, conſentit. *Ingraffian* quoque textum *Galen*i emendat, cùm agit de tertio li,

gamento, quod est in medio posterioris & inferioris regionis, legendum anterioris, & *in* *im*, reponit, *in* *im*. Idem *Ingraffias* contra *Pesalum* & *Calambum* asseuerat articulationem femoris cum tibia non esse gynglymoidem, sed duplici articulatione dextrâ & sinistrâ per enarthrosim fieri, ideoque tibiam ad latera contorqueri posse immoto crure, quam actionem perficit Popliteus, ex *Galen*. Cavitas verò duobus condylis interiecta facta fuit, vt ab ea ligamentum robustissimum enasceretur, quod tibiz tuberculo alligatur, quinetiam cartilaginez duæ crassæ semilunares tibiz: cavitates implent & adæquant, itaut capita femoris per gynglymum articulari nequeant. Femoris figuram parte antica & externa gibbam esse scribit *Galenus*, posticâ internâque parte simam, quod non admittit *Fallop*ius, de internis externisque partibus, quoniam antè femur gibbû est, retro simum, non autem externè gibbû, internè simum. Sed possum femora ostendere simili figura prædita & conformata, qualem descripsit *Galenus*.

## COMMENTARIUS IN CAPVT XXII.

### De Tibia.

#### CAPVT XXVIII.



**I**ta & cubiti structura ferè similis est, vt enim cubitus duobus constat Osibus, ita & Tibia. Quorum maius & internum Tibia nominatur: Alterum Os gracilius & externum, *fibra*, siue *Sura* dicitur. *Hierophilus* etiam *urida*, Radium appellauit, auctore *Ruffo*. Et *Aristot.* Tibia duo Tibiz *uridus* dicuntur, *lib. de spiritib.* cap. 7. Tibia dicitur, quasi tubia, à tuba, quod pastoribus Tibiz primùm ex his Osibus paratæ fuerint. Græcis *urida* à *urid*, quod est scabo, quia bruta hac potissimùm parte acuminata sulent se scabere, vel *urid* dicitur, quasi *uridum*, *urid* à *urid*, quod est moueo. Sura ex *Celso*, est Os tenuius Tibiz, sed à *Plinio* aliter vsurpatur. Sura, *inquat*, folius hominis, quippe carnosa Tibiz pars, minùs tamen aptè. Sura enim palum significat, ex *Ennio* & *Fest*o, cuius diminutiuum furculus, vtrumque à surgendo, & vtrumque in plantis reperitur: Cuius similitudo in Osse, non in carnosa parte, à barbarolatini vtrumque *Os facile manus*, & *minus* dicitur, quasi *fulcile*.

Porro Tibia parte superiore epiphysis est, duabus cavitatibus prædita, vt duos femoris condylos excipiat, inter quas eminet apophysis quædam *intercondylar*, in medium condylorum femoris, tanquam in scissuram quandam profundam inserta, sicque per gynglymum laxum articulatæ femori. Sura verò Tibiz adheret per synarthrosim, nec ad femur vsque ascendit. Sed quantò breuior est Tibia parte superna, tantò longior apparet parte inferna. Tibiz & suræ partes infimæ, quæ epiphyses sunt *Malleoli*, siue *Talaeoli*, quia Talum includunt, dicuntur Græcis *urida*. *urida* à *urid*, quod est scabo, quia bruta hac potissimùm parte acuminata sulent se scabere, vel *urid* dicitur, quasi *uridum*, *urid* à *urid*, quod est moueo. Sura ex *Celso*, est Os tenuius Tibiz, sed à *Plinio* aliter vsurpatur. Sura, *inquat*, folius hominis, quippe carnosa Tibiz pars, minùs tamen aptè. Sura enim palum significat, ex *Ennio* & *Fest*o, cuius diminutiuum furculus, vtrumque à surgendo, & vtrumque in plantis reperitur: Cuius similitudo in Osse, non in carnosa parte, à barbarolatini vtrumque *Os facile manus*, & *minus* dicitur, quasi *fulcile*.

Hæc Ossa suis extremis inuicem colligantur, sura supernè excavata, Tibia latus externum protuberans excipit: Infernè verò Tibia Suram suo sinu admittit. At in medio dehiscunt membranoso ligamento connexa, quo etiam musculi anteriores à posterioribus discernuntur. Huiusmodi hiatus causa est Tibiz conformatio, quæ in medio gracilis, extremis suis partibus intumescit, his *urida* commissa necessariò à media Tibia distare cogitur.

Tibia vti sura vbique propemodum est triangularis, sed solus anticus Tibiz angulus nomen inuenit, & *urid* dicitur.

Sura vsu triplex assignari potest, primus est, vt per suam apophysim malleolum dictam, cum Tibia astragalum comprehendat. Secundus, vt spatium traducendis vasâ accommodatum, & ab omni offensione securum constituat. Tertius, vt condylum

tum Tibiæ externum, cui affixa est, sustineat, cum femoris totiusque corporis pondus in eam partem maximè pendeat.

In articulatione femoris cum Tibia obseruandæ sunt partes anteriores & posteriores; quæ nominibus propriis designatæ sunt. Pars anterior *ἡ ἄνω*, Latinis *Genu*, quod sicut edo *ἡ ἄνω*, angulum efficiat, vel *ἡ ἄνω* ab humiliando, *ἡ ἄνω* est humilio, vnde *Patella*.

*Et genua amplectens efficitur salua supplex.*

Vel, *ἡ ἄνω* *ἡ ἄνω*, quod est operor, seu actionem edo. *Poples* sinus est post genu dictus, quia ponè plicatur, vel quasi podiples, ex *ἡ ἄνω* & *ἡ ἄνω*, verito, Græcis *ἡ ἄνω*, vel *ἡ ἄνω* *ἡ ἄνω* *ἡ ἄνω* *ἡ ἄνω*, vide *Etymologicum magnum Græcum*. Latinis suffrago, à frangendo, siue suffringendo, quia flectitur.

Nihil controversum occurrit in hoc capite, sed diligenter expende articulationem femoris cum tibia, quam pto *Galenum* rectè descripsisse, nec esse gynglymoidem, vt censet *Vesalius*, idem repetit *lib. 3. de usu partium, cap. 15*. Cognosces ex *Galeno*, cni duobus Ossibus crassitie & longitudine inæqualibus Tibia constructa sit: Cur parte anteriore sit acuta, quæ acuties *ἡ ἄνω* dicitur. At verò *ἡ ἄνω* significat latus internum Tibiæ ex carne.

Prudenter *Galenus* veterum *Anatomicorum* errorem detegit, qui malleolos vocabant astragalos, foris gibbi sunt, intus autem caui, vel potius plani. Considerabis autem, an eminentia *ἡ ἄνω* sit ligamentum, vel potius tuberculum, quod ingreditur cavitatem duobus condylis femoris interiectam. Pars illa *ἡ ἄνω* dicitur ab *Hippocrate* & *Galeno*.

## COMMENTARIUS IN CAPVT XXII.

### De Mola.

#### CAPVT XXX.

**F**EMORIS & Tibiæ articulationi Os patium præponitur, variis nominibus appellatur. *Mola* enim & *rotula*, & *Patella* dicitur, *ἡ ἄνω* & *ἡ ἄνω*; Os supergenuale. *Patella*, a theore *ἡ ἄνω*, à latitudine, vel à verbo pateo, quod sit foris exposita & patens, sic apud *Arnobium, lib. 4. aduersus Gentes*, *Patellana* numen est, & *Patella*, ex quibus vna est patefactis, altera patefaciendis rebus præstituta: *ἡ ἄνω*, *Mola*, quod sub ea parte femur ad sedendum plurimum vertatur, *ἡ ἄνω* ab *Arist. lib. 1. de hist. anim.* *ἡ ἄνω* à *ἡ ἄνω*, *Accorambon* ex vetusto codice legit diuisum à *ἡ ἄνω* *ἡ ἄνω*. Id Os vndique cartilagine incrustatum, intus densum & læue, foris cavernosum est, & pumicosum ad nutritionem, & tendinum quibus obuoluitur insertionem.

Figurâ suâ scutum *ἡ ἄνω* eleganter exprimit, vel vt placet *Ruffo Ephesio*, disci formam repræsentat. Externis partibus extuberat, internis subiectorum Ossium partes condylosas aptis cavitatibus complectitur, & in medio intumescens oblongâ quadam eminentiâ vmbonem imitante, mediæ femoris ac Tibiæ capacitati insinuat. Mobilis & vaga esse debuit, ne motum huius articuli difficilem redderet, aut longum in genu decubiturum impediret.

In hoc Osse duo reprehendunt *Anatomici Vesalio* & *Columbus*, quod *Galenus* extrinsecus cartilaginofum esse dixerit, & figurâ rotundum. Id *Galenus* veterum *Anatomicorum*, & potissimum *Marini* autoritate fretus, atque oculata fide confirmatus affirmavit. Verum hæc dictio *ἡ ἄνω*, tribus modis intelligi potest, vel enim distingui debet virgula à frequentibus verbis, vt referatur ad verbū *ἡ ἄνω*, vel extrinsecus *mola* cartilaginosa dicitur, ratione tendinum musculorum Tibiæ quibus alligatur. Nam elixatione emolliti tendones cartilaginosi fiunt, vel patella seiuicta & seorsum considerata, dici potest extrinsecus cartilaginosa, intus ossea, vel erit extrinsecus cartilaginosa in pueris, quæ ætate tota est cartilaginosa. *Patellæ* figura non est exactè rotunda, sed ad eam figuram propius accedit, quàm ad aliam, vt caput sphæræ comparatur, nec tamen exactè sphæricum est.

Veniſimile est *Galenum* voluisse *molam* nullis ligamentis contineri, quia nulla ex:





ab alijs articulis consilium Osibus cum Scaphoide ex Galeno. Pars verò huius Ossis inferior est valde inæqualis, alibi gibbosa, alibi excavata. Id os Talus etiam dicitur Latinis, iudicio quorundam *lib. 2. de hist. anim. cap. 7.* Nam in brutis talus est quadratus, *πτερυγιον*, quaternio, in homine senis lateribus constans inæqualibus, figuram habet, quæ rectius assimilari non potest, quam bombardæ, ideoque os balistæ dicitur. Quamvis autem Talus permultis animalibus bifidus datus fuerit, ultisidorum nullum animal obtinuit, nec in homine reperiri certum est.

Astragalus subest *ἄστρον*, siue calcaneum, *ἄστρον* dicitur, *ἅπλοῦν ἢ σύνθετον*, à calcanda terra, vel *ἀστὴρ* à *ἀστρον*, & per syncope *ἄστρον*, ex *Etymologico magno*. Inde perna & pernio in porcis, vna litera extrita, & affectus partis à frigore dictus pernio, quasi pernio. *Calcaneum* etiam Latinis vocatur, quod calcet, & premat terram. Est autem calcaneum Ossium omnium, qui in pede sunt maximum, superstanti astragalo & cyboide per gynglymum iungitur, eius proiectione postica contegitur crassissimo & lato tendine, ex tribus musculis prognato, quæ verò in sceletis apparet vacuitas inter calcem & astragalum, quæ cyboidei & scaphoidei propinquant, in viris pinguedine, & validissimis ligamentis oppletur. Notat *Fallopins*, calcaneum in postica parte appendice donati.

Quærit *Scaliger exercit. 279.* quare homini, ut bipedi natura non produxit in longum retrò calcem, aibus verò adiunxit digitum posteriorem, digito vnguem. Respondet aibus æqualiter vtrunque librati corpus, multum enim est ad orispygium vsque, homini verò nihil. Altera ratio est, quod genium flexus contrarius sit, atque in aibus, postremò brachiorum agitationes, omnesque actiones antorsum spectant. Si pedem humanum in sceletis inspicias, calcem retrò valdè exportectum inuenies, sed in vivis propter deformitatem multis obducitur integumentis.

Tertium *Ostei* *ἄστρον*, naiculare, cavitatem habet satis profundam, quæ caput astragali excipit, sua parte gibbosa tres habet superficies cubicas leviter gibbas, quibus tria Ossia tarsi applicantur.

Quartum *ἄστρον* dicitur. Id constat sex lateribus admodum inæqualibus, & sæpe asperis, quorum etiam internum videtur geminum.

Reliqua tria Ossia tarsum absoluunt à Galeno in *Definitionibus* *ἄστρον* dicta, ab alijs cuneiformia ineptè, cum potius dici debeant *cuneiformia*, in explicatione huius nominis omnes Anatomici quotquot sunt errarunt: *Banhus in theatro*, *Laurentius & Spiegelus*: errandi occasionem dedit *Fallopins*, comment. in lib. Galeni de Osibus. An quia sint dura & solida instar æcis, an quia cunei ærei similitudinem referunt, vel cunei modo inter se conferta. Vnum dici potest *cuneiforme maius*, Alterum *cuneiforme minus*, Tertium *cuneiforme medium*.

In hoc capite multa dubia occurrunt, quæ sigillatim enucleanda sunt. Imprimis astragalum scaphoidei dearticulati scripsit *Galenus*, cum tamen motus ille sit obscurus, & lib. 3. de usu part. cap. 8. motum lateralem pedis ab ea articulatione fieri prodidit, quod si verum est, oportet eam articulationem esse diarthrosim, tam ratione struatur, quàm ratione motus. *Ingrasius* motum lateralem ab omnibus Ossibus tarsi edi & iuari putat, cùm non parum ad eundem motum faciat articulus cum calce posterioris, similiterque alius quo scaphoides cum tarsi Ossibus, atque etiam alius quo calcaneum cum Osse cyboide coarticulantur. Deinde astragali partem anteriorem laxiugatam esse tradit *Galenus*: contra *Ingrasius* docet totum Os exterius magis, quàm interiorius laxe lubricumque, cartilagine incrustari, ac proinde legit, *ἡ δὲ τὰς αὐτῶν ἰσχυρὰ*. Astragali partem superiorem *ἰσχυρὰ* nominati notat, ob quatuor facies quadratas, quæ figuram capreolis & hœdis observatur, non autem in homine, ut animaduertit *Fallopins*. Scribit *Galenus*, cyboides os gibbum esse, inde *Fesalins*, *Galenum* arguit, quod crediderit calcem suscipere os cyboides, cum potius calx à cyboide suscipiatur: sed non ea fuit *Galeni* mens. Nam antea dixerat calcis extremiratem minimo digito respondentem Ossis cyboidei coarticulari. Ossa tarsi & pedis dura & solida esse scripsit *Galenus*, comment. ad part. 8 lib. 2. de fract. Quinetiam lib. 3. de usu part. cap. 8. calcis substantiam summè duram dicit: Reprehenditur à recentioribus Anatomicis, quod pedis Ossis sint spongiosa & medullosa, similemque substantiam calx sortitus sit, cum & ligamenta, & muscoli ab eo Osse enascantur, eique adhæreant.

Ex ultimis capitulis verbis tria Ossa paruula inferiori scaphoidis parti per synarthrosim copulantur, & post quatuor hęc Ossa, prima pars pedis quam tarsum vocant, finitur. Multi arbitrantur *Galenum* accepisse tarsum pro quatuor illis postremis Ossibus, & tria illa grandiora putā astragalum, calcem, scaphoides, à tarso, distinguere quod fecit *lib. 3. de v. part. cap. 6.* Sed *Galenus hoc capite* nihil simile designauit, aut expressit: forsan quod tria Ossa maiora non sunt leuatiū disposita turrem modo, quod tarso nomen significat, idcirco à tarso separauit.

# COMMENTARIVS IN CAPVT XXIV.

## De Pedio, & Digitis.

### CAPVT XXXII.



**A**RSO succedit metatarsus, siue *metatarsus*, quasi *metatarsus*, id est, planum, quia solum tangit. Hęc etiam pars videtur apud *Hippocratem* ex Ossibus quinque contexta esse, quæ eodem & simili ordine arcu, siue collocantur ad ambulationis firmitatem. Eius structura similis est manus metacarpio: extrema enim nodosa sunt & erassiora: Infernè tarso per arthrodiam articulata, quæ parte scilicet ab inuicem abscedunt, itaut versus digitos magis diducta, quàm prope tarsum appareant: quia pedum digiti magis sursum, quàm digiti manuum in extensione elcuari debuerunt. Superiør verò conuexa sunt, infernè caua: simulque iuncta cum tarso cavitatem insignem & profundam in planta pedis efformant, quam adaugēt protuberans calcaneum. Eo fine constructa fuit, vt per eam tendones nervosi musculorum, tunc in digitos pedis deducerentur. Nam si planta plana fuisset, in progressionē tendones compressi, nec liberi, nec absque dolore moueri possissent. Accedit, quod in locis asperis & præruptis pes conueus melius aptatur, firmiusque sistit quàm planus. Concauitas hęc in pede *Planta* dicitur, idem quod in manu palma, & planta vocatur à plantis, quasi palantis: Attamen pedes plani infeliceiter stant & ambulant, tales dicuntur *Planei* & *Plauti*, Græci *πλανιδες* vocant. Vide *de Galenum, lib. 3. de art. ad part. 2.*

In hoc capite nulla controuersia notatur. Constat enim omnes pedum ex quinque Ossibus constructum esse, digitos pedum tribus Ossibus constare, excepto magno digito, qui ex duobus tantum Ossibus constat. Cuncta digitorum Ossa eodem modo, vt in manu articulata sunt. Prima phalanx eum Ossibus per arthrodiam articulata est. Reliquæ duæ phalanges inter se per gynglymum iunguntur.

Sed in numero Ossium pedis assignando *Galenus* erroris insinuat *Resaliū*, quod *lib. 2. de fracturis part. 1.* constituat 27. eodem *lib. part. 16.* bis cyboides enumeret, itaut tarsum ex Ossibus octo componat. Mentem *Galeni* non assequitur *Resaliū*, aut saltem dissimulat contradijendi studio, Nam priore loco demonstrat inter Anatomicos dubium & incertum esse numerum Ossium pedis, vt liceat viginti sex, aut viginti septem constituere, quippe si malleolum pro vnicō Osse numeres & adicias, erunt viginti septem: si non asferas, remanebunt viginti sex. Binos autem malleolos pro vnicō Osse vsurpatos fuisse ipse *Galenus* docuit, *comment. ad part. 5. lib. 2. de fract.* Quocirca cum alieno loco *Galenus* Ossa pedis exponat, numerum certum non definit, quem alibi *lib. de Ossibus, & libro tertio de usu partium* assignauit, dum agit ex professione de Ossibus pedis. Adde quod possis viginti septem Ossa in pede inuenire, si patellam addideris. Nonnulli ex veteribus Anatomicis astragalum duorum Ossium loco habuerunt, cuius rei testem habeo *Rufum Ephesium*, qui huius Ossis partem superiorem trochleæ similem astragalum vocat, inferiorem admodum inæqualem *Pisum* appellat, simulque Ossibus octo tarsum componit. Insigne mendacium est, vel potius impossura, quod *Galenus* bis cyboides repetat. Nam cyboides non nominat, & verisimile est mendum fuisse in textu, cum incertum remittat *ad lib. de Ossibus*, in quo post quatuor illa maiora Ossa, nempe astragalum, calcaneum, scaphoides, subiungit tria Ossa innumera.

De aliis Ossiculis à Galeno prætermisiss.

**N**otat *Galenus*, præter ista Ossia enumerata, alia reperiri ossicula, quæ sciens & volens prætermisiss, quoniam ad seclerum parandum non sunt necessaria, nec cum aliis commodè aptari & connediqueunt, quod videtur innuere, dum scribit, quæ connumerata facere Ossia sufficere *Tyronibus*, ex his omnibus seclerum exstrem & compingi. Si quod autem aliud ossiculum alibi, videtur in Corde, in naso, in larynge, item in aliquo ex digitis, qualis sunt *Sesamoides*, aliudque eius generis deprehenditur, non est necessum hic perenumerare. Quasi diceret præter Ossia commemorata, ex quibus secleros constituitur, extare alia, quæ foris non apparent, sed intra aliorum cavitates continentur, vel cum aliis, neque per articulum, neque per symphysim iunguntur. Inde manifestè patet, *Galeno* innotuisse Os Cordis, Os Eihmoides, Os Hyoides, sesamoides, & per aliud eius generis, suspicari licet esse ossicula auris, quæ *Galenum* subolfecisse, aut saltem leuiter adumbrasse liquet, lib. 3. de Decretis Hippocratis & Platonis. Sed tu scis iam obique & manifesta corum speciem quandam esse tunicam, & acini speciem alteram, quinetiam & crystallinum, & humorem vitreum, & alias huiusmodi oculorum particulas, quemadmodum & auris Ossia.

Quod spectat ad præcedentia ossicula, *Galenus* eos reprehendit, qui inceptè quæ-runt ossiculum Cordis, & curiosè inuestigant, si quæ sint in Cerebro ossicula, lib. 4. administ. Anatom. cap. 1. In Corde hominis etiam grandæui, raro ossiculum obseruatur, quale depictum est à *Galeno*, lib. 6. de usu partium, cap. 19. sed in Elephantio vidit *Galenus*, ut ipsemet testatur, lib. 7. admin. Anat. cap. 16. & alij Anatomici in bobus vetustate decrepitis inuenerunt, digiti auricularis longitudine ad radicem aortæ transuersim collocatum: quinetiam equorum Cordi inesse notauit *Ingrassias*. Certissimum est in ceruorum Corde Os reperiri, quod perhibetur cardiacum, & à Medicis Arabibus commendatur. Fieri tamen potest, ut radix aortæ cartilaginosa in senibus tandem ossæ fiat. Ossiculi Cordis meminit *Aristot.* lib. 3. de part. anim. cap. 4. & lib. 5. de gener. anim. cap. 7. illud non tribuit homini, ut *Gal.* lib. 6. de usu part. cap. 19. sed equis & cuidam boni generi: reperitus etiam in ceruis, & habetur hodie pro singulari cardiacæ, quod sylvius & Brasavola parui faciunt, quia sæpissimè eius loco in Ossicinis prostat bubulum, vel alterius animalis: quinetiam in Ossicinis, *Vesalius* obseruauit pro eo, Agni grandinis Os hyoides substitutum: Idem testatur se nunquam istud ossiculum in humano Corde humido & molli inuenisse, nihilque esse statuit, quàm aortæ, & venæ arterialis radices induratas, & cartilagineas.

Verumtamen *Cornelius Gemma*, lib. 2. artis Cyclagnom. pag. 100. in virorum cadaueribus ossiculum Cordis deprehendit, ad radices arteriæ magnæ, & venæ arterialis collocatum: & alibi, lib. 1. Cosmocrutices cap. 6. affirmat, se ossiculum inuenisse instar maleoli inter cartilagineos circulos arteriæ aortæ & venæ arterialis, ipsa specie prorsus cum Cordis ceruini Ossibus comparandum. Existimo, Os Cordis in homine nihil aliud esse, quàm aortæ radicem indurata, quam in senili corpore substantiam ossæam comparare sæpius inspexi: Nam si carneum & humidum Cordis septum per ætatem cartilaginolum euadit, ut sæpius obseruauit *Columb.* lib. 1. g. quidni aortæ radix cartilaginosa ætatis progressu in ossæam substantiam degenerabit. Notat *Volcherus Cæster*, *Fallopium* in cadauere humano *Patauij* dissecto innuisse aortam arteriam totam ossæam. Nec inutile eiusmodi ossiculum demonstrat *Aristot.* quippe fundamenti vice basim Cordis sustinet, non secus quàm ossa corpus sustentant. Alium usum tradit *Gal.* 1. 6. de usu part. ut ab eo valuulæ, & ostiola vasorum oriantur, & tanquam basi firmentur, quæ falsa sunt.

Os nasi non aliud esse potest quàm Eihmoides, quod Ossia nasi appellat, lib. 9. de usu part. cap. 3. cuius in ossibus capitis nullam fecit mentionem, forsitan quia cæteris mollior, & alterius naturæ, siue substantiæ, quàm reliqua capitis ossa: est enim totum foraminulentum, squamiosum, ac spongiosum. Vel quod non extaret in cranii effossis: Primum enim carie consumitur, vel quia foris non eminet, sed intra nares continetur. Explicat utè *Galenus*, eminentia & apparentia Ossia non recondita. Propterea *Galenus*, septem ossa cranij continentia constituit, quod imitatus est *Sylvius*, quibus etiam addi potest os piruæ cristæ gallinacæ æmulum, foramina ethmoidæ complexum. Nemò dubitare debet, quin os ethmoides *Galeno* cognitum fuerit, ut patet ex lib. 8. de usu part. 4. 7. & lib. 9. eiusdem operis 4. 5. quibus in locis, id os non pro vnicò habet, sed plurium loco, quæ semper numero plurali nominat & describit. Atque re-

Quid hæc Ossa spongoidea cum *Hippocrate* vocari, quam ethmoidea cum vulgo Anatomicorum, non propter foramina, quæ sunt obliqua, vt in spongia, sed potius ratione substantiæ quæ spongiola est. Propterea *Galenus*, Os ethmoides ab Ossibus capitis exclusit, vt nati Ossibus attribueret: more priscorum Anatomicorum: sic *Ruffus Ephesius*, Os ethmoides ad Ossa nati reuocat: Sed illas partes laterales, laminæ speciei tenues, quæ latius internum orbitæ iuxta magnum canthum efformant, cognouit. Nā capite de maxilla superiore, Ossiculum situ secundum intra orbitam, quod nervos in maxillam distribuendos traducit, in pueris vsque ad septennium est os separatum, quod postea ossi maxillari vnitum illi attribuitur: sed in pueris, cū sit futura secretū, existimatum fuit à *Galeno* esse partem ethmoidis, quamuis nomen non expresserit. Id colligo ex his verbis *Galeni*, cū scribit, *Ex tribus hīs ossibus obuia interdum deletis futuris, vnum Os constare*. At si ossiculum istud per quod nervi transmittuntur, porrio esset maxillaris. *Galeni* sententia falsa esset. Quod si veram ethmoidis portionem pro secundo Osse accipere volueris, dic cum *Galeno*, lib. 8. de vsu paruum, cap. 9. secundum, siue medium, existimari non tantū situ, verū etiam natura.

Laryngis ossiculum non est ipse larynx, sed os hyoides supra laryngem, situm & innixum, quod in scelecto aliis ossibus non adnectitur. Os istud *Galeno* notum fuisse fatebitur, qui legerit, lib. de diffict. muscul. cap. 13 & lib. 7. de vsu part. cap. 19. eleganter à *Syluius* supra descriptum est post Ossa maxillæ infernæ, vt ad caput reduceretur.

Addo de Osse Cordis, quod supra prætermisi, videlicet huc anno 1614. in publica Anatome ducentis spectatores obseruauis, atque demonstraui, in principio venæ arteriosæ ossiculum annulare, cui tres valuulæ sigmoides affixæ erant. *Platerus in suis Obseru.* pag. 5. 7. narrat se in adolescentis Corde per mediū dissecto. Ostribus articulis constans, cauumque, & arenosa quadam materia impletum inuenisse: quidni ergo in Cordis basi illud ossiculum à *Galeno* commemoratum generabitur: cū in ipsis pulmonibus, aliisque corporis partibus, ossicula gigni & coalescere certum sit. *Valnerda* eruditè explicat, quid per Cordis ossiculi accipi debeat. In Cordis medio, inquit ille, ad elatiorem intersticij duorum ipsius ventriculorum sedem, venæ arterialis & magnæ arteriæ radices perinde inuicem conterminantur, ac si duo CC scapulis suis committeretur, ac simul ambo corpus ad cartilaginis duritiem proximè accedens constituunt, cuius figuram X similitudine refert. Hæc radices, siue ossa cum *Galeno* appelles, seu cartilagines, vt reuera sunt, parum interest, modò ex commemoratis radicibus consurgere, quæ temporis progressu indurecant, minimè ignores.

De osse Cerebri quætionem mouit *Vesalius*, cap. 6. lib. 1. sua Anatomies Sed impudenter imposuit *Galeno*, quod istud ossiculum canibus familiare, in Cerebro humano constituerit: longè alia fuit mens *Galeni*, vt videre est, cap. 2. lib. 4. admin. Anatom. Ignari, ait, *surpser* quæ erant, nūm cartilaginum quidpiam prope Cerebri glandem, vel ossum inhaereat. quo in loco eludit, expungitque istud ossiculum humano Cerebro falsò attributum Narrat *Daubinus*, lib. de part. simil. l. 1. Placensium in arteriis carotidibus ossiculum natū fuisse: Illis, inquit, statim atque caluariam sunt ingressæ, paruum quoddam Os oblongum petalum semel inuenit, cui ex vtraque valuulæ tres quales vena caua obtingit, erant adnatæ.

*Botalius* quatuor ossicula in cadanere reperit inter vtramque Cerebri partem, dextram videlicet & sinistram, rectà sub sagittali commissura posita, & sub torculari ipsi septo adfixa adnataque, vt videre licet, sub fin. lib. de catarrho, & nuper in Cerebro illustris Baronis, Os latum 4. digitos, & ad cristam ethmoidis protensum separabat Cerebrum in duas partes, dependebat à futura sagittali excurrente ad nates. *Est in Tabacologia Riccardi*, refertur ossicula sex lata & compressa in interiori parte dextra duræ meningis versus proctum falciforme adnata fuisse. Anno 1610. dum caput mulieris in vsum Anatomicum dissectæ expurgarem, ossiculum speciei feminis eitralli natum sum, in cauitate magni illius foraminis exterioris, quod subit, penetratque carotis.

Notauit *Vesalius* ossiculum nonnunquam inter os metacarpi & carpi octauum insertum, iuxta minimū digitum reperiri, atque ossam partem in sensibus cyboidi ossi pedis appositam esse, quæ interdum separata est, sæpius tamen ossi cubiformi agglutinata, quinetiam ossiculum ad pedij cum minimo digito articulationem sæpius occurrere, quæ quidem ossicula sunt extra censum & numerum Sesamoidæon, vt & illa duo ossicula, quæ magitudine ciceris in poplite aliquando deprehenduntur, iuxta femoris Os exterius capitibus musculorū pedis, nempe gemellorum innata, quod

est ibi particulare, & notandum contra naturam aliorum sesamoidum, quæ tendonibus assident, vel substernuntur: Hæc inuenisse gloriatur *Vesalius*, cum tamen rarò in hominibus, nisi decrepitis reperiantur, in simis, canibus & leporibus frequentius occurrunt. *Eustachius*, notat a deo rarò inueniri, vt non modò sæpius alterum, nunc internum, nunc externum deficiat, verum etiam vt plurimum vtrumque ipsorum defuit. Miraculum enim existimabo, si duo simul occurrant, & non mediocri diligentie adscribam, si post multorum cadauerum sectionem, alterum illorum quis inueniat.

### De Sesamoides Ossiculis.

**N**Ec *Vesalius* sibi tribuat & arroget sesamoidum ossiculorum inuentionem, *Galenus* horum mentionem fecit hoc libro, & alibi, lib. 2. de usu partium, cap. 12. art. 7. vbi securitatis gratia tãquam auctuarium, digitorum articulationibus apposita fuisse scribit, & circumiecta cautatibus ossiù, & tanquã epiphyces adiectas, illas adaugere.

Sunt autem sesamoides, parua ossicula digitorum internodiis circumiecta & interposita, Sesami figuram referentia, eo fine condita ibique collocata, vt articulorum vacuitatibus implant, flexionem & extensionem regant, ne laxè moueantur digiti, & ne in angulum nimis acutum flexantur, authore *Vesalio*: Quem vsus reprehendit *Sylvius*, quoniam interna sesamoides in articulis digitorum manus ita collocantur, vt digitos flexantibus musculis sursum in ligamentum recurrant, nec amplius sint articulo opposita, ne flexionem extremam impedian, cum necessaria est: hunc etiam vsus præstant, referente *Platero*, vt in extensione digitorum intra spatium articuli inserta tendinem retineant, quem hic liberum non strictum esse oportuit, ne ab articulo extuberante in moru decidat.

Sesamoidum ossiculorum numerus apud Anatomicos incertus est, alij decem in manu, totidem in pede constituunt, alij duodecim, alij sexdecim. *Sylvius* in manu, vt in pede nouemdecim admisit, eaque interna facit, externa sunt incerto numero, singula sub tendonibus latent ligamenti complexa. Pauca sunt sesamoides, quæ interna parte manus reperiuntur, nulla sunt in parte externa, & primis digitorum manus internodiis abstrusa deprehenduntur, pollex in secundo & tercio internodio sesamina habet, nullum in primo. Sed imprimis notanda sunt duo sesamoides, quæ secundo magni digiti pedis internodio subiecta sunt, quorum alterum Magizæ scætores *Albadaram* vocant, & illud esse tradunt, quod cicæris magnitudini respondens, nullique corruptioni obnoxium, instar seminis, in extremo die iudicii corpus regenerabit. Hoc ossiculum idem est cum eo, quod sub nomine *Luz* describit *Cornelius Agrippa* lib. de occultis *Philosophia* cap. 20. his verbis. *Est in humano corpore Os quoddam minimum, quod Hebræi Luz vocant, magnitudine cicæris mundati, quod nulli corruptioni obnoxium, ne igne quidem soluitur, sed semper conseruatur illud, ex quo veluti planta ex semine, in resurrectione mortuorum nostrum corpus animale repululabit.*

### De numero Ossium totius Corporis.

**N**umerus ossium apud Anatomicos incertus est, *Fallopium* in suo Commentario duplicem numerum proponit, vnum maiorem, alterum minorem. Maior constat ossibus 255. Minor verò ossibus 230. vt legitur apud eundem authorem vltimo capite Commentarij in hunc librum. *Vesalius* in sua Anatomie subductis & enumeratis omnibus ossibus, 307. constituit, quem leges & examinabis. *Galenus* vacillat in assignando ossium totius corporis numero. Nam libello de formatione *Fetus* cap. 6. Ossia ducenta & amplius admittit, lib. 1. de placitis, cap. 8. plura esse, quàm ter centum testatur. Sed istos numeros perfunctoriè, & alieno loco designauit. Si quidem hoc libro plura non inuenies humani sceleti Ossia, quàm 210. & si addideris dentes 31. habebis totius corporis Ossia 242. vt ex enumeratione singulorum Ossium comprobatur. Sunt enim capitis 7. Ossia maxillæ superne 4. maxillæ inferne 2. Spinæ vertebrata Ossia, 24. Ossia Sacri, 3. Coccygis 3. Costæ 24. Sterni 7. Omoplatæ 2. Claviculæ 2. Brachiorum 2. Cubiti 4. Manus 54. Isthij 2. Femoris 2. Tibiæ 4. Patellæ 2. Pedes 32. adde si lubet dentes 31. prætermittit ossicula postremo capite commemorata & neglecta, cuiusmodi sunt Osæthmoides. Os hyoides, ossicula auris, ossiculum Cordis, & ossicula sesamoides, quia ad sceletum parandum non sunt necessaria, neque cum alijs aptari queunt.

Propterea prudenter *Ingraffius* dumtaxat 242. Ossa declarari à *Galeno* arbitratur, quibus adiungit omnia ossicula 11. hyoidis, ossiculum Cordis, nasi 3. manuum & pedum sesamoidea 48. quæ simul iuncta efficiunt 62. & adiuncta 242. Ossibus, erunt totius corporis Ossa 305. ex illius supputatione.

Maiore difficultate parit *Hippocrates* opinio de numero Ossium, quæ ab omnibus Anatomicis falsa & absurda iudicatur. *Foetus* in numeris. varietatem literarum erroris causam fuisse, ex antiquis codicibus demonstrat. *Ossa manus* 27. *junt*, *Pedis* 24. *Collis usque ad magnam vertebra* 7. *Lumbarum* 5. *Spina* 20. *capitis una cum oculorum Ossibus* 8. *in uniuersum* 91. quam sententiam verissimam demonstro, quia non est verisimile tantum Anatomicum qualis *Exitit Hippocrates*, in numerandis Ossibus deciprum fuisse, cum statim ipse profiteatur, se istum numerum ex inspectione Ossium humanorum collegisse.

Dicam igitur *Hippocratem* eo numero Ossa tantum vnus lateris complecti, quæ per articulum manifestò mobile iunguntur: sicque in tota manu, si comprehendas omnioplatam, 27. erunt Ossa, quæ per articulum copulantur: modò tamen 8. carpi Ossa pro quatuor Ossibus tantum, enumera, quia secundus Ossium ordo, qui metacarpio iungitur, apertè non mouetur. In toto pede 24. reperies, si comprehendas coxendicem, & 7. tarsi Ossa pro vnico numeres, quia solus astragalus Tibiæ per articulum coheret, reliqua tarsi Ossa inter se, vel cum pedio iuncta manifestè non mouentur. Spinam à cervice & lumbis distinguit, eique Ossa 20. tribuit, quam partem 12. vertebri constructam dorsum vocamus: Sed *Hippocrates* per vertebbras, vnus lateris veras costas iisque affixum sternum intelligit. Caput, quia simplex & vnicum, non geminum, vt reliqua membra, 8. constat Ossibus, quæ articulos constituunt, cuiusmodi sunt Os occipitale cum prima vertebra, duo Ossa temporum cum duobus Ossibus maxillæ inferioris: Os frontale, & duo Ossa maxillæ superioris, quæ tria postrema ossa, oculi orbitam, seu cauum efformant, quod propter profunditatem articulus dici potest, quemadmodum *Hippocrates* ischij cotylem *αἰχμή* vocat.

Obiiciet aliquis multa *Hippocrates* prætermisisse ab *Hippocrate*, puta quatuor costas, clauiculam, Os Sacrum, quorum *ea libro, & alijs* meminit. Equidem suspicor mendum esse in codice, & post viginti addi debere quinque, vt quatuor costæ cum clauicula comprehendantur, quas statim post assignatum eum numerum nominauit. Os Sacrum, quia firmum & stabile, vice fundamenti Spinæ subiectum, nec villo modo mobile, idcirco fuit omissum, quod quidem rarè vel nunquam frangitur, ideoque apud *Homerum*, qui omnium ferè Ossium fracturas memorat, nusquam Ossis Sacri fracti mentionem fecit, semelque aut bis apud eundem *ἰνὴ* extat, quod etiam lumbos rectius significat, quàm Os Sacrum. Nouerat quidem *Hippocrates*, in manu & pede præter enumerata, multa esse alia ossicula aliando coarticulata, sed ea neglexit, quia articulum mobile & luxationi obnoxium non constituunt. *Pes humanus*, inquit *Hippocrates lib. 2. de fracturis*, ex multis minutisque Ossibus constat, sicut & manus. Cætera autem cranij Ossa non omisit *Hippocrates* propter ignorationem, nam ea *lib. de vulneribus capitis* expressit & designauit, nempe Os frontis, Ossa duo temporum, Ossa duo bregmatica & occipitis.

Interea notari velim, *Hippocratem* ea tantum Ossa nominasse & proposuisse, quæ Medicinæ subiecta sunt, dum franguntur & luxantur. Propterea principium libri qui vulgò inscribitur *de Ossium natura*, vsque ad hunc numerum Ossium sub nomine *Mochlici* designatur à *Galeno*, & Chirurgici accensetur, vt fecit *Foetus*. Sed malè istam particulam de numero Ossium distinxit, & alterius *scilicet libri de Ossium natura* initium fecit: quæ *Mochlici* conclusio esse debet. Nam post eum numerum Ossium explicatum, toto libro nil de Ossibus continetur: sed de venis & arteriis agit. Cùm igitur *Mochlicum* suæ Chirurgiæ præmitti voluerit, credibile est ea tantum Ossa numerasse, quæ fracturis & luxationibus sunt obnoxia. Ac non plura quàm 91. reperietis. Ergo verissima *Hippocratis* opinio de numero Ossium.

*Finis Commentarij in librum Galeni de Ossibus ad Tyrone.*





S I M I Æ  
O S T E O L O G I A .  
S I V E  
O S S I V M S I M I Æ  
E T H O M I N I S . C O M P A R A T I O .

C A P V T P R I M V M .



**Q**UÆCUMQUE de Ossibus à *Galeno* prodita sunt, ex simiarum inspectione deprompta fuisse plerique censent idcoq. librum quem enarrauimus, non de *Ossibus* hominis, sed potius simiarum inscribi debere. Sed quàm iniqui sint ærum censores, vel potius calumniatores, & quàm imperitè de rebus Anatomicis iudicent, cupio ab omnibus resciri, & inacta refecti, vt in hac Ossium simiarum descriptione, quam ex *Galieno*, *Eustachio*, *Fallopio*, & *Valscheri Coiter*, merique Observationibus collegi, manifestè demonstrabo. Simiarum autem cum sint variorum specierum, eas eligere oportet, quæ ad hominis figuram quàm proximè accedunt: Sunt enim quædam: non caudatæ, quæ absolutè simiarum dicuntur. Aliæ caudatæ. cercopitheci. aliæ canino capite, cynocephali; aliæ sunt cepi, aliæ callytriches, aliæ Satyri, aliæ lynces, quas omnes species describit & depingit *Gesnerus* in *historia quadrupedum*. *Cuius* in *Exoticis* tres alias species picturâ differentes proponit. Ex illis omnibus simias nos caudatas ad vsum Anatomicum aliis præferes, quarum maxillæ, nec oblongæ, nec dentes canini exerti, & quæ duobus cruribus incedere & currere possunt. Quæ verò cynocephalos imitantur, rostro longiore sunt, & dentes caninos prominentes habent, nec binis pedibus insistant erectæ, tantum abest, vt ambulare aut currere possint. In simiis veteres Anatonem celebrasse certum est, vt docet *Rufus Ephesus*, nec differtur ipse *Galenus*, *libra de dissectione vuluæ*, dum commendat *Herophilæ* sedulitatem, & peritiam Anatomicam, qui non in brutis, vt plerique solebant: sed in hominibus Anatonem exercebat. Et *lib. 15. de vsu partium*, faterur plures Anatomicos simias sibi proposuisse, cum agerent de musculis femoris. Sed non inde sequitur *Galenum* simias tantum dissecuisse, earumque Ossia descripsisse: Nam Ossia simiarum ab humanis differre, in quibusdam partibus proposuit. Femoris caput obliquius quodammodo in acetabulo coxæ committitur, & quidam ex musculis qui in tibiâ descendunt, vterius progrediuntur, quæ ambo rectitudinem impediunt, quemadmodum & pedes ipsi calce magis angustâ constant, digitis insigni spatio ab inuicem discretis, *lib. 1. ad ministrum Anat. cap. 2.* Iste huius articulus dissimilis est ab illo hominis, *lib. 15. de vsu part. cap. 8.* neque ipsius genuflexio similis est humanæ, *lib. 15. de vsu part. . 8.* quinetiam *libris admin. Anat.* discrimina partium internarum in simia & homine proponit.

Itaque cum temporibus *Galeni* rara essent hominum sceleta, tyronibus consulit

Ossium figuras primùm in simiis inspicere, quò eodem Osteologiz notitiam sibi comparent, vt si quando in humanum sceletum inciderint, Ossium differentias confestim agnoscant. Porro cùm *Galenus* Ossia simiz & hominis similia dixit, non sic intelligendum, vt nihil inter se discrepent. Nam ipse variis in locis, quid simile & dissimile inter se haberent Ossia simiz & hominis diligenter exposuit. Natura, inquit, cuiusque animalis corpus proratione formæ, varium condidit, propterea simia, vt ridiculam animam habet, sic ridiculum corpus obtinuit ab humano diuersum, ac proinde Ossia corporis fundamenta, quæ formam & figuram partibus præbent, dissimilia existunt. Simile autem duobus modis dicitur apud *Galenum*, *comm. ad part. 4. Officina*, primo quando vnũ ab altero nulla conditione differt, vt *Gaster & Pellux*: altero, quando maius & minus adest, & obseruatur, id est cùm quid magis aut minus ad aliud accedit, vt interpretatur *comm. ad part. 8. lib. 2. de hum.* Quare cùm Ossia simiz & hominis similia *Galenus* pronuntiauit, discrimen aliquod intercedere, haud dubiè intellexit, quo sensu, ait *Hippocrates*, *lib. de natura hominis*. Hæc inter se similia sunt, quorum neque colores similes videntibus apparent, neque ad manus tantum similitudo aliqua esse deprehenditur. Verè igitur, scripsit *Hippocrates*, *lib. 6. Epid. sect. 8. part. 31.* similitudines præstantibus, etiam Medici, errores & dubitationes parere, quas discernere prudentis & periti artificis est.

## DE CAPITIS, ET FACIEI OSSIBVS.

### CAPIT. II.

**S**IMIA & Caput rotundum est, humano simile, cynocephali verò caput oblongius. Vtriusque *Sutura* adeo sunt obscuræ, vt eorum nullum appareat vestigium. Propterea potius harmoniz dici merentur, quàm suture, quia rerum consutarum figuram non æmulantur. Attamen *Valerianus Cæli-* ner *suturas* attribuit simiis, parum ab humanis discrepantes. In cercopitheco squamiformes desiderantur. *Frontis Os* in caluariz basis sede, ad coniunctionem Ossis sphenoidis, transversa potius lineâ quàm futura distinguitur: ampla oblongaque scissura homines diuisum obtinent, in quam aliud Os instar cribri perforatum conicitur, arctissimeque constringitur. At *Simia Os Frontale* ea in parte omnino continuum existit, & quâ nasus principium sumit, non longè ab ea sede, quæ frontem constituit, alto & rotundo foramine parumper à lateribus compresso, illo foramine quod neruum visorium emittit, nonnihil ampliori, excavatum est. In eius humiliori profundiorique sede, quatuor aut quinque alia foramina recta & lata cernuntur. In simia caudata *Os ethmoides* admodum profundè in nares descendit, paulò infra eam regionem ex qua nasus exoritur. Harmoniâ per medium diuiditur, & vtrimque ab Osse frontis, quod etiam profundè descendit elingi videtur. *Superficies sella sphenoidis* ad narium principium in Osse frontis non est plana & æqualis vt in homine, sed est eminentissima. In posteriori sellæ eminentia glandulam excipiente, reperitur foramen exsculptum. In sellæ huius substantia nulla later cavitates vt in homine. *Cavitates illæ* quæ in apophysibus pterygoideis exsculpæ sunt, maximè & profundè apparent. *Osse, Bregmaticæ, & Temporum*, nec intus, nec foris, vllam demonstrant diuisionem, quasi ex vnicò continuatoque Osse constarent. In Osse temporum apophysis *Mastoidis* deest, *Hyalidis* exigua est. Cavitates auris videtur vnica, orbiculatim in piores gyros striata, nec tria Ossicula Malleolus, Incus, & Stapes reperiuntur, quibus aliorum animantium aures instructæ sunt, si credimus *Casserio*, sed ego semper obseruavi.

*Os Zygoma*, quâ parte ab Osse orbitario procedit, crassum & robustum est, atque eius in medium lineâ potius quàm futura distinguitur. In homine verò tenuè existit, & futura dirimitur.

*Simiz Facies* rotunda est, cynocephali oblonga & antrorsum protuberans. Ossia verò *Maxilla superioris* respondent humanis. Suture sunt harmoniis, siue rimis similes, potissimum ea quæ medium palatum interfecat. Sed peculiaris futura notatur, ab inferiore orbita incipiens, secundum longitudinem maxillæ ad caninum dentem cuiusque lateris prorepti, ipsumque palatum dirimit.

*Maxilla inferior* integra est, nullâ lineâ in mento diss. cta, breuissima est corporis

proportione, itaut ex omni animantium genere nullum breuiorem habeat, excepto homine. Extremitas quæ cavitati temporum articulatur, est condylus, ut in homine. Quare non est gynglymoides hæc articulatio, ut scripsit *Valcherus Coster*.

*Simia in dentibus caninis & molaribus differt ab homine. Caninus quidem habet dentes humanis similes, in vnaquaque maxilla binos, qui virimque assident & accumbunt incisioribus. Singulas radices ut incisores habent, sed altius infixas robustioresque, minus etiam ex anteriore parte, quam posteriore pressas & angustas. At simia cynocephalos dentes caninos longiores prominentioresque, quam vera simia obtinet. Molarium dentium numerus in homine incertus est, auctore *Galeno*: sapius enim in vtraque maxilla sunt sexdecim, interdum viginti, nonnunquam viginti quatuor. At simia semper certus adepsus molarium numerus. Differunt quoque Maxillares simiæ ab humanis, in figura externa, & radicum numero, quamuis enim priores duo molares simiæ, ab humanis, aut nihil, aut certè parum discrepent, quia in simia pinus inferior vni tantum apicem obtinet: Attamen in posteriorum dentium mensis, secundum longitudinem maxillarum, profunda admodum linea exsculpta est. Quam lineâ altera etiam transuersa, quæ in quinto dente simiæ non caudatæ gemina est, intrinsecus & extrinsecus ad gingiuam vsque protrahata interfecit. Quo fit, ut singuli eiusmodi dentes eminentias, ut plurimum quatuor in angulis (nam quinto sex sunt) tres verò foueas in medio habentes, duarum ferrarum mutuo sibi occurrentium modo committantur: quod profectò accuratissimus auctor *Galenus* explicare minime prætermisisset, si molares simiarum descripsisset.*

Scire oportet Maxillarum radices in homine non eadem perpetua forma fingi & distribui sicut in simia, in qua semper hoc modo se habent: quippe singuli molares maxillæ superioris tres radices emittunt, inferioris maxillæ molares duas, quinto excepto qui geminus est. In altera simia tribus etiam radiculis firmatus est, maximas omnium quartus obtinet, sicut etiam maximus ipse est. radices magis teretes & tenues, atque etiam acutiores in duobus sunt, qui post caninum statim collocantur. Omnes præterea magno intervallo disjunguntur, non quidem æquabili, sed quemadmodum in triangulo, longiore, in fine, quam in principio. Adhærent autem in maxilla inferiore propriis alucolis affixæ secundum ipsius longitudinem. In superiore verò duæ ex ipsis ad partem exteriorem vergunt, vna ad interiorem, è regione spatii quod medium est inter duas priores. In homine longè secus res se habet, ut fusè lateque explicat *Fusca. hum. libello de Dentibus*.

*Os Hyoides humano fermè simillimum existit, præterquam quod medium ipsius ossiculum amplius est, quam in homine, & posteriore sede insigniorem ostendit cavitatem, gibbis ipsis laryngis partibus inuehitur, si que propugnaculum cartilaginis scutiformis. In illa enim lata oblongaque apophysi, interiores partes Ossis hyoidis efformat, quæ deorsum adeo produciuntur, ut instar clypei cartilagini thyroidei obtendantur.*

## DE SPINA ET OSSIBVS EI ADNEXIS.

### CAPVT III.

**S**IMIA *Cervix* brevis est, septem vertebrae instructa, corpora vertebrarum anteriori parte non sunt rotunda ut homini, sed plana. Posticæ apophyses spinosæ non sunt longæ, & bifidæ, sed breues, simplices, & acutæ. In prima vertebra, nullum spinæ vestigium apparet, imò nulla sentitur asperitas, in anteriore parte corporis primæ vertebrae humanæ obtusa quædam eminentia apparet, quæ in simia magis extuberat, & in mucronem produciuntur. Quod si vertebrae & spinas breues habet simia, apophyses transuersas obtinuit longiores, atque ad anteriora magis, quam in homine reflexas. Imprimis verò sexta colli vertebra, quæ hunc processum præ cæteris insignem adeptæ est, eumque bifidum, magisque recuruum & aduncum, quam in aliis vertebrais. Hic autem spondylus sextus maximus est, propter illas transuersas apophyses grandiores, in simia caudatæ minor est. Septimi spondyli transuersæ apophyses simplices & tenues, in cau-

data simia bifida, & satis longæ existunt, quæ licet in homine simplices appareant, sexto tamen crassitie non cedunt.

Prima simiæ vertebra ad finem processus transuersi ascendens utrimque foramen habet, ad neruum transmittendum, quo humana caret vertebra, septima colli vertebra in homine sæpius est perforata: Vnde euenit, quod transuersi processus huius vertebrae non sunt similes apophysis transuersis colli, sed potius thoracis apophysis transuersis assimilantur. *Vertebrae dorsi* corpora parum ab humanis differunt, neque apophyses multum dissimiles sunt, exceptis rectis vltimarum duarum vertebrae, quæ rectiores sunt in simiis, paulum deorsum inclinant in hominibus. In postremis vertebrae dorsi reperiuntur quatuor infernæ apophyses saticuli gratiæ constructæ. In humanis vertebrae duæ tantum notantur, quas etiam in lumborum vertebrae obseruabis. In simia decima dorsi vertebra, infra suprave suscipitur, ac in homine est duodecima.

Lumbi, inquit *Galenus*, in simiis sunt longiores quàm in hominibus, si pro ratione reliquarum partium hoc æstimare velis, nam in homine quinque vertebrae lumbos efformant, in simiis non secus, quàm in aliis quadrupedibus sex adsunt. Harum vertebrae processus ab humanis differunt. Si quidem transuersi in homine teretes sunt & oblongi, nonnihil in exteriora conuerli, costularum vicem gerentes. In simia sunt ampli, intrò spectantes, & instar squammæ tenues: figurâ caudam hirundinis referunt, aut cornu retortum, quod oblongo acutoque mucrone erigitur, ac sursum vergit. Ac tertia lumbi vertebra primò incipit transuersum consequi processum, qui breuius est. Reliqui subsequentes longiores existunt. Posteriores processus spinosi non sunt recti, sed superne spectant, atque excipiuntur à supernis incumbenibus vertebrae, quæ hiatus siue fissura triangulari inter duos transuersales processus existente, dum in posteriora simia spinam inflectit, eosdem transuersales excipiunt.

Obseruandum venit in homine circa radices infernas transuersarum apophysearum lumborum, atque etiam duarum infernarum thoracis, quædam tubercula magnitudine figuraque mespilorum nucleos referencia sæpius reperiri, quæ cum in canibus & simiis non habeantur, suspicari posset aliquis vicem illarum quas paulò antè descripsi proceritatem in homine tenere.

Os Sacrum spinæ fundamentum in homine, ex tribus vertebrae constat: In simiis ex duabus tantum componitur, quibus illium Ossa copulantur.

Simiæ longior est *Coccyx*, quàm homini, pluribus ideo constructus Ossibus, quæ iuxta commissuram Ossis Sacri perforata sunt, medullamque continent, atque nervos antrorsum & retrorsum emittunt, quæ omnia desunt in coccyge hominis: cur autem simia vero coccyge caruerit, rationem reddit *Fallopins*, in *Obseruat. Anatomica*.

Homo, inquit *Galenus*, ex omnibus animalibus *Cassus* curuissimas habet, propterea latissimum pectus obtinuit. Simiæ latius cæteris pectus datum, sed humano angustius.

Porro simia, tam caudata, quàm non caudata, costas vigintifex præ se fert, cum in homine tantum viginti quatuor reperiuntur. Harum utrimque sunt octo veræ costæ, in homine septem, quæ per articulum sterni committuntur. Quinque verò nothæ costæ non desinunt in perficam cartilaginem versus sternum inuicem constrictæ, vt in homine, sed ossæ magis quàm cartilaginossæ, à se mutuo disiunguntur. *Costæ* in simia, tam caudata, quàm non caudata, spatii vertebrae intermedii inferuntur: ac in hominibus magis corporibus vertebrae mætexuntur.

Sternum octo constat Ossibus rotundis, quorum primum aliquantisper prominet, supra cartilaginum duarum primarum conjunctionem, quæ duæ cartilagines videntur amplexari superiore parte primum os sterni. Cartilagines costarum commissuris Ossium sterni accrescunt, duæ vltimæ concurrunt simul in articulationem vltimi & penultimi ossis sterni. Vltimum os sterni xiphoidem cartilaginem referens, impensè longum est, & teres.

Simia quoad scapulas & clauiculas homini maximè similis est, auctore *Galeno*. Clauicula incipiens à primo sterni osse ad medium costæ rectâ procedit, inde ad acromion vsque mulrùm curuata intumescit: huic articulationi interiectum est ossiculum, quod in homine ad decimum octauum annum & vltra, appendix existit: ac in simia, nec istud ossiculum, nec illius vestigium vllum apparet, imò pars illa robustissima est.

## DE ARTVBSV SVPERIORIBVS.

## CAPVT IV.



**S**IMIA & Hominis *Omapleta* omnino similes sunt.

*Humerus* simia non admodum ab humano differt, in caudata dissimilis est iuxta inferius caput, quod cubito articulatur. Hac enim regione refectitur ab exteriori parte inrorsum, atque in illa flexura canaliculum acquirit ex opposito latere peruium.

*Cubiti Offa* duo in vtraque simia humanis respondent.

*Carpus* simia non valde differt ab humano, obtinuit tamen nonnumos, de quo sic loquitur *Eustachius*: Hoc ossiculum non in prima brachialis aëie est locatum, sed tertio eiusdem aëie ossi incumbit, atque inter ea quæ indicem & medium digitum sustinent seipsum inserit: vocatur à *Galeno* *Apus*, hoc osse videntur carere simia caudatæ, sed eius loco adipiscuntur os peculiare, quod carpi ossi cubito sublatro annectitur, & satis longè protuberat. Deinde instar cornicis versus manus volam incuruatur, atque cum processu ossis carpi radio articulati, magnam cavitatem musculorum tendinibus efformat.

*Metacarpus*, *Digitorumque Offa* simia, tam caudatæ quàm non caudatæ, parum admodum ab humanis ossibus discrepant. Simia quidem magnam manus digitum *Pollicem*, mutilum obtinet, & eurtum, & indici propinquum, non oppositum, instar alterius manus, ut in homine: Reliqui digiti multò sunt minores digitis pedum.

## DE ARTVBSV INFERIORIBVS.

## CAP. V.



**S**SA *Ilium* in vtraque simia, tam caudatæ quàm non caudatæ, toto habitu, & figura distat ab humanis: dehiscunt enim eo in loco, ubi pubis ossa esse debebant, atque omnino priuantur osse pubis: propterea ad velociter currendum ineptæ sunt Ischij articulus planè dissimilis est ab illo hominis, ut notauit *Galenus*.

Ea est *Femoris structura* in simia, ut eam stare rectam non permittat, nec instar hominis corpus suum erigere, aut incedere, ne quidem sedere; quia femoris caput obliquius in articulo coxæ committitur. In hominè eueruæ rotundi capitis femoris oblonga est, & sensim obliquè deorsum ducitur. In simia verò brevis, & propemodum transversa visitur. Sub femoris ceruice, apophyscæ duæ, trochantæres dictæ, in simia similes sunt humanis, verum in illa, ut in caudata minores.

*Patella* vtriusque simia manifestum discrimen ab humana demonstrat: est enim oblonga, non rotunda. Quamuis autem extrinsecus gibba sit, atque intus caua, nihilominus longè aliter se habet quàm in hominè. Nam secundum ipsius longitudinem recuruatur, excavaturque adeo, ut nihil propemodum in medio emineat, curuo aduncoque eius sinu nauiculam quandam elegantissimè referre videatur. In caudata simia patella videtur ex duobus ossibus mutuò adnatis constructa.

*Tibia utrumque Os* in vtraque simia humanis ossibus simillimum est.

*Simia Pes* ab humano maximè discrepat, est enim oblongus latusque homini, angustus brevisque simia, pro ratione corporis, pedisque digiti longiores sunt, sed metatarsi ossa breviora, calcaneum verò angustius, & anteriori in parte qua cum osse cyboide committitur, latus euadens, magisque inibi longum, quàm retrò, impedit ne simia diu erecta, & stare, & ambulare queat. Astragalus *Galeno* tenuis non efficitur, sed manens sublimis, ossi scaphoidi coniungitur, quod simia repugnat, in qua astragalus humilem, oblongam atque tenuem ceruicem habet. Planta in simia ex quatuor ossibus componitur. Pollex ex tribus, inquit *Eustachius*, Quamuis *Volcherus* in caudata simia nullam obseruare differeatiam, quâ discrepant ab homine. Digitorum

notissima est discrepantia in homine, ut notauit *Galenus*, omnes una serie disponuntur, breuissimoque spatio discreti. multo minores sunt, quàm qui in manu habentur. Nam quando pes summa manu maior est, tanto illius digiti manus digitis sunt minores.

Accedit quod pollex longitudine indici æqualis est, quem dupla crassitudine superat, talisque est quatuor digitorum commensuratio, ut ab indice ad minimum semper deficiat longitudo: & secundæ aciei Ossa, si indieem exceperis, breuiora sunt iis, quæ in tertia phalange reponuntur. Hæc omnia in utraque simia aliter se habent, omnes enim pedis digiti insigni spatio discreti sunt, multoque longiores, quàm in manu existunt: Pollex cæteris digitis breuior tenuiorque est, atque diuersam ab aliis positionem sortitur, dehiscit etiam, ut pollex in manu valde ab indice. Digiti pedis simiæ, manus humanæ digitorum seriem imitantur, est enim pollex in pede simiæ reliquis digitis breuior, inter alios quatuor digitos ut in manu, medius omnium longissimus.

## DE SESAMOIDEIS.

### CAPVT VI.

**I**n homine Ossa *Sesamoidea* pauca sunt, magnæque ex parte cartilaginosa, & sicæ quæ pollicis applicantur exceperis, inconstanti sede firmata. In simia verò multa, atque magna occurrunt, & ossa perpetuò sunt. Cuique primo quatuor digitorum internodio, & secundo pollicis gemina ferè semper adnectuntur. Duo ossicula magnitudine ciceris, lupia vtrumque tuberculum femoris in origine gemellorum reperiuntur.

FINIS.



OSTEOLOGIA  
CORPORIS HUMANI.  
EX HIPPOCRATE COLLECTA,  
& in ordinem digesta,

PER IOANNEM RIOLANVM, PROFESSOREM  
*Regium Anatomicum.*



P R Æ F A T I O  
QVA DOCETVR HIPPOCRATEM  
PERITVM FVISSE ANATOMICVM,  
& ab eo vniuersam Anatomem descriptam.

**S**CITVM est illud à Galeno sapiens inculcorum, Hippocratem omnium bonorum autorem esse. Primus enim rudem & incultam Medicinam certis præceptis instruxit, & in suas partes distinxit. Non erat ante illum cognita & explicata corporis humani structura. Neque de hac parte Medicina vlla veterum exstabant monumenta: ille diuino suo fretus ingenio, & sagaci diligentia, quæ ad Anatomicam artem spectabant perscrutatus est, inuenta literis consignauit. Galenus testatur Hippocratem rudem illam præcorum Anatomem tum obscuratam, & in tenebris iacentem erexisse, instaurasse, & cum esset huius artis summæ deditus, eandem plurimis inuentis auxisse & locupletasse. Præterea, quantum fuerit Hippocratis studium accuratum, in hac Medicina parte Galenus aperit docet, libella quod optimus Medicus sit Philosophus, ubi non aliam patientis Medicina causam addidit, quàm contemptum & supernam infusam Anatomicæ doctrinam, quam Hippocrates Medicina principium & fundamentum esse voluit. Sed ut exaret aliquod monumentum suæ diligentia, laborisque in hoc studio exantlati, res Anatomicas saluti descripsit, quæ manent immota læcis, necturbata volant rapidis ludibria ventis, ut carmina Cumanæ Sibyllæ, sed à variis doctis religiosis leguntur & observantur, libram de corporum refectione condidit, quem iniuria temporis imperfectum habemus. Attamen variis in libris omnes corporis partes, etiam vsque ad minutissimas persequutus est, quæ huius libri lætulam quædamtenus facere possunt. Commentarios de venis & arteriis publicauit, quos Galenus videre non potuit. Verum hoc aperte declarat Hippocratis industriam in arte Anatomicæ, quod Galenus de Anatomia secundum Hippocratis doctrinam quatuor libros composuerat, quorum deploramus iacturam. Porro, in Ossibus explicandis & cognoscendis, Hippocratem plurimum insudasse & excelluisse, manifeste probant libri de fracturis, & luxationibus Ossium, arte mirabilis elaborati, quos nunquam edere, ne quidem imaginari potuisset, sine perfecta Ossium cognitione. Adde sceletum aneum Apollinis Delphici, ab ipso Hippocrate consecratum, in memoriam Osteologia à se restituta: ille idem candidè proficitur se quacumq. de Ossibus exarauit, ex hominis Ossium inspectione didicisse. Quamuis autem liber Hipp. de Ossium nat. sit imperfectus, omnia confusè & sine ordine proponat: tamè ex illius libris integra, & omnibus numeris absoluta Osteologia eriri & colligi potest, quod præsentis opere efficere tentauit. Varii enim in locis dispersæ de Ossibus emblemata veluti compositas tesseras compegi, & in hunc ordinem digessi. Itaque quod de methodo medendi, quæ apud Hipp. confusè & inordinatè describitur, Gal. pronuntians, idè de Anatomia Hipp. affirmare possum. Fieri nequit, vt libro vno bene omnia scribat Hippocrates, atque ordine doceat. Præcipuè cum ipse primus horum inuentionem sit molitus, qui tamen hæc ab Hippocrate, tum transfuersè, tum inordinatè scripta didicerit, totamque suam vitam in eam quæ ex operibus docetur meditationem, exercitationemque deuouerit, is lucem & ordinem doctrinæ aducere poterit.

Vniuersa Anatomies seminaria hæc & illuc sparsa apud Hipp. reperiuntur, ex quibus simul collectis integrè Anatomia corpus condere, & erigere licebit: nam in omnibus eius operibus intelligitur plus semper quàm scribitur, & cum ars summa sit, ingenium tamen vltra artem est. Cum autem Anat. sit duplex auctore Gal. 1. 2. admin. Anat. c. 2. Altera utilis, quæ ad vsum Medicum est necessaria: Altera supra vsum artis, quæ ornamenti & voluptatis plus adfert, quàm utilitatis: superabundantem vocat Gal. illam accuratè & eleganter Hipp. descripsit. Quantum verò fuerit ille in scribendo religiosus & accuratus, ex l. 1. de art. intelligitur, in quo nihil nisi quod obseruauerit se referre scribit. & ipse Gal. confirmat, comment. ad part. 3. l. 1. de art. Quamobrem quo carmine summi præceptoris Lucretius affatur, par est, vt ab omnibus Hippocrates prædicetur.

Tu pater es rerum inuentor, tu patria nobis  
Suppeditas præcepta, tuis ex inclyte chartis,  
Floriferis vt apes in saltibus omnia libant,  
Omnia nos itidem depascimur omnia dicta;  
Aurea perperuâ semper dignissima vitâ.



# OSTEOLOGIA

## CORPORIS HVMANI:

### EX HIPPOCRATE COLLECTA,

### & in ordinem digesta.

1. **A**D multiplicem Ossium affectionem, & articularum luxationem, repositionem, & Ossium contritorum refectionem, & perforationem, & compositionem, & detractionem, ac reliquam curationem, maiore industria utetur, qui nouerit qualis est locus, & quale os quod luxatum est, *Epistola ad Theſſalum ſuum.*
2. Vbi non inerat glutinosi, verum pinguis & frigidi, citius exulta sunt propter pinguedinem, atque hæc Ossa durissima & rigidissima existunt. Vbi vero pingue & glutinosum, similia sunt, Ossa sunt antrorsa, *lib. de principiis.*
3. Turbaris & confusis elementis, quidquid fuit ex terræ pinguedine, & pingue, & paucissimum humidi habens, celestim exultum est, & facta sunt Ossa. *Ibidem.*
4. Quæ solida sunt natura in compaeto ac sicco, & non consumuntur ab igne in alimentum, sed valida ac robusta fiunt, & consistunt humore deficiente, hæc Ossa, & nervi nominantur, *lib. 1. de diæta.*
5. Ossa indurantur à calore conglutinata, *lib. de natura pueri.*
6. Postquam articulatus fuerit puer, speciebus membrorum ipsius augetur; tunc & Ossa duriora fiunt, & cauantur, atque hæc à spiritu fiunt. Caua autem existantia trahunt ad se à carnibus, quod in sanguine est pinguisimum, & progressu temporis ramificantur versus extremitates Ossium, *lib. de natura pueri.*
7. Medulla alimentum Ossis, propterea callo glutinantur, *ibidem.*
8. Sola spinalis medulla membranas habet, quas alia medulla non habet, *libro de principiis.*
9. Ossium alimentum est naturæ naso bis quinque, maxillæ & clauiculæ, & costis duplicia, cubito triplicia, tibis & brachio quadruplicia, femori quintuplicia, & si quod in his plus aut minus potest, *lib. de alimento.*
10. Ossa stabilimen, formam, & rectitudinem corpori exhibent, *lib. de Ossium natura.*
11. Apophysis est totius Ossis pars productior, *lib. de articulis.*
12. Apophyseos sæpius mentionem facit Hippocrates.
13. Scellex sunt partes, Caput, Collum, Spina, (quæ Thoracem comprehendit) Lumbi, Manus, & Pedes, *lib. de Ossium natura.*
14. Imprimis nosse conuenit Ossium commissuras, ut plurimum ex capite & acetabulo constare. At in quibusdam cauum acetabuli formam referre, & oblongum esse. In nonnullis verò sinis leuiter esse depressos, *lib. 4. de articulis.*
15. Quæcumque Ossa inter se committuntur, articulos faciunt, *libro de locis in homine.*
16. Totum id appellatur diarthrosis, vbi committuntur extrema ossium, quæ in flexu & porrectione moventur, *lib. de articulis.*

17. Differentiæ duæ sunt, enarthrosis, & gynglymos, qui duplex est ratione stru-  
cturæ, in cubito, & vertebrais, *lib. de articulis.*
18. Synarthrosis quæ non differt à symphyfi, duas sub se comprehendit differentias;  
sutura, siue harmoniam & gomphosim.
19. Carnes corpori colligationem præbent, *lib. de Officium natura.*
20. Mucus omnibus Ossibus à natura inest, & cum hic purus fuerit, articuli sani  
sunt, & bene moueri possunt, utpote lubrici, *lib. de locis in homine.*
21. Plurimum differt neruorum ligamentum, cum in quibusdam remissum sit, in  
quibusdam intentum: nam humiditas hominibus fit ex articulis propter neruorum  
connexionem, si laxa fuerit, & intentiones facili ferat. Multos enim videas, qui ad-  
eo humidi sunt, ut quando velint, articuli ipsis citra dolorem excidant, & absque  
dolore restituantur, *lib. de articulis.*
22. Donec Ossa fuerint solida facta, menstruarum purgationem circuitus est, *lib. 6.  
Epidem.*
23. Acutum habentes caput, siquidem valida ceruice sunt, & aliis robusti sunt, &  
ossibus, *lib. 6. Epidem.*
24. Humana capita nulla inter se similia sunt, neque etiam certus suturarum nume-  
rus, sicut ne locus quidem, sed quicumque in fronte proiecturam habet. Proiectura  
autem est, quod rotundum ex caluarie Osse extra solidum eiicitur, ei suturarum fa-  
cies est, qualis littera T deformari solet. Nam secus proiecturam, lineam, quæ bre-  
uior est, transversam habet: longior autem ex eodem vertice, per medium caput,  
prorsus ad ceruicem vsque semper procedit. Contrà, cui magis eminet postica ca-  
pitis pars, ei aliter atque illi suturæ se habent. Etenim breuior linea secus proiecturam  
transuersam sita est: longior verò, secundum capitis longitudinem, per illius medium  
ad frontem omnino pertendit. At cui utrimque ab antica & postica parte proiectu-  
ræ procidunt, huic itidem suturæ ad formam H literæ procedunt. Cuius quidem li-  
teræ longiores lineæ secus utramque proiecturam transversæ pertinent. Tertia au-  
tem breuior per caput medium prorsus excurrans sub utramque longiorem lineam  
desinit. Verum, cui neque anterior, neque posterior pars procidit, huic suturæ  
ad litteram X. deformatæ sunt. Sed ita tamen, ut ultra transversam ad duo tem-  
pora pertineat: altera verò prorsus per medium caput feratur, *libro de vulneribus  
capitis.*
25. Capita futuras habent, alia tres, alia quatuor: quæ quatuor habent, utrim-  
que una est iuxta aures. Tertia ab anteriore, quarta posteriore capitis parte. At  
in eo capite quod tres obtinet, nulla futura in posteriore parte reperitur, *libro de  
Officium natura.*
26. Caput tres futuras habet, inuenitur tamen & solidum absque futuris, & illud  
quidem humidum, *lib. de structura hominis.*
27. Quod quis plures futuras habet, eò saniore vitam, *lib. de locis in homine.*
28. Dehiscere quoque possunt suturæ capitis, *lib. de Officina Medici.*
29. Calvaria duplex vsque ad verticem à fronte est, eiusque densissimum, durissi-  
mumque os supernè est, & infernè iuxta meningas, atque diploe, siue discrimen val-  
de fungosum, ac molle est, pumicis modo crebriter eauum, estque totum istud cal-  
uarie os, si internam externamque faciem modò excipias, spongiosum totum, & in-  
ter ea caluarie Ossa venæ tenuiores, cauiioresque discorunt, sanguine plenæ, *lib. de  
vulneribus capitis.*
30. Capitis Ossa vnà eum oculorum Ossibus sunt octo, *lib. de restitutione.* Nominan-  
tur Ossa sincipitis, Ossa temporum, Os occipitis, *lib. de vulneribus capitis.*
31. Foramina aurium ad os durum & siccum, lapidi simile pertingunt, iam verò ad  
ipsum os, est cavitatis antrofa. Serepitis autem ad dura sumantur, os autem cauum  
resonat per durum, *lib. de principis.*
32. Cerebrum in cavitatem nasi pertingit, atque hæc parte non est ante ipsum os  
aliquod, sed cartilago mollis veluti spongiosa, neque caro, neque ossiculum.  
*Ibidem.*
33. Vniuersi capitis tenuissimum infirmissimumque os est, quod anteriorem ipsius  
partem constituit, ex reliquis ossibus, id quod sub temporibus conditur, infirmis-  
simum est, *lib. de vulneribus capitis.*
34. Sed in toto osse capitis, maior in occipite, ac secundum aures durities. *Ibidem*

35. In superiore maxilla plures sunt symphyfes. In maxilla inferiore vna est symphysis ad mentum, quæ inrer dum diuellitur, *lib. de articulis.*
36. Maxilla superna quiescit, est enim capiti connexa, & non coarticulata, inferior verò maxilla mouetur, coarticulata est à superna maxilla, & à capite, *Ibidem.*
37. Os quod à superna maxilla prodiit, cum eo osse subiugatum est, quod sub aure annexum est, quodque caput infernæ maxillæ concludit, ac dirimit, cum alteri caput inferius, alterum sit superius, & extremæ inferioris maxillæ partes ita se habent, vt altera ob longitudinem non facîle accessionem admittat, altera verò ceruix est, & supra iugulum os excedit, *lib. 1. de articulis.*
38. Solæ ex ossibus maxillæ in seipsis venas habent, & ob id alimentum amplius in ipsas, quàm in alia ossa trahitur, *lib. de Principiis. At lib. de Ossium natura*, inter omnia ossa, sola maxilla inferior venas habet.
39. Quibus os palato decidit, iis medius nasus subdidet, si verò os, vnde dentes enascuntur, extremus nasus concidit, *lib. 6. Epid.*
40. Post ossa generantur dentes, ex hac causa, ex ossibus capitis, ac maxillarum incrementum sit glutinosum, & quod ex pingui inest, à calido siccaturum exurit, & sunt dentes reliquis ossibus duriore, quia nihil inest, & primi quidem dentes nascuntur à victu in vtero, & postquam natus fuerit puer, lactenti à lacte: vbi verò ij exciderint à cibis & potibus. Excidunt autem, vbi ad annos primi alimenti peruenierint, quibusdam etiam prius, si à morbofo alimento nutrir fuerint. Plurimis verò cum septem annos impleuerint: qui verò postea enascuntur, simul consenscunt, nisi præ morbo perforentur. Cæterum dentes ob id posterius aliis nascuntur in maxilla, quia vcnæ sunt, & huic ossi soli inter omnia ossa ex inferno ventre alimentum præbent. Ossa verò tale augmentum dant, qualia existunt. In quarto septenario dentes enascuntur plerisque hominibus, duo qui sapientie dentes appellantur, *libro de principis.*
41. Dentes cum maxillaribus duo supra triginta sunt, *lib. de structura hominis.*
42. Qui plures dentes habent, longioris sunt vitæ, *lib. 6. Epidem.*
43. Rachis est *incurua*, recta & incurua, in posteriorem & anteriorem partem inclinat, ab Osse Sacro vsque ad lumbos est *curua*, inde ad septum transversum *incurua*, ab ea parte ad magnam vertebram, quæ est supra summam humeri partem, est *incurua*, ipsa ceruicis commissura in partem anteriorem repanda, est *incurua*, *lib. 5. de articulis, & lib. de Ossium natura.*
44. Spina hominis vertebrae viginti quatuor habet, *lib. de structura hominis.*
45. Vertebrae alij plures, alij pauciores habent, qui pauciores habent his duodeviginti sunt, quarum aliz sursum ad caput, aliz deorsum ad sedem tendunt, *libro de locis in homine.*
46. Vertebrae ab anteriore parte qua ad ventrem spectant, inter se sunt æquales, aligantur autem inter se mucoso arque nervoso ligamento, quod à cartilagine orsum, vsque ad spinæ medullam progreditur. In posteriore parte, vertebrae cardinis modo commissuras habent. Singulae autem vertebrae, tam maiores quàm minores, in anteriorem partem singulos processus exigunt: his verò processibus adiecta est cartilago, atque ab ea oritur germen ligamentorum, quæ nervi exterioribus germana sunt. Quæ verò parte costæ non sunt, apophysis exortus obliquus, brevis & latus, ad singulas vertebrae nervo annexus est, *lib. de Ossium natura.*
47. Processus secundæ vertebrae ceruicis dens appellatur, *lib. 2. Epidem.*
48. Adiunctæ sunt costæ capitibus in anteriorem partem spectantibus, magis quàm in posteriorem: quæ sigillatim cum vnaquaque vertebra committuntur, maxime autem flexæ sunt hominis costæ, & eorum modo quæ curua sunt, *libro tertio de articulis.*
49. Costæ sunt viginti quatuor, *lib. de structura hominis.*
50. Pectus, siue sternum coherens ipsum sibi ipsi, discriminationes habet obliquoas, qua parte costæ annexæ sunt, laxum autem est & cartilagineum, *lib. de Ossium natura.*
51. Claviculæ sunt rotundæ in anteriore parte, motus breues habent ad pectus, ad summum verò humerum frequentiores, *libro de Ossium natura.*
52. Claviculæ articulos habent, alios in medio pectoris iuxta guttur, atque hinc co-

17. Differentiæ duæ sunt, enarthrosis, & gynglymos, qui duplex est ratione structuræ, in cubito, & vertebra, *lib. de articulis.*
18. Synarthrosis quæ non differt à symphyfi, duas sub se comprehendit differentias, futuram, siue harmoniam & gomphosum.
19. Carnes corpori colligationem præbent, *lib. de Ossium natura.*
20. Mucus omnibus Ossibus à natura inest, & cùm hic purus fuerit, articuli sani sunt, & bene moueri possunt, utpote lubrici, *lib. de locis in homine.*
21. Plurimum differt neruorum ligamentum, cùm in quibusdam remissum sit, in quibusdam intentum: nam humiditas hominibus fit ex articulis propter neruorum connexionem, si laxa fuerit, & intentiones faciliè ferat. Multos enim videas, qui ad eo humidi sunt, ut quando velint, articuli ipsis citra dolorem excidant, & absque dolore restituantur, *lib. de articulis.*
22. Donec Ossa fuerint solida facta, menstruarum purgationum circuitus est, *lib. 6. Epidem.*
23. Acutum habentes caput, siquidem valida ceruice sunt, & aliis robusti sunt, & ossibus, *lib. 6. Epidem.*
24. Humana capita nulla inter se similia sunt, neque etiam certus futurarum numerus, sicut ne locus quidem, sed quicumque in fronte proiecturam habet. Proiectura autem est, quod rotundum ex caluariæ Osse extra solidum eiicitur, ei futurarum facies est, qualis litera T deformari solet. Nam secus proiecturam, lineam, quæ breuior est, transuersam habet: longior autem ex eodem vertice, per medium caput, prorsus ad ceruicem usque semper procedit. Contrà, cui magis eminet postica capitis pars, ei aliter atque illi futuræ se habent. Etenim breuior linea secus proiecturam transuersam sita est: longior verò, secundum capitis longitudinem, per illius medium ad frontem omnino pertendit. At cui utrimque ab antica & postica parte proiecturæ procedunt, huic itidem futuræ ad formam H literæ procedunt. Cuius quidem literæ longiores lineæ secus utramque proiecturam transuersæ pertinent. Tertia autem breuior per caput medium prorsus excurrens sub utramque longiorem lineam definit. Verùm, cui neque anterior, neque posterior pars procedit, huic futuræ ad literam X. deformatæ sunt. Sed ita tamen, ut ultra transuersim ad duo tempora pertineat: altera verò prorsus per medium caput feratur, *libro de vulneribus capitis.*
25. Capita futuras habent, alia tres, alia quatuor: quæ quatuor habent, utrimque una est iuxta aures. Tertia ab anteriore, quarta posteriore capitis parte. At in eo capite quod tres obtinet, nulla futura in posteriore parte reperitur, *libro de Ossium natura.*
26. Caput tres futuras habet, inuenitur tamen & solidum absque futuris, & illud quidem humidum, *lib. de structura hominis.*
27. Quò quis plures futuras habet, eò saniores vitam, *lib. de locis in homine.*
28. Dehiscere quoque possunt futuræ capitis, *lib. de Officina Medici.*
29. Caluaria duplex usque ad verticem à fronte est, eiusque densissimum, durissimumque os superne est, & inferne iuxta meningas, atque diploe, siue discrimen valde fungosum, ac molle est, pumicis modo crebriter cauum, estque totum istud caluariæ os, si internam externamque faciem modò excipias, spongiosum totum, & inter ea caluariæ Ossa venæ tenuiores, cauioreque discurrunt, sanguine plenæ, *lib. de vulneribus capitis.*
30. Capitis Ossa una cum oculorum Ossibus sunt octo, *lib. de restitutione.* Nominantur Ossa sincipitis, Ossa temporum, Os occipitis, *lib. de vulneribus capitis.*
31. Foramina aurium ad os durum & sicum, lapidi simile pertingunt, iam verò ad ipsum os, est cavitatis antrorsa. Strepitus autem ad dura fumantur, os autem cauum resonat per durum, *lib. de principis.*
32. Cerebrum in cavitatem nasi pertingit, atque hæc parte non est ante ipsum os aliquod, sed cartilago mollis veluti spongiosa, neque caro, neque ossiculum, *Ibidem.*
33. Vniuersi capitis tenuissimum infirmissimumque os est, quod anteriorem ipsius partem constituit, ex reliquis ossibus, id quod sub temporibus conditur, infirmissimum est, *lib. de vulneribus capitis.*
34. Sed in toto osse capitis, maior in occipite, ac secundum aures durities. *Ibidem*

35. In superiore maxilla plures sunt symphyfes. In maxilla inferiore vna est symphysis ad mentum, quæ interdum diuellitur, *lib. de articulis.*

36. Maxilla superna quiescit, est enim capiti connexa, & non coarticulata, inferior verò maxilla mouetur, coarticulata est à superna maxilla, & à capite. *Ibidem.*

37. Os quod à superna maxilla prodit, cum eo osse subiugarum est, quod sub aure annexum est, quodque caput infernæ maxillæ concludit, ac dirimit, cum alteri caput inferius, alterum sit superius, & extremæ inferioris maxillæ partes ita se habent, vt altera ob longitudinem non faciliè accessionem admittat, altera verò ceruix est, & supra iugulum os excedit, *lib. 1. de articulis.*

38. Solæ ex ossibus maxillæ in seipsis venas habent, & ob id alimentum amplius in ipsas, quàm in alia ossa trahitur, *lib. de Principiis. At lib. de Ossium natura,* inter omnia ossa, sola maxilla inferior venas habet.

39. Quibus os palato decidit, iis medius nasus subsidet, si verò os, vnde dentes enascuntur, extremus nasus concidit, *lib. 6. Epid.*

40. Post ossa generantur dentes, ex hac causa, ex ossibus capitis, ac maxillarum incrementum sit glutinosum, & quod ex pingui inest, à calido siccatur exutitur, & fiunt dentes reliquis ossibus duriores, quia nihil inest, & primi quidem dentes nascuntur à vultu in vtero, & postquam natus fuerit puer, lactenti à lacte : vbi verò ij exciderint à cibis & potibus. Excidunt autem, vbi ad annos primi alimenti petuerint, quibusdam etiam prius, si à morbofo alimento nutriti fuerint. Plurimis verò cum septem annos impleuerint : qui verò postea nascuntur, simul consenscunt, nisi præ morbo perforentur. Cæterum dentes ob id posterius aliis nascuntur in maxilla, quia venæ sunt, & huic ossi soli inter omnia ossa ex inferno ventre alimentum præbent. Ossæ verò tale augmentum dant, qualia existunt. In quarto septenario dentes enascuntur pletisque hominibus, duo qui sapientie dentes appellantur, *libro de principiis.*

41. Dentes cum maxillatibus duo supra triginta sunt, *lib. de structura hominis.*

42. Qui plures dentes habent, longioris sunt vitæ, *lib. 6. Epidem.*

43. Rachis est *inmedius*, recta & incurua, in posteriorem & anteriorem partem inclinans, ab Osse Sacro vsque ad lumbos est *inmedius*, inde ad septum transuersum *inmedius*, ab ea parte ad magnam vertebram, quæ est supra summam humeri partem, est *inmedius*, ipsa ceruicis commissura in partem anteriorem tepanda, est *inmedius*, *lib. 3. de articulis, & lib. de Ossium natura.*

44. Spina hominis vertebrae viginti quatuor habet, *lib. de structura hominis.*

45. Vertebrae alij plures, alij pauciores habent, qui pauciores habent his duodecim viginti sunt, quarum aliz sursum ad caput, aliz deorsum ad sedem tendunt, *libro de locis in homine.*

46. Vertebrae ab anteriore parte qua ad ventrem spectant, inter se sunt æquales, aliz ligantur autem inter se mucoso atque nervoso ligamento, quod à cartilagine ossum, vsque ad spinæ medullam progreditur. In posteriore parte, vertebrae cardinis modo commissuras habent. Singulae autem vertebrae, tam maiores quàm minores, in anteriorem partem singulos processus exigunt : his verò processibus adiecta est cartilago, atque ab ea oritur germen ligamentorum, quæ nervis exterioribus germana sunt. Quæ verò parte costæ non sunt, apophysis exortus obliquus, brevis & latus, ad singulas vertebrae nervo annexus est, *lib. de Ossium natura.*

47. Processus secundæ vertebrae ceruicis dens appellatur, *lib. 2. Epidem.*

48. Adiunctæ sunt costæ capitibus in anteriorem partem spectantibus, magis quàm in posteriorem, quæ sigillatim cum vnaquaque vertebra committuntur, maximè autem flexæ sunt hominis costæ, & eorum modo quæ curua sunt, *libro tertio de articulis.*

49. Costæ sunt viginti quatuor, *lib. de structura hominis.*

50. Pectus, siue sternum coharens ipsam sibi ipsi, discriminationes habet obliquis, quæ parte costæ annexæ sunt, laxum autem est & cartilagineum, *lib. de Ossium natura.*

51. Claviculæ sunt torundæ in anteriore parte, motus breues habent ad pectus, ad summum verò humerum frequentiores, *libro de Ossium natura.*

52. Claviculæ articulos habent, alios in medio pectoris iuxta guttur, atque hæc co-

articulatio est, alios verò ad humeros reclinatos ad scapulas, qui humeris semper adhaerent, *libro de locis in homine.*

53. Iuguli exiguus est motus à parte ossis pectoris, ipsum enim os pectoris sibi continuatur & spinæ, sed & iugulum prope humeri articulum supernatur, cogitur autem moveri sæpiissime, eò quod cum summitate lati scapularum ossis iungatur, *libro de articulis.*

54. Summus humerus ex scapulis nascitur, in plerisque dissimiliter. Scapula ad spinam cartilaginea est, reliqua parte laxa inæqualem partem foras habet, ceruicem verò & acetabulum habet cartilagineum, ex quo costæ motum non habent, *lib. de Ossium natura.*

55. Scapulæ ad membra brachij, siue totius manus coarticulantur, incumbentes in ipsum os quod in membro est, iuxta Osses appendices duæ prodeunt, altera intrinsecus, altera forinsecus, quæ ad scapulas ossi adnascetes, infra coarticulatur sunt, *lib. de locis in homine.*

56. Quibus lati scapularum Ossis summitas deducitur, extare videtur Os quod recedit, est autem hæc, ligamentum iuguli cum lato scapularum Osse, diversa autem est hac parte natura hominis à cæteris animalibus, *lib. 1. de articulis.*

57. In lateribus scapulas alarum modo prominentes habere, malum, in *Epidem.*

58. Brachij caput ex nervo & acetabulo dependet, cartilaginis laxæ rotundam appendicem habens, ipsum verò brachium incurvum foras, & anteriore parte obliquum, non rectum est ad acetabulum. Pars verò ad cubiti gibbum lata nodosa, & repagulo similis, & solida, posteriore parte caua, in qua ceruix inest ex cubito, cum manus extenta fuerit, *lib. de Ossium natura.*

59. Brachium à natura ad externam partem incurvatum est, distorqueri solet, si non bene curetur, *lib. 2. de fracturis.*

60. Si quis in brachio supernam humeri partem carnibus denudarit, ant qua parte musculus sursum tendit, nudarit: item tendinem, qui subalis & iuxta claviculam ad pectus est apparuerit, utique caput brachij in anteriorem partem vehementer eminet, etiamsi non sit delapsum, à natura enim pronum est brachij caput in anteriorem partem, reliquum autem brachij Os ad posteriorem partem incurvum, conuersatur autem brachium cum scapulæ cavitare obliquum, cum iuxta costas fuerit porrectum, cum verò ad anteriorem partem extensa fuerit tota manus, tunc brachij caput è directo est in scapulæ cavitare, & non amplius in anteriorem partem eminere conspicitur, *lib. de articulis.*

61. Brachij articulus & magnus est, & plures sinus habet, *lib. 2. de fracturis.*

62. Cardiniformis est brachij pars in cubiti sede, in hac figura innitens ossibus cubiti & brachij reëitudinem facit, veloci totum vnum esset, & refectio articuli facta est in hac figura, *lib. 1. de fracturis.*

63. Cubiti ossa inæqualia sunt, & quod breuius est multò crassius est, quod verò tenuius est, multum superat, & excedit articulum, dependet tamen, & hoc ex nervis iuxta communem Ossium connexionem, horum itaque articularum & Ossium flexuræ cubiti natura huiusmodi est, *lib. 3. de fracturis.*

64. Os circa iuncturam manus eminens, iuxta paruum digitum cubiti est, quod verò in flexuris est, à quo vnam homines metiuntur, id brachij caput est, ille verò idem Os esse, & hoc illud putabat, itemque multi alij, est autem idem cum illo is, qui cubiti gibbus vocatur, in quem innitimur, *lib. de articulis.*

65. Summa manus ex multis ac parvis Ossibus composita, sicut pes, *libro de fracturis.*

66. Digiti ossa densa & parua habent, *lib. de natura pueri.*

67. Manus articulos multos habent, quæcumque enim ossa inter se committuntur, omnia articulos faciunt. Digiti articulos habent multos, unusquisque tres, vnam ad vnguem, in medio vnguis, & nodosæ prominentiæ: Alterum in ipsa nodosa prominentia, quæ parte etiam digitos consistunt, tertium quæ parte digitus à manu exoritur, *lib. de locis in homine.*

68. Nomina digitorum, Pollex, Index, Medius, Annularis, Auricularis, *libro de structura hominis.*

69. Optima digitorum structura est, ut ipsis magnum spatium interiectum sit, &



è regione Pollex cum indiee concurrat. Morbus quo & læduntur, quibus à primo natali die, vel in educatione affluevit Pollex, sub aliis contineri patet, *libro primo Officina Medica.*

70. Coxa magno verticulo, quod iuxta Os sacrum est, ex ligamento cartilagineo, ac nervoso adhæret, *lib. de Ossium natura.* In coxendicibus articuli duo sunt, quæ acetabula appellantur, & femora in his inarticulata sunt, *lib. de articulis.*

71. Femur gibbosum est magis ad externam partem, quàm ad internam, & magis ad anteriorem, quàm posteriorem, *lib. 3. de fracturis.*

72. Ipsum femur & foras, & in anteriore parte incurvum est, caput eius appendix est rotunda, ex qua nervus, qui in coxæ acetabulo est, nascitur, subobliquus etiam hic annexus est, minùs verò quàm brachium, *lib. de Ossium natura.*

73. Iuxta femora appendices duæ protenduntur, altera intus, altera foris, & in articulum neutra procedit, neque ab altera parte, sed ad Os femur inferuntur: Femur itaque ubi supernè in acetabulum ingruit bifidum est: huiuscemodi bicipitate, altera bicipitatis pars exterior magis foras prominet, & informis apparet ad nates, & coxendix appellatur, *lib. de locis in homine.*

74. Femoris articulus pro magnitudine, expeditior est quàm brachij, & iustam naturam solum habet, eamque rectam, *lib. 3. de fracturis.*

75. Femoris & brachij ossa magna sunt, & multum medullæ habent, *libro de fracturis.*

76. Os femoris ad genu taliter biceps est, bicipitio huic Os Tibia appellata, velut in cardine adaptatum est, supra verò adaptata mola incumbit, quæ humiditatem à carne in articulum expassum descendere prohibet: iuxta Tibiam appendices duæ prodeunt, quæ infernè ad malleolos pedis finiunt, supernè ad genu, non autem perueniunt ad articulum. Ad pedem verò Tibia iuxta malleolo articulum habet, & alium infra malleolos, *lib. de locis in homine.*

77. Tibiæ Ossa duo sunt, quæ supernè ac infernè coherant, iuxta medium verò distant, iuxta paruum digitum paulò tenuius, plurimùm autem hac parte distant, & minore momento iuxta genu, & tendo ex ipso nascitur, qui circa poplitem foris est. Habent autem infernè communem appendicem ad quam pes movetur, aliam verò supernè habent appendicem, in qua femoris articulus movetur, simpliciter & expeditè, in longitudinem specie nodosa patellam habens, *libro de Ossium natura.*

78. Tibiæ Ossa longitudine inter se similia sunt, & externum Os paululum, nec memorabili modo excedit, nullum magnum impedimentum adferens, à quo externus tendo circa poplitem nascitur, *lib. 3. de fracturis.*

79. Tibiæ duo Ossa sunt, quorum alterum altero hac parte multo tenuius est, illa verò parte non multò tenuius. Cohærent autem inter se iuxta pedem. & appendicem habent, & appendix discriminationem. Longius verò paulò alterum est os, quod secundum paruum digitum est, & talis quidem est natura Ossium in Tibia, *libro secundo de fracturis.*

80. Plurimum oneris intetnum Os Tibiæ vehit, nam simul & vnà cum ipso crure, & oneris secundum cruris rectitudinem, maiorem laboris partem intetnum Os sustinet, Femoris verò caput supernam corporis partem sustinet. Hoc autem intra crus est, & non extra, sed secundum Tibiæ rectitudinem, & simul reliqua dimidia corporis pars huic rectitudini magis appropinquat, & non externè, & simul est crassius intetnum, quàm externum, quemadmodum etiam id quod in cubito est secundum parvi digiti rectitudinem tenuius est, & longius, in articulo tamen inferno non similis est Ossis longioris constitutio, inæqualiter enim cubiti gibbus, siue flexura, & poples accedunt, *libro 2. de fracturis.*

81. In pedibus articuli multi, quemadmodum & in manibus sunt, quot enim Ossa, tot sunt articuli, & in digitis pedum eodem numero sunt, ac pari modo se habent, *libro de locis in homine.*

82. Quæ verò cum Tibiæ Ossibus communionem habent, maiora sunt aliis, *sect. 2. de fracturis.*

83. Calcaneum Os paruum non est, & supereminet quidem sub Tibiæ rectitudinem: Communionem verò habet cum venis ac nervis principalibus, tendo posterior huic Ossi annectitur, *libro secundo de fracturis.*

84 Ossa manus viginti septem sunt, Pedis viginti quatuor, colli vsque ad magnum verticillum septem, Lumbi quinque, Spinæ viginti, Capitis vnâ cum oculorum Ossibus octo, in vniuersum nonaginta vnum, cum vnguibus verò centum ac vndecim. Ceterum, vt nos ipsi ex hominis Ossibus didicimus, verticula supra claviculam vnâ cum magno septem sunt, iuxta costas tot sunt, quot costæ, duodecim videlicet, iuxta laterum mollitudinem forissecus, vbi coxendices, in Lumbo quinque, *lib. de Oss. suæ natura.*

85 Pectorum Ossa & tenuiora sunt & molliora, quia sanguinis plus continent, sunt & cauernosa, non dura, nec densa, nec solida: hinc fit, vt cùm à pari telo, aut etiam imbecilliore, æquale aut leuius vulnus acceperit tenuioris pueri Os, id magis celeriusque purulentum fiat, quàm robustioris. et si alioquin lethale vulnus fuerit, iunior quàm ætatem habens citius perit, *lib. de vulneribus Capitis.*

## F I N I S.



OPVSCVLA ANATOMICA  
N O V A;

Quæ nunc primùm in lucem prodeunt.

*Instauratio magna Physicæ & Medicinæ,  
per nouam Doctrinam*

*De motu Circulatorio sanguinis in Corde.*

*Accessere Notæ in Ioannis VVallæi duas  
Epistolas de Circulatione sanguinis,*

Authore IOANNE RIOLANO,  
Professorem Regiorum Decano.

*Eiusdem Animaduersiones*

In Historiam Anatomicam Andræ Laurentij.

In Theatrum Anatomicum Caspari Bauhini.

In Librum Anatomicum de Fabrica humana Andræ Spiegelij.

Ad Institutiones Anatomicas Caspari Bartholini.

Ad Anatomica Caspari Hofmanni.

In Syntagma Anatomicum Ioannis VVeslingij.

In Tractatum de Diaphragmate Æmilij Parisani.

De Monstro nato Lutetiæ, liber iam pridem editus.





## MONITIO AD LECTOREM.

**H**ERODOTVS *sapiens* interpellatus suam historiam in lucem conspectumque hominum proferre, expellunt Panegyrici Græciae commentus, ut publicè examinaretur, priusquam oculis omnium legendam exponeret. Eius exemplo multoties rogatus, meam sententiam de Circulatione sanguinis enunciare, hæc enim: *hesitanti, & dubitanti*, ob varias difficultates quas ostendebam in scriptis eorum, qui de hac questione tractarunt, quas cum tandem superaverim, nolui meam opinionem publicam facere, nisi publicè in Scholis Medicorum Parisiensium fuisset prius recensita, & examinata.

Nunc data occasione disputationis publicæ in celeberrimo *Æsalapy* sano Parisiensi, cui ex officia præfesse debui iuxta ritum Scholæ, ipsam proposui, ex voto & consilio Galeni, qui optabat morem veteris saculi renouari, ut nona inuenta vel scripta in locis sacris publicis appenderebatur ad examinandum, qua si probarentur, lucem adspicerent, si displicerent consensum suffocarentur: eandem sententiam periclitari volui, non in dactyli ambitione gloriae, sed amore veritatis & iuvandis, ac bene merendis studio. Sero enim arborescens præsentis, & futuro saculo profuturam, assiduae solentibus plenius respondissem. Non me villares delectabit, licet eximia sit & salutaris, quam vni mihi sciturus sim, si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam, nec enunciem, reiiciam: nullius boni sine socio iucunda est possessio, inquit *Seneca*, *epist.* 6.

Sed nequa offio nudè & simpliciter enuntiata in *Thesi*, suæ probationibus destitueretur, illas addidi, & *thesi* continuavi, ut veritas nona doctrina magis illustraretur, mensque mea facilius intelligatur.

Nam potui meam sententiam introducere & confirmare, nisi destructa circulatione sanguinis ab *Harueo* & *Vallæo* eruditissimis Medicis publicata. Dabitur illis forsitan occasio telam retexendi, & accuratius examinandi illam circulationem totius sanguinis, adeo rapidam ac precipitem, quam statuant, & ad usum Medicum renouandi.

Sed desidero, Lectorem & Censorem mea scriptiois in rebus *Anatomicis* peritum & exercitatum, quia nostræ cogitationes & probationes ex conformatione, usu, & actione partium corporis sunt depromptæ, nec pigebit, sibi hæsitare quod erere, nec pudebit, sibi erro discere, proinde quisquis hac leges, ubi pariter certus est, pergat mecum, ubi pariter hæsiat, quærat mecum, ubi errorem suum cognoscat, redeat ad me, ubi incertum, renocet me, sic enim debent agere omnes, qui rei obscura veritatem inuestigant.

Ut autem Lector meus *Philalethe*s, uno intuitu sciat nona doctrina de Circulatione sanguinis fundamenta, paucis aperiam. *Harueus*, eiusque *Señtatores*, dum agunt de Circulatione sanguinis favent opinioni *Aristotelis*, de sanguificatione in Corde facta, & sustinent totum sanguinem ab *Hepate* ad Cor meare, ibi arteriosam effici, solumque nutrire: à Corde per arterias quatuorversum distribui, venas esse tantum canales reuehendi sanguinem ad Cor, ab omnibus partibus ad quas allabitur. Ideoque circulationem totius sanguinis fieri per venas & arterias multoties in die statuant, ut assidue sanguis Cordi suppeditetur ad sanguinis recoctionem, & recalcificationem. A dextro Cordis ventriculo secundum ductum venæ arteriosæ, per pulmonum substantiam traduci, inde per arteriam venosam ad sinistram Cordis ventriculum derivari, ut vitalis fiat, sed contracto Corde per arterias in universum corpus distribui, atque ubi peruenit ad extremas partes in venas remigrare, qua reuehant ad dextrum Cordis ventriculum: sicque perpetuo redit sanguinis labor actus in orbem.

Ego vero cum sim Medicum, discedo libenter ab *Aristotele* in opere sanguificationis quam constituo in *Hepate*, quamvis ab eo sanguis subministratur Cordi, ut vertatur in arteriosum: qui diffusus per omnes arterias, continuo recurrit in venas maiores ad circulationem, sed in progressu suo unumquodque vas, sanguinem suum partibus per transennam suppeditare.

Deinde demonſtro circulari, non totam ſanguinem, ſed ſermè dimidium duntaxat, alterum dimidium contineri in vena porta, & canaliſ minoribus vena cana & aorta, qui nulla modo naturaliter circulaſur. Is tantum circulatorius eſt, qui intra canaleſ maioreſ vena cana & aorta, à iugulo ad extremos arcus extenſes includitur, in Corde per ſepium medium à dextra caſitate in ſiniſtram illabitur, ſine tranſitione per pulmoneſ. Idque ſi ſibi, ſeruo intra diem naturalem, ſanguinem tam venoſum, quàm arterioſum in ſuo excuſſu omnibus partiſus largiundo. Per hanc circulaſionem ſanguinis Medicina Galeni non mutatur, vi acciſit in altera Haruoci, imo magis illuſtratur in dignotione morborum, & uſu remediſorum, atque docetur quantum utilitatſ adſerat Medicis, & Chirurgis, nova hac circulaſio ſanguinis ad bene mēdendum. Hac eſt brevis hypocoſiſ, ſive informatio noua doctriſna, quam examini & cenſura doctiſſimorum Medicorum libenter ſubiicio. Legant igitur diligenter priuſquam deſcendant, ne videantur, non ex indiciſ, ſed ex odiſ praſumptione ignotaſ damnaſe: Eſt enim familiare hominibꝯ omnia ſibi ignoſcere, nihil aliꝯ remittere, & inuidiam rerum non ad cauſam, ſed ad voluntatem, perſonaſque dirigere. Equidem nullam exiſtimo ſcripſuram adeo fortunatam, cui nullꝯ omnino contradicatur: ſed illam cenſeo eſſe rationi conſentaneam, cui nemo iure contradicere queat: non profeſſo ex iſis, quæ tu non intelligi iudicanda eſſe veritatſ, ſed ex iſis, quæ quiſpiam intelligit, quæ & naturā prudens ſit, & ea didicerit, atq. exercuerit, nec idem contentioſus ſit, ſed veritatē amet. Non ignoro mentes noſtraſ directas & deſixas in naturaſ contemplationem, caſigare & excutire, ſicuti Veſperilionem ad lucem meridianam. Socrates cum iuueniſ mirā ſapientia, quā natura hilioriam vocat, ſtudio flagraſſet, & omne tempꝯ in perſeſtandis naturaſ operibꝯ impendiſſet, tandem ſenior, ex iſta contemplatione hunc fructum ſe retuliſſe affirmabat, ut ea qua pro certis & antea enidentibꝯ & exploratiſ habuerat, nunc pro dubiis & incertiſ habeat, & experiatꝯ. Non ita loquar cum Socrate, iam enim ad ſenilem aſtatem per Dei miſericordiam deductꝯ, candidè & ſincere proſcitor, me nullo modo penitere anataſ opera ſedulo in ſtudio Anatomico, cum animaduerſam quotidie veritatē veram Anatomicarum, qua ſenſu & oculatiſ manibꝯ à me laboriſe indagata & deprehenſa fuerat. Sed fateor circulaſionem ſanguinis omnibꝯ præcellere, magnam lucem & incrementum Medicinaſ adſerre, atque adeo mihi placet, ut cogar palam enunciare:

Vilia ſunt nobiſ quæcumque prioribꝯ anniſ  
Vidimus, & ſordet quicquid traſtauiſmus olim.

Itaque ſtatio Phyſicæ & veræ Medicinæ inſtaurationem pendere ab iſta circulaſi ſanguinis cognitione, & aſidua meditatione, in omnibꝯ naturaſ aperientiſ, tam ſanorum, quàm agrotantium corporum.

Hanc circulaſionem ſanguinis aliſter demonſtravi, quā ſecere primi circulatoriſ ſanguinis, opꝯ meiciſ arduum, & quidem nouum propter utilitatē, quaſ protuli ad bene mēdandum. Quibꝯ ſi accederet ſermoniſ elegantia, omne punctum tuſiſſem, ſi deſideratuſ in mea ſcriptione, Arnobij auctoritate me tuebor: ſi priꝯ dixero cum Diuo Paulo, imperitiſ, imo ſermoniſ, non ſcientia: cum agitur de rebus ab aſtentatione ſubmatſ, quid dicatur ſpellandum eſt, non qualiſ enim amenitate dicatur, nec quod aures commoueat, ſed quaſ adſerat audiētiſ utilitatē, maxime cum ſciamꝯ, etiam quoliſem ſapientiaſ deditiſ, non tantum alienaſſe ſermoniſ cultum: verametiam cum poſſent ornatꝯ atque uberiniſ eloquiſ, trivialeſ ſtudio humilitatem ſequentiſ, ne corrumperent ſcilicet granitatſ rigorem, & ſi ſophiſticiſ potius aſtentatione iactarent: Interea monebo Lectorem, ut ſi forſan in ſcriptiſ meiſ Anatomiciſ reperiatur quadam proſpiſ aduerſa & pugnantia huiꝯ ſcriptiani ſeiat me iſta emendaſſe in poſtrema editione. Poſtrema cogitationeſ ſunt prioribꝯ ſapientioſeſ. Dieſ dieiſ eructat verbum, & nox noctiſ indicat ſcientiam. Propterea abſtinebit ab illiſ obiectionibꝯ & obſtꝯtationibꝯ, duntaxat huiꝯ ſcriptoſ inſiſtentiſ & adhiarentiſ.

----bonorum eſt

Cuncta Theonino non rodere dente, ſed æquo  
Pro genio, proque ingenio meliora referre,  
Si ſint in promptu, ſi non communibꝯ vti.



# QVÆSTIO MEDICA,

## QVOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBVS

MANE DISCVTIENDA IN SCHOLIS MEDICORVM,

Die Iouis 1x. Februarij,

M. IOANNE RIOLANO,

DOCTORE MEDICO, MODERATORE,

PROFESSORE REGIO, DECANO,

REGINÆ MATRIS, REGIS LVDOVICI XIII.

Primario Medico & postremo.

*An propter motum sanguinis in Corde circulatorium,  
mutanda Galeni Methodus medendi?*



ANTA est maioris mundi & minoris, scilicet hominis, inter se similitudo, vt quidquid in maiore Mundo reperitur, id omne in minore deprehendatur. Sed præ cæteris admirabilis occurrit Cordis ad Solem analogia, mutatis ac inuicem mutatis nominibus, dum Sol Cor Mundi dicitur, & vicissim Cor Sol hominis, etenim Cor æthereo calore, situ medio, motu perpetuo, sanguinis & spirituum generatione, eorundem fluxu & irradiatione, exquisitè Solis naturam æmulatur, imò superat, adeoque inter partes corporis nulla obseruatur tanto artificio, tantoque apparatu exornata, vt principium ac domicilium vitæ in se contineret, tanquam primum viuens, & vltimum moriens, atque fundamentum existeret omnium corporis partium: Siquidem in conformatione & corporatura Cordis omnes corporis partes similes, ipsique muscoli reperiuntur, ac si deberent ei suum ortum & hyparxim, reliquæ organicæ vitam, agendi vim, & motum inde re-  
petunt.

VT autem Cor suo fungatur officio, motricem facultatem, siue pulsificam obtineat, harmonicè musicali modulo salientem, sibi congenitam, arteriis adscititiam, ab ipso Corde inspiratam & emanantem, quæ ipsum dilatat in diastole, constringit in systole, quiescere facit in perisystole. Cùm sit excauatum, ad excipiendum & emittendum, mouetur: Istius motionis continuïtas non potest esse absque materia, vt in pneumaticis & hydraulicis organis, nec alia est, quàm aër & sanguis per Cordis cauitates reuolutus, ad motus perennitatem, caloris natiui conseruationem, & corporis nutritionem. Desertur autem per venam cauam, in dextrum Cordis sinum, ibi per medium eius septum immobile, ac peruium, pars crassior secundum venam arteriosam in pulmones ablegatur ad nutritionem, habetque reuersionem in cauam dum regurgitat, pars tenuior in finistrum sinum illiquitur, vertenda



in sanguinem arteriosum purissimum, inde secundum aortam deductus in artus, per mutuas anastomoses vasorum ab arteriis in venas, ex se sanguisforbas transfusator, vt iterum recurrat ad Cor tanquam ad fontem & principium suum, more aquarū, quæ ascendunt vsquequò principii sui ortus æquaucrint, modò marginibus contineantur.

**V**erum, nequaquam vniuersi corporis sanguis circumfluus, quotidie bis tertæ, ad Cor remeare circulus, vel semel intra horæ spatium, vt nonnulli audaces asseuerant, cum vtrumque sit absurdum & impossibile, quandiu sanum est corpus & alitur. Sed in magnis inediis, si corpus iam extenuatum, per duos triesev diēs alimento defraudetur, vel in largo sanguinis dispendio, sponte vel arte factò ad decem, vel duodecim libras, intra duodecim horas absque vlla reparatione: Tunc totus ferme sanguis ter, vel pluries ad conseruationem caloris natui, motus Cordis continuationem, atque spirituum testurationem potest circulari. At in sanis corporibus intra diem, semel aut bis pro quantitate alimenti assumpti, & vacuationis excrementorum, sanguinis illius reddit labor actus in orbem, qui in canalibus venæ cauz, & aortæ, à iugulo vsque ad artus directè porrectis concluditur, qui verò tubulis venæ portæ coërcetur, qui in vasa minora, tam cauz quàm aortæ diffusus est, non recurrit ad Cor, nisi violenter raptus, in summa inopia sanguinis canalium maiorum aortæ & cauz, vel æstro quodam percitus, profiliat extra sua conceptacula, ruatque in cauatū, attamen dum exuberat, depletur per loca conuenientia. In muliere grauida, sanguis foetus fermè totus remigrat versus Cor matris, donec Cor perfectè fabricatum fuerit, tuncque placenta carnè exceptus, & separatus à sanguine materno, quamuis ab vtero huius, per canales maiores cauz & aortæ propriam habet circulationem, cuius ope aliquandiu viuuit, extincta matre, tumque celeriter extrahendus cæso matris vtero, vt eius vita conseruetur, quam interdum cogitur rependete pro matris incolūmitate, alioquin matricida ni moriturus.

**P**er istam circulationem sanguinis sic explicatam, Medicina Galeni farræ testæ & inuiolata conseruat, tam in procreatione sanguinis, quàm in productione morborum, ratione causarum, & locorum: Etenim sanguinis alimentarij elaborati, etiam spiritu naturali imprægnati primarium instrumentum Hepar constituitur, secundarium Cor, præsertim sanguinis directè ad ipsum, ab Hepate, vel ex trunco cauz affudit perlabentis, quem arteriosum & viuificum reddit, sigillum vitalitatis impertiendo, per caloris & spiritus perfectionem. Inde duplex sanguis, venosus & arteriosus, ratione loci, substantiæ, & contrarij motus specie discretus. Vterq. alimentarius, sed venosus absque arterioso, perfectè non potest nutrire, quod præstat solus arteriosus. Excrementa sanguinis in Hepate fecernuntur, & ad sua quæque loca demandantur, vbi morbos excitare solent. Ac proinde febrium intermittentium materia, & sedes, non interpolantur, neque continuarum. Medendi ratio hæcenus instituta retinetur, seruatis tamen quibusdam diorismis, ad bene medendum necessariis, ob continuum sanguinis venosi canalium maiorum recursum ad Cor, & venæ portæ, sæpe vitiosum sanguinem continentis, discrimen à caua. Quod prisci Medici non ignorantes, in choantibus morbis liberaliter sanguinem detrahebant, rarò ter vel quater, toto morbi decursu. Sed variis artificijs nunc exoletis, tentabant in habitum corporis vitium massæ sanguineæ euocate, temperare, & expurgare, per frictions, ligaturas, diopaces, phœnigmos, sinapismos, percussiones, sudationes, balnea, cornicula, apriationem ad Solem, pernoctationem sub dio, gymnasticam, quorum magnam partem olim administrabat Iatrapeutice, Medicis tum lubdita & vestigalis.

**N**unc autem eum tota Medicorum industria versetur potissimum in sanguinis educatione, purgatione, & dieta, ministris Medicinæ, relictis Chirurgiæ & Pharmaciæ operationibus, quorū tamen directio ad peritos Medicos spectat: Ob sanguinis recursum ad Cor, in vfu istorum remediōrū, cautiones quasdam adhibere conuenit. Imprimis venæ sectio in febribus ardentibus, ab initio debet esse larga & liberalis, tam è supernis, quàm infernis partibus, si plethoricū & robustum fuerit corpus, nec inutilis erit venarū manus apertio, si venæ pedis tundantur vtiliter, neque reiicienda sunt malaeolorum scarificatio, venarū nasi referatio, cucurbitularū etiam cruentarum per totū caput admotio, necnō hæmorrhoidū apertio. Purgatio post varias & multiplices venæ

secciones, exaeto septimodie morbi, febre utcumque mitigatâ, si nulla suspicio inflammatis visceris etiam in zymosi interponetur, eaque blanda, sæpius repetita, non intermissa venæ sectione, si morbus exposulet. Purgatio præcipitata & violenta per metallica, siue per os, siue per aluum tentetur, plus damni, quàm emolumenti semper attulit. Purgatio per externa medicamenta, extremis artubus apposita, nequaquam repudianda, neque alteratio sanguinis, quæ in iisdem locis, per alexipyreta procuratur negligenda, neque cardiaca manifestis qualitatibus agentia, sunt omit- tenda, tam sumpta, quàm admodum, iatroleptice ægris & sanis necessaria, ad vltum Medicum reuocanda. Dixit tenuis & exquisita, abstinendo ab omni cibo per duos trefve dies, vel alternis diebus parçè nutriendo more veterum Medicorum, sangui- nem minuit, vitiosos humores exsiccat, interdum etiam modicè sanguinem detra- hendo & purgando. Quod medendi genus periculose plenum alex, requirit *Hippo- cratem* sedulo observatorem, qui non multum ab ægro recedat, vires cum morbo as- siduè comparando, vt labantibus cibo conuenienti opportune subueniat.

*Ergo propter motum sanguinis in Corde circulatorium, non est mutanda Galeni Methodus medendi.*

Proponebat Lutetiz IOANNES MAVRIN, Annontensis, tum Baccalaureus, et si Doctor Auenionensis eruditissimus, nunc Doctor & Collega noster meritissimus. A. R. S. H. M. DC. XLV.

## OBJECTIONES CONTRA THESIM.



Quæstio de circulatione sanguinis, qualis à nobis proponitur à D.D. Doctoribus eruditissimis, ordine Scholæ disputantibus, rationibus va- lidissimis impugnata fuit, sed non expugnata, quoniam abundè satis- factum, vt opinor. Præcipuas obiectiones paucis enarrare forsan lecto- ri non displicebit: prætermisiss instantiis, & consequentiis, vt moris est in disputationibus publicis Scholarum.

Obiectio I. *Imprimis damnata fuit circulatio sanguinis, quia paradoxa, noua, inaudita, præfata & recentioribus Medicis, ac profus inutilis in Medicina, quia falsa, impossibilis, absur- da, vana noxia.* Galenus nouitates in Medicinam introductas longe reuicis & improbas. Quidam, inquit, in arte Medica res nouas sunt aggressi, cum rebus prioribus melius quid- dam inuenire nequirent, sed vulgi affectionem quam Hippocrates dixit, intelligerent. Nam vulgus quod nouum, inusitatumque est, & nondum si utile est intellectum, laudat magis quàm assuetum, quod utile est & cognitum. Idem dici potest de circula- tione, quæ multis placeat, quamuis non intellecta, & ad quem usum pertineat in Medicina nou- dum explicatum.

*Responsio.* Esto noua circulatio sanguinis, an ideo repudianda si verat

*Quod si tam Græcis nouitas inuisa fuisset*

*Quam nobis, quid nunc esset vetus? aut quid haberet*

*Quod legeret, teneretque viritum publicus usus?*

Nonne Medicina diuersis temporibus noua sumpsit incrementa? Galenus post Hippocratem nouis inuentis artem amplificauit, post Galenum alij Medici acceptum patrimonium plurimum auxere.

*Sunt frunt artes hac tempestate decorem,*

*Nullaque non melior, quam prius ipsa fuit.*

Quod si inaudita præfatis & recentioribus, auideo reiicienda, si vera?

*-----non omnia grandior atas*

*Not quæ scimus habet, seris venit usus ab annis.*

Attamen eius adumbrationes quædam apud antiquos Medicos & Philosophos ex- stant, vt legere est apud Hippocratem & Aristotelem.

Obiectio II. *Omnes Medici, tam præfati, quàm recentiores crediderunt sanguinem arteria- lem à sinistro Cordis ventriculo transmitti per arteriâ in vniuersum corpus, si intra sua vasa re- gurgiet & exuberet, in venas contiguas ipsis iunctas per mutuas anastomoses transire, sed ne-*

mo faminiatur: ne quidem expressis istam reuersam sanguinis per venas ad Cor, inde refluere in arterias, atque sic orbiculatim reuolui, & in circulum agi: quod vena & arteria inter se communicant per aulicostyles mutuas, declarauit Galenus, lib. 6. de vsu part. c. 21. & lib. 3. de natural. facult. c. 15. & lib. de vsu pulsuum, c. 5.

*Resp.* Non potest sanguis arteriosus à Corde cudi & fabricari, nisi venosus ei indefinenter subministretur, vt ille fluxus, siue appulsus continuus sanguinis, est species & idea circulationis, nam à Corde defluit sanguis in arterias, si regurgitet, deriuatur in venas, vt ereditur antiquitas, sed reditum eius ad Cor inuenit *Harnius*, & nos cum eo sustinemus.

*Obiectio III.* *Circulatio sanguinis vita noxia est, ac perniciofa: Noxia, quia continuus affluxus sanguinis nonnisi diuque sine vlla quiete & intermissione, non potest non ledere Cor & fatigare, atque eius vires exhaurire, si in singulis pulsationibus effundat sanguinem & spiritus.*

Quod caret alternâ requie, durable non est.

*Peristhyle momentanea non potest Cor sufficienter recreare.*

*Resp.* Cor non magis læditur & fatigatur quàm pulmo, & diaphragma, quæ indefinenter mouentur ritu Cordis, etsi non pari gradu, sed per sanitatem moderatus est motus Cordis, nec vllam ipsi molestiam creat, vt in morbis, dum præcipiti motu agitatur, tandem fatiscit & succumbit labori perpetuo. Reques Cordis est in duplici peristhyle, nec expedit longior quies, quia periret animal, quemadmodum mundi machina dissolueretur, si Sol dimidij quadrantis horæ spatio cessaret à cursu suo, ita Cor Solis laborem & opus imitatur in corpore humano.

*Obiectio IV.* *Iterum demonstratur perniciosam esse vitam circulationem sanguinis, quia sordes & impuritates massa sanguinea multoties per Cordis ventriculos reuoluuntur, at Cor quantumvis sanum & integrum vix euitare posset labem & inquinamentum à sanguine impuro praterlabente, dum aliquid remanet in canaliculis & fissulis carnis & fibrosis ventriculorum Cordis.*

*Resp.* Aliud est loqui de actione Cordis in sanis, aliud in morbis. Cor in sanis nullum detrimentum patitur ab ista circulatione, quia Cor est locus simulque ignis purgatorius, vbi defecatur, & renouatur sanguis transiendo per ventricos Cordis. In morbis corporibus, si quod vitium ex sanguine impuro Cor contraxit, sequentibus circulationibus eluitur & exurit igne: quod si tota massa sanguinis fuerit corrupta, ipsam conatur emendare, redintegrare, & rectificare, per istas circulationes nouos spiritus, nouumque calorem partibus impertiendo, vt à putredine vindicentur, alioquin nisi circularetur sanguis, deteriore conciperet putredinem magis inimicam vitæ. Interea calor natiuus instauratus per circulationes sanguinis, emendat & amandat sanguinis sordes, & quoquoersum per habitum corporis, per intestina, per renes, & velicam: ideoque magnâ Dei providentiâ facta fuit sanguinis circulatio per Cordis ventriculos, ad vitæ conseruationem, alioqui breui petitura, nisi à Corde conseruaretur & repararetur.

*Obiectio V.* *Iterum obicitur, si Cor admittit sanguinem ex minoribus ventis totius corporis, & ex vena porta refluam in canam, dein refundat in ariam, Cor & arteria erant sordium & impuritatum massa sanguinea conceptacula & cloaca: At hoc valde perniciosam vitam, ac proinde valde perniciofa circulatio sanguinis.*

*Resp.* Per circulationem *Harnii* & *Vallai* isthæ incommoda vitari non possunt. At nos negamus istam circulationem sanguinis minorum vasorum & portæ, vitium autem quod sanguini maiorum canalium accidit, vel in se contrahitur ex propria corruptione, vel aliunde insinuit, vtrumque vitium eluitur & emendatur per nostram circulationem, & ablegatur in diuersas partes, vnde abscissus generantur. Cæterum arterias sordes excipere & expurgare non disiteor, sed in excursu suo in has vel illas partes transmittunt, itaut tandem post varias circulationes priori euadat sanguis.

*Obiectio VI.* *Non esse necessariam sanguinis circulationem in homine, & animalibus sic demonstratur. Glires, & hirundines, multaque animalia per hyemem latitant in antris & caernis absque cibo & potu, & tamen viuunt cum motu Cordis. Lucomeri extremi populi septentrionales per quatuor menses ob fructum brama glacialis, regentes & spiriti sacro absque villo alimento, redempte vere expersæ facti remanescunt, ac veluti resuscitantur: At in istis animalibus & hominibus nulla sit circulatio sanguinis, quia intra paucas dies sanguis conseruetur, & tamen in illis Cormicas, alioquin vita periret, cessante motu Cordis.*

*Resp.* Animalia ista somno sepulta, ut & populi Lucomori, si vera est historia, suo fuceo vixitant, dum his nihil illiquitur, quemadmodum i), qui per aliquot annos vivere absque cibo, sed non loquimur de hominibus & animalibus agentibus & curentibus, in quibus magna fit dissipatio sanguinis arteriosi, in illis nulla fit, aut exigua.

**Obiectio VII.** Si necessaria foret circulatio sanguinis ad vitam, nullum animal, neque homo vivere posset absque illa circulatione: Atqui visum est, si credimus Telesto in sua Philosophia, qui absque Corde vixit: Obseruata in Polono, qui Lucretia obiit, talis Cordis conformatio, quod erat solidum absque ventriculis, anastomosis vasorum Cordis in se in adhuc remanentibus, ergo non est necessaria circulatio sanguinis per Cor.

*Resp.* Respondetur in illo, qui dicitur caruisse Corde, morbo consumptam fuisse Cordis substantiam, remanentibus adhuc partibus nervosis & membranosis, nec tale fuisse creatum ab initio vitæ: ideoque istum hominem tabe Cordis consumptum fuisse. Quod spectat ad istum Polonum, etiam si non habuerit Cor perfectum, & ut decet excavaum, artamen spongiosum erat, ut aliquid exciperet & traderet in sinistram ventriculum, ad continuationem motus Cordis, ideoque deterius operabatur Cor, nec vivere posuit ultra vigesimum annum.

**Obiectio VIII.** Non esse necessariam sanguinis circulationem ad continuationem motus Cordis, & conservationem caloris in suo fonte, sic probatur. Sanguis in feto non ingreditur Cor nondum excavatum, necdum mobile: ergo circulationis usus nullus est in feto, qui motum habet Cordis.

*Resp.* In primo tempore conformationis partium fœtus, sanguis eius circularur per sanguinis materni circulationem, quia vasa umbilicalia tam venosa, quàm arteriosa, iunguntur venis & arteriis vteri, sicque recurrit iste sanguis ad Cor matris, sed postquam placenta interposita est istis valis tam matris, quàm fœtus, dissolvitur ista contiguitas vasorum, tumque non amplius sanguis fœtus circularur per Cor matris, sed per proprium Cor fœtus.

**Obiectio IX.** Si sanguis per circulationem esset in perpetuo & celeri motu, nec in arteriis ex distensione membranarum fieret aneurisma, nec in venis excitarentur varices, nec ex plenitudine transiret vena. Causa disrumperetur, ut saepius obseruatum, nec inflammationes particulares vasorum ventris inferioris fierent absque febre, siue alteratione manifesta in pulsu Cordis & reliquarum arteriarum, at hæc quotidie obseruantur, ergo sanguis non est in perpetuo & celeri motu.

*Resp.* Istis obiectionibus facilis est responsio. Ex Vallæi & Haruei doctrina isthæc omnia vera sunt, sed ex nostra doctrina, qua sustinemus & probamus fieri circulationem sanguinis dumtaxat in maioribus vasis venarum & arteriarum filia, quia aneurisma formatur tantum in propaginibus aortæ, ut & varices in ramis minoribus venæ Cavae. Truncus eiusdem venæ in summa plenitudine frangi potest, si torus nequeat à Corde celeriter absorberi, sed hoc periculum vitari potest per venæ sectionem, id autem non impedit circulationem sanguinis: verum est in melancholia hypochondriaca æstuantibus visceribus palpiare coeliacam arteriam atque splenicam absque vlla mutatione in pulsu carpi & Cordis, quod annotauit Fernelius, lib. 2. Pathol. c. 21. Mercatus, tractata de Melancholia hypochondriaca, quod prius fuerat animaduersum ab Arretio, lib. 2. de signis acutor. morb. c. 8.

**Obiectio X.** Per circulationem non est necesse sanguinem ad Cor redire, ut recalcascit, & assidue fluxu & refluxu foueatur, instaretque fuzacem vitæritatem par iam extremam, quia natura fecit Anastomoses venarum & arteriarum, ut inter se suas opes, & facultates assidue communicent sine reditu ad Cor.

*Resp.* Ex doctrina Haruei & Vallæi sanguinis labor, actus in orbem inferuit maiori elaborationi sanguinis & recalcascioni, sed ex nostra doctrina non redit ad Cor sanguis, tanquam ad ollam coquariam ut magis excoquatur, sed ut perfectior reddatur nouos spiritus assumendo, quos disperdit, & distribuit in suo excurfu per vniuersum corpus: Continuus aurem ille influxus adeo necessarius ad vitam, ut eo intercepto moriendum sit animali, ut ex Theomesto licet intelligere memorabili historia: vitam tamdiu animal protrahit, quoad Cor suum calorem membris fumeratur, frigore ipsum nondum correptum, eo enim prifictionem sentiente, animans protinus extinguitur.

**Obiectio XI.** Quod circulatio sanguinis non sit necessaria ad continuationem motus in

*Corde, sic probatur. In pulli formationis tertio vel quarto die ab incubatione ovorum à gallina, deprehenditur punctum saltem quod representat Cor ex Hippocrate & Aristotele, & experientia quotidiana: similiter in fœtu humano Corde imperfecto, nondum excavato, ipsum tamen pulsare creditur, ut in brutis verissimum observatur: Atqui Anastomosem cardiacarum constructio in fœtu, manifeste demonstrat nihil influere in ventriculos Cordis: ergo circulatio sanguinis per medias Cordis ventriculos non est necessaria ad eius motum, quia ut probatum fuit, pulsus, absque ista circulatione sanguinis.*

*Resp.* Respondetur quod ante legitimam & exactam conformationem Cor lentè micat insita virtute per affluxum & refluxum spiritus iuxta molem & capacitatem cavitatatum Cordis, idque per anastomoses cardiacas perficitur: sed ubi perfectum, & omnibus numeris absolutum est Cor, tum validius salit, quia tunc temporis circulatur sanguis.

**Obiectio XII.** *Est quod indiget Cor sanguine ad continuationem sui motus, portio sanguinis confecti precedenti die, vel de demerso quotidiano sufficit ad illud opus, sine ista revolutione sanguinis sapius iterata in die, quia guttatim sanguis illiuitur Cordi, nec in singulis pulsationibus indiget sanguine, si per hora quadrantem enulum Cor hominis palpitare potest, ut in Anglia sapius observatum, & Salmonis Cor exemplum per diem micare visum fuit.*

*Resp.* Cor habet facultatem morticem insitam, quia micat aliquanto tempore euullum, incipit tertio vel quarto die palpitare in ovo à gallina incubato: similiter in homine Cor nondum exacte conformatum movetur, ut in brutis animantibus visum, sed ubi perfectum est, & excavatum, debetque continuo operari, pro conseruatione corporis, tum indiget sanguine ad procreationem vitalis spiritus & sanguinis artetiosi: at in singulis pulsationibus sanguinem licet exiguum guttatim assumere & expellere verisimile est, atque id obseuatum in sectione viuientium animalium. Hoc ita posito, intra quindecim, vel viginti horas totum sanguinem à Corde absorbere credibile est, si intra horam Cor bis millenos pulsus edat, & in singulis pulsationibus, vel tribus emittat guttam sanguinis. Quod spectat ad Cor Salmonis piscis, aliud est loqui de piscibus viuacibus, aliud loqui de animalibus & homine, atque ut Cor Salmonis diu palpitet, sanguine proptio calente rigari debet, si credimus *Constantino in suo Lexico Latino.*

**Obiectio XIII.** *Prorsus est inutilis in Medicina, quia nostra artis fundamenta destruit, nostramque nudandi methodum evertit: quis ante circulatores sanguinis, distinguit sanguinem venæ portæ & cavae omnes Philosophi & Medici consimilem esse statuerunt, & in se quatuor humores continere: at per novam circulationem sanguis venæ cavae deprimitur ad Hepate, & sapius per Cor reuolutus, quodammodo euadit arteriosus, purior ac tenuior sanguine venæ portæ.*

*Resp.* Anatome docet venam portam & cauam separatatas esse, nec ullam aut exiguam habere intra Hepar communionem per mutuas Anastomoses radicum, atque expediebat ita fecerni, ne sanguis culinatus partibus dicatus, corruptioni magis obnoxius, totam massam sanguinis contaminaret, refluus in cauam. Denique pates, quæ pertinent ad secundam & tertiam regionem, quia nobilioribus officiis destinatae, & in motu positæ, puriore & calidior sanguine, quodammodo arterioso indigebant. Attamen merè arteriosum non denegamus partibus culinatis, rigantur enim à Coeliaca artetia amplissima, quæ comitatur ramos venæ portæ, & cum ipsis communicat.

**Obiectio XIV.** *Si necessaria est circulatio sanguinis, non tantum eius unica portio, sed totus debet circulari in omnibus animalibus, quia reperiuntur animalia quædam ut pisces, quæ iecur habent album, alia cinereum, alia caruleum, alia viride, tamen in ipsis observatur sanguis rubicundus, at color iste non aliunde profusissimè, quàm à Corde in omnibus rubicundus: ergo totus sanguis, ut tincturam rubicundam acquirat, debet per Cor transire, ac proinde totius sanguinis est necessaria circulatio: Curenim una portio sanguinis circulari, cum totus in Hepate gentius aequaliter desideret in Corde perfectionem?*

*Resp.* Respondemus nos loqui de circulatione sanguinis in tetrestribus animalibus, quorum viscera, tam primæ quàm secundæ regionis nostris sunt similia. Quid si dicerem, in piscibus rubicundum illum sanguinem qui spectatur, licet alterius sit coloris quam iecur, totum esse arteriosum, quo plurius indigent pisces, frigida animalia: sanguinem verò nutritium alterius esse coloris. Itaque non est necesse, ut to-

tus sanguis ad Cor redeat, si sufficiat dimidia portio ad continuitatem motus Cordis & confectionem spiritus vitalis, cuius vehiculum est sanguis, alioqui solus spiritus intra arterias conclusus furibundus excurrrens, varios tumultus & seditiones excitaret, si enim ei natura iniecit sanguinis permissione. Ideoque scripsit Hippocrates, & post eum Galenus, sanguinem suapte natura esse frigidum, alcititium habere calorem à corde. Itaque distinguens sanguinem nutritium in duas regiones, & vasa deferentia, primæ regionis sanguis est crassior, magis alimentarius, & vasis venæ portæ includitur. Secundæ regionis sanguis est calidior, spirituosior, & intra venam caavam coëretur, hic circularur, alter non nisi per accidens.

Obiectio XV. *Adversus circulationem id obicitur: nulla pars officialis quod semel elaboravit, & reiecit, postea ad se retrahit, ut recoquat, & restaret, vel recalsciat. Hepar & ventriculus, quem semel elaboraverunt succum & expulsum, non resorbunt iterum. Ergo neque Cor.*

Resp. Hoc verum est de Hepate, & ventriculo, quæ partes sepe otiantur & quiescunt, sed non est par ratio Cordis, quod nocte dieque indefinenter movetur ad conseruationem totius corporis: at motus ille non potest continuari sine appulsu sanguinis, qui non eo fine ad Cor appellit, ut recoquatur, sed ut recalscat, novusque spiritus assumat, quorum magnam partem dispergit in omnes corporis partes.

Obiectio XVI. *In corporibus extenuatis & valde macris, omnes venæ per artus dispersæ, manifestè extant & apparent: at in illis, nec visu nec tactu ullus fluentis sanguinis motus deprehendatur, qui adesse deberet, si tam impetuosè fluere, ut Valles credit & assenerat: ergo nulla datur circulatio sanguinis.*

Resp. Respondeo sanguinis motum ex nostrâ sententiâ lentum esse, vix perceptibilem, ut in fluuiis quibusdam motus aquæ leniter fluens vix deprehenditur, visu vel tactu. Quid si dicent Medici Sinenses, qui aures habent acutissimas, carpo ægrotantis ad aures admoto pulsus mutationem deprehendere, si credimus relationi Patris Iesuitar, qui nuper descripsit historiam Sinensem.

Obiectio XVII. *Ex doctrina circulationis sanguis à Corde per arterias descendit deorsum, & ascendit ad Caput: Sanguis per venas infra Cor remeas ad istam partem, supra Cor descendit ad eam partem, ac proinde sanguis per venas nunquam descenderet: at contrarium observatur, nam vena ængyos deferit sanguinem deorsum in caavam iuxta renes, vena Spermatica in viris ad testes, vena mammaria descendunt ad medium musculorum rectorum, thoracica ab axillari præducentes deferunt sanguinem ad infernas partes thoracis: plurima vena detracta pancreaticæ carnosæ conspiciuntur inferne disseminata, usque ad inferiores artus.*

Resp. Ex nostrâ doctrina solus sanguis, qui continetur maioribus canalibus venæ cavae & aortæ motum habet per arterias, à Corde descendit, siue discedit, per venas ad Cor ascendit, siue accedit: sed istorum canalium rami, seu propagines, continent sanguinem, qui non circularur in suis canalibus, fluitat ad nutritionem partium. Interdum tamen defectu sanguinis circulariorij sufficientis, rapitur in venas & arterias, vel æstu & orgasmo percussus in febribus, resillire potest in istos maiores canales, tumque circularur, isque sanguis minorum canalium potest intra suos canales, & descendere, & ascendere.

Obiectio XVIII. *Uterius probatur sanguinem naturaliter descendere in vena magnæ, quæ caret conigge arteria, nec habent cum arteriis communionem per anastomoses in progressu suo, quales sunt Cephalica & Saphena, quia disiuncta ab arteriis, & scissa, sanguinem effundunt affatum.*

Resp. Facilis est responsio. Venæ istæ sunt propagines trunci, non diremptus, qui sit per æqualia vasa, at Cephalica & Saphena sunt venæ multo minores suo trunco, potest igitur descendere sanguis & fluere supernè deorsum scilicet à vtræque venâ, nisi dicamus istas venas in extremis partibus habere communionem cum arteriis, ut si fortè vena basilica, aut cruralis omnino resecta fuerit, eius officium suppleat Cephalica vel Saphena, ad reuocandum sanguinem arteriosum.

Obiectio XIX. *Si verum sit sanguinem semper descendere per arterias in corpus universum, per venas ad Cor ascendere, nunquam sanguis scissa vena ab ipsa parte affecta derivabitur, nec remittetur, quia debet remeare in arterias, ut deducatur ad venam scissam, at hoc impossibile ex circulatione sanguinis, ergo nulla derivatio & reuulsio sanguinis ex parte affecta, supposita circulatione sanguinis. Nam si pleuritis, exempli gratia, insisset latus alterutrum infra diremptam aortam, sanguis impactus lateri resiliiret in aortam inferiorem, quod si talis sanguis ascendat sursum, est contra naturalem motum, atque repelletur deorsum ab illo,*

*qui continenter & rapide à Corde deuoluitur: Cumque secta vena brachij, vel pedis sanguis fluens per vultus, manat ab arteriâ ex doctrina Haruci & Vallei, pulsant autem aqua-  
liter arteria alterius brachij, vel pedis integri, nec secti, necesse est utrobique distributionem  
sanguinis aequalem fieri. Ergo nam inuenitur motus sanguinis secta vena ad reuulsione[m] à  
parte affecta, ac proinde nulla derivatio, & reuulsio à parte affecta in circulatione sanguinis.*

*Resp.* Ad istas rationes sic respondendum ex nostra doctrina nouæ circulationis: sanguis non æquali gradu meat per arterias, & remear per venas, quia per arterias è Cordis sinu sinistro violenter per eiacionem emittitur ip[s]e truncus aortæ exiens-  
sum à iugulo ad inguina, quo agitato eodem instanti propagines ab eo productæ vni-  
diquaque vibrantur, in artubus sanguis per venas reueans ad Cor tardius intedit ad  
truncum venæ Cauæ à iugulo ad inguina porrectum: vbi acervatur tanquam in ci-  
sterna & promptuario. Propterea in hoc trunco sanguis maiore ac fermè dupla quan-  
titate continetur, quàm in trunco aortæ, & maiore copia admittitur à Corde, quàm  
expellitur, quia alendis pulmonibus, & procreandis spiritibus destinatur, cumque  
in eo spatio constituitur medium corporis, vt in medio maioris mundi circa zonam  
torridam motus maris segnior est: ita sanguinis motus in trunco venæ Cauæ tardior,  
quamvis assidue ad Cordis ventriculum dextrum ascendat. His positis assueueramus  
sanguinem naturaliter ascendere vsque ad iugulum prope subclauias, collectum in  
eo spatio à iugulo ad inguina posse secta vena brachij, successione vacuati, descende-  
re ad brachium, quemadmodum ab inferis partibus brachij, per arterias cum venis  
communicatas, potest fluere: similiter secta Saphena, vel Ischiadica, sanguis potest  
eodem modo descendere contra suum naturalem motum, ac proinde utrobique se-  
ctis venis pedis & cubiti, sanguis, tam à venis, quàm ab arteriis manabit, quemad-  
modum videmus ab utero, hæmorrhoidibus, & naribus sanguinem profuere con-  
tra suum naturalem motum. Ideoque ex hoc loco amplissimo sanguinis promocon-  
do, emissus sanguis primo vasculo exceptus purus, postremis vasculis impurissimus,  
secunda detractio[n]e laudabilis prodibit: Tertia impurissimus, quamvis interuallo  
dumtaxat quinque vel sex horarum istæ euacuationes fiant. Itaque in venæ sectione,  
venæ & arteriæ deplentur, alioquin non succederet subita leuatio partis affectæ & op-  
pressæ, neque veri simile est tantam sanguinis copiam quanta velociter detrahitur  
vna vice, ad duas vel tres libras vno ductu, intra breue temporis spatium, manare à  
folis arteriis, & sæpe variegatam.

**Obiectio XX.** *Quod nulla datur sanguinis circulatio inde probatur: in magnis hæmor-  
rhagiis narium, qui riuulose fluit, & excipitur vasculo sanguis, purus & floridus spectatur,  
qualis è pulmone educitur, tunc temporis venis sectis impurissimus detrahatur, atqui si san-  
guis maiorum canalium circuletur, talis à Cerebro manare deberet, qualis est in venis, ergo  
nulla est circulatio sanguinis.*

*Resp.* Certum est purissimum sanguinem directè à Cordis sinistro ventriculo e-  
manantem sine vlla alteratione ad Cerebrum deferri per arterias carotidas, ac proin-  
de qui fluit per nares totus est arteriosus, ac veluti colatus per arteriolas duræ me-  
ningis, quæ sunt propagines carotidum. In ascensu suo ad torcular, siue longitudi-  
nalem sinum, acervatur, vel eò confluit vndiquaque. Inde riuulose labitur per nares,  
quia sinus longitudinalis terminatur in summis naribus, quare sanguis qui fluit per  
nares est arteriosus purissimus, atque hoc fit contra naturæ institutum, quæ sangui-  
nem tanquam suum filium primogenitum, vt loquuntur Arabes, intra vasa conser-  
uat quantum potest. At secundum naturam superfluous sanguis in Cerebro, vel cana-  
libus duræ meningis, per iugulares internas & ceruicales deorsum recutrit ad tran-  
cum venæ Cauæ.

**Obiectio XXI.** *Sed dum assatim & riuulose sanguis per nares exiit, non est verissi-  
mile percolari per arterias dura meningis, probabilis est venas iugulares & ceruicales, qua  
perueniunt ad sinum longitudinalem, solum sanguinem in torcular euomere, à quo continuo  
ductu & filo vacuatur per nares.*

*Resp.* Tota amplitudo duræ meningis arteriis innumeris circumdata, celeriter  
istum sanguinem tenuem, subtilem & xliuantem potest celerrime transmittere ad tor-  
cular, nec potest naturaliter ascendere sanguis per iugulares, & si ascenderet, id esset  
contra suum naturalem motum. In hoc casu & cursu, sanguis effluet impurus,  
qualis continetur in trunco venæ Cauæ, isthuc integritas & puritas sanguinis, mani-  
festè indicat sanguinem à Caua per venas ceruicis non ascendere ad torcular.



**Obiectio XXII.** *Si sanguis esset in perpetuo motu, nulla foret transpirationis necessitas ad euentilandum sanguinem, nec metuenda impedita perspiratio, qua causa plurimorum moriarum perhibetur à Galeno, quia circulatio tollit transpirationem, qua fit per extremitates arteriarum in habitum corporis & cutem desinentium.*

*Resp.* Circulatio non tollit transpirationem, imò adiuvat, dum emittit per propagines maiorum vasorum tenuiores sordes massæ sanguineæ in habitum corporis. Sed credere non oportet aërem externum per arterias in ambitum corporis dispersas excipi, & reuerti ad Cor.

**Obiectio XXIII.** *Si sanguis perpetuo circularetur, nullum rheuma consistens esset, sed in motu perpetuo concutatur, quia tenuis humor ichoroides, exempli gratia, in rheumatismo assidue reuolueretur, sic etiam in gonagra, podagra, & chiragra: at non videmus istos refluxus humorum assiduos, sed potius harentes in partibus humores, ergo nulla datur circulatio sanguinis.*

*Resp.* Si credimus *Fernelio*, non tam per maiora vasa, quàm per minora fit iste rheumatismus, atque per habitum corporis fiunt istæ fluxiones. Vbi partibus adhæret humor, non tam citò fugit, aut repellitur, nisi æstu, vel cæstro percitus desultorio motu in has vel illas partes. Atque cùm fluxiones istæ fiant per minora vasa, sanguis eiusmodi vasorum non circulator.

**Obiectio XXIV.** *Fallacia sunt experimenta, quæ producuntur ad probandam circulationem sanguinis, motus Cordis, & arteriarum. Alius est in vidente & integro animali, alius in scito, & crudeliter torto, quia Cor principium vitæ violentè agitatum, sanguinem & spiritus tanquam capias auxiliares ad se rapit & recolligit, ac proinde ex illa inspectione & obseruatione non est iudicandum, ita res peragi in animali integro & tranquillo.*

*Resp.* Conceditur motus Cordis, & arteriarum velociore esse, sanguinem maiore cōpia forberi à Corde in animali scito & viuente, sed motus sanguinis continuus intra venas & arterias, quod est circulationis fundamentum, obseruatur manifestè, cui nemo iuste potest contradicere. Certum est à sensibus esse creatam notitiam veri, nec sensus posse refelli, inquit *Lucretius*.

**Obiectio XXV.** *Cùm hactenus Medicina falsitata fuerit satis feliciter sine ista circulatione sanantur: istud paradoxum non est admittendum, quod nostram Medicinam perturbare, & innotare possit.*

*Resp.* In thesi probatum fuit circulationem sanguinis nihil immutare in Physiologia, neque in Pathologia & Therapeutica, quod praxim consuetam, & vulgarem medendi methodum delinuat: Sed potius partes illas Medicinæ magis illustrat, atque veram Medicinam instaurat, ita ut doctrina de circulatione sanguinis, sit vetæ Medicinæ instauratio, quam soli fastidient, qui

--- nil rectum nisi quod placuit sibi ducunt,  
Vel quia turpe putant parere minoribus, & quæ  
Imberbes diducere, senes perdenda fatentur.

**Obiectio XXVI.** *Quomodo fiet purgatio humoris peccantis intra venas maiores vel minores, si sanguis est in perpetuo fluxu & refluxu, nam tria requiruntur in legitima purgatione, ex doctrina Galeni & Mesuici, delectus humoris peccantis, qui pendet à similitudine substantiæ, siue proprietate medicamenti: eiusdem humoris attractio, quæ fit à calore, tam natiuo, quàm medicamenti: expulsio extra corpus à natura irritata: hæc tria in sanguine impuro assidue per canales maiores aorta & cava reuoluta, perfici non possunt: quia opus est mora & quiete ad istas actiones.*

*Resp.* Certum est purgationem varij & multiplicis humoris perfici in prima regione, quæ sentina est corporis, vbi humores quiescunt in secundâ & tertiâ regione, alterationes & corruptiones sanguinis emendantur detracto sanguine, & post varias & multiplices circulationes natura, siue calor natiuus amandat in diuersas partes istam impuritatem massæ sanguineæ, vnde per medicamenta reucllitur ad primam corporis regionem, & expurgatur per arteriam coeliacam in intestina, nec enim per cauum refluat in portam, nisi Hepar recipiat totam sarcinam, vel portionem. Deinde cùm sit proprium natiui caloris cogere homogenea, & separare heterogenea, calor natiuus sanguinem in excursu suo despumabit, & suis sordibus expurgabit per renes, & per ambitum corporis. Pulmo & caput habent suas vacationes particulares, præter vniuersales, per venæ sectionem, & purgationem.



**Obiectio XXVII.** *Quomodo in ista circulatione sanguis putris, ac planè corruptus Cor non insigniter ladit, & labefactas. Scribunt Aristoteles & Galenus, bilem & noxios humores, si peruenierint ad Cor plurimum ledere. Idem Galenus, nullum extare putat remedium, quod possit emendare putredinem, quæ ad Cor peruenit.*

*Resp.* Quia guttatim percolatur sanguis, ideo cum delectu admittitur, si putris fuerit, vitium in transitu per Cor robustum & vegetum emendari potest, vel saltem sine inquinamento Cordis perlabitur, & magna eius portio impura à dextro ventriculo in pulmones ablegatur, qui sunt Cordis emunctoria. Videmus rusticos & alios inopes propter circulationem illam sanguinis & inedia, sine remediis curari, modo nulla sit contumax obstructio in visceribus, aut vitium aliquod indelebile, aut inemendabile.

**Obiectio XXVIII.** *Si sanguis assidue fluere per arterias ad extremos artus, ibique elutriatus in venas permearet, si contingat venam cruralem transversim abscindi in crure, vel axillarem in humero refecari, non amplius sanguis sursum ascendet ad Cor, sed in his locis intumescens pariet, quæ tandem calorem matuum suffocabunt, ex affluxu sanguinis copiosius: at isthac incommoda non obseruantur in istarum venarum amputationibus: ergo sanguis non assidue, nec celeriter fluit per arterias ad extremos artus.*

*Resp.* Responsio facilis: Natura provida huic incommodo prospexit, quamvis enim vena eruralis abscindatur transversim, saphena quæ prope inguen enascitur in pede, habet anastomoses cum arteria: ideoque supplere potest defectum cruralis venæ, similiter in humero abscissa axillari, Cephalica altior quæ habet anastomoses cum arteria, supplebit defectum axillaris. Quod si contingat amplo, profundo, & transversali vulnere ambas venas, quæ non multum à se distant, refecari, propagines venarum, quæ sunt supra vulnus rapient ad se sanguinem, sunt enim venæ sanguinis attractrices.

**Obiectio XXIX.** *Nulla necessitas est venæ sectionis, si sanguis est in perpetuo motu, quia qui ad partem affectam fluxerit per arteriam, data circulatione per venas renelletur, itaque præstat cum minuire datâ tenui, ut facere solebant veteres, quàm illum exhaurire per venæ sectionem.*

*Resp.* Sanguis à maioribus canalibus circulatoriis derivatus, per ramos vasorum maiorum delatus in partes dolore vel tumore aliquo affectas, non potest depleri, nisi immينو sanguine circulatorio maiorum canalium, quia non habet sanguis nutritius partium, reuersionem, nisi fiat per venæ sectionem largam, vel organismo percitus resiliat in maiores canales. Præstat per venæ sectionem imminuere sanguinem, quam per dixeram tenuissimam, quæ est periculosa.



# PROBATIONES THESEOS.

## CIRCULATIONIS SANGVINIS.

*primus Auctor & Inuentor Harueus, quinam assertores  
huius opinionis, quinam aduersarij, Riolanus  
nouam Circulationem inuenit.*

### CAPVT PRIMVM.



**Q**VESTIO de circulatione sanguinis in Corde, ab eruditissimo *Harueo* inuenta, atque eleganti scripto proposita, magni est in Philosophia & Medicina momenti, quia de vitæ & nutritionis principiis agitur assignandis, conseruandis, & restaurandis, nouitate sua multis placuit, aliis displicuit: hincinde animosè certatum.

Primus in arenam descendit contra *Harueum* doctissimus *Primerusius*, & argutis rationibus oppugnauit: in eodem puluere pugnauit *Parissanus*, sed armis disparibus, scilicet obscure admodum, verbosè, futiliter, ac superbè pro more suo, vt suam inficitiam & insipientiam in rebus Anatomicis, magis ac magis proderet ac patefaceret.

Ne quis autem putet à me id acerbè nimis pronuntiatum, audiat *Primerusium*, de *Parissano* indicium. *Librum illum Parissani fateor me uidisse, sed legisse nunquam, nam auctorem istum vix intelligere licet, nam seipsam intelligat nescio. Curingius tale profert iudicium de Parissano. Primerusij liber elegans est, ac doctus, vt intelligenti cuique negotium facessat: quæ Parissanus tetigit, sunt illa quidem barbaricè & fastu mirum in modum conuincinata. Sinibaldus doctissimus Medicus Professor in Academia Romana, sic iudicat de libris Parissani. Ille parum sanus in opinionibus, ubi sua malè expressit deliramenta in Genesiaropæia, pag. 36. Pudeat igitur Medicos ignarum & ineptum hominem laudasse, istis encomiis superbè insolescentem.*

*Qualem commendes etiam atque etiam aspice, ne max*

*Incutiant aliena tibi peccata pudorem.*

*Fallimur, & quondam non dignum tradimus, ergo*

*Quem sua culpa premet, deceptus omitte tuere.*

Ne quis indigno & vano elogio *Parissani* decipiatur, monebo istam præfationē editionis Lugd. Batavæ, ab inimico *D. Haruei*, sed ignaro rei Anatomicæ, in Angliā fabricatam fuisse, & Lugdunum Batav. transmissam, in odium *Haruei*, quem adeo fastidit, vt ne quidem docti titulo dignū iudicaret. Ego verò candidè & sincerè profiteor, & prædico, huius circulationis sanguinis Authorem & Inuentorem *D. Harueum*, eruditissimum Medicum Anglæ, Anatomæ Professorem in Collegio Medicorum Londinensium, cui plurimum debet hodiernus sapientum chorus, & grata posteritas, propter istud inuentum, quia Philosophorum & Medicorum ingenia excitauit, ad expendendam & eruendam huius quæstionis veritatem, & viam aperuit ad instaurationē veræ Medicinæ.

Ab annis sex aut septem in Academia Leidensi hæc quæstio agitata fuit à *Dottif. fmo Vallæo, Anatomis Professore*, qui partes *Harum* tuetur, nouis experimentis & rationibus roborauit. Aduersus eum insurrexerunt *idem Primærius* suis vestigiis insistent, circulationem istam sanguinis iterum rescellendo.

A quatuor annis *Hermannus Conringius*, Medicinæ Professor in Academia Iulia, eandem quæstionem ad incudem reuocauit, & ab annis duobus *Plempius, Professor Lomaniensis*, idem saxum reuoluit. Omnes *Harum* fauent, eiusq. opinionem confirmant.

Nuper *Fredericus Leichenus, Professor Academia Erfordienfis contra Harum* scripsit, iterum pro *Harum* contra *Parissanum* apologiam edidit *Georgius Ent, D. Medicus Londanensis*.

*Henricus Regius* acerrimus circulationis sanguinis propugnator, ipsam satis accuratè declarat, sed in quibusdam ab *Harum* defecit in sua *Physica*.

*Cornelius ab Hogelando*, de circulatione sanguinis tractauit in suis *cogitationibus Physicis* nuper editis.

*Anonymus Vir doctus* Gallica lingua circulationem sanguinis, tanquam absurdam refutauit.

Postremus *Fortunius Licetus, Philosophus, & Medicus præstantissimus*, circulationem sanguinis *Harum*nam explosit, & nouam commentus est.

Cùm igitur viderem istam quæstionem de circulatione sanguinis magnos rumores, & tumultus excitare in Academicis, tandemque diuortium facturam in Medicina, diligentiùs examinatam, & ad vsum medendi reuocatam, quod nemo adhuc præstitit, suscepì demonstrandam. Quantum scilicet noceat in assignandis morborum causis & locis, atque eorundem curationibus, circulatio sanguinis secundum *Harum* doctrinam, aliorum suffragiis approbata. Postea ostendam circulationem sanguinis à me nouo modo explicatam, nihil mutare in Medicina, sed morborum curationi plurimum conferre, atque Medicinam vetam instaurare.

## PROBATIO CIRCULATIONIS SANGVINIS.

### CAPVT II.



**N**ON circulationis sanguinis fundamenta verissima sunt constituenda. Cerium est, ac indubitatum Cor à primo vitæ ortu vsque ad vltimum vitæ spiritum indefinenter agitari, duplici motu alterno, cui gemina quies interiecta est. Motuum Cordis vnus dicitur *Diastole*, alter *Systole*, quibus interiecta quies *Perissistole* vocatur.

Vt autem Cor istos motus dat per receptionem materiæ, eiusque depulsionem, ampliter excavatum fuit, vt dilatatum in sua diastole, attrahat sanguinem in dextrum ventriculum, atque aërem, siue spiritum aërium depuratum in pulmonibus, eliciat in sinistrum ventriculum. Materia hæc momento temporis ibi cunctatur, quia Cor in sua systole contractum, expellit sanguinem à dextro ventriculo per medium septum in laeuum ventriculum, & in pulmones, & alium arteriosum è sinistro ventriculo in aortam reiiicit. Arteriosus ille sanguis sinistri ventriculi, portio est eius sanguinis venosi dextrum ventriculum ingressi, quæ traducta per medium septum Cordis peritum & porosum, illabitur in sinistrum ventriculum. Isthæc non egent proluxa demonstratione, quia ex Anatomie & inspectione Cordis in mortuo & viuenti animali visu & tactu deprehenduntur.

His positis fundamentis innotesce, sic extructum & fabricatum fuisse Cor, vt motum haberet sensibilem, & vnicuique aspectabilem, de quo non ambigitur. Sed quæritur, si ad pereannitatem huius motionis in Corde, necessaria sit materiæ sanguineæ & aëreæ continua, nec interrupta aduectio, & foras expulsio in vniuersum corpus; cùm videamus inopia vtriusque materiæ, vt in magno sanguinis effluuio, vel respirationis defectu, Cor deliquium pati, eiusque motionem intercipi, ac tandem emori.

Si necessaria est cordi materiæ subministratio ad continuitatem motus, sanguis depromitur à vena cava, spiritus aëreus è pulmonibus per arteriam venosam suscipitur. De his nemo dubitat: sed tota difficultas in eo versatur, an totus sanguis venarum & arteriarum, ab vniuerso corpore nullis locis exceptis, intra diem naturalem viginti

quatuor horarum quater vel sexies per Cordis substantiam transeat, siue circule-  
tur, vt arbitratur *Harnus*, vel pluries, vt eius affectus contendunt, & quò velocior  
fuerit motus Cordis, eò celerior fiat circulatio.

Omnes fatentur Cor materiam sanguineam non aliunde depromere, quàm à ca-  
ua. At cùm in singulis contractionibus, vnam vel binas guttas sanguinis Cor euomat  
in aortam, vnus verò horz intervallo, systoles bis millenas & vltra Cor edat: *Carda-  
nus* quatuor mille ictus, siue pulsus arteriæ in homine temperato obseruauit intra  
vnam horam: Necessum est intra vnum diem omnem sanguinem venarum semel  
aut bis à Corde absorberi, prout fuerit celerior tractus, & in aortam deriuari. Ibi  
collectus, nec diffusus, aut diffuens, ex magna copia suffocaretur calor natiuus,  
vel in Cerebrum raperetur, vel in viscera regurgitaret, nisi deplerentur arteriæ,  
quæ sanguinem istum in carnes paulatim effundunt, itaque effusus putresceret &  
corrumperetur, nisi venulæ sanguisorbæ celeriter exsugerent, & in venas maiores re-  
funderent, vel in venas proximas ipsarum arteriarum per anastomosim connexas transmittre-  
rent, inde ad Cor necessariò reuehitur, vt repleat locum venosi à Corde iam absor-  
pti, atque materiam ei suppeditet ad motionis & actionis suæ continuationem.  
Isthaec consequutio motionum Cordis & sanguinis diligenter obseruata & perpensa,  
occasionem dedit circulationi sanguinis, quam *Harnus* ingeniosè ac subtiliter in-  
uenit & introduxit.

## CIRCULATIO SANGVINIS QVODAMMODO

cognita *Aristotelis*, eiusque sectatoribus, imò ante  
*Aristotelem*, *Hippocrati*, & aliis non fuit  
incognita.

### CAPVT III.



Ave sanguinis traductionem per Cor subodoratus fuerat præstan-  
tissimus Philosophus *Cremoninus*, lib. de principia membrorum, dum  
probat ex *Aristotelis* doctrinà, sanguinem venosum necessario debere  
per Cor traduci, vt vitalis fiat ad nutritionem, ideoque totum per-  
meare Cor, in aortam descendere, & quoquouersum distribui ad nu-  
tritionem partium, sed reuersionem istam sanguinis ad Cor subicit, vel ignora-  
uit. Antea tamen subolsecerat *Casalsenus*, & demonstrauit ex ligatura arcta, quæ  
facit intumescere partem infra ligaturam, non supra, quod indicat perpetuo sangui-  
nem ascendere ad Cor. Eodem argumento vitur *Harnus* tanquam *Achilles*.

*Hofmannus* lib. de Thorace, & *Commentariis in librum Galeni de vsu partium*, variis-  
que in locis, multa scribit de principatu Cordis, quæ fauent *Cremonino*, & miror  
ipsum intactam reliquisse circulationem sanguinis, de qua ne verbum quidem scrip-  
sit in suis *Institutionibus Medicis*, & alibi, certo indicio non probare, nec tamen au-  
sum fuisse refellere.

Addam superpondij vlce istam circulationem sanguinis non ignotam fuisse pri-  
scis Philosophis, vel saltem illius vestigia quædam extare in eorum monumentis,  
quæ nobis supersunt, vbi notare licet caloris, spiritus & sanguinis fluxum & reflux-  
um per vniuersum corpus.

*Empedocles* referente *Aristotele*, ita respirationem fieri iudicauit, cùm sangui-  
sua natura sit aptus sursum & deorsum moueri, quando deorsum fertur aërem influe-  
re, & respirationem fieri, quando verò sursum remeat aërem resuere, & expirationem  
perficere, quod similiter accidit, vt in vas, quas clepsydram vocamus. Ecquid aliud  
*Arione*, circularis pulsio aëris & sanguinis per vniuersum corpus apud *Platonem*  
in *Timæo*, atque superna reuersio, quàm circulati sanguinis adumbratio quædam.  
Primus *Aristoteles* sanguinem continuò affluere ad Cor, propter motionis perpetuæ  
continuationem & productionem prodidit, dum enim huc appellit sanguis, & magis  
incalcescit, ac proinde inflatur spirituosus effectus, tumque intumescere facit Cor impulsu suo,

*Et recessu detumescere. Inde pulsatio formatur, humoris scilicet incalcescentis inflatio, simili-  
liter pulmones moventur indelinitanter, sed va Cordis infernians, aerem illi suppedantes, ac in-  
flar solium in furnacibus exsufflantes. sin verò motus principium repetunt à Corde, quod in-  
mesallum coëgit portas ambientes pulmonem & thoracem moueri & attolli, ut libertus dum  
mouetur exspirari queat, caloris autem sedes & principium cum sit in Corde, motu & ex-  
cursu caloris foveri necessum est, ignis enim fluminis inflar perpetuo gignitur, atque fluit. Ve-  
rum id nos latet pra celeritate, inquit Aristoteles, lib. de Iuuentute.*

Nunc demonstrabo circulationem sanguinis probari posse ex variis Hippocratis lo-  
cis. Ille sanguinem perpetuo moueri intra canales suos docet, lib. 4. de *Diata acuta-  
ram*, corrupteo sanguine, & nequeantibus spiritibus naturalis pertransire meatus, in-  
frigidationes sunt, quæ obstructionem & moram sanguini pariunt, atque ex eodem, li-  
bertatem meatuum procurat, ac restituit, in omnimoda venarum interceptione, venæ  
sectio. *Idem, siue alius lib. de Corde*, quatuor vasa Cordis, fontes & lumina corporis  
appellat, quibus rigatur vniuersum corpus: ergo sanguis est in perpetuo fluxu inflar  
fluminis & fontis aquæ salientis, & licet duo vasa Cordis ad pulmones contendant,  
in iis tamen sanguis fluxum habet, dum recurrit in sinistram Cordis ventriculum  
transfundo pulmones: Atque eleganter Hippocrates, duplicem circulationem san-  
guinis designauit, vnam quæ sit inter Cor & Pulmones: alteram quæ per vniuersum  
corpus extenditur. *Idem venas & arterias consimili nomine indigitat*, quasi similem  
sanguinem contineret: & lib. de *alimento*, scribit, forinsecus alimentum ab extrema  
superficie, ad interiora peruenit, Confluxio vna, Conspiratio vna, Consentientia  
omnia: & libro de *Carnibus*, Cor & venæ causæ semper moventur, & plurimum ca-  
lidi in venis inest, & propterea spiritum Cor trahit ex omnibus in homine, cali-  
dum existens: & *sub finem lib. de natura Osium*, Cor habenas habet corporis, laxan-  
te se, & costringente colorum mutationes facit. Sed apertius lib. de *morbo Sacro*. Ven-  
nas turgere spiritibus, & consimiles arteriis sic describit: In has venas etiam spiritus  
copiam inducimus, hæ enim nostri corporis respirationes sunt, aërem in sciapas tra-  
hentes, & reliquum corpus ac venulas detruantes, refrigerantque, ac rursus demit-  
tunt, non enim possibile est spiritum stare, sed procedit sursum ac deorsum, si alicui  
confluerit, ac interceptus fuerit, impotens redditur illa pars. Cui rei signum  
hoc est, cum decidenti, ac decumbenti venulæ compressæ fuerint, ut spiritus à vena  
non discurrat, statim torpor occupat, & de venis reliquis si esse habet. Deinde efflu-  
xus sanguinis arteriosi in carnes, qui proponitur ab *Harnes*, etiam ex Hippocrate pro-  
batur potest, lib. 6. de *Epidemiam*. Carnes sunt attractrices ex ventre, & extrinsecus: &  
lib. 1. de *morbo*, venæ magistra hunc quàm carnes, & cum calefactæ fuerint, & exinan-  
itæ magis attrahunt: Apud Hippocratem somnare de mari, humorum agitationem  
significat, & humores corporis mari comparantur, unde voces quæ conueniunt flu-  
tibus maris reciprocantis retinuit Hippocrates, quales sunt *apertus & mappius*, accessus  
& recessus maris ad litus, quod explicauit Galenus, libello de *Diata Hippocratis*:  
*scire debet artifex, non solum in Oceano mari recessum & accessum fieri aquarum circa Lu-  
na transfigurationes, sed etiam in nostro corporibus quandam esse reciprocationem humorum,  
in quibus crescente Luna conuenit anxilia, qua replent adhibere, decrecente autem detractio-  
ne uti.*

Hippocrates lib. de *Insomniis*, istum circuitum sanguinis subolsfecisse videtur, cum  
ires *Astrorum* circuitus in corporibus nostris reperiri statuit. *Astrorum*, inquit, exter-  
ior est in corpore circuitus, Solis verò medius, Luna ad cauitates. Ibi meam nouam do-  
ctrinam de circulatione sanguinis designasse ausim affirmare. Nam sanguis aliter mo-  
uetur in corporis circumferentia, aliter in corde, quod solem mundi æmulatur, ali-  
ter in ventre inferiore, qui Lunæ comparatur. Subiungit, quicquid enim in corpore pa-  
rum ex circuitu excernitur secundum naturam, à *Vespera* ad auroram, idipsum redire habet.  
*Nam & qua in ventre secerantur, & qua in cornem eructantur, omnia ex circuitu & cir-  
cumferentia excidunt: idem exposuit lib. 1. de Diata*, triplices circuitus ignis fecit inter se,  
mutuo intrò ac foras terminantes, alios quidem ad cauitates humorum Luna facultate, alios  
verò ad externam circumferentiam ad ambientem soliditatem, astrorum facultate, medijs verò,  
& intrò & foras terminantes, calidissimum ac fortissimum ignem habent, qui sunt omnibus  
dominatur, omnia secundum naturam gubernans. Alibi libro de *Osium natura*. Venas &  
arterias sibi per anastomosis in extremis iunctas, circuitum efflere scribit, vna per  
corpus diffusa, spiritus, & fluxum ac motum exhibent ab vna multa germinantes, atque has

*una, unde oritur, & ubi desinat, non scia. Circula enim facta principium non inuenitur. Ipsemet lib. 3. de artubus venarum, & arteriarum communicationes naturam separato sermone pollicetur. Idem lib. de Dieta, circuitus in corpore est: unde incipit in hoc desinit, id est, sanguis incipit fluere à corde, & ad illud recurrit. Galenus ex Hippocrate docet, lib. 3. de naturalibus facultat. cap. 13. non modò spiritum, vel excrementum, sed etiam nutrimentum ipsum ab vltima & summa corporis parte; vnde primum fluxit rursus deferri, quod expressum legitur, lib. 6. Epidem. sect. 8. text. 1. & lib. 4. de morbis, non longè à principio, ubi manifestè docet circuitum sanguinis alimentarij. Ex omnibus istis locis licet picturam aliquam, vel adumbrationem circulationis sanguinis colligere apud Hippocratem.*

Erasistratus sanguinis, & spirituum à venis in arterias, & vicissim ab arteriis in venas traductionem, & communicationem fieri putabat per paremptotism, quo vocabulo utebatur, ad exprimendum istum commercium, & commercium vasorum inter se, atque de generatione febris scripsit, meo iudicio, consentanea veritati, dum materiam febrilem à venis violenter detrusam in arterias, transferri & euchi vsque ad Cor, ubi post varias luctus tandem inflammatur Cor, eiusque spiritus, indeque febris nascitur, & emergit.

Initio lib. de vena sectione contra Erasistratum, Galenus lib. 3. de natural. facult. cap. ult. & lib. de usu respirationis mutuas anastomoses venarum & arteriarum docet, exemplo animalis pereuntis incisis magnis arteriis, quia totus sanguis exhauritur etiam venarum, mutuum quidem istum confluxum & commercium agnouit, sed nullam circulationi sanguinis mentionem fecit.

Porro textum Hippocratis, ex lib. de alimentis adductum, videlicet mutuum & reciprocum venarum, & arteriarum commercium, atque consortium confirmant duo experimenta certissima. Primum tale est in fetu recens edito, si per venam umbilicalem, quæ inseritur in venas cauam & portam fortiter insufflaueris, videbis aperto abdomine & discisso thorace, omnes venas & arterias corporis Cor ipsum & pulmones inflari: atqui si in caduere talem habet penetrationem aër, quid non permeabit spiritus in viuentem. Cur viam non faciet humoribus, cum sint spiritus impulsores, & impetum facientes ex Hippocrate. Alterum experimentum est eiusdemodi in ovis, vel vitulo recentem maciato, incisis thorace & ventre, atque relictis in suo situ extis, putà visceribus vitalibus ac nutritiis à iugulo vsque ad renes, si ligatà aortà insufflaueris venæ caux truncum ascendente supra diaphragma, videbis Cor inflari, eiusque ventriculum dextrum & sinistram, pulmones, aortam, si verò, per tracheam arteriam ligato venæ caux truncum insufflaueris, animaduertes pulmones, sinistram Cordis ventriculum inflari, cum dextro Cordis sinu. Inde cognosces communionem pulmonis cum Corde, & transmeationem spiritus à dextro Cordis ventriculo in sinistram. Ad probandum fluxum sanguinis ab arteriis in venas duas adiungo rationes, cum æquabilis sit, & consimilis eodem instanti omnium arteriarum motus, ut in diastole excipiunt magnæ arteriæ, sic in systole expellunt extremæ arteriæ: at præsto sunt venæ coniungatæ per anastomosis iunctæ arteriis, quæ excipiunt, atque ita fit traductio sanguinis ab arteriis in venas. Adde quod Hippocrates in arteriarum interceptionibus venam secat, ut magnâ portione sanguinis detracta è venis, arteriosus transeat in venas depletas, inde plenitudinem, siue abundantiam sanguinis, eiusque feruorem ex pulsu arteriarum metimur, atque discernimus, ac si æqualis esset quantitas & qualitas sanguinis in vtroque vase. Omnia tam in cælis, quàm in terris, & præsertim in homine circulariter agi & conuerti, demonstrat Cornelius Gemma, lib. de Arte Cyclagonomica, & Aristoteles in Problem. vitam vniuersam hominis circulum appellauit.

EXAMEN, ET REFUTATIO OPINIONIS  
Haruei.

CAPVT IV.



Is præmissis ad tollendam circulationis absurditatem, quam multi iudicant, accedo ad examen opinionis *Haruei*. Ille vt probet suam circulationem sanguinis supponit cor, & arterias moueri per systolem & diastolem, sed systolem esse cordi propriam, dum fortiter contractum cor expellit: Diastolem esse veluti per accidens, quia Cor quodammodo paritur, dum impletur, repletionem esse præcipuam causam perennis motus in Corde, dilatatur enim, quia impletur instar vtris, non autem instar folliis dilatatur, vt repleatur.

Ego vetò systolem & diastolem motus esse Cordis proprios statuo, quamuis fortior sit systole, quia maiore opus est robore ad expulsionem, sed repletionem esse causam proximam motus in Corde, neque Philosophi, neque Medici vnquam admittent. Quia Cor palpitat statim, atque eius rudimentum extat, vt in ouis triduo à gallina incubatis obseruatur. Inde *Ficinus* contendit tertio à conceptionis die animam rationale infundi ratione motus: At tunc temporis Cor nondum excavatum est ad recipiendum sanguinem: accedit quod euulsum Cor & resectum à suis vasis in animali viuente, supra tabulam, vel manum aliquandiu palpitare deprehenditur, siue villo appulsu sanguinis. Cor *Salmonis* exenterati aspersum aquosa sanie eiusdem *Salmonis* euiscerati, vltra diem viuere conspexit *Constantinus*, uti refert in supplemento *dictionarij* voce *Salmo*. Cor hominis euulsum in iis, qui viui expectorantur in Anglia, *Verulamio* per quadrantem horæ vidit palpitare, dum carnifex manu demonstraret: ergo facultas pulsifica Cordi insita est, & ab anima dirigitur. Nec pendet ab appulsu sanguinis, quamuis sit necessarius ad motus perennitatem.

Est autem duplex Cordis motus ipsi proprius & insitus, systole, & diastole. Hæc prior est systole, quia Cor prius debet excipere, quàm expellere. Diastole fit basi versus mucronem reuulsa: hanc actionem adiuuant valvulæ tricuspidæ vasis ad Cor materiam vehentibus appositæ, & ipsæ valvulæ membranæ sunt veluri tendones, & spongetoses columnarum carnearum, quæ ventriculis intrusæ, tanquam muscoli exigui trahunt basim vtriusque conum. At systole perficitur ab omnibus fibris carnem Cordis ambientibus, & vndique constringentibus parietes Cordis: in istis actionibus septum Cordis manet immobile, vel leuiter tetrahitur circa basim Cordis in diastole, quia super aliquo quiescente, motus fieri debet ventriculorum: sic enim transitio sanguinis per septum facilior existit.

Vt *Harueus* probet suam de circulatione sanguinis opinionem, supponit tres opiniones omnino falsas. Prima est sanguinem à dextro ventriculo per venam arteriosam traduci per medios pulmones, telorberi ab arteria venosa, & in sinistram Cordis ventriculum deduci, vt transmittatur in aortam. Secunda est, sanguinem arteriosum in carnes extremitatum partium effundi, & à venulis emulgeri. Tertia, bis terve in die naturali istam circulationem sanguinis perfici & absolui.

Quod adstruit tribus falsis fundamentis. Primum est sanguinem copiosius à vena caua transmitti in arterias pulsus Cordis, quàm ab assumptis alimentis refarciatur: idcoque massam sanguinis breui temporis illac transire atque redire. Secundum, sanguinem vltcrius in singulas partes distribui, quàm ad nutritionem necessum sit. Tertium, ab vnaquaque parte venas ad Cor hunc sanguinem reducere, omnium propositionum falsitatem prius demonstrare conuenit, vt veritas nostræ opinionis magis elucescat.

Quod spectat ad primam propositionem de translatione sanguinis per pulmones. *Galenus* lib. de resu partium, & lib. 3. de naturalibus facultatibus, aliique Anatomici posteriores quamplures, sanguinem à dextro Cordis ventriculo per foramina septi colari statuunt. Primus *Columbus* istam transeolarionem repudiauit, & nouum iter per medios pulmones à vena arteriosa ad arteriam venosam introduxit: Multos habet suæ



opinionis fautores & affectas: alij diligentius inuestigant illam traductionem sanguinis à dextro ventriculo in finiftrum, & deprehenderunt ftylo tenoi introducto foraminula obliqua feptum perforantia, vt *Delfifsimus Gaffendus Profeflor Regius Mathematicus* in hac Academia atteltatur.

*Alter Venerius, Follius, iuuenis Anatomicus, annos viginti quatuor natus*, fic expreffit ztatem fuam, vt ingenij fubtilitatem cognofceamus, gloriatur fe reperiffe verum ductum sanguinis à dextro Cordis in finiftrum. Defcribit ac depingit anafomofim venæ caviæ cum arteria venofa, quæ in fortu deprehenditur, infra valvulas tricolpides vtriufque vafis. Fateor equidem illam aliquandiu in adultis apertam manere, fapiusque tal. m obfervavi, & notavi in mea Anthropographia, & fi occludatur circa ipfam foraminula fuperfunt, per quæ fuit fanguis à vena cava in arteriam venofam, fed cum iftæ porofitates, fiue foraminula fint exilia, non potefl fanguis velociter traduci: præterea cum elarent, & repetantur infra Cordis valvulas triculpides, fanguis venofus non perveniet ad cavitatem finiftri ventriculi, quia non potefl admiffus fanguis intra ventriculum dextrum regredi in cavam. Confiltamus igitur in illa traductione fanguinis per medium feptum Cordis, porofum & foraminulentum.

Priusquam ulterius progrediar, rationes ipfius *Galenii* pro traductione fanguinis per feptum paucis proponam, atque rationes Columbi, quibus opinionem fuam tueatur, prorfus inanes oftendam.

Cor ex fanguine à vena cava in dextrum ventriculum deducto puriffimam portionem retinet, & transmittit in finiftrum ventriculum, refiduum ablegat in pulmones. Vt hoc efficiat feptum habet medium multis cavernulis profundis, multis etiam fcribculis excavatum, & oblique pervium, cuiusmodi cavernulæ & foraminula in cadavere funt obfcura, etiam calido, multo magis in refrigerato Corde. Præterea, fi confideretur inæqualitas vaforum, quæ funt in dextro Cordis ventriculo, reperies vnum quod aduchit amplius altero, quod reuchit in pulmones. Ac proinde aliqua portio fanguinis abfumpta efl & traducta in finiftrum ventriculum. Si quis obiciat portionem illam in nutritionem Cordis abfumptam fuiffe, id falsum ex eo conuincitur, quod Cor alio fanguine alitur per venas & arterias coronarias extrinfecus expañfas.

*Columbus* dum novum vñum pulmonis proponit prioribus Anatomicis ignotum, fcilicet præparare Cordi fanguinem arteriofum, quem motu fuo attenuat, & permifcet aëri, vt poftera deducat in finiftrum Cordis ventriculum, moxque in aortam demittatur, id probat rationibus quatuor, quarum nonnullæ ipfius opinionem deffruunt. *Prima* efl, arteria venalis femper fanguinis plena deprehenditur, non aëris. *Secunda* capacitas venæ artetialis maior efl, quàm conueniat ad nutritionem pulmonum. *Tertia* amplitudo pulmonum indiget copiofo fanguine arteriofo. *Quarta* reledio fanguinis floridi à pulmone fimilis arteriofo, demonffrat tali fanguine abundare pulmonem. Rationibus Columbi fatisfaciam, fi prius monuero, iplum quædam de pulmonibus fcripfiſſe, quæ eius opinioni prorfus aduerfantur. Quo pacto per venam arteriofam fanguis à Corde ad pulmones deducetur, inde ad finiftrum Cordis ventriculum, fi vtrumque vas motu careat, vt ipfe ffatuit. Si pulmonum tunica porofa efl, & in pleuritide, & peripneumonia fanguinem fufcipit ab ipfa cavitare ex eius opinione. Ergo fi excipit ex cavitare thoracis fanguinem & excrementa, potefl zque facile demittere fanguinem in eandem cavitatem, negat etiam fuligines emitti à Corde in pulmones *lib. 7.*

E diuerticulo redeo ad ratlones Columbi, quibus improbat traductionem fanguinis per feptum Cordis, quod fpectat ad primam rationem: Verum efl arteriam venofam in cadaueribus fanguine refertam eſſe, quoniam in morte aëre euaneſcente per expirationem, eius locum occupat fanguis. Secunda ratio deffruitur à tertia, ampla efl vena artetialis, quia pulmonum amplitudo copiofum fanguinem defiderat. Reledio fanguinis floridi à pulmone, demonffrat fanguine arteriofo nutriri, quia contrarium aliis partibus habet alimentum ex *Hippocrate*. Verum fola expulſio fanguinis à dextro Cordis ventriculo in pulmones, quantulumcumque fir in fingulis contractionibus Cordis, demonffrat copioſiorem, quàm par fit fanguinem pulmonibus diftribui, ac proinde alicubi diuerrere debet, alioqui fuffocaret pulmones, habet effugium per illam anafomofim venofam, quæ fit inter arteriam venofam & venam cavam, quam dixi remanere hiulcam, aut foraminulis pertufam ad eum finem.



Nunc redeo ad *Haruēum*, cui tantopere placet Columbi opinio, quia fauet eius circulationi, dum contendit istam translationem sanguinis à dextro in sinistram, fieri copiosam ac velocem cum ei aculatione quadam, sed violentiam facit ut in pulsu, non tam motus sanguinis copiosi, quam spiritalis qualitas, siue facultas, docet enim *Galenus libro, quod sanguis in arteriis continetur*, celeritorem esse qualitatum motum quam corporum, ut videre est in luce, sono, & odore.

*Haruēus* translationem sanguinis per septum Cordis quatuor rationibus eludit, quibus respondere facile est. *Prima* septi Cordis substantia densior, & compactior est quavis corporis particula, exceptis Ossibus & nervis, quod falsum experientia conuincit: nam renem caro æquè dura est, & tamen percolatur serum per eius substantiam, secretum in peluim renis distillat. *Secunda*, si adessent foraminula per quæ spiritus & sanguis ab vno in alium ventriculum dilatatur. Corde commiscerent: Non video, quid inde detrimenti possit accidere Cordi, ex illa confusione substantiarum cum probatur *Haruēus in præfatione*, utrumque ventriculum æquali virtute præditum esse, sed cum impleatur ventriculus dexter eodem tempore, quo sinister in dilatatione Cordis, appulsus sanguis venosus ad dextrum sinum quem implet, simul impedit alterius materie à sinistro venientis influxum. *Tertia*, si per septi substantiam sanguis permearet, aut ab ipso septo poroso exhibi posset, quid opus esset venæ & arteriæ coronalis ramulis ad ipsius septi nutritionem expansis. Falsum est ad septi nutritionem venas & arterias coronales Cor intrare, perperant tantum & aluunt exteriora Cordis. Fateor ista vasa materiam suppeditasse Cordi formando, & remanere semper expansa supra Cordis parenchyma ad generationem & conseruationem adipis circumfusi. Addo *quintam rationem* istis quatuor validiorem. Certum est in motu Cordis ambos ventriculos æqualiter & eodem tempore moueri, si in diastole dilatatur ventriculus dexter Cordis, similiter & sinister in diastole dilatarī debet: at si translatio sanguinis à dextro in sinistram fit per septum, non potest fieri, nisi in perisistole, id est in eo momento temporis, quod intercedit diastolem & systolem, at illud instans adeo breue est, ut nequeat per exigua foraminula penetrare sanguis à dextro in sinistram ventriculum, simulque adipisci vitalitatis formam, & expelli per systolem in aortam, ergo necessum est per aliam viam materiam ire ad sinistram ventriculum, dum dextro pariter infunditur. Respondeo, dum impletur ventriculus dexter sanguine, sinister impletur aëre in pulmonibus præparato, & permixto spiritui vitali, qui in utroque ventriculo continetur. Ille spiritus dum implet dextrum & sinistram ventriculum, aperit vias septi, ad faciliorem translationem in diastole, propterea momento fit ista translatio, ita ut guttatim admissus sanguis in sinistram ventriculum, confestim expellatur in systole vtriusque ventriculi. At cum ventriculus dexter eandem habet facultatem conficiendi sanguinem vitalem, per vtrumque ventriculum celeriter transiens sanguis redditur vitalis, istaque alteratio eodem temporis momento in perisistole perficitur, nisi dicamus rotum sanguinem ventriculorum non euacuari in systole, remanere semper intra foueolas aliquam portionem, quæ apparatus ad sequentes pulsationes Cordis.

## CIRCULATIONEM SANGVINIS NON FIERI per Pulmones.

### CAPVT V.



Non mearum est partium probare falsitatem translationis sanguinis per pulmones ex impossibilitate, & incommoditate.

Pulmones cum sint in perpetuo motu dissenti in inspiratione, considerantes in expiratione, quod leuiiores, et alacriores erunt ad motum, at si sanguis continenter à dextro Cordis ventriculo per pulmones traduceretur, graui sarcina premerentur, nec sine damno & periculo, si sanguis effunderetur per substantiam pulmonum, ut chylus per Hepar, quia tussiendo facile extunderetur, & dum tossis anhela & violenta quatit pulmones, non effugerent ecchymoses, aut sanguinis effusiones.

Cum enim pulmonum membrana foraminulenta sorbeat impuritates thoracis, & vicissim in pulmones suas sordes effundant in eam cavitatem: quidni per easdem vias sanguis calidissimus & tenuissimus, è pulmonibus collisus in alveum thoracis exiliet, vel exstillet? Obseruatus ab Hippocrate *omni*. morbus pulmonum ex vehemēti eorum collisione & concussionē.

Deinde in dissectis cadaueribus non strangulatis, sed soffocatis, parenchyma pulmonum, non tantum foris, sed etiam intus albicans deprehenditur: At rubere deberet instar Hepatis. si rotum sanguinem quoquoersum effusum exciperet, & totum parenchyma discissum sanguine diffunderet in cadauere recentē mortuo.

Præterea, si motus arteriarum dependet à sanguine ferido, vti patet in aneurismate, ex arteriola rupta, vel dilatata, ipso *Hæmæ* fatente, Sanguis ille profectus à dextro ventriculo, & per venam arteriolam pulsatilem traductus in pulmones, ibi Aneurisma producet, atque cum sit spirituosus, molem pulmonum amplificaret. Vixi sunt, qui absque pulsu notabili & perceptibili in temporibus, manibus, pedibus, etiam ad regionem cordis appressa manu, per tres vel quatuor annos vixere, sine vlla spirandi difficultate, quibus in truncis venæ arteriole, & arteriæ venosæ tubercula vias istas obstruentia post obitum deprehensa fuisse, sæpissime in his, qui summam inæqualitatem in pulsu patiuntur tuberculum obseruatum, quod obturabat alterutram pulmonum viam, vt in *Medico Antipatro, apud Galenum, libro quarto de locis affectis*, attamen vivebant, facile spirantes, sine ista traductione sanguinis per pulmones. Adde quod in violentis motibus & exercitationibus corporis, obnoxius fuisset suffocationibus pulmo, vixque effugisset inflammationes, ex abundantia sanguinis per pulmones transcurrentis.

Cum autem contrarij sint motus pulmonum & cordis, quia non sunt eodem tempore, & cordis motus sunt multo celeriores, in violentis motibus thoracis & pulmonum, si pulsant vasa pulmonum ad expulsiōem sanguinis, proculdubio ista traductio sanguinis interturbaretur: Quoniam vt commodè fiat, corporis quiete indiget, & moderato pulmonum motu, qui non reperitur in vita laboriosa, aut violentis agitationibus corporis.

Bronchia pulmonum cum sint interiecta duobus istis vasīs, cur non recipiunt etiam sanguinem effusum per substantiam pulmonum, si reor bent excrementa. At dices, per anastomoses vasorum sit ista traductio sanguinis, ergo non potest esse celerissima & copiosa, vt imaginatur *Hæmæ*, ac proinde bis tertē in die non potest fieri circulatio sanguinis.

Sanguis in illa traductione, vel per substantiam pulmonum dispergitur, aut vasīs pulmonum per mutuas anastomoses inter se iunctis includitur: si diffusus est extra vias in expiratione, spiritus sanguinis cum aëre soliginoso excludetur, aut saltem eius magna fiet diminutio, si intra vasa pulmonum sanguis ille continetur, ab aëre circumfuso continenter inspirato, impense refrigerabitur, ac proinde de calore suo amittet.

Vasa pulmonum, nempe arteria venosa, & vena arteriosa, quamvis proficiantur à corde, motu carent dilatationis & constrictionis, sed instar canalium dumtaxat, admittunt, & deducunt sanguinem, alioquin si mouerentur, contrarij inter se haberent motum: nam constructo corde dilataretur vena arteriosa, quæ suum sanguinem effunderet in arteriam venosam: at hæc exceptum non potest per alium motum, quàm systoles immittere in sinistram Cordis ventriculum dilatatum: quia si mouentur hæc vasa, seruire debent motum cordis & arteriarum, ergo sunt immobilia, aut saltem sola vena arteriosa mouetur.

Eo modo reuoluitur sanguis motu circulari in sanis, vt in ægris corporibus, atque in ægris non circularitur per pulmones: Nam si circularetur, haud dubiè in febribus supra modum calerent pulmones, atque vix phlogosim, aut dolorem, aut oppressionem euitarent. At in plurimis febribus etiam ardentibus, hæc symptomata non teperiuntur, quin etiam in dissectis cadaueribus, mortis repentinæ, vel pulsus intermittētis, & inæqualis causæ, in septo cordis obstructo, vel ventriculis oppletis, inibi congesta materia inuili deprehenduntur, liberis & integris pulmonibus. Hæc dubiè pulsus inæqualitates & intermissiones, quæ sunt defectus, & vitia Cordis manifestè conuincunt illam traductionem sanguinis potius per septum medium cordis, quàm per pulmones fieri. Nam si sanguis à dextro ventriculo per amplam venam arte-

riofam veloci curfu flueret per pulmones, vt perueniret ad finiftrum cordis ventriculū, vbi celeſtiter effunditur in aortam vas ampliffimum, neque fuligines, vel fumi, aut ſtatus, à partibus infernis elati in Corde ſubſiſterent, nec tot concrectiones ſebaceas, aut carnoſas intra venam cauam, & ventriculos Cordis in cadaueribus obſeruamus: at per illam traduccionem ſanguinis per ſeptum cordis tenuiſſimum & puriſſimus dumtaxat ſanguis percolatur, impuriſſimus ad pulmones ablegatur tanquam cordis emunctorium, & ad eorum nutritionem: quod ſi regurgitet, in cauam remigrat per illam anafomofim cardiacam arteriæ venoſæ eum venæ caua: ac proinde ex craſſo & impuro ſanguine multa patitur incommoda, dum foraminula ſepti ocluduntur, vel ventriculi replentur, vel auriculæ, vel intra canales iuxta cor, materia illa ſebacea, vel carnoſa continetur, quæ affiduè cordi varia parit offendiſcula. Interea moncho ſtatus & fumos non poſſe cunctari in cordis dextro ventriculo, propter continuū fluxum ſanguinis à dextro in finiftrum, & ad pulmones, nec qui per arterias ad cor aſcendunt, diffiſſimè eò perueniunt, propter repugnantiam & oppoſitionem ſanguinis arterioſi impetuoſè deorſum fluentis. In iſto conſictu iuxta cor ſæpiſſimè pulſus immutatur.

Cur quæſo repudiatur traieccio ſanguinis per medium ſeptum cordis, ſi admittitur ſanguinis exudatio per membranas venarum, ſi ſeminalis materia ſpirituofa per vas ciaculatorium poroſum à reſtibus impetuoſè emittitur in ipſo coitu, ſi per craſſiorem oſſium ſanguis è cauitate exudat, cur per ſeptum poroſum non penetrabit ſanguis calidiſſimus & tenuiſſimus.

Obſeruamus quotidie gladio vel ſcopeto alicubi pulmonibus perfoſſis etiam ſatis profundè, ſanguinem tandem ſiſti, qui totus conſeſſim eſſuaret, ſi per pulmones traduceretur. In phthoè, ſi ſanguis per pulmonem carnes traduceretur, non leuem noxam adferret cordi, nec tandiu videremus iſtos ægrotantes viuere. Plures etiam obſervati fuere per multos annos vixiſſe, exeiſis, putrefactis, conſumptisq; pulmonibus. Recentia exempla reperies apud *Talpium doctiſſimum Medicum in ſuis Obſervationibus*.

Addo, ſi ſanguis à dextro cordis ſinu per pulmones reuolueretur, in illo tranſitu ſanguis multum de ſuo calore & ſpiritu amitteret, & aëris permixtione, ac pulmonum ſtellatione frigidior eo euaderet, qui in vena caua continetur. Deinde pituitoſis excrementis pulmonum inquinaretur, ac proinde prorſus ineptus foret confiſcendi ſanguini arterioſo puriſſimo, atque cùm in maſſa ſanguinis contineantur quatuor humores conſuſi, interdumque impuriſſimus ſanguis perueniat ad finiftrum ventriculū ſine vlla ſecretione purtab impuro, quæ ſit in dextro ventriculo, dum per ſeptum colatur, ex impuro ſanguine conſtabitur ſanguis arterioſus, qui debet eſſe puriſſimus, quantum poſſibile nature, ergo ſatius eſt per ſeptum cordis puriorem & tenuiorem ſanguinis portionem tranſcolari, impuriorem ablegari in pulmones, qui ſunt veluti emunctoria cordis, vt lien Hepatis. Nec mirum, ſi tot fluxionibus ſint obnoxij, quia magnam parrem impuritatem circulaſi ſanguinis excipiunt.

Colophonem imponet huic diſſertationi vltima hæc ratio inuicta & irrefragabilis. *Galenus* in multis animalibus, præſertim piſcibus, cor eique adnexam venam cauam obſeruauit, quamvis carerent pulmonibus, & finiftro cordis ventriculo. At ſi neceſſarius eſſet pulmo ad traduccionem & generationem vitalis ſanguinis, natura magnis illis piſcibus deduſſet, quia nunquam deficit in partibus neceſſariis ad vitam.

Quod decepit *Hartnium*, & alios, eſt capacitas & amplitudo venæ cauæ, atque venæ arterioſæ iuxta cor, & quantitas eſſuſi ſanguinis in ventriculū dextrum, qui momento temporis inter diaſtolem & ſyſtolem non poteſt traduci per foraminula ſepti. Ex tali amplitudine venæ cauæ, qualis ſpectatur iuxta cor, colligere licet ſanguinem cunctari ad portas cordis, nec tam velociſter, tantaque copiâ influere in cauitatem cordis: at fluxuri ſanguinis quantitas, non eſt metienda ex capacitate & amplitudine ventriculi dextri, & vaſorum, quia ſanguis ventriculo dextro exceptus in diaſtole, partim in duos locos migrare debet, in finiftrum cordis ventriculū per medium ſeptum, & in pulmones ad nutritionem: ſuperſuam portionem regerunt in venam cauam per anafomofim arteriæ venoſæ eum caua. Propterea, ſi comparatur cauitas finiftri ventriculi eum dextra, duplo minor obſervatur, quia paucum ſanguinem admittit.

Cuncta hæc dum apud me cogito & expendo, in eam ſententiam inclino. Venam

arteriosam amplam & capacem sanguinem suppeditare ad nutritionem & vitam pulmonum, qui cum sint ampli, & in perpetuo motu, indigent copioso sanguine in ipso Corde calefacto: Sanguis ille acquiritur in dextro Cordis ventriculo vitalem spiritum, quis per poros & foraminula septi Cordis spiritus vitalis utrobique commeat, quamvis in sinistro eudatur & condatur: arteria venosa aëris in pulmonibus præparari portionem transmittit in sinistram Cordis sinum, simulque partem sanguinis intra pulmones regurgitantis refundit in venam cavam, per foramen illud Anastomoseos cardiace juxta Cor, sed infra valvulas tricuspidales venæ cavæ: atque amplitudo istius venæ, & auriculæ dextræ Cordis, quæ spectatur ad portas Cordis, indicant ibi maiorem copiam contineri sanguinem, quam influat in Cordis ventriculum dextrum, in quadruplici diastole. Propterea isthæc amplitudo pendere videtur, ab affluxu sanguinis reiecti à pulmone per illam viam commemoratam. Scio quidem istud foramen interdum in aliis occludi, sæpius tamen apertum deprehendi, nec tam exactè elaudatur, quin foraminula in circuitu membranulæ quædam supersint, ad sanguinis translationem.

His iactis & præmissis fundamentis, apud me constitui, quod pulmo & Cor dum sana sunt & integra, in optima corporis valetudine, circulario sanguinis lentè procedit, & guttatim, quia leniter Cor & pulmones moventur, atque tum respiratio adeo est lenta, ut ferè sit inaspectabilis, gubernata à solo diaphragmate, agitata cum leuissimo motu pulmonum: at dum violenta est respiratio, Cor celerius agitatur, ac proinde maiorem copiam sanguinis in se recipit, quam possit traducere per septum, ideoque cogitur in pulmonem refundere, atque ita resuere sanguinem necessum est in sinistram Cordis ventriculum, vel si non ingrediatur ventriculum, per diueticulum elabi in venam cavam: Propterea dum expendo motus violentos Cordis, & pulmonum, siue insani, siue in ægris corporibus, cogor admittere istam translationem sanguinis violentè factam contra naturam, à dextro ventriculo in sinistram per medios pulmones. Itaque si sanguis copiosus, vel feruidus ac furens magno impetu ad Cor feratur, nec possit transire per septum Cordis, resuit in pulmones, tumque spirandi difficultas accedit, vel tussis molesta, tandemque hydrops thoracis consequitur, qui nascitur interdum, non tam vitio pulmonum, quam ex affluxu copiosi feri, quod effluit in capacitatem thoracis, ex agitatione violenta, & collisione pulmonum ad costas. Atque cùm tale iter sequitur sanguis, tum pulsus exilissimus & celerissimus observatur ex oppressione Cordis, & prælocatione pulmonum, qui non libere admittunt aërem, nec fuligines emittunt è Corde. Hæc tamen non impediunt, quin standum sit doctrinæ Galeni, de transirione sanguinis per septum Cordis, primo naturæ instituto, cùm transitio per pulmones sit violenta, contra naturam. Ex Aristotele sanguis à dextro ventriculo in sinistram traducitur, & solum Cor omnium membrorum intra se sanguinem continet, pulmo non in se, sed in venis habet. Itaque Doctissime Harnæ, agnosces sanguinis translationem per pulmones, esse contra naturam.

*Disce, sed ira vadat naso, rugosæque saeva,  
Si veteres auias tibi de pulmone remello.*

Atque tibi oggero, quod est in *Euangelio*. *Amice, non facio tibi iniuriam, tolle quod tuum est, & vade.*

## IMPOSSIBILIS CIRCVLATIO SANGVINIS

ab arteriis effusi in carnes extremarum partium, & à venis exsucti: neque in die naturali, ter aut pluries perficitur. Eruditi Primerosij refutatio expenditur.

### CAPVT VI.

**N**unc demonstro impossibile esse sanguinis effusionem in carnes extremas corporis, & reversionem in venas velocem, quia sanguis arteriosus subtilis, feruidus, pulsatilis, extra arteriolas in carnes effusus, nisi coaptatas habeat venulas, quæ confestim resorbent, produceret tumorem in partibus similem aneurismati, ergo non ab ipsis carnibus venæ exsugunt sanguinem arteriosum, sed iundæ sunt arteriis per anastomosim, vt commodè fiat illa transfusatio.

Non potest esse velox iste excursus sanguinis propter exilitatem vasorum, ideoque in extremitatibus corporis retardatur. Videmus secta vena brachij exiguo temporis spatio tres libras sanguinis educi velociter, quomodo sanguis ab arteriis in venulas capillares traduci potest adeo celeriter? tardius adhuc effluet, si per porositates carniū exilitet sanguis, & à venulis resorberetur.

Nunc superest ostendere circulationem sanguinis nequaquam fieri quotidie ter aut pluries ex fundamentis ab *Hartneo* propositis. *Primum* est. quod sanguis copiosius à vena caua in cor transmittitur, quàm iecur ex alimento possit suppeditare. Quod probat hoc experimento: in cauitate sinistri ventriculi cordis ipse deprehendit frequenter vncias duas sanguinis: at cessante pulsatione, si quantitas illa sanguinis fuit obseruata, fluxura erat in vna systole, quæ totum ventriculū exhaurit: si cor intra horæ spatium ter millenas, & amplius pulsationes edat, multiplicatis illis vnciis intra sex vel septem horas totus sanguis venosus cor pertransibit, etiamsi ad 4. libras admittatur in corpore bene habito & sanguineo, vt censuit *Auicenna* cap. de hæmorrhagiæ moriū. Sed *Hartneus* non considerauit cor elanguescens & emoricens, impar esse expellendo sanguini, ideoque ibi congestum fuisse, qui forsitan in viginti & pluribus contractionibus valdè fuisse eiectus. At ex illa traductione per medium septum dumtaxat gutta vna aut altera sanguinis traicitur, quæ in specu sinistro cordis inflata, ac veluti spumificata, spirituoſa, eiacularia, & impetuosa euadit.

Reversionem sanguinis arteriosi ab extremis partibus ad venas per ligaturas brachij, sic *Hartneus* demonstrat. Dum aperitur vena ad vacuandum sanguinem, arduissima ligatura impedit vtriusque excursum arteriosi & venosi, tumque vasa inferiora intumescunt prope ligaturam, mediocris ligatura non impedit fluxum arteriosi deorsum, & eiusdem refluxum in venas superiores: at ex aperta vena fluere desinit, si soluantur ligatura facta supra foramen incisæ venæ, quia sanguis venosus directè & celeriter vulnus infictum venæ prætergrediens, ad superiores partes recurrit. Admitto quidem recursum sanguinis ad superiora versus cor, sed non adeo celeriter, vt sibi fingit, & imaginatur *Hartneus*, ad probandam circulationem sanguinis, pluries iteratam in die naturali.

*Eruditissimus Primerosius*, qui contra *Hartneum* scripsit, quamuis sit acerrimus circulari sanguinis impugnator, admittit quidem circulationem sanguinis in longioribus inediis, sed totum sanguinem circulari multoties intra viginti quatuor horas sapienter inficiatur. Credit ex paucæ sanguinis quantitate maiorem multò spiritus copiam fieri, cùm spiritus sit quædam sanguinis æquant, ac proinde, si sanguinis è cordis sinu effusi quantitatem expendas per granos particulas, id verum inuenies. Si quarta pars grani singulis pulsationibus subeat arteriam magnā, mille noningentis & viginti contractionibus, tantum vnciam vnā immitti in arterias deprehendes: sicque intra horam vix vncia vna expellitur è corde in aortam. Cùm *Primerosius*, non plures quàm septingentas pulsationes numerarit intra horæ spatium, ideoque confidenter affir-

mat

mat arteriosi sanguinis vnciam vnā, intra horas duas non peruadere Cordis ventriculos. At hæc sanguinis quantitas potest ab assumptis cibis rependi, in homine sano, ac bene valente, quapropter vix tertia pars assumpti cibi in sanguinem versū refunditur in arterias, & sufficit ad spirituum generationem.

Equidem fateor *Primerosium* nimis subtiliter, exactè, & seuerè agere contra *Harnæum*: Ex eius fundamentis certum est saltem vnā guttam sanguinis in singulis Cordis pulsationibus lentis, regularibus, & naturalibus distribui: In aliis motionibus Cordis morbosis celerioribus maior copia labitur, idcirco circulatio sanguinis semel aut bis in die naturali fieri & absolui potest, sibi in die naturali, qui continetur maioribus canalibus venæ caviæ & aortæ totus circulari potest. Argumenta & rationes, quibus *Primerosius Harnæi & Vallæi* circulationem oppugnavit, non repugnant nostræ circulationi, quæ omnino differt ab *Harnæiana*.

## EXAMEN OPINIONIS VALLÆI.

### CAPVT VII.



VM igitur mentionem fecerim *Eruditiſſimi Vallæi*, & ad manus meas peruenierint eius duæ Epistolæ auctæ, *Institutionibus Anatomicis Bartolini* secundo editis insertæ, & doctissimi *Primerosii* ad eas responſio: Cogor ea paucis examinare, quæ *Harnæi* rationibus & experimentis superaddidit. Ille adhuc liberalior ter millenas in hora Cordis pulsationes obſeruauit: ſemunciam sanguinis in ſingulis pulsationibus Cordis humani effundi opinatur, ac proinde intra horæ quadrantem totius sanguinis circulationem absolui eo ſine, vt calefactus ſæpius, atque rarefactus magis peſficiatur, & in ſua integritate conſeruetur, quamuis admittat venoſum & arterioſum sanguinem eſſe conſimilem ætſrumque fibroſum, & concreſcere.

Vt autem inueniat viam patentem & ſacilem huic traduſioni adeo veloci, negat cordis ſeptum eſſe peruium, ideoque per medios pulmones traduſi sanguinem celeriter à dextro ventriculo in ſiniſtrum. Iſtius circulationis rapidæ fundamentum conſiſtit in illa traduſione per pulmones, quam cū n demonſtrauerim eſſe impoſſibilem, huic propoſitioni iam ſatiſfecì. Sed experimentis certat *Vallæus* ex Anatomie viuentium animalium petitis, quæ deſcribit accuratè, & elegantibus iconibus delineauit. Ac ſanè laudo plurimum eius induſtriam ac diligentiam, & ſæpius id olim præſtiti, ad explorandos motus Cerebri, Cordis, Pulmonum, Diaphragmatis, Inteſtinorum, atque etiam in Foetu ouis prægnantis, more *Galeni*, qui in hac parte Anatomica fuit admirabilis, ſed ingenuè fateor cum *Ceſo*, colorem, laxiorem; molliem, duritiem, ſimiliaque omnia non eſſe talia incifo corpore, qualia integro ſuere. Veriſimile eſt interiora, quibus maior mollietis, lux ipſa noua ſit, ſub grauiffimis vulneribus, & ipſa trucidatione mutari. Addit, neque quidquam eſſe ſtultius, quàm quale quodque viuo homine eſt, tale eſſe exiſtimare moriente. Ideoque in iſta præcipiti & obſcura propter largam sanguinis effuſionem, obſeruacione, multa noſtros oculos effugiunt, nec poſſumus veras actiones Cordis, & arteriarum innoſcere: Sic *Ceſus* pulſum rem fallaciſſimam in viuente iudicauit: Non vltius examinaſto *Vallæi* opinionem, quia *Notæ* ſcripti ad binas eius epistolæ, ad quas lector recurret, ſub ſinem huius traduſionis.

## EXAMEN OPINIONIS CONRINGII.

## CAPUT VIII.

**R**OST *Leidenſes Medicos*, nuper in lucem prodiit liber *Hermanni Conringii*, *Profeſſoris in Academia Julia doctiſſimi*, qui ſtrenuè defendit circulationem ſanguinis per Cor & pulmones. Atque *Hartui* opinionem confirmat, ſed velociorem adſtruit circulationem fieri, quàm *Hartui*, ad *Fallaen* propius accedit. Nam ſingulis horis in homine ſano, ac adulto ſanguinis libras octuaginta, vel ſexaginta, vel quadraginta, vel certe pluſquam viginti in arterias ex Corde promanare ſtauit, itaut in vna hōra bis terve totus ſanguis per Cor reuoluatur. Probat circulationem ſanguinis ex diſpoſitione venæ cauæ emergentis ab Hepate, quæ rectè vergit, ac dirigitur ad Cor: Ipſa valvulas habet vndique, quæ impediunt diuerſionem ſanguinis, ſinunt quidem aſcendere, ſed remeanti obſiſtunt, itaut nihil ſanguinis in caua concluſi ſupra Cor aſcendat, neque deſcendat infra. Ulterius aſſeuerat in Hepate bubulo intra ramos venæ cauæ manifeſtas valvulas reperiri ad eum effectum. Traductio verò ſanguinis à dextro ventriculo Cordis ad ſiniſtrum fit per medios pulmones: rationes adducit ad confirmandam hanc ſanguinis circulationem. Focus caloris natui radicaliter eſt in Corde, participatione in ſanguine, qui perpetuo remeare debet ad Cor, vt inſtauret iſtum calorem, & ſanguinem recalc faciat, quod fieri non poſſet ſine iſta circulatione veloci. Præterea debuit circulari, vt eius partes nondum probè excoctæ, elaborationem perfectam reciperent, quemadmodum Chymici circulatoriis vaſis liquores ſuos crudeſcentes perficiunt. Deinde vt ſanguis vitalitatem acquireret in iſto motu, & tranſitu per medium Cor, & medios pulmones: Sanguis autem ſuoſpe impetu propriaque propenſione ad Cor, tanquam ad fontem & principium ſuum continenter aſcendit.

Rationes iſtæ ſunt tolerabiles & probabiles, ſed conſequentiæ, quas inde deducit probare non poſſum: ſcilicet ſolum ſanguinem arterioſum nutrire, ac proinde meſentericas ſanguinem deferre ad nutritionem inteſtinorum, portionem redundantem reſcindi in venas meſentericas, vt ad cauam remigret: ſimiliter ſanguinem arterioſum ad lienem deduci, inde per venam ſplenicam deriuari in cauam. Sanguinem verò venoſum nequaquam per venas meſentericas, & ſplenicam ad illas commeari, quia valvulæ ibi interpoſitæ viam obſtruunt: ſed malè probat celerem ſanguinis traductionem per Cor, ex lotij quantitate dum bibuntur aquæ minerales, quæ non poſſunt ad renes peruenire, niſi per Cor tranſierint. Adſiſtentes ſordes & impuritates maſſæ ſanguinis per arterias expurgari, ne cogatur admittere aliquid deſcendere per venas.

## EXAMEN OPINIONIS CARTESII.

## CAPUT IX.

**R**ENATVS *Carteſius*, *Philoſophus in Batania non ignobilis*, ſanguinis circulationem neceſſariam eſſe iudicat ad motum Cordis, qui excitatur, & continuatur appulſu ſanguinis ad Cor, focus caloris natui, ibi ſanguis cauitatibus Cordis intruſus & ſeræſcens, ſtatim Cor intumefcere, ac dilatare facit, atque in dextro ventriculo rareſcens, & quali in vapores mutatus deſcendit ad pulmones aëris plenos, ibi craſceſcit, & denuo in ſanguinem mutatur, priuſquam in ſiniſtrum ventriculum Corſuat: præterea ſtatuit ſanguinem torum qui continetur arteriis, tranſiſſe per Cor, & in venas, poſtea reſcurre, quæ cum Hepate conſiderandæ ſunt inſtar vniuſis vaſis. Attamen in ipſas venas, ab inteſtinis ſemper humoris aliquid illabi ſatetur, atque aſſerit ſiniſtrum Cordis ventriculum ampliorem & latiore dextro.



Noua est ac inaudita, & prorsus absurda hæc opinio de circulatione sanguinis; quamvis iteratas circulationes per Cor in diem non adstruat, & à Medico Professore Ultraiectino *Henrico Regio* proposita & propugnata fuerit, in  *suis Theſis*, qui distributionem sanguinis per guttas fieri scribit: talem mecum agnosceat, qui in rebus Anatomicis mediocriter versari fuerint: ipsam pate facere refutare est, quia per se destruitur, quod Medicorum est, promittant Medici.

Attamen ne videatur hæc opinio nimis imperiosè damnata, rationes quasdam adiungam. *Cartesius* aduocatur in sanguine, vt in elementis introducit. At si sanguis in aërem mutatus fuerit, quomodo permixtus aëri intra pulmones momento potest pristinam naturam recuperare? Cur potius ad sinistram ventriculorum labitur spiritus, quàm in ambitum pulmonum, qui sunt spongiosi, perspirabiles, & foraminulenti? Spiritibus faciliorem exitum præbere possunt in continua sua agitatione & flabellatione: Falsum est sinistram ventriculorum latiorē & ampliorē esse dextro, longior quidem est, sed non latior, imò angustior semper obseruatur.

## EXAMEN OPINIONIS PLEMPII.

### CAPVT X.



**PORTVNATVS Plempius**, *Profissor Louanienſis*, quam aliis improba-  
uerat sanguinis circulationem, ex opinione *Harnet & Vallæ*, fatetur se  
illam nunc admittere, ad id adductum per inspectionem; & experi-  
menta facta in animalibus viuētibz, quæ sunt ab *Harnet & Vallæ*  
proposita & obseruata.

*Ipsè Plempius* testatur in sinistro Cordis ventriculo hominis strangulati, contineri sanguinis vncias prope duas, arterias micare ultra quater mille ictus in vna hora: intra horam emitti à Corde, plusquam libras sex sanguinis, adeoque intra quatuor vel sex horas tantum à Corde effundi, quanta est tota hominis massa sanguinea, nec putatur homo iustæ ætatis & magnitudinis, continere ultra triginta, vel quadraginta sanguinis libras, quamquam ab ipso putetur, multo minus continere. Venæ non accipiunt sanguinem ex arteriis per directos canales, & eum impulsu, sed per modum transudationis & transcolationis per partium substantiam, aut per angustas anastomoses. Sanguis à dextro Cordis ventriculo per venam arteriosam in sinistram ventriculorum, tam celeriter, & assatim truditur, vt ductus ille *Follianus*, multo minus exigua foraminula satis pateant, vt tantum sanguinis, tam subito transmittant.

Cùm istæ propositiones meæ opinioni prorsus aduersentur, nec veritati consentaneas putem, cogor illas paucis examinare. *Plempius* auget quantitatem sanguinis, qui reperiri solet in ventriculis hominis strangulati, vix semiuincia in sinistro ventriculo, maior in dextroprehenditur. Dein supra inuentores & assertores circulationis multiplicat numerum pulsationum in Corde, vt probeat circulari totum sanguinem intra sex horas, quod non admitto. Impossibilitatem & incommoda demonstravi. Quantitatem sanguinis totius multò minus, quàm triginta librarum statuit, & tamen in vna hora plusquam sex libras à Corde effundi, & totam sanguinis massam quanta est, intra sex horas à Corde absorberi. Hoc posito erunt in homine iustæ ætatis & magnitudinis 36. libras sanguinis & ultra, ratione istius dictionis *plusquam*. Istæ quantitas non potest intra sex horas ad Cor redire, & ab ipso oriri, si per modum transudationis & transcolationis sine impulsu, per partium substantiam, aut per angustas anastomoses fiat, sanguinis ab arteriis in venas recursus, nec per pulmones velox esse potest excurſus sanguinis, si tali modo tradueatur. Qui propositiones *Plempii* expendet, meas notationes non reiciet. Forsan ipse admonitus se retractabit, & circulationis utilitatem ad bene medendum demonstrabit. Interea considerabit, an suæ opinionioni de circulatione sanguinis conueniant, quæ scripsit. Iteur sanguificationis instrumentum esse, venas ab eo fugere sanguinem, & in reliquum corpus distribuere, intra venas reperiri valvulas, quæ impediunt, ne sanguis à Corde reſtuet, sed ad Cor semper ruat. In tractatu de missione sanguinis, quâuis mentionem faciat sanguinis cō-



tinenter in orbem moti, suoque impetu intra venas, tamen oblitus istius doctrinæ scribit, *Vena dum immanitur, concedunt, & nullum relinquunt vacuum, & alibi: Certum est, rursus sensu perceptibile, sanguinem in vena sectione extraxim ad habitum corporis fluere, per eundem exitu, & quatuor partes internas immanitur, non tamen plus sanguinis trahunt, quàm antè exitu impleta, imò minus implere se possunt.* Ex illa circulatione sanguinis à *Plenio* constituta expressis verbis colligitur, quod totus sanguis transeundo per Cor euadit arteriosus, atque is solus nutrit, nec differt arteriosus etiam à Corde depromptus, ab eo qui venis continetur, nisi colore, uterque fibrosus est.

## EXAMEN OPINIONIS LEICHNERI.

### CAPVT XI.



**N** *Venerabili* *Eccardus Leichnerus* contra *Harnem* scripsit de motu sanguinis, à sublatione causarum ad negationem effectus, audacterque concludit perpetuum sanguinis fluxum & refluxum, citra mentis operationem reapse non extare in rerum natura.

Vasa non depleri putat in vnoquoque pulsu, totum sanguinem vel guttam inultum spiritus producere, ut granum gummi odoriferi prunis inicitum torum conclaue odore replet, ut vnum granum medicinali virtuosissimis, suas qualitates, atque vires longè lateque spargit. Inde colligit dispersionem virium & qualitatum sine extensione subiecti. Propterea agitationem arteriarum esse concossoriam instar ventilationis, non fluxu materiæ impellentis. Præterea ostendit arteriarum motum ab insita facultate, non ab impulsu sanguinis fieri, quod demonstrant æquabilitas, & ordo pulsus in singulis arteriis, & omnibus simul, dum secundum naturam se habent, ut & momentanea earum cum pulsu Cordis coincidentia. Ridet istam recalcificationem sanguinis in Corde, ac si esset olla coquinaria, ahenum, vel furnus ad recoquendum sanguinem. Negat per septum Cordis traduci sanguinem, sed per pulmones, colatoria sanguinis ad sinistrum Cordis sinum deducendi. Sic delatus sanguis fuligines suas deponit intra pulmones, nec alia à Corde manant, quia puro & defæcato fruitur sanguine.

Si *Leichnerus* motum illum sanguinis per pulmones admittit, potest etiam motum sanguinis venarum ad Cor admittere: Quia traductio sanguinis per pulmones est vera circulatio, & prima. Itaque ridiculum est negare moueri sanguinem per venas & arterias cursu naturali, ab infernis partibus ad superas, & ab his ad inferas. Propterea non immorabor in refellendo *Leichnero*, quoniam eius assertiones quique quas proponit, non aduersantur meæ opinioni de circulatione sanguinis.

## OPINIONES CORNELII AB HOGELANDE.

### & Henrici Regij examinata.

### CAPVT XII.



**C** *CORNELIUS* ab *Hogelande*, & alter, *Henricus Regius, Medicus Vltraie-* *sinus*, ambo *Hollandi*, viri non indocti, Circulationem sanguinis laudant & amplectuntur. Constituunt sanguinem totum in ipso Corde perfici, ibi colorem rubicundum adipisci, deinde per circulationem ab arteriis Cordis per venas ad Cor redire, atque ita celeritè reuolui intra horam. Arterias venis vniri per anastomoses mutuas in extremis partibus, & si defint, effusum ex arteriis sanguinem confestim resorberi à venis proximis, uterque sanguinem à dextero Cordis ventriculo per pulmones traduci statuit, ut perueniat ad sinistrum ventriculum: Sed *Regius* ex vena cava in dextrum Cordis sinum, atque ex arteria venosa in sinistrum, eodem tempore in dilatatione duas satis ma-

gnas guttas infuere putat, quæ propter suam ad dilatandum aptitudinem, cordifque calorem, & reliquias sanguinis ibi ardentis, mox eodem momento in utroque ventriculo accenduntur & dilatantur, moxque cum non possit cor pati istam distensionem à spiritu sese dilatante, ex utroque ventriculo sanguis repellitur, à dextro per venam arteriosam in pulmones, à sinistro per aortam in uniuersum corpus. Admittit *Regius* in unumquemque ventriculum magnam satis guttam infundi, paulò post duas tresve drachmas ex cordis canini incisione vno pulsu saliendo profluere statuit, sæpius seminiacia, ex aorta incisa iuxta cor exilit vno impetu, ideoque in homine fortiore, calidiore, & grandiore, si non plus, saltem tantumdem singulis pulsibus cordis in arterias effundi credibile est. Tandem se restringit ad scrupulum sanguinis: vnde sequitur, cum in homine mediæ ætatis, & temperamenti moderatioris, vna hora fiant pulsus plus minus ter mille vnus horæ spatio, decem & duabus horis viginti libras sanguinis, 5760. scrupulos ad minimum, è Corde in arterias propelli.

Non admitto totum sanguinem circulari, sed dumtaxat dimidium, nec tam celebrem excursum, nec tantam sanguinis copiam admitti & expelli à corde, vt iam demonstrauimus, neque probò ad sanguinis receptionem & recalcificationem inservire circulationem sanguinis. Alias causas proposui verisimiliorcs. Nec mihi placet explicatio diastoles & systoles admodum obscura in Corde, quod diastole non ex ventriculorum dilatatione, sed ex ipso cordis tumore, qui etiam arctatis ventriculis contingere potest, est æstimanda.

*Cornelius ab Hogelande* docet guttulam vnâ sanguinis non esse quantitatem capacitati cordis adæquatam, id est, Cor maius esse, quàm vt tanto molimine & motu, nempe efferuescentiæ, dilatationis, & constrictionis vnâ solummodo guttam expellat, istam imparem esse motui omnium arteriarum, qui pulsus dicitur, excitando. Ideoque considerando venæ causæ amplitudinem, & auriculæ dextræ capacitatem, statuendum est, dimidiam vnciam sanguinis singulis auriculæ aperturis in Cor humanum infundi: quin etiam posita vnâ drachmâ cor ingrediente & egrediente, plusquam triginta libras sanguinis. vna hora per Cor transire fatendum est. Idcoque multò plus sanguinis per cor transit, quàm nutrimenti assumitur, itaque in transi-tione sanguinis per cor liberalior fuit *Corn.* *Hogelande ipso Regio.*

Sed guttam vnâ spirituosam è corde profluentem motu quodam ejaculatorio, sufficere demonstrabo, dum meam opinionem proponam.

Laudo iudicium *Cornelij ab Hogelande*, de vtilitate circulationis sanguinis, tanta est consequentia, ut si non totius Medicinæ rationalis fundamentum, saltem præcipua eius columna iure meritoque statuenda sit. Verùm eius cogitationes de cordis diastole & systole mihi non placent, quia sunt obscure descriptæ per Mechanicam illam Philosophiam nouam Hollandicam, & constituit solam naturalem diastolem, accidentalem & fortuitam systolem, quia sanguis cauitates cordis ingressus, calefactus, ac feruesfactus, rarefcit admodum, tuncque propter distensionem suam expellitur, sicque nouus subinde appellit & affluit, inde arteriarum & cordis motus simul eodem instanti coincidere cernitur, quia nulla systole: Propterea veterem doctrinam peruertit de motu Cordis, & de eius structura, nec declarat iter & progressum sanguinis per cordis ventriculos.

Ad *Anonymi* librum *Gallien* scriptum contra sanguinis circulationem, eodem idiomate respondebo.

FORTVNII LICETI DE CIRCVLATIONE  
sanguinis in Corde, opinio noua examinata.

C A P V T XIII.

**I**NGENVE & sincere fatetur Clarissimus Licetus, eximius Philosophus, & eruditissimus Medicus, disquisitionem de circulatione sanguinis, purum putum esse Anatomis mysterium, pag. 2. Ideoque non erit impar congressus Achilli, si Professor Anatomicus opinionem Licetii ad examen Anatomicum reuocarit. Ipsum enim Philalethem, veri licum, tanta equitate & humanitate præditum esse reor, vt quam assumpsit libertatem examinandi opinionem Haruet & Vallai, eandem mihi non denegaturum. Consimili verò modestia & humanitate vtat, quam ipse adhibuit in examinandis illorum scriptis. Veri Philosophi de re aliqua dubia moniti, veritatis amore, sæpe sua dogmata rescindunt, vt meliora sequantur, si proposita fueriat. Clarissimus Licetus, rogatus ab eruditissimo Medico & peritissimo Anatomico Veslingio, proferre suam sententiam, super ista questione de Circulatione sanguinis, subtiliter & ingeniosè nouam sanguinis circulationem excogitauit, de promptam, vt ipse affirmat, ex Hippocrate, Aristotele, & Galeno, quam video desertam ab ipso Veslingio in suo Syntagma Anatomico, vbi laudat, probatque de circulatione sanguinis opinionem Harueti, nulla facta mentione opinionis Licetii. Maluit ipsam silentio præterire, quàm reprehendere, ne Licetum irritaret, & ex amico inimicum haberet. Obsequium Amicos, Veritas edium patet. Nihilominus liberè proponam Cl. Licetii opinionem, atque difficultates obuias in viis patefaciam, ac enuntiabo.

Supponit pag. 4. duplicem esse substantiam corporis diuerso sanguine nutriendam, vnâ spirituosam, alteram solidam. Spirituosa calidum innatum constituit, omnibus partibus infusum, quod sanguine arterioso restauratur. Solidam component partes solidæ vniuersi corporis, quæ reparantur, atque conseruantur sanguine crassiore venoso. Sicut autem artificium circulati sanguinis procedit, & peragitur ex Cl. Licetio. Chylus ex alimento in ventriculo confectus, per venas lactæas, quas admittit, deferretur ad Hepar, vbi incipit mutari in sanguinem, vim istam sanguificam iecur mutuat, & accipit à corde: semicoctus & imperfectus ille sanguis cæco pulsu ab Hepate truditur, & traditur eordi, quod ex se naturaque sua trahit sanguinem ad dextrum ventriculum, vbi ibi perficiatur: sed non potest perfectè coqui & elaborari sine reciproco motu, à dextro ventriculo in auriculam dextram, & ab ea in ventriculum: Vbi satis excoctus, suamque perfectionem est adeptus, refunditur in cauam venam, inde deriuatur portio per venam coronariam, pag. 9. simplicem, interdum duplicem, quæ ramulos suos exilissimos spargit in laeuum ventriculum: Per hanc viam omnibus Anatomicis ignotam traducitur sanguis, à dextro ventriculo in sinistrum, quam viam gloriatur se inuenisse supra cæteros Anatomicos in ductu sanguinis cæcipientes. In sinistro ventriculo sanguis calidior & spirituosior effectu, in aortam effunditur, vt in corpus vniuersum distribuatur ad nutritionem istius spirituosæ substantiæ, quæ constituit calidum innatum, siue humidum primigenium. Sed quia substantia solida nutrienda erat sanguine venoso, maior portio istius sanguinis, ventriculum dextrum ingressi, ibique præparati, eo modo quo retuli ex Licetio, nempe reciproco motu, siue recursu bis terve repetito sanguinis, à ventriculi cauitate in auriculam dextram: postea diffunditur in venam cauam, distribuendus per vniuersum corpus cum Ichore, qui penetrabilem reddit vtrumque sanguinem in venas capillares, vsque ad extremas & penitiores corporis partes.

Pag. 31. Vbi verò partes sunt expletæ & satiatæ isto sanguine duplici, reliquæ vtriusque sanguinis dicatæ semini procreando, recurrunt per sua vasa comite & ducente sero, quod est instar vehiculi, ita vt venosus ad cor recurrat per venam cauam, vt arteriosus ad cor reuertitur per aortam. Vnusquisque sanguis per officium sui vasis cor ingreditur, nempe arteriosus sinistram ventriculum subit per aortam, ve-

nosus dextrum per caum, vt recalescant, nouosq. spiritusaequirant in corde, postea descendunt continuo ductu cum Ichore, quilibet intra suum vas conclusus ad testes, partim pulsu quodam, partim attractione testium. In isto progressu Ichor tam venosus, quam arteriosus sanguinis suo officio functus, per venas & arterias emulgentes labitur ad renes, inde in vesicam, firque vena. Ipsum recursum sanguinis valvulae non impediunt, quia non sunt adeo strictae clausae, quin pateat vtrique sanguini remeanti ingressus, quia dixit *Auerthues*, valvulae cordis conuenienti modo inter se iunguntur, & conuiuent.

Isthaec verissima esse demonstrat consimilis structura Cordis, in numero vasorum, receptione materiae, & expulsionem, quia vterque ventriculus habet duo vasa, vterque excipit aërem à pulmonibus, & reiecit fuligines, admittit sanguinem, & expellit. Atque haec est vera *Circulatio sanguinis*, ex *Hippocrate*, *Aristotele* & *Galeno* confirmata, praeferenda circulationi *Harnet & Vallis*, quamvis ingeniose excogitatae, sed male probatae, quia omnes eorum rationes Liceti opinioni potius fauent, ipsi potius aduersae. Haec est vera narratio opinionis *Liceti de circulatione sanguinis*, quam breuiter ac fideliter expressi, & comprehendendi.

Supereft nunc expendere fundamenta huius opinionis, quoniam *Clarissimus Licetius* se Peripateticum proficitur, & ex mente *Aristotelis* vbique loquitur. Illi concedo sanguinem praeparari in Hepate, perfici in Corde, sed sanguis exceptus dextro ventriculo, si à cavitatem ventriculi debet ire in auriculam dextram, ab hac in ventriculum motu reciproco, quomodo id fieri potest sine inuersione motus cordis, officij valvularum, & sine substantiarum confusione? Nam cor excipit in diastole, expellit in systole, si sanguis à ventriculo dextro Cordis refluat in auriculam, in systole expellitur extra cavitatem cordis, quia auricula dextra est infra valvulas tricuspidales, illae aperiantur in diastole, & sinunt ingredi sanguinem, in systole clauduntur, vt sanguini remeanti obstant. Istud axioma est adeo certum & receptum à *Galeno*, & omnibus *Anatomicis*, vt sit indubitatum: at dices, non ita obsignatas esse valvulas, quin non sinant aliquid elabi, quod *Galenus* dixit de valvulis duabus arteriae venosae: sed apertio debet esse ampla & aequalis in egressu sanguinis, ac in ingressu: deinde perfecte elaboratus sanguis, praeter istum motum reciproco, debet perpetuo refluere, ex *Licetio*, in venam coronariam, & in venam caum, vt distribuantur toti corpori. Ergo in orificio venae cauae valvulae erunt semper apertae, nunquam clausae, quod aduersatur omnino doctrinae omnium *Anatomicorum*. Nec valet autoritas *Auerthui*, qui suam ignorantiam in rebus *Anatomicis* agnoscit & deplorat propter defectum *Anatomicorum*, quod valvulae conuenienti modo debiscant, quia nihil ineditur & expellitur in corde, nisi motu diuerso cordis, ac proinde in diastole coram ventriculo dextro admittit sanguinem, ventriculus sinister aërem vel sanguinem, vasa duo, venae caua & arteria venosa, sunt vasa aduentia materiam, habent in orificiis suis valvulas tricuspidales, quae permittunt ingressum in diastole, sed impediunt regressum: in systole vasa reuehentia materiam elaboratam in corde, sunt vena arteriosa in dextro ventriculo, aorta in sinistro, in eorum orificiis appositae sunt valvulae sigmoides, quae sinunt elabi materiam, remeanti obstant, vena arteriosa sanguinem in pulmones transmittit, aorta sanguinem arteriosum effundit in corpus vniuersum. Itaque non considerauit *Cl. Licetius* diuersam esse structuram valvularum in vasis cordis, differentem usum, siue actionem, atque discrimen vasorum, quod quaedam aduehant, alia reuehant, aduentia praestructas habent valvulas tricuspidales, reuehentia valvulas sigmoides, illas admittere materiam, remeanti obistere, has emittere materiam, sed redeunt obstruere.

Reciprocatio sanguinis arteriosi à ventriculo sinistro in auriculam sinistram, est aequè absurda, ac illa ventriculi dextri cum auricula dextra, quia sinistra auricula est infra valvulas tricuspidales, & in adultis nullam habet cavitatem, quamvis in foetu amplior sit dextra, sed edito in lucem foetu sensim crassescit, solidescit, & cristata euadit progressu ætatis, propterea non potest admittere sanguinem in illo motu sanguinis reciproco, quem fingit *Licetius*. Denique rationes quas adduxi pro refellenda reciprocatione sanguinis venosi inter ventriculum dextrum & vicinam auriculam, militant aduersus istam reciprocationem sanguinis arteriosi inter ventriculum sinistram & auriculam proximam.

Praeterea, animaduerto magnam confusionem substantiarum diuersi sanguinis in-

gredientis & egredientis simul in orificio venæ cauz, etiamsi pateret corde immoto. Nam venosus sanguis ingressus cauitatem cordis, mox relabitur in auriculam, alter sanguis collectus in magna illa capacitate cauz cordi coherentis, & priori continuus ingressum affecit, elaborati & perfecti sanguinis ad coronariam perpetuus debet esse fluxus, similiter eodem tempore refluxus sanguinis venosi in corde elaborati in corpus vniuersum, simulque adest appulsus sanguinis semialis refluens ab omnibus partibus ad cor, eiusdemq. refluxus ad partes spermaticas: Qui considerabit istos motus humorum eodem ferme tempore, in eodem vase, per idem orificium venæ cauz fieri ex doctrina *Liceti*, id impossibile pronuntiabit, vel isti sunt differentes sanguines simul confundi, vel ex istis confusis varium sanguinem formari concipiet, & affirmabit. Opera naturæ sunt regularia, & bene ordinata, vno ad vnum vitur, nec agit operationes suas instar Delphici gladij.

Accedo nunc ad examen traductionis sanguinis à dextro ventriculo in sinistrum, vt fiat vitalis, arteriosus: Elaboratus & perfectè coctus in cordis ventriculo dextro, copiosè & velociter expellitur in venam coronariam, vt ventriculo sinistro materiam suppediet sanguini arterioso consiciendo: at non potest exire ventriculo dextro, nisi in systole, laxatis & apertis valvulis Venæ cauz, quod est contra naturam. Deinde coronaria non potest haurire sanguinem ex alveo ventriculi dextri, quia ex *Galenno* & relatione omnium Anatomicorum, ipsaque *anatomia*, coronaria vena nascitur ab ipso trunco venæ cauz, supra scissuram, huc apertionem venæ cauz cordi adaptatam: ideoque, si sanguis præparatus in dextro ventriculo, corde egressus, non potest non permisceritalteri vicino stanti ad portas cordis vt ingreditur, non potest sincerus tradi coronariæ venæ, atque illa vena tenuis est, per exilissimos ramos perperat superficiem cordis, nec penetrat sinistrum potius, quàm dextrum ventriculum. Quod si sanguinem instillaret ventriculo sinistro, paucus esset, isque ci choroides, propter tenuitatem venæ, & eius ramos exilissimos: At copiosus debet esse affluxus & continuus sanguinis, ad confectionem arteriosi per vniuersum corpus distribuendi. Adde quod huic celcri & copiosæ traductioni sanguinis per venam coronariam obstat *Valvula*, quæ sanguinis paucissimi per eam fluens appulsus moderatur, quam ignorauit *Licetus*, vel subtrixit. Hæc ab omnibus Anatomicis obseruata & descripta, impedit, ne affatim irruat sanguis ex continua agitatione cordis, & pariat ecchymosim, vel ruptionem in vena, quæ destinata est nutriendo cordi, vel potiùs gignendo & conferuando adipi circumfulo: Ideoque vena coronaria depromit sanguinem suum crassum ex vena caua, priusquam cordi adapcriatur.

Vt suam opinionem *Gl. Licetus* confirmet de traductione sanguinis à dextro ventriculo in sinistrum per venam coronariam, adducit auctoritatem *Vesalii*, lib. 3. cap. 7. cum agit de vena caua ascendente, quæ iuxta cor amplo foramine, seu scissione tam ampla adaperitur ( vt aptetur & coniungatur foramini dextri ventriculi ) quanta ex vena caua partis sub corde consistentis, & eius quæ mox supra cor habetur amplitudinibus in vnum circulum deductis conflueret. Voluit *Vesalius* declarare venam cauam prope cor, tam supernè quàm infernè vastissimam & amplissimam esse, & tamen ipsam scissuram amplam venæ cauz, iuxta cor in circulum contrahi, qui aptatur foramini, siue apertioni ventriculi dextri. Istam amplitudinem trunco venæ cauz, & scissuram amplam Vesalicam coronariæ venæ imperitè tribuit *Licetus*, & passim id repetit pag. 16. vt demonstret magnam sanguinis portionem à dextro cordis ventriculo, in sinistrum deriuari, quod non fuit ab omnibus Anatomicis animaduersum. Vt autem textus *Vesalii* suæ opinioni quadraret & conueniret, ipsum dolosè falsauit. Nam *Vesalius*, cum agit de vena coronaria, sic loquitur, *frequentiores venæ sinistri lateris Cordis, & vbi sinuum ipsius septum consistit, ipsas cernimus: Licetus* scripsit, *vbi sinum ipsius septum*. Magnum discrimen inter duas scripturas agnosceat, qui peritus fuerit Anatomicus. Nam vena coronaria sparsa per partes exteriores cordis, vbi consistit septum, euidentiores & maiores ramos producit: At *Licetus* inteligit sanguinem intra sinuum septum, id est, conclusum effundi, quod est falsum, ipso met confitente pag. 15. perforatum est septum cordis ad penetrationem alimentarij sanguinis ad partes interiores, ad quas non pertinget vena coronaria, quæ reliquam cordis substantiā nutrit potiùs quàm septum. At immemore eorum quæ scripsit pag. 16. agnoscit venam coronariam multam portionem tenuioris sanguinis per plurimos sui ramos, ad sinistrum cordis ventriculum terminantes, ampla scissione Vesalica in

eum egerit, nec aliter dicendum est de geminata coronaria arteria, quæ multum spiritum in dextrum ventriculum Cordis à sinistro refundit.

Præterea, si sanguis ingrediatur sinistrum ventriculum, per effectum dignæ molis coronariam venam, amplamve scissuram Vescalicam, ut ipse *Lucretius* sæpius inculcat: sanguis ingredietur Cordis sinum sinistrum per alia vasa, quam illa quatuor commemorata: quis hoc vnquam dixit præter *Lucretium*? si destillat sanguis per substantiam Cordis in ventriculum sinistrum crassiores & duriores dextro, non potest nisi ferossus tenuissimus, & paucus influere, quomodo potest esse iugis hic fluxus sanguinis in læuo Cordis sinu ad generationem spirituum vitalium, & animalium, qui magna copia suppeditari debent vniuerso corpori.

Considerate quæso aliud absurdum, si sanguis per venam cauam aduectus ingreditur dextrum Cordis ventriculum, id fit in diastole, reicitur ex *Cl. Lucretio*, in systole in eandem cauam, ut distribuatur in vniuersum corpus, at expulsus sanguinis in systole, est violenta, rapida, impetuosa, ut sanguis arteriosus in distantissimas partes feratur, ex doctrina Anatomicorum similiter debet promoueri sanguis iste venosus, si à Corderemigret in cauam in systole, ergo sanguis proximus Cordi præ foribus adstans, ab exeunte propulsabitur: quomodo duo sanguines contrarij, siue oppositi, vnus ascendens ad Cor, alter descendens, possunt intra idem vas consistere, & meare in contrarias partes, sine permissione vnus sanguinis cum altero, perfecti cum imperfecto, siue semicocto, quis vnquam Philosophorum, Medicorum, Anatomicorum dixit, sanguinem è vena caua fluentem in Cor, per eandem viam redire in cauam, sine impedimento valvularum tricuspidum? Nonne est perturbare totum ordinem naturæ, & euertere vsum valvularum tricuspidum, quæ rumeant sanguini obstitunt, & impediunt refluxum in cauam? Sed video *Cl. Lucretium* nouam Anatomiam meditari & condere: nam valvulas tribuit orificio caux non tricuspidales, sed Sigmoides, pag. 50. 615. repetit.

Vt demonstret reuersum motum sanguinis ex omnibus corporis partibus ad Cor, scribit sanguis venosus & arteriosus per venas & arterias effusi in omnes corporis partes, post nutritionem superesse aliquam portionem instar cambij, quæ cum sero sanguinis vehiculo, testuit è capillaribus venis & arterijs in maiora vasa sui generis, & ascendere, siue remeare ad Cor, ut superflua & superabundans hæc portio semini procreando destinata, referens id eam omnium partium, in Corde nouam facultatem acquirat, dein delabitur in eadem sua vasa quælibet portio sanguinis venosi & arteriosi ad testes, ut inferuiat semini concipiendo, serum verò suo defunctum officio, tunc in excursu suo labitur ad renes, ut in urinam vertatur. Nolo disputare de generatione feminis, an sit deciduum à toto, an ratione materiz, vel spirituum, per quas vias isthæ substantia deferatur, quia video *Aristotelem*, libro secundo de generatione animalium, ea dèrè disseruisse: sed non possum percipere, quomodo portio cambij superflua, ex omni particula corporis reuulsa, deducatur, ad Cor illibata, incorrupta per suum vnaquæque vas, ut ibi nouos spiritus, & calorem æquirat, fiatque magis apta procreationi, ad generandum semen in testibus, quomodo aliquam iacturam, vel dispendium spirituum in excursu suo non patitur? Priusquam perueniat ad testes, debet influere in vasa spermatica viri vel mulieris: At illa vasa non alium sanguinem continent, quàm communem & alimentarium, & in progressu suo ramulos vicinis partibus impertiunt. Scire cuperem, an iste sanguis differat à Menstruo, vbi conineatur in muliere, si caueat vero semine, ex *Aristotele*. An effuat singulis mensibus cum menstrua purgatione, vel fluore rubro? Hæc omnia fortasse licebit *Lucretio* fingere & scribere, sed nemo sensu & ratione probare poterit. Nec peritus Anatomicus vnquam admittet: Quomodo serum sanguinis venosi & arteriosi, itque reductiui toties in ascensu & descensu sanguinis reuoluti per truncum venosæ caux iuxta renes, sine raptu & attractione, quia emulgendero sero dicati sunt renes.

Si ex *Cl. Lucretio* in Cordis ventriculis idem est temperamentum, eadem substantia, & similis structura, in numero vasorum, materiz exceptione & expulsionem, ergo consimilem facultatem habebunt ventriculi Cordis, & æquæ vitalis, siue arteriosus erit sanguis, qui perficitur in dextro ventriculo, ac is qui in sinistro elaboratur. Sed ex *Galeno*, & inspectione Cordis deprehenditur, dissimilem esse substantiam, temperiem, ventriculorum Cordis, atque conformationem. Nam ventriculi dextri substantia tenuior, sinistri duplo crassior, capacitas dextri amplior, temperies calida

fortior in sinistro, quàm in dextro, ex *Galeo*, conformatio planè diuersa. Nam vasa in dextro sunt venosa, in sinistro arteriosa, vasa differentes habent valvulas, quin etiam materia, quæ intra vasa recipitur est diuersa: In venis est sanguis crassior, in arteriis subtilior & spirituosior: ær ingreditur ventericulum sinistrum, non autem dextrum.

Colophonem imponet huic examini validissima & verissima hæc ratio. *Clarissimus Licetus* Peripateticæ Philosophiæ Professor contendit Cor, sanguinem in Hepate præparatum perficere, ex *Aristotelis* doctrina, appulsu suo motum Cordis excitare & conseruare non potest inficiari. Inde infero, si alimentum vno pastu assumptum excoquitur intra viginti quatuor horas, & homo per quatuor dies, vt olim fieri solebat in curationibus morborum, priuatur alimento, & vltra septem dies, Cor ex succum, sanguinis affluxu destitutum occumbet & emorietur, quia carebit sanguine ad humectationem, pulsus excitationem, eiusque actionis continuatæ conseruationem. Forfan dicit *Licetus* superfluum partem Cambij semini procreando destinatam, ad Cor redituram. Sed respondeo, nullam fore defectu sanguinis ad partes nutriendas appellentis, & si quæ superesset, partes omnes famelicæ retinerent ad suam nutritionem: At per *Harucianam*, & nostram sanguinis circulationem, etiam in longioribus inædiis, Cor nunquam carebit sanguine, ad sui motus continuationem, quia perpetuo sanguinis redit labor actus in orbem.

Cæterum, ex *Aristotele*, lib. de somno, cap. 4. putat *Licetus* istam circulationem depictam fuisse, vel potius adumbratam, dum scribit ex evaporatione humidæ alimentis supernè sublata excitari somnum, si multa fuerit, aquescentis relabatur instar Euripi, quod tantum distat à circulatione sanguinis, quantum rheuma serosum differt à sanguine. Clarius ex *Hippocrate*, libro secundo de morbis, iste Euripus probatur, cùm agit de generatione pituitæ. Pituita de capite descendit, eaque ex corpore trahit, trahit autem, vbi fuerit calefactum, percalescit à cibis, & Sole, & frigore, & laboribus, ac febrili calore, quum verò calefactum fuerit, tenuissimum ex corpore trahit ad se ipsum: Vbi verò traxerit rursus, id ad corpus descendit. Nunc finem non facio breui-tatis causa, non deseripsi textus *Cl. Liceti*, sufficere indicasse paginas, brevis esse laboro, ne longiore sermone, & repetitione lectori fastidium adferam, recollit *Crambe* mens est, idcirco multas antilogias, intactas prætermisi.

Dispicendum relinquo *Viris doctissimis Haruco & Vallæ*: Num experimenta & rationes quas producunt ad probandam circulationem sanguinis, faueant magis circulationi sanguinis *Liceti*, vt ipse affirmat.

## QVOD SIT IMPOSSIBILIS SANGVINIS Totius Circulatio, & sæpius in die repetita, & in medendo planè perniciofa.

### CAPVT XIV.

**I**DELTÆR expositis variis Philosophorum & Medicorum iudiciis, de circulatione Totius sanguinis per Cor & pulmones, ex doctrina *Haruci & Vallæ*: Nunc illius incommoditatem & impossibilitatem, atque *Galenicæ*, siue nostræ Medicinæ destructionem paucis ostendam.

Quantum sit incommoda *Circulatio Totius sanguinis* sic demonstro. Si sanguis Totus esset in perpetuo circulari motu velocissimo, transeundo multoties in die naturali per Cor & pulmones, vtrumque viscus ex violentis motibus corporis incallescens, affatim & copiosè sanguinem attrahens, suffocatum iret, & quemadmodum spiritus vini, quod sæpius circulator, eò ardentior & spirituosior euadit, similiter sanguis multoties violenter circulatus, igneam naturam & inflammabilem adpisceretur. Videmus rotas curtum ex continua & celeri agitatione ignescere: similiter aquam sæpius violenter agitaram calefieri, spumare. Idem de sanguine sæpius per Cor rapidè circulator cogitandum. Aqua, quæ ter vel quater ebullit, corrumpitur.



Si *totus sanguis* esset in perpetuo motu circulari, nutritio partium haud commodè perficeretur, si intra vnam vel alteram horam, bisterve sanguis omnium partium corporis circuletur, quia si esset in perpetuo fluxu & refluxu, alimentum proximè nutriens ipsis partibus præriperetur.

Si sanguis venæ portæ in iecur assidue rediret, vt ad cauam perueniat, permisceretur materię chylozæ & cœnosæ, (nondum in Hepate secretus excrementis) quam aduehant venæ lacteæ, vel melaïcæ: Nec facilis & expeditus esset excursus sanguinis ab Hepate in cauam, ob remota quam haberet in ipso Hepate, ratione differentis materię, & transcolationis, siue traductionis per radices exilissimas poræ in radices cauz, ac proinde vix semel intra duodecim horas circulari possit totus sanguis aluine regionis, id est portæ, multò minus vniuersi corporis: Ac proinde sanguis impurus, neque defæcatus in Hepate, tradcretur Cordi ad conficiendum sanguinem arteriosum.

Deinde, si tota massa sanguinis vitia foret, & penitus corrupta, talis sanguis saniosus, ac tabificus per Cor & pulmones sæpius transeundo, haud dubiè labefacteret, non tantùm Cordis, sed etiam pulmonum substantiam.

Addo, sanguis ille ex partibus interdum corruptis & sphacelatis, aut venenatis, superne secum adduceret corruptelam, aut inquinamentum pulmonibus, nec tandiu in corpore delitesceret venenatus humor, antequam suum maleficium prodatur & exerat.

Impossibilitas *totius sanguinis sapius in die circulandi*, patet ex remota & interceptione, quam habet in internis & externis corporis partibus, dum ab arteriis in venas traditur, translocationis vel transcolationis modo. Nam interceptur eius velocis excursus transeundo per lienem, per Hepar, per pulmones, per Cerebrum, vbi exilissimæ sunt vasorum anastomoses, & admodum tarda transuasio, ideoque vix sanguinis libræ duodecim, aut quæ secum in die possunt circulari.

In Hepate anastomoses radicum venæ portæ cum caua, aut nullæ, aut exiguæ, ideoque sanguis venæ portæ lente admodum transcolatur. Nec rapitur in cauam, aut aortam, nisi in summis inediis, aut magnis depletionibus cauz.

Nec enim sanguinem arteriosum, qui coniunctur intra ventrem inferiorem circulari facile innotescit, ex pullis arteriæ cœliacæ, in hypochondriacis affectibus violento, dum feriunt & ætuant viscera nutritiâ. Cùm tamen reliquarum arteriarum corporis ipsiusque Cordis pulsus, æqualis, & naturalis appareat absque vlla mutatione.

Antiqua medendi ratio fundius eueritur per circulationem *totius sanguinis* sæpius in die naturali iteratam, quæ nulla poterit fieri in partibus corporis, tam internis, quàm externis secretio puri ab impuro, vt videre est in dolio vini assidue agitato, vbi sæx cum liquore puro confunditur, ideoque cacochymia sanguinis nequam perficere defæcabitur: Neque coctio humoris moribifici perficietur, cùm opus sit quiete: ac continuo fluxu & refluxu sanguinis agitantur, simulque noua materia cum priore confundetur.

Localis constitutio febrium primæ & secundæ regionis, id est, febrium intermittentium & continuarum à recentioribus assignatâ, planè corrui.

Deinde fibrillæ materiæ sic confusa suam idiotropiam non seruabit, vt bilis tertio, humor melancholicus quarto die, pituita quotidie moueatur, iuxta cuiusque humoris proprietatem, sed inordinatè & quotidie, semel vel bis, pro fluxu & refluxu sanguinis in parte affecta redibit paroxysmus.

Neque Crises statutis & conuictis temporibus absolui poterunt, propter istam *totius sanguinis reuolutionem*.

Quomodo medicamentum poterit expurgare sordes massæ sanguinæ, si per venas & arterias tota diffusa fuerit, ac in rapido & perpetuo circulari motu?

Quomodo natura per sudores expelleret cœnosos humores, si *totus sanguis* assidue mouetur circulariter, & recurrit ad centrum corporis.

Frustra reformidatur *diarrhoea*, morborum causa præcipua, & ad dissipationem sanguis detrahitur, si sit in perpetuo motu circulari *totus sanguis*.

Neque putrefcet in putridis malignis & pestilentibus, continenter agitatus ac diffusus.

Denique reuulsionis & deriuationis fundamentum destruitur, si *sanguis totus* est

in continuo & velocissimo fluxu & refluxu per vniuersum corpus : Nec referet vtrum ex latere partis affectæ, vel oppositæ sanguis educatur, cum nihil ex parte laborante vacuerit, ob circulationem *totius sanguinis*, quia quantum detraxeris tantumdem ad eundem locum redibit, nisi copiosa fuerit sanguinis detractio, quæ periculosa est.

Nec venæ sectio à centro ad circumferentiam reuocabit : si *sanguis totus* ad centrum suum, nempe Cor assidue recurrit vndique ex omni parte.

Nec cucurbitulæ scarificatæ sanguinem foris euocabunt, si continuo refliat ad centrum corporis, videlicet Cordis penetralia ?

Miror, cur in varicibus tibiarum & femorum sanguis non minuatur, per istum sanguinis arteriosi & venosi excursum, & cur obstructions viscerum contumaces non resoluantur, ab isto sanguine arterioso quoquoersum penetrante, permeante, atque redeunte.

Cur non impeditur menstruorum profluuium, quando circa locos muliebres congeritur sanguis ad excretionem consuetam ?

Cur non distrahitur & præripitur sanguis, qui ad mammas in nutricibus ad lactis generationem deferitur, si *totus sanguis* ad centrum suum recurrit ?

Quomodo fiunt tumores in partibus per fluxionem & congestionem, si *totus sanguis* perpetuo mouetur circulariter ?

Quomodo humores per venas seorsim delabuntur ad partes, ibique adhærent, si *totus sanguis* in omnibus corporis partibus motu circulari rapidissimo continenter agitur ?

Quomodo fiunt metastases, metaptofes humorum ab vna parte in aliam, ab Hepate ad Lienem, & è conuerso, ab infernis partibus ad Cerebrum, ad pulmones, si *totus sanguis* est in perpetuo motu circulari versus Cor, ac proinde inflammatio systrophica nulla esse poterit, si *totus sanguis* redeat ad Cor quadragies in die naturali circularus, ex opinione *Pallai*.

In Cerebro spiritus animalis non distingueretur à vitali, propter illius recursum ad Cor. Idem de spiritu naturali dicere possum, si sanguis venæ portæ remigraret ad Cor.

At per nostram sanguinis circularionem partes principes tres separantur. Vnaqueque suo officio fungitur absque vlla confusione substatiarum, functionum, aut facultatum, atque omnes quas proposui difficultates evitantur. Tres partes principes corporis habere suum sanguinem peculiarem, suos spiritus, suos canales, sua emissaria, quibus sese exonerant, & partes sibi subiectas atq. famulantes, sic clarè demonstratur.

Iecur habet sanguinem proprium quo se alit, & partes subditas, canalem venæ portæ, & spiritum naturalem proprium, emissaria, quibus expurgatur per aluum, hæmorrhoidas, partes sibi famulantes, Lienem, cystim fellis, ventriculum, inrestina.

Cor sanguinem vitalem arteriosum procreat cum spiritu vitali, canales habet venam cauam & aortam, per quos fit circulatio sanguinis, sua emissaria, os, renes, in mulieribus vterum, hæmorrhoidas externas, partes verò famulantes sunt, Pulmones & Diaphragma.

Cerebrum purissimum arteriosum sanguinem admittit, qui sursum euolat, suum habet spiritum animale, suos canales nervos, emissaria, Os, Nares, Palatum, siue foramina Ossis Sphenoidis, atque hæc constituunt tertiam regionem, habitum corporis cum extremis artubus, quos reuoco ad secundam regionem, quia aluntur & alluuntur à propaginibus maiorum canalium, quamuis nervos à Cerebro admittant. In prima regione nulla fit circulatio sanguinis. In secunda regione vera perficitur. In tertia regione Cerebri circulatio quidem reperitur, sed longè tardior, quàm in secunda.

Interea considerabis venam portam non oriri à Corde, ac proinde non habere sanguinem consimilem cauz.

OPINIO RIOLANI,

DE CIRCULATIONE SANGVINIS.

CAPVT XV.



**A**LII est mea de circulatione sanguinis sententia. Cor in perpetuo motu versatur, à vitæ primordiis vique ad vltimum spiritum, in duas cauitates discretum, quæ sanguinem continent, ab vna cauitate in alteram assidue fluentem. Sanguinem illum necessariò Cor directè assumit, vel ab Hepate ex alimento, vel à trunco Cauæ dum tecurrit, quia Cor non potest suum motum continuare, neque arteriosum sanguinem fabricare, si ne appulsu sanguinis venosi. In vnaquaque diastole aliquid assumit, in systole expellit. Hæc omnia sunt adeo vera, vt nemo sapiens dubitare queat.

Sed tora difficultas in eo versatur, vtrum *totus sanguis* elaboratus in Hepate debeat ad Cor ire, ipsumque permeare, postea deducendus in arterias, vt nutriet & viuificet, ex opinione *Aristotelis, Auerrhois, aliorumque recentiorum?*

Hoc concessio, vel solæ arteriæ continent sanguinem alimentarium, & omnibus partibus suppeditant, vel in venas ab arteriis debet effundi ad nutritionem, alioquin omnes venæ forent inutiles & vacuæ: at hoc est falsum. Ergo venæ cum arteriis per anastomosim communicantes, accipiunt & distribuunt in progressu suo, istum sanguinem à Corde per arterias magantem. Cum autem sanguinis quotidie fiat depeditio magna, per nutritionem vniuersi corporis, per expirationem, per insensibilem transpirationem, per lotij & stercoreis reiectionem, per excrementorum Cerebri, & pulmonum expurgationem, remanere potest in corpore sano ac bene valente, probeque nutritio sanguinis copia, ad duodecim vel quindecim libras circiter, & si credimus *Auerenna*, ad viginti quatuor libras. Si quantitas alimenti assumpti quotidie non sufficiat, ad reparandum sanguinem pari quantitate intra venas, non dico pro nutritio corporis, sed ad sanguinem tribuendum Cordi, pro continuatione motus, necessum est eum qui continetur in venis & arteriis, redire ad Cor: at ex pulsationibus Cordis bis mille factis in vna hora, certò scimus non sufficere istam quantitatem sanguinis ad quindecim libras pro motu Cordis continuando: oportet igitur eundem sanguinem per circulationem ad Cor redire, vt suppeditet illi materiam ad suas actiones obeundas. Atque hoc est præcipuum fundamentum circulationis sanguinis. *Aristoteles*, & qui sequuntur eius opinionem de sanguificatione in Corde, fatentur quidem motus eius fieri continuo appulsu sanguinis, sed nihil dicunt de recurso ad Cor.

Cum igitur animaduertem Cor indefinenter moueri, istum motum non posse continuari sine sanguine qui foueat motum, simulque materiam suppeditet conficiendo sanguinem arterioso: iudicaui materiam illam, vel ab Hepate, vel à trunco Cauæ de promi. Quod sic probo, suppositis venis lacteis chyloferis. Hepar præparat sanguinem Cordi, vel cum intra se perficit. Magna istius sanguinis portio labitur in venam portam, distribuenda in omnes partes primæ regionis. Altera portio maior ad Cor transmittitur per truncum venæ cauæ, alteri sanguini permiscenda. Inde duplicem sanguinem constituo, venosum simpliciter in vena porta conclusum: Alterum mixtum in vena Caua: Vterque separatus est, nec habet communicationem nisi intra Hepar, vel resurgente sanguine portæ in Cauam. Vtriusque sanguinis cum magna quotidie fiat depeditio per nutritionem vniuersi corporis, per expirationem, insensibilem transpirationem, lotij & sæcum excretionem, excrementorum Cerebri & pulmonum expurgationem, restat in corpore sanguinis copia exigua, quamuis alimenti quantitas satis lauta & ampla fuerit. Itaque cum in singulis pulsationibus Cor admittat vnam aut alteram guttam sanguinis, & in hora edat circiter bis mille pulsationes intra quindecim vel sedecim horas, plusquam sanguinis libræ viginti hauriuntur à Corde, etiam transeundo per medium septum Cordis foraminulentum. At cum solum sanguinem venæ cauæ Cor rapiat, & illa vena dimidiam can-

tum portionem sanguinis cum aortæ trunco obtineat: altera restitibi in vena porta, & in omnibus canalibus minoribus vcnarum & arteriarum ad nutritionem, certum est sanguinem duntaxat circulari, qui maioribus canalibus Venæ Cauæ & Aortæ concludetur, à iugulo ad extremos artus directè porrectis, sine vlla interruptione, & impedimento viarum ambigioso. Venæ portæ sanguis non circulator, nec sanguis Cerebri nisi tardè, quia non habent liberum commercium & refluxum, neque sanguis minorum canalium venæ Cauæ refluit in vasa maiora Cauæ & Aortæ, quia retinetur à partibus ad nutritionem.

Cæterùm sanguis naturaliter non appetit sponte, propterea impetu recursum ad Cor, vt recalescat & recoquatur: sed partim trahitur à Corde ob consequentem vacuum sanguinis, propter motum assiduum, & calorem Cordis, partim etiam impellitur in extremos artus, dum per violentam systolem, quæ fit in extremis arteriis æqualiter, ac iuxta Cor, eodem instanti transfunditur in venas proximas contiguas, & per anastomosim iunctas, sicque sanguis sensim, & sine sensu continuo ductu & pulsu propellitur ad Cor, vt vnda impellitur vnda.

Transusationem illam manifestè demonstrat euacuatio dolij pleni vino, in vas vicinum & vacuum, interuentu siphonis coniaci, cuius extremitas inditur in vas plenum, & per alteram extremitatem vno suctu otis educitur & attrahitur vinum, atque ita totum dolium vino repletum exinanitur. Hoc modo defæcantur Vina Rhe-nensia, quæ diutius seruantur quo defæcatiora sunt.

Si quis auct seire meam opinionem de translatione chyli & sanguinis in prima, siue aliua regione corporis, paucis explicabo. Quamuis Deus finxerit, ac destinauerit hominem ad virtutem, ei tamen liberum indulsit arbitrium, vt quam vellet sequeretur viam, aut virtutis, aut vitij: Cùm verò animaduertetet, ac præciperet eius propensionem in vitium, remedia dedit, quibus hoc præcauere posset, vel emendare.

At in nullum magis est pronum genus humanum more belluarum, quàm in voracitatem & ingluuiem, quæ patens & nutrix est infinitorum malorum, quibus vt prospiceret Deus, mirabili artificio construxit partes nutritioni dicatas, ac potissimum Hepar, præ cæteris partibus obnoxium obstructionibus: Ideoque duplicem canalem vehentem chylum ad Hepar fabricauit, vt vno obstructo, alter suppleret officium. Admitto quidem venas lacteas chyloferas, vt *Aeslium* proposuit, sed earum continuationem ad Hepar cum trunco, vel canales manifestos, si demonstrasset, aut inuenirentur, certiores essemus de illa translatione chyli. Propterea non adimo venis mesaraicis eundem vsum deferendi chylum ad Hepar, quando venæ lacteæ sunt obstructæ, ne cessaret in Hepate sanguificationis actio necessaria ad vitam. Quod si fuerit Hepar ita obstructum, vt nequeat ipsum subire chylus, vel refluxus in intestina, vel eius portionem suget, trahetque Lien per venam splenicam, quæ sita paulò infra jecur, non tam est propago trunci venæ portæ, quàm eius bifurcatio iuxta Hepar, vt si aditus ad Hepar fuerit interclusus, refluxus portio chyli ad Lienem: Interdum enim fungitur officio Hepatis, vt multoties obseruatum fuit. At cùm venæ mesaraicæ vehicula sunt chyli ad Hepar, tum arteriæ mesaraicæ nutriculae sunt intestinorum: ac sanè tam numerosa fructificatio vasorum per mesenterium ad intestina membranosa descendunt, eo fine fabricata fuit, quem proposui, non autem ad solam nutritionem intestinorum, quæ panco sanguine indigent: atque *canalis à Vinsungo, peritissimo Anatomico Patuino* repertus, per Pancreas deductus, atque perforans intestinum duodenum iuxta pylorum, manifestè demonstrat illam translationem, & translationem chyli ad Lienem per medium Pancreas, atque per eundem canalem impuritates Lienis & Pancreatis interdum expurgantur in intestina, quando in his locis regurgitant.

NOVA OPINIO DE CIRCULATIONE  
sanguinis.

CAPVT XVI.

**S**I vellem adhærere opinioni *Aristotelis*, de sanguificatione in Corde contra *Galenum*: istam circulationem sanguinis adhuc faciliùs demonstrarem, quàm fecere *Harueus*, eiusque *seſſatores*: atque opera naturæ perfectiùs fieri sine vllis ambagibus viarum, & confusionibus substantiarum, quod sic ostendo.

Suppono totum sanguinem præparatum in Hepate recto tramite ad Cor viam dirigere, quod Peripatetici omnes concedent: Ibi elaborari in sanguinem arteriosum, & suum complementum adipisci. Dein traduci guttatim per septum Cordis, inde deriuari in aortam, eiusque propagines: Vbi peruenit ad extremos artus, remeare in venas, & in ascensu suo etiam suppeditare sanguinem suis propaginibus, quæ comitantur arterias, vt mutua sit vasorum consociatio. In ista distributione sanguinis, constituo canales illos maiores venæ Caur & Aortæ, vasa esse circulandi sanguinem, & distribuendi in omnes partes per suas propagines. Sanguinem verò effusum in illas propagines canalium maiorum, non amplius recurrere in eosdem canales maiores, sed absumi in nutritionem partium vniuersi corporis. Constituo quoque primæ regionis sanguinē totum esse arteriosum, nec redire ad Hepar, vt perueniat ad Cor, sed absumi ad nutritionem illarum partium, venas portæ deducere chylum ad Hepar ad confectionem sanguinis. Sanguis autem arteriosus à trunco Aortæ per arteriam insignem Splenicam defertur ad Lienem. Splenica subsequenter habet arteriam Coliacam, quæ in reliquas partes abdominis sanguinem suum distribuit.

Videtis sine vlla confusione substantiarum, venam portam deportare solum chylum ad Hepar, reiectis venis lacteis exilibus, nec satis cognitis & sufficientibus ad chylum deuehendum. Quod autem sanguis primæ regionis, siue venosus, siue arteriosus non circuletur, sic manifestè demonstro. In affectibus hypochondriacis, dum æſtuant viscera nutritia, appressa manu, percipitur insignis palpitatio in ventre inferiore, quamuis nulla mutatio in pulsu arteriæ ad carpum, neque in motu Cordis ad pectus obseruetur. Quod indicio est, separatam esse istum sanguinem à maioribus canalibus, nec habere communionem. Per istam translationem sanguinis arteriosi ad Lienem, & distributionem per arteriam Splenicam peculiarem agnoscere licet, Lienem esse emunctorium Hepatis, & Cordis, atque pari intervallo ab illis partibus distare, habere arteriam æqualem amplitudine venæ splenicæ, illamque flexuosam deduci ad Lienem, iuxta septum transversum.

NOVÆ CIRCULATIONIS ACCVRATIO  
explicatio.

CAPVT XVII.

**S**PEREST ostendere circulandi sanguinis *Metas*, siue *Terminos*, *Medium progressionis*, *Materiam*, & *Utilitatem*. Terminos circulandi sanguinis constituo à iugulo ad extremos artus manuum & pedum. Iter istud directum est, sine vllis diueticulis & ambagibus viarum: sanguis à Corde decurrit in artus, per truncum Aortæ vsque ad extremos artus, vbi ad hæc loca peruenit transfusus in venas, à pedibus ascendit ad Cor, sine transiitione per Hepar, quia vena caua subius Hepar perreptans, ramum multo minorem trunco, impertit Hepati, vel ad Hepar transmittit, per quem Cor sanguinem haurit ab Hepate.

Similiter sanguis è manibus recurrit ad Cor, ideoque ascensus perpetuus sanguinis ad Cor, intelligendus de illius accessu. Sanguis à iugulo ad caput ascendit, sed non recurrit motu pari & perpetuo, quemadmodum ille, qui maioribus canalibus Cauæ & Aortæ continetur, quoniam istius sanguinis recursus ab arteriis in venas, liberâ & rectâ viâ intra Cerebrum non satis innotescit. Venæ Portæ sanguis non potest refluxu, quia ab Hepate in propagines Portæ effunditur sine reuersione ad Cor. Propterea sanguis portæ, & eius ramorum est planè difcretus ab illo vasorum maiorum Cauæ & Aortæ. Minorum vasorum sanguis, etiam si detruetur ab istis canalibus maioribus, non tamen circulatur, quia partes tantum sanguinis attrahunt, quantum indigent: semel attractum non sinunt elabi, sed retinent & conseruant ad nutritionem. Quare is dumtaxat circulator sanguis, qui in istis canalibus maioribus iam commemoratis coërcetur.

Istis terminis positis, medium progressionis facillè intelligitur, quod est longitudo maiorum canalium Cauæ & Aortæ, à Corde vsque ad extremos artus, & Cerebrum. Sed à Corde per arterias rectissima & patentissima est via, ideoque excursus spirituum est celestissimus. Irradiatio fit in instanti quocunque uersum instat venti subtilissimi, aut solaris irradiationis, tam in ascensu, quàm in descensu.

Materia quæ reuoluitur per istos canales, sanguis est venosus & arteriosus. Venosus ascendens assidue suppeditatur ab Hepate, isque purissimus: reliqui excrementitij, retinentur in prima regione venæ portæ: directe ad Cor deductus, ventriculo dextro exceptus in diastole, traducitur per medium septum in sinistrum ventriculum, ubi arteriosus euadit, tumque reiiicitur & refunditur in arterias per systolem Cordis. Inde ad extremos artus delatus, refluxit in venas, sicque perenni circuitu, sanguis Cordis recessus perlabitur, itque reditque viam tories.

Certum est, ac indubitatum, arteriosum sanguinem facultatem viuificandi, etiam nutriendi vim habere, ideoque sanguis ille primus à Corde defluens & emanans, nempe arteriosus, fugacem vitalitatem partium, id est, spirituum iacturam assidue teparat: & humidum primigenium corpori coextensum, quamuis radicaliter affixum & innatum Cordi, atque omnibus partibus participatione insitum, perpetuo transitu instaurat: atque ubi peruenit ad extremos artus, per arterias transilit in venas, quæ cum sint diuise in tot ramos, quot sunt arteriæ, deducit istum sanguinem paulò crassorem ex diminutione spirituum, ad nutritionem solidarum partium secundæ regionis, quæ puriore sanguine, quàm partes primæ regionis nutriri debebant: Perinde enim natura, vt patet familias prudens nihil omittere solet, ex quo facere aliquid commodi posset: dispensatur autem in cura rei familiaris, itaut cibis optimus detur liberis, deterior seruis. Similiter in corpore humano, vt generationis, sic nutritionis diuersa est materia, inquit *Aristoteles, libro secundo de generatione animalium*: Ideoque non absurdè proposui diuerso sanguine partes aliuinæ regionis culinarias nutriri, alio partes secundæ regionis. Adde quod vasis differentibus duplex iste sanguis continetur: nec habet cum altero communionem facilem & liberam per circulationem sanguinis, quia intra Hepar radices venæ portæ cum radicibus cauæ, per exilissimos ramos, eosque paucos inter se communicant: quod factum magnâ naturæ prouidentia, ne sordes culinæ resfluxerent in venas cauæ, totamque sanguinis massam inficerent, partesque nobiles, quod dum accidit, hominem ægrotare contingit.

## VTILITAS CIRCVLATIONIS DECLARATVR.

### CAPVT XVIII.



VTILITATEM circuli sanguinis duplicem facio, *Physicam & Medicam*. Dum assidue considero, vt *Physicus*, utilitatem circuli sanguinis, inuenio necessariam fuisse ad fouendum & conseruandum calorem natium Cordis, aliarumque partium corporis vniuersi, non potest conseruari calor sine motu; Ergo Cor debuit moueri: sed motum suum nõ potest diu conseruare sine appulsu matetæ calidæ spirituosæ, qualis est

sanguis. Appellatur autem ad Cor per cauz truncum, & exceptus, vel potiùs attractus in cauitatem dextram Cordis, per medium septum labitur in sinistram cauitatem, vbi veritur momento in sanguinem arteriosum, calidiorem; spirituosiotem venoso, quia in ventriculis Cordis tanquam aurum obrisum in postremo fornacis camino depuratur. Inde assidue nocte dieque in vniuersum corpus per arterias distribuitur, ad conseruandum calorem aliarum partium, & nutritionem.

Per istam circulationem sanguis à putredine vindicatur, nisi aliunde accedat, quia per motum circulatorium diffatur, suisque fuliginibus expurgatur, & si putredine hæreat intra fibras & foueas Cordis, secunda aut tertia admissione sanguinis eluitur, & relicitur. *Iouernius, 2. Decade, Paradoxo 2.* docet humores non putrescere in venis, ergo multò minùs, si circulentur per arterias & venas.

Nec satis est Medico nosse circulationem, nisi sciat ipsam ad vsum artis reuocare, & quas vtilitates adferat ad bene medendum. Itaque cum expendo vt Medicus, vtilitates circulationis infinitæ mihi succurrunt. Sed multò plures deinceps dabit assidue meditata circulatio, & in curationibus morborum diligentius obseruata.

Imprimis Chirurgi ex circulatione sanguinis discunt modos peritè secandi venas, sanguinem facillè & liberè educendi, & citò sistendi. Itaque Chirurgus venam secaturus in pede vel manu, partem fricare debet dursiter supernè deorsum, ad reuellendum sanguinem, moxque arctè fascià partem secundam stringet, vnum aut alterum digitum supra vulnus infingendum. Per arctam ligaturam incipit excursus sanguinis ad superiora, tumque pars infra ligaturam intumescit, non autem pars supra vinculum, quod fieri deberet, si arcta ligatura traheret. Idcirco post iniectum & strictum vinculum vena secanda est, alioqui, si aliquantulum cunctetur in vena indaganda, pars infra ligaturam arctam adeo intumescit, vt venam abscondat, & eripiat tactui. Tum necesse est laxare vinculum, vt sanguine supernè remicante, pars detumescat. Aperià venà, si nimium laxes, vel resoluas vinculum, fluxus sanguinis sistitur, aut pigro lapsu fluat, quia recto tramite supernè recurrit, si digito premas venam infra vulnus, sanguis fluens itidem supprimitur, nec quidquam stillabit ex parte superiore, nisi fricando reuellas. Admota ligatura medioeriter arcta supra vulnus re-dibit fluxus sanguinis, quando paucus est sanguis in parte inferiore brachij laxanda ligatura, vt descendat sanguis liberius ad manum per arterias, mox adstringenda, vt sistatur refluxus ad superiora supra ligaturam.

Si contingat cutaneam venam scindi. vt Chirurgus vitet dedecus, & probum malè sectæ venæ, ex panicata sanguinis fluentis, iniiciet alteram ligaturam infra vulnus sex digitos à priore distantem versus carpum, tum sufficienter exiliet propter arteriarum & venarum communionem inter se in isto spatio, & sanguinis arteriosi descensum ad manum interruptum: ideoque sanguis è cubito detractus vberius fluit, quàm è venis manus, quia vsque ad cubitum venæ & arteriæ communicant inter se per anastomoses.

Vbi nouerit Chirurgus contrario motu sanguinem venarum & arteriarum ferti, appresso digito supra vel infra vulnus pro ratione alterutrius vasis sanguinem sistet in vulneribus, dum alia remedia parantur & administrantur. Cum ligabit arteriam, aut venam vulneratam, in arteria ligabit partem supra vulnus, in vena partem inferiorem, sic enim impetuosa sanguinis profusio vitatur, quæ Chirurgicas operationes interturbat & obscurat.

Opinio *Spigelij* de sectione saluatellæ fuit, quod prodesset & refrigeraret magis quàm in cubito secta vena, propter anastomoses venarum & arteriarum, quæ sunt in manu. Propterea sanguis, qui effluit inter duas ligaturas in brachio, & pede, ex anastomosi profluit, atqui sic calidior est, & maiori cum impetu fluit, & leipothymiam inducit, quâ sectione venæ vitatur *Fallax*, vbi spirituosum fetentemque sanguinem agnoscit.

*Primerosius* contendit infra vulnus infictum venæ, apprimendo digitum, sanguinem non sisti, vt centies id expertus est: Sed hoc falsum conuincit experientia, aut à partibus supernis descendit, vt fieri potest, ex *Hippocrate, Epidemion lib. 2. sect. 3.* deligationes in venarum sectionibus impetum faciunt, fortes verò sanguinem impediunt. Inde vult probare *Primerosius*, sanguinem non fluere, si arcta fuerit ligatura, etiam si pulser arteria, si atctissimè ligetur brachium infra vulnus venæ, fluet adhuc sanguis supra istam ligaturam. Addit, si ligas arctissimè in carpo, ab eo loco vsque ad liga-



turam supra cubitum pars illa intumescet, & si tundatur, sanguis effluet, ergo non venit sanguis à partibus infernis, & qui detrahitur è venis manus, & què conferet, ac venæ cubiti sectio. Sed istæ obiectiones non destruunt ascensum sanguinis ad superiores partes versus Cor, atque fatemur successione vacuati, etiam venâ apertâ sanguinem descendere contra suum motum naturalem.

Chirurgus in fasciatione circa fracturas & vulnera, cognoscet, vbi artius constringendum, vt sanguinis fluxus intercipiatur. Videmus per arttorem fasciationem in femoribus & brachiis partes inferiores intumescere, & si nimium pars adstringatur, propter circulationem interceptam, ex partis infernæ intumescencia, sanguinis motu suppresso, calorem suffocari, indeque gangrænam induci.

Præterea, Chirurgus discit in amputationibus membrorum arterias potissimum ligandas esse, vel ferro candente vtulandas, cùm sanguis venarum facillè sistatur ex recurso ad superiora versus Cor. Cognoscet etiam ex Hippocratis consilio, in vulneribus magnis sanguinem copiosè vacuandum esse fame corpus macerandum, vt minuatur sanguis, modò nulla eius iactura magna facta fuerit. Denique, circulatio sanguinis sæpius expensa & examinata in arte Chirurgicali & Anatomica, multa secreta aliis indicta & ignota patefaciet, vt quisque de ipsa circulatione cogitando experietur.

## QVASNAM UTILITATES MEDICVS percipiat ad bene medendum, ex Circulatione sanguinis?

### CAPVT XIX.

**M**EDICVS præter utilitates iam commemoratas ex circulatione sanguinis, quæ illi cum Chirurgo & Philosopho sunt communes, agnoscit recursum sanguinis ab arteriis in venas, vt ad Cor remigret, necessarium esse, vt sanguinis diffusio, exsudatio, expurgatio, depletio, & refrigeratio perficiantur, cùm ista commoda fieri nequeant per arterias venis sextuplo crassiores, istas autem utilitates medicas, sic apertè demonstro.

Sanguis diffusatur & ventilatur per continuam illam reuolutionem ab arteriis in venas, transeundo per Cor, vt redeat in arterias. Sunt enim venæ, ex Hippocrate, lib. de morbo sacro, spiracula nostri corporis: & lib. 2. Epidem. flatulentiz medetur venæ sectio. Spiracula sunt venæ, quæ exsulant & expirant per teneritudinem membranarum, inutiles, flatulenti spiritus, & humores serosi. Atque ita expurgatur massa sanguinea suis sordibus tenuioribus, simulque refrigeratur sanguis feruidus artiarum per venas transeundo. Siquidem de suo fervore & æstu multum amittit, dum per tenuitatem membranarum calor, & spiritus exhalant, & sæpius in sudores vertuntur.

Circulationis non est contemnenda hæc utilitas, ne partes corporis repentino sanguinis affluxu obruerentur, calorque natiuus suffocaretur defectu spiraculi, depletionis, & refrigerij. Omnis enim anadrome sanguinis, quæ non habet anagogem, periculosa est: at per circulationem sanguinis vitatur istud præceps & funestum periculum. Scio partes oppressas multitudine sanguinis, interdum per alias vias sese exonerare: Cerebrum per nares & os: Pulmones per tracheam arteriam: Hepar per Lienem & ventriculum, aut vterum in mulieribus, sed istæ vacuationes sunt suspectæ, quia violentæ, immoderatæ, & contra naturam.

Circulatio sanguinis nobis indicat modos curandi affectus diffusarum partium, conuenientibus medicamentis, tam alterantibus, quàm vacuantibus, quin etiam alimentis & medicamentis sæpe continuatis, vt viscerum possit ad partes illas remotas peruenire, cum sanguine sæpius reuoluto, qui istis qualitatibus imbutus, tandem agit in partem affectam, & immutat eius prauam qualitatem.

Circulatio sanguinis docet in morbis chronicis, qui corporis habitum obsident, remediis per aliquot septimanas, imò menses iteratis vtendum esse. ad delendas malignas impressiones partibus iniustas, vt vis eorum quotidie cum sanguine deferatur:

in tabescentibus alimentum conuenire medicamentofum, illudque liquidum, quale est lac aſinum magna quantitate epotum, vt eo ſolo cum aliquot ouis, ægri per aliquot ſeptimanas nutrantur, ſic enim rigantur & humectantur omnes corporis partes exareſcentes.

Per circulationem ſanguinis facilius explicabo errores, & cauſas pulſum, intermittens, inæqualis, inordinari, caprizantis, biſſerientis, frequentis, rari, debilis, oppreſſi, parui, magni & euaneſcentis per aliquod tempus, quàm ſi referam ad vapores malignos è viſceribus ad Cor elatos, vel ad phyma aliquod in læuibus arteriis pulmonum conſuſum, vel ad plethoram, aut cacoſchymiam, vel copiam ſeri in pericardio contenti, vel ad animi pathemata, aut ad morbi malignitatem, vel magnitudinem, vel virium oppreſſionem, vel ad imparitatem motricis facultatis, & mouendi corporis, vt decernunt omnes, qui de *arte phyſicæ* ſcripſere. *Galenus libro de pulſibus ad Tyanenſes*, cauſas mutationũ in pulſibus paucis verbis deſcribit à diſſolutione facultatis vitalis, vel eius oppreſſione, diſſoluitur facultas alimenti inopiã, & morborum malignitate, animique affectuum vi, atque vehementia dolorum, vel diuturnitate, vel immodicis vacuationibus. Deprimitur & grauatur materiæ copia, ab inſtrumentorum affectibus, vt inflammationibus, ſcirrhis, tumoribus, abſceſſibus, variisque corruptionibus: itaque ſatiſcens facultas pulſum paruum, languidum & crebrum admodum efficit: depreſſa & grauata vertit in inæqualitatem pulſus, & in ordinem perturbatum, tum vehementiæ, tum magnitudinis. Verùm, ſi curioſè conſideremus ſanguinis ad Cor appellentis, vel introducti qualitatem, quantitatem, conſiſtentiã, ſive ſubſtantiam, ſubito vel tardè in ventriculos recepti, vel traducti per ſeptum, concreſcentis, vel concreſci intra ventriculos, ibi hærentis, vel expulſi, cunctantur per foribus, vel longius eieſti, & poſtea redeunt ad Cor, ſicilius iſtorum pulſuum commemoratorum cauſas internolle licebit. Ab iſſdem cauſis vitia & affectus Cordis contra naturam quamplures dependent, quorum dignotio & curatio faciliior & ſicilior erit ſuppoſita ſanguinis per Cor circulatione.

Cor autem cum ſit pars organica & diſſimilaris, in ipſo conſiderare oportet multas partes etiam diſſimilares, ex quibus conſtat: huiusmodi ſunt vaſa quatuor, auriculæ binæ, ventriculi duo, ſeptum medium, in quibus locis varij humores hætere & concreſcere poſſunt, & conſequenter Cor inſigniter lædere. Præterea, Cor lædi poteſt in parte exteriori ab affectibus pericardij, ſive contrineatur humor ſuperfluus, aut vermes intra ipſius capſulam, ſive propria ipſius Cordis ſubſtantia labores, & afficiatur tumore, vel vlcere, quæ omnia diligenter obſeruata magnam lucem afferunt in cardiacis affectibus, & cauſis mortis repentinæ præuidendis & percurandis, ſi ad ipſum Cor remedia referantur, & applicentur, tam ſumpta, quàm admoda, quæ debent eſſe ſpirituosa calida, vt diſcutiant ac reſoluant iſtos humores illic hærentes vel concretos, augentque ſpiritus Cordis, vt poſſit ſe liberare & expedire ab iſtis impeditis.

Per circulationem ſanguinis februm cauſæ, ſedes, inſultus, ſive inuaſiones facilius explicantur. Certum eſt febrem non ad eſſe, niſi Cor ardeat, ardor iſte à cauſa externis, vel internis accidit, vt plurimum à viſceribus malè affectis procedit, nec aliud eſt quàm *muſcus*, ſeminarium febrile, ſive feruida exhalatio ſiniſtrum Cordis ventriculum ſubiens, torumque Cor calefaciens. Dum enim humor febrem committens in ſuis laribus incipit turgere & æſtuare, vt ſuribundus erumpat, progrediturque ad Cor per arterias, vbi peruenit ad aortam nititur euolare vſque ad iugulum, & ſubire penetralia Cordis, ſed Cor indignatum reſiſtatur, abigitque quantum poteſt malignam iſtam auram, qua afflatur & obſidetur per oppoſitum ſanguinem arterioſum deſcendentem, & ſpiritus vitales contrario motu aliud è ſuentes. Id iſta luſta Cor contrahitur, & pauciſſimum ſanguinem admittit, inde fit pulſus diminutio & contractio, ſive ſyſtole frequentior, & validior ipſa diaſtole: Circumfluus humor febrilis in aorta ſupra & infra Cor extenſus, impedit caloris & ſpiritus circulationem, vel irradiationem, ſimulque ſanguinis effuſionem in extremas partes: inde perſtiteratio. Si per ramulos aortæ, ſerum tenue, acre, mordax exſudet in membranis ſpinalis medullæ, rigores, vel horrores excitantur, tandemque Cor ſatiſcens labori ſuccumbit, hoſtemque ſuum tanquam hoſpitem & inquilinum cogit admittere, vel humor febrilis impetu ſuo Cordis reſceſſus ſubit, penetratque: inde calor natius accenditur in vtroque ventriculo, & intenditur per diaſtolem liberiorem ex

appulſu ſanguinis venoſi feruidioris in tranſitu per Cor excandefacti, qui per arterias in vniuerſum corpus diffunditur, aſſidue & impetuoſe remeans ad Cor, prout materia febrilis è viſceribus emanat copioſior, vel parcior euaporata, vel conſumpta fuerit. Inde febris augetur, prorogatur, aut abbreviatur.

In generatione februm cauſas materiales, & ſedes à *Fernelio* conſtituas agnoſco, ſed vias alias perueniendi ad Cur conſtituo, ſcilicet arterias: nam humor febrilis, qui venæ portæ canalibus continetur, non facile iecur permeare poteſt, propter ambages & flexus viarum, & obſcuras, vel nullas anatoſes radicum venæ portæ & cauæ: dein quod viſcus illud obſtructionibus obnoxium ſit in febris: Adde quod materia febrilis, ſi tranſiret per Hepar, ſecundarium focum caloris natui, prius illud excandefaceret quàm Cor: Symptomata inſultus febrilis, ſeu inuaſionis inferri credunt omnes, à ſero in dorſum & panniculum carnoſum corpus ambientem effuſo: Ego verò àlter explicui: Humoris verò motum refero ad idiotropiam cuiuſque, peræquè obſcuram, ac motum maris. Atque vt in mari, Mediæ terræ non mouetur fluxu & refluxu, ſed dumtaxat Oceanus: ſic in corpore noſtro Microcoſmo, venæ portæ ſanguis non agitur, ſed à viſceribus malè affectis, ſiue ſit Hepar, ſiue Lien, ſiue partes circa pylorum, humor febrilis procedit, fluitque per arterias ad Cor, vbi remoras & repulſas diu patitur, priuſquam arcem Cordis inuadat. Quamdiu durat illud certamen, tamdiu perſeuerant febrilis inuaſionis ſymptomata.

Nunc februm eontinuarum ſedem assignare conuenit. *Fernelius* in ſecunda regione collocat, eamque ſpatio, quod eſt à iugulo uſque ad inguina comprehendit. In hac ſecunda regione continentur Cor, vena caua, aorta, pulmones, partes vrinales & genitales, tam viri quàm mulieris. In canalibus Aortæ & Cauæ contineri putant omnes. Ego verò longius extendo canales, ſcilicet ad extremos artus, vbi ſanguis verſatur in perpetuo motu circulari: ac proinde materia febrilis eo modo reuoluitur cum ſanguine excalefacto. Plura dabunt frequentes de circulatione ſanguinis meditationes.

## QVOD VERA METHODVS MEDENDI

per vena ſectionem, ex circulatione ſanguinis clarius inno-  
teſcis, & obiter demonſtratur, quantum Hippocrati  
& Galeno uſitata fuerit?

### CAPVT XX.

**N**ON ignoro præcipuas indicationes mittendi ſanguinis, à magnitudine morbi, & virium robore deſumi: Reliquas indicationes tantum quantitatem ſanguinis educendi deſignare. Sed circulaſio ſanguinis oſtendit in omni febre, in partium principum inflammatoriis diſpoſitionibus, aliſque morbis à plethora, vel ſumma cacoſymia maiorum canalium enatis, non eſſe parcendum detractioni ſanguinis, in omni ſexu, ætate, etiam in grauidis, ſi morbus tale remedium expoſtulat. Iſta latiùs explicio.

Scriptiſt *Galenus*, lib. 11. *Meib.* in omnibus febris, tam intermittentibus, quàm continuis, quas putreſcens humor excitat, mittendum eſſe ſanguinem. At per circulationem ſanguinis, cuiuſdè vacuandi neceſſitas indicatur, quoniam continenter accenſus in Corde, non poteſt illud incendium deponere, niſi refrigeretur & ſtabellatur. Vtrumque perficitur per circulationem ſanguinis, quæ quò magis vacuatur ſanguis, eò celerior eius circulaſio abſoluitur, dum reuoluitur ad venas ſpiracula corporis, propter membranarum teneritudinem: cuius beneficio ignei vapores ſanguinis in habitum & ambitum corporis exhalant, atque ſæpius in ſudores erumpunt a degenerant. Scriptiſt *Galenus*, comment. ad *Aphor.* 23. lib. 1. ſi in ardentiffimis febris uſque ad animi deliquium ſanguis mittatur, ſtatim totius corporis habitus refrigeratur, & febris extinguitur: plurimis etiam alius citatur, & ſudores emanant. At hæc

quo modo phlebotomiz largiori succedant, circulatio sanguinis demonstrat. Cùm enim *vena sint ex Hippocrate, spiracula corporis*, per eas, vt iam dictum est, diffilatur sanguis, atque refrigeratur, per frequentem sanguinis reuolutionem intra venas, & quò magis minuatur massa sanguinea, eò magis deferuescet ille ignis febrilis, maior intra canales maiores venæ Cavae & Aortæ, quàm in aliua regione, nisi ardor incœperit ab eo loco, & foueatur ab inflammatione, vel dispositione inflammatoria alicuius visceris.

Nemo sapiens & artis Medicæ peritus dubitat in febribus continuis mittendum esse sanguinem, sed quantum, & quo tempore sit educendus, dubitare licet. In febribus continuis putridis, etiam ardentibus, potest innoxie ante septimum diem pro vehementia febris, vel intra decimum quartum diem, dimidia quantitas sanguinis demi. Itaque si Germanus vel Belgæ, ex *Plempe*, habeat in corpore sanguinis libras triginta. quindecim librarum securè & salutariter poterunt vacuari, intra terminos istos dierum præscriptos. At nobis Gallis, qui vix viginti libras sanguinis habemus, decem librarum tuto detrahi possunt. *Valeriola, locorum communium lib. 3. c. 16.* notat in regione calida parcius, in frigida zudaciùs sanguinem mitti, ob id Germanis & Gallis copiosius, Hispanis & Mauris Affricam incolentibus, vel etiam Asiatis parcius omnino mittendum esse sanguinem. At contrarium hodie obseruatur. Germani, Belgæ, Angli, populi que Septentrionales reformationem detractionem sanguinis, quam Hispani & Galli lubenter amplectuntur & vsurpant. *Galenus, libro de venæ sectione, cap. 14.* candidis, quibus mollis & tenera est caro, quales Galli sunt, minus sanguinis detrahere consulit. *Idem lib. 1. de sectis, cap. 1.* notat Septentrionis incolas sanguinis effusiones non pati, quæ affatim fiunt, sic nec eos, qui Ægyptum aut Meridiem incolunt, qui autem inter hos medij sunt, sæpe euident ex sanguine misso commodum accipiunt. Itaque *Galenus* non affatim, putà ad duas tresve libras, continuo ductu & filo Septentrionalibus educendum esse sanguinem censuit, sed non prohibuit venæ sectionem.

Equidem obseruavi in Anglia, Germania, Belgio raras esse detractiones sanguinis, præsertim in Germania, vbi sinunt suos ægros febribus ardentibus exuri sine missione sanguinis, aut saltem parca, itaut à sanguine præfocati plurimi pereant, vel incident in apoplexiam, vel paralyfim, aut alios diuturnos affectus & immedicabiles: eùm tamen, propter edacitatem & bibacitatem continuam, post meridiem, vt & Angli carniuori præ cæteris nationibus, isto indigeant remedio. Quod illis profuisse salutariter, & à præsentis periculo multos præseruasse sæpius expertus sum, in ea peregrinatione quam feci cum *Maria Medica, Christianissima Regina, Matre Ludouici XIII.* per istas regiones.

Forfan Medici in medicandis istis popullis Septentrionalibus, sequuntur consilium *Galeni, lib. de venæ sectione, cap. 7.* *Insuperantes, vniuersisquæ, ac ventris quæque dedites, neque purgatione, neque venæ sectione magnopere inuicis: nam per vitæ intemperantiam crudorum humorum copiam ocysimè congerunt, itaque ne his quidvis manum adinuere tentandum est.* Propterea *Galenus*, non sine ratione, *lib. 1. de sanitatis tuenda, c. 20.* scribit se libras sanitatis non scribere Germanis, aliisque agrestibus & barbaris hominibus, non magis equidem quàm Persis, Apriis, Leonibus, aut aliis id genus feris, sed Græcis & iis, qui licet sint genere barbari, Græcorum tamen æmulantur studia.

Non possum absque commiseratione ægrorum, & detestatione Medici, legere in *Obseruat. Plateri*, historias ægrorum, qui febribus ardentissimis torrefacti fuere, absque venæ sectione. Ipsemet *Platerus*, historias de se, ardentissima febre laborante, eaque maligna profert, eùm tamen in istis, neque in seipso venæ sectionem adhibuit, etiamsi eiusmodi morbi tale remedium efflagarent. Itaque quid euasete, non ope Medici, sed fati beneficio sanitatem recuperarunt.

Forfan aliquis in lectione *Hippocratis & Galeni* versatus contra frequentem venæ sectionem & liberalem, obiiciet ea quæ nemo adhuc animaduertit, videlicet *Hippocratem* in omnibus suis historiis quæ extant *libris Epidem.* deferipræ, atque in aliis veris ac germanis libris, rarò ægris suis venæ sectionem adhibuisse: tantum meminit in *Anaxiane* pleuritico, cui venam secuit octauo die. Scio quid respondeat *Galenus*, id factum fuisse, & notatum contra veterum consuetudinem, qui post quartum diem non amplius secabant venam. Ipsum verò *Hippocratem*, in aliis suis ægrotis non meminisse venæ sectionis, quia illam tanquam remedium ordinarium subtrah-

cuit. Attamen in *libris Epidem.* veris & germanis, mentionem facit glandis, clysteris, pessarij, balnei, fomenti, quæ sunt remedia vulgaria. Putat *Dnretus Hippocratem* solo clystere contentum, Medicinam fecisse, raro catharticus usum fuisse, sed diuam exactam adhibuisse. Estne verisimile *Hippocratem*, ægris suis adstitisse, vel assedisse otiosum spectatorem, motus naturæ contemplando, & nihil agendo, aut pauca remedia administrando, ne motus naturæ perturbaret? Obseruo in quadraginta duabus historiis quas describit, vigintiquinque ægros mortuos, sed dumtaxat septemdecim euasisse, per crism beneficio naturæ. Non credo *Hippocratem* in suis ægris recitatis in *libris Epidemion*, à venæsectione abstinuisse: sed eam cum summa prudentia & ratione, conuenienti loco & tempore adhibuisse, dum ægris assidens, morbi & naturæ momenta diligenter obseruaret, instructus perfectâ notitiâ œconomica circa ægrotantes, non eorum more qui urbem circumcursant, irrationabili arte vrentes, inquit *Galenus*. Nam qui quæstui seruiunt, quoniam is maior ex populo est, non lubenter ea remedia sectantur, quæ sedulitatem exigunt; auctore *Celsio*. Ille sub finem *lib. 3. Epidem.* videtur designare quo fine scripserit historias *Epidemicas*, ut cognosceret & declararet constitutiones temporum ac morborum, atque inde Crisæon, & dierum criticorum indicia desumeret: Harum rerum gnarus, sicut coniungit, quibus & quando & quomodo vultum præscribere oportet, quasi solius diuæ mentionem faceret absque aliis prædiis, eaque fere solâ usus fuerit in curatione suorum ægrotantium. Excusationem *Hippocratis* colligo ex *Galeno*. Certum est *Hippocratem* prius *libros Epidemion* conscripisse, dum theoremarum experimentis exploraret, nec generalem sententiam de iis proferre auderet, c. 3. lib. 1. de *diabno Decretorius*.

Itaque credibile est *Hippocratem* adhuc iuuenem, nondum in operibus artis satis exercitatum, *libros Epid.* peregrinando conscripisse, ægris suis remedia adhibuisse pauca, quia scripsit *lib. 6. Epidem.* nihil temerè, interdum quiescere oportet, si non proficiat, saltem ne noceat. Sed remediorum seriem noluit describere, ne posteritas aliquid in ipsis reprehenderet. Nam aliud est videre iacentem in lecto ægrum, aliud in libro descriptum, sæpissimè scriptis contraria est medicatio: pro varietate regionum mutanda esse remedia monuit *Celsus*, ideoque *Aristoteles* fatius esse iudicari à peritis Medicis consilium petere, quàm à libris repetere suam curationem. Idcirco prudentes Medici raro describunt historias ægrorum, cum medicatione particulari facta, quia censuræ Medicorum se exponunt, qui multos errores notant in curatione huius vel illius ægri.

In Medicina *Hippocratis* Medici multa notarunt ante tempora *Cornelij Celsi*, ut ipsemet refert *præfatione secundi libri*. Attamen ipsum rectè prælagiisse omnes semper fassi sunt, atque gloriatur sub finem *prænotificum*, de ista scientia, & descriptione sua, quam vbique terrarum verissimam repertam iri asseuerat. De eius Medicina, quod reprehenderetur à posteris, ipsi prædixerat *Democritus in Epistolis. Fœsius lib. 3. Epid.* excusans remedium *Hippocratis*, quod dedit cuidam cholera morbo laboranti, nempe elleborum epotum cum lenticulæ succo, à quo sanatus fuit, aduersus *Calij Aureliani* reprehensiones. Valde iniquum est, inquit, ab iis, quæ in peregrinationis procinctu, temerè ac leuiter sunt animaduersa, exacta curationis leges petere velle. Iudicium istud, si creditur *Fœsio*, suspensas redderet historias *Hippocratis*, eiusque obseruationes. Prudenter *Galenus*, *lib. 2. de respirat. c. 7.* scribit *Hippocratem* in *libris Epidemion*, pauca describere ex iis, quæ ad totam affectionem pertinent, circa quam ægrotus est periclitatus, multa verò alia à Idiotis quidem neglecta, artificiosam & exactam cognitionem exhibentia, & quæ etiam optimos Medicos sæpe latere solent, atque ex factis plurima relinquens, minimè voluit in non factis tempus terendo delirare, neque enim vulgaria, nec quæ quilibet Medicus assequi queat, hic scripsit. Ideoque in descriptione ægrorum, plus semper intelligi debet, quàm exprimitur.

Elegant *Galenus*, *libello de Dieta*, *Hippocratis* obscuritatem reprehendunt, quòb propriam imbecillitatem non possunt magnitudinem *Hippocraticæ* virtutis assequi. Non enim affectæ sunt ad *Hippocratis* scripturas insipientium abiectionumque hominum animæ, ut decali ad Solem, dum in ipsum intuentur, &c.

Quis non reprehendat in *Galeno*, quod regulas & præcepta medendi à se præscripta in *libris meth. med. & alibi* non obseruari in suis ægris, præsertim in vacuando sanguine, si perpendat historias ægrorum à *Galeno* variis in locis recitatas? In quibus

nullam mentionē facit venę sectionis, cū tamen istud remedium esset pernecessarium ex legibus medendi à Galeno constitutis. Ipse lib. 6. *Aphorism.* 31. balneo curat dolores oculorum sine venę sectione prætermissa : etiam potu vini mercurioris oculis supra modum tumentibus, & sanguine repleti medetur : quod cū vellet imitari *Iacobus Sylvius in Ramo, Professore Regio*, ipsum pene occæcavit, uti narrat *Zuingerus in Theatro vite humana, & Nicolaus Nancelius, in vita Petri Rami*.

Contraria est admodum historia Oeconomi Romani, quem larga & repetita Phlebotomia ab oculorum inflammatione brevi temporis spatio miraculose persolvit. Quis non damnavit audaciam Galeni, lib. 5. *meth.* c. 23. curantis mulierem sanguinem ē pulmone reiciientem, balneo, & sola dieta sine venę sectione, quam alibi in tali affectu commendavit. Quod si quis hodie vellet imitari, contra præcepta verę Medicinę peccaret. Ipsemet *Galenus* gloriatur se pleuritidem cum spuito cruento absque plebothomia sanasse, *comment.* 3. in lib. 6. *Epid.* In adolescente, cui præ rubra illuvies cum febre aderat, non secuit venam. *comment.* 2. in *primam præbitionem*. In iuvene plethorico laborante febre syncho secta fuit dumtaxat vena, tertia morbi nocte, cū impediisset *Galenus*, venam secari secunda die. Eundem triphlei quartana laborantem curavit sine venę sectione, lib. de præcognitione ad *Epistolum*. Atque febrem acutam curavit absque venę sectione sola dieta tenui contentus : quin etiam impediit venę sectionem contra sententiam Medicorum, in eo qui pati debebat fluxum sanguinis ē naribus, quia quintum diem præterisset. At ille scripsit quovis tempore, die, & quavis hora vacuandum esse sanguinem, etiam si primis diebus istud remedium omisum fuisset. Mulierem herpete laborantem in malleolo percuravit sine venę sectione, vsus dumtaxat purgatione ex sero lactis & scammonio parata.

Isthe cgregia & audacia Galeni facta admirari licet, sed non imitari sine periculo ægrotantium, & artificis meritā reprehensione. Inde iudicate in Medicina quantum facta distent à scriptis, & quibus authoribus fidere oporteat. *Galenus* lib. ad *Glauconem*, ubi ex professo tractat de curatione febrium, scribens ad *Glauconem Medicum amicū suū*, communicat suam medendi methodum. At ibi nullam mentionē facit venę sectionis in febribus nisi in quartana, atque cum magna cautione, quam vult obseruari, cū tamen in Lienosis, lib. de vena sectione, audacter ad libram vnam sanguinem detrahit : & lib. de atra bile, laudat *Stratonicum suū Præceptorem*, quod in quodam, cū spectasset vacuatum sanguinem atrum, diebus ternis consequentibus sanguinem detraxit, antequam purgaret, & lib. de vena sectione, gloriatur se hydropicos sanasse per venę sectionem, cū tamen alibi, lib. 4. de dieta acutorum, sit adeo circumspectus in eo remedio permittendo, ut in anasarca tantum admittat.

Ac sanē videtur *Galenus*, ambitiosē & animosē libris de vena sectione scripsisse, annum agens trigessimū quartū, cū videret *Erasistratū* in omnibus Medicinę partibus tanquam virum admirabilem prædicari. Cœpit ardentius illius scripta reprehendere, atque selegit libros eiusdem Authoris de cūctione sanguinis, quos publicē examinavit & refutavit, eō vehementius, quō magis exanderet *Martialis*, sine *Martiano Erasistratensi* esse volens. Eo modo *Archigenem* insectatus est *Galenus*, ut famam eius deprimendo, suam magis extolleret : ideoque causē legendus est in curatione morborum, propter varietatem & discordiam in eius scriptis, quem idcirco *Fernelius* tradidit meditationem potius, quā ad medendi rationem vitam omnem conluisse.

Redeo ē diuerticulo in viam, id est, *Hippocratem* artis medicę conditorem, quem *Galenus* testatur infano amore amplexum fuisse venę sectionem, & in omnibus ferme morbis adhibuisse. Ipsam appellat, lib. 4. de dieta acutorum, principale remedium à quo sit inchoandum, & in curatione morborum purgationi præmittere iubet. Quantitatem vacuandi sanguinis declarat in pleuritide, ut copiosus detrahatur sine cūctione, donec multo rubicundior fluxerit, aut pro puro & rubicundo liquidus. Eodem libro, detrahare consulit ad animi deliquium : alibi, in tabe, ubi summa adest sanguinis impuritas, educit, donec exangue reddatur corpus, ad renouationem massę sanguinę. In pulmone tumente & repleto sanguine, copiosum detrahit ē cubitis, ē naso, ē lingua, & ab omni parte corporis. Obseruo apud *Hippocratem*, sanguinem educi ē vena frontis, Occipitis, pone aures, sub lingua, ē naso inferiore, ē venis mammarum, ē cubitis, ē manu, ē poplite, ex malleolis, ab ano, nec

plures hodie venæ, imo pauciores inciduntur. Inde licet colligere quantum vîsata fuerit Hippocrati venæ sectio, & quâ detraxerit quantitate sanguinem, non tantum partitum, sed affatim, ad tollendam vasorum plenitudinem.

Proinde audax est, ne dicam temeraria assertio *Prosperi Martiani, Medici Romani, suis notationibus in Hippocratem*, ipsum nunquam in morbis ratione febris, detraxisse sanguinem, quod probare nititur variis locis, ex eodem Hippocrate de promptis, *sect. 3. Concarum, versu 79.* subiungit Hippocratem venæ sectionem in febribus putridis à bile adeo suspectam habuisse, ut pro earum curatione nullibi eam admiserit, tandemque hic & alibi reprehendit Medicos recentiores, qui in quolibet morbo sanguinem audacter educunt, quotiescumque adest febris, ac si præcipuum esset iudicans, quam summum prohibens habuit Hippocrates, sed cautè legendus est hic Interpres, immemor istius effati Hippocratici, *lib. 4. de dicta acutorum. In acutis morbis sanguinem detrahes, si vehemens morbus videatur, vigeatque agrotantis ætas, & vitium adsit robur.* Vide & expende admirabilem *Galenus* commentarium, & pernitiosam *Martiani* interpretationem ad hunc locum. Nescio qua ratione *Hollerius, in suis Institutionibus Chirurgicis* scripserit, cùm agit de dolore sedando, atque omnino qui contumaciatur esset dolor, nec facile mansuescit, intemperiem ostendit, in quo summiopere cauendum eris, ne quod sit ignorantia artis, frequentibus phlebotomiis sapius reuocatus, catharticis, cucurbitulis ægros ex carnifices, in quibus solis summa morborum præidia Medicorum vulgus colloare solet.

Valde laudo iudicium & consilium *Valesii, lib. 4. sue methodi medendi*, postquam eruditè de moderatione venæ sectionis tractauit, addit. *Ne quis me putes maledicere Venæ sectioni, ut illas innumeras missiones sanguinis, quæ ad quindecim aut vixinti præcedunt, nunquam facio. Ita nullum fere esse morbum, cuius curationem à missione sanguinis non inchoem: quia ea non premissa, vix ulli remedii locus est. Nec sunt negligenda symptomata, quæ præsanitia nos auocant à certa via medendi. Ideoque acriter castigat Medicos, qui sustinent curare symptomata, esse vmbra velle detrahere remanente corpore. Quid ergo agendum? mittendum aiunt sanguinem: quid deinde? mittendum rursus: quid post hæc mittendum iterum, misso verò nihil præterea, & breuem formulam, meritis sanè respiciendur, qua tam parua constat. Quorsum Hippocrates & Galenus, & alij omnes authores, tam Græci, quam Latini, etiam Arabes & Iuniores nostri sæcula proximi, alij etiam nobis contemporanei, tam multa concesserunt simplicibus & compositis, & eorum formulis innumeris? cur tam multa de purgandi ratione, de succis & corporibus medicamentorum præparandis, de symptomatibus amouendis, cùm liceat hæc omnia, vno lute verbo concludere, sanguinem mitte?*

Mihi valde placet iudicium *Londoni Dureti in Concis, pag. 252. de missione sanguinis in Pleuritide*, quæ sæpius iteratur, perseverante febre, etiamsi spūm conuenienter exeat: Tale spūm procurari debet, ut, quæ expurgationem inuuant, molliendo, leniendo, & spūm ciendo. Non autem sanguinis detractio retrahit & impeditur: quod vñ venire videmus, non sine morbo, & Nemesi, abistis præmaticis valgò dictis, quæ omnem pleuritidis curationem exigunt, in sanguinis detractioe sapius iterata, quandū pleuriticus huiusmodi spūta expurgat, cum spe salutis prædante. O Homines Reipublicæ calamitosi atque funestissimi. Ipsam pleuritidem quæ sua sponte nullius operis indigens, cum tali spūto quiesceret, ex euentu reddunt mortiferam. Confer etiam pag. 388.

Lute quæri potest, an liceat in morbis frigidis, vigente frigida intemperie, ac sine febre, detrabere sanguinem, ut in tali constitutione corporis morboia, quæ describitur, *lib. 2. de Morbis apud Hippocratem*: postquam vena pituitam in seipsas traxerint, necesse est præputita frigiditate sanguinem magis nunc sisti, ac perfrigeratum esse, quam priori tempore, dum verò sanguis non mouetur, fieri non potest, ut non etiam corpus quiescat ac torpeat, & siquidem sanguis, ac reliquum corpus superarint, itans calefiant, homo euadit: notat obiter quandam delineationem circularionis sanguinis. *Galenus* commentario ad *part. 1. sect. 3. de vitiis ratione in acutis*, sic eleganter loquitur & pronunciat de venæ sectione. *Vis ignis propè extinguatur immixtis ignis, tum humidis, tum multis, nisi quis multitudinem sustulerit, sic & in frigidiore ob copiam sanguine, ubi calor natus propè extinguatur, prudentissimum est remedium venæ sectio.*

Quæritur, an in febris impetu sanguinem mittere, sit agrum iugulare, ut opinatur *Celsus, lib. 2.* Id solemus præstare in summo febris ardore, ubi periculum impendit capiti, vel partibus thoracicis, & in summis doloribus: Aliàs non eredo nociturum, quod



quod flabellationem & refrigerium procuraret sanguini æstuant; & sæpius redeunt per venas perspirabiles.

Nunc maior difficultas oritur de impuro sanguine: an ille copiosè detrahendus, vel parciùs, aut potiùs expurgandus, quia cacoehymix debetur purgatio: An partitim, vel assatim ille demendus, quia quandiu vasis includitur, per Cor reuolutus, potest ipsum inficere & labefactare. *Galenus, libro de sanitate tuenda*, monet, si fuerit sanguis bonus in exigua quantitate, plurimus verò corruptus, à venæ sectione abstinendum: sin verò impuritas sit exigua, sanguis autem copiosus purus, audacter mittendum esse sanguinem. *Fernelius lib. de venæ sectione, qui est 2. meth. gener. & in consiliis*, hanc difficultatem sic enodat. Vasorum omnis plenitudo venæ sectione demenda, impura plenitudo, quæ est multa cacoehymia, licet purgatione indigeat, nec tutò, neque celeriter minui potest. At secta vena protinus pericula vitantur ex plenitudinè impendentia, nulla virium offensione: si sanguis purus appareat, copiosius detrahes, sin verò impurus, parciùs, ex intervallis detrahendo, quam assatim & vniversim vacuando. Sublata plenitudo sine præcipiti, atque periculosa, reliqua impuritas & cacoehymia, purgatione eximenda est. Sed tum maximè incommodat venæ sectio, cum cacoehymia è iecoris aut ventriculi vitio, quod ferè sit, contrahitur, vt in ictero, in cachexia, leucophlegmaria, nam detractio sanguinis licet impuro, impurius multò succedit.

*Vallesius lib. 2. meth. med. & Septalius, lib. 4. animaduersionum*, quasdam cautiones notant: Vbi maxima adest impuritas sanguinis, considerandum, an sit naturalis, si talis fuerit, parciùs detrahendum: si adscititia ex morbo, tunc iudicatur magnum fuisse recessum à naturali statu: Ideoque viribus conseruandis studendum, nec ita liberaliter sanguis demendus erit. Nos per *sanguinis circulationem* nodum illum resolui-mus. Vniuersalis cacoehymia canalium maiorum venæ Caux & Aortæ, magna ex parte minuenda, vt residua faciliùs à medicamento defæciari queat. Minutio illa fieri debet partitim, non assatim, nisi principio morbi, & in summo æstu. Interea, cardiacis refrigerantibus, & diureticis, per vrinas depuratio tentanda, & Cordis inquinamentum euerrendum, id est, impressio maligna delenda aut arcenda. Particularis cacoehymia, quæ in canalibus venæ Portæ, & in partibus ab ipsa enutritis continetur, crebris purgationibus exhaurienda, non neglecta tamen phlebotomia, sed parca: Ne nimium imminutà, vel deficiente massæ sanguineæ quantitate, necessaria ad circulationem, ex porta vena eliciatur, & rapiatur humor fordidus in cauum. Quando verò sanguis in febribus ardentibus malignis purus & laudabilis appareret, post varias phlebotomias, haud dubiè putredo non continetur in maioribus canalibus venæ Caux & Aortæ, sed in minoribus per habitum corporis dispersis, aut in venæ Portæ canalibus, aut in spiritibus. In eo statu queritur vtrum detractio sanguinis copiosa sit necessaria? Equidem existimo ad restringendum incendium vtiliter educi sanguinem initio copiosum, tum demum per epaphæresim, tres quatuorve libras sanguinis ducti sufficere, nisi in parte aliqua nobili inflammatio, vel præceps aliquod periculum immineret, quod vltèrius procedere nos adigeret. Reliqua curatio refrigerantibus & cardiacis eiusdem naturæ largo hauitu assumptis perficietur, donec opportunitas adsit purgandi exacto septimo die.

Magna difficultas occurrit insistendo sanguine, fluente impetuosè & assatim per nares, os, anum, & vterum: nam, quæ data porta ruit: nec per *circulationem sanguinis* ascensus vel recursus ad Cor immodicam hemorrhagiam intercipit, vel remoratur. In hoc casu quid molendum? Probo consilium *Amati Rustiani*, vt sanguis intra horæ spatium multoties educatur, ad duas vel tres vncias singulis vicibus ad reuulsionem, itaut libra vel sesquilibra intra horam exhauriatur: sic enim sanguis vel intercipitur, vel retardatur. *Galenus lib. de venæ sectione, cap. 11.* in nariorum hemorrhagia valida sanguinem mittit, non ad animi deliquium, sed moderatè citra virium prostrationem, reuulsionem fieri commodè putat, sæpius referatà venà, & quantò maiorem in numerum particulares auxeris detractiões, tantò efficaciorē effeceris. Præterea artus vinculis stringit, apponit cucurbitulam hypochondrio nari fluenti supposito. His, inquit, artibus erumpentem immodicè sanguinem è naribus compescui, reiectis iis quæ introducuntur in nares, & applicantur fronti, cum sint prorsus inutilia, vt ipse comperit. Non erit etiam inutile supra pectus iuxta clauiculas, cucurbitas siccas admouere, & adstringentia carotidibus arteriis instillare

cataplasmatibus apponere, ad intercipiendum ascensum sanguinis. Non probo arctas ligaturas artuum, nisi fiant in femoribus iuxta flexum inguinis, ut quantitas sanguinis artuum sic intercipiatur, ubi prius è venis, tam supernis, quam inferis sanguis eductus fuerit satis liberaliter. Sanguis è pulmone remissus, vel à ventriculo reiectus ut supprimatur, copiosus educi debet, & assatim primò, dein per epaphræsum ex brachio & pede. Qui ex pulmone procedit, à Caua deriuatur. Qui à ventriculo manat, vel ab Hepate sanguinem per venam splenicam demittente in eius ramos per ventriculum dispersos, vel à Liene expuitur in ventriculum. Reiectus sanguis vomitu, præter venæ sectionem, aquæ frigidissimæ potu liberali, vel serratæ mineralis, vel decocto adstringente frigidissimo curatur, ut osculum venæ obsignetur. Hæmorrhoidalis fluxus immoderatus sistitur venæ sectione liberali brachij, iniectione adstringente frigida, emplasticis adstringentibus Offi Sacro admotis. Hæmorrhagia immodica per vterum à partu succedens, horrendum & miserabile symptoma: si vires languent, & recusat venæ sectionem, supprimitur in vulvum profundè intruso fasciculo Cannabulo oblongo, & imbuto emplastico liquore conueniente, & validè adstringente, eleuatione natium altitudine duorum pedum supra truncum corporis: Applicatione cucurbitæ inter mammas, adnoto oxycrato refrigerante supra imum ventrem, & ad fumbos, arctis ligaturis artuum superiorum, potu aquæ frigidissimæ, atque ut vno verbo absoluam hunc articulum, Hippocrates, lib. Prorethicum, in laiga sanguinis hæmorrhagia venam secat, in *αγγίλι*, seu concitatore sanguinis statulenti impetu phlebotomiam consulit, affectum istum *αγγίλι* vocat, de quo vocabulo variz sunt interpretationes, sed verisimiliores sunt de reiectione sanguinis per superiora.

*Circulatio sanguinis* impeditur fluxum humoris impuri in habitum corporis, ut in variolis, morbillis, ecthymatis & exanthematis febris purpuratæ? Nequaquam. Nam humor morbosus in vasa minora, quæ sunt propagines canalium maiorum, suoque impetu, vel robore naturæ prorepat, vel propulsatur in habitum corporis, sed dubitatur, num venæ sectio possit, vel auertere, vel retardare istam excretionem? affirmant omnes practici venæ sectionem à centro ad circumferentiam trahere humores, at circulationi sanguinis contrarium docet, nisi dicamus naturam subleuatam sarcina humoris vitiosi, reliquum facilius amandare in extimas partes. Certum est humores vitiosos in vasa minora effusos affectare viam & exitum ad cutim, vel decurrere in habitum corporis, inde non posse recuelli, nisi facta fuerit magna vacuatio sanguinis. Ideoque in variolis & morbillis, aliisque excretionibus cutaneis, initio potest educi sanguis liberaliter, sed aliis sequentibus phlebotomiis parcius detrahetur, nisi præfucatio pulmonum, vel Cerebri oppressio, vel suor alui biliosus periculum intentare videantur.

Cùm enim *Variola*, & *Rubiola*, sint morbosæ secretiones, vaporosæ, vel humidæ, in habitum corporis expulsæ, cutim afficientes, secernuntur calore febris, vel robore naturæ. Ex duplici substantia partium duplex materia expuitur per quandam despumationem, quod ex vaporosa substantia, siue humido primigenio, siue humido radicali partibus insito secernitur per modum exhalationis, est spirituosus, vel fumosa materia, quæ rubiolum facit: quod ex solida partium substantia segregatur, humor est, & Variolam procreat: Vtrique materia eodem modo initio efflorescit, ac prorumpit, prurigine & asperitate cutim afficit. Sed Rubiola dumtaxat maculis cutim afficit, Variola pustulis fœdat, de quibus extat apud Hippocratem, lib. 6. Epid. sect. 2. exemplum notabile in Simone, qui latus habebat pustulas, non admodum pruriginosæ, qui cum ad ignem innueneretur, aut calidâ lauaretur, innuabatur, vomitus non innuabant, puto si quis calida fomenta adhibuisset, utilitatem percepisset. Galenus in commentario, videtur designare Variolas, quem consules, & comparabis cum nostris Variolis, tam in pustularum diagnosi, quam curatione. An cognitus fuerit hic morbus præcisè, inquit Cl. Salmasius, pag. 726. libri de annis climactericis.

Huic capiti de venæ sectione attexam instat Mantissæ, istam disquisitionem de mittendo sanguine ex doctrina Hippocratis. Quoniam vituperatur & damatur Medicorum Parisiensium sanguinis profusio, nimis larga, & licentiosa, quia nunquam talis ab Hippocrate usurpata fuit, & in omnibus morbis adhibita, ut moris est apud nos. Pauca demonstrabo doctrinam Hippocratis in sanguine mittendo, non esse prorsus alienam à nostra praxi.

Equidem sanguinem mitti nouum non est, sed nullum esse morbum, in quo sanguis non mittatur, nouum est, inquit *Celsus*: veteres ante quartum diem detrahebant sanguinem, quo exacto tale remedium nefas erat administrare, referente *Celso*, quod confirmatur à *Galeno* commentario ad historiam *Amaxonis* pleuritici, cui octauo die *Hippocrates* sanguinem detraxit, præter consuetudinem Medicorum sui sæculi. Ideoque istam venæ sectionem annotauit, tanquam raram & extraordinariam. *Auctor Introductorij, siue Galenus, siue Herodorus*, notat Recentiores initio ad quartum vsque diem venæ sectionem decernere. Veteres etiam post tertium diem imperasse, si vires suppetant, & morbus possulet. Sed iure dubitatur, Si *Hippocrates* venæ sectionem frequenter vsurparit in curationibus morborum, cum in ægrotis quos recitat in libris legitimis *Epidem.* semel eius mentionem fecerit *Galenus*, cum præuideret istam obiectionem, eleganter tuetur *Hippocratis* doctrinam, & huius remedij necessitatem demonstrat, commentario ad historiam *Pythionis* grauissimo morbo laborantis, cui conueniebat venæ sectio, nec tamen *Hippocrates*, eam commemorat administratam. Non repeto istam apologiam, quia proluxa est, satis erit locum indicasse lectori Medico, *comment. 1. lib. 3. Epid.*

Inuenio apud *Hippocratem* in variis morbis, & quampluribus præscriptam venæ sectionem, atque omnes locos secundum regiones corporis designabo.

Incipiam à capite, in læsione capitis vena secta est iuxta *Mnesimachum, lib. 5. Epid.* si vlcus fuerit in capite internas venas secato, si non febricitet *lib. 2. Epid.* iis qui voce destituuntur derepente, venam secato, si febre carent. *Ibidem*, quod repetit & latè explicat, *sect. 4. lib. de dieta acutor. & Aphorisma 81. lib. 5.* in posico dolore capitis venam secat in fronte. In eo qui graui dolore capitis detinebatur, lingua exulsa, nares fuere rescissæ vnguibus, sanguis non manauit. *Galenus in comm. lib. 6. Epid. sect. 6.* notat tentatam apertionem venarum narium internarum, quæ secabantur olim ad eliciendum sanguinem, & caput exonerandum, instrumenta & artificia quibus veteres vterentur, explicat *Arriani*. Oculis dolentibus confert venæ sectio *Aph. 46. lib. 7.* Callimedontis puero propter tuberculum ad collum secta vena, *lib. 5. Epid. & lib. 7.* nota puero detractus sanguinem. In dolore capitis proderit, si sanguis è naribus, aut à vena in fronte detractus fuerit, *lib. de affectionibus.*

Polemarchi vxori anginosæ febris multa, secta fuit vena, cessauit suffocatio, *lib. 5. Epid. & lib. 7. Epid.*

Melissandro cum gingiua doleret, & intumesceret, vena secta fuit, *lib. 5. Epid.* pro leui morbo.

In hæmorrhagia venæ sectionem laudat *Hippocrates* in *Prorrhetico, & in Coacis*. In angina suffocante venam brachij secat, dein venas linguæ, *lib. 4. de dieta acutorum*. Vbi quis repente obmutescit, id venarum inreceptiones oclusionesque faciunt, si sano absque occasione, vel forti alia causa id contingat, venam brachij dextri internam secare oportet, sanguinem auferre, inspecta secundum habitum, ætatem, pluris minorisve ratione, *lib. 4. de dieta acutorum, Galenus in commentario*, per aphonium notat *Hippocratem* intelligere epilepsiam, apoplexiam, & syncopem cardiacam, sed paulò post *Hipp.* docet necessitatem venæ sectionis festinatæ in plurimis affectibus capitis. Cùm dolores accesserint, bilis atra, fluxuumque actiuum influxiones fiunt, dolent morsu interna, morisque, atque admodum arefactæ venæ intenduntur, inflammataeque trahunt, quæ insuunt, quapropter corrupto sanguine, nequeuntibus spiritibus naturales pertransire meatus, in frigidationes fiunt oblationem vertigines, aphoniæ, capitis grauitas, & conuulsiones, si tum ad Cor, vel Hepar, vel in venam peruenerint. Hinc epilepsia & paralexia, si continentes locos fluxiones inuaserint, atque spiritibus exire nequeuntibus exaruerint. Talibus prius adhibitis, fomentis venam confestim ab initio secare oportet, cùm nondum fixa sint omnia, quæ contristant, tum spiritus, tum fluxiones, facilius enim remedijs patent: In hoc discursu vestigia quædam circulationis sanguinis extant in curatione morborum considerandæ.

Venio ad partes Thoracicas. In pulmone tumente præ calore, clystere prius iniecto, sanguinem detrahit de cubitis, de naso, de lingua, & de omni corporis parte, *lib. 3. de morbis*, in Oeniadis vir tabidus ex medicamentis nullam opem persentiebat, vbi verò vena ipsi secta fuisset in vtraque manu, donec ex sanguis redderetur, postea utilitatem perecepit, & à morbo liberatus fuit, *lib. 5. Epid.* nota repetitam venæ sectionem

nem: in tussi ex affectibus testibus venam secat, *sub finem lib. 4. Epid.* in peripneumonia, & pleuritide sine spūto, venam secare oportet, splenitidem aut hepaticidem iuxta vtram fuerit morbus, *lib. 1. de morbis*, nota ē directio partis affectæ in dolore lateris affecti, qui non remittit ad calefactoria, & spūtum uon prodit, venam secat, aut purgat, prout videbitur, *lib. 2. de diata acutorum*: accuratius explicat venæ sectionem in pleuritide, & peripneumonia, venam in brachio secare oportet internam, vtra tandem parte fuerit, in ea ipsa detrahare sanguinem iuxta corporis habitum, & tempus, & ætatem, & calorem plus vel minus, & confidenter, & si acutus fuerit dolor ducere vique ad animi deliquium, *veris anm-izim, lib. 4. de diata*, nota diorsimtos. Ibidem detrahit sanguinem in pleuritide ad mutationem coloris, donec ex rubicundo lividus exeat, id est, interpretet *Galeno*, qui manat ab affecta parte.

Pergo ad partes ventris inferioris, in morbo lienis ab interna cubiti vena sanguinem educit, *lib. de internis affectionibus*. In morbo splenis, qui scorbutum æmulatur de vena splenitide frequenter mittere sanguinem consulit, *lib. de affectionibus*, nota frequenter: in Eudemo splenitico, cum non proficeret ex vsu remediorum secta fuit vena, & melius habuit, *lib. 7. Epid.* in Lycia post dolorem splenis, febrem, & dolores, vena quæ in splene est, in cubito secabatur, & saliebat quidem sæpe, *lib. 7. Epid.* credo fuisse arteriam. In morbo regio, quia venæ sub lingua sunt crassæ & nigre, venas sub lingua secat, *lib. 2. de morbis*, flatulentix conuenit venæ sectio, *lib. 2. Epid.* intelligit colicum dolorem a flatu, vel aliam flatulentiam, Stymargi famulæ vbi filiam peperisset, conuersum est vteri osculum, & dolor ad coxam, & crus iuxta malleolum, secta vena liberata est, & quidem cum tremores totum corpus detinerent, *quod notandum*, verum ad causam deuenire oportet, & causę principium, *lib. 1. Epid.*

In hydropē venas internas secato, dum morbus magnus in intentione est, *lib. 1. Epid.* In tympanite, si gger difficulter spirauerit, & tempus venum fuerit, simul ætas vigerit, & virium robur adsit, de brachio sanguinem detrahare oportet, *sect. 4. lib. de diata acutorum*. In dolore renum a calculo poplitem incidere consulit, *lib. 6. Epid.* Vrinæ stillicidium, & meiendi difficultatem, venæ sectio soluit, incidendæ sunt interiores, ex *Galeno vena pedis*, *Aph. 48. lib. 7.* venæ iuxta aures sectæ sterilitatem adferunt, *lib. de Genitura*, & *lib. de Aere, Aquis & Locis*. Si prægnans parere non possit, venas pedis secare oportet in malleolis, si iuuenis, in vigore, & multo sanguine repleta, sanguinem detrahare virium respectu habito, *lib. 1. de morbis mulierum*, mulieri deficientibus naturaliter menstruis, si sanguinea fuerit, & liberos susceperit, quater in anno, sanguis detrahendus per aliquot annos, *lib. de morbis mulierum*, in vteri vlcere cancroso maturæ venam secat, *lib. 1. de morb. mul.* attamen prohibet venæ sectionem in muliere grauida, *lib. 5. Aphorismorum*.

Quod spectat ad morbos artuum. Cum adsunt cedmata, venæ in auribus posticæ sunt cædendæ, *lib. 6. Epid. & sect. 5.* In fluxionibus ad coxam venas retrò aures secato, *lib. 6. Epid.* pranso & potu homini secat, venam in varicibus curandis ex parte affecta vacuando, & ex parte opposita, si sanguis nimium fluit, *lib. de vulneribus*, in fractura costarum sanguinem detrahit, *lib. de fracturis*, & in magnis vulneribus sanguinem mittit, & corpus fame macerat: ruptiones quæ ex dorso ad cubitum descendunt venæ sectio soluit, *Aphorism. 12. lib. 6.* quibus continuo in febris vacatione, hypocondrii & Cordis dolor, crurumque ac partium inferiorum, & vnà venter in molem affurgit, phlebotomia exoluit, & alui profluuium in *Coacis*. Oportet venæ sectiones in doloribus dorsi, ac coxendicem de poplitibus facere, & de malleolis forinsecus, *lib. de natura humana*. In coxendicem morbo venas in poplitibus secat, *lib. de internis affectionibus*. Tetanus lumborum in anteriorem & posteriorem partem, distensio, & in atrabiliariis, vbi spirituum per venas interceptiones sunt, venæ sectione soluantur in *Coacis*, quibus ad præcautionem vena tundenda Vere & Autumno, id facere consulit *Hippocrates*. Docet in genere detrahendum esse sanguinem in omnibus febribus æctis, *lib. 4. de diata acutorum*, in acutis morbis venam secabis, si vehemens morbus appareat, & ægri in vigore ætatis fuerint, & robur ipsis adfuerit, *postea addit, quibus morbis conueniat*, in angina, in pleuritide, si præcordia inflammata fuerint, septi transversi intentiones, aut spirituum protensiones, in rectę cœcicis spiratione sicca, quibus pus non subest, maxime autem Hepatis dolores, & splenis grauitates, & alias inflammationes, & supra septū transuersum dolores, ac morbo si collectiones, solui non

possunt, si quis prius medicamentis purgare aggrediatur. Nam *vena sectio in talibus principalis est*. Hic textus deproptus ex *Hipp.* libro legitimo, confirmat alios textus librorum, qui suspecti & spurii reputantur, ex censura accuratissima librorum *Hippocratis*, facta à *Mercuriale*. *Hippocrates lib. 1. Epidem.* notat in febribus ardentibus hæc accidisse, quibus rite, & largiter sanguis per nates erupit, ea de causa maximè seruabantur: Nec vllum noui, si redè erupisset sanguis, in hoc statu quemquam mortuum. Nam *Philiscus*, *Epamenon*, & *Silenus*, quibus parum quarto die, & quinto, è naribus stillauit, mortem obierunt. Nonnullæ mulieres, & virgines, mensibus copiose fluxibus liberatæ fuere. Ex hoc loco licet intelligere, quod Phlebotomia istum defectum hæmorrhagiæ supplere potest, ac debet fieri. Apud *Hippocratem*, *lib. 4. de diarræa acutorum*, ubi quis de repente voce priuatus fuerit, interceptiones venarum id faciunt, si hoc sano contingat, sine manifesta causa, aut alia forti, venam secare oportet in brachio dextro internam, & sanguinem detrahère, iuxta habitum, & ætatem, rationem inueiduo, an plus aut minus oporteat. Ex istis omnibus locis bene intellectis sensus eruitur manifestus cuiusdam loci, apud *Hippocratem*, *lib. 4. de diarræa acutorum*, censura *Galeni* iniqua castigati. Cognoscere autem eos oportet, qui capite dolent, vel ob exercitationes, vel cursum, vel iter, vel venatum, vel quemuis alium importunum laborem, vel venerea: decolores, item raucos, lienosos, exangues, spirituosos, sicce tussientes, siticulosos, statuosos, & venarum interceptiones. Hic adde, quibus intentia sunt hypochondria, tum dorsum, tum latera, torpentes, obscure videntes, eos quibus aurium tinnitus molestus est, eos qui vrinas non continent, morbo laborantes regio, quorum venter cruda egerit, sanguinem è naribus, vel sede vehementer profundeutes, inflatos, quos vehemens labor infestat, nulli horum nisi superuicerint, medicamentum exhibebis. Nam periculo egrum expones, nihilque iuuabis, spontanea que, tum permutationes, tum iudicationes adimes: *subiungit*, si iuciam sanguinem auferre confert, ventrem confirmare oportet, & ita auferre, & in ediam præscribere, & vinum tollere, deinde congruenti victu, & fortibus humidis, reliquam curationem absoluerè. *Galenus in commentario ista negligenda putat ac eludit his verbis*. Si quis nunc singula horum simpliciter & indistincte audierit, is multa in arte perperam molietur, quod si singula, vt oportet distinxerit, primum quidem nihil in præsentia ad eorum inuentionem iuari deprehendit, deinde ad eam, quæ de præsentibus sunt, contemplationem, multis egere libris cognoscat. Nec verò plerisque hominum persuaderi potest, vt aggrediantur ea sola scripta, quæ manifestata sunt, & quæ talia non sunt, iis qui scripserunt relinquunt, quasi nullam illi curam habuere, vt nos ea quæ scripserunt, intelligeremus: sic nos nequaquam diligenter ipsis adhærere iustum est, ea quæ dicuntur, tum querentes, tum diuinantes. Pro defensione *Hippocratis* obitio *Galeni*, quod in hoc loco, non recordatur eorum, quæ scripsit de *Hippocratis* scriptis, fieri nequit, vt libro vno præsentì, bene omnia scribat *Hippocrates*, atque ordine doceat, præcipuè cum ipse primus horum inuentionem sit molitus: Qui tamen hæc ab *Hippocrate*, tum transuersum, tum inordinatè scripta didicerit, totamque suam vitam, in eam quæ ex operibus docetur meditationem, exercitationemque deuouerit, is lucem & ordinem doctrinæ adiecit poterit. Propterea præstantissimus Medicus *Simon Pietreus*, dicere solebat libros *Hippocratis* seminaria totius Medicinæ continere, præclara nostræ artis documenta apud ipsum reperiri, quæ non intelligit, nisi peritus Medicus, & in operibus artis exercitatus, & in eius lectione diu multumque versatus: se multoties accuratè legisse *Hippocratem* per triginta annos, & ætatis suæ quinquagesimo quinto, quo denatus est, se nunc post multas cogitationes, & experimenta, *Hippocratis* arcana diuina solis sapientibus cognita & competita intelligere, & ex eius præceptis nunc posse rectè Medicinam exercere. Cæterum *Galenus* de Medicina *Hippocratis* affirmat, quæcumque ipse ad curationem cogitauit, priusquam nos doceat experimento comprobare, non sicut nonnulli ex iunioribus Medicis, qui in scriptis de ratione medendi, nobis ea imperarunt, quæ ipsi nunquam antè sunt experti, sed & ipse *Hippocrates* in hoc libro, quum tractasset de iis, quæ spinæ incidunt, subdidissetque posse experimento redargui, quæ ipse excogitasset, inquit: Pulchra huiusmodi sunt monimenta eorum quæ experti sumus, siue effectu inuenimus, & causarum propter quas parum processerint, *lib. de articulis scilicet. 1. & scilicet. 2.* Empiricorum impudentiam, cognosces, qui audent *Hippocratem* appellare Empiricum: fuit omnium qui Medicinam

exercuerunt maximè experientia, & experimentorum spectatores, iisque omnia comprobauit, quæ multis fretus rationalibus argumentis inuenit, potissimumque rationi corporum incidendorum operam dedit, ut quæ mirum in modum ad artem conferat.

Quàm fuerit accuratus Hippocrates in methodo tradenda secandi venam, legitur in *Medica* venas in brachijs funicularum apprehensionibus constringere oportet, caro enim contegens in multis non probè coaptata est venæ, vbi lubrica fuerit caro, non contingit sectionis vitrorumque iuxta seipsas fieri: Nam venam contentam insufflari conringit, & sanguinis fluxum impediri, multis verò propter hoc pus congregatur, quapropter talis Chirurgia inducit duo nocumenta, scilicet quidem dolorem, secanti verò multam ignominiam. Idem in omnibus venis fieri præcipit: sed lib. 2. *Epid.* videtur indicare sanguinis fluxum facta ligatura, iuxta circulationis doctrinam, in pulsantibus sanguinis fluxionibus, foramen amplum existens, & omnino si ex valde decliui accliuæ fiat, & propterea ligaturæ in sectionibus venarum impetum faciunt, fortiores prohibent sanguinem. Hic locus, nisi consideremus sanguinem facta ligatura manare ab infernis partibus, non potest rectè intelligi: Admirabilis est Hippocrates, in modo secandi venam, lib. de *Visceribus*, vbi cumque vena secatur sanguine detracta, & habenula resoluta, si sanguis non suppuratur, mittatur ex contraria parte, à qua fuit, seu brachium, seu crus, ut retrocedat: sicque plus minusue iacens detineatur, atque ita ligeretur ea animaduersione, ne quid in sectione concreti sanguinis superflui, tum duplex pannus vino madens imponatur, & super lana lota, atque oleo inundata. Nam si vehemens fuerit sanguinis eruptio, supprimitur, quod si sanguis in sectione concresecat, & ita inflammetur, suppurari solet. Est autem mittendus quum homo liberaliter, aut parcius pransus fuerit, ac biberit, quumque leuiter fuerit calefactus, calidiore die, magis quàm frigidiore: Præterea docet, an vas propinquum parti affectæ, an remotum sit aperiendum, venæ sectiones facere oportet iuxta hos modos, ut quàm longissimè à locis vbi dolores fieri solent, ac sanguis colligi, secemus: Sic enim minimè magna mutatio dererent fiet, & coniect adine transuleris, nec ut amplius in eundem locum colligatur, lib. de *officiis naturæ*, & libro de hominis natura idem repetit. Notat Galenus commentario ad *Aphorismum* 21. lib. 6. apud Hippocratem sæpius exempla particularia, continere doctrinam vniuersalem, quod refero ad quasdam phlebotomias particulares, quæ possunt esse generales.

Dubitare licet, an sæpius iterauerit venæ sectionem? Hippocrates in quibusdam morbis copiose detrahebat sanguinem, vel ad animi deliquium, vel ad mutationem coloris, interdum repetitam suadet venæ sectionem, ut liquet in morbis supra citatis, sed dictio *ἀπαισιμα*, in morbis commemoratis, ab oppressione, inflammatione, vel syctophæ demonstrat phlebotomiam esse remedium principale, quod sæpius vsurpandum, non tantum, quia præferendum purgationi, sed tanquam principale, in quo sit posita spes curationis, partim administrato, siue per epaphresim.

Præter venæ sectionem, Hippocrates ad euacuationem sanguinis ex parte affecta, & deriuationem sæpius utebatur cucurbitis siccis, & eruentis cum scarificatione: quomodo sit ille administrandus, & qua figura debet esse varic cucurbitæ, eleganter docuit libro de *Medico*. Nouerat etiam sanguisugas hirudines, sed ipsis nunquam est vsus, forsitan, quia serofum dumtaxat humorem subcutaneum eliciunt, & earum virulentiam reformidauit. Atque hæc pauca sufficiant de venæ sectione, plura dabo in praxi Medica Hippocratica generali, & particulari quam meditior.

Certum est in Meridionalibus regionibus hæmorrhagias, siue per nares, siue per hæmorrhoidas, siue per vterum iu mulieribus frequentiores esse, quàm in frigidis & temperatis regionibus, ut legitur apud Hippocratem lib. de *Aere*, &c. Ideoque Hippocrates, qui in calidis regionibus degebat, & sua patria calidiores peragrauit, præter sanguinis detractionem semel aut bis administratam larga copia, inchoantibus morbis, vel ad moris cucurbitis eum scarificari, eum esset expertissimus in præuidendis & dignoscendis futuris hæmorrhagiis, ipsas expectabat in febribus ardentibus, & alijs morbis inflammatorijs capitis, thoracis, ventris inferioris. Nam ex ipso Hippocrate, hæmorrhagiæ multæ difficilia mala dissolunt, lib. 2. *Epid.* mulieribus profusum menstruale morbum exoluit in *Coactis*. Commoda hæmorrhoidum fluentium declarantur ab Hippocrate libris *Epid.* in *Aphorismis*. Propterea passim apud ipsum de.

signantur signa p̄tūia & p̄nuntia h̄morrhagię futurę per nares, per vterum, & h̄morrhoidas, lumborum dolores h̄morrhoidici, apud Hippocratem in Coacis, itaque aduenientem h̄morrhagiam lubenter excipiebat, si redēt & ritē fueret, stillantem promouebat, vt in Metone, immodicē vel malē fluentem sistebat, secta vena, vt liquer ex vatiis apud Hippocratem locis.

EX CIRCULATIONE SANGVINIS

*facilius determinatur tempus, & utilitas purgationis.*

CAPVT XXI.



**C**IRCULATIO sanguinis indicat quando, quantum, & quomodo purgandum sit, posito discriminē venę Portę, & Causę, quę intra Hepar nullam, aut exiguam habent inter se communionem. Cū enim impuritas corporis in aluina regione potissimū generetur & cumuletur, excrementitij humores primę & secundę coctionis, in partibus primę regionis recondantur, & asseruentur, solo sanguine naturaliter intra venas & arterias disfluente & excurrente, quis non videt inchoantibus morbis, & paulū progreditis, atque declinantibus purgandum, si necessitas & opportunitas adsit? Hippocrates, Aphorism. 10. lib. 4. pronunciauit medicamento purgante vtendum in quida acutis, si materia turget, eodem die, tardare in talibus malum. Galenus in comment. rationem assignat p̄iulquam virtus vitata fuerit, vel febris caliditas aucta, vel ad ali-quod membrum principale decubuerint, qui per corpus vagantur humores. Cautiones alibi describit Hippocrates, in acutis morbis rarō, & in principiis, medicinis purgantibus vtendum, & hoc cum exacta p̄meditatione faciendum: eodem primo lib. Aphorism. 22. concocta medicari, atque mouere conuenit, non cruda, nec in principiis nisi turgeant, plurima verō non surgent. Galenus in comment. notat humores euacuandos esse, qui sunt in motu & fluxu, eos verō qui parte aliqua corporis firmati sunt, neque vllō auxilio mouere oportet: Subiungit, explicans alteram particulam Aphorismi, plurima non surgent, rarō, inquit, contingere, vt humores ab vnā parte ad aliam transfluant, sed frequentius accidere, vt in vna aliqua parte quiescant, atque consistant, in qua etiam concoquantur toto morbi decursu, vsque ad eius solutionem. Ergo cū sensu, & ratione cognoscā, corporis impuritatem contineri in aluina regione, sentina corporis, excrementa secundę coctionis ibidem asseruari, quidni prima die morbi, si turgeant humores à purgatione medicationem inchoabo? modō nulla adsit inflammatio in parte nobili, vel insignis plethora, quę me reuocent ab isto remedio: Medicamentum verō debet esse mediocriter orragogum, vt celerimē, sine turbatione, corporis humores in orgasmo tumultuantes & defultorios, quales sunt serosi, vel bilioli, confestim ē primā & secundā regione exhauriat.

Sed purgationi maturē succedet venę sectio, quę canales maiores deplebit, & fetuorem reslinguet: Tutius tamen erit venę sectionem p̄mittere purgationi: Vbi autem plenitudini vasorum, vtrumque satisfactum fuerit, ne humores tubulis Portę, & Causis partibus Hepatis conclusi resiliant in venam Causam, si febrilis ardor deferbuerit, nulla sit inflammatio partis alicuius principis, locus erit purgationi exacto septimo, rarō antē septimum: idque cum magna cautione faciendum: Tumque purgationes erunt blandę, minoratię, quę vacuando refrigerent sensum, sine sensu molesto, & sine magna perturbatione corporis, quod fiet per epicrasim.



## CIRCULATIONIS SANGVINIS UTILITAS

*confirmatur ad usum medendi.*

## CAPUT XXII.



**E**X circulatione sanguinis dubitare licet, an sanguis intra maiores canales assidue per Cor reuolutus possit putrescere, an aliunde accedat putredo ex sanguine venæ Portæ in alio putrescente, vel ex sanguine vasorum minorum in habitu corporis putrescente, nec diffuso: hoc enim consideratione dignum ad usum bene medendi in febribus putridis & malignis: nam si in habitu corporis putredo contineatur, videtur æquum ipsam per sudores expurgare: si canalibus venæ Portæ coëreatur, per alium euerenda erit: si intra canales maiores, minuenda venæ sectione, Cardiacis emendanda, diureticis frigidis, aut temperatis eliminanda. Si nullum vitium adsit in sanguine, cettum est putredinem alibi repositam latere, nec adhuc effusam in vasa maiora circulatoria, vel in spiritibus contineri, quod cognosces ex affecto Corde, ex pulsus magna mutatione, & sanguinis colore prauo in superficie dum calet, sed mox euanescente dum refrigeratur, sæpius putredo inhaeret sero sanguinis, jllzsa & incorrupta sanguinis massa.

Quæritur, an tum pari quantitate sit educendus sanguis, ac si corrupta ac valde fixata esset sanguinis massa: vel an sit ocyus purgandum, ad exhauriendum illud serum tenuitate sua, caliditate, & mobilitate desultorium, quod in pulmones, vel Cerebrum irruere potest. An propter putredinem non vulgarem, inest massæ sanguineæ, vel spiritibus *uicinis* virulentum, pestilens, venenatum, quod adhærens Cordi ipsum destruit, vitamque adimit? Quod cum animaduertit prudens Medicus, cautè procedet in vacuando sanguine, & potiùs partitum, quàm affatim vteretur phlebotomiâ.

Ideoque circulatio sanguinis docet febres ardentes, malignas, putridas alterantibus cardiacis, & roborantibus tractandas esse: Alterantia debent esse liquida, magna quantitate sumpta, vt perueniant ad Cor, vt quoquoersum cum sanguine per circulationem distribuuntur.

Quod spectat ad cardiaca & roborantia, rectum eorum usum indicat circulatio. In arte Medica cardiacorum speciosus est titulus, commendatio eximia, materia preciosa, sed abusus maximus, imò sæpe perniciosus. Horum quorundam manifestis qualitatibus agunt. alia occultis, siue proprietate quadam, quæ peritis Medicis valde est suspecta & infida: vt autem perscèdè cognoscamus, quænam sint dotes, siue virtutes medicamentorum cardiacorum, scire conuenit quid sit cardiacum. Illud est, quod vires, siue robur Cordis conseruat, instaurat, ac præseruat à putredine. Vis autem & robur Cordis consistit in eius temperie, & substantiæ integritate, id est, in calido innato, siue humido primigenio puro, nec inquinato. Calidum istud innatum conseruatur, instauratur puro & laudabili sanguine, & spiritu: laudabiles spiritus cudentur, & fabricantur in Corde, qui sunt yctores istius calidi, à Corde assidue manantis & fluentis in vniuersum corpus. Inde cognosces, quid sperare liceat ab illa materia quæ est inodora, insipida, inepta ad fumum & spiritum producendum. Quare spiritus cardiaca calida, vel temperata per circulationem sanguinis delata ad Cor possunt eius robur conseruare, vitium emendare: atque cum sanguinis virtus à Corde procedat, ferme in omnibus morbis, istius partis potissimum habenda ratio, tam sumptis, quàm admotis cardiacis.

## EX CIRCULATIONE SANGVINIS

*delectus venarum in mittendo sanguine facilius  
innotescit.*

## CAPUT XXIII.



T rectè instituat & præferbatur venæ sectio ad curationem morborum, & deplendos locos affectos: scire convenit variam distributionem sanguinis in tres locos differentes, eiusdem motum, & quietem, naturam sanguinis venosi & arteriosi, communicationem vasorum inter se, & quomodo diversi isti loci depleri queant. Id clariùs & plenius explico: aliter distribuitur sanguis in ventre inferiore, aliter in Cerebro, aliter in reliquo corpore. Venter inferior habet suam venam peculiarem, nempe portam, quæ alit & alluit partes, quæ constituunt primam corporis regionem. Sanguis ventris inferioris non est mobilis & circulatorius, distinctus tamen à sanguine venæ Cavae: admittit quidem arteriosum per arterias coeliacas cum venis portæ communicantes. Sanguis istius ventris commodè depletur, pedis venis apertis, venter medius cum reliquo corpore, excepto capite, nutritur sanguine venoso & arterioso excurrente per uniuersum corpus intra truncos venæ Cavae & Aortæ. Istius sanguinis portio quanta sufficit, per propagines vasorum in carnes & viscera diffunditur, quæ sanguinis portio non mouetur circulariter, & tamen communicat cum sanguine arteriarum vicinarum & coniugarum. Deplentur partes illæ sectis venis supernis, & infernis. Caput solo sanguine subtilissimo arterioso alitur, immorū habet circumfluum, & circulatorium, sed tardum & obscurum. Superflus iste sanguis è sinubus duræ meningis decurrit in venas iugulares & ceruicales. Depletur venis sectis brachij & iugularis externæ apertione.

Præter ista considerabis truncum venæ Cavae rectum & continuum esse, à clauibus usque ad Os Sacrum. Aortam quamvis paulum sit incuruata in diremptu rami ascendentis, & descendentis, esse tamen ductum continuum sicuti truncum Cavae: Truncus Cavae in Corde non est interruptus, sed tantum latere sinistro adaperitus, ut adhæreat Cordi. Sub Hepate repit, eique ramum se ipso minorem præbet: propterea sanguis liberè per istos canales amplos venæ Cavae & Aortæ excurrit, & sectis venis brachij, vel pedis alterutrius depleri possunt.

Verùm ex doctrina Circulationis Harueianæ, sanguis per venas omnes, & præcipuè per truncum semper ascendit, vel recurrit ad Cor, nequaquam descendit. Idcirco apertis venis brachij, vel pedis, cursum suum non immutat, ac proinde qui detrahitur sanguis, manat ab illa parte venæ sectæ, quæ est infra vulnus inflatum, istius venæ furculi in extremitatibus manus vel pedis ab arteriis sanguinem accipiunt. Ego verò statuo per nouam circulationem, sanguinem per propagines truncorum venæ Cavae & Aortæ fluitare, in partibus huc & illuc diffuere, sed intra suum canale, id est, ascendere & descendere. Interdum remeare, si regurgitet, vel refluxet in truncum suum, vel si truncus exinanitus fuerit, resorberi, ideoque cum vena Cephalica sit soboles trunci, similiter Saphena: Istis venis sectis, quæ carent arteria coniuge, truncus Cavae deplebitur, quia successione vacuati, siue fugâ vacui trahitur sanguis ab ipso trunco. Idem non accidit sectâ basilicâ, quia in hac vena non descendit sanguis, quoniam à manu continenter ascendit ad Cor. Propterea non obseruabis par emolumentum sectâ Cephalicâ vel Saphenâ, ac si secarentur basilica, poplitea, vel ischiadica, quia venæ istæ sectæ magis refrigerant, quia trahunt ex doctrina circulationis à parte affectâ per arterias, quæ communicant cum venis, ideoque & per venas, & per arterias vacuat sanguis usque ad partem affectam: sed velim in detractione sanguinis medium corporis in Hepate constitui, ex Galeno. Idcirco partes corporis quæ sunt supra Hepar inclusiue, leuantur magis detracto sanguine è venis supernis, partes quæ sunt infra Hepar exclusiue, facilius exonerantur sectis venis infernis, ipsæque vena porta, quia nō habet refluxum ad Hepar & Cor, ne-

que communionem cum vena Caua, commodè depletur apertis venis infernis, quia sanguis in partibus, quæ aluntur à portæ æstus vel redundans, exhaustur per arteriam Coeliacam, quæ in Aortam descendente sese exonerat, atque recto cursu sanguis arteriosus fluens in pedes secunda venâ popliteâ, vel ischiâ sic vacuatur. Atque vti nam secaretur hodie poplitea, quæ est continuatio cruralis rami, vt facere solebant Medici, haud dubiè maius emolumentum perciperetur, vt in brachio secunda basilica: & nisi imperitis Chirurgis periculosior esset ischiadica, siue malleolaris externæ venæ apertio, propter neruum & arteriam ipsi accumbentes, huius venæ sectionem præferrem Saphenæ.

Interea notabis anastomoses venarum & arteriarum fieri in cruribus ab inguine vsque ad pedes: In brachiis ab axilla vsque ad manus. Cæterum reuulsio à capite, quæ speratur & desideratur secunda Saphenâ non adeo commodè fieri potest, apertis venis pedis, ac si brachij venæ tunderentur, quia sanguis trunci venæ Cauæ non descendit, & caput pars est distantissima, à qua per arterias non potest tam citò reuelli, nisi copiosa fuerit sanguinis vacuatio, quæ antè, deliquium animi adferret, ob iacturam spirituum, quàm caput exoneraretur. Neque per arterias carotidas sanguis descendere potest, ideoque præferrem venam basilicam brachij, quoniam axillaris continuatio est subclauis, quæ iugulares venas producit, sanguinem Cerebri reuoluentes in venæ Cauæ truncum. Cùm autem in dextro brachio ab ipsa subclauia arteria enascatur carotis, secunda vena brachij dextri potius quàm sinistra, citius depleret Cerebrum, & si per axillarem venam descendat sanguis ad brachium successione vacuati, breuiore via leuaretur Caput secunda basilica, quia per iugulares sanguis descendit à Capite in Truncum: at iugulares internæ & externæ à subclauio ramo emergunt, cuius axillaris continuatio est, defectum istius utilitatis supplebunt cornicula, siue paruæ cucurbitulæ plures supra angulos omoplatarum, & supra claviculas admotæ, etiam cum leui punctione, poterint reuelli à Capite, ex doctrina circulationis, si sanguis per venas à Capite refluus descendat per iugulares ad truncum Cauæ.

Præter Coeliacam arteriam, quæ deplet omnes partes nutritias, in quas distribuitur sanguis venæ Portæ, per refluxum sanguinis in aortæ descendentis Truncum, venæ etiam hæmorrhoidales tam internæ quàm externæ, quæ in extremitatibus recti intestini communicant cum ramis arteriæ Coeliacæ eò productis, partes illas exonerare possunt.

Atque hæc diligenter notanda sunt ei, qui ex circulatione sanguinis, eius vacuandi vias commodas inuestigabit. Ac ne alicubi lector hæreat, repetam adhuc sanguinem, tam venosum venæ portæ, quàm arteriosum coeliacæ non circulari per corpus vniuersum, nisi per accidens raptus, vel delatus fuerit in maiores illos canales, ideoque sanguis ille intra suos canales fluere potest: Similiter sanguis minorum vasorum, quæ à maioribus canalibus Aortæ & venæ Cauæ producta, sparguntur per vniuersum corpus, non circulator, nisi æstu & orgasmo quodam resiliat in truncum maiorum canalium, vel defectu sanguinis circulatorij rapiatur. Attamen motum habet, dum effluit in carnes ad nutritionem, vel à valis reforbetur. Potest ille descendere & ascendere, si secentur propagines maiorum canalium, quæ data porta ruet sanguis, vt in hæmorrhagia narium, vteri & hæmorrhoidum, quin etiam secus cephalicâ & Saphenâ, quæ sunt propagines maiorum canalium, potest sanguis venosus solitarius facilius descendere, quàm apertis poplitea vel basilica, quæ sunt continuitates maiorum canalium, ac proinde recipiant, ac mutantur suum sanguinem ab arteriis, vt venæ in coniugatæ sanguinem suum accipiunt immediatè à venæ Cauæ tronco.

Quod si totus sanguis, ex *Hæmo*, ter vel quater in die circuletur, tam è partibus supernis, quàm infernis, ter vel quater paulatim eductus intra vnum diem, multum prodesset ad febris ardentissimæ extinctionem. Atque hoc docere deberent, qui frequentem circulationem sanguinis pertinaciter tuerentur.

Sunt autem partes quædam principales, quarum depletio per venæ sectionem obscura est, viz nō satis cognitæ. Pusmo admittit sanguinē per venam arteriosam, non habet regressum ad Cor, sed traducitur in arteriam venosam, quæ refundit in sinistram Cordis ventriculū, & Aortam. Inde patet via vacuandi sanguinem è pulmone per arterias, ex circulatione sanguinis. Non possum probare opinionem *Fernely*

pulmonem facilius depleri, si fecetur vena brachij sinistri, quia truncus venarum Cavae per latus suum sinistrum iungitur Cordi, & per istum hiatus, sanguinem ei suppeditat, ideoque secundum rectitudinem fibrarum sanguis facilius attrahitur: sed rectitudo illa fibrarum in missione sanguinis iam dudum explosa est, & sanguinis fluxus in dextrum Cordis ventricululum dumtaxat, reucllitur per venarum sectionem, sed quomodo sanguis congestus in pulmone exhauriatur, non explicat.

In pleuritide ex latere affecto sanguis reucllitur secta basilica, quia ab axillari ramo manat thoracica, tam arteria, quam vena, quae communicant cum vena azygo, & arteriis Aortae per intervalla costarum intercurrentibus: Si pulmo adharet lateri, & verum sit pleuritidem omnem degenerare in peripneumoniā, via facilis est per pulmonem, vt iam descripsi. Hepar affectum per venam suam Hepaticam, sic appello, sepe exonerat in truncum Cavae: Cum autem sanguis naturaliter ascendat ad subclauias, secta basilica, successione vacuati, potest commodius Hepar vacuari, quam sectis venis pedis. Non video, quomodo per arterias Hepatis, via brevis & facilis dari queat. Nam arteriae duae, quae in Hepar feruntur sunt exiguae, nec sanguis arteriosus furtim remeare potest. Lien habet suam vacationem per venas inferiores sectas, siquidem admittit arteriam insignem, amplitudine aequalem venae Splenicarum, quae supra coeliacam orta, indiuisa, sed ambagiosa & anfractuosa decurrit ad Lienem. Per hanc arteriam sordes intra Aortam fluitantes deferri ad Lienem puto. Inde ad intestina & renes deriuari. Ambagiosa est haec arteria, ne humores vitiosi affatim irruant in hoc viscus, & obruant. Per hanc arteriam sanguis Lienis in truncum Aortae reuelli potest: Ac proinde euacuandus erit per partes inferiores, siue pedis, siue ani venae referentur. Capitis deplendi via brevis & expedita per iugulares externas, si secarentur. Earum defectu per venas brachij id fieri potest, quia sanguis per iugulares descendit ad subclauias. Inde ad Truncum, ex doctrina circulationis. Verum sectis brachij venis quā data porta ruet. Sed propter flexus & ambages viarum, sanguis qui in ramis plexus retiformis haeret, vel qui influxit in ventriculos per plexum choroidem, vel qui detinetur intra arteriolas durae meningis, vel qui intra venulas extimae Cerebri substantiae anfractuosa, diffusus est, ex his locis difficillime reucllitur. Solus qui in canalibus amplis durae meningis continetur, facile exhauritur. Aliarum partium viae sunt patentissimae, & liberissimae ad reuulsio- nem, & vacationem sanguinis.

Haec meditatio Medicis artis suae studiosis, magnam lucem adferet in missione sanguinis, vt recta fiat sine frustra sanguinis iactura. Ridebunt alij negligentiores, & explodent tanquam inanem & frivolum, cum haec non felicitate facta fuerit Medicina, sine ista curiosa viarum indagatione, quia nostrum corpus est confusibile & conspicabile. Natura per se docta vias inuias nobis incompertas inuenit, ad sese exonerandum, cego dabitur penetratio dimensionum in nostro corpore, & humor, extruatus progrediendo penetrabit, sibi que vias parabit nouas, quod est valde absurdum, periculosum, ac vi perniciosum.

## PER CIRCULATIONEM SANGVINIS

*dignoscitur, quomodo sit minuendus ad curationem mor-  
borum, an per vena sectionem, vel dietam, &  
quamnam via sit tutior?*

CAP. XXIV.



CONSIDERATIONE dignum, vtrum pro salute aprotantium istam circulationem sanguinis retardare liceat, vtendo paucis remediis vacuantibus, sed potius conuenienti & optima viarum lege, & alterationibus cardiacis medicamentis morbum oppugnando, vel istam circulationem sanguinis frequentem procurare debeamus per inedia ex- quisitissimam, vel per copiosam & liberalem sanguinis vitiati euacuationem, atque

utrum præferenda sit circulatio sanguinis per exactam inediam ei, quæ fit per largam phlebotomiam. Hæc enim accuratè pensitata, Medicos admonebunt, de modo in istis remediis seruando, vires ægri, & qualitates sanguinis cum natura morbi exactè comparando.

Atque ut primæ propositioni satisfaciam, *Galenus lib. 2. de duobus criticis, cap. 11.* Medicos redarguit nimium sedulos & officiosos; in remediis importunè & intempestivè adhibendis, ubi quiescendum erat, quod interturbat motus naturæ, impedique crises: Prudenter dicebat *Vidus Vidius*, Medicum plures sanaturum ægrotantes, si sciret se essentaturæ ministrum, ac sane stultum est aliquid agere, ubi quiete & otio opus est, inquebat *Euripides*, verùm

..... alitur vitium, vinitque legendo,

\* Si medicus adhibere manus ad vulnera Pastor

*Abneget, & meliora deos sedes omnia possent.*

Ideoque non ita sidentum bonitatinaturæ, ut totum ei curationis negotium committamus, suppetias & auxiliares manus labanti, & afflicte interdum adhibere conuenit, ne succumbat oneri, per ea remedia, quæ ars perito Medico suadet, & suppeditat: Multa enim ars perfectius facit, quàm natura, inquebat *Aristoteles, 1. Mechanicorum*, & post eum *Fernelius, lib. 1. methodi, c. 2.* Ideoque phlebotomia, & catharsis, prout expedit utendum erit, non neglectis cardiacis intus assumptis, & foris admois, quæ resistunt putredini massæ sanguineæ, ut habeatur semper ratio Cordis in summa impuritate sanguinis, ne sæpius recurrens ad Cor, aliquid inquinamenti sui relinquat: sed optimus auerruncus putredinis est phlebotomia, per epaphræsim, & catharsis, si morbus exigat, per epicrasim. Verùmile est Ægyptios in omni moda abstinentia detinuisse ægrotantes, quando prohibuerunt ante quartum diem quiddam moliri per medicinam. Atque multos morbos per famem triduanam, vel quatrinduanam perlanatos fuisse certum est, dum sic excoquitur vitium, atque exsudat inutilis humor, beneficio caloris natui, cuius proprium est cogere homogenea, & separare heterogenea. Ideoque humoribus aluique regionis per medicamentum non confusus & perturbatus in corpore impuro, nihil impurum aut paucum Cor ingreditur, sed potius robore caloris natui in Corde conclusi, procul ab isto viscere in partes inferiores amandabitur. Itaque merito dubitaret aliquis, num in corpore mediofiter sanguineo, modò dolor acutus, vel partis alicuius internæ inflammatio, vel febris ardens non vrgeant, sistius sit, & ægro conducibilius manere in quiete, nec mouere camarinam, totum negotium relinquendo naturæ morborum medicatrici, quàm interiora corporis remediis agitare, & conturbare, seruando tamen exquisitam victus legem ab *Hippocrate* præscriptam, ut corpus aliquatenus sustentetur, & sordes massæ sanguineæ potu liberali medicato euerrantur. Quod si plethoricum fuerit corpus, confestim sanguinem simul atque iterum detrahes, ad minuendam vasorum plenitudinem, & sanguinis qualitatem considerandam: quæ si praua fuerit, audaciores erimus in mittendo sanguine, ut refluu arteriosi sanguinis in venas depletas & vacuas aliquatenus emendetur vitium sanguinis venosi. At sanguis ille arteriosus recto tramite per venas maiores recurrit ad Cor, non interruptus, intactis aliis visceribus impuris, quæ refugit & præterlabitur. Ideoque nihil de inquinamento viscerum ægrotantium secum deferet ad Cor, nec in visceribus illis quiddam commouebit, sed dumtaxat suum cursum absoluet per Cor circulatus, donec ex alimento venosi sanguinis iactura refarciatur. Cæterùm, si febris non dicatur, aut existat, nisi calor fuerit in Corde accensus, verisimile est sanguinem arteriosum magis ardere in suis vasis, quàm in venis: ac proinde ignem febrilem in arteriis potius contineri, quàm in venis. Quare in ardente febre copiosè detrahendus sanguis venosus, refrigerabit arterias, tandemque successione vacuati totus recurret ad venas, ubi magis refrigerabitur, tam per exhalationem aerentium spirituum, quàm distillationem & liberauiorem excursus, atque permixtionem sanguinis venosi. Idcirco nonnulli prædici iudicarunt, quod vnciæ vna sanguinis arteriosi vacuati (si possit arteria tuto secari) plus prodesset, ad extinguendum incendium febrile, quàm vnciæ duodecim sanguinis venarum. Deinde sanguinis arteriosi permixtione intra venas, impuritas vel cruditas sanguinis venosi coqui & emendari poterit. Attamen isto remedio non est abutendum, quia ab *Hippocrate* scriptum, *Aphorism. 3. lib. 1.* vasorum coincidentia ad extremum non esse ducendas, periculosum enim, sed qua-

lie natura fuerit eius qui perferet, ad hoc ducere conuenit. Sic & vacuationes, quæ ad extremum deducunt sunt periculose. Item de altero remedio dietetico in morbis seruando monuit. In tenui viâ ægri delinquant, quod fit, vt magis lædantur, quicumque enim error committitur, maior in tenui fit, quam in paulò pleniori viâ.

AN ACEPHALEOSIS HUIUS TRACTATVS.

CAPVT VLTIMUM.

**N**ON defuturos præuideo calumniatores, quibus insolens & superbus videbitur hic titulus, *Instauratio magna Physicæ & Medicinæ per circulationem sanguinis*, & desiderabunt huius rei adhuc incertæ & litigiosæ certas demonstrationes, cum non constet adhuc de hyparxi inter Philosophos, neque inter Medicos, quosdam approbantes, alios ipsam repudiantes. Sed ego post *Harueum & Valeum*, circulationem sanguinis, adeo certam & veram esse demonstrauit, vt nemo sapiens de illa deinceps dubitare queat.

Nostra inter *Harueum & Valeum* controuersia consistit, de totius vel dimidiati sanguinis circulatione, de cursu celeritate vel tarditate, de transitu sanguinis per septum Cordis, vel per medios pulmones. Ego verò supra primos circulatores sanguinis etiam demonstrauit circulationis sanguinis vsus ad bene medendum,

Nunc autem ostendam instauracionem magnam Physicæ Peripateticæ ex circulatione sanguinis, si prius probauerò ex *Hippocrate & Aristotele*, aliis adductis locis, ipsis non fuisse ignotam. *Hippocrates* passim vocat magnas venas, siue canales maiores venæ Cauræ & aortæ *ἀμύμονες*, sanguifluas venas, quasi in istis canalibus solis fluere sanguis, & lib. de locis in homine: Communicant omnes ytnæ, & confluunt inter se mutuo, per venulas à venis extentas, quæ autem carnes nutriunt ea parte inter se confluunt. Elegans locus extat apud *Hippocratem*, libro quarto de morbis: fontes humorum quatuor, quos nominaui, quum pleni fuerint, semper corpori distribuunt, quum verò vacui vniuersa trahunt ab ipso ventriculo, & res se habet hoc modo, veluti si quis tria aut plura ænea vasa in planissimoloco componat, & coaptata quam optimè disponat, fistulis ad foramina insertis, atque ita placidè in vnum vas aquam infundat, donec omnia ab aqua fuerint expleta, ab vno enim disfluat in reliqua vasa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquam autem plena fuerint vasa, si quis de vno aquam effundat, retribuet se retrò fluens aqua ad vnum vas, & vacua fient reliqua vasa, rursus quemadmodum etiam susceperunt. Sic sanè & in corpore se res habet, & subiungit: venæ donec viuunt homo, apertæ sunt, & suscipiunt, & dimittunt nouum humorem. En adumbratio & delineatio circulationis sanguinis.

Apud *Aristotelem*, cap. ult. lib. 4. de generatione animalium, manifestè videtur expressa circulatio sanguinis. Vt mare, & omnem humorum naturam subsistere, mutarive pro flatu motu, & quiescere videmus: Aërem verò & status pro Solis & Lunæ circuitu affici, sic ea quæ ex iis, aut in iis oriuntur, sequi necessum est. Nam vt rerum minus principalium circuitus, sequantur magis principalium rerum circuitum ratio est, inde iudicate, si Sol & Luna circuitum faciunt, si humores parem circuitum non debeat in corpore perficere. Nam humores nostros secundum Lunæ quadrans moueri certum est, alij motum imitari maris fluxu & refluxu, quinetiam nostri corporis humores, secundum diei quatuor partes moueri scriptum est à *Sorano*, in *Isagoge Medica*. Sed admirabilis est: peculiaris motus humorum in febribus, dum alius tertio die, alius quarto, alter quotidie mouetur, & sæpius circulat in febribus.

Probo nunc instauracionem Physicæ Peripateticæ. Scitum est ex *Aristotele*, Cor esse officinam sanguinis, ideo excavatum ad excipiendum sanguinem, in iecore præparatum, quem Cor perficit, aptumque reddit ad conseruandum & reparandum calidum innatum, spiritu & calore perfusum, corpori coextensum, omniumq. partium nutritione. Ideoque duplex sanguis existit, diuersis canalibus inclusus, & deductus, arteriosus, & venosus: Cautas Cordis diuisa est in tres ventriculos, ex *Aristotele*. Pri-

Ecc

mus, dexter, maior & calidior, excipit sanguinem semicoctum & imperfectum, ab eo in medium progreditur: Inde in sinistrum ventriculum deducitur, qui minor est & frigidior: Appulsus autem continuus sanguinis Cor intumescere facit, expulsio subsidere. Inde motus elevationis, siue dilatationis, atque depressionis, siue contractionis, quod est motus Cordis.

Porro tres ventriculi Cordis, ita positi deteguntur, si à basi digiti distantia Cor transuersim secueris, innennes tres cauitates, vnam ventriculi dextri, alteram medij in aorta, quæ à septo Cordis nascitur, tertiam sinistri ventriculi, atque si Cor mortui animalis resupine iacentis obseruaueris, tria vasa in conspectum veniunt, sic alternatim disposita, vena Cava, Aorta, & vena Arteriosa, ita ut aorta sit media, inter illa duo vasa memorata, quæ tamen pertinent ad dextrum ventriculum, inuerso Corde apparet arteria venosa, ideoque ratione aortæ collocatæ inter duo vasa, credidit *Aristoteles*, medium sinum Cordis esse partem extremam dextri ventriculi, cui aorta adhzret. Nam constituit medium ventriculum in Cordis septo immobili, quia principium quiescere debet. Tale autem erit, si sanguis purus & mediocris, tum copia tum calore sit: siquidem in dextro est sanguis calidissimus, in sinistro frigidissimus, ex affluxu & afflatu perenni aeris, in medio purus & mediocris consistit, in exitu fistula aortæ est arctior ipsa vena Cava. Quare fallitur *Clarissimus Lucius*, dum arteriam venosam de medio sinu oriri statuit ex mente *Aristotelis*, & in humano Corde medium sinum, esse partem dextri propter appendicem, à basi dextri ventriculi exurgentem, versus æquam partem sinistri ventriculi, nisi pro appendice accipiat portionem membranosa valvula tricuspidis. Horum omnium veritatem manifestè docet circulatio sanguinis. atque Cordis principatum & imperium supra omnes corporis partes, quæ subditi ipsi suum ortum & viam debent, cui etiam ministrant & inseruiunt, atque omnes ad Cordis conseruationem laborant, nisi seditio, vel perturbatio aliqua in corpore superueniat, quæ illas à suo familiaritio distrahat, propterea regimen & directio œconomix animalis, eiusque continuatio vsque ad Intantum dependet à Corde ratione circulationis sanguinis.

Medicus præter noticiam de principatu Cordis, actione & motu, quam habet cum Physico communem, ex circulatione causas pulsum, & respirationis dignoscit, discit etiam in curationibus morborum, rectam methodum videntis phlebotomia, & purgatione ex nostra circulatione. Nam si nouerit venam Cavam distinctam esse à vena Porta, vnamquamque separatam ac diuersum sanguinem continere, sanguinem portæ impuriorem esse: Mineram omnium ferè morborum residere in prima regione, atque febrium intermittentium ibi sedes collocari: Atque in Corde, eiusque vasis amplioribus venæ Cavae & Aortæ sanguisui & circulatorii, contineri alium sanguinem, diuersum ab illo portæ, qui formatus fuit ab Hepate solo: præterea ex illo sanguine fabricato in Corde, humidum primigenium corpori coextensum reparari, partesque solidas nutriri, atque ex ipso sanguine fluente & refluxente ad Cor instar Euripi, sui motus continuitatē habere: insuper in Corde, & in istis canalibus amplioribus febrium continuarum focum contineri, nec febres intermittentes suscipiari, & ardore suo manifestari, nisi humor febrilis ad Cor peruenerit: Is inquam, qui cuncta hæc nouerit, prudentius & cautius agat in mittendo sanguine, vel purgatione administranda, quæ duo sunt remedia præcipua curationis, deinde si sciuerit dimidium sanguinem contineri in vasis circulatorii iam enumeratis, quando sanguis purus apparuerit post multas phlebotomias celebratas, cautior erit, nisi quid vrgeat, in iterando isto remedio, iam ad quatuor vel quinque libras administrato, ne sanguis venæ portæ impurus refluat in causam, & massam sanguinis inficiat & corrumpat. Inde captabit occasionem purgandi ex octo septimo die, qui terminus esse solet febrium acutarum, nisi adsit inflammatio alicuius visceris principalis. Cumque *Galenus* febrium intermittentium sedem constituerit in capillaribus venis, per habitum corporis dispersis, atque omnes impuritates tenuiores massæ sanguineæ, robore naturæ in habitum corporis, tanquam commune emulsarium amandentur, non improbarem sudorem prouocatum, siue liquidis medicamentis assumptis, siue integumentis iniectis, si ed motus naturæ inclinaret criticis diebus, vel aliis salutaribus, ab *Hippocrate* commemoratis, quales sunt sudores incipientes tertia die, quinta, septena, nona, vndecima, quod cum diligenter obseruaret *Hippocrates*, venæ sectionem distulisse, vel non adhibuisse credibile est: quoniam ex ipso præcipiente




quæ iudicantur & iudicata sunt integrè, neque nouare, neque medicamento mouere, sed sinere oportet, quod non facit hodie. Veteribus tamen vſitatum, & apud alias nationes feliciter administrari vidi, itaque defectu ipsius remedij prætermiſſi, impuritas in habitum effuſa, reuouatur ad venas & arterias maiores, magno ægrorum damno.

Cæterùm Cyclica medicatio Methodicorum, longè differt à circulatione sanguinis. Nam illi ſeriem quandam remediorum conſtituebant, quæ alternatim fieri deberent, quibus peractis, eandem telam retexebant, id eſt, eadem iterabant remedia, quod erat per circulum mederi, vt legitur apud *Calium Aurelium*, *Oſianum* *Horatianum*, qui erant Methodici Medici, & talem methodum medendi deſcripſerunt. Duplex autem erat circulus, vnus reſumptiuus, alter reſcorporatiuus, ſiue metalyneriticus: in illis modum duplicem obſeruabant, adiectionis, & detractionis: illi hæc omnia diligenter expreſſa paſſim occurrunt apud *Calium Aurelium*, in curationibus morborum.

## F I N I S.







# IOANNIS RIOLANI

## NOTÆ

### AD DVAS EPISTOLAS IOANNIS VALÆI.



IX ab animo meo impetraui, vt dēdo scriberem de circulatione sanguinis.

*Ah queritur calamo crassus quod pendeat humor*

*Ater, & infusa raneſcat ſeſia lymphæ.*

Deterrebat me ab hoc opere modesta præmonitio & præcautio, aduersus iniquos cenſores propoſita à Valæo, initio ſuæ ſcriptio- nis: Verebar etiam ne crambe toties repetita ſaltidium adferret, ſed tūc viderem meam opinionem ſtare non poſſe, niſi huic circulationi ſanguinis nimium licentioſæ, diffuſæ, ac præcipiti per vias iniuias & obſcuras, intra horæ quadrantem completæ & ſolutæ, temperamentum quoddam adhiberem, atque ſcirem ex Seneca, nil ſatis dicitur, quidd nunquam ſatis diſcitur. Coactus fui iſtas notationes ſuper duas eius episto- las exarare, quas accurata cognitio, & pericia rei Anatomice (abſit dicto inuidia) ac frequens de circulatione ſanguinis meditatio, ad vſum artis medicæ reuocata, mihi ſuggeſſere. Turpe eſt ſilere, & Xenocratem pati loqui, inquiebat Iſocrates, mode- ſtè tamen pro more meo agam cum viro doctiſſimo, quem cum Hæruas, æternâ lau- de & commendatione dignum iudico, ex iſto ſcripto Anatomico quamuis exiguo:

*Sapiens in libro memoratur Perſius vno,*

*Quam levis in terra Marſus Amazonide.*

Admitto quidem circulationem ſanguinis, ſed non eo modo quem deſcribunt Hæruus & Valæus, volunt enim totum ſanguinem ex omnibus corporis partibus circ- ulari, id eſt, ab Hepate ad Cor traductum per arterias in corpus vniuerſum celeri curſu diſtribui. Dein ab extremis partibus ad Cor pari curſu per venas totum ſanguinem redire, hancque viam ire, ac redire intra dimidiam horam, in ſuo fluxu & reſſu- xu, ſi credimus Valæo: ſpatium amplius aſſignat Hæruus, ſed vterque ſanguinem è dextro Cordis ventriculo ad ſiniſtrum deriuat per pulmones, ſecundum ductum vene- næ arterioſæ, quæ reſundit in arteriam venoſam, vt deducat in ſiniſtrum ventricu- lum, inde in aortam celeritè quouoerſum diſtribuit, ſicque ſolos ſanguis arterioſus nutrit ex eorum opinione. Ego verò iam demonſtraui totum ſanguinem non circulari, nec per medios pulmones ſecundum naturam, tranſire à dextro Cordis ven- triculo in ſiniſtrum, ſed per medium ſeptum Cordis, poroſum, ac foraminulentum,

Ecc hij

nec solum arteriosum nutrire, verumetiam venosum, ac proinde constituo duplicem sanguinem corpus nutriendum & viuificantem, *Venosum & arteriosum*, huncque solum posse nutrire, sed illum non sufficere absque arterioso. Vtrumque diuersis canalibus coerceri, quamvis in Hepate prius elaboretur, sanguinis purè venosi canales sunt ex vena porta: sanguinis purè arteriosi canales maiores sunt ex aorta: sanguinis arteriosi mixti canales sunt ex vena cava, qui quidem canales directè à Corde tanquam à fonte perenni ad extremos artus, & caput excurrunt: Intra quos abfoluitur circulatio sanguinis, bis terve intra diem naturalem iterata, in minoribus ramis Aortæ & Cavae nulla fit circulatio sanguinis, quia in istos canales diffusus sanguis tam venosus, quàm arteriosus, est nutritius ac vitalis, alendis partibus destinatus, nec refluat ad Cor nisi per accidens. Venosus sanguis venæ Portæ nullam habet circulationem, siue recursum ad Cor, sed fluit ac refluat intra suos canales, & habet comitem & socialem sanguinem arteriosum, intra coeliacam arteriam amplissimam inclusum, qui similiter non circularur. Omnes istas propositiones verissimas demonstravi præcedenti tractatu: Superest epistolas duas *Valis* examinare, ut meæ opinionis veritas magis elucescat, & confirmetur.

In primis *Valen* agit de motu chyli, quem examinabo, vbi prius meam sententiam de motu chyli intra, & extra ventriculū præmiserim, ut æquus lektor, de vtraque possit melius iudicare.

Motus chyli duplex est, vnus localis intra ventriculū, alter progressius de loco in locum extra ventriculū. Motus chyli intra ventriculū, est alimentum assumpti alteratio, quæ fit per elixationem sicci alimenti cum humido, quæ contritum & subactum alimentum vertitur in substantiam liquidam, cremori hordei consimilem, quæ chylus nuncupatur, ut ipsa coctio facta in ventriculo chylosis dicitur.

Quomodo fiat isthæ chylosis dubitatur inter Philosophos & Medicos: quidam tribuunt idiosyncrasiam ventriculi, siue peculiari facultati, quæ natus & apertus est hanc actionem publicam præstare & perficere. Alij authorem huius operis constituunt spiritum cum sero arterioso, alij ad succum acidum Lienis referunt, quem desipit per vas breue, vel alias venas in alueum ventriculi. *Aristoteles*, *lib. 2.4. Probl. 26.* querit. Cur aqua seruens liquefacere nequeat, venter queat? an quia ventris calor temuitate sua subire potest, aqua sua crassitudine nequeat? An quod cætera quæque liquefieri humor prohibet? nulla enim res est, quæ intra humorem delabi & tabescere possit: at in ventre, si humor in vesicam secedat, facultas resoluendi acquiritur. *Philosophus* in hoc Problemate modum coctionis & dissolutionis alimenti in ventriculo manifestè declarat: per ventris calorem intelligit substantialem, siue calidum innatum cum suo spiritu, ventriculo infixum, quod elixando liquat alimenta laxabilia, alioquin sicca, & exsucca, & incocta remanerent: atque vbi ista liquatio commodè fiat, necessum est secerni superfluum humorem quem vicinus Lien, & accumbens, ex *Aristotele*, emulget, & in vesicam transmittit, ut per elixationem alimenta facilius dissoluantur. Consentanea scripsit *Paracelsus* ænigmatice, dum fingit Archeum cum suis mechanicis spiritibus, coctionem alimenti in ventriculo perficere. Archeus ille nil est aliud, quàm *visus* calidum innatum, quod cum suis spiritibus hoc opus absoluit. Id si sciisset, qui *novas coniecturas super digestionem alimenti in ventriculo* edidit, de inuentione causæ dissolutionis alimentorum in omnibus animalibus, præcis, & recentioribus Philosophis & Medicis incognitæ & indictæ, non tam superbè gloriaretur.

Paucis igitur expendamus istud solertissimum & ingeniosum inuentum. *Stulta est clementia, cum tot occurrat scriptis peritura patere charta.* In chylosi omnium animalium considerari debent dissolutio, coctio, & distributio. Coctio fit per elixationem à calore, at quæ elixantur, ab humore emolliuntur dissoluta in minimas particulas, sed non eo modo, quo chylus in ventriculo. Ergo requiritur aliud dissolvens penetrabile, nec aliud esse potest, quàm spiritus subtilissimus cuncta rerum permeabilis, qui alimento permixtus hoc opus peragat. Hunc spiritum suppeditat ventriculo vicinus Lien, ex innumeris arteriis contextus. Itaque dissolutum alimentum cuiusvis saporis dulce fit, quia mitificatum, colorem candidum acquirit ex vario situ elementorum, dum aeris partes superficiem occupant, terrenis ad medium locum repositis & incarcerationis.

Non possum hanc subtilem & nonam Philosophiam admittere, pisces enim carent Liene, & aues noram Lienis habent, pisces quia pulmonibus carent, aues quia parca bibunt, ideoque non indigent Liene, qui exsugat & absorbeat superfluum humorem, ut perfectior fiat elixatio, ergo in istis animalibus Lien non potest istum spiritum dissolventem subministrare ventriculo. Spiritus ille reperitur dumtaxat in animalibus terrenis quadrupedibus, & bipedibus. Atque istotum animalium quoddam quadruplicem habent ventriculum, ut per istos ventriculos successuè traductum alimentum, variis alterationibus subigatur. Alia ruminantia assumptum alimentum ad Os regerunt, ut noua masticatione plenius conficiatur & excoquatur, ergo non dependet absolute ab isto spiritu dissolutio alimenti, quia dissipatur in ista remasticatione. Fateor ramen calidum innatum ventriculi spiritu refertum esse, simulque cum calore agere in alimentum, quod elixando dissoluit, ac liquefacit, ut in succum cremori hordei consimilem vertatur, quod non accidit ex varia dispositione elementorum, sed à candida & spermatica substantia ventriculi, vndique amplexantis & constringentis alimentum. Scitum est illud Philosophorum, quod alterans alteratum in suam substantiam conatur permutare: sic sanguis in mammis albedinem contrahit. Sic purissimæ partes sanguinis tam venosi, quam arteriosi albescent in testibus ad feminis elaborationem. Pulmonum parenchyma albescent ab inspirato aëre: chylus autem non dulcoratur, nisi fuerit ad Hepar perductus, ubi portiones heterogeneæ fecernuntur, quamuis portiones quasdam amiserit, in secretionem illa, quæ fit in principio venarum lactearum sugentium chylum, tumque dulcis euadit in sanguinem conuersus: Ceterum fateor alimenta integra natiuos spiritus intra se habere, ut sunt herba, grana, quibus pascuntur animalia, ipsæque carnes animalium, sed in alimentis prius elixatis, spiritum natiuum remanere non puto, neque in pane qui paratur ex tritico molito, farina saccata cum aqua subacta & pinfitra, tandem in furno cocta post varias alterationes, potestne superesse naturalis spiritus alimento inlitus? Quomodo alimentum in ventriculo coquatur, varias pericorum sententias profert *Celsus, in Praefatione lib. 1.*

Hæc opinio probabilior mihi videtur, alimenta coqui in ventriculo caloris beneficio, tam ipsius ventriculi, quam partium adiacentium, quia ventriculus instar lebetis, duo habet accumbentia viscera Hepar & Lienem, quorum calore tanquam focus ignis calefcit, suumque calorem roborat & adauget. Verum, cum per elixationem fiat ista coctio, alimenta prius in ore trita, & mansa saluæ permutatione, tum affusione acidi humoris ex amygdalinis glandulis prodeuntis, ita exactè fermentantur in ventriculo, ut liquefcant, mutanturque in succum cremori hordei similem. Acidus autem ille humor à Liene manans inferoit etiam constringendo ventriculo, dum eum vellicat & irritat, ut per fibras suas sese contrahat ad amplexandum alimentum, ideoque in coctione consideranda est illa restrictio veluti necessaria, sine qua nulla fieret coctio. Cur autem alia animalia melius vel deterius, otyus, vel tardius coquantur, causam refero ad varietatem calidi innati in modo substantiæ, id est, proprietatem calidi natui. Ex *Aristotele* calor natiuus primum est instrumentum coctionis, ab eo conficitur & coquitur alimentum, *lib. de Iuuenute c. 4. & lib. de breuitate vitæ, c. 5.*

Porro ne videatur ridicula, quia noua hæc fermentatio, plenius explicabo. Vientis animalia ventriculo inlitus & congenitus est acidulus humor, qui instar fermenti per alimentum diffunditur, ut exquisitè elaboratum, & subactum facilius in chylum solnatur. Is humor perenniter fouetur, atque renouatur ex relicta chyli portione, vel angetur à seroso humore acidulo, quem Lien per vas breue in ventriculum erudit. Aciditate sua appetitum prouocat, & ad palatum vique affurgens gratæ & acidulæ humiditate fauces & linguam irrigat, ut masticatum alimentum sic humectatum, coctionis rudimentum acquirat in ore. Neque hic humor acidus, esurinus, tendis, spirituosus, operationes suas in ore inchoat, in ventriculi fundo perficit adiuvante nativo calore ipsius ventriculi, cui datum est à natura præ cæteris partibus chylum elaborare, ideoque absumpto, vel diminuto isto humore appetitus languet, chylus siccior gignitur, si acrior fuerit, chylus nimio fermentatur, indatur & spumescit, si fuerit aquosus & frigidus, cruditas auctor est. Vnde *Paracelsus tract. 2. de entericis*, vocat ventriculi alchymistam. Sic *Hipp. lib. 6. Aphorism.* requirit ad

sanationem longæ Lienteriz, ructum acidum superuenientem, qui prius non erat. Atque hæc dicta sunt de motu chyli intra ventriculum.

Nunc de chyli motu extra ventriculum agendum, id est, eius distributione. In isto motu obseruare conuenit terminum à quo, & terminum à quem, medium per quod deducitur chylus, qui ubi in ventriculo est perfectè elaboratus, tanquam inutilis reicitur in superiora & tenuia intestina, quæ sunt dumtaxat vehicula & conceptacula chyli delabentis, per eorum volumina, ut facilius à vasis ad id destinatis exsugatur. Ideoque nullam ulteriorem coctionem chylo impertiunt, cum illa quatuor desint, quæ notauimus requiri ad coctionem. Non ignoro, quid dicant veteres & Recentiores Medici: præparari alimentum in ore, coqui in ventriculo, perfici in intestinis: Eadem imaginatione statuunt sanguificationem inchoari in vasis melsaraicis, elaborari in Hepate, perfici in venis, quod falsum mox demonstrabimus ex oculari inspectione. Vetus & communis opinio est, chylum delapsum in intestina, & à venis melsaraicis exsuum deferri ad Hepar, easdem venas melsaraicas reuere sanguinem ad intestinorum nutritionem. Cum autem recentiores quidam Medici obseruarent, præter istos motus contrarios diuersi humoris, puta chyli ascendentis & sanguinis descendentis intra easdem venas, etiam in ipso trunco venæ portæ cum istis humoribus simul fluere ad Lienem, excrementitium sanguinem, puta humorem melancholicum, dubitarunt de motu chyli extra ventriculum. Nonnulli putant, tam trunci portæ venas, quàm propagines venæ splenicæ per ventriculum sparsas trahere chyli tenuiorem portionem, & deferre in Hepar, ne actio Hepatis longiore mora, & expectatione chyli frustretur, ac proinde langueat Hepar. Id primus proposuit *Andreas Lacuna in methodo Anatomica*, & huic opinioni fauere videntur *Cassius*, atque *Fabricius ab Aquapendente*, si credimus *Hofmanno*. Si hoc modo deferatur chylus, melsaraicæ venæ sanguinis dumtaxat erunt vehicula. Sed parem difficultatem animaduerto in isto progressu chyli. Nam si per istas venas chylus deferatur ad Hepar, per easdem sanguis ad Lienem & ventriculum reuerti debet, ergo illæ venæ ab ipso trunco portæ prodeunt, & in ventriculum insertæ sunt inuestigandæ. Tres inuenio, quæ huic officio possunt inservire, huiusmodi sunt gastrica, gastrepiploica, & intestinalis, quæ iuxta pylorum inseritur: nisi velis adiungere canalem illum intra Pancreas, à *Virsungo* detectum & patefactum. Hic eum venæ portæ trunco potest habere communionem: at istæ venæ exiles non sufficiunt chylo eliciendo, tenuiorem tantum eius portionem emulgent. Sed cum dissectione animalium viuientium rubere spectentur, non albescere, credibile est solum sanguinem deducere ad partes in quas inferuntur. Iam à viginti quinque annis publicatus est *Asselii liber de venis lacteis chyloferis*, quas inuenit in dissectione animalium viuientium, & venæ chylo addixit & destinauit, & profusè distinctas ac dissimiles à venis melsaraicis demonstrauit. Tales venæ lacteæ, sunt adeo receptæ & approbatæ in omnibus Academicis, ut nemo posthac dubitare queat de earum hypoxi, quamvis aliter describat *Valæsius*, earum progressum, quàm fecit *Assellius* inuenitor. Sed præter venas lacteas existimo, venas etiam melsaraicas in casu necessitatis, id est, omnimodâ obstructione venarum lactearum officium supplere, ne chyli anadosis cessaret penitus intercepta in venis lacteis. Memini me sæpius spectasse & demonstrasse in cadaveribus strangulorum hominum, qui paulò ante supplicium largitèr epulati fuerant, venas candidas per mesenterium sparsas, quas semper accepi pro mesentericis, nequaquam earum ortum & progressum persequutus. Optarem, ut tribus vel quatuor horis ante supplicium homines patibulo destinati cibarentur, ut istæ venæ lacteæ confestim ab extinctione vitæ possent obseruari, hoc plurimum ad bene medendum conferret. ex motu chyli indicare licet ventriculi affectiones contra naturam, simulque intestinorum, mesenterij, & cauarum partium Hepatis, etenim plurimæ dependent à vitio coctionis in ventriculo, aliæ ab impedimentis in distributione chyli ad Hepar, quippe vitium primæ coctionis non emendat secunda, ac proinde chylus corruptus, vel in ventriculo, vel in suo progressu, vsque ad caua Hepatis, vel delabitur tanquam inutilis ad crassiora intestina, aut si deferatur per venas lacteas ad Hepar, vel eas obstruit, vel in cauis Hepatis vitium suum imprimit, sædatque partes illas: Inde manant varij fluores alui, tam à ventriculo & intestinis, quàm à mesenterio & Hepate prodeunt, quos ut peritè discernas, in ventriculo confido-

rabis substantiæ membranosæ constitutionem, coctionem, dissolutionem, alimentum, eiusque distributionem, atque in distributione, intestinorum vim peristalticam, & rugulatas ad remorandum chylum, deinde libertatem meatuum usque ad Hepar, & ad regressum sanguinis, & humorum superuacaneorum, aliorum meatuum libertatem. His positis rectius distingues fluxum coeliacum à Lienterico, utrumque à diari hoc chylosa, vel serosa, fluxu Mesenterico, & Hepatico. Ideoque unicuique fluxui facilis & felicius medebris, si hæc noueris, quæ desiderant peculiarem tractatum, qui excederet nostram disceptationem de motu chyli.

Pagina 444. redeo ad *Valium*. Ille discrimina sanguinis in diuersis vasibus & locis proponit venosum, arterialem, sanguinem uelut Porta, & Cava, & cum qui conficitur in Hepate, priusquam sit altera permixtus. Nos uero venosum ab arterioso distinguimus, ratione loci, substantiæ, vasibus, & contrarij motus, nam unus generatur in Hepate ex chylo, & dum exilit, ut in Cavam & Cor migret, differt ab illo Cauæ, qui ulterius habuit perfectionem in Corde, & circulatus fuit, ideoque substantia differunt. Deinde arteriosus quandiu intra arterias continetur, totus est spirituum plenus, pulsabilis, feruidior, floridior, translatus in venas deferuefcit, & omnes istas qualitates, partim amittit, partim diminutas habet. Etiam ratione loci, nam sanguis primæ regionis non circulatur, solus secundæ regionis, qui maioribus canalibus sanguinis circulatorijs à Corde prodeuntibus concluditur: Nam certum est potius à Corde, quam ab Hepate enasci, ac proinde verum est sanguinem portæ crassiorem & impuriorem esse, tam in sanis, quam in ægris corporibus, non tantum defectu circulationis, sed etiam quia sordibus culinæ primus inquinatur. Motus etiam contrarietate differunt, quia arteriosus descendit, id est, refuit à Corde, venosus ascendit ad Cor, id est, recurrit, siue ab inferis, siue à superis partibus.

Pag. 445. Obseruauit *Valius*, secundum molem & quantitatem alimenti constringi ventriculum per fibras. Id prius annotauerat *Galenus*, confirmarunt omnes Medici: unde à nimia distentione in helluonibus, ruptis, vel nimium laxatis fibris, non potest amplius constringi, quod fluxoris alui, vel summæ debilitatis causa existit. Præterea uidit *Valius*, in ore masticata & madefacta à salina, porosa & spumosa reddi in ventriculo, ut facilius atterantur, dissoluantur, & subigantur, quod intelligendum de alimentis solidis, liquida talem non patiuntur alterationem. Quod spectat ad humorem acidum, qui instar fermenti dissoluit, id iam dudum præmonueram in *versione Gallica mea Anthropegraphia*, quæ amplior est Latinâ, & quam uidere Bartolinus & *Conringius*, atque ad suos usus conuertere, me innominato, & insalutato, Fermentum illud, nempe acidus humor ab Arabibus & Græcis animaduersus fuit, illi ad auocandum appetitum, huiusmodi constrigendum ventriculum destinatum esse uoluerunt. Nos uero misceri cibis credimus, ut dissimilium fiat fermentatio & uisio, sed si deesset Lien, ut quibusdam accidit, vel adeo exiguus esset, ut uix uinciam ponderaret, unde manabit iste acidus humor: ab arteria splenica, quæ deficiente Liene habet suam insertionem in ventriculum, sed præter istum succum acidum fermentatiuum, spiritum vitalem huic operi accedere non diffiteor, qui augeat calorem insitum ventriculo, mutatio uero alimentorum in succum candidum, qui chylus dicitur, non aliunde procedit, quam ab albedine membranarum ventriculi. Sic Hepar rubrum sanguini colorem imprimit.

Pag. 446. Experimentum istud alimenti prius macerati in salina imbula, vel bile, nec samen dissolui vel liquefacti, non ualet ad probandum ab alterutro non fieri istam distinctionem, quia in uiuente animali, hoc opus dependet à coactrice facultate insita, quæ fermentationis interuentu, & caloris natui præcipuo instrumento, dissoluit, & liquefacit alimentum.

Pag. 446. Laudo diligentiam & industriam *Valii*, in perquirenda coctione & distributione chyli, quod opus valde arduum est, sed monebo, chylum in iis, qui calidiore sunt ventriculo celerrimè perfici, & effluere à ventriculo. Quod obseruatum fuit in *Polemarcho Birenio Patre*, in obsidione urbis à *Espernay*, qui cum largè epulatus fuisset in prandio cum amicis, duabus horis à pastu caput ei bombardæ ictu auiusum fuit. Disscindo cadauere ad pollincturam, vacuus fuit deprehensus ventriculus. Id rescitui ab iis, qui interfuerunt apertioni cadaueris: Sed mirari subit, quod contra Medicorum & Anatomicorum opinionem scribit *Valius*, coqui alimenta in ventriculo per partes, & excoctas seorsim excerni, remanentibus crassioribus & iq-



coctis, donec subacta fuerint: At omnes Anatomici, qui obseruauerunt pylorum altitudine æqualem esse superiori orificio, saltem in homine, id factum fuisse asseruerant, ne quid elaburante perfectam coctionem. At non potest recludi pylorus, & fundum ventriculi eleuari ad reiciendam illam portionem chyli coctum, quin simul demittat reliquum alimentum. Præterea constituit terminum coctionis in ventriculo septem vel octo horarum. Omnes Medici ex doctrina veterum Medicorum septem vel octo horas pro coctione, & distributione ad Hepar assignant. Sed si in canibus vsque ad sedecim horas, aliquid alimenti retineri in ventriculo obseruauit, quid fiet in homine, si solidis & duris, ac dyspeptis alimentis vescatur? valde decipimur, si post quatuor vel quinque horas, ei edimus vacuum ventriculum, ad sumenda alimenta, tam alterantia, quàm purgantia. Illud scire operæ præcipuum est, quia maximi in medicina momenti. Si canis calidissimum animal intra septimanam vel octauam horam carnem bubulam coquit tardius partes membranosas, imo raro etiam si ante sedecim horas conederit, quid de homine, qui ventriculalem habet imbecilliores censendum esse?

Pag. 447. *Ingenue fatetur non esse satis expeditam & cognitam viam venarum lactearum ad deferendum chylum, quoniam ipsarum quoddam inserruntur in ramum mesentericum, alia in ipsam venam Portam, alia in Cava Hepatis feruntur, alia in Cavam venam desinunt prope emulgentes. Quenam hæc distributio chyli in portam, eiusque ramos, in truncum venæ Cavae, & in partes Cavae Hepatis? an si in cane talis distributio reperitur, similiter in homine, valde dubito. Ut hæc anadosis chyli prorsus aduersatur circulationi. Nam tollit actionem Hepatis ad sanguificandum tutum chylum, si portio deferatur in Cavam, altera in ramum mesentericum & irineum portæ: Nam istæ portiones impuræ cœnosæ chyli, cum resfluente sanguine ad Cor rapiuntur. Miror venas lacteas extendi vsque ad rectum intestinum, ibi chylum albescente, ergo ex sterquilinio chylum exsurgere, quod non admitto: Vtinam Palesus cadauera hominum subito extinctorum inter epulandum, vt frequenter accidit, dissecuisset, & venas istas lacteas statim ab obitu obseruasset. Id etiam in suspensiosis patibulo destinatis experiri licet, si eibum capiant, tribus vel quatuor horis ante supplicium, vt fortiores sint animo, tunc certiores essemus de istis venis lacteis, atque id præstabo, quando opportunitas sese offeret.*

Pag. 447. *Merito reprehendit Asellium, qui glandulam magnam in medio mesenterij collocat, quam Pancreas appellat, plures obseruauit, nempe quatuor vel quinque glandulas venarum lactearum diuisionibus interpositas, quod probat.*

Pag. 448. *Coalitus ramorum Porta & Cava intra Hepar agnoscit ad transfusionem chyli cum sanguine. Id deprehendi posse in Hepate ex carni & aquæ innatante, si infussetur, quoniam Hepar reddatur ex carne non explicat, per fortem perusionem Hepatis eum baculo supra lapidem id perficitur, alij leuiter prius elizant ad facilitatem carnis attritionem, & dissolutionem. Sed de isto coalitu dubitandi occasiones habeo non leues: Nam ex Galeno, Fallopio, & aliis Anatomicis, nullus est, aut obscurus per exiles ramulos, quomodo chylus cum sanguine potest permeare istas radieculas, si continenter chylus fluat cum sanguine? nun coquitur in Hepate, quia ibi non moratur, sed directè ad Cor traducitur: si non diffundatur chylus per substantiam Hepatis, quomodo fiet excretio humoris bilioli, atque crassi, terrestris, & melancholici? quomodo sanguis arteriosus, qui insuit in Hepar per duas arterias satis insignes refluet in venas, si radieculæ venæ portæ sicut per anastomosim iunctæ radicibus venæ Cavae? si venæ Mesentericæ eum vena Porta reuehant sanguinem ad Hepar, non potest descendere ad partes inferiores. Vide quàm multa sequantur absurdæ, ex tua hypothesi.*

Pag. 448. *Nihil sanguinis transfluere à dextro Cordis sinu in sinistrum per intermedium septum asseruat, sed per venam arteriosam in pulmones deduci. Contrarium demonstrat in præcedenti tractatu, quod non repeto.*

Pag. 449. *Vt probet translationem sanguinis per venam arteriosam ad pulmones, adducit se ligasse hanc arteriam, & vidisse sanguinem ressum in pulmones tumefactos, sed tumefactio pulmonum, partim accidit ob interceptum eursum aëris purissimi ad Cor, simulque propter interclusum fluxum sanguinis in pulmone superflui, qui per arteriam venosam deriuatur in venam Cavam, per illam anastomosim cardiacam venosam, adhuc extantem in adultis vsque ad vltimum vitæ terminum. Ductus ille à Ro-*

taſſo obſervatus, ſive illa anastoſis vaſorum Cordis in ſortu in mea *Anthropographia Gallica & Latina* deſcripta fuit, qualis in ſuſpenſis hominibus diuerſe ætatis obſervata fuit.

Pagina 450. *Quem finum intra ventriculum dextrum medio ſepto inſculptum, & ad apertum in ſiniſtrum ventriculum deprehendiſti in Corde bubulo*, læpius in hominis Corde ſpectavi & oſtendi, verſus ſepti extremum prope conum, & id à me annotarum in mea *Anthropographia Gallica*. Atque pars illa ſepti medijs ſemper eſt tenuior, quamvis intra ſuoculas & ſcrobiculos ſepti manifeſta foraminula obliqua repertiuntur. Cordis medium parietem perforantia. Itaque ſi poſſis, aſſueſce huic traditioni ſanguinis per ſeptum medium Cordis: ſed obitat rapidæ tæ circulationi ſanguinis per pulmones.

Pag. 451. *Cùm totus ſanguis ex tua circulatione intra quadrantem horæ per Cor & pulmones circuletur*, nullam ſacere debes diſtinctionem venoſi & arterioſi, cùm uterque ſit conſimilis, & ſolus arterioſus ex te nutriat, attamen fateris arterioſum quartà parte rariorem eſſe venoſo. Deinde addis ſanguinem magna ex parte ad maiores venas remeare, ergo non rotus, & hoc favet meæ opinioni, tux adverſatur.

Pag. 454. & 455. *Totus eſt Valavi, ut demonſtres ſanguinem non deſcendere per venas, ſed aſcendere & dirigì ad Cor*. Ideoque ſecta vena brachij non deſcendere ad vulnus inſiſtùm veng, ſed à parte infera eiufdem venæ ex arterijs in manu & pede aſcendere, ne caries affeſtas depleri, neque in pleuritide latus affeſtum, niſi per arterias exhaustas, quæ demittunt ſanguinem in partem affeſtam, hunc reuelliunt ſectæ venæ, ſed eùm ſanguis per vterum, & venas hæmorrhoidales, qua data portæ ruat contra naturam, quidni reſeratis venis contra naturæ inſtitutum, ſanguis profluat, conſequitione vacuati? Ille fluxus contra naturam non impedit naturalem aſcenſum ſanguinis ad Cor, & tu videris id fateri, pag. 478. eùm ſcribis ſanguinem è maioribus venis ad minores non fluere, niſi forte data via aliquid vicini elaboretur. Conſiſtamus igitur in ſanguinis circulatione naturali: Si arteriæ demittunt humorem ad partem affeſtam, eadem arteriæ non poſſunt reuelli, aut uterque motus aſcenſus & deſcenſus in eadem arteria reperietur, contra ordinem circularionis: ſi venæ reuolant ad Cor ſanguinẽ, longe ſunt ambages viarum, antequam reuulſio fiat ex parte affeſta, & id fieri non poteſt ſine magna iactura ſanguinis. *Valavi*, ut demonſtret per arteriam inſuere ſanguinem, & refluere à parte affeſta, in exemplum proſtere pleuritidem, in qua, ſi ſanguis ſecta vena maneret ab azygo, poſius dextrũ brachium, quàm ſiniſtrum eſſet ſecandum, ut ſeruetur reſtitudo, quia azygos oritur à dextro latere venæ Cauæ, quæ fuit opinio *Peſaly* iamdudum reſutata, quia azygos, quamvis emergat à dextro latere Cauæ, tamen æquales ramos vtrique ſupeditat, qui coeunt cum ramulis venæ thoracicæ: ideoque ſecundum latus affeſtum ſecandum brachium. Adde quod reſtitudo non conſideratur iuxta ductum fibrarum, ſed ex ſitu partium, ut dextrum brachium magis reſpondeat lateri dextro, quàm ſiniſtrum brachium.

Cùm animaduerreret *Valavi*, è vaticibus ſanguinem non reuelli, imò magis afluere per venas, valde anxioſeſt, in assignanda cauſa huius tumoris. Id tribuit imbecillitati venarum, & grauitati humorum, accedente ſemper ex arterijs nouo ſanguine, qui venas dilatat, & varices facit. Quod ſi ſanguis eſt arterioſus, qui ſemper inſluit in venas varicoſas, cur non patiuntur aneurifma, cur non pſſant? Videmus in aneurifmate extravaſatum ſanguinem arterioſum pulſare: at ego per nouam circulationem ſanguinis demonſtro, venarum minorum ſanguinem non circulari, ideoque tumulari in parte affeſta, atque ut fluit ad partes, ſic refluere poteſt per eandem venas in canales maiores Aortæ & Cauæ. Ut probeſt *Valavi*, ſanguinem, qui reduciſtur ex arterijs ad Cauam, reſta deſerri ad Cauam, reſta referri ad Cor: *Capiſter eſt*, inquit, *quam qui omnis in nutritionem venæ Cauæ conſumatur, & is ad minores venas non ſeratur*. Quis dixit vnquam venam Cauam nutriti ſanguine? rigatur & recreatur ſanguine, quem continet, ſed ſanguinem illum neutiſquam ad minores venas deſerri pernego, nonne ſpermatice venæ ſanguinem deſcendentem deſerunt ad teſtes? Nonne venæ deſcendunt ad medium reſtorum muſculorum abdominis, & coeunt cum epigaſtricis? Nonne venæ dextræ cum ſiniſtris coeunt, ſub pancreatico carnoſo in dorſo, & ſupra Os Sacrum, itaut reſcurſus fiat ſanguinis celeritimus ab vna parte in alteram? Ego facilius explicio iſtas difficultates per nouam circulationem

nem sanguinis, qui siue descendat per maiorem canalem aortæ, siue ascendat per maiorem canalem venæ Cavae, in progressu suo vasibus suis minoribus, vnumquodque sanguinem transmittit in partes famelicæ exhaustas, & per se trahentes, qui quidem sanguis semel attractus, non recurrit in maiores canales, cum sit destinatus a-  
lendis partibus, nisi æstu vel cæstro percitus exiliat è suis conceptaculis, vel maiores  
canales aortæ & cavæ exinaniti reforescant, priusquam sanguis venæ Portæ eliciatur:  
Videmus etiam venis minoribus sedis, quæ sunt extra maiores canales, cursum san-  
guinis dirigentes, sanguinem paulatim & parcè fluere, moxque sisti: at si sanguis mi-  
norum venarum refluxerit, supernè arctiore ligatura supra vulnus facta, abundan-  
tius stillare deberet sanguis, quod non accidit, ideoque ab isto sanguine minorum  
vasorum, siue sint venæ, siue arteriæ per carnosas partes dispersæ, omnes fluxiones,  
tumores tam internos, quàm externos excitari statuo, atque humores per eadem va-  
sa refluxere in maiores canales.

Pag. 456. *Assertis se observasse in pluribus Cor in vna hora plures, quàm sex mille pul-  
sus edere, & in singulis pulsibus semenciam sanguinis effundi, quamvis dumtaxat scrupulus in singulis pulsationibus è Corde fluere ex tuo computo, singulis horis plura-  
rum decem librarum sanguinis Cor pertransibunt: hæc omnia non admitto, quia natu-  
ralem viam per pulmones nullam esse demonstraui, ideoque ex mea circulatione  
parciùs fluit, & guttatim per septum Cordis, nec in singulis pulsationibus sangui-  
nem effluere necessum est. Deinde, vix dimidiam sanguinis partem circulari demon-  
stravi, cum vna pars intra venas portæ concludatur, quæ non circulator, atque sangui-  
nem per Cerebrum traductus lento gradu procedit ad circulationem, propter flexus  
& ambages viarum. Itaque de sanguine, qui per Cor circulator, vix novem aut de-  
cem librarum intra maiores canales aortæ & cavæ continentur, per Cor circulandæ, at-  
que cum de demens quotidiani cibi magna fiat quotidie dissipatio, vel secretio per  
alium, per transpirationem, & respirationem, ita ut si credimus Staticæ Medicinæ  
conditori, per respirationem fuliginosorum spirituum ferme quotidie semilibra disper-  
datur, per transpirationem effluat per poros cutis quotidie ferme pars quarta assumpti  
alimenti, ergo paucus sanguis remanebit circulandus, atque is ea quantitate non  
potest intra horæ quadrantem totus circulari. Si verum est, quod scribit Valens, pag.  
472. in vena cava sanguinis quoddam penarium est, in quo sanguis in futuros usus recan-  
ditur, quando copiosior est, quàm qui Cordi omnis suppeditetur. Istud penarium melius col-  
locasset in minoribus venis, quàm in illo canali, in quo est velox ac rapidus excur-  
sus sanguinis, ac proinde totus circulator.*

Pag. 457. *Miraris, quomodo veteres Medici, & Philosophi non animadvertierint istam  
circulationem sanguinis, cum ipse Aristoteles velut totum sanguinem traduceret per Cor, sed re-  
versurus ad Cor nullam fecit mentionem. Laudo textus, quos adducis ex Hippocrate, sed  
locus ille ex Aristotele citatus, lib. de somno, non probat sanguinis circulationem,  
sed ibi, & alibi, libris de animal. vapores ex alimento euehi ad caput, ibi in aquam  
conuertere, quæ postea relabitur, sicque sit perennis fluxionum generatio, quod ab  
Hippocrate fuerat priùs observatum, lib. 2. de morbis. Possem ex doctrina Democriti &  
Epicuri, probare cuncta esse in perpetuo motu & fluxu, similiter etiam sanguinem in  
animalibus.*

Lucretius  
lib. 4.

*Vsq̃ue adeo omnibus ab rebus, res quæque fluenter  
Fertur, & in cunctas dimittitur undique partes,  
Nec mora, nec requies, inter datur vlla finendi.*

Cum autem Cor sit caloris sedes, tam naturalis, quàm ignei, id est, febrilis, mo-  
ueri debet instar flammæ, quæ quoquoersum extenditur à suo principio, & ab ex-  
tremis ad suum principium, sic videmus ignem febrilem per corpus excurrere, quid-  
ni naturalis ignis eundem atque consimilem servabit motum cum sanguine, cui in-  
situs est?

Præterea necessariam esse circulationem sanguinis asseuero, ad ipsius defæcatio-  
nem atque renouationem: nam putredo sanguinis qui continetur vena cava, elui-  
tur per circulationem, & exurit ac consumitur igne. Vitium sanguinis qui coër-  
cet tubulis venæ Portæ, per clysteres & cathartica expurgatur.

Obiter monebo ignem illum febrilem incendiarium, in febribus ardentibus non  
facile restinguere, quia fouetur à materia pingui combustibili, quæ inest sanguini:  
quemadmodum naui in mari, si conceperit ignem, ab aqua maris potius accendi-  
tur;

tur, quàm restinguitur, quia maris aqua est bicominibsa, sic in febribus ardentibus, iuseulis carniū oleosis, pinguibus, magis suscitatur flamma febrilis, propterea Hippocrates, in acutis ægros nutrebat aquâ hordei, siue ptisanâ, melierato, & aquosis portionibus vberissimis, donec ardor febrilis desetbuisset, aut ad septimum diem æger peruenisset.

Pag. 459. Magnam iniuriam facis D. Harneo, dum eum depingis tanquam plagiarium, & alieni laboris furem, quando Paulum Serpam, Seruatum & Theologum à eodem, huius circulationis inuentorem facis, à quo edoctus Harneus, hunc motum sanguinis accuratius indagauit. Nonne aperte declaras furtum Harnei? Quod si verum est, taxandus venit inuidentiæ, aut ingratitude criminis sed cur Parisanus Venetus scribens contra Harneum, hoc illi non exprobrauit? Cur alii Anatomici Patavini, qui de hac inuentione gloriari deberent, conticuere? Potuine solus Serpa vacare huic speculationi, quæ deuderat auxilium & ministerium alicuius? Cur istud myllerium Naturæ non reuelauit Mediciis Venetiis & Patavini. Atque hoc non potuit excogitari, & tractari, nisi à Philosopho Peripatetico, qualis erat Cremaninus, qui gissum eius rei nobis dedit. Estne verisimile Paulum Serpam virum Religiosum, in rebus Ecclesiasticis & Politicis occupatum, in his rebus Physicis, Medicis, & Anatomicis, quæ dependent ex accurata inspectione & dissectione viuientium animalium, & cadauerum humanorum, tam sedulo vacasse, vt rem totam egregio scripto comprobaret, quod Venetiis asseruaretur? Aut Veneti inuidet istud bonum publico, aut indignum est fama & existimatione Pauli Serpe. Sed Pater Fulgentius eius discipulus, qui nuper scripsit idiomate Italico viram Serpe, meminit quidem valularum ab ipso inuentarum, quas & monstrauit Fabricio ab Aquapendente, nullâ faciâ mentione circulationis sanguinis. Video presentis sæculi omnes inuentiones admirabiles, huic homini tribui, vt quondam Helmeti Trismegisto, quem Authorem & Inuentorem omnium rerum, tam verarum, quàm falsarum, prædicauit antiquitas, auctore Galeno, lib. 6. de simpl. medic. facult.

Pag. 459. Intendit demonstrare per omnes venas & arterias minores fieri istam sanguinis circulationem, sed impossibilitatem in quibusdam partibus quas proponis, ostendam, vt de aliis iudicet Lector, quas tamen asseris diligenter explorasse. Scribis sanguinem per arterias spermaticas ad testes, per venas à testibus ad emulgentem sinistram, aut cauam in dextris moueri: At si perpendas arterias spermaticas cum venis, mirabili & anfractuoso plexu contorqueri, vt ex miscella vtriusque humoris in illo plexu, qui parastata varicosus dicitur, seminis rudimentum incipiat: fateberis impossibilem esse istum recursum sanguinis à testibus per venas, cum nullæ sint, quæ possunt reuerehere ab ipsis testibus. Interea monebo istum mirabilem plexum detectum fuisse à Guinterio Andernaco, Medico Parisiensi, & demonstratum Vesalio suo discipulo, vt in suis Institutionibus Anatomicis declarauit, & in suis Commentariis de veteri & noua Medicina. Adde, in recursum isto præiperetur materia seminalis, & spiritus genitor à testibus supernè remearet.

Pag. 460. Præterea statuit omnes ramos à vena Porta sanguinem arteriosum celare, diffusum in partes nutritias reuerehere ad Hepar, vt in Canam traducatur. Quæ confusio sanguinis puri cum impuro & coenoso in Hepate, quod est obstructionibus obnoxium, propter exilitatem venularum intra eius substantiam? At iam demonstratum, obsecram esse, vel nullam communionem venarum Portæ & Causæ intra Hepar.

Pag. 460. Quomodo sanguis arteriosus per emulgentes arterias ad penetralia renum deductus, potest remeare per venas emulgentes in Causâ, cum vala hæc obliquerentur per substantiâ renis, & serofus dōtaxat sanguis ad renes deriuetur, qui materia est lotij, idcirco venæ emulgentes serum reuerehent in Cauam, quod est absurdum.

Pag. 460. Scribis sanguinem per venam splenicam ad Hepar redire, similiter ab intestinis per mesaraicas venas ad itur remeare demonstras, elegantis pictura per ligaturâ factâ in istis venis. Vidisti ex intercepto comæatu sanguinis vel chyli, inferiores partes infra ligaturam intumescere, vacuis & inanitis partibus superioribus supra ligaturâ, hoc concessio, sequitur venam splenicam inseruire dumtaxat reuerfioni sanguinis ad Hepar: ergo sanguinem limolum, siue melancholicum non amplius ab Hepate reuerehet ad Lienem, vel cum massa sanguinea confunderetur, quomodo sanguis arteriosus, tam celeriter potest transire per innumeros capillares ramulos, tam arteriæ, quàm venæ splenicæ intra Lienem dispersos, vt intra horæ quadrantem totus sanguis Lie-

nis, quantuscumque sit, depleſi queat, ſi Lien deſtinatus eſt limoſo ſanguini excipiendo, ſive traharab Hepare, ſive à portione chyli per canalem Pancreatis à *Vena ſanguis* obſervatum. impuruſ ſanguis, vt plurimum excrementitius & atrabilarius remeabit ad Hepar, ſi meſentericæ venæ reducunt ſanguinem arterioſum ad Hepar, permiscebitur cœnoſo & incocto ſanguini ex chylo nondum probè ſubactis, quem celeri curſu aſcendens ſanguis ad Cor ſecum abripiet: nec enim vero ſimile eſt crudum & incoctum ſanguinem ad Cordeduci elaborandum, nobiliori aſtioni iſeruit, ſcilicet conſectiōi ſpiritus vitalis, dum ſanguinem venoſum in Hepate perfectè coctum, conuertit in arterioſum momento, celeri per Cor tranſitu.

*Præterea, ſanguis in Hepate mirabilem intexturam quatuor vaſorum diſſerentiam, venularum Portæ, venularum Cauæ, ramulorum meatuſ ebullidaci, & innumeratum arteriarum, quæ vaſa ſunt per amplitudinem Hepatis diſperſa, pari numero & ſtratiſatione, quia inuicem cœcut & communicant. Nolo ſuſpectam reddere fidem oculatam, & accuratam inſpectionem Valeſ, ſed quo ſine per Hepatilis diſſeminatio & intextura vaſorum, quæ à quadruplici ramo procedunt? Reſpondebit, ad vitalitatem, ſive facultatem vitalem huic parti inſitam conſeruandam: ſed ex tua opinione ſanguis arterioſus diſſuſus in partes, redire debet in venas: Non poteſt habere alias, quàm radices venæ Cauæ, aut Portæ, quibus erunt affixæ & iunctæ arteriolæ, ſi adhæreant radicibus Cauæ, non per Hepatis ſubſtantiam diſfundetur ſanguis arterioſus, & ſolum tranſibit per Hepar, ſi redeat in venas Portæ, deſcendat contra regulam circuli ſanguinis, & per iſtas venas duplex ſanguis continetur, aſcendens & deſcendens.*

Porro, cùm Lien & Hepar ſint viſcera obſtructionibus valde obnoxia, quomodo ſanguis, tam celeri curſu partes iſtas poteſt perſuadere? Si quis obſiciat ſanguinem venoſum intra canales Portæ, quietum & immotum manere non poſſe, quia putreſceret: Reſpondeo fluire intra iſtos canales, & ſtabelle Diaphragmatis iſtam regionem ventilari, atque ſanguinem Portæ exuberantem, niſi ſuat per hæmorrhoidales venas, habere exitum & effugium in Cauam & Aortam, per venulas à trunco Portæ ſupra cysſticas emergentes, & inſectas in truncum Cauæ, quod obſeruauit *Galenus*, & à me ſæpius fuit notatum.

Nefcio, an alibi Porta vena & Caua communicent inter ſe per anastoſomum, vt quidam iactant ſe vidiffiſſe: id manus meas & oculos diſſecando effuſiſſe fateor, indagantius aliàs curioſiſſus, ſi manus & oculos adhibeam diſſectioni Anatomice.

Pag. 460. *In capite non explicat qualem iugularem legat oporteat, ad ſpectandum motum ſanguinis, eſt enim duplex, interna & externa. Nominis obliuio, vel omiſſio, rem iſtam ſuſpectam reddit.*

Pag. 460. 461. *Quamuis Valen multum laborauerit ad probandam circulationem ſanguinis, deſignare non poteſt, nec demonſtrare, quomodo ſanguis Cerebri redeat ad iugulares venas. Credibile tamen eſt per arterias carotidas & ceruicales, ad quatuor ſinus duræ meningis deriuari: ſunt enim ad illos ſinus peruæ, ex quibus iugulares venæ ſanguinem ad Cor reducunt: Nec poſſunt eum aliunde ſinus, ſive ſanguiductus, quàm ex arteriis accipere. An autem arteriæ immediatè ſanguinem in ſinus infundant, an verò per arteriolas plexus mirabilis numeroſè in meningem duram diſperſas ad ſinus perueniat, non ita facile eſt intueri. Crediderim tamen per vtramque viam ſanguinem in illos ſinus infundi.*

Ex hoc diſcurſu intelligitur, ignotam eſſe Cerebri ſtructuram, & ſanguinis ad Cerebrum appulſum, & recurſum ad iugulares internas, & ceruicales. Certum eſt iugulares internas peruenire ad ſinus laterales Cerebri, ſi carotides & ceruicales arteriæ ex *Valeſ*, eò pertingant. Triplex erit vaſorum genus vtrique in oriſicio ſinum lateraliū, ſicque erit ſanguis arterioſus aſcendens, & alter venoſus deſcendens intra iugulares. Credit *Valeſ*, arterias ſanguinem effundere in ramulos ſinum: ſi hoc verum eſt, debet venire ſanguis arterioſus ad ſinum longitudinale, ſive tertium, quia ramuli, ſive riuuli ſinum ab eo ſinu dumtaxat producuntur: ſi in iſtos ramulos ſinum ſanguis arterioſus deriuatur, deſcendit ad baſim Cerebri, quomodo ſuperne remeabit, vt inueniat iugulares internas, & reſtat in Cauam?

Deinde, in extrema ſuperficie Cerebri obſeruabis arterias diſſeminatas per meningem craſſam, ramuloſ ſive riuuloſ excurrenteſ, per anſtraſus exteriores Cerebri ſub tenui meningē. Hæc diligentius expende, vt inuenias veras illas vias circulationis in Cerebro.

Interea, ſupet ea re meam opinionem exponam, quam per experimenta in mortuis poſſum demonſtrare veriffimam. Cùm Cerebrum hominis ampliffimum indigeat multo ſanguine, & copioſis ſpiritibus, tum ad nutritionem, tum ad generationem ſpiritus animalis, quem vniuerſo corpori impertire debet ad ſenſum & motum, dubitare licet de circulatione ſanguinis per Cerebrum propter ſexus & ambages viaſ in plexu retiformi, & progreſſus ſanguinis ad verticem, & ſaltim Cerebri. Ceterum eſt magnam ſanguinis copiam Cerebro ſuppeditari à Corde, vicino celeriter deduci, breui & rectiſſimâ viâ ad baſim Cerebri, per carotidas arterias patentes & amplas, ibi mirabili artificio inuicem cœunges, & decuſſatim intertextas, vt dextra ſiniſtroſum, ſiniſtra dextroſum ferantur. Deinde perperat nemeioſa lobole ramoſi, vndique ſparſorum ſuperficiem duræ meningis, donec petuenerint ad ſinum, ſicque canalem longitudinalem, in duplicatura meningis formatum & inſculptum, vbi deponunt ſuam ſanguinem arterioſum: Ab eo ſinu innumeri ramuli, ſeu riuuli depromuntur, qui ſparſi per anfractus exteriores Cerebri, rotis inſtar, deſtillant ſanguinem arterioſum ſuperne deorſum, per ſubſtantiam medullarem & mollem Cerebri; etiam ab illo plexu retiformi deriuantur arteriæ, quæ in ſpinalem medullam ſuperiorem feruntur. In dorſo & lumbis recipit ab Aortæ trunco arterias: ſi id ſciuiſſet *Valentius*, reuerſum iſtius ſanguinis per lumbares venas, & intercoſtales azygos inueniſſet, & vidiffet, quando regurgitat ſanguis in canalibus lateralibus duræ meningis, qui ſunt portiones, vel poſtus continuationes longitudinales, decurrit in iugulares internas, quæ ſunt iſtus canalibus coaptatæ, vt per truncum venæ Cavae redeat ad Cor.

Porro, vena magna à *Galeno*, in Cerebro conſtituta, propago eſt tenuis meningis, quæ canalem efformat, qui pro quarto ſinu habetur, reperitur in conſurſu trium canalium inter Cerebrum & Cerebellum intra ventriculos Cerebri deductus, & expanſus vſque ad baſim, nutrit illas partes internas Cerebri, ſanguinemque ſuum & ſpiritus inde depromit.

Interea notabilis palpitatio meningem ab arteriis ipſam perrepantibus, & canales illos ſanguineos, non à facultate motrice arteriis inſiti, cùm intra canales nullæ ſint arteriæ, ſed ab impulſu ſanguinis arterioſi puriſſimi, ſubtiliſſimi, intra ſinum longitudinalem effuſi, vel pulſus ille à ſola membrana arteriis conſperſa dependet, motum autem elevationis & deprehenſionis non adimit Cerebro, ratione ſpiritus animalis, qui talem motum operatur: deducitur per illam magnam venam in ventriculos, quomodo Cerebrum parte inferiore ſpiritus quoque habeat à plexu retiformi, qui in neruorum ſeptem paria diffunditur, & in ſpinalem medullam, qui per omnes corporis neruos celeritè inſtar flammæ radiantis diſtribuitur.

Sed è diuerticulo redeo in viam circulationis ſanguinis in Cerebro, quam non pari paſſu procedere aſſumo per Cerebrum, vt in circulatione ſanguinis canalium maiorem Aortæ & Cavae, propter remoras quas patitur in plexu retiformi, & in progreſſu vſque ad verticem Cerebri. Nec expediebat celeriter fluere propter effuſionem ſpiritus animalis circumſui, qui taperetur deorſum cùm ſanguine. Experimenta quæ olim feci, iſta ſunt: eratis oculis, & abſceſſis auribus, etianum in his locis ſecandis excarne teddidi, dein ſerram per medias orbitas, & ſupra auris foramina verſus occipitis foramen circumduxi, peritè eunſa cranij ollâ, ſine laceratione duræ meningis, circa ſinus ante & retrò, & null bi ſi fieri poſſit, tum arterias carotidas inſlabis, vt videas diſtentiones ſinum Cerebri, & amplificationem ac elevationem ſubſtantie cerebralis, vaſorum duræ meningis dilatationem, poſtea reſectis ſinubus lateralibus infernis, ſtylo perquire ſaſa, quæ iunguntur iſtis ſinubus. Obſervabis per illos ſinus, neque venas, neque arterias ſeruare ſuam membranam, poſtea devenies ad baſim Cerebri, vbi videbis plexum retiformem, & arterias, quæ illum contextunt.

Pag. 461. Circulationem ſanguinis in Fœtu accommodatè ad ſuum ſenſum deſcripſit *Valentius*: ſingulis ſanguinem maternum (intelligi, ut credo, arteriaſum) non fieri per arterias umbilicales, quia non coniunguntur vterinis arteriis, ſed ſolum per umbilicalem venam vebis, inde in dextrum Cordis ventriculum, ibi ſit alia diſtributio, quam in edito Fœtu, propter pulmonum immobilitatem, ſoliditatem, deſectum reſpirationis, meatum patenſium, proinde vna portio per venam arteriaſam vadit ad Aortam per canaliculum, altera portio labitur per ſtramen venæ Cavae in Arteriam venoſam, & ventriculum ſiniſtrum, mox ſiuit in Aortâ.

*tam, inde per arterias vmbilicales recurrit in placentam, ut vena vmbilicalis iterum recipias, & per eandem viam reuehat ad Cor, quod licet imperfectum non pulsas.*

Vt in amoribus, sic in opinionibus, qui suas amant, sibi somnia fingunt: in opinione *Valas*, quot verba tot errores agnosco, qui sensu & inspectione demonstrari possunt: Si arteriæ vmbilicales non iunguntur vtero, solus venosus ad formationem carnis in Corde, & reliquis partibus delatus fuit, cùm tamen æquè sit necessarius arteriosus sanguis.

Dicit *Valens*, id repugnare circulationi sanguinis, quia arteriæ non vchunt ad Cor, in prima partium conformatione via est breuissima, vix æquat digiti minimi longitudinem, si totus sanguis ingreditur ventricululum dextrum, sanguis qui deferri debet per foramen. Causæ in arteriam venosam non poterit egredi propter oppositionem valvularum tricuspidae contranitenti, idcirco in vestibulo ventriculi dextræ, infra valvulas fiet illa distributio sanguinis, non intra ventricululum.

Deinde, si sanguis iret ad sinistrum ventricululum, & inde in Aoriam per duos ventriculos traduceretur, ac proinde essent inutiles illæ vasorum Cordis anastomoses, quas fuisse factas putauit *Galenus*, & post eum omnes Anatomici, propter soliditatem Cordis, & pulmonum. Non animaduertit *Valens*, venæ vmbilicales bifidæ in iecore partem vnam inferi in Caudam, alteram in Portam, vt discerneret sanguis Causæ à sanguine Portæ, qui non circulator.

Quando *Valens* scribit redire sanguinem per arterias vmbilicales in placentam, statim considerauit sanguinem circulatoriũ infra Cor, quia venæ à Cerebro & meningibus non possunt reuicere, neq. per arterias remeare potest ab istis locis. Si sanguis arteriosus per arterias vmbilicales totus deduceretur in placenta, frustrarentur sanguine extremi artus, vel si delatus ad pedes, inde rediret ad arterias vmbilicales, superne remearet contra motum naturalem sanguinis, ergo iuxta vmbilicales arterias, diluidi debet sanguis arteriosus inferior, vt portio feratur ad pedes, altera in Placentam. Sed quo fine? vt refundat in venam vmbilicalem? nequaquam: nam circulatio sanguinis prima fit per vasa vmbilicalia Fœtus cum vasis vterinis: Secunda circulatio Fœtu conformato, & Corde excavato, fit in ipso Fœtu more communi & via ordinaria, quando dicit *Valens*, Cor imperfectum pulsate, quid intelligat per istam imperfectionem non exprimit: Ista imperfectio non potest esse alia, quàm in structura ventriculorum: At si excipimus sanguinem ventriculi, non sunt imperfecti. *Ne percipis, quomodo sanguis per duos ventriculos traducatur, nec his collas admittatur.* Imo maiorem aduersionem suscipiet. *Valens* reliquit pulmonem ex sanguine, nec explicauit, à quibus vasis alatur, dum proponit anastomoses vasorum Cordis, & quomodo ipsis sanguis distribuatur.

Videamus nunc, si *Riolanus* rectius hauriolatur, in tanta rerum caligine. Omnes qui agant de anastomosis cardiacis, eas considerant in Fœtu grandiore, & prope nascituro, non in prima partium conformatione, vnde exordiar. Virile semen iniectum in sinum Vteri, auidè comprehenditur à corpore vterino, postea stricto & clauso, & cõglobato, vt eius virtute & calore suscitetur facultas formatrix, sine anima vegetas, quæ incipit in medio coagulati seminis punctum ampullosum creare. Propterea merito dicitur *homo bulla*, tumque istius seminis coagulati circumferentia condensatur in membranam, intra quam huic puncto vicina alia duo puncta ampullosa formantur, quæ hepar & caput referunt. Istis iactis fundamētis cæteræ partes delineantur, prius ductis staminibus vasorum, inter quæ prima sunt vmbilicalia, quæ à Caudâ & Aortâ iuxta punctum Cordis grandius enata, deducuntur trans illam membranam circulari ad parietes vteri, vt affixa consimili vasculo, exsugant sanguinem ad formationem carnis in totius corporis. Antetio die punctum illud, quod representat Cor, palpitat vt in pullo, an tardius, non ausim quidquam pronũciare. Verisimile est micare vi insitâ post delineationem partium. Vasa vmbilicalia suum quæque sanguinem propriũ deuehant ad formationem & nutritionem partium: quandiu istud opus peragitur vsq. ad 2. menses, nulla est circulatio sanguinis Fœtui propria, sed à matre venit, dum sanguis recurrit ad Cor matris: vbiverò molem & corporaturam adeptus est Fœtus, & grandior factus, placenta crassior & firmior separat vasa vmbilicalia, ab vterinis suâ interpositione, tumque parietibus vteri agglutinata, exsugit ab vtero maternum sanguinem, quem permixtum præbet vmbilicali venæ distribuendum, tum circulator sanguis in Fœtu motu proprio, Corde tamen nondum probè conformato, quamuis



excipiat sanguinem, ad excavationem ventriculorum & elaborationem sui sanguinis. Sanguis igitur est placura de promptis de fertur per umbilicali in venam ad Cavam & Portam in Hepar, atque cum nequeat Cordis ventriculorum dextrum insubire minorem finitro, in Cava officio, siue vestibulo Cordis transit in arteriam venosam, & in finitum Cordis ventriculorum, max labitur in aortam, vt partibus supra & infra Cor distribuat. Sed non totus sanguis Cordis finitrum ventriculorum ingreditur: portio quædam per eandem arteriam venosam in pulmones vadit, vt illius sanguinis portio, qui à finitro ventriculo in Aortam delapsus est, per alteram anastomosi in venam arteriolem deducatur in pulmones. Itaque cum istæ anastomoses sint factæ & formatæ propter Cor & pulmones, verum est formandis & nutriendis istis partibus inservire: N. m. parenchyma pulmonum anapleurum, rubrum, ad sui formationem & nutriendum, non habet sanguinem nisi venosum ab arteria venosa, arteriolem à vena arteri ista, ideoque à v. na Cava propagata fuit arteria venosa, cum effice destinata f. bris andis & nutriendis pulmonibus, vt vena arteriosa prognata ab Aorta, & sanguinem arteriolem suppediat.

Cum autem Cor tardè perficiatur propter opusculam eius fabricam, natura primò effundit ventriculum finistm, tanquam p. æcipuum, magisq. necessarium ad elaborandum sanguinem vitalem, idcuq. æqualis est amplitudine & molliitè ipsi ventriculo dextro, & auricula sinistra amplitudine sua æqualis est dextræ. In Fœta grandiore propè nascituro, ubi lab. var. Cordis ventriculus dexter, excipitque sanguinem, tum ventriculus finist. angustior, crassior & robustior euadit, tam ad conseruationem caloris natui, quam ad expulsiõnem sanguinis arteriosi, & auricula sinistra, quæ nihil ampliùs excipit, reficcata p. n. obliteratur in infante, & sensim cristata euadit.

Qui voluerit istas anastomoses & Cordis structuram exactè observare, debet sibi comparare, & obtinere ab obstrictis embryones diutius temporibus per abortum eiectos. vel in mortuis gravissimis percutari, ut sepius fieri, atque cuncta quæ propius verissima deprehendat. Itaque circulatio perficitur circa tertium mensem in Foetu, donec in lucem prodcat.

Quod sp. Ar. ad arterias vmbilicales, quæ ante circulationem sanguinis propriam Fœtus, d.f. rebus sanguinem ad Cordis vasa, v. ex Co. et pulmonis fabricarentur, quandiu Fœtus in intra utero circulator, s. sunt portiones sanguinis arteriosi ad placentam, non vt circuletur, s. d. ad conseruationem istius partis, ne refrigeretur aquarum copia, simulque sanguinem superfluum in Fœtu recuehant ad placentam, quæ sanguinis nutritiui, & exuberantis receptaculum erit.

Pag. 463. *Miror, quomodo Valeni affuerit maximum circuitum sanguinis: etiam de  
 extremitates corporis breviori tempore, quam hora quadrante peragi. Quod est impossi-  
 bile per pulmones traducatur totus sanguis, at ipse antea deceni libras intra horam  
 posse effluere proposuit. Cū autem in corpore bene habito & sanguineo viginti  
 quatuor libras sanguinis reperitur, ex *Auscenna*, & confirmatione *Botali*, falsum  
 duz vel tres horæ ex tua præcedenti propiositione requiruntur, ad illam circulari-  
 nem sanguinis, quod talis quantitas sanguinis in corpore contineatur, id ex insignis  
 hæmorrhagiis, in viris per hæmorrhoidas & nares: in mulieribus per uterum im-  
 pectetur.*

Pag. 462. *Non potest assignare, neque probare Valæus, ex sua circulatione veras causas febrium intermittentium, neque continuarum, itaut hallucinari ea in re mihi videatur. Mens libellus id ei patefaciet per novam ipsam circulationem à me introductam.*

Pag. 463. Quærit, cur vena non pulsans, vis arteria, si sanguinem confusilem contineant,  
 & à sanguine ebulliente motus arteriarum dependeat, non à corpore m. m. l. v. arterie agita-  
 to, nec per influentiam facultatis moris, à C. corde producantur. Rationes suas proferit, ego  
 meas: quia vis & impetus sanguinis arteriosi versus extremitates elargescit, propter  
 distributionem à sanguinis in illo progressu, & diffusumem splittum in extrema  
 loca, vbi magis attenuatur tunc à arteriarum.

Scribit *Hippocrates*, in lauis omnes carnes sanguine & spiritu repleti, in agris flatu & fero, ideoque in venas qui transfatur sanguis arteriofus, magnam spirituum copiam amittit, & transfundo per venas ob tenericudinem membranarum exhalat quoquoferum. Sed non credo venas in tumoribus vndique concludis & compreffis micare. Palpatio hæc ab arteriis manat, fi à flatu, citò diffiparetur.

Interea nota in plures ramos diuidi venas quàm arterias, quod fit propter nutritionem partium. Inde colligo omnes venas non coire cum arteriis ad reuulsionem sanguinis, quod fuit meæ opinioni.

Pag. 465. *Animalis spiritus motum non potuit deprehendere Valæus*, quem tamen supponere oportet, cùm videamus ligatis arteriis, motum & sensum intercepti in partibus ad quas defertur, vt videre est in neruo sexti paris recurrente, & ligato in ceruice, vti faciebat *Galenus*, vt motum musculorum laryngis demonstraret, & causas vocis.

De cauitate neruorum dubitatur ab Anatomicis, quin etiam de poro nerui optici. Attramen certum est per neruos subtilissimum spiritum animale in vniuersum corpus distribui, ad motum & sensum, quamuis per omnes partes non disseminatur nerui, diffunduntur tenuitate suâ quâ pollent, spiritus animales quoquoersum.

Pag. 465. *Manifesta est contradictio in motu chyli intra venas lacteas, quem ipso sanguine celerem indicat: paulo post dicit, non ita esse vehementem chyli motum, ut sanguinis, si placet, id explicabis, vel emendabis, aut conciliabis.*

Pag. 465. Tecum non admitto rarefactionem sanguinis in Corde, vt intumescens pulsationem edat, quæ est opinio *Cartesii*, quæ probari possit ex de stillatione vini. Videmus enim dum spiritus vini paratur in vasis circularioris, appressa manu circa tubulos, pulsationem percipi consimilem pulsui arteriarum. Similiter dum oleum ex sanguine humano conficitur, addita portione exigua, spiritus vini adeo feruet & ebullit liquor, vt quantitas sextuplo augeatur, idem in lacte ebulliente obseruatur, quod decuplo extumescit: Verùm sanguis ebulliens in Corde & arteriis ac impetuose fluens, non potest istum motum regularem & rhythmicum creare, vbiq; in arteriis per vniuersum corpus. Rythmus & æqualitas pulsus in sanis, manifestè probat istum motum à facultate directrice, siue motrice fieri, non ab impulsu sanguinis feruidi, neque potest semina sanguinis ex *Valæo*, à Corde eicci in Aortam, istum motum regularem eodem instanti excitare in omnibus arteriis vniuersi corporis. Ac sanè pulsatio Cordis, & arteriarum tactu & oculis deprehenditur, sed causa nobis est valde obscura, soli Deo cognita.

Pag. 466. *Motum trunci venæ Cavae prope Cor manifestum deprehendit: quod antè obseruauerat Galenus, lib. de Placitis Hippocratis & Platonis, sed motus ille venæ, non est similis aortæ, est enim succussio venæ, propter Cordis agitationem: si venæ Cavæ truncus pulsaret, deberet suum motum mutuari à Corde, vt aorta, quomodo pulsabit & repellat in Cor dilatatum? Ergo istum motum habet sibi insitum, non à Corde dependentem, quod non credo.*

Pag. 467. *ut demonstret vinctatatem auricularem Cordis*, obseruauit auriculam dextram septuagies, imo centies pulsasse, antequam motus sequeretur Cordis, quod credo: & inde colligo eum *Harnæ & Valæo*, & aliis præcedentibus Anatomicis, in auriculis motum Cordis incipere, & ibi desinere, ac proinde in Fœtū, antequam Cor sit perfectum, solæ micant auriculæ, aut motus Cordis est obscurus, quia non excipit sanguinem, nec emittit.

Pag. 468. *De forma motus Cordis, quæ scribis non mihi placent, mucronem Cordis in systole accedere ad basim, ideoque nonnihil elatiorem fieri.* Durius est conus, quàm vt possit reuelli vel replicari: me huius opinionis approbatorem & fauorem producis, cum honorifico elogio, cui gratias debeo: fateor equidem basim Cordis circa Aortam & latus sinistram Cordis ferire pectus, sed motus Cordis in homine aliter considerandus, & explorandus, ac explicandus, quàm in brutis: nam in his, quæ prona terram spectant, Cor ferit pectus cono suo, in homine Cor propter adhesionem orbicularem pericardij ad centrum nerueum Diaphragmatis, conum habet suum reuulsum & directum versus Diaphragmatis centrum: ideoque dum mouetur in systole, cono suo ferit Diaphragma, & basim suam Aorta, simulque latere sinistri ventriculi pectus percutit, sic extensum, si velis in viuenti animali id obseruare, vitulum viuentem dissectabis, quia bos sic habet structum & dispositum Cor.

*Laurentius* monitus à *Rossello*, Hispano Medico, constanter assueuerat Cor in diastole potius, quàm in systole pectus ferire, non mucrone, sed ventriculo sinistro distento, qui arteriarum principum & fons arteriosi sanguinis exsistit. Id probat duabus rationibus ex ipso *Rossello* petitis. Prima, si manus altera pectori, altera carpo admouetur eodem tempore, vtrobiq; similis ictus percipietur, & nos in viuentibus anima-

fibus id sæpe sumus experti. Nescio, an de homine vivente, vel aliis animalibus viventibus istud experimentum intelligat, nam animalia earent earpo, sed qui percipitur pulsus in pectore, pendet à trunco Aortæ eminenis, & ferienis pectus, ac proinde similis ictus deprehenditur in earpo hominis vivientis: nam in diastole basis accedit ad conum sponte reuulsa, adjuvantibus musculis internis ventriculorum Cordis.

Secunda ratio est. Si Cor contractum mucrone suo percuteret pectus, non perciperetur ictus circa sinistram mammam, sed paulò infra, Cordis enim mucro ad eam pectoris partem pertingit, in quam septum inseritur. *Rossellus* scribit mucronem Cordis in systole, usque ad extrema notharum costarum peruenire, inque septum transvendum inseritur. Supina ignoratio rerum Anatomicarum in utroque Medico istum insignem errorem produxit: quomodo mucro potest ad extrema notharum costarum pertingere, si Cor pericardio includitur, quod adhæret orbiculatum centro nervo Diaphragmatis? Quare sic statuo.

Cor in diastole abbreviatum, dum basis ad mucronem accedit, amplius & tumidius redditur, quoniam admittit, dum contrahitur expellendo prolongatur, & mucro ferit centrum nervum Diaphragmatis, & fortiter expellendo atollit Aortæ truncum durissimum, qui extat & supereminet: dilatatus & intumescens foris pectus in reiectione sanguinis arteriosi. *Franciscus Rossellus, Barcinonensis Medici Epistola receperit sub finem commentarij in libros Galeni de differentiis & causis morborum, scripta anno Domini 1593.*

Pag. 468. Cando & later quod fustarij in septo intermedio Cordis, nullum motum observari: quod faveat meæ opinioni de Circulatione sanguinis, à dextro ventriculo in sinistram. Cur non moueatur, tua ratio non est admittenda, sed quia super aliquo quiete ente motus fieri debet, & musculi interni ventriculorum, firmam habere debent inhesionem. Cum ergo ventriculi supra septum pericium dilatentur, & constringantur instar follium, intus tamen reuulsi basi molli, septum immotum manere debuit ad faciliorem translationem sanguinis per sua foraminula, quæ ocluderentur, si sequeretur motus ventriculorum.

Pag. 468. Miores illæ fibræ quæ in ventriculis Cordis visuntur, & concurrunt ad validiorem motum edendum, sunt illæ porciones carnotæ valvularum tricuspidum, de quibus amplè tractavi in mea Anthropographia, cap. de Corde.

Pag. 470. Quod scribis de pulsatione, quæ in amplo aneurismate percipitur ex sanguine extrusato, Id animaduertat & notauerat *Riolanus*. Vnde licet colligere pulsus arteriarum iuvari à sanguinis motu & saltu, intra sua conceptacula convenientia.

Pag. 470. De motu corpori membranoso arteriæ insito, *Galenus* experimentum falsum esse *Plempius* asserit, per suum experimentum in animalibus viventibus, quamvis id operosum & factu difficile scribat *Valerius*, necdum expertus fuerit, vel ei non successerit, ut *Plempius*. Tandem post longum ea de re discursum,

Pag. 471. Concludit arteriarum diastolem, & ab impullu sanguinis, & à propria dilatactione fieri, & utrumque ad mouendum sanguinem operas conferre, quod probò & admitto, itaut in pulsu naturali, regulari, bene ordinato, systolem Cordis sequatur diastole arteriarum, quarum directus est progressus, sine ambagibus & diuerticulis, ut influxus vitalis spiritus à Corde, in extremas partes fiat in instanti. In pulsu velocissimo & irregulari, ac inordinato, Cor malè affectum ac rennulum, perturbatè suas actiones edit, ac proinde grauius laborat: Melius sperant de salute ægrotantium Medici, dum vident pulsus ex paruo, exili, & eelerissimo mutatum in magnum, elatum & tardum, quod signum est liberiorem esse cavitatori sanguinis motum, atque vias patentiores.

Pag. 472. Hic articulus destruit circulationem totius sanguinis intra horæ quadrantem absolutam. In vena Cava sanguinis quoddam Penarium est, in quo sanguis in futuros usus recondatur, quando copiosior est, quam qui Cordis omnis debet suppeditari. In qua parte venæ Cava recondatur & asseruetur, non explicat: an in trunco? an in venis minoribus Cava? Ergo in quocumque loco asseruetur, non totus fluit ad Cor intra horæ quadrantem. Quomodo manere potest in tubulis Cava quietus, nec labilis? Sed hoc faveat meæ circulationi, quæ constituit in venis minoribus Cava asseruari sanguinem ad futuros usus.

Pag. 472. *Redeo ad chyli distributionem, tuis vestigiis insillens*, per anfractus intesti-  
norum, quæ sit vi peristaltica, constringente tunicam intestinale, sed lento gradu,  
ob rugas tunicæ internæ retardantes fluxum chyli, atque ut commodius venæ la-  
ctææ cunctantem chylum exsugerent, instar hirudinum intestinis applicantur. In  
isto fuctu crassior chyli portio secernitur à tenuiore, quàm venæ lactææ chyli feræ pro-  
lestant.

In illa anadosi chyli, id vnum meum animum torquet, & studium Anatomicum  
interturbat, quomodo chylus candidus esse possit in intestinis, ut in venis lacteis, si  
bilis flaua, quæ tingit naturaliter eodem colore fæces, id est, crassam & extremam  
partem chyli portionem assidue fluat in intestina: an à candore chyli obscuratur  
color bilis? an illa chyli portio secernitur à venis lacteis? Non permisceri chylo, &  
reuehi iterum ad Hepar per quandam circulationem, non est credibile. An expe-  
ctatur tempus distributionis chyli contenti in gracilibus intestinis? tumque bilis ef-  
funditur in intestina per suum porum cholidocum, qui traducitur longitudine v-  
nius digiti intra duplices membranas intestinorum, quæ oclusæ sunt, quandiu chy-  
lus in eo loco moratur.

Potro, chylus per venas lactæas ad Hepar deductus, effunditur in substantiam  
Heparis, ut nouam alterationem subeat, ipsius parenchymatis contactu, ex quo ru-  
brum colorem induit, quem aliàs non acciperet, si intra venulas poræ maneret, at-  
que confestim traderetur venulis Cauæ, opus est morâ ad coctionem illam sangui-  
nis: idcirco non admitto istam anastomosin capillarium venarum, siue lactearum,  
siue venæ Portæ cum radicibus venæ Cauæ. Multo minùs probare possum intra Ie-  
cur illam intexturam, & communionem vasorum Cauæ, Portæ, meatus cholidoci,  
venarum lactearum, & arteriarum, ut Valæus describit. Verùm, quia suppositio illa  
anastomosæos venæ Portæ cum Caua intra Hepar, magni est momenti ad vnum me-  
dendi, hunc scopulum ac scrupulum explanavi & exemi, in mea *Anthropographia*, cap.  
de *vena Porta*.

Pag. 473. *Rationem adfers, tur chylus traduci debuit per venas peculiares*, quæ multis  
non placebit, qui venarum melaëicarum officium aliàs sanguini vebendo, aliàs re-  
uehendo desinant. Sed tu cum *Asellio*, venas lactæas chyli feras substituis, & as-  
signas, ne sanguis per venas delatus ocyùs efflueret, quàm raperetur chylus, quia hic  
tractrix fucularis est multò obscurior & imbecillior expultrice. Attamen scripsisti re-  
obseruasse per venas lactæas, celerius moveri chylum ipso sanguine.

Si venæ lactææ sunt ita dispersæ, ut descripsisti, contra scripturam *Asellij*: An  
id à natura factum, ne simul & semel obstruerentur in suo trunco, & in Hepate? id-  
eoque in mesentericum ramum, in Portæ truncum, in Hepar, & in Cauæ truncum natu-  
ræ parens disperdit, ne cessaret illa distributio alimenti?

Pag. 473. *Non probo circulari sanguinem, ut perfectius excoquatur, suamque perfectio-  
nem nutritiam acquirat in Hepate*: quia distribuitur partibus primæ regionis sine cir-  
culatione ad Cor, sed sanguis ad Cor delatus suam perfectionem vitalem renouat ac  
recuperat, ad conseruandum & restaurandum fugacem partium, vniuersique corpo-  
ris calorem Itaque circulatur in Corde, ut sanguis arteriosus recaleseat, nouosque  
spiritus assumat: A crudis enim & incoctis, si ad Cor tanquam ad cibarium accede-  
rent, insignitet læderetur, quod fieri potest in ægris corporibus, ubi languet Iecur,  
sed non melior ipsis valetudo.

Sed aduertat Valæus, quod scripsit, continuo illo transitu per Cor sanguis calefit, dum  
alius paucies, alius pluries Cor transit. Ergo non totus, qualicumque sit, intra horæ  
quadrantem per Cor circulatur. Multa sunt in isto discursu de vtilitate circulatio-  
nis sanguinis reprehensione digna, sed nolo esse ingeniosus & mordax Aristaribus:  
Non est absolute necessaria circulatio sanguinis ad conseruationem caloris natui in  
remotis partibus à Corde, venæ comites & coniugatas habent arterias, quæ non tan-  
tùm in extremis corporis inter se communicant, sed etiam in progressu suo, ut docuit  
Galenus: Sed Cor dumtaxat sanguine indiget ad sui motus continuationem, & elab-  
orationem sanguinis arteriosi, quem in vniuersum corpus transmittit. Quare cum  
ista circulatio sanguinis à me constituta sufficiat, non est opus Cordi, totum sangui-  
nem corporis & impuriorem, ex aliuâ regione haurire.

Pag. 475. *Valæus totum sanguinem circulari statuit, excepto illo, qui è minimis arte-  
riolis deferretur in carnes, ut rorem, gluten, & cambium constituat: Vocantur in Scholis, Je-*

*candorq; humores.* Hoc posito sequitur sextam partem sanguinis absumi in nutritio- nem diffusam per carnes, quæ non potest inde reuelli & eripi, nisi in morbis: inde colligatiui floues ex habitu corporis emanantes.

Pag. 477. Fateor, mi Valae, circulationem sanguinis per Cor, & te subtilissimè probatam fuisse, sed non totius sanguinis ex aliqua regione, ex habitu corporis, & Cerebro, atque sangui- nem à dextro Cordis, sine per medios pulmones traduci in sinistram ventriculum Cordis, istam- que circulationem intra hora quadrantem obfusu, non probasti sufficienter. Hæc sunt, de quibus inter nos controuertitur, tibi que ad stipulari, & subscibere renunciarò, do- nec ista demonstraueris.

Pag. 478. Certus sum istud experimentum, quod adducis ex ligatura venæ, demonstra- re quidem ascensum sanguinis ad Cor, sed nullo modo ostendit à maioribus ad minores non venire, nam maiores canales venæ Caudæ & Aortæ in suo progressu, venis & ar- teriis minoribus sanguinem suppeditant, partim à partibus attractum, partim ex ap- ertione viarum.

Pag. 479. Londo quod mones in secundo vena, dum ostiis ligatur brachium, interdum vicina arteria motus interceptur, quæ interdum pro vena secatur ab imperito Chirurgo. Vt igitur euires istum errorem; ante ligaturam diligenter explorare digito debet lo- cum, vt dissingat ex pulso venam ab arteria. Dein laxare vinculum, mox rursum istud explorare tactu, & per fortem ac strictam reuulsionem sanguinis versus locum secandum, iterum tentare digito locum, antequam tundat venam.

Pag. 480. Si sanguis tam cito ad Cor venit, quam ab eo pellitur, sequitur quod intra dimidiam horam totus sanguis à Corde per vniuersum corpus expulsus, redibit ad Cor intra dimidiam horam, quod est absurdum, quia inæqualis est motus sanguinis arteriosi impetuose fluentis, & sanguinis venosi tardè redeuntis ad Cor.

Pag. 480. Si è vena fecta cubiti sangui. exasperat effluit, quàm è manu, fusta secatur saluazella, aut saltem non par emolumentum adfert, ac si vena cubiti tunderetur. At- tamen, Spigelius notat magis refrigerari corpus, propter anastomoses arteriarum cum venis, & hæc ratione laudat sectionem saluazellæ.

Pag. 481. Scribis, in Hepate tot sunt rami arteria coliaca, quot sunt rami vena Porta, & totidem quoque sunt rami ductus cholidoci, quod falsum experientia testatur, nam exi- guæ arteriæ binæ intrant subeuntque Iecur, cum Lien insignem arteriam habeat de- scriptam ab Arantio, quàm ignorat Valens. Nun potest in tot vasa æqualia isthæc diuarticatio fieri, sed quo fine non explicat. An vt sanguis arteriosus in venas fluat, & descendat infra Hepat? An vt remigret ad Cor? non probo directum arteriarum & venarum meatus cholidoci, si uticantem in tot ramulos, quot sunt venarum chy- liferarum distributiones. Sed quo fine ista diuisio & insertio arteriarum ad chyliife- ras venas? quorsum venæ Caudæ radicibus venæ lactææ vniuntur? & radices Portæ eandem debent habere communionem? Quæ confusio, & ramorum, & substantia- rum in ista cõplicatione & intextura vasorum? Nonne satius est chylum per Hepa- tis substantiam diffundi, vt contactu carnis in sanguinem vertatur? Iadeque Cor vi- cinum per Caudam rapit ad se, vel sponte sanguis fertur ad Cor.

Vena Porta suum sanguinem eligit, & deducit ad partes nutritias aliuinæ regionis: si venæ Caudæ radicibus venæ chyliiferæ vniuntur, chylus crudus, incoctus, & infor- mis ad Cor raperetur: Arteriæ ad Hepat feruntur, vt cum sanguine arterioso vita- lem huius visceris facultatem, & calorem natium conferuent. Non credo Valam vniquam in viuentibus animalibus id intuitum fuisse, neque istas communiones in mortuis hominibus. Ista vasorum indagatio est admodum difficilis & obscura in vi- uentibus propter sanguinis effusiones, quas nemo vitare potest, etiam si digitis istas partes diuidat, & discepat absque ferro.

Pag. 481. Valens, vt responderet huic obiectioni, multis portas sunt obnoxia fluxionibus, quæ non habent arterias, vt pleura. Nemo pleuræ arterias denegabit, qui viui animalis tho- racem vidit aperiri. Nonquam inspexit singulis costis cum ramulis azygæ arteriam in- tercostalem suppeditari ex trunco Aortæ manantem, quæ deprehenditur adiuncta venæ. Earum arteriarum ortum si velit obseruare, dissecabit Aortæ truncum, & vi- debit mirabiles propagines arteriarum, quales descripsi in meo Anatomico.

Pag. 483. Scribis in animalibus ultra ligaturam aperta arteria sanguinem arteriosum guttatim exilire: Videt tamen Chirurgus incautos, arteriam pro vena secuisse in cu-

bito, & quamvis arctiore vinculo constrictum esset brachium, non sinebat fluere sa-  
liendo à parte inferiore, quasi mutato cursu, quò data porta fluere.

Pag. 483. Isthæc incommoda quæ proponit *Valens*, de impuro sanguine Cor  
mediū permiscere, vitantur per nostram circulationem, quia impuritas sanguinis  
Porræ non transit in venam Cavam, sed consistit intra suos canales, etsi ad Cor per-  
ueniat, non diditur in sinistram Cordis ventriculū, quia à dextro ventriculo re-  
spuitur in pulmones per venam arteriosam, qui sunt veluti emunctoria Cordis.

Impuritatem illam pulmones, vel per anacatharism expurgant, vel remittunt in ve-  
nam per anastomosim venosam cardiacam, ut longius à Corde amandetur. Attamen  
non diffitcor interdum aliquid sanguinis in Corde abundantis, & superflui in pul-  
mones deduci, siue sit purus vel impurus: inde in Aortam traduci, & per arterias dif-  
fundi: ut autem *menstrua ad Caput perveniant, non est necesse per Cor transire*, possunt as-  
cendere ad iugularem, atque substantiā suā, vel vapore infestare, & increscere Cere-  
brum, aut præ feruore euolare ad Cerebrum per venas iugulares.

Pag. 485. Notas ex *Marito*, animalia à quaticis, anates, anseres retinere per totam  
vitam istas anastomoses vasorum Cordis, quia sub aquis non respirant, ac proinde  
Cor non debet cessare à suo motu: quod si ita esset, ut non respirarent, quia pulmo-  
nes tunc temporis sunt immobiles, non est necessarius aer ad Cordis refrigerium, &  
confectionem spiritus vitalis, nec fuliginum suppressione suffocaretur calor natus  
in Corde.

Pag. 487. Scribis, in septo Cordis nullus motus sentitur, nisi quod à spiritibus exitum qua-  
rentibus, palpitatio quadam percipitur, quamvis neges istam translationem sanguinis spi-  
rituosi per medium septum Cordis, attamen aliquid admittis, quod accedit ad il-  
lam opinionem. Nunc manum de tabula tollo, & me subduco, ne videar nimium  
flutare in Euripo sanguinis, ex quo iamiam emetgo, per Dei gratiam, non submer-  
sus & absorptus, ut *Arustoteles*, in cauis Euripi septemflui in die, inuestigandis.

FINIS.





# ANIMADVERSIONES IN OPVS ANATOMICVM ANDREÆ LAURENTII.

A D L E C T O R E M.

P R Æ F A T I O.

**V**ERISSIME dictum fuit à Diao Hieronymo, cum qui scribit, multos sumero indices, quorum dubia sunt, & sæpe maligna iudicia, cum ipse Iupiter nequeat omnibus placere, nullaque litora adeo perfecta reperiatur, qua non lituram aliquam patiat. Quippe nulla scriptio adeo accurata esse potest, qua censuram Criticorum effugiat, inquitbas Plato, qui inimicus est, nodum in scirpo quarit, ais Divus Hieronymus, atque Sapiens Ecclesiastic. 4. monuit, labores & industrias hominum, patere invidia proximi: Præinde rectissime monuit Tullius, vitari non posse ne reprehendamus, nisi nihil scribendo. Cum autem magnitudo nostræ professionis unicuique liberum permittat arbitrium, ut in civitate libera venientes linguasque liberas esse oportet, permittente Tiberio Imperatore, multo magis in Medicina isthac libertas toleranda, & laudanda videtur, ut cum omni modestia & humanitate, doctissimorum hominum errores & hallucinationes notentur, ne alij risdem erroribus decipiantur, quibus illi suere decepti. Nam qui laudat errantem, inquit Divus Augustinus, errorem confirmat, & qui adulatur, ad errorem allicit: Qui erranti comiter monstrat viam, is de lumine suo aliud accendit. In Medicina liberum & honestum esse indicavit Hippocrates, aliorum errores notare, nec ipse dissimulavit Medicorum sui seculi errores, cuius exemplo Galenus, infinitos errores Medicorum notavit & emendavit, & quod magis miraberis, & laudabis in Hippocrate, ingenue suos errores ipse confessus est. Nam à suavis se deceptum fuisse in Autonomo candidè profitetur, more scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam lenta ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt, magno ingenio, multaq. nihilominus habitare, convenit etiam simplex & vera erroris confessio, præcipueque in eo ministerio, quod utilitatis causâ posteris traditur, in quo quis decipiat eodem errore, quo quis ante deceptus est. Divus Augustinus libros Retractionum composuit, quibus suos errores agnoscit & emendat. Denique docti omnes atque ipsi Philosophi, veritatis amore sua decreta rescindere non dubitant, inquit Aristoteles. Nemo itaque nobis vitio vertere debet, si in opus Anatomicum Andr. Laurentij, tam acutè cernimus, & libèrò animadvertemus. Non id feci & suscepi ad aucupandam ex illo multatulo gloriam, nec per ambitionem more Archigenis, qui de se ipse fassus est, quod per atatem ambisiosus & vehementius operis contra quosdam, ut vexaret illos & vreret: nec contradicendi studio sylum adversus Laurentium exacui & direxi, ut insultarem mortuo leoni: Nam cum mortuis non nisi larum luctantur, sed meliore sui parte, imagine vitæ relicta, hoc est, libris adhuc vivat per ora virum. Quem vivum ob singularem & extremam eruditionem, atque Comitum Archiætorum, tanquam Medicorum Mæcetem venerabam, & suaviter aspiciebam, denatam lacessere impium



feret. Nonne illi detrabere animum, harentem capiti meritis cum laude ornam.

Verum, cum publicè sapias, & in Theatro Anatomico, & in mea Anthropographia proposuiffem Andream Laurentij opus Anatomicum, quominus eruditum, & elegantissimè exaratum, infinitis tamen erroribus repletum, & misere sedatum esse, nonnulli id à me temere & inscienter pronuntiatum dixere, vel potius contradicendi studio. Quinetiam nuper scripto ad huius rei demonstrationem me provocauit, cum nihil tale viquequam cogitassim. Satis enim putabam in mea Anthropographia monuisse, erroribus quibusdam abundare Laurentij Anatomem, ut studiosi Anatomes admoniti, fallique cautiore, sedulo eius scripta examarent, & cum subtili accuratè conferrent. Num inuicem & coactus, cum omni tamen modestia & reuerentiâ, quæ debetur manibus & memoria viri præstantissimi & eruditissimi, Animaduersiones in Opus Anatomicum Laurentij descubam, tanquam editionis postrema corrector, si putes ab incuria typographia istos errores profectos. Non examinabo quæstiones physiologicas, quæ possunt in utramque partem agitari, in quibus suam quisque poterit industriam, & ingenij subtilitatem experiri. Rem tantum Anatomicam, id est, strucluram partium, quæ logicæ Anatomes fundamentum est, emendabo.

Propterea non possum probare institutum Colladonis, qui animam Laurentium insectatur, & acerbè nimis in quæstionibus Physiologicis reprehendit, quas tueri, quilibet eruditus potest. Atque ut occasionem caperet contradicendi, prima editionis librum recepit, cum tamen postrema editio anni 1600. auctoris manu sicca fallaque fuerit, varia voluminis forma in Gallis & Germania excusa, quæ ipsum latere non potuit. At de rebus Anatomicis pauca quædam adserpsit, Laurentio sæpius opponens alterum Anatomicarum auctoritates, & pillulas. Inde Collado suam ignorantiam in rebus Anatomicis manifestè prodidit.

Propterea, frustra congeritur, quod Bauhini narrationes Anatomicas non legeris, vel neglexeris, quas tamen sequi & imitari deberas. At Bauhini grandis labor Anatomicum in Theatro Anatomico expressus, quinquaginta post editionem ultimam Operis Anatomici Laurentij prodit in lucem: denique Laurentius iniquè damnatur, quod multa prætermiserit ab aliis exposita, nec Fallopij opiniones ad verbum transcripserit. Noluit vir doctus opibus ingenij sui fretus, aliena misse discedere, & suum librum transcriptionibus variis auctorum referre, nec in maiorem molem excrescere, contentus fuit digitum ad fontes intendisse, & auctorum verba præcipua produxisse. Nec enim reprehenditur, qui in ampla segete stipulam reliquit ad spicilegium. Fortè quidem de quibusdam enunciare aliquid canari, vel de omnibus, nihilque prætere, videri posuit, vel multa impudentia, vel multa arrogantia argumentum, inquebat Aristoteles lib. 3. de Cælo.

Quare petulantis & malignæ Colladonis emendationes in Laurentium effusæ, non mereantur responsum, nisi quæ ingenij experiundi gratiâ, velis cum ipso de Physiologicis quæstionibus certare, quas nemo ad cultum omnium unquam poteris componere: sed rerum Anatomicarum veritatem sensu, & animâ comprobata, nullus nisi sensu communi, & oculis captis repudiabit, præsertim si à peritissimo Anatomico demonstretur, qui in rebus Anatomicis operam aliquam dederunt, quibus non poterit tam facile imponere, res ipsas suo arbitrio subiiciens, & disponens, pro varia partium dissectione ad libitum administrata.

Quid referemus enim, quod nobis sensibus ipsis

Certius esse queat, quæ vera & falsa noramus,

Qui nisi sint veri, ratio quoque claudicet omnis.

Ceterum, Laurentij Opus Anatomicum emendare proposui, quia post aliorum præstantissimorum Anatomicorum opera, tanquam exemplar ablatissimum conditum & editum fuit, quæ Laurentium consuluisse, & in suos usus conueruisse probabile est. Cum istos auctores, præsertim Vesalius, Fallopius, Eustachius, Arantius, Coiterum nominatim producat. Sic Galenus præ cæteris Anatomicis, Lyci errores emendauit, quod cum perfectissimè de rebus Anatomicis scripsisse vulgò ferebatur: & lib. 1. de visu partium, libris eorum qui se Anatomicos vocant, multis erroribus abundare notat, de quibus librum pollicetur. Præinde dum Laurentium corrigo, reliquos Anatomicos priores emendo. Opus quidem arduum, sed non impar meis humeris, qui tamardum laboribus Anatomicis sunt assuefacti.

Corrigere, at tantò res est magis ardua, quantò

Magnus Aristarcho maior Homerus erat.

Inde cognosceris quanta fides tribuenda sit libris Anatomicis, & quàm turpiter errant & halu-

hallucinentur, qui ex solis libris mendosis, & picturis fallacibus, se perfectam Anatomem cognitionem adipisci sperant: Quos omnes errores sedula & frequenti indagazione in cadaveribus plerumque centum reperta detexi: Meam indicaturam verissimam esse comperies, qui mihi dissecanti & demonstranti Anatomem ter vel quater adfueris, dein meis præceptis instructus & informatus, eundem laborem sedulo susceperis. Nec quis autem me falsis asis insimulet, ut omnes dubitandi causas rescindam, his aut ter in publicis Anatomis errores istos me patefacturum spondeo, atque pollicor.

Propterea non possum satis increpare quorundam Medicorum credulitatem, vel potius ignorantiam aut inertiam, qui se perfectos & eruditos Anatomicos credunt ex librorum lectione, atque inspectione unius aut alterius cadaveris humani à Chirurgo persuntoribus dissecti: Ideoque confidenter de rebus Anatomicis publicè disserunt in Theatro Anatomico, dissectoribus præesse gloriantur, & ambiunt, Chirurgo interim ad libitum secante, & Anatomem demonstrante, qui cum in lectione peritissimatus Anatomicorum non fuerit versatus, & eadem quandam Anatomem à suis præceptoribus Chirurgis acceperit, saltem suis auditoribus impertiet, & Medicina studiosis communicabit, annuente nec repugnante Medico, qui in ea re non sapit supra Chirurgum dissectionem, nisi fuerit in Administrationibus Anatomicis diu multumque exercitatus. In tanta rerum Anatomicarum obscuritate, faciem præferre cæcatus sum, & lampadem aliis tradere, ut accuratius & diligentius, in historiam Anat. Andree Laurentij, etiam in quædam opera Anat. animaduerti. Nec enim deerunt, qui meum institutum improbant, quod in alieno libro sum nimis Lynceus & oculatus, in meo penitus cæcus.

Cum tua non videas oculis mala lippus inunctis,

Cur in amicorum virilis ram cernis acutum,

Quam aur aquila aut serpens Epidaurius?

Quibus respondeo cum Cicetone, tantum abest, ut contra nos scribi nolimus, ut etiam maxime optemus. In ipsa enim Græcia Philosophi in tanto honore non fuissent, nisi doctissimorum contentiones diffinitionesque vighissent. Vt enim pictores, & ij qui signa fabricantur, & veri etiam Poeta, suum quisque opus à vulgo considerari vult, ut si quid reprehensum fuerit à pluribus id corrigatur: Ita nos desideramus nostrum Opus Anatomicum à viris doctis examinari, ut si quid reprehensione dignum occurrat, Authori superis regressus ad veniam.

Corrigenda si quæ sane vilia nobis hic erunt,

Non ero stultè repugnans, aut amans præuè mea,

Quin statim culpanda delens, præbeam rectis locum;

Er correcta magis, quàm condemnata vocabo,

Apponer docti, quæ mihi lima viri.

Sed optarem meorum librorum Anatomicorum Censorem Anatomicum, qui manu propria tractaret Anatomica, ut oculatis digitis demonstrare queas falsitatem mearum Observationum in rebus Anatomicis. Nam quod spectat ad quæstiones Logicas & Problematicas, quas ad definitionem Aristotelis in medium sapientis produxi, cum possim in vitamque partem agitari, forsitan aliquis ingeniosus esse poteris oppugnat, ut audeam sui cum ratione assertor.

Præterea, grata mihi semper erunt eiusmodi Animaduersiones, si in refellendo non opponas alios Anatomicos à me dissentientes, quoniam omnes aliter sentientes contra sensum, & animam, peccare aut hallucinari sustineo: Neque me desipere, vel alios decipere putabo, dum hæc literis consignans, nisi peritus Anatomicus, aliam mihi rectiorem viam indicaueris.

Desine quapropter nouitate exerrare ipsa,

Expone ex animo rationem, sed magis acri

Iudicio perpende, & si tibi vera videntur,

Dede manus, aut si falsa est, accingere contra.

**L** Laurentius, præfatione ad Lectorem, multa prioribus sæculis incognita, & diligentia sua Observatione animaduersione in apertam lucem proferre pollicetur. Cum tamen nihil ab eo supra præcedentes Anatomicos obseruatum fuerit. Foran intelligit vasa spermatica, à nemine adhuc descripta, spinalis medullæ, & neruorum ab ea procedentium diuaticationem, Cordis in Fœtu, & recens natis anastomoses, quæ omnia tanquam à se inuenta prædica uit, & Iconibus depinxit. Arramen vasa spermatica eiulantia ad vteri collum protensa ab ipso Herophilo obseruata fuerant, vrligitur apud Gal. lib. 2. de semine. Fernelius eleganter descripsit, quamuis nonnulli cum Galeno, de hyparxi eiusmodi vasorum dubitent. Spinalis medullæ diuaticario à Colombo, & Piccolomino prius designata fuerat. Vasorum Cordis in Fœtu anastomoses eleganti libello longè ante Lan-

ventium descriptæ fuerant à Baptista Carcano, & Piccolomino. Venarum Porta & Cava anatomis intra Hepar ab ipso Piccolomino descriptæ & delineatæ fuere, & à Bauhino, variis in locis, & præsertim lib. de partibus similibus asseritæ & demonstratæ ante Laurentium.

Quod spectat ad figuras: sunt omnes ad imitationem Vesalii, siue ex præcedentium Iconibus Amstelredamensis excusis effictæ, nec tamen meliores. Novum autem modum docendi Anatomiam, inchoando à partibus similibus, tanquam à Medicis & sensibilibus elementis, ex quibus totum corpus componitur, primus Sylvius indicauerat & sequutus fuerat in sua Isagoge Anatomica. Historiam cuiusque partis primum describit, dein Controversias omnes Anatomicas commentationum instar attexit. Ac sanè Controversias quasdam Anatomicas peritè examinat, sed quamplures quæstiones interferit, quæ nullo modo ad institutum Anatomicum pertinent, nisi velimus totam Medicinam ad Anatomiam revocare: Cuiusmodi sunt illæ de partibus similibus, lib. 1. de motu facultatis, lib. 4. de adipe, de sacum fatore, de chylosi, de naturali spiritu, de rerum materia, de Semine, de sanguine menstruato, de monstris, de Ectromphrodito, de gemellis, de superfætatione, de lactis generatione, de vitali spiritu, de sede principum facultatum, de animali spiritu, de visione & auditu. Nusquam ipse Galenus, lib. de usu partium, & in libris Anatomicis, consimiles quæstiones Physiologicas, quæ ratione potius, quàm inspectione tractantur, proposuit. Initio libri de musculorum dissectione, Lysilabrum Anatomicum damnauit, quod omnia prolixius interpretetur, & Logicas quæstiones rebus Anatomicis inseruerit, prorsus alienas & remotas ab arte Anatomica.

Cap. 1. lib. 1. Laurentij præfationes ad commendationem corporis sunt eleganti stylo scriptæ, quamvis ex Calij Rhodigini variis lectionibus, & Scaligeri Exercitationibus in Cardanum, magna ex parte depromptæ, scita quidem derivatione in usus suos ita conuertens, ut etiam si appareat vnde desumptæ sint, aliud tamen præ se ferant, quàm vnde deductæ fuerint. Proinde iniquè accusatus fuit de plagij crimine à Colladone, nam, ut rectè Flavius Albinus dicebat, fructus legendi is est, ut æmulis, quæ in aliis probas, & quæ maxime in aliorum scriptis miraris, in aliquem usum tuum opportuna derivatione convertas. Istum scribendi morem non improbat Isidorus Pelusota, epist. 133.

Cap. 2. lib. 1. Dum Laurentius eleganter & philosophicè de hominis dignitate & excellentia multa disseruit, & nimis argutè philosophatus est: Absurda quædam proposuit, quæ non augent hominis dignitatem, sed potius minuunt, ac depriment, quoniam ista cum brutis communia habet. Solus figuram in calum versam obtinuit homo, & idcirco solum inter cetera animalia formatus est ad rationem universi, quia superiores, inferiores, anticas, posticas, dexteras, ac sinistras partes habet distinctas, reliqua animalia hæc non habent, aut confusas admodum. Dextra & sinistra similia omnino sunt, nisi quod sinistra imbecilliora: at antica postica dissimilia sunt: Inferiorem autem aliquam ex parte superiorum similitudinem præ se ferunt. Istæc omnia in brutorum corporibus reperiuntur. Notare licet partes anticas, posticas, dexteras, sinistras, superiores, inferiores, quin etiam dextra sunt sinistris similia, & pedes anteriores posteriorum similitudinem quandam præ se ferunt, ut in homine pedes manuum structuram æmulantur: sed non respiciunt ezelum naturaliter ut homo.

Cap. 2. lib. 1. Solus homo viventium omnium temperiem in se concludit, reliquorum animalium singula ferè omnia, idem in eadem specie temperamentum obtinuerunt: Vnus homo non potest in se comprehendere reliquorum animalium temperiem, sed in pluribus hominibus animalium diuersa temperies reperiri potest, ut in brutis eiusdem generis diuersa temperies, ac peculiaris cuiusque idiosyncrasia reperitur, si ex contrariis elementorum qualitatibus & substantiis constantur eorum corpora. In stirpibus quidem eiusdem speciei idnotatur, non autem in brutorum corporibus perfectioribus: propterea inter animantes eiusdem speciei, quædam sunt animosiores, à feruida temperie, aliæ segniores & timidiore, ex temperamento frigidiore, ut in eorum specie obseruare licet.

Cap. 2. lib. 1. Hominis dignitas id indicat, quod pluribus morbis obnoxius sit, & ab extremis equaliter ledatur. Ergo temperatus homo adeptus est corpus causarium & valendarinarium. Nec ipsam debet accusare naturam de sui corporis imbecillitate: Ergo non sine ratione Democritus, hominem totum à natiuitate morbum esse scripsit. Ego verò exilimo corpus, quod moderatam temperiem obtinuit, & quod corporum

omnium temperatissimum est, non esse morbis obnoxium, quia si æqualiter distat ab extremis, non potest ab illis lædi facillè, si caueat sibi.

Cap. 2. lib. 1. *Multus est Laurentius in præbenda analogia hominis microcosmi cum maiore mundo: sed quæcumque profert ad demonstrationem huius paralleli, reperiuntur in brutorum corporibus, ut notarunt Porphyrius in vita Pythagoræ, & Rabbi Moyses Aegyptius in suis quæstionibus perplexis & resolutis: At nemo vnquam dixit alium esse microcosmum, in eo tamen reperitur eadem structura Cordis, Hepatis, & reliquarum partium naturalium, ipso teste Laurentio, capite sequenti, adeo ut facultates naturales & vitales, atque animales ministræ sunt eadem, excepta rationali, quibus corpus vniuersum regitur & administratur. Quomodo sit admittenda & interpretanda hæc analogia mundi & hominis, copiosè demonstravi.*

Cap. 4. lib. 1. *Et in homine, & cæteris animalibus par est vita ac nutritionis ratio, ita vitæ & naturalium organorum in his non est dissimilis structura: sensus verò & motus, in quibus animalitatis natura consistit, organi maiori artificio constructa sunt. Summam iniuriam facit homini, eum partium internarum fabricam in brutis humanæ similem esse statuit. Galenus aliter sentit libris de usu partium, qui inspecta cuiusque animalis forma externa interiorem fabricam diuersam esse iudicauit. Itaque cum hominis forma externa prorsus diuersa sit à forma brutorum, concludere licet interiorum partium dissimilem esse structuram, ut alibi demonstraui. Laurentius æquior fuit ipso Vesalio, qui structuram Cerebri humani non esse diuersam à Cerebro brutorum statuit, lib. 5. Anatome. Sed in quibus partibus discrimen illud vtriusque Cerebri consistat, debuit Laurentius assignare. Nam moles & amplitudo Cerebri non constituit vllam dissimilitudinem, quia magis & minùs non mutant speciem, neque formam, alioqui nulla esset similitudo hominis microcosmi cum maiore mundo.*

Cap. 4. lib. 1. *Quamuis Laurentius magnam partem huius capitis ex Plinio, lib. 11 de præmiserit, non tamen fideliter sensum expressit, verborum mutauit. Palpebra quadrupedibus in superiore tantum cilio, volucris in inferiore, homo solus, si struatur, ut melius exprimitur, vtriusque palpebras habet. Plinius dixit in genis, Laurentius mutata voce dixit cilium: Improperia est significatio cilij, apud omnes Authores Latinos, nec vnquam usurpatur pro gena aut palpebra. Testem adduco ipsum Laurentium, de oculo. Præterea hæc de palpebris observatio pertinet ad motum palpebrarum. Quadrupedes binas habent palpebras, sed solam superiorem manifestè mouent. Volucres inferiorem motitant, homo vtramque, sed superiorem manifestius mouet. De Struthio camelo dubitatur, lege varias Plinij lectiones, Hermolai, & Pintiani Hispani, & Vesalii Aldraundum, cap. de Struthio camelo.*

Ibidem. *Diffant oculi hominis sibi intervallo minimo, ut celerius ab altero in alterum transmittatur spiritus. Absurda hæc ratio, sed potius ut amborum oculorum idem sit intuitus, & radij minore spatio inuicem coeant, ideoque extrinsecus non possunt ab vno in alterum oculum transmitti spiritus. De refluxu interno id potius intelligendum. Proximitas oculorum externa breuiorem non facit vllam communicationis inter se per neruos opticos.*

Ibidem. *Vni animalium homini deprauantur oculi, unde cognominata Struthium & patrum. Non potest meritò laudari homo ab isto vitio, isthæc imperfectio oculorum tacenda erat.*

Ibidem. *Aures homini tantum immobiles. Imo quibusdam etiam mobiles cernuntur, ut tu fateris, pag. 351.*

Ibidem. *Soli homini clauis data sunt. Etiam simia clauis habet.*

Ibidem. *Nullum est animal, quod mammas parte priore gerat præter hominem, Elephantis mammas duas quidem, sed non in pectore. Si partem priorem accipit pro pectore, etiam auis vespertilio mammas habet in pectore: Si priorem partem accipit pro anteriore, etiam auis illa in priore parte corporis obtinuit.*

Ibidem. *Quæ de pilis philosophatur Laurentius, non intelligo, adeo subtilis est eius discursus, ut Oedipus opus sit ad soluenda eius ænigmata. Animalibus, quæ pilis vestiuntur partes præter hispidas sunt, supina aut glabra omnino, aut minùs pilis ornata. Subungui: Homo contra, parte priore, (intelligit, credo thoracem & venterem) hispidior est, quia cum pili operimenti gratiâ facti sint, egent quadrupedes prono tegumento. Sequens verba sunt valde obscura & inexplicabilia. Priora autem esse nobiliora sunt;*

*tamen per corporis flexum fouentur: Nescio, quid intelligat per priora nobiliora, quæ per corporis flexum fouentur, an illa referantur ad quadrupedes, an ad hominem, an ad utrumque? Nam si in brutis per priora sumas dorsum, partem superiorem, hæc pars non fouetur per corporis flexum. Si per priora, partem pronam accipias, hæc pars non fouetur per corporis flexum. Sermonem suum concludit. Homini verò, quia ob celsam rectamque figuram corporis anterior pars compar erat exteriori, debuit nobilior pars muniri. Ergo anterior pars corporis, & nobilior pars munitur, quia compar est posteriori. Quid per comparitatem illam intelligat, diuinandum relinquo. Ego verò agnosco inter partem anteriorem & posteriorem corporis summam disparitatem.*

*Ibidem. Solus homo canescit & caluescit: Etiam equus, cuius ætatem, ex canitie & caluitie dignoscimus.*

*Ibidem. Omnium quadrupedum crura & coxæ Ossibus, neruoque abundans, carne deficiunt. Similiter in homine crura & coxæ Ossibus neruoque abundans. Fateor quidem nates homini carnosiores ad sedendi comoditatem, sed etiam Os Ischium, & tota circumferentia articulationis coxæ, carnis circumdata est in brutis.*

*Ibidem. Flectunt quadrupedes crura priora, & posteriora contrario modo, quam homo, nam brachia retrorsum flectit, crura antrosum. Dicere debebat brachia antrosum flectit, crura retrorsum.*

*Ibidem. Homo cum ad iusta incrementa peruenit, partem superiorem habet minorem, quam inferiorem. Priusquam verò adolescat, superiorem maiorem habet, contra quam cetera animalia. Debebat designare locum, in quo mensuram illam partis superioris & inferioris reperias. Scio umbilicum à quibdam statui, quo si suspendas embryonem septimestrem, inuenies partes superiores inferioribus præponderare, at in adultis æquales sunt pondere. Vide Aristotelem, libro quarto de historia animalium, cap. 10.*

*Ibidem. Ceteris animalibus discrimen Ossium nullum, sed omnia primo ætate perfecta apparent. Nanquam Laurentius animaduertit vitulorum, aliorumque recens natorum Ossis coronata esse epiphyse, quæ Ossis additamentum est molle, sensim induratum, in Ossis substantiam, ut in hominibus. Idem ante Laurentium notauerat Aristoteles, sed errauit cum Laurentio.*

*Ibidem. Solus homo terrestrium bipes: Quidni & alia animalia, quæ duobus pedibus gradiuntur, non autem volant? Nonne alter Philosophus in Scholam Platonis introduxit animal bipes implume, gallinam? dum definiret hominem animal bipes implume.*

*Ibidem. Solus ad amissum rectum crurum beneficium incedit. Rectitudo illa ab articulatione femoris cum tibia, & cur rectus incedat à latitudine pedis, ut demonstrat Galenus.*

*Ibidem. Solus homo sedet, quia diu stare non potest, & necessariò sedet, ob nobiliorem finem, ad præclaras artes exercendas. Ignorat causam assignatam à Galeno, inter animalia solus homo sedet, quia crura habet sic disposita per articulationem in coxæ, ut possit antrosum flectere, atque commodè sedere, est quando spina cum femore angulum rectum facit.*

*Cap. 5. Alexander Magnus inter tot tantisque rerum gestarum triumphos, si animalium naturam, & singulas partes, sub præceptore Aristotele diligenter obseruasse gloriabatur. Ignoro, unde hoc Laurentius fuerit expiscatus, scio Alexandrum conquestum fuisse, quod multa publicasset, quæ sibi propria cupiebat, & ingentem pecuniæ summam impendisse in conquirendis animalibus, ad contextendam historiam animalium, sed præsentem fuisse Alexandrum, aut habuisse libros illos, non memini me legisse.*

*Cap. 9. Ars Anatomica duobus modis comparari potest, inspectione, & doctrina, uterque modus ad artis perfectionem est necessarius, sed prior certior, posterior nobilior, ille historicus, hic scientificus dici potest. Si acquirendi Anatomen modus per inspectionem est certior, alter ex libris, aut discursu, potestne esse nobilior si incertus? potestne etiam scientificus esse, si incertus: quoniam ex lectione, & auditu comparatur.*

*Segnis irritans animos demissa per aurem,  
Quam quæ sunt oculis subiecta fidelibus.*

*Ibid. Summam iniuriam facis peritis Anatomicis, Carpa, & Vesalio, dum eos nostro sæculo uos fecisse narrat, quod est falsissimum, ut demonstravi in Anthropographia.*

*Ibidem.* Prudenter indicauit Laurentius impiam, & planè inhumanum, nec ullo modo neceſſarium, viuos homines incidere, poſtea addit, ſed inhumanum indicatum eſt, ob Anatomies imperitiã, viuos necare homines. Ergo iſta crudelitatis pendet à ſola opinione vulgi, propter Anatomies imperitiã, quaſi in perito Anatomico nulla ſit inhumanitas, viuos necare homines: facinus equidem horrendum & impium.

*Ibidem.* Ante Galeni tempora ſolebant veteres in Alexandrina adoleſcentibus cadauera reſectã proponere. Non id legi apud Galenum: ſed oſſa primùm demonſtrata fuiſſe, & Oſteologiam artis Anatomicæ tyrocinium fuiſſe: Cur enim præponerent cadauera reſectã, deinde integra corpora, cùm externarum partium exte facilior ſit, & in iis primùm ſe debeat exercere iuuenes.

*Ibidem.* Cùm duplex ſis ſectio, vel partis à toto ablatæ, vel totæ adiacentis, prius admiſtranda ſectio partis à toto ablatæ, quia facilior, quàm ſecare tot adiacentem. Iſta ſunt ridicula, niſi de viſceribus brutorum interpreteris, quæ Galenus conſulit in ſcillo emere ad vſum Anatomicum, quia non ſuppetunt tot cadauera, vt partes ſeorſim exemptas perluſtrems. Deinde earum continuïtas cum aliis non obſeruat, ſi à toto ſint ſeparatæ.

Cap. XI. Galenus æſtiones partium indicauit libri de facultatibus naturalibus, de placitis Hippocratis & Platonis. De vſu verò ſingularum corporis partium, decem & octo. Galenus libris de vſu partium, etiam actiones declarat. Titulum præſtitit de vſu partium, quia nulla pars eſt, quæ vſum non habeat, at non omnes actionem edunt. Hallucinatur in numero librorum, de vſu partium, cùm decem & octo numerat.

*Ibidem.* Methodus librorum Galeni de vſu partium, deſcripta à Laurentio, de prompta eſt ex Capuaccio in Methodo Anatomica.

*Ibidem.* Cùm enumerat libros Galeni de vſu partium, ſcribit decimo ſexto & decimo ſepimo, venas, arterias, nervos delineari. Poſtremus liber eſt veluti omnium epilogus. Ergo erant decem & octo libri de vſu partium, ſed poſtremus qui eſt decimus ſepimus, non decimus octauus, vt voluit Laurentius, non eſt epilogus omnium præcedentium librorum, ſed epodos, gratias Deo agendis dicatus.

Cap. 12. Fecit Aristotelem in deſcribenda animalium & hominis natura omnibus excelluiſſe, poſtea rei Anatomica præſus ignarum declarat, neque hominum corpora ſcuiſſe. Ab iſta calumnia tueret Aristotelem, niſi alibi maniſeſtè probaſſem, Aristotelem peritum fuiſſe Anatomicum, nec humanis cadaueribus pepereſſe.

Cap. 13. & 14. Multum hallucinatus eſt Laurentius, in recensendis veterum & poſteriorum ſæculi Anatomis. Dioclem Coryſtium Anatomicum indicat ex epistoſa ad Antigonium Regem, quæ tamen nihil de rebus Anatomicis continet: ſed pro ratione partium, ſive cavitatum, in quibus humores aſſeruari ſolent, medicamenta diſtribuit, ad purgandum caput, thoracem, ventrem & vetricam, vt legere eſt in epistoſa, quæ ad finem lib. 1. Pauli Aeginetæ adnexa eſt. Vberiora de ſtudio Anatomico Dioclis, proferre poterat ex antiquorum monumentis.

*Ibidem.* Erratum memoria eſt, dum ab Herophilo, ex relatione Tertulliani, plus quàm ſeptuaginta cadauera ſecta fuiſſe narrat. Cùm tamen apud Tertullianum, lib. de Anima, cap. 10. pluſquam ſexcentos homines exſecuerit, vel vt alij legunt, ſeptingentos: Niſquam memini me legiſſe Medicum & Anatomicum, qui Calpiſus dictus fuerit.

Multum errauit in Chronologia, dum authores Anatomicos, quos nominauit longè inferiores ipſo Ariſtotele, excepto Diogene Apolloniata, ætate præceſſiſſe Ariſtotelem potat, dum ſcribit, ſi Ariſtotele & Galeno ſides eſt adhibenda, multa abſurda & ridicula eo præſuſſe credendum, quorum omnium nulla extans apud nos ſcripta. Attamen, ſi Diocles Coryſtius ex epistoſa ad Antigonium Regem iudicari debet Anatomicus, proſtat excuſa cum Paulo Aeginetæ.

Præterea, inter veteres Anatomicos qui ex profeſſo ſcripſere, & nobis reliquere ſua monumenta, omiſit Ruſſum Ephreſium, & Meleſium. Secretus nihil ex profeſſo de re Anatomica ſcripſit. Inter Anatomicos poſterioris ſæculi nominat Pigafetam, cùm nullus vquam Medicus inter recentiores, tali nomine inſignitus extet in Bibliothecis. Scripſit quidem Pigafeta, Hiſpanus, de rebus Indicis, verùm non erat Medicus, nec Anatomicus.

Cap. 15. Anatomies duplex acceptio, nam aut actionem denotat, quæ manu perſicitur, aut habitum animi, & actionem intellectuſ perfectiſſimam: Illa Præctica, hæc Theoretica di-

ciur, illa ad usum artis omnino necessaria est, hæc utilis tantum, & sæpe supra usum artis, illa partium structuram, hæc structura causas, actiones, & usum inquirat. Quis non agnoscit in his verbis magnam contrarietatem? Nam si Theoretica structuram, actiones & usus partium exponit, non tantum utilis, sed etiam necessaria est, quoniam ab actionibus læsis indicationes partium affectionum defumuntur.

Pæterea, si Theoretica est scientifica, quidni erit non tantum utilis, sed etiam necessaria? Si Theoretica est tantum utilis, & sæpe supra usum artis, non verè pertinet ad Medicinæ usum, ideoque Medico non est perdiscenda, sed Philosopho relinquenda, qui partium actiones supra usum artis nuspiam Medicis commendauit, ideoque ista Anatomie scientifica non erit nobilior, si de rebus incognitis, nec vnumquam visis Doctor & discipulus inter se dissentient, si ex libris vnus doceat, alter discat Anatomem. Attamen *Laurentius* c. 9. vtrumque modum historicum & scientificum, ad artis perfectionem esse necessarium decreuit.

*Ibidem.* Inter instrumenta Anatomica enumerat *urebras, multolos, & modiolos.* Non intelligoad quem vltum pertineant *modioli* in Anatome, aut non intelligit veram significationem *modioli*, qui *Trepanum* concavum significat.

Cap. 16. *Vtrumque Anatomæ & historicæ, & scientificæ subiectum est pars, non enim corpus integrum, continuumque tractat Anatomicus, sed in membra, partesque diremptum.* Non potest esse pars subiectum Anatomici operis, nisi fuerit composita & dissimularis, nam pars similis omnis non est sectioni exposita, si scorsim spectetur: Ideoque Anatomicus corpus integrum, continuumque tractat, quatenus in membra, partesque dirimendum, alioqui si esset in membra partesque diremptum, nulla esset Anatomie, quæ accuratam & iteratam sectionem significat.

Cap. 21. *Laurentius istam diuisionem corporis non bene expressit, ex Fernelio deprimam in tres Regiones publicas, quarum una uterque prima, è gula in mediam lecoris partem dirigitur, in qua ventriculus, vena mesenterica, caua lecoris, Lien, & his interiectum Pancreas includitur.* Reprehendo quod omiserit intestina, & cystim felleam, & quod gulam, siue œsophagum direxerit per mediam lecoris partem. Debat dicere anatomicè loquendo, comprehendere omnes partes quæ aluntur, & alluuntur à vena porta, omnes istæ partes constituunt primam regionem cum vena Porta. Ex *Laurentio* altera regio è medio secõe in tenues partium singularum venas ecurrit, comprehendit iecinoris conexa, venam cauam, atque illi comitem arteriam maiorem, & quicquid eorum incidit inter axillas & inguina. Ergo omnes partes ventris inferioris iterum referuntur ad secundam regionem. Omisit enumerare partes vitales. Ergo rectius dixisset secundam regionem extendi ab axillis, vsque ad inguina, & comprehendere omnes partes, quæ à trunco Caudæ nutriuntur. Ex *Laurentio*, tertia regio musculos complectitur, membranas, ossa, omnem denique corporis molem. Miror, cur omiserit caput, ad quam regionem reuocari debeat, non explicat. Ego verò tertie regionis præcipuam partem constituo, nec enim priuata pars censenda est, sed publica, quæ in diuisione corporis primam partem trunci, siue cauitatem constituit.

### De Ossibus.

Lib. 2. **Q**uamuis ossium differentie desumptæ, ab iis quæ essentiam constituunt, & iis quæ accidunt, non sint reiiciendæ, nullibi tamen à *Galen*o fuere sic explicatæ, quamuis lib. de usu part. partes ita examinandas esse docuerit. *Laurentius* inter Ossium differentias hanc assignat, quod quadam mouentur, ut quæ per diarthrosim articulantur, quadam sunt immobilia, ut quæ per synarthrosim connecluntur. Debat dicere per symphyfim iuncta esse immobilia, quia ipse tribuit motum obscuro synarthrosi, ex doctrina *Galen*i. Falsa quoque hæc differentia, quod quadam ossa imperfecta, alia perfecta gignantur, ut aurium ossicula & costæ, quia auris ossicula infantibus aliquatenus minora sunt, quàm adultis, costæ etiam adhuc magna ex parte sunt cartilaginose.

Cap. 4. Nonquam *Hippocrates* scripsit constructas epiphyyses, ut sint tanquam ventres Ossium, in quibus coquatur Ossium alimentum, quod sensum in eorum cauernas percoletur. Ergo cum desint in adultis, non posset Os nutriri defectu epiphyseon.

Cap. 5. quæst. 7. *Laurenty institutum laudo*, dum *Galen*i doctrinam de articula-



tione Oſſium animoſe defendit. Articulationem opponit ſymphyiſi: illam in contiguitate ſolique contactu extremorum conſiſtere: hanc vero per extremorum unionem perſeſi, dum Oſſa quæ duo erant, continuantur, & vnum ſiunt. Diarthroſeos, & ſynarthroſeos differentias ex mente Galeni accuratè proponit, & ſub ſynarthroſi, præter tres diarthroſeos ſpecies, tres alias contineri, ſuſuram, harmoniam & gonphyſim. Sed reſpectu futuræ duplicem differentiam, ſerratam, & ad vnguem. Prioris exemplum proſert in cranio, poſterioris nullum, ac lanè inanis eſt hæc differentia ad vnguem, nec reperitur.

In explicanda ſymphyſeos natura, dubius & inconſtans fuit Laurentius. Eleganter & pueri à ſimodum aduerſus Reſalium docet ſymphyiſim non poſſe reſerri ad ſynarthroſim, cum ſit oppoſita articulationi: Tota enim ſymphyſeos natura, in contiguitate ſita eſt, vt articulationis natura in contiguitate, ſoloque contactu extremorum conſiſtit. Symphyſeos exemplum proponit, cap. 4. lib. 2. dum Os alteri Oſſi præcipuo, per eam ſymphyſeos ſpeciem connectitur, quæ ſit ſine medio, adiungit. Eſt ergo epi-  
 phyſis Os per ſe, totu Oſſi per ſymphyiſim adnexum, non autem Oſſis cum Oſſe vniſſo. Ita enim à ſymphyiſi non diſtingueretur. In hac particula multa obſeruabis ſibi contradicentia: Nempe, Os per ſe toti Oſſi per ſymphyiſim adnecti, & tamen à ſymphyiſi diſtingui. Exempla ſymphyſeos proponit, quæ non reſpondent doctrinæ Galeni, nam ſi ſymphyſeos eſſentia in vnione, per extremorum contactum conſiſtat, Os hyoides non poteſt per ſymphyiſim aliis Oſſibus connecti. Nec in omni laxa articulatione neceſſaria fuit ſymphyiſis, quia diſtat omnino ab articulatione, & ſeorſim exiſtit, nec reperitur vnquam, vbi eſt articulus.

Cap. 6. In generali diſpoſitione Oſſium, extremam pedem male diuidit in medium, metapodium, & digitos. Nam pedium eſt metataſi pars caua, & inferior terram tangens, nec rectè dicitur metapedium, pro metatarſo.

### De Cranio.

Cap. 7. Cranij figuram oblongam eſſe ſcribit, vt Cerebrum & cerebellum contineat, protuberare anteriore parte, ob apophyſes mammillares odoratus organa, poſtiori ob ſpinalis medulla eorum, & cerebelli ſinum. Incepta ratio de protuberantia antica, cum apophyſes mammillares ſint in homine exiles admodum, ſine vlla promi-  
 nentia mammillati. Veriſimile eſt, cum propter ventriculos anteriores protuberare cranium, tum quia ad latera compreſſum eſt: inde formari ſinum frontalem putat Laurentius, cum tamen in paucis craniis repetiatur, etiam ad latera compreſſis.

Cap. 8. Non aſſequor, quomodo cranium pluribus oſſibus extructum eſſe debeat, quæ craſſitie & ſoliditate differant ab Cerebri functionum varietate, & medullarum ſubſtantiæ. Cum tamen alibi ſcripſerit facultates animæ in Cerebro ſedibus non eſſe diſtinctas, & oſſa cranij medulla carere, etiamſi meditullio quodam cruento, quod dicitur Di-  
 ploë, ſint alicubi reſerta.

Ibidem. Rectè futuras cranij in proprias & communes diuidit, ſed male deſine communes, quæ caluam à maxilla, Sphenoidæ & Ethmoidæ diſtinguunt. Ergo Os Ethmoides, & Sphenoides, ad caluam non pertinent. Rectius dixiſſet, communes ſunt, quæ caluæ oſſa à maxilla ſuperiore diſterminant, quales ſunt futuræ frontalis, & ſphenoidæ.

Ibidem. Non eſt probabile, vt antica & poſtica Cerebri partes eſſent in æquilibrio, duplicem ſuturam requiri, anteriorem vnā, poſteriorem alteram, quia nihil ad pondus Cerebri faciunt futuræ: forſan intelligit, vt æqualia eſſent cranij oſſa, ſic diſpoſitas fuiſſe futuras, ratione ventriculorum, quos ſuſpenderit dura meninx, his futuris alligata, quæ reſpondent ventriculis Cerebri.

Ibidem. Iſta ſtructuræ ſpecies, quam recentiores Græci ænigma dixere, nota non fuit Hippocrati, nomen Græcum debebat reſerre.

Lib. 2. cap. 9. Laurentius inuulſo Fallopiū reprehendit, quod Os frontale in pueris ſemper geminum eſſe voluerit, Ariſtoteles in ſeminis, ſed fallitur utraq. Imò fallitur Laurentius. Nam in puerorum craniis Os frontis ſemper duplex apparet, quia futura ſagittalis ſemper ad radicem narium excurrit vſque ad ſepennium: ergo medium Os frontis interſecat. Ipſemet Laurentius, ſui immemor, cap. 16. lib. 2. ſtatetur ſagittalem futuram ſemper ad narium radicem excurrere, & verum eſt potius in ſeminis, quàm in matribus, Os frontale geminum reperiri.

*Ibidem.* Falsum est *fossam duplicem in Osse frontali excusptam esse, Cerebro & processibus mammarum ritu protuberantibus continendus dicatam*: sunt enim illi funiculi, aut nervuli, qui mamillares processus vulgò dicuntur, graciles admodum, nec protuberant. At superius dixit cranium antrosum protuberare, propter processus mamillares, at illi sunt nunc adiuncti cerebro.

*Ibidem.* *Vesalius* decepit omnes Anatomicos, ac proinde *Laurentium*, dum scripsit intra sinus Ossis frontalis, corpus molliusculum, & medullosum, membrana vitidi obductum contineri, sunt enim vacui, nec vlla membrana velati.

*Cap. 10.* Verissimum est *Ossa simplicia omnium rarissima & debilissima facta fuisse, quia caput hac parte plurima indiget enaporatione, non ob plures hac Cerebri parte venas & arterias, ut credit Laurentius*, sed propter sinum longitudinale *Turcalay* dictum, qui secundum longitudinem futuræ sagittalis excurrit: nec hac in parte plures sunt venæ & arteriæ quàm alibi, nam nullæ sunt ibi arteriæ, nisi inferiorum carotidum extremitates eò pertingant.

*Ibidem.* Non probat *Laurentius* admaneri pyroticum in adultis, circa concursum sagittalis & coronalis, ob vasa & crassiores membrana villis complures. Cum tamen satis feliciter sine vilo detrimento apponatur pyroticum. Nec vasa per eum locum transeunt, & villi crassiores membrana in adultis, nam à futuris arctè confertis sunt interici.

*Cap. 11.* Impea *descriptio sinu communis, quæ Os temporale anteriore parte fecerit, quæ capiti cum Osse Sphenoidæ est communis*, quia non potest esse communis, si capiti & Ossi Sphenoidi sit interiecta, vel Sphenoides non pertinet ad caput, vel potius cranium. quo nomine vti debebat.

*Cap. 12.* Structuram auris nunquam vidit *Laurentius*, nec intellexit, quia multa tacet non prætermittenda, à *Fallopia*, *Eustachio*, *Volckero Coster*, *Arantio* observata.

Falsum est tria hæc ossicula meningi implicari, chordæ cuiusdam tenuissimæ ope, quia solus malleolus applicatur meningi tympano, chordæ atrensæ interuentu.

*Ibidem.* Ignorat quomodo excrementa per canaliculum cartilagineum repargantur, quia debuerat explicare, si per eum canaliculum sordes, quæ continentur in primo meatu auditorio traducantur, an per alium canaliculum excrementa defluant in palatū.

*Ibidem.* Falsum quoque horum ossiculorum usum esse, ut prator specierum soni delationem, excrementis aurium præbeant viam, nec enim per labyrinthum traducuntur, nec potest aperiri superius fenestra stapædis basi oclusa à membrana, aeris externi impulsu percussa, sic enim impulsæ, magis intruderet stapedem in fenestram.

*Cap. 13.* In Osse occipitis imperitè *sinus quatuor proponit, fossas* debebat dicere iuxta regulam ab eo præscriptam, *cap. 12. lib. 2.* Atque huiusmodi fossarum duæ sunt internæ, aliæ duæ externæ, quæ admittunt venas iugulares.

*Ibidem.* Falsum est coronas occipitis esse epiphyfes, in pueris cartilagine obductas, sunt enim in primordiis vitæ apophyses, nec tuta fuisset articulatio capitis ponderosi in pueris, si ab istis epiphyfis sustineretur.

*Cap. 14.* In Osse Sphenoidæ apophyses clinoides, ab aliis sellam vocari scribit, à sella equina forma. Potius cavitas apophysebus clinoidæ interiecta, sella equina dici debet.

*Ibidem.* Falsum est rete illud *Galeni*, plenum admirationis, in capacitatibus duabus Ossis Sphenoidis contineri, sunt enim vacuæ, & dubito, an serofos humores è choana supra glandulam pituitariam destillantes excipiant. Aliter sentit de situ retis mirabilis *lib. 10.* Ad latera apophyseon clinoidæon plexus apparet, quem *Rete mirabile* vocat *Galenus*.

*Ibidem.* Falsum est à capacitatibus Ossis Sphenoidis, canales gemellos emergere, qui in rimas illas definant, per quas pituita in palatum transcolatur. Nam cavitates Ossis Sphenoidis, quæ sinus vulgò dicuntur, sunt antrosum in nares peruiæ, duplici foramine angusto & ovali, ut è naribus aërem excipiant.

*Cap. 15.* Qui diligenter observari processus mamillares parvissimos, nunquam credit cum *Laurentio*, pituitosam illuviem stillare per tubercula mammarum papillis similima, in Ossa cribriformia, & nares.

*Cap. 16.* Nescio, an *Laurentius* linguam Arabicam calluerit, nam fontanellam, *cap. 10. lib. 2.* ab Arabibus vocari *Tendik* scribit, & *cap. 16. eisdem libri*, ab eisdem *Zendeh*. Sunt duo nomina, quæ vni parti conveniunt.

*Quæst. 10. lib. 2.* Miror *Laurentium* quæstionem nullo modo controuersam pro-

posuisse: *An cranium Cerebri gratia constructum sit*, eum à nemine vnquam dubitatum fuerit, nec discursus *Dawenty* respondet titulo quæstionis. Nam *Galenus* disputauit aduersus *Aristotelem*, si caput, siue Cerebrum in editissimo loco positum fuerit ratione oculorum, non autem Cordis: certum est cranium instar ollæ includere totum Cerebrum, & ad eius custodiam comparatum esse: sic *Aristoteles*, libro secundo de partibus animalium, cap. 6.

### De Maxilla Superiore.

Cap. 17. **V**erè scribit maxillam superiorem pluribus constare Ossibus, per harmoniam articulatis, inferiorem verò duobus tantum per synchondrosim iunctis, ergo symphysicos speciem, quæ sit per synchondrosim interuentu mediæ cartilaginosis, agnoscit in maxilla inferiore, contra suam doctrinam de symphysis, si repetitur simul eum articulo.

Cap. 18. Erratum memoriæ notabis, dum refert ex *Hippocrate*, ex Ossibus, maxillas in seipsis venas habere. Nam *Hippocrates*, de sola maxilla inferiore i. j. pronunciauit: Id tamen maxillæ superiori attribuit, atque grandiora ossa venas habent manifestas.

Ibidem. *Rotunda apophysis in speciem orbis globata vixit æmulum*, dicta ab *Hippocrate* iudicio *Galenii*, non adscribenda tertio maxilla Ossi, quod dentes sui lateris continet, sed primo Ossi, quod portionem orbitæ, necnon zygomatis, & mali partem constituit, & ista globosa prominentia, partim formatur ab Osse primo, partim à zygomate:

### Maxilla Inferior.

Cap. 19. **T**ypographiæ errorem emendabis, iunat articulationem maxillæ inferioris cartilago mollis, scribe mobilis.

Quamuis maxillam inferiorem frangeris, nunquam obseruabis vtrinque lateris vasa continua esse, quia maxilla inferior in mento intus callo durissimo intercepta est, qui continuitatem vasorum impedit, ideoque cavitates maxillæ non est continua, ab vtro extremo ad aliud, sed isto septo osseo intercepta.

### Dentes.

Cap. 20. **F**alsum est dentes cum reliquis Ossibus non cremari, & de *Sarcophago lapide*, qui dicitur *Asinus*, nequaquam deuorante dentes, dubio: Neque dens sculpturæ ineptus est, cum sculpi & cœlari in effigiem queat, quamuis hæc omnia auctoritatibus antiquorum confirmari queant.

Ibidem. *Falsum est dentibus ad septimum vsque annum, amplam inesse cavitatem tenni squamma*, sanis apam simili circumseptam, albo humore velut mucosam. Hæc omnia vera sunt vsque ad biennium, nec ultra deprehendi possunt.

Cap. 21. *Caninus dentes scribis oculares vulgò dici*, quod in eos nervi oculi mouentis protinacula feratur, eorumque extraxitio periculosa censetur. Debebat monere imperitè caninos inferioris maxillæ dici oculares, nec ad caninos superioris maxillæ profertur protinacula nervi oculi mouentis, ideo dicuntur oculares, quod radix longior ascendit prope orbitam.

### Foramen Sella Sphenoidis.

Cap. 22. **S**ecundum foramen in sella Sphenoidis apparet, quo in palatum transcolatur pituita: Attamen tabula sellæ Sphenoidis non est instar cribri perforata, neque foramina habet peruia ad transcolandam pituitam in sinus subiectos, quod monere debuerat aduersus *Sylvium*, aut saltem hanc partem accuratius exponere.

### Sinus Frontalis.

Ibidem. **S**inus frontales olfactui inferuire volunt quidam, duo in Osse Sphenoidis sinus vulgò pituitæ excipiendæ destinantur. Sed cum sinus frontales sint à Cerebro disiuñcti, per duplicem tabulam cranij, neque exicipiant proef-

• sus mammillares, seu nervos olfactorios, nequaquam olfactui inferuire possunt. Neque intra sinus Ossis Sphenoidis pituita detillat, & excipitur. Sinus in superiore maxilla, cùm sint vacui & inanes, medullam ad dentium nutritionem, accretionem & generationem continere non possunt. In adultis, sunt facti & excavati octo sinus, qui omnes defunt in pueris.

### Spina.

Cap. 23. **I**n vertebrae spinæ articulationem, & symphysem agnoscit. Symphysis vertebrarum non fit per cartilaginem, sicut eorum extrema cartilagine obducuntur, sed per vincula validissima, cum ab Ossibus orta, tum à cartilaginibus, tum à membranis Ossis unestruentibus. Quot verba, tot errores. Impropiè symphysem appellat colligationem vertebrarum, quia sunt per articulationem, quæ *gynghymas* dicitur, iunctæ, & inscicienter negat symphysem fieri per cartilagine, cùm utriusque vertebræ cartilago crassa sit interiecta, quæ utriusque vertebræ agglutinata, sicque per quandam symphyseos formam, vertebrarum corpora, quæ non moventur ut in dorso, & Osse Sacro, inter se connectuntur.

Deinde vincula hæc validissima, quæ ab Ossibus, cartilaginibus, & membranis oriuntur, quænam essent, debebat explicare, an sint nervocartilaginea, an alterius naturæ peculiaris. Sed quomodo à tot locis differentibus enasci queunt, nisi sint diversa ligamenta.

Cap. 24. lib. 2. *Symphysim vocat colligationem capitis cum prima vertebra.* Synthesis est per ligamenta & musculos, id est, per syneurosim, & sylsarcosim.

Cap. 25. *Non intellexit Laurentius, cur undecima vertebra ipsius dicatur, non quod eius spina lateat sursum, aut deorsum non inclinans, sed quia in spinæ motu stabilis manet, superius & inferius vertebra ab ea recedentibus in flexione, accedentibus in erectione spinæ, tum differenti articulationis specie vicinis coniuncta est.* Nam supra & infra excipitur per arthrodiam, cùm reliquæ vertebræ sint articulatæ per gynghymum.

*Falsum est singulas dorsi vertebrae sinus duos articulationis costarum gratiâ habere.* Nam undecima & duodecima unicum habent sinum, ut & prima scapissimè.

### Ossa Pubis.

Cap. 26. **A**bsurdum putat existimare in ipso enixu pubis Ossa disungi, Cùm tamen sit certissimum huiusmodi Ossa hiare, laxatâ intermediâ cartilagine, ut infra demonstrabitur.

### Claucula.

Cap. 27. **C**laucula, clavis modo firmant cum sterni omoplatam, & per hanc brachium. Huius cùm varij sint motus, sique expediri, facile antrosum & deorsum precipitaretur brachium, difficile sursum & retrorsum moveretur, nisi hoc Osse tanquam palo stabiliretur. Non potest firmari omoplatam sterni interuentu clavis, istud firmamentum imbecillius est, repellitur potius omoplatam, à clauicula interiecta. Verum est stabiliri ad motus suos, ne quàm par sit, superiùs, vel deorsum, antrosum vel retrorsum moueatur, à musculis qui ipsam suspendunt: sed absque clauicula, facilius sursum & retrorsum moueretur. Figuram literæ S Romanæ similem non habet, sed potius æmulatur figuram literæ Italice s.

Ibidem. *Clauicula connectitur scapulis cartilaginis interiectu, quæ tamen illi minimè adnascitur, ut in brachij & scapulæ motibus aliquantulum cedat. Cartilago hæc quibusdam acromion, sed verius ulacromion vocatur.* Quot verba tot errores, nam clauicula non connectitur scapulis cartilaginis interiectu nisi in pueris. Cartilago hæc sensim indurescens, Ossis naturam acquirit, & acromion verè dicitur, impropiè *ulacromion*, nec in brachij & scapulæ motibus aliquantulum cedit, quia progressu ætatis tandem ossiculum istud agglutinatur scapulæ, & ex epiphysii ossæ, degenerat in apophysim. *Festinet tamen Laurentius, cap. 30. lib. 2. acromion, Os esse cartilaginofum, vel articulationem clauiculæ, cum parte superiore omoplatæ.*

*Omplata.*

Cap. 30. **E** Rrat grauitat Laurentium, dum appendices quinque in omplata constituit, lib. 2. tres ad latus inferum in xta spine ductum collocat, vbi sint positæ aliz duæ appendices non exponit: Ac sanè appendices sunt margines ossæ, ac velati fungosæ, quæ Ossium latorum extremitates coronant, qualia sunt Ossa ilium & omplata: sed euidentiores sunt in Osse ilium, quàm in omplata, nec conspiciuntur, nisi post ebullitionem longam. Duas autem appendices suppeditare ligamenta, quibus humerum canitatis alligatur, falsum est, nam quatuor muscoli, supra spinatus, infra spinatus, rotundus minor, & scapularis latum nervosum, & robustissimum tendonem ligamentosum efformant, quo humerus & omplata inter se connectuntur. In descriptione partium omplata, omisit costas, siue latera scapulæ. Expende, an pars gibba, seu exterior omplata, rectè dicatur *scapula*, à testudinis forma.

*Os ilium.*

Cap. 31. **I** N Osse ilium est costa, quasi pars quædam eminentior & curna, vbi id Os est lib. 2. crassissimum. Non rectè exponit costam, clariùs dixisset, extremitas Ossis ilium ab Osse Sacro versus partem anteriorem exposita.

*Brachium.*

Cap. 32. **F** alsum est brachium autè & sparis gibbum esse, ad securitatem, intus verò seminum. Est enim omnino rectum, sine vlla, aut leui curuitate.

*Cubitus.*

Cap. 33. **C** anitas sigmatoides cubiti non excipit brachij apophyses, sed trochlearem lib. 2. apophysum.

Ibidem. Falsum cubiti externas partes protuberare, anteriores esse sumas, in radio internas protuberare, anteriores sumas esse. Et in re, & in verbis confusio, contrarium docet *anatomia*.

*Radius.*

Ibidem. **R** adij articulatio cum externa brachij apophysi non dirigis motum supinum & pronum, sed radij extremitates, cubiti extremis articulatz, efficiunt istam radij reuolutionem in pronum & supinum, supra cubitum tunc immobilem.

*Carpus.*

Cap. 34. **C** um describas Carpum post Ossa cubiti, cui carpus subiectus est, contextum ex lib. 2. Ossa Ossibus, in duos ordines distributis, posteriorem male vocat eum, qui radio articulatur, anteriorem qui postbrachiales Ossibus adnectitur. At primus ordo non cubito, sed radio tantum articulatur, quatuor quidem constat Ossibus: sed quatuor omnium minimum & interius, sub minima digito positum esse scribis Laurentius. Illud Officulum non est interius, sed extra ordinem locatum, supra tertium primi ordinis.

*Digitus manus.*

Ibidem. **D** igitum Ossa in tres Phalanges distributa, omnia per *gynghymon* articulationi scribis, quod verum est de secunda & tertia articulatione, nam prima cum metacarpij Ossibus per arthrodiam iungitur.

*Femur.*

Cap. 35. **V** erum est caput femoris, & trochantera magnum, esse epiphyfes, sed lib. 2. trochanter parvus apophysis est, quæ in pueris vix emicat.

## Rotula.

Cap. 36. **N**on capio, quomodo rotula quæ impedit, ne genu multum flexcentibus, luxatio in anteriora fiat, ipsa efficiat, vt in rectum angulum genu flexi queat, nisi intelligat de partis posticæ flexionis in poplite: At illa flexio est ad angulum acutum, quia calcaneum ad nates adducitur.

## Tarsus.

Cap. 37. **T**arsi tria Offa innominata scribit Laurentius à Fallopio *caruæ nomenclari*, quod cuneum referant, id est, cuneiformia dicantur. Non ita nominauit Fallopius, sed Galenus in definitionibus. Interpretatio nominis Græci ridicula, quam omnes sequuti sunt Anatomei post Fallopium, dicendum est cuneiformia.

## Os Hyoides.

Cap. 38. **F**alsum est Os hyoides occipiti alligari: Nam stylohyoideus musculus ab apophysi styloide manat, styloides verò apophysis ad Os temporale pertinet. Occiput verò constituit Os lambdoïdes, in Osse hyoide basis pars caua est, vt linguam excipiat, vel potius epiglottida, cum lingua lateri basis innitatur, pars basis caua opposita erit gibba, sed non ad securitatem, vt credit Laurentius.

## Cartilago Tarsi.

Lib. 3. **I**n palpebris tarsi, cartilago non potest in sua tenuitate externi luminis exigent cap. 3. *umbra transmittere*, quia non est pellucida, præterea, quia cute tegitur: Addita videtur vtrique palpebræ hæc cartilago, non tantum ad exortum, & firmiorem adhesionem ciliorum, verumetiam vt arctius constringerentur inter se palpebræ.

Ibidem. *Vtriusque cartilaginis exigua foramina non magis comparent, quam in aliis cutis partibus*, nec possunt deprehendi etiam accuratè intuentibus. Impropiè pilos vtriusque eleganti ordine dispositos, *Geme* vocari scribit: hoc enim nomen conuenit cartilagini, non pilis, ex *Julio Polluce*, lib. 2. cap. 4. Et *Geme* dicitur, *ἡ ἐν τῷ ὕδατι*, ex *Etymologico magno Græco*: nec *Geme* ideo dicitur, quod remorum in longis nauibus similitudinem teferat, pilorum series.

## Cartilago Trochlearis.

Ibidem. **C**artilago in maiore angulo sita trochlea quidem usum refert, non figuram, quia est vncata, non circularis, & in adultis ossæ euadit.

Cap. 5. lib. 3. Cortige Hadrianum Imperatorem, & lege Arrianum Consulem.

## Laryngis Cartilagines.

Cap. 7. & 8. **L**aryngem tribus constare cartilaginibus scribit, aut potius, si verum amamus, quatuor: Prima est thyroïdes, interdum gemina, præsertim in mulieribus. 2. Vteribus innominata, recentioribus *quadrata*, quod similis sit Taurorum annulo, quem dextro imponunt pollicis, dam sagittas iaculantur. 3. Est Arytanoides, Antatomicè ferè omnibus simplex credita, sed Laurentio semper gemina visa est. Falsum est tribus tantum constare cartilaginibus Laryngem, siue, quatuor, ratione Arytanoidis, quæ duplex est: Cur non & quinque ratione Thyroïdis, quæ etiam gemina est, ex Laurentio. Sed verissimum est, quinque cartilaginibus natura & nomine distinctis, constari Laryngem, quarum prima est Thyroïdes, 2. Cricoides. 3. Arytanoides, 4. Glottis, 5. Epiglottis. Propterea nescio quâ ratione motus Laurentium epiglottidem separarit à Larynge, cuius mucro non ad palatum vergit, cum sit vltra palatum & gargareona posita hæc cartilago, nec Glottis ex duabus Arytanoidis processibus

sibus efformatur, cū sit cartilago ſeparata, membranarum tamen interuentu extremitatibus arytznoidis alligata: grauius hallucinatur, dum cricoidis nomen à recentioribus inuentum & inditum putat cartilagini annulari: Comparatio hæc de Turcarum annulo ex Dalecampij Scholiis ad librum Galeni de vſu partium deſumpta eſt, & Galenus cricoidis nomine ſæpius appellat hanc cartilaginem.

### *Cartilagine Tracheæ Arteriæ.*

Cap. 9. **C**artilagine æſperæ arteriæ, vbi ad pulmonem peruenere, non circula abſolunt, ſed inæqualis ſunt figuræ, vt eleganter docuere Rondeletius, lib. 1. de piſcibus, & Fallopius in Obſervationibus Anatomicis.

### *Xiphoides Cartilago.*

Cap. 11. **S**cribit cartilaginem Xiphoidem biſidam, furcellam à quibuſdam dici, & partem ſuperiorem ſterni, interiectam duabus claviculis, ſuperiorem furculam à vulgo vocari notat, lib. 2. cap. 28. An vtriq; conueniat nomen iſtud Gallicum inquire, ſemper obſeruau regionem Xiphoidis furcellam appellari. Nunquam vidi cartilagini & xiphoidi minorem alteram incumbentem, vt hypogloſſi folium. Verum eſt cartilaginem xiphoidem in medio perforatam eſſe, ad tranſmittendas venas & arterias mammarias, ſi bifurcatio deſit, ſed ſi foramen, & bifurcatio deſiciant, ſternum in medio perforatum eſt, quod potiſſimum in mulieribus obſervatur.

Ibidem. In aſignanda cauſa vomitus, qui accidit introflexa cartilagine xiphoidi; ſcribit Os ventriculi, quod dorſo applicatur, in vomentibus non ita diſtare, & ſic premi ab incuruata cartilagine: quod eſt falſum, nec ventriculi diſtentio ex cibo, iſtam oriſicij eleuationem probare poteſt, nec ſterni morſus à bile effuſa ſupra ſternum, vbi ligamentum ſuſpenſorium Hepatis aſſixum xiphoidi, bile imbutur.

### *Cartilago Osibus Pubis interiecta.*

Cap. 12. **S**i inter Oſſa Pubis cartilago eſt craſſiſſima & durifiſſima, non eſt incredibile in partu diſiungi, ſi humectata & tumefacta fuerit hæc cartilago.

### *Cartilago media inter Femur & Tibiam.*

Ibidem. **C**artilagine non in femoris capitibus inferius duæ ſemicirculares, ſinum ſupercilia ampliſcantes reperiuntur: Nam femorum extremitates inferiores ſunt condyloſæ, ſed cuiusmodi cartilagine incumbunt cavitatibus tibiæ, vt augeant cavitatum ſupercilia, ad excipendos femorum condylos, ſunt autem circulares in medio huius, non ſemicirculares, atque mobiles ſunt, vt in articulatione maxillæ inferioris, & diſiunctæ à cartilagine extrema tibiæ in Cruſtante.

### *Ligamenta Capitis.*

Cap. 13. **L**igamenta capitis quatuor deſcribit accuratè, ſi eo modo formata eſſent & circumdata, vnum enim eſt, quod dentem pyrenoidem alligat primæ vertebræ, alterum quod enaſcitur ab apice dentis pyrenoidis, & alligat occipitio, tertium intus circumdat medullam ſpinalem, nec plura reperiuntur.

Ibidem. Inter ſuturas & harmonias maxillæ ſuperioris, nulla ſunt membranofa ligamenta ad muſculorum exertum: Aſperitates præbent firmitatem adhæſionis, nec tendines muſculorum inde oriuntur, niſi velis cum quibuſdam Anatomicis, caput & finem muſculi tendinoſum eſſe, cuiusdemque naturæ.

### *Ligamenta lingua, Oſſis Hyoidis.*

Cap. 17. **O**ſſis hyoidi per ligamenta non ſumma lingua parti vincitur, ſed ima, quæ baſis dicitur, habet etiam Os hyoides ligamenta, quibus ſuſpēditur, cui loco ſint aſſixæ non expoſitæ, ſtyloideis apophyſibus adhærent.



*Ligamenta Brachij, Cubiti cum radio.*

Cap. 19. **L**igamenta brachij cum omoplata, communia, & propria constituit, quibus brachium cum omoplata colligatur. Sed notabis nullum esse ligamentum, neque proprium. neque commune, quod brachium cum omoplata neget, validissimum & robustissimum orbiculare ligamentum constatur ex tendonibus simul unitis, quatuor musculorum brachij, qui oriuntur ab omoplata, & circumdant caput & cervicem brachij, quales sunt supraspinatus, infraspinatus, rotundus minor & subscapularis: propria non possunt esse articulationi duo illa, quæ ab acromio in coracoidem apophysim producuntur: sunt potius propria omoplatae, reliqua duo propria portiones esse bicipitis musculi verè scribit, sed non possunt esse propria, si ab omoplata in brachium proferantur, atque ita erunt communia, si sint ligamenta & vincula.

Ibid. Cubitus & radius superna, infernaque parte, quæ interbiant tenuia non habent vincula. Sufficit istud ligamentum membraneum, secundum Ossis utriusque longitudinem extensum, & interiectum.

*Ligamenta Carpi.*

Cap. 20. **T**ransversa & annularia ligamenta carpi, traducendis tendonibus musculorum digitos flectentium & extendentium, duo tantum reperies, externum, & internum, quamvis Laurentius scripserit, sex deprehenda, si accuratius insuearis, nec qualia sint, exponit.

*Ligamenta Femoris, & Tibiæ.*

Cap. 21. **N**on restat describere ligamentum, quod appellat priatum, à cotyles fundo in lib. 3. medium femoris caput productum. Non enim nascitur à fundo cotyles, sed ab illo hiato aspero ad latus internum cotyles exsculpto, istudque ligamentum medium est inter nervum & cartilaginem, ut neurocartilagineum dici debeat, atque etiam cruentum est, quale spectatur illud ligamentum interiectum tibiæ & femori, quod est unicum, latum, non triplex, ut voluit Laurentius.

*Ligamenta Tarsi.*

**I**n Ossibus Tarsi; omisit ligamentum cruentum, quod astragalum scaphoeidi connectit, & aliud quod eundem astragalum pternæ colligat, quæ quidem tarsi ligamenta Ossibus interiecta, sunt cruenta, cum reliqua corporis sint candida.

*De Membranis.*

Cap. 24. **N**on intelligo sensum, neque mentem Laurentij, dum scribit membranas fibris carentes, papyri modo diuiduas: Nam tales membranae sunt tenuiores his, quæ villos habent, ac proinde difficiliter diuiduntur, aut discernuntur.

*Membrana Fetus.*

Cap. 25. **F**œtum inuoluentes membranas tres constituit, chorion, amnion, & allantoidem. Chorion membrana, tota utero adhærescit venarum & arteriarum umbilicalium interiectu. Allantoides puellum cingit instar zonæ. Attamen sola placenta utero per venas & arterias umbilicales adhærescit, chorion quidem parietes uteri tangere potest, eisque adhærescere, sed sine venarum & arteriarum umbilicalium interiectu, quæ sunt in placenta, Allantoidem hic agnosco, quam alibi repodiavi.

*Membrana Communes.*

Cap. 25. **M**embranas editi animalis constituit universales, aut particulares: Universales vel totum corpus inuolunt, ut cutis, & panniculus carnosus, aut omnes eiusdem generis partes, musculos quippe & ossa: Musculos omnes tegit membrana communis muscularum, ossa omnia inuolunt à capite ad pedes peruisum. Inde licet cognoscere Laurentium membranam communem musculorum comparare cum periosteo, ita ut eadē

membrana in omnibus musculis, vti eadem in Ossibus reperiatur: At non ita communis hæc membrana musculorum est intelligēda, quæ demonstratur in abdomine, thorace & artubus, nam præter istam communem, omnes musculos cuiusque regionis complectentem, habent & singuli muscoli suam peculiarem membranam.

### Membrana Renis.

Ibidem. **R**enes non habent proprium inuolucrum crassum quod fasciam dicunt, sunt enim duplicato peritonæo inclusi, & duplicatura hæc illis præbet inuolucrum, commune cæteris partibus duplicato peritonæo inclusis.

### De Fibris.

Cap. 16. **S**i fibre sint ex semine genitæ, ideoque albæ, ad motum & carnis custodiam definiuntur, Cur sapius dixit Laurentius, membranas neruas fibræ carnis intertextas esse. Duos esse vsus fibrarum, scilicet motum, & carnis custodiam, postea statuit fibrarum propriam actionem esse contractionem. Vtus & actio longè differunt. Dicerem potius habere vsum roborandi membranas in dilatarione & contractione moruum, retentionem & expulsionem fieri ab insita partis facultate. Fibrarum vsus eludit Vesalius, in Examine Obseruat. Fallopij.

Ibidem. Quis non videat partes quasdam corporis fibras ad officialem quandam actionem habere, non ad peculiarem tractionem, retentionem & expulsionem, cuiusmodi sunt Cor ad spiritus vitalis generationem, arteria ad caloris natui moderationem, Vena ad sanguinis transmissionem, ventriculus ad chyli perfectionem. Artamen paulò post scribit in arteriis diuerso situ locatas fuisse fibras, vt Cordis expurgationi inseruirent, quia natura de noxiæ expulsionem magis est sollicita, quàm de vtilis tractione.

Memini me legisse apud Galenum, arterias fibris carere, quia spiritus vitalis suo ipse impetu quoquo uersum diffunditur, rapitque secum sanguinem arteriosum. Accedit quod Laurentius, alibi scribit actiones proprias solius natui caloris operâ, & à sola temperie perfici, nec fibris indigere: Officiales verò, quæ motu perficiuntur locali, non nisi villorum ministerio edi: at lecur, renes, Liē, Pulmo officiales edunt actiones, & fibris carent. Dicere debebat, partes officiales membranosæ, quæ distendi & contrahi debent, indigent villis ad suas actiones edendas, cuiusmodi sunt ventriculus, intestina, vesica, vterus.

Cap. 17. lib. 3. Si vera membrana suas habent fibras, imò nihil aliud sunt, quàm fibra inuicem conuincta, ergo membranz, quæ illis carent papyri modo diuiduz, non erunt membranz, aut saltem omnes villis erunt contextæ.

### Vena Cava.

Lib. 4. **V**ena Cava cum sit subdita Hepati, & porta, quomodo ex gibbis Hepatis procap. 3. dire potest? sed truncus cauis Hepatis affixus iuxta ipsius caput, vel emergit ab Hepate, vel ramum insignem ad Hepar transmittit, si isthæc vena à Corde proficiscatur.

Ibidem. Verum est umbilicalem venam ab Hepatis scissura ad umbilicum ferri, sed ipsius portæ non tantum soboles est, verumetiam principium & fundamentum huius venæ, vt & Cauæ, quibus adhærescit intra Hepar. Id in Foetu recens editoprehenditur.

### Anastomosis Cava & Porta.

Ibidem. **Q**uod spectat ad anastomosin radicum Portæ & Cauæ intra Hepar, nondum inter Anatomicos definitum, & illud experimentum Laurentij fallax est in adultis, verum in puerulis recens editis: de insufflatione venæ umbilicalis, quia non tantum venæ, sed etiam arteriæ instantur, quod demonstrat communicationem vasorum inter se, ac proinde circulationem sanguinis.

*Vena Lactea.*

Cap. 4. **C**um Arabes venam lacteam ad Hepat chylum deferentem describunt, forsitan obseruauerant aliquid simile obseruationi, quam fecit *Assellius de venis lacteis*, propterea non omnino repudianda ista venæ lacteæ significatio.

*Vena Splenica.*

*Ibidem.* **V**erum est ramum splenicum in duas abire venas, vtramque rursus bipartitam, in caput & caudam Lienis inferi, sed falsum est in alias, atque alias diuidi, donec numerosa ramorum serie in cauam Lienis partem implantentur.

*Ibidem.* Est etiam verum à summo prope Lienem ramo, surculum in ventriculi latus sinistram efferri, quem *vas Breue* dicunt, sed raro vnici reperitur surculus, sapiens duæ vel tres vena spectantur, quæ pro vase breui accipiuntur, laterales partes ventriculi percrepant, vsque ad Os Superius.

*Valuula Venarum Mesaraicarum.*

*Ibidem.* **M**embranulas instar valvularum, intra venas mesaraicas refluxum chyli impediētes, *merum figmentum Columbi* putat *Laurentius*. Sed *Assellius*, & alij extare & reperiri contendunt, fides sit penes inspectionem, & indagationem à perito Anatomico factam, sed libenter adspiculus *Laurentio*.

*Vena Cava diuisio.*

Cap. 5. **E**xistimant *Laurentius* truncum vena Cava ab Hepate exsurgentem, in duas lib. 4. partes diuidi, inferiorem & superiorem: Illa descendens, hac ascendens dicitur, vtriusque trunci ramus sunt multiplices. Attamen truncus venæ Cavae à Corde, vel porius à summo sterno, vsque ad Os Sacrum continuatus est, sine vlla interruptione in Hepate, cui tantum adhæret in cauis partibus, potestque integer & illæsus sine vlla diuisione aut laceratione parenchymatis separari, iuxta caput Hepatis, ramum insignem in incur immittit, vel ab eo ramo truncus iste directus enascitur.

*Ibidem.* Vena Cava iuxta Os Sacrum in iliacos ramos finditur: Iliacus dexter subicitur Iliaco dextra Arteria, Ne, inquit *Laurentius*, Osibus Sacri duritie, & dorso continuo motu laderetur. Quod non est verum. nam isthæc equitatio non fit supra Os Sacrum, & arteria sextuplo erassior vena, offensionibus magis obistere poterat quàm vena, neque motus dorsi partes istas læsisset, cùm sit dorsum immobile, & longè distitum.

*Ibidem.* Ischiæ minor non oritur à regione saphena, distat duorum digitorum intervallo.

*Ibidem.* Falsum est popliteam ex ramis duobus cruralis cõiunctis constari, nam soboles est saphenæ, ramulum tantum acquirit in poplite à crurali, vel potius ipsa saphena transmittit ramulum ad furalem.

*Ibidem.* Ischiæ maior male hic describitur: debebat adiungere externum malleolum percrepare, ibique tundi in Ischiadicis affectibus.

*Ibidem.* Saphenæ origo, vt describitur vera est, sed ad malleolum externum non descendit, repones internam, forsitan typographi erratum.

Cap. 6. lib. 4. Fateor venam Cauam ascendentem primùm per foramen proprium Diaphragmati alligari: sed pernego membranæ intersepientes per communes tunicas, quia membranæ intersepientes constituunt mediastinum: Mediastini duplicaturæ includitur pericardium, quod centrum nerueum Diaphragmatis circumdat, & comprehendit, propterea vena Cava ascendens non potest membranæ intersepientibus alligari per communes tunicas, quia ingressa pericardium, non indiget Mediastino, quod tamen reperitur extra pericardium, ascendens ad iugulum.

*Ibidem.* *Azygos vena* ramulus descendens in ventrem, non inseritur in venas adiposam, & emulgentem, vt asserit *Laurentius*, sed infra emulgentem venæ Cavae insinuat, &

ad exonerandam venam azygon, ſanguine regurgitantem. *Et lib. 7. quaſt. 1. in emulgentem & ſpermaticam deſignare prodicit. Vide inconſtantiam.*

*Ibidem.* Valvulae azygæ non ſunt mera nuxa, cum reperiantur, & demonſtrentur, nec impediunt reſluxum ſanguinis, ſed aſſatim irruenti obſiſtunt.

*Ibidem.* Cervicalem venam à ramo ſubilano derivat, cum tamen à ſuperclauio producat: ſingularis interna non à ſuperclauio, ſed à ſubclauio proficiſcitur.

Cap. 2. lib. 4. Ignorauit Laurentius valvulas ſine oſtiola venarum, quoniam obiter & vno verbo earum mentionem facit, cum tamen ſuſius eas expoſuerit *Sylvius, cap. de membranâ.*

Quæſt. 4. lib. 4. Examinans venarum villos & motus, hos & illos venis non omnino denegar. At certum eſt venas fibris carere, multò minùs moueri, *lib. 4. c. 2. ſi venæ villis carent, etiam arteriæ deſtituentur.* Sanguis arterioſus non indiget fibris ad ſui diſtributionem, ergo malè tribuit, ac diſponit villos in arteriis.

### De Aorta & Arteriis.

Cap. 10. lib. 4. **M**Alè ibi deſcribit exortum Aortæ, nam à Cordis ventriculo ſiniſtro prodians non bipartitò, ſed quadripartitò ſinditur, tres ramos ſuſum tranſmittit, quartum verſus laſus ſiniſtrum per inferiora contorquet. Quadriſſimæ diuſionis ſuperiæ ramus ſiniſter, axillaris eſt arteria ſiniſtra, medius carotis ſiniſtra, tertius ad axillam dextram contendens, eſt axillaris arteria dextra, omnes iſti rami ſic diſpoſiti, radicem palmæ Chriſti æmulantur.

Cap. 10. lib. 4. verum eſt ceruicales arterias in ſinus illos craſſiores membranæ cum venis non deferri, vt perperam annotauit *Veſalius*: in eo peritè caſtigatur à *Laurentio*: quia ſolus ſanguis iugularum internarum, effunditur in illos ſinus duræ meningis.

*Ibidem.* Falfum eſt circa ſellam ſphenoidis, propagines carotidis arteriæ in horjginibus non ita conſpicuas eſſe, ut in brutis animalibus, ſed rete aliud mirabile conſtituendum. Sunt enim huiusmodi arteriæ inſigniter manifeſtæ, & multiplici textura conſtituunt rete mirabile, à *Galeno* deſcriptum. Quid mirum ſi in mortuis non ita tumeant & appareant, propter defectum ſpirituum, qui continentur in ſanguine tenuiſſimo & ſubtiliſſimo Cerebri?

Cap. 11. lib. 4. *Laurentius* dubitanter proponit exortum carotidis ſiniſtræ: *Videntur carotis ſiniſtra oriri à trunco.*

*Ibidem.* Intercostalıs ſuperior, & intercoſtalis maior, ſunt ſiliis arteria, quæ pntat azygæ ramulos comitari. Nam truncus Aortæ à Corde vique ad Diaphragma, vtrimque iuxta vnamquamque coſtam, ramulum tranſmittit, & ſuppeditat ſingulis coſtis & ſpinali medullæ, quod diligenter obſeruandum ad vſum medicum.

*Ibidem.* *Laurentius* arteria deſcendentis priuſquam in ramos Iliacos diuidatur, nouem annumet ramos. Sed intercoſtalis maior deſt, vt & meſenterica ſuperior. Ac proinde ſeptem erunt à coeliaca: Ramum inſigniorè obliquo & flexuoſo ductu in Lienem contendere ſcribit. Verum eſt de obliquo proceſſu, ſed hæc arteria diſtincta eſt à coeliaca, & oritur a trunco ſupra coeliacam, cuius meminit *Arantius*, & arteriam lienalem appellat, ſoli Lieni conceſſam, Hepati denegatam, cum ſuam arteriam mutuetur à coeliaca, & hæc arteria magnitudine ſua æqualis eſt venæ ſplenicæ, cum qua prope Lienem per mutuas anastoſes iungitur.

*Ibidem.* Sacra arteria, aut deſt, aut adeo exilis eſt, vt oculos eſſugiat.

### De Vracho.

Cap. 12. lib. 4. **L** Laurentius Vrachi cauitatem deſendit: Sed eo canali vrinam effundere Fœtum in Allantoidem membranam imperitè ſcribit, quia deſt in Fœtu humano Allantoides, nec puto Fœtum belluinum intelligere, cum agat de ſtructura hominis, aut ſaltem monere debuerat.

## De Nervis.

Cap. 13. **C**ertum est nervum esse partem spermaticam, sed falsum interiore parte medullarem, quasi substantia nervi interior sit medullaris, alba, & molli, qualis est feri Cerebri, & spinalis medulla, sed durior, ac si intelligas densatum & duriusculum factum Cerebrum, quamvis id confirmari possit auctoritate Galeni, & quorundam Anatomicorum. Tamen solius nervi optici substantia interior medullaris est, reliquorum tam à Cerebro, quam à spinali medulla prodeuntium substantia fibrosa est, absque medulla. Imò nervi spinalis medullæ, quo magis descendunt, eorum substantia tota ex fibrulis innumeris contexta est, ac proinde sensili, & conspicua cavitare carent. Nec porosam aut spongiosam in eusmodi nervis substantiam animadvertere licet, qualem illis tribuit Laurentius.

Cap. 16. lib. 4. Verum est nervos omnes à posteriori Cerebro, qua parte sacra illa medulla ortum ducit oriri, modò excipias nervos opticos, qui ab eminentiis illis maioribus anteriorum ventriculorum Cerebri enascuntur. Sed accuratius debebat exponere exortum illum nervorum à spinali medulla, non autem à posteriori Cerebro, quia sacra illa medulla in occipite, cerebello obducta est, quod subiectum est posteriori Cerebro Rectius dixisset nervos omnes oriri à spinali medulla, intra vel extra Cerebrum, siue cranium: Nam quatuor radices emittit, duas intra Cerebrum, quæ constituunt duas illas eminentias nervorum opti corum, *Thalamos*: Alias duas profert radices intra cerebellum, à quibus omnes sensuum nervi emanant, ut optici à *Thalamis*, ideoque omnes nervi prodibunt à spinali medulla.

*Ibidem*. Miror, cur cavitatem nervi optici repudiet, cum Galenus, multique Anatomici eam adstruant, qua de re consules alios Anatomicos.

Cap. 17. lib. 4. In describenda nervi moventis oculum distributione, adeo accuratus est, ut mihi suspecta sit isthæc distributio, nec possit observari, nisi refecta orbita. Præsertim dum negat ab hac coniugatione nullos nervulos ad temporales musculos excurrere. Vnde sympathia temporalis musculi cum oculo? ut læso temporali cecitas repentina oborta fuerit: Quom sympathiam ipse refert ad portionem tertie coniugationis, quæ defertur ad oculos. Attamen tertie hæc coniugatio tota sub oculi pavimento, duplici lamina ossea inclusa, in faciem infra oculum distribuitur, vnde nascitur spasmus cynicus.

*Ibidem*. Verè scribit quintam coniugationem transmittere nervulum in fauces, vnde sympathia ariurum, & *Laryngis*: Sed per quam viam excurrat, non exponit, quod erat notatione dignum, & à *Fallopio* traditum: sed cum ignota fuerit auris structura *Laurentio*, ignoravit etiam istum ductum osseum ad fauces protensum.

*Ibidem*. Sexta coniugatio vulgè dividitur, & à *Laurentio* quoque, in tres ramos, recurrentem, costalem, & stomachicum. Sed costalis à spinali medulla cervicis emanat, & intra thoracem dum perreptat radices costarum sub pleura, aliorum additione roboratur & augetur.

*Ibidem*. Processus qui vulgè dicitur mammillaris, non ritu mammarum protuberat, ut sæpius meminit, & inter nervorum paria potest numerari, etiam si non feratur extra calvariam, relictus tamen à *Laurentio*.

## Spinalis Medulla.

Cap. 18. **V**erum est per spinalem medullam venulas & arteriolas vario modo implicatas, medullam nutrientes, & vita spirituum affundentes, sed unde derivantur, non exponit: sunt autem propagines carotidum & cervicalium arteriarum & venarum Cerebri, quæ superne deorsum distribuuntur, spinalem medullam perreptantes, & rigantes.

*Ibidem*. Cur autem spinalis medulla, cum ad dorsi fines pervenerit, tota in funiculos & filamenta caudam ferè equinam referentia absumatur, non explicat. Quamvis mirabile istud natura artificium produci & plurimum extollat, quod ante *Laurentium* fuerat ab aliis Anatomicis observatum, ne scilicet spinalis medulla mollis & succulenta, qualis in ceruice, & dorso spectatur, lumborum continuo motu contunderetur, aut effringeretur.

*De Neruis.*

Cap. 19. **N** Eruos brachij & manus male describit, tam in ortu, quam in distributione. lib. 4. Quæ proposui in *Anthropographia* cum *Laurentio* comparabis & examina-  
bis.

*Ibidem.* In *Diaphragmate* præter nervos duas *Diaphragmaticas*, nervos quatuor adiun-  
git, qui à cervice oriuntur, si habet, potius à docto manant nervi.

Cap. 20. lib. 4. Item nervos, qui per satum pedem disseminantur quatuor insignes pro-  
ponit, quos dividere debebat in anticos & posticos, Antici tres sunt, Posticus vni-  
cus omnium crassissimus, sed secundus anticus non demittit ad pedem usque ramum insi-  
gnem cum vena malleoli (vt opinatur *Laurentius*) quia saphena solitaria incedit, nul-  
lo nervo, aut arteria stipata, proinde eius sectio in poplite, & in malleolo interno se-  
curissima est, quia caret coniuge nervo & arteria. Quartus nervus crassissimus & po-  
sticus, non inter Os Sacrum & Ilium elabitor, sed per sinum, qui totus est exscul-  
ptus in Osse Ilium, inter apophysim æntam ischij & taber posticum Ossis Ilium iun-  
cti cum Osse Sacro.

Lib. 5. cap. 2. Renum carnem præfuit insensibilem facit, & capite de Renibus, eam valde  
sensibilem agnoscit.

*Glans Pituitaria.*

Cap. 4. **G** lans pituitaria supra sellam sphenoidis collocata, ventriculorum Cerebri su-  
lib. 5. peruacua, non per cuncta foramina in palatum pedescentem instillat: Sed per  
quatuor canaliculos choanz in fauces transmittit, qui quidem canaliculi, traducun-  
tur per cunei, siue sphenoidis foramina sellæ accumbentia, non supra tabulam in-  
ternam exsculpta, vt alibi dixit *Laurentius*.

*Glandule Amygdale.*

*Ibidem.* **N** Escio, cur glandulæ ad radicem linguz positæ amygdale dicantur,  
cùm nullo modo figuram amygdalarum referant, cùm sint in quibus-  
dam carnosæ, in aliis diuise, quasi ex pluribus corpusculis conglobatz, scribit *La-  
rentius*, glandulas illas amygdalis purgatis similes esse.

*Ibidem.* Pancreas modò inter glandulas, modò inter carnes collocat.

*Prostata.*

*Ibidem.* **P** rostatæ glandulæ, ex *Laurentio*, semen perficiunt & asseruant ad necessarios  
usus, & oleosa, ac veluti salinalis humiditate vestream irrigant. Quasi semen  
suam perfectionem in eiusmodi glandulis adipisceretur: Si semen asseruant, & o-  
leosam humiditatem, ergo differentes humores in eiusmodi glandulis coptinebun-  
tur, inde quasi oleosa, ac veluti salinalis humiditas emanabit.

In illa descriptione, & enumeratione glandularum, omisit balanum penis, &  
mammarum glandulas, & testes.

*De Musculis.*

Cap. 6. **T** Endo non potest esse pars similis, ex nervo & ligamento constare, vt  
docet *Laurentius*.

*Musculus latus Faciei.*

Cap. 10. **M** embranam musculosam toti faciei cuti ita adhaerere putat, vt vix ab ea se-  
lib. 5. parari queat, faciem enim propriè coronam & collum tegit. Sed si diligenter  
securisset hanc partem, animaduertisset terminari ad basim maxillæ inferioris, por-  
tionem tamen versus aures supra parotidem assurgere ad tempora. Membrana hæc  
musculosa separatus est musculus, qui à summo iterum clavicula tota enascitur, &  
Hhh iij

cum suo congenere collum obuoluens, in basi maxillæ terminatur, nec vltra versus nares & oculus expanditur: deprimendæ maxillæ cum digastrico destinatus est, cuius actionem, vt compositionem, ignorauit *Laurentius*.

### *Musculi Palpebra.*

Cap. 11. **S**ola palpebram superiorem moueri putat, cum tamen inferior in arcta palpebrarum conuiuentia sursum adducatur, beneficio musculi orbicularis, tam ciliaris, quàm alterius maioris, qui ab vna parte maioris anguli circa vtramque palpebram reuolutus, terminatur in eodem puncto, à quo incepit, verique palpebræ tarso affixus. Male describit musculos claudentes palpebras: vnicuique proprios attribueri videtur.

### *Musculi Oculi.*

Cap. 12. **I**n musculis Ocularum quatuor illi *Reclis* simul agentes, non intrò oculum trahunt, sistantque: sed potius decinent, sistantque in tonico motu, qui diu stare non potest, propter antitaxim musculorum.

Ibidem. Obliquus per trochleam traductus, non in latum coniunctiua oblique inseritur: sed supra oculum expanditur, substratus musculo oculum attollenti.

Ibidem. Obliquus minor non ab interiore angulo, sed ab eadema, quæ duo maxillæ ossa iungit ortus, ad exteriorem angulum traductus, atque reuolutus, supra oculum sub musculo indignatorio, occurrit tendoni musculi maioris obliqui, huius musculi inuentio facilis est, primusque detegi, & administrari debet.

### *Musculi Auris.*

Cap. 13. **I**gnorat musciculum verum & vnicam auris externa trifidam, ad radicem auris instratum supra ligamentum ipsius auris, quos enumerat, sunt musculi latissimi, & frontalis portiones.

### *Musculi Narium*

Cap. 14. **N**asum dilatantes musculi, non à fronte nascuntur, sed ab ea sutura, quæ lib. 5.

Ibidem. Constringentes musculi Narium, non sunt labiorum musculis continui, sed intus locantur ab Anatomicis, nec superius labrum constringere cogimur, quousque per nares aliquid trahimus, vt cuique in seipso experiri licet.

### *Musculi Labiorum.*

Cap. 15. **L**abium superius mouentes musculi duo, non à malo prodeunt, sed à lib. 5. cauo maxillæ, iuxta marginem orbitæ, vbi foramen adest. Idem labium deorsum mouentes musculi, non à mento, sed à media maxilla prope angulum enascuntur.

Ibidem. Musculus quidam sphincteris modo buccas circumdans, unde buccinator dicitur, oritur à summis gingiuis, & in gingiuas summas terminatur, circuli instar variis fibris intertextus. At quomodo sphincteris instar buccas potest circumdare? deberet supra vtrumque labrum reuolui: Deinde, si à summis gingiuis oritur, & in summas gingiuas terminetur, non mouebit labia: Ergo oritur à maxillis ambabus iuxta molares dentes, & buccis attensus, inseritur ad commissuram vtriusque labri. Si cibum huc & illuc propellat, vt à dentibus atteratur, non potest buccas inflare ad tubarum modulationem, sunt enim motus contrarij, in tubarum modulatione buccæ inflantur, vt dissentis musculis à spiritu violenter eliso, & in ore retento, in propulsione ciborum constringitur musculus, propterea rectius dicitur bucco à situ, quàm buccinaror.

Cap. 16 lib. 5. Notat *Laurentius* membranam pericranium obuolueri muscolum temporalem, Os autem ea parte periosseæ non tegitur, quod pauci obseruauerunt. Ergo in cranium peritur pericranium, & periosseæ, quod pernegat lib. 10. cap. 5.



*Musculi Maxilla Inferna.*

Ibidem. **M**usculus in ore latitans, non ab Ossis sphenoidis processibus alatis exoritur, sed à cauo pterygoidis, quod opplet, exurgit, & ad angulum maxillæ internæ inseritur.

Ibidem. *Aperitioni maxillæ Digastricum duntaxat musculus assignat*, quia musculi lati actionem, & conformationem ignoravit, qui ut supra dictum est, mouet deorsum maxillam inferiorem.

Ibidem. *Verum est maxillam antrosum moveri à musculo, qui ab externis pterygoidis processibus oritur, in partem internam maxilla, iuxta duas eius apophyses inseritur*, sed nulum habet musculum, qui retrorsum eam moueat, quia tenitens oppositum habet Os temporale, cui articulatur: *Laurentius delitescentem hanc motui assignat: quis ille sit, non exponit*: forsitan intelligit in ore latitantem, quem scripsit temporalis musculi adiutorem esse. *Si intelligit alium à Fallopio notatum, non retrahit maxillam, sed immensum propellit antrosum, ut alibi docui.*

*Musculi Ossis Hyoidis.*

Cap. 17. **H**yoidis Ossis musculus non motioni, sed tensioni dicatos esse putat: sed istud lib. 5. Os habet ligamenta, quibus suspenditur, tensumque manet, quod non potest dio admittere: præterea musculos habet ipsi Ossi proprios, & linguæ communes, quia linguæ motus sequitur, quam sustinet & amplexatur. At si tensioni essent dicati musculi, in perpetuo motu tonico starent, quod est impossibile.

Ibidem. *Septimus & Cellanus, qui à styloide processu evascentur, non sunt in medio perforati, ut musculo maxillam aperiendi aditum præbeant*, sed cum sint sæpissime ligati Ossi hyoidi, sustinent, firmantque reuolutionem digastrici musculi, sine vlla perforatione facta in stylohyoideo.

*Lingue Musculi.*

Cap. 18. **L**ingua totum corpus non potest sursum & deorsum moveri: Sed duntaxat lib. 5. antrosum, tetrosum, & ad latera mouetur. Antrosum ducitur, à duobus musculis ab anteriore mento enatis, & genioglossi dicuntur, tetrosum à duobus, qui basiloglossi dicuntur. à basi Ossis hyoidis prodeuntes, ad latera trahitur, à duobus, qui prodeunt à styloide processu, & styloglossi dicuntur, propterea sursum non possunt mouere linguam, neque illi deorsum, qui ab inferiore maxilla enascuntur, qui sunt molares, quia potius antrosum cum genioglossis, quam deorsum traherent.

Notabis autem tantum octo musculos linguæ competere, si addideris cetatoglossum, miloglossum ad Os hyoides reuocando, & mutato nomine dicetur mylohyoides: Non errat *Auerroes*, sed potius *Laurentius* fallitur, dum negat linguam proprio motu ciet: nam in loquutione celeri & continuata, suapte natuta mouetur. Extremitas quoque linguæ mobilis admodum in omnes motus differentias, non à musculis agitur. Musculi linguæ sunt comparati, ad motus validiores linguæ, in masticatione.

*Musculi Pharyngis.*

Cap. 19. **M**usculos faucium ex *Fallopio* descendit. Rectius dixisset *Pharyngis*, lib. 5. qui principium est œsophagi, ut *Larynx* apertæ arteriæ. Musculis istis sex *Pharyngis*, addit musculum, quem fere omnes *Laryngis* esse putant, & communem vocat: Oritur à cartilaginis lateribus quæ scutum tectet, & œsophagum omni ex parte circularibus & transuersis fibris amplexatur. *Hunc duplicem facit cap. 20. lib. 5. & quæst. 5. lib. eiusdem, & cap. 17. lib. 9. iniuste reprehendit Columbum*, qui vnicum vult esse hunc musculum, non duos, qui sphinctetis vicem gerat, ut ab altero thyroididis latere ortus in alterum inferatur. Vnicus, inquit *Laurentius*, primo occurfu apparet, sed paulo oculo in inspectantibus, mediana quadam linea discinditur: attamen si ex eodem *Laurentio*, œsophagum omni ex parte circularibus & transuersis

sis fibris amplexatur, vnicus erit non duplex. *Hoc in loco hunc musculum tribus sanctibus. attamen lib. 9. quest. 26. oesophago tribuit, & in duos diuidit, & neminem adhuc oesophagi musculos descripsisse notat, quasi rem nouam, & priscis sæculis incognitam proponeret.*

### *Musculi Laryngis.*

Cap. 20. **L**aryngis musculi sunt communes, aut proprii. Communes appellat, qui ab alijs partibus, quàm à Larynge oriuntur: proprios, qui à Larynge orti in eundem inferuntur. Dic etiam communes vocari, qui totum Laryngem mouent, proprios qui certis cartilaginibus mouendis sunt additi.

*Ibidem.* Eleganter ex Galeno notat Laurentius, thyroideam dilatari & constringi, azytænoideam verò claudi, & aperiri, qui motus sunt planè differentes. Sed debebat musculos prope os referre ad eas actiones edendas, quod non obseruauit, nec præstitit.

*Ibidem.* Branchij musculus, & hyoisthyroidei Communes toti Laryngi, non possunt thyroideam dilatari, neque constringere, quia non agunt nisi in deglutitione, dum ascendit & descendit Larynx: At dilatatio & constrictio thyroidis perficitur in vocis articulatione, quo tempore in suo situ manet totus Larynx, cessantibus & otiantibus istis communibus musculis, quia nemo potest eodem tempore sorbere, & loqui.

*Ibidem.* In descriptione propriorum Laryngis musculorum, non assignat actiones motibus cartilaginum consentaneas, & plures concedit azytænoidei musculos, quàm par sit, vnicum dumtaxat musculum tribuens thyroide constringendæ, dilatationi nullum, nisi cum ipso reuocet bronchios communes.

Ex hac musculorum Laryngis hystoria, demonstrationem Anatomicam depromit in questionibus, cur in angina Laryngis, rubeat aliquando sternum & ceruix. *Rubet, inquit, sternum per continuitatem branchij, qui à summo sterno oritur, & in latera thyroidis inferitur: At musculus iste internus est, superstratum habet musculum sternohyoideum, atque bronchius sub sterno traducitur duorum digitorum transuersorum latitudine. Rubent ceruicis latera, addit Laurentius, per musculos oesophagos, & collis anterior superiorque pars per continuitatem musculorum, qui ab hyoide orti in thyroideam inferuntur.* At musculi oesophagei sunt vndique occultati, & alijs obuoluti, hyothyroidei sunt breuissimi. Dicere debebat ratione mastoidei, & sternohyoidei, rubere sternum, ceruicem verò per musculum latum, qui toram ceruicem obuoluit. Inde manifestè declarat, se penitus ignorare musculos Colli.

### *Musculi Capitis.*

Cap. 21. **S**cribit Laurentius capitis motus alios esse rectos, alios obliquos, alios semilib. 5. *Seculares, obliquos vocat, cum in dextrum aut sinistrum mouetur caput. Ad hos motus peculiare musculi destinati non sunt, sed dum alterius partis flexor, cum extensore opposito simul agunt, obliquum edunt motum, vt in carpo videre licet. At in carpo motus iste est lateralis, & secundum rectam lineam partis ad latera inclinatz petfitur, non eo modo obliquum motum capitis accipit in Osteologia, quem scribit esse semicircularem, ergo obliquus & semicircularis sunt eiusdem naturæ, nec distinguere debebat.*

*Ibidem.* Extensioni Capitis octo inferiuntur musculi, quatuor magni, & parui totidem. Attamen in enumeratione musculorum paruos octo recenset, quatuor rectos, & quatuor obliquos, ergo octo erunt parui, si vnus tantum lateris musculos enumerat, erunt tantum sex, non octo, duo magni, & quatuor parui.

*Ibidem.* Obliquus paruos à medio occipite prodire scribit, & in transuersas primi spandylis apophyses inferi. Quod si obliquus motus super secunda vertebra perficiatur, prima leuiter reuoluta circa dentem pyrenoidem, quo modo musculus ab occipite enatus mouere potest primam vertebra, quando caput eodem instanti moueri debeat cum vertebra: nam principium mouentis musculi, debet esse immobile.

*Musculi Cernicis.*

Cap. 22. **C**ernicem stellant longi sub œsophago latitantes, à corporibus superiorum vertebrarum enati. Corpora vertebrarum designare debebat, nempe corpora quintæ & sextæ vertebrarum dorsi.

Ibidem. *Scales in transversas ferè omnes vertebrarum cernicis apophyses fibras obliquas inferuntur*, at cum sint recto motui destinati, non possunt habere fibras obliquas. Obiter monebo nullas esse in musculis fibras obliquas, ne quidem in obliquis musculis abdominis, quia oblique dicuntur, quæ rectas ad angulos obtusos intersecant, & fibræ à capite musculi usque ad finem directè sunt protensæ, sine vlla aliarum fibrarum interfectione.

*Musculi Omoplate.*

Cap. 23. **O**mpata leuatore proprius in exortu distinctus est, sed eius non est diuersa insertio, nec in varias superiores anguli partes, eius portiones inferuntur, cum angulus superior omoplate sit brevis aut acutus, ei extremitas leuatoris musculi strictè iuncta & unita est.

Ibidem. *Verum est deorsum scapulam moueri à portione inferiore trapezj, & portione latissimi.* Sed hic motus leuis est & obscurus, quem faciliè deprehendes, si cubitum ad pectus imposueris, tunc obseruabis motum solius scapulæ.

*Musculi Brachij.*

Cap. 24. **N**on probe in musculo latissimo, varias inesse fibras, ac prouide brachium vario modo deorsum trahi, oblique tamen. Nam tractio brachij deorsum simplex & eadem est, versus lumbos & nates cum retrorsum trahitur, disunctum à lumbis. Motus hic perficitur ope rotundi maioris, & longi musculi, multò minùs oblique potest mouere brachium latissimus.

*Musculi Cubiti.*

Cap. 25. **V**erum est flexorem cubiti appendicem carnosam in medium ferè os brachij emittere. Nam huius appendicis ope, mouet brachium antrosum, versus clauas eleuando, & est musculus separatus, qui dici potest *Coracobrachij* ab origine, siue *Coracobrachij*.

Cap. 26. lib. 5. *Pronatorum alter rotundus, ab apophysi brachij interna ortus, & sape ab interna humeri parte.* Non intelligit quid scribat, nam interna humeri pars, & apophysis interna brachij idem sunt, & semper ab apophysi interna brachij nascitur.

*Musculi Carpi.*

Cap. 27. **C**arpum extendunt *supernus, ab altera brachij externa apophysi ortus, alter inferior eodem enatus principio.* Verum est de ortu secundi, non de origine primi musculi, qui à spina, siue colla brachij, longè supra apophysim illam externam nascitur.

*Musculi Digitorum.*

Cap. 28. **V**erum est à musculo digitorum-tenere, duos alios separari posse, nempe *auricularem, & indicatorem.* Sed falsum est omnes ab externo processu brachij, aut paulo inferius nasci. Nam exortus sunt planè differentes, nec iste musculus in quatuor partes diuidi potest. Tres tantum agnosco portiones carnosas, origine & interfectione distinctas, quæ tres musculos constituunt, nempe magnum digitum extendentem, Indicantem & Auricularem.

Ibidem. *Lumbricales quamuis coeant cum interossei, ut excurrant ad tertiam usque articulationem digitorum, attamen primæ articulationi firmiter adhærent, & colligandis inter se digitis, dum manus excavatur, inseruiunt:* Vt autem interossei digitos manuum extendant, monebat, peruenire tendones ad radices vnguium extorsum.

Cap. 29. lib. 5. Pollicem adducere scribit musculos tres, qui monticulum veneris confutunt, qui tamen abducere potius videntur, dum recedunt ab aliis, nec thenar in tres portiones secari debet, si tendinosæ partes ihuicem coeant, vnicum tendonem efformantes, qui ad eundem locum inferitur: pollicem abducere scribit totidem musculos, propriis carentes nominibus, cum tamen vnicus constitui debeat, & pollicem potius adducere videtur, dum trahit ad alios digitos, ut alter thenar abducat, dum disiungit ab aliis.

Ibidem. Minimo digito attenti, non sunt alij musculi, qui in tres aut quatuor secari possunt, sed massa quædam carnea, quarto Ossis metacarpij instrata est, quæ tendonem suum immittit in Ossis minimi digiti, & hypotheper vulgò dicitur.

### Musculi Thoracis.

Cap. 30. **V**erè scribit Laurentius, intercostales externos undecim, serratos duos pollicibus, serratum maiorem à basi scapulae enatum, & cum obliqua epigastrij exteriori pectinatim commissum, inspirationi inservire, quæ sit sublato thorace. At quomodo obliquus epigastrij superior (rectius dixisset ascendens) ex Laurentia, ab Ossibus pubis, & ilium enatus, thoracem amplificare potest in valida inspiratione, cum sit plane oppositus serrato maiori, cui pectinatim committitur.

Præterea, si tres epigastrij musculi obliquus ascendens, rectus & transversus, ex Laurentia, expirationi inserviant contrahendo thoracem, & deorsum revellendo, nulla ratione musculus obliquus exterior ab eodem loco cum musculis, obliquus interiore, & recto enatus, thoracem amplificare potest in valida inspiratione: imò potius contrahet, & deprimet thoracem in expiratione, cum reliquis musculis epigastrij.

Nescio, cur scripserit serrato maiori conignum esse obliquum epigastrij superiorem musculum, cum sit ex aduerso oppositus tantum suis tendonibus digitatim insertus. Deinde de falso scribit singulis superioribus costis alligari, imò duabus vel tribus veris insertis tantum adhærescit.

Ibidem. Nunquam vidi istam mirabilem, & veteribus incognitam insertionem, duplici tendimus musculus sacrolumbi ad singulas costas, ut eorum alter deorsum, alter sursum feratur, quasi sese intersecantes, sed cuilibet costæ duplicem anslarum tendinosam suppeditat.

Ibidem. Triangularis musculus internam sterni partem occupans, non ab inferiore sterni parte nascitur, sursum protensus, ut cartilagine deorsum adducat, sed potius à parte superiore sterni ductus, in cartilagine costarum verarum & notharum trium inseritur usque ad Diaphragma: forsitan quis existimaret productiones esse anteriores Diaphragmatis, oppositas aliis duabus apophyseis, quæ sunt ad lumbos.

### Diaphragma.

**S**i inspiratio dilatatione, expiratione contractione thoracis perficiatur, inspiratio verò sit præcipua pars respirationis, cuius causa respirat animal, Diaphragma verò sit instrumentum libertæ respirationis, credibile est potius moveri in inspiratione, quàm in expiratione, ut vult Laurentius, ea figura sic dispositum, costas inferiores sursum eriget, nec poterit inferuire compressioni abdominis.

Probo Laurentij opinionem de Diaphragmatis ortu, nam oriri scribit à lumborum vertebis, notharum costarum extremis, inferiore sterni, & xiphoide cartilagine, in eoque circuito carnoso constituit originem, in centro circulari, & nervoso & membranoso finem. Admitto etiam motus speciem quam describit, quæst. 1. lib. 1. Cum Diaphragmatis tendo, sine finis ad principium carnosum, & costas moveri nequeat, ut æqualem partium omnium thoracis contentianem, tunc principium versus finem trahitur, & flexiles costa ad circulum nervum adducuntur, sique ex earum fibrarum contractione expiratione, quibus laxatis, & in pristinum locum reductis, fit inspiratio. Ergo in ista tensione Diaphragmatis rectum efficitur & descendit, tumque inspirationem facit.

Cap. 31. lib. 5. Diaphragmatis motus proprius est contractio. Tenditur enim, attollitur quæ in expiratione, id in extincto animali facile deprehendes, canistrum enim perpetuè apparet Diaphragma. At rursus cessat expiratione. Nescit Laurentius in mortuis, & respiratione corpore Diaphragma concavum semper apparere, versus cavitatem abdominis, non quia contractum, sed quia reuulsum & suspensum à mediastino, alioqui pondere

# Animaduersiones in Anatomica Laurentij. 649

dere Hepatis & viscerum ab eo dependentium, deorsum aggrauatetur, propterea contrahitur in inspiratioe, dum ex concauo directum efficitur.

## Musculi Abdominis.

Cap. 32. **M**usculi abdominis nomina obliquere à situ quem occupant, non à villosorum textura, quia caput semper tendoni opponitur: Actio fit secundum dispositionem & situm musculi, fibræ in musculo quouis modo collocatæ, semper erunt rectæ: proptereaque musculus non dicitur rectus, obliquus & transversus, ratione fibrarum.

Ibidem. Quid sit linea candida in abdomine, ignorat Laurentius, dum scribit lineam albam à coriaco, & exsurgenti corpore, multo nouumquam adipe obfusa, cognominatam esse. Istæ hæc linea est imaginaria, nec potest designari, aut norari, diuisa supra aponeuroses obliquoꝝ, quæ sunt adeo vnitæ inter se & continuatæ, vt nullum diuisionis vestigium appareat. Hanc igitur imaginari oportet à cartilagine xiphoide per mediū vmbilicū ad symphyſim ossium pubis protensam, vt musculi obliqui cuiusque lateris inter se distinguantur. At reuulsis aponeurosis obliquoꝝ, inter duos rectos musculos intervallum quoddam spectatur, adipe reſectum, quod lineam albam refert, à cartilagine xiphoide ad Os pubis extensam.

Ibidem. In obliquo interno duplicem tendinem agnoscit, musculum rectum hinc inde amplexantem, quem tamen rectè meo iudicio eludit Vesalius, nec potest accuratè demonstrari, atque separari, sed aponeurosis iuxta rectum stridit vnitur & coalescit aponeurosi transversus musculi.

Ibidem. Negat Laurentius, consensum mammarum cum vtero per anastomosim mammaria & epigastrica, quia in viris reperitur. At viri etiam mamma & papillas habent, sine ulla mammarum functione & vñ. Anastomosis illa verissima est, & confert ad illam sympathiam vteri & mammarum, vt alibi demonstraui.

Ibidem. Scribit aliquando in viris & mulieribus reperiri, paruos duos triangulares musculos, quos dicuntur succenturiati. Imò semper reperiuntur, atque rarissimè ambo deficient. Non inseruntur in partem inferiorem, necneamque reſectorum, sed neruolæ & tendinosæ parti reſectorum superieſti, digiti longitudine ascendunt supra rectos, quorum tendinibus ne colliderentur, propugnaculi vicem gerere credit Laurentius. At istam collisionem metuit ab Osse pubis, quam impedire non possunt, si tendonibus superieſti? An potius collisionem externam in congressu, quam arcere possunt suo incubatu & apertura.

Quæst. 10. lib. 5. In subsidium obliquoꝝ, & transversorum constructos fuisse pyramidales verisimile est, quia obliqui & transversus inferiorem partem comprimere non poterant exquisitè. At dixit supra Laurentius, obliquos, rectos, & transversos ad ventris compressionem extractos. Origo & ortus ex Laurentio, id attestantur, ergo inutiles erant parui isti muscoli, & cum sint supra rectos positi in subsidium reſectorum veniunt, & vesicam fœalem subiectam comprimunt.

Ibidem. Musculus obliquus & reſector epigaſtri ab Ossibus pubis enasci contendit: ferri autem ad superiores potius quàm inferiores partes id indicat, quod inspirationi & dilatationi thoracis inseruiunt, in thoracem ergo inferuntur. At in descriptione musculorum thoracis, scribit obliquos internos & rectos, contractioni thoracis, siue expirationi inseruire. Deinde, quomodo inspirationi & dilatationi thoracis inseruiunt, si thorax sursum erigatur in inspiratione? Itaque Laurentius verè scribit naturam omnes musculos abdominis ad ventris compressionem construxisse, dum enim sensim agunt, modò hanc, modò illam, nunc superiorem, nunc inferiorem, nunc mediam abdominis partem comprimunt: quod si simul omnes agunt, æqualis sit compressio, ex qua mirabiles hi fructus emergunt, sæcum deturbatio, inuante Diaphragmate, valida exspiratio, spiritus cohibitis, & Fœtus expulsio, qui quidem omnes motus sunt musculorum actiones, non vñ, vt putat Laurentius.

Sed multa reprehendo in eiusmodi actionibus assignatis à Laurentio: imprimis, si ab Ossibus pubis omnes musculi obliqui & recti oriuntur, quomodo superiorem & mediam abdominis partem comprimant ad sæcum deturbationem, quæ in colo continentur, & Fœtus expulsionem qui ad ventriculum ascendit, instante partu: nam musculus versus suū principii retracti, dum agunt intus, intus melius, tumore suo compellit subditas partes. At nihil cõprimet versus hypochondria, & stomachalè regionè.

Propterea, si validæ expirationi inferiunt, quomodo ab his spiritus cohibetur; qui non potest intercipi, nisi in magna & coacta inspiratione, occlusa aryanoide, quamvis id scriptum fuerit à Galeno.

### *Musculi Dorsi.*

Cap. 33. **D**ecem musculos dorso mouendo assignat, imperitiè admodum, cùm dorsum lib. 5. inter cœruicem & lumbos immotum maneat, soli lumbi mouentur, aut saltem tota spina in coniunctione dorsi & lumborum. Propterea *Sylvius*, non dorso, sed lumbis musculos tribuit scilicet duos, & erigentes quatuor. Præterea, cùm dorsum non habeat intus musculos, non potest foris habere ad motum, nec excusari potest, etiam si dorsi nomine intelligat totam spinam, quia omnes musculi ad motum spinæ destinati referuntur ad lumbos.

*Musculi à Laurentio descripti, sunt magna ex parte filitij, nisi ex vno plures efficias: primi duo, qui sunt triangulares, oriuntur quidem à superna & postica cauitate Ossis Ilii, nullo modo à superiore & interiore Ossis Sacri parte, duo alij omnium longissimi à dorso, Ossibus Sacro, & Ilium oris, necnon à spinâ vertebrarum thoracis, & in spinâ dorsi feruntur. Si à dorso oriuntur, quomodo in omnes processus transversos vertebrarum thoracis inferi possunt, & in spinâ dorsi, quasi spinæ dorsi differrent ratione dorsi, à processibus transversis vertebrarum thoracis, spinæ enim & processus transversi ad eandem vertebrae pertinent dorsi, siue thoracis. Quintus & sextus ab omnibus transversis apophyseis lumborum oris, in omnes lumborum ac thoracis vertebrae inferuntur, quomodo possunt ab omnibus lumborum vertebrae nasci, & in omnes easdem inferi? Quomodo postremi duo spinam in posteriora stellant, immotus lumbus, cùm motus totius spinæ cadatur supra lumbos, ex Galeni doctrina.*

### *Musculi Ani.*

Cap. 34. **L**euatores ani sunt tennes, non admodum carnosij, imò sunt multum carnosij lib. 5. ligantur ex lateribus, & internis partibus Ossis pubis & ischij, vel potius ex ligamentis à coccyge & ischio procedentibus. Ista duæ origines sunt longè distinctæ, & longa intercapedine disiunctæ: posterior opinio est verior.

### *Sphincter Vesicae.*

Cap. 35. **S**phincter vesicae, situs est in prima ceruice, & à ceruicis substantia diuidi non lib. 5. potest, sed est ceruicis substantia carnosior. Quid sit prima ceruix vesicae ignoro, si fuerit ceruicis substantia carnosior, non erit musculus separatus: eo scilicet inuoluntariè urina fluit: at secatur in lithotomia ad extractionem calculi sine inuoluntaria missione, sanato vulnere. Est etiam in mulieribus sans vesica sphincter, sed crassior, quia proflata nulla adsunt. Ratio illa inepta est, nam proflatae accumbentes ceruici vesicae nihil conferunt ad crassitatem musculi, si fuerit vesicae intertextus, aut ceruicis substantia carnosior. Imò tenuior vesicae sphincter apparet in mulieribus, & ad carnositatem cunni pertingit, atque carnositas isthæ, siue glandula quæ est extremitas musculi sphincteris, semper tuberosa remanet, oblitteratis aliis carnositatibus in partu.

In quaestionibus. De situ sphincteris quaestionem mouet *Laurentius*. Quidam, inquit, musculum hunc, & vesicæ ceruicem, & glandulas proflatas amplexari, constringereque existimant: Alij contra supra glandulosa corpora, situm esse musculum, id est, glandulas illas à musculi amplexu liberas esse voluerunt, eius sententia *Laurentius* potius assentitur, quàm priori. Ego verò priori potius subscribo & fanceo, nec intelligi illam interpretationem *Laurentij* de situ sphincteris supra glandulosa corpora, id est, glandulas illas à musculi amplexu liberas esse, nam musculus sphincter orbicularis carnosus duos digitos latus, proflatas glandulas obuoluit, & circumdat, omnino separatus à substantia vesicæ, cùm glandulas istas habeat interiectas.

Nec potest semen externi constricta vesica à sphinctere musculo, quia non potest elidi nisi cum impetu, & orgasmo ipsius seminis, & validè comprimente, & constringente glandulas, sphinctere musculo semen exprimitur, & eliditur tunc temporis artius occlusa, & constricta vesica à sphinctere interno.

*Cremaster Viri & Mulieris.*

Cap. 36. **T**estium muſculi cremasteſtes non oriuntur ab extremis obliquoꝝ & tranſverſoꝝ abdominis finibus, ſed ab extremitate carnoſa obliqui interni iuxta ſpinam infernam Offis Ilium, cuiusque caro non tantum colore pallidior, ſed etiam fibris deorſum ad teſtes deſcendentibus diſtinguitur: quomodo ad teſtes delabitur, clariuſ exponere debebat; conſtituit membranam teſtis erythroideam dictam.

Ibidem. Agnoſcunt etiam quidam in utero muliebri cremasteſtes, membranas ſcilicet peritonei fibris carnoſis conſperſas, aſſumptæ lib. 7. cap. 11. Rotunda uteri ligamenta à quibuſdam cremasteſtes vocari ſcribit. Nefcit quid debeat accipere pro cremasteſtibus mulierum, ſed membranz iſtæ peritonei non poſſunt eſſe fibris carnoſis conſperſæ, quia fibræ natura ſua ſunt nervoſæ, deinde fibræ ſunt ſemper extenſæ ſupra carnes, aut membranas carnoſas, propterea membranæ iſtæ peritonei non ſunt intertextæ fibris carnoſis, multo minus inferna ligamenta uteri erunt cremasteſtes, quos habent mulieres, eodem ſitu locatos ut in viris.

*Muſculi Penis.*

Cap. 37. **P**enis muſculi duo oriuntur à muſcularum ani extremis, vlex inferiore pubis parte. Iſtæ origines ſunt plurimum inter ſe diverſæ, & ſpatio diſtinctæ: Non poſſunt ex inferiore pubis parte enaſci, ſed à ſphinctere ani prodeunt; vtrethrz attenti, duo alij à tubere Iſchij enaſcuntur, non autem ab appendice iſtius Offis, cum careat epiphyſi.

*Muſculi Clitoridis.*

Ibidem. **C**litoris in mulieribus duos habet exiles muſculos ligamentiſſimos, quos ignorat Laurentius, nec vquam vidit, alioquin debebat explicare; ſed nullo modo inferiuntur tentigini, aut tenſioni huius particulæ, qua de re poſteriores Anatomicos conſules.

*De Pſoa Muſculo Femoris.*

Cap. 38. **S**tupor in crure è directo renis affectu calculoſis ſuperueniens, non lib. 5. tam ratione muſculi ploæ contingit, quia inſeritur in trochanterem parvum, quàm ratione inſignium nervoꝝ, qui oriuntur à foraminibus lumbarium vertebrarum, intra carnes muſculi ploæ abſconditi, & deſcendentes per inguina in femur, per totam eius longitudinem exeurunt uſque ad genu.

*Muſculi Femoris.*

Cap. 39. **I**gnoravit originem & inſerſionem muſculorum, qui quadrigemini dicuntur, quos derivat à tubere Iſchij, & in trochantera magnum intrudit: Nam primus & ſuperior cæteris longior, ab imo & externo Offe Sacro enaſcitur, ſecundus, & tertius à tubere Iſchij, & illi tres in trochanteris magni cavitatem inferuntur, quartus quadrigeminus, quadratus, ab interna parte tuberis Iſchij educus, in partem externam magni trochanteris affigitur.

Ibidem. Erravit Laurentius in deſcribendo progreſſum utriuſque muſculi obturatoris, nec enim notavit internum obturatorem per eum ſinum, qui eſt inter tuber Iſchij, & acetabulum traduci, eius tendonem, à tertio & ſecundo quadrigemino muſculis ſimul iunctis tanquam maſſupio includi, externum per cervicem femoris, veluti per trochileam reuolui, ideoque imperitiè ſcripſit internum obturatorem ſupra coxendicem extroſum trochlea inſtar reſſecti.

*Muſculi Tibiæ.*

Cap. 40. **I**n muſculiſtibiz graviter erravit Laurentius, nam tibiam ſecunde quatuor poſticos muſculos fatetur, quorum tres à tubere Iſchij naſcuntur, interni duo, & vnus exterior. Internorum prior ſeminervoſus, aliter gracilis dici-



tur, *internorum secundum omnes, nempe semimembranosum*, & gracilis alter exterior est, vel potius interior femoris internum latus perreptans, oriturque à linea, quæ Ossium Ischij & pubis coalitum designat: propterea imperitè *Laurentius*, quartum, quem bicipitem vocant *Anatomici*, propter duo capita, quorum alterum à commissura Ossis pubis, alterum ab exteriori femoris parte enascitur, cum tamen vnum caput à tubere Ossis Ischij prodeat, alterum caput ab exteriori & media femoris parte iuxta finem tricipitis.

*Ibidem*. Membranofus, siue fascia lata, vt tibiam abducatur, cum oriatur à spina ossis ilium, non potest oblique in tibiam externam ferri, quia origo erit inflexioni opposita directe ad perpendicularum. Verisimile est potius ad tibiam internam ferri, vt abducatur tibiam.

### Musculi Pedis.

Cap. 41. **E**Xtensores digitorum pedis duo sunt, longus, & brevis, hic oritur à lib. 5. superiore tarso, & in quatuor tendines diuitus, vnicuique digito suum tribuit peculiarem excepto pollicis. Erga falsum est pollicem habere tendinem, & minimum eo carere: falsum quoque est lumbicales quatuor musculos à profundo, seu digitorum flexoris maxime tendinibus enasci, habent enim carnem pro fundamento & principio, & sunt tantum tres lumbicales.

*Ibidem*. Ex interosscis octotantum externi, spatia metatarsi opplent, non autem interni interossei, quia sunt extra spatia eiecti.

Pollex solum habet peculiarem abductorem metatarsi primo Ossis instratum, nec adducitur alterius muscoli operâ, Ossis pedis maximo intrinseci, sed transuersi muscoli beneficio, qui ab Osse metatarsi subiecto minimo digito enatus, inseritur transuersim incedens, in Os primum pollicis.

Omisit abductorem minimi digiti, qui respondet hypothenari manus, vt abducatur pollicis in pede respondet thenari manus.

### Diuisio Corporis Humani.

Lib. 6. **I**Am monui diuisionem corporis à *Diocle* propositam in Epistola ad Antigonum Regem, Therapeuticam esse, non Anatomicam, dum corpus humanum in Caput, Thoracem, Ventrem, & Vesicam dirimit, quibus locis affectis propria describit remedia, *Diocles* autem Epistola extat apud *Paulum Aeginetam* sub finem libri primi.

Cap. 2. lib. 6. Si venter inferior dicitur epigastricum, cur superior regio tursum vocatur epigastrica: rectius diceretur stomachalis.

*Ibidem*. Hypochondria *Celsus* vocat praecordia, sed *Plinius*, lib. 11. cap. 37. hoc nomine septum transversum intelligit, quia Cordi praetenditur hæc membrana.

*Ibidem*. Fallitur *Laurentius*, dum in epigastricæ regionis parte media, canum illud notabile scribit à Polluce nominari, nam ex eodem *Anthore*, cap. 4. lib. 2. finis est, in quo claues separantur.

*Ibidem*. Canum umbilicus vocatur dicitur ab inextricabilis contortæque sagina specie. Isthæ interpretatio inepta est, quoniam apud *Pollucem*, etiam *μυρ* dicitur.

*Ibidem*. Hypogastrium vocari aqualiculum à *Persia* scribit. Attamen *Mercurialis* demonstret superiorem partem ventris inferioris hoc nomine indigitari.

### Cutis.

Cap. 4. **S**i ratione tactus sensus cutis habet actionem, similiter omnes membranz lib. 6. corporis actionem habebunt, quia sunt interni sensus tactilis organa, ex *Laurentio*, at quis hoc vnquam dixit, aut approbavit?

*Ibidem*. Cutem ex vasorum extremis dilatatis gigni putat *Valgus*. Imò *Aristoteles* auctor est huius opinionis.

*Ibid.* Dum *Aristoteles*, lib. 2. de anima, ingenij vires ex cutis & carnis substantia tenuiori & molliore colligit, comparisonem instituit inter animalia eiusdem speciei, propterea ineptè *Laurentius* producit aduersus *Aristotelem* exempla Crocodili, Hippopotami, & Elephantis, quorum terrena, siue corra sunt crassissima & durissima, cum tamen ingenio & sensu valdeant.

*Membrana Carnosa.*

Cap. 6. **M**embranam carnosam cuti subiectam, vulgus *Anatomicorum* barbaro nomine panniculum carnosum vocat. Attamen panniculos nomen est purè Latinum, vſurpatum à *Celfo*, *Iuuenale*, *Martiale*, &c.

Ibidem. *Membrana carnea in homine tota eſt neruea membranaque.* Quis ferat carnosam membranam dici nerueam, membraneamque? Poſtea panniculum iſtum neruſum eſſe, aut adiposum eſſe ſcribit: quomodo adipoluſ, ſi totuſ neruoſuſ, vt antea dixit, ac ſubiungit *Laurentiuſ*, *quandocumque dicitur carnoſa, quia parti huiuſ membrana carnoſa eſt, quæ ſcilicet faciem tegit*: At demonſtraui muſculum iſtum latum faciem inſtar laruæ neutiquam operire, ſed terminari ad baſim maxillæ, quare rectiùſ dicitur hæc membrana ſimul carnoſa & adipoſa, quod alicubi aſſumpto adipe ſit adipoſa, alicubi carnoſa compareat, vt circa lumbos, & collum, & in fronte, & in ſcroto.

Ibidem. *Huiuſ membrana inferior pars lento humore velut mæla oblituitur, ne muſculorum impediatur motum.* Sed cum ſit adipe vndique obſita, non indigebat iſto humore, quamvis non ignorem id traditum fuiſſe ab *Hippocrate*, lib. de glandulis, nempe corio ſubiectum eſſe lentum & viſcidum humorem, qui in brutis interiectuſ eſt corio, & membranæ carnoſæ, ad corij mobilitatem faciliorem.

Ibidem. *Rigorem ab iſta membrana, ſiue conuulſum motum manare ſcribis, quod priuſ à *Niculaſo Maſſa* dictum & obſeruatum fuerat, in ſua Anatomie.*

*Peritoneum.*

Cap. 8. **S**i peritoneum omni ex parte ſuperiore & inferiori, anteriore, & poſteriore, dextra & ſiniſtrâ, duplex eſſe obſeruauiſ *Laurentiuſ*, poſſeſne eſſe membrana tenuiſſima latuſ aramearum teluſ ſimiliſſima? At *Laurentiuſ* omneſ corporeſ membranaſ etiam tenuem mentionem, duplices eſſe audacter aſſeuerat: Ego verò contendendo tenuem meningem indiuiduam omnino: cui ſi peritonæum ſimile eſt, non poteſt eſſe duplex, fatiuſ eſt dicere craſſum, & duplici membrana contextum, atque motuſ inteſtinoꝝ perpetuoſ id exigebat.

Ibidem. *Manuſ *Laurentiuſ* cum *Fallopio*, peritoneum oriꝝ à plexu illo neruorum validiſſimo, qui meſenteriuſ ortuſ dat, à vertebraſ enim lumborum, & cæteriſ partibuſ facile ſeparari, at huiuſ plexuſ ita annectitur, ut illacerum inde haberi nequeat.* Qualis iſte plexuſ ignorat, nec vnuſquam explicauit: conſtat ex ſtomachico vtroque & coſtalibuſ duobuſ neruiſ, ſed ille plexuſ eſt intra peritonæum inter duoſ reneſ ſituſ, & meſenteriuſ nihil eſt aliud, quàm peritonæi reduplicatio, vt in thorace pleuræ reduplicatio mediaſtinum conſtituit, quare peritonæi exterior membrana, huiuſ plexui neruoſo ſubiecta, non poteſt ab eo ortuſ ducere.

Ibidem. *Peritonæi membrana feminis ab umbilico ad pubem validior conſpicitur, ad Fœtuſ incrementuſ.* Sed meo iudicio nihil conſert ad Fœtuſ incrementuſ, ſed propter Fœtuſ incrementuſ dilatatur, ideoque craſſior ibi facta fuit, vt ſufficeret diſtentioni.

Ibidem. *Gloriaꝝ *Laurentiuſ* de obſervatione omniuſ ſerè *Anatomiciſ* incognita, quod peritonæum, dum ad veſicæ regionem peruenit, ita maniſeſtè duplicatur, ut amplius relinquat inter duaſ tunicaſ ſpatiuſ veſicæ continendaſ capax, adeoꝝ veſica inter duaſ peritonæi tunicaſ latet.* Id priuſ obſeruatum fuerat à *Veſalio*, in *Examine Obſervationum *Fallopii**, antequam natuſ eſſet *Laurentiuſ*.

Ibidem. *Peritonæum ſuperiore parte quâ Diaphragmati meſſitur, ſcribis tria habere foramina, ut arteriaſ deſcendentiuſ, venaſ Cavaſ aſcendentiuſ, & oſophagoſ pateat adituſ.* At negauit, lib. 9. cap. 4. *Diaphragma tria habere foramina, quoniam arteriaſ deſcendentiuſ, corporeſque vertebrarum iuncta, à duobuſ apophyſibuſ carnoſiſ peritonæiſ comprehenduntur, & reuera Aortæ deſcendentis truncuſ duplicato peritonæo includitur, nec perforat peritonæum: Vena Cava aſcendens perforat quiduſ peritonæum, penetrando Diaphragma, ſed oſophaguſ penetrato Diaphragmatè, cum ventriculo peritonæiſ membranâ obvolvitur, nec infeꝝtoriuſ partem, vbi vaſa ſpermatica præparantia ad teſteſ feruntur, & circulatoria aſcendunt, perforata eſt, ſed foramina hæc veriùſ productioneſ dixeris externæ membranæ peritonæi inſtar canaliſ elongati: Imò vaſa hæc intra duplica-*

turam peritonæi traducuntur, imperforatâ, nec elongatâ interiore peritonæi membrana: nec anterior & media peritonæi pars circa umbilicum manifestè in Fœtu perforata cernitur, ut credit *Laurentius*. Sed peritonæum extra ventrem vasa umbilicalia comprehendens, protenditur vltque ad placentam.

Quæst. 8. *Disputas contra Vesalium, de processibus peritonæi ad inguina descendens. Non observari, inquit, semper ferri ad inguina processus hos, & esse veteri cremasteri, foraminaque eadem in chordis musculorum oblique descendens: Ergo cremaster est processus peritonæi, sed iste processus ad testes vsque in viris extenditur, & membranam constituit elytroidem: In mulieribus subsistit in inguine. Nec tantum chordæ musculorum oblique descendens, sed etiam aliorum musculorum aponeuroses sunt alternatim perforatæ.*

Cap. 9. lib. 6. *Venam umbilicalem à radicibus porta eriam, per chorion diuicari scribit, imò potius per placentam diuicatur, & radicitur, nullo modo per chorion, nisi placentam accipias pro chorio, more veterum.*

*Ibidem. Vena umbilicalis est non minus porta, quàm arxys caua propago. Nihilominus alij venæ portæ principium & radicem esse volunt, quasi formaretur ante alias omnes venas.*

*Ibidem. Arteria dua umbilicales à ramis iliacis prodeunt. Si diligenter inspexeris, ab hypogastricis potius ramis prodire deprehendes in adultis. In Fœtu bipartitæ iliacis & hypogastricis affixæ sunt, sed crescente puero, adhæsiō ad iliacas effringitur, remanente alterâ cum hypogastricis.*

*Ibidem. Eleganter Laurentius, umbilicales arterias iliacarum propagines esse potius, quàm radices sustinet. Alioquin, nec Cor arteriarum, nec Hepar venarum esset radicatio. Sed membrana illa Fœtum ambiens chorion dicta, ibi aliquod deest, nec respondens quæ sequuntur. Quare si vasa umbilicalia sunt propagines cuiusque visceris, haud dubiè facultas pulvisca umbilicalium arteriarum manat à Corde Fœtus, non à matre.*

*Ibidem. Ourachon, quartum vas umbilicale, statim canalem esse canum, vrina ad Allantoidem deducenda dicatam, non in brutis modo, sed etiam in humanis Fœtibus conspicuum. Quomodo ourachus cauis deferret vrinam in Allantoidem, si Fœtus humanus careat Allantoidemembrana, ourachos est solidus & imperuius, ut suo loco cum Laurentio fusiùs disputabitur.*

*Ibidem. Dubito, an vasa umbilicalia Hepar & vesicam suspendant, quia sæpiissime nulla remanent, aut extant in adultis, & potissimum in mulieribus post grauidatē disparant.*

Modum apertionis umbilici in Ascite, malè describitur. Nec eo modo fieri potest tutò paracentesis, nec locuſ *Hippocratis* ab eo citatus, lib. de Locis in Homine, id demonstrat.

Cap. 10. lib. 6. In enumeratione partium contentarum in abdomine, omisit Pancreas, Mesenterium, & Vesicam lotij.

### *Epiploon.*

Cap. 11. **E**piploon, Hippocrati, lib. 5. Epid. Nonnulli dici scribit. De ista dictione lib. 6. *gendum Etymologicum magnum Græcum, & adenda Oeconomia Fœtū, ubi aliter explicatur.*

*Ibidem. Epiploon est imo ventriculo, & superioribus intestinis obtensum. Verum est intestinalis obtendi, non autem imo ventriculo, cui tantum circa fundum adnectitur, nec versus Lienem sese retrahit, & veluti in spiras colligit, sed est dumtaxat in sese collectum, ac veluti conglobatum, Ventriculo & Lieni interiectum. Nullis mexibus intestinalis epiploon alligatur, nisi colo, cui mesenterij loco est. Ergo non potest rectè diuidi mesenterium in Mesaraum, & Mesocolon.*

Quos putat exortus epiploi, à gibba ventriculi parte, & à peritonæo sub Diaphragmate, sunt potius eius adhæsiōnes firmiores. Attamen *Galenus* notauit interdum adhæsiōnem vsurpari pro exortu.

*Ibidem. Epiploi inferioris membrana à peritonæo statim sub Diaphragmate ortum dicit. Dicere debebat à peritonæi membrana, partem inferiorem Diaphragmatis obuelante, estque ea insignis portio, quæ sub Hepate traducitur, ab ipsius cauo profiliens, & intra se comprehendens paruum Hepatis lobum.*

*Ibidem.* Omenti figura marsupij aut sacculi similitudinem refert. Verum est de parte pendula, non de ea quæ est reuulsa versus Lienem, nisi extensa fuerit, atque id difficillimè deprehenditur.

*Ibidem.* Inter vsus epiploï, quantum hunc assignat, ut colo intestino; à Liene ad ventriculū & iecoris cauum ascendenti, mensenterij vicem gerat. Dicere debebat, à rene dextro ad iecoris cauum & ventriculū versus Lienem colo descendenti, mensenterij vicem gerere.

*Ibidem.* Postremum vsū addit ex Hippocrate, lib. de Glandulis, ut copiosus humor ab intestinis insuens, cum à glandulis excipi & absorbi semel nequeat, in omento velut in xistuario asseruetur. Hic vsus non ab Hippocrate, sed à Zuingerio fuit designatus, commentario in librum Hippocratis de glandulis, & ipsissima verba Zuingeri recitat, quæ non extant apud Hippocratem, nec lubenter istum vsū probō, & nescio quomodo in xistuario possit asseruari humor.

### Intestina.

Cap. 12. **I**ntestina à Barbaris chordæ appellari scribit. Imò non Barbari, sed Græci, quibus dedit ore rotundo Musa loqui, ita dixere, & χῆρδ, nomen est Græcum, inde chordapfus nomen morbi intestinorum. Homerus, lib. 21. *Odyssea*, *Athenæus*, lib. 7. *Aristophanes* in *Ranis*.

*Ibidem.* Interiorem intestinorum tunicam pingui concretoque humore oblitam esse scribit. Humor iste non est pinguis & concretus, sed potiùs mucus, quo peruncta sunt, & delibuta intestina ad faciliorem descensum excrementorum, & lonicationem intestinorum, aduersus acrimoniam sordium præterlabentium.

*Ibidem.* Tunicarum propriarum interior nervosa est, carnes tamen fibras conspersa, exterior carnosior. Malè disponit membranas, nam interior carnea est, exterior nervosa, & tunica peruosa non potest esse carnis fibras conspersa, quia fibræ omnes sunt nervosæ. Adde quod Hippocrates, *Aphorism.* 26. *sect.* 4. manifestè demonstrat carnosam esse internam intestinorum substantiam.

*Ibidem.* Crustâ veteribus incognitâ interiorem tunicam obduci scribit, ne occiderentur venarum oscula. Crustam hanc generant terra cæctionis excrementa, ut epidermida. At nunquam potui videre istam incrustationem, nec quidquam extare puto, præter mucum inuengeantem intestina. Inuentum est, aut commentum Piccolomini.

*Ibidem.* Observauit Laurentius intestina resiccata & statim dissenta septies longitudinem corporis æquare. Non debebat resiccare intestina, ut mensuram istam deprehenderet, neque statim distendere, nam statim atque exenterantur, si metiri volueris, non tantum septies, sed interdum nouies longitudinem corporis æquare obseruabis. Resiccata intestina sunt breuiora, & angustiora: forsan scribendum resecata.

*Ibidem.* Crassâ intestina undique tenuis sepiamenti instar obuallare scribit. Sed in parte tantum superiore sepiamentum istud apparet, cum alibi sint tenuioribus intestinis subiecta. Crassiora intestina, quia non debebant esse conuoluta, & intorta ritu tenuium, Natura supernè reflexit colum intestinum, ideoque non fuit in gyros conuolutum, ut tenuia intestina supernè sepiamenti instar obuallaret.

Cap. 13. lib. 6. Primum intestinum duodenum dicitur, quasi duodecim digitos longum. Monere debebat istam mensuram non reperiri, vel quomodo sit accipienda.

*Ibidem.* Pancreas habet duodenum substratum. Imò superiorem habet, interdum aliam portionem pancreatis subiectam habet, itaut includatur duplici pancreate.

*Ibidem.* Nunquam deprehendere potui, interiorem tunicam intestinorum villosæ serici parti similem esse, & crustâ quadam obductam. Itaut includatur duplici priore.

*Ibidem.* Notat eam appendicem in recens natis & puerulis latiorē & ampliorem esse, quàm in adultis, quia liquidioribus alimentis vescantur, quæ celerim præterfluere, nisi hoc veluti sacco retinerentur: Imò, & breuior & angustior est in ea ætate, quàm in alio ætatis statu. Quid autem accipi debeat pro cæco non demonstrat: Nam describit caecum brutorum tanquam saccum, ventrem quemdam crassum, uno tantum ductu & foramine peruium, ad cuius extremum cernere est appendiculum conseri lumbrici speciei.

*Ibidem.* Colum intestinum, si Græcè scribatur, per, non per = scribi debet, ut

membro cruris, intestinum eorum distinguatur: at *Laurentius* per = scribit: *Hofmannus* notat à Poëtris dumtaxat per = scriptum.

De scriptura coli intestini per =, non per =, etiam monuit *Cl. Salmasius*, lib. de annis *Climactericis*, & ante viginti quinque annos id annotauit ex *Sebero*, in mea *Anthropographia*: sed non possum tacere de inficitia artis, quam nouem Medicis Parisiensibus exprobrauit *Salmasius*, p. 731. lib. citati: conabor istam maculam nostræ Scholæ inuolam, non acrisapone abstergere, sed aqua dulci, quia faciliè eluetur. Is cum colico dolore laboraret Lutetia, nullus ex symptomatis coniectari, neque nomen ipsius morbi dicere potui, variabant omnes sententias, excepto *Citese*, qui colicam *Pellioncam* esse pronuntians, & ipsum ita curauit, ut paucas intra septimanas sanis, et pristina reuerteret, incurabilem alius futurum. Non vitupero grates quas persoluit dignas *Citese*, sed implemet eodem crimine suggillat Medicos Parisienses, libello suo de dolore colico *Pellionico*, quod ante aduentum *Medici Milonis*, primarii Medici *Christianissimi Regis Henrici IV.* colicus ille dolor *Pellionensis*, ignotus erat Medicis Parisiensibus: Sed velim, utique discat, (*Salmasium* & *Citese* intelligo) ex *Fernelio* & *Hallerio*, nomine calici doloris nostri, istum dolorem designatum fuisse, qui sepe in paralydum artuum inferiorum, & interdum superiorum definit. Morbus hic populis Lutetiae vicinis, iam dudum, Melodunenſibus familiaris est, & Endemicus, ut etiam populis *Armo-ricis*: etiam frequens occurrit in hac vrbe, mediastinis Medicorum notissimus, antequam natus fuisset *Citese*.

*Ibidem*. Ascendere debuit eorum, ne tam citò effluerent quæ in eos continentur, atque ita perfecta fieret cremoris exsiccatio. Propter ascensum coli non citiùs, neque faciliùs exaggit *Hepar* alibilem succum, nam fæces in eo intestino tantùm continentur. Habet venas à ramo splenico, multas à Mesenterico.

*Ibidem*. Ad coli principium valvulam saepe obseruauit *Laurentius*, deorsum spectantem ostioli iuxta, quæ fecum & inutilium humorum refluxum, ad partes supernas prohibet. Hæc valvula non est in coli principio, sed in fine Ileii supra appendicem lumbicalem collocata, neque deorsum spectat, sed iuxta vergit, remeantibus fæcibus, & sordibus obſistens, ne in Ileum resiliant: ad demonstrationem valvulæ experimentum *Laurentij falsum est*, nempe in resicatis & dissolutis intestinis, si per duodenum iniiciatur liquor faciliè per rectum exibat, si per rectum iniiciatur, morabitur in cæci appendice, nec ulterius præterſuget, quod arguit in cæci extremo adesse valvulam: sed si resicatus fuerint intestina, simul & resicabitur valvula, & angustior euadet in circuitu: deinde cum liquor per superiora intestina iniicitur suspensa, & erecta portione intestini circa valvulam, in sacculo quodam ad principium coli, ubi emicat appendicula lumbricalis, morabitur liquor, si paucus fuerit, si multus, portio vicina ileo exibat, & si manibus portionem coli, & appendicem sustineas, & succutias, omnis liquor per ileum confectum effluet, etiam in humidis intestinis & recenter exemptis.

### Mesenterium.

Cap. 15. **M**esenterium diuiditur in mesarum, & mesocolum, Mesarum est ea pars, lib. 6. qua tenuia continent intestina, mesocolum, qua crassa amplectitur. At ex *Laurentio*, epiploon in colo intestino mesenterij vicem gerit, & inter vsus epiplooi, hunc assignat, vt fungatur officio mesenterij in colo intestino, ergo nullum mesocolum.

*Ibidem*. Mesenterij membrana oriuntur à ligamentis, qua lumborum vertebrae coniungunt, & Os Sacrum ossibus Ilium committunt, aut à plexu illo & fasciculo neruorum *Fallopiano*. Mesenterium cum sit intra capacitatem & ambitum peritonæi locatum, exortus illi duo sunt falsi. Nam mesenterium nihil est aliud, quàm internæ membranae peritonæi reduplicatio ad lumbos, vt mediastinum reduplicatio pleuræ. Deinde mesenterium non descendit vsque ad Os Sacrum, firmam tamen habet adhesionem inter renes & Diaphragma. Non potest etiam à plexu illo & fasciculo neruorum *Fallopiano* mesenterium oriri, quia nerui dilatati non constituunt membranas, & plexus ille neruorum confusus ex duobus costalibus & duobus stomachicis neruis inter Diaphragma & renes collocatus, omnibus partibus ventris inferioris neruis suppetat, quare neque ortum, neque adhesionem præbere potest mesenterio.

Ibidem. *Mefenterij nerui à ſexta Cerebri coniugatione ſcatariunt. Obiter monebo omnes neruos ventris inferioris depromi ex plexu neruorum Fallopiiano, nec directè à Cerebro deferri ad ſingulas partes.*

Ibidem. *Propter flexum & ſcſiculaſum neruorum Fallopiiano, mira lumborum & inteſtinorum ſympathia, & apud Hippocratem in Coacis, qui lumbus ſunt queruli, profluere ſunt alio ob conſenſum meſocoli, vt interpretatur Galenus, comm. ad Aphoriſm. 4. ſect. 4. lib. 2. Epid.* Quot verba tot errores. Quomodo plexus neruorum, ſi duplicatura peritonæi continetur, poteſt communicare lumbis inteſtinorum materiam, cum nolum lumbis ſuppeditet neruum, ſed tantùm dicat ſint illi nerui ſextæ coniugationis internis partibus aliuinæ regionis, ſed lumborum & inteſtinorum ſympathia intercedit per meſenterij membranas, quæ vertebris lumbaribus firmiter adnæſcuntur. Citata prognôſis Coacarum, nullam talem explicationem recipit à Galeno, quia Coacæ ipſe non eſt interpretatus, nec condidit commentarium in lib. 2. Epid. quomuis nuper ex Bibliotheca Veneta quidam editus fuerit nomine Galeni, quem videre non potuit Laurentius, nec quidquam ſimile in eo commentario extat. Explicatio huius prognôſis Coacarum deſumpta eſt ex Duretî commentario ad hanc particulam.

Huc pertinet altera quæſtio agitata à Laurentio, lib. 4. quæſt. 1. Quomodo colicus dolor in arthritidem degenerare queat, & viciffim arthritidis in colicum: huius tranſmutationis viæ aliâs manifeſtæ ſunt, aliâs inſenſiles: manifeſtæ vias non explicat, ſed totus eſt in demonſtrandis viis inſenſilibus, niſi velit à vâſis in neruos, & viciffim à neruis in vâſa transferri materiam ſeroſam. Præterea alios eſſe ductus nobis incognitos, per quos humorum fiant tranſlationes: ſed cum inteſtina habeant tantùm neruos à ſexta coniugatione ex Laurentio, & meſenterium non alios obtineat, quàm à ſexta coniugatione ex eodem authore, quomodo à neruis in venas aut arterias traduci poteſt materia ſeroſa, aut à vâſis in neruos remeare?

Si recurras ad verba Hippocratis, quod corpus ſit confluxile, & conſpirabile, quod natura inuenit ſibi vias ſontas, nobiſque incognitas: Reſpondebo peritum Anatomicum ſcire vias & ductus, per quas partes intet ſe communicant.

Exempla quæ proſert Laurentius nil concludunt, quamuis enim abſceſſus inferiorum partium, habeant ad partes ſuperiores palindromen, non fit iſte excuſus per inſenſiles vias, ſed per venas & arterias, quæ abſorbent partis affectæ ſepſam materiam. Febres ſingultuoſæ & conuulſiſſæ, quæ ſuccedunt in fractura calcis, ex Hippocrate, non ſunt portepigenefim, ſed per ſympathiam neruoſi generis. affecto nimirum tendone illo totius corporis craſſiſſimo, qui calcis alligatur, nec febris materia in neruos migrat, ſed ex arteriis in ſpinalem medullam.

Vias igitur demonſtro, per quas perficitur mira ſympathia lumborum & inteſtinorum, ſucceſſio arthritici doloris & colici. Aorta deſcendens ſtatim atque vertebris dorſi inclinata recumbit, vtrinq. in diuiſionibus vertebrarum ramulos tranſmittit, partim in ſpinalem medullam, partim in muſculos dorſo & lumbis inſtratos, cœliaca verò ramuloſè diſtribuitur per meſenterium: in iſtis ramulis catullicæ ſerum tranſfertur in Aortam, & ab iſto trunco deſcendente in ſpinalem medullam, inde fit pareſis aut paralyſis inferiorum partium, aut ſuperiorum. Trâductio humoris ſeroſi in craſſos neruos femoris, vnde Iſchias notha deſcripta à Fernelo, ſeroſa materia ab Aorta in ſpinalem medullam inſuere poteſt. Imò peripneumonia ſæpe degenerat in paralyſim brachiorum & crurum, ab eadem tranſfuſione ſeroſi humoris in ſpinalem medullam.

Ibidem. *Glandule Meſenterij ſunt ligamenta vaſorum, & ne ventriculus ſpine comæſtu ladatur. Quis dixit glandulas eſſe ligamenta vaſorum? pancreas ventriculo ſubſternitur, non meſenterium.*

### Pancreat.

Ibidem. **Π** *Αντιπνῆ, etiam αντιπνῆς appellari ſcribit. Vnde hoc nomen explicatus fuerit, ignoro. Certò ſcio à veteribus, aut recentioribus Græcis non fuiſſe ſurpatum.*

Nefcio, cur perfeçtè eoquatur chylos in ſycophantis, & vtracibos, ſycophantia non impedit coctionem, quæſt. 12. lib. 6.

*Ventriculus.*

Cap. 17. **V**entriculi internam superficiem crusta quadam obduci scribit, ab excrementis tertia coctionis promata. Quam tamen obferuare nondum mihi licuit, rugosa quidem est interior tunica ventriculi, non crustosa, cuius incrustatione callosior euaderet interior tunica, sicque venarum oscula occurrerentur, contra quam existimat Laurentius.

Ticulus Cap. 18. lib. 6. De partibus ventriculi dissimilariibus, quas tres esse statuit, orificia duo, & fundum. Sed istae partes ventriculi non sunt magis dissimilares, quam totus ventriculus.

Cap. 18. lib. 6. Si dextrum Cordis mucronem tangere videtur orificium superius ventriculi, ergo mucto Cordis deorsum vergit, quia istud orificium vndecimae thoracis vertebrae iunctum est.

Cap. 18. lib. 6. Vtriusque orificij apertio & constrictio non fit membranularum, seu valvularum opera, non tuberculorum glandosorum veluti annulum constituentium ministerio, sed sola naturae impulsione, sic vteri osculum interius clauditur ad conceptionem, aperitur ad exclusionem Fetus, sine musculo, sine glandula. At notabis orificium inferius, siue pylorum orbiculari membrana circumdarum esse, quae similis est valvulae ad finem Ilci collocatae, quae regurgitationem chyli elapsi in ventriculum impedit. Vteri osculum inferius clauditur sine glandula, sed eius substantia glandulosa est, emulaturque balani virilis substantiam.

Ibidem. Natura ventriculum vndiquaque partibus fovit, quae non secus atque lebeti magno circumiectus ignis, collisioni auxiliatur, parte anteriore epiploon, tanquam tegumentum obtenditur iuuantibus peritonaeo, abdominis musculus, & vena umbilicali. Potestne vena umbilicalis arefacta, ac penè deperdita in adultis, fouere ventriculum, eiusque calorem augere?

Ibidem. Ventriculi duplex est usus, primus ut cibi potioniisque sui receptaculum, alter ut chylicifer. Sed chylicatio est potius actio ventriculi quam usus: non debuit usum & actionem confundere, quae distinxit accuratè lib. 1.

*Hepar.*

Cap. 19. **H**epar distat aliquantulum à septo, ne illi tanquam stabello praecordia stabel-  
lib. 6. lanti obesse. Imò tota superior pars Hepatis affixa est Diaphragmati sine vlla vel leui distantia, & cum dependeat Hepar à Diaphragmate, siue fluxu, aut refluxu, moueatur Diaphragma, & stabelli instar ventilet praecordia. siue sui contractione sursum adducat Hepar, deprimat sui relaxatione, semper Hepar sequitur motum Diaphragmatis, proptereaque inutile erat illud inreruallum ad stabellationem.

Ibidem. Verum est in Feto, & recens natis, Hepar etiam sinistrum occupare hypochondrium. At in adultis, si credimus Laurentio, non patitur ventriculi discentio spatium illud à Iecore occupari. Attamen saepius obseruatur praegrande Iecur, etiam ad sinistrum hypochondrium protensum, & ferè semper totum ventriculum sinistro lobo contegit.

Ibidem. Humani Hepatis figuram ignorarunt veteres, & iuniorum quamplurimi, quam tamen Laurentius non exprimit: Quoniam, inquit, figuram nullam habuit propriam, quae nihil ad alterationem conferret. Et tamen valde religiosus est in designandis reliquarum partium figuris, nec in ventriculo designauit figuram, nec in Liene, & pulmone. Aristoteles Iecur humanum bubulo simile notauit. Recentiores quidam Anatomici scribunt Iecoris figuram vngulae bubulae formam emulati, nam praeter duos insignes lobos filios instar vngulae, habet duos paruos lobos subiectos, qui referunt formam corniculorum vngulae, atque ut vngula foris gibba est intus caua, sic Iecur extorsum gibbum est, introrsum cauum. Non dissimile Hepatis figuram in plurimis variare, quia dumtaxat est sanguis concretus.

Ibidem. Admirabiles venarum Anastomoses veteribus incognitas in Hepate praedicat, quas dubias & incertas esse demonstrauit.

Ibidem. In Corde specus duo, plexus nulli, in Hepate canitas nulla, plexus multi. Imò



Iecur parte ſima adeo excavatum eſt, vt manum excipere queat, & ab eo ſpecu quatuor, aut quinque canales, qui digitum recipere, huc & illuc feruntur per Hepatis ſubſtantiā: his cavitatibus ſordes Hepatis cumulantur, & in portione illa omentum, quod ibi intruditur.

Ibidem. *Ridicula eſt ratio, cur connexa Hepatis pars arteriſcareat, qua ſolam Hepatis canam tantum attingunt: Quia, inquit, connexa Diaphragmatis, motu quaſi ſtabelle perpetuo ventiletur. Ergo ſtabelle ſi fieri poſſet, locum arteriæ obtineret, quæ ſanguinem vitalem cum ſpiritu deſert ad vitalitatem partis conſeruandam,*

Ibidem. *Interca notabis connexum accipi debere non pro gibbo, ſed pro cano, ideoque gibba pars Hepatis, improprie conuexa dicitur.*

Ibidem. *Hepar vno tereti & valiſſimo ligamento phrenibus alligatur, ſuſpenſorium vulgus vocat, altero Hepatis latera coſtis adnectuntur & lumbis. Reperio tamen iecur per totam ſuam ſuperiorem peripheriam aſſixum Diaphragmati, per reuolutionem membranae peritonæi ſupra iecur expanſæ: Nec adhuc obſeruauimus apud Anatomicos iſtud ſecundum teret ligamentum ſuſpenſorium vocari, hoc nomen tribuitur venæ vmbilicali, & alteri ligamento quod aſſixum xiphoidi cartilagini, ſuſpendit reuellitque Hepar, quod quidem nothiſ coſtis interdum interuentu filamentorum adnectitur, neuiquam lumbis, quia lumbos tangere non poteſt propter pancreas, & meſenterium, portionem inteſtinorum tenuium, Hepati ſubiecta, deinde totum latitat & reconditur hypochondrio dextro.*

### Veſica Fellea.

Cap. 10. **L** Laurentius ita accuratè diſpoſitionem villorum in folliculo fellis deſcribit, vt lib. 6. operanti natura interfuſſe videatur. Intus rectos habet, quibus in ſe bilem allucit, & obliques, quibus retinet, ſoris autem tranſverſos, & orbiculares quibus eandem expellit. Audaçter quouis pignore certarem, illas fibras non poſſe demonſtrari in cyſti fellis, ac eaſmeritò explodit Fallopius.

Ibidem. *De expurgatione fellis, an directe ſeuat ab Hepate in duodenum, an potius ab Hepate in cyſtim, & ab ea in duodenum, animoſè diſputat contra Fallopium, qui ſtatuit ab Hepate recta expelli in inteſtinum, cyſtim felleam tanquam dimetriculam extrinſecam fuiſſe, ſi quando comitatus bilis & ingreſſus ab inteſtino diſtento & oppleto intercipiatur, rationibus exagitat, & eludit Fallopium, qua tamen ſunt inuolida, & elambes, experientiam ſuam tandem proſequitur. Dico, inquit, à ſecore ad veſiculam ferri ductum conſpicuum, per unumque canalem, non autem à ſecore in inteſtinum. A veſicula verò ad duodenum patet canaliſculus alter, non à duodeno ad ſecur. In utroque ductu valuula ad ſunt bilis refluxum impediētes. Id facile deprehendes, ſi ſiſtulam in Hepatis ductus immittas, & aſteſ, videbis ſtatim, veſiculam prius inſtari, quam inteſtina, quia peritus eſt ab Hepate ad veſiculam ductus: quod ſi in veſiculam imponas tubulum, inſtabitur inteſtini ductus, non ſecoris: ita fertur bilis ab Hepate primum ad veſiculam, à qua mox in duodenum extrahitur.*

Ex hoc diſcurſu cognoſces duplicem eſſe ductum cholidocum diſtinctum, vnum qui ab Hepate ad veſiculam proſertur, alterum, qui ab eadem cyſti ad inteſtinum delabitur. Deinde in utroque ductu valuulae ſunt bilis refluxum impediētes: vbi ſint collocari in vnoquoque ductu non exponit: designat quidem membranulas, quæ bilis refluxum impediunt in extremitate meatus cholidoci, inter duas inteſtinorum tunicas delati, ſed in altero meatu, vbi ſint ſitz membranulae non declarati: & quamuis ſcripſerit iſtos ductus eſſe omnino ſeparatos ab exortu uſque ad inſertionem, addit tamen inſcienter admodum, quod duo illi ductus communem habent in medio ceruicem verſus canalem, quo trahit veſicula bilem, & eandem pellit, ſi diuerſis temporibus.

Inde facile cognoſces ignorantiam rei Anatomicæ, & in ea re, de qua agitur rudem inſcitiam: Nam ab Hepate recta ad inteſtinum canalis inſignis directe fertur, & circa eius medium alter canalis gracilis, à veſica productus, oblique deorſum vergēs inſertitur, ab inteſtino ad Hepar tenuiſſimum ſpecillum traduci poteſt ſine villo impedimento. Intra canalem hunc diſſectum, nulla membranula inſtar valvularum deprehenduntur. Quid igitur impedit, quo minus bilis ab Hepate per hunc canaliſculum amplum ad inteſtinum deriuetur? Quod ſi fuerit chylo oppletum, comprefſis inteſtini membranis, intra quas ſeſe inſinuat extremitas huius rami, bilis exitu ſuo prohibita, reſedit in veſiculam tanquam diuerticulum, quod ſi iuxta Hepar in-

fluoris, ductum & vesiculam, & intestinum, si supra & infra insertionem meatus cholidoci vinculo constringatur, duorum digitorum distantia distendi deprehendes. Quod si à parte inferiore iuxta intestinum ductum insufflaueris, vesiculam & Hepar tuigscere comperies. Fateor equidem ceruicem vesiculæ angustam esse admodum, & rugositatibus quibusdam tanquam valvulis interceptam, quæ festinum bilis prolapsum vtcumque sistant & moderentur. Inde conuicio non absurdam esse *Galen* opinionem, de duplici bile excrementitia Hepatis, crassa, & tenui: crassa purgamentum est ipsius chyli in radicibus portæ defæcati, quod directè ab Hepate in intestinum ablegatur: tenuis bilis, est excrementum particulare nutriti iecoris. ideoque bilis hæc nullum habet commercium cum altera, continenter ab Hepate fluente, proinde vesiculæ ceruix istis rugositatibus intercipitur, vt per angustiorẽ meatum sensim exsillet & vacuetur, cum huius bilis mora sub Hepate non sit inutilis.

### Splen.

Cap. 21. **S**plen risus organum dicitur apud *Viatricum*. Ad huius rei confirmationem lib. 6. *S*auctorem melioris notæ proferre poterat, nempe *Serenum Sammonicum*, & *Plinium* & *Aristotelem*.

Ibidem. *Plato* Lienem hunc agnouit usum, vt Hepar speculi modo nitens atque perspicuum, ad imagines exprimendas redderet. Aliter explicant docti Medici, *Quapian*, vt sit Lien simulachrum, & expressissima imago Hepatis, *Antropus* & *Imperpetua*, vt *Budæus* vertit.

Ibidem. Lien quæ Diaphragmatis cavitatem attingit leuiter gibbus cernitur, quæ ventriculo gibbo & extuberanti innittitur, modicè canus occurrit. At Lien tantum capite suo Diaphragmatis cavitatem attingit, gibbus est qua parte nothas costas tangit.

Ibidem. Venæ sunt insignes in lineam veluti rectam insertæ, & in totam Lienis substantiam sparsæ. Non capio, quid intelligat per venas in lineam veluti rectam insertas, nisi quod flexuoso ductu non incedant, vt arteria.

Ibidem. Tenuis membrana Lienem obvoluens à peritonæo exoritur, sed quomodo producat, non potest facillè demonstrari, vt in Hepate, quia per filamenta tantum tenuia reuinctus, & alligatus est Diaphragmati: ideoque facillè dislocatur, & procidit in ventrem.

Ibidem. *Auicenna* nunquam scripsit per venam coronariam ad os ventriculi ferri melancholicum succum, priusquam Lienem ingrediatur. Nec id sonant verba *Auicenna* recitata à *Laurentio*.

Ibidem. *Laurentius* vix illud venosum, quod breue vocatur, perpetuò obseruauit. Monito tamen raro solitariū deprehendi, sæpius duas aut tres venas eius vicem gerentes à ramo splenico iuxta suam insertionem disseminari ad latera ventriculi, & ascendere vsque ad os superius, quamuis *Laurentius* scripserit venosum vas in os ventriculi non implantari. Ac sanè, si diligenter venas istas persequaris, deprehendes perrepere vsque ad os superius ventriculi inter duas membranas, & interiore notis quibusdam liuidis tanquam poris punctatam esse, & laus sinistrum interioris ventriculi. esse pigrius dextro.

Ibidem. Existimas *Laurentius* per arterias potius, quam per venas à Liene expurgationem fieri ad renes fieri. Id prius docuerat *Sylvius* in sua *Anatome*, cap. 8. lib. 3.

### Renes.

Cap. 23. **S**cribis renes vtriusque ad latera vena Cava positos esse, ne sanguinis ad inferiora cursus interciperetur. Inepta planè ratio, nam à duobus renibus vtriusque positis facilius intercipitur, quàm ab vno. Probabilior est *Hippocratis* ratio ab *Ari-Horele* confirmata, renes vtriusque venæ Cavae accumbere, vt eam instar anchoræ firment, & in sua sede stabiliant, simulque serum vaforum exfugant, sibi que mutuam præstent operam.

Ibidem. Renis membranae duæ sunt, externa & interna: Amba à Peritonæo ortæ, illa inuolueris modo vndique adducitur, unde etiam renum fascia vulgo nuncupatur. Interna proprium carnis tegmen, à communi vaforum renes ingredientium tunica dilatata ortam dicit. Ergo non ambæ à peritonæo ortæ, si interna à communi vaforum renes ingre-

dicen-

dientium tunica producitur. At dices, communis hæc tunica à peritonæo produciur. Respondeo, renes, & venæ, atque arteriæ emulgentes cum aorta, & truncò venæ Caur descenditis, traducuntur per duplicaturam peritonæi, ideoque carent communi illà tunicà, quæ tribuitur tantùm partibus intra alucum peritonæi contentis: & renis externa tunica nihil est aliud, quàm duplicatura peritonæi, propriè interna tunica renis immediatè cingens parenchyma, ipsi reni peculiaris est, à primo ortu formata, quales sunt reliquorum viscerum propriæ membranæ.

Ibidem. *In adiposam venam sæpe ramulus ab azygo diaphragma permeans inseritur. Alibi tamen scribit in emulgentem, vel spermaticam insinuari, quæst. 5. lib. 3.* Quod est falsissimum de triplici illa insertione: Nam semper infra emulgentem in truncum venæ Caur inferiur, ad exonerandum azygæ venæ ramum, quando turget multo sanguine, arque etià Truncum Caur supra Cor.

Ibidem, & in quæst. 29. *Cur in nephrotide tanta sit ventriculi subversio, ut omnem fastidiant cibum, & iniectum statim eructent: Sympathia huius causam hanc assignat: Nervi nuli à stomacho ad renem inferuntur, & exterior tunica renes inuoluit, quam fasciam vulgus vocat, à peritonæo ortum ducit, quod ventriculi fundo continuari norunt omnes.* At reliquæ partes ventris inferioris quæ nervulos habent à stomachico ac renes, & quæ communem habent tunicam à peritonæo: Nec istud inuolucrum renum, fasciam dictum, ventriculo magis continuatur, quare sympathia hæc renem cum ventriculo pendet ex illo plexu nervorum Fallopiiano, qui renibus interiectus est, vnde fit, ut renibus affectis, propter vix breuitatem, plexus ille nervorum tuam affectionem statim ventriculo communicet.

Ibidem. *Sinus duos secundum visceris longitudinem protensus negat reperiri, sed vnicum repudiare non potest, qui fit ex dilatato intra cauum renis vrectere, constituitque communem illum ductum, ad quem à tubulis per papillas transcolatum serum corruatur.* At ipse nullum admittit, quomodo sinus illi duo sint intelligendi, alibi expofui.

Ibidem. *Ex mirabili struaturæ renum, usum, & actionem facillè colliges, usus communis est sanguinem venosum & arteriosum suo sero expurgare. Actionem non assignat, quæ nihil est aliud quàm attractio & separatio seri à sanguine, quod usum renum appellat.*

### Glandula iuxta renem.

Ibidem. **I**n renum superiore parte glandulam insignem aliquando vidit, sæpe etiam deesse observauit. Sed glandula hæc querenda & inuestiganda in renibus Fœtus, aut recens editi infantis, quæ vicem gerit adipis ambientis renem, qui vbi succreuit, vel obliteratur glandula, aut confunditur cum adipe renibus circumfuso, nec vnquam in homine adulto, veræ glandulæ figuram exprimit, vt in renibus ouillis, aut puerorum: qualis sit hæc glandula, & quo fine, alibi declarauit.

### Vrecteres.

Cap. 24. **V**recteres adhærent peritonæo, ab eoque communem tunicam habent. Dilib. 6. cendum, inclusi sunt intra duplicaturam peritonæi, nec aliam habent communem tunicam.

Ibidem. *Vrecteres deorsum ad vesicam protepunt, eiusque lateribus non directè, sed refluxu sinuoso, & in anfractus conuoluti, mirificè implantantur.* Sed miror incertiam aut cæcitatem Anatomicam Laurentij, quoniam directè cum obliquitate itineris, ad vesicam feruntur, inter duas tunicas ipsius vesicæ traducti, neuiquam reflexu sinuoso, & in anfractus conuoluto.

Ibidem. *Sunt qui operculum fingant miræ artificis fabrefactum. Quoddam sit iustud operculum, & vbi locatum debebat exponere, forsitan intelligit membranulas fictitias in extremitate ductus positas à quibusdam, figmentum istud debebat refellere:*

### Vesica Vrinaria.

Cap. 25. **V**esica inter duas peritonæas tunicas latitas propter Ourachon, & arteriam umbilicales, quæ inter duas peritonæas tunicas ad securitatem ferri debeuerant. Incepta proflus hæc ratio de situ vesicæ, propter Ourachon, & arterias umbilicales:

Isthæc verior est, vesicam in homine erecto, sublimem esse ac suspensam, lagenæ in-  
uictæ ritu, duplicato peritonæo determinatam, ne ponere incumbentium intesti-  
norum compressa deuolucretur. In brutis quæ prona terram spectant, nullo septo dis-  
cula, intra alucum abdominis fluitat.

Ibidem. *Substantia vesicæ membranæ est, ut distendi & contrahi possit. Imò carnosæ  
est, ut possit dilatari & constringi, quod proprium est membranæ carnosæ, fibris in-  
tertextæ: neruosa enim, ubi nimium dilatantur, pristinum tonum vix possunt recu-  
perare. Si triplici regiatur membrana, communis illa nihil est aliud, quàm duplicatura  
peritonæi.*

Non potui deprehendere crustam illam, quæ interiorē partem oblinat. Præter  
hec vasa conspicuum est canalis à vesicæ fundo in umbilicem porrectus, quo olim dum vter  
gestaretur infans, vrinam in Allantoidem effundebatur: Ego in humano Fœtu agnoscit  
Ourachon perforatum, & vrinam in allantoidem effundi.

Ibid. m. *Vesicæ partes duæ sunt, fundum & ceruicem. In fundo continetur vrinæ, atque  
recti etur obliquum firratum ministerio. Quis vnquam admittet in lagena inuersa li-  
quorem in fundo contineri? habetne velicæ fundum vim insitam, & naturalem fa-  
cultatem magneticam, beneficio fibrarum obliquarum, quæ possit retinere vrinam  
in fundo. Ketineur intra vesicam clausa ceruice, ope & ministerio sphincteris.*

Ibidem. *Vesicæ collum maribus angustius, & oblongius, feminis breuius & latius. Inep-  
tum & inane istud discrimen, nam f. minis vt maribus, vesicæ vera ceruix æqualis  
est longitudinis & angustæ, imò longius erit collum vesicæ mulieribus, si careant  
vethra, quam tamen habent, sed breuiorem virili, & rectam.*

### Vasa Spermatica.

Lib. 7. I Neptæ ex Antirena vasa spermatica vocat lucubaria: satius erat isthæc  
cap. 2. barbara nomina silentio inuoluerè, quàm proferre.

Ibidem. *Vena spermatica peritonæo incumbens, & alligata vni cum arteriis, abdomi-  
nis cavitatē egrediuntur, debebat dicere venam cum arteriis peritonæo duplicato in-  
cludi & egredi.*

Cap. 3. lib 7. Quatuor hæc vasa, intelligit præparantia, miro artificio implorata, uni-  
tam corpus effingant varicosum, candidum, oblongum, quod quæstus adhaeret, eique incum-  
bit epididymis dici solet, Anatomici serè omnes parastata varicosos appellant. Quot verba,  
tot errores: non sunt vtriusque quatuor vasa præparantia, quæ constituunt epididy-  
mida, sed tantum bina, neque epididymis corpus est varicosum & candidum, quia  
nullæ varices, aut anfractus in ea conspiciuntur, atque rubicunda potius, quam al-  
ba spectatur.

D. inde, longè diserepat parastata varicosus ab epididymide: nam parastata cirroi-  
des est extremitas vasis leminarij præparantis, anfractuosa & varicosa, iuxta suam  
insertionem in testiculo: propterea Imperiæ, ex Herophilo, parastatas cirroides dici  
scribit, vesiculas illas iuxta vesicam vrinariam positas, in quas iaculatoria vasa semen  
effundunt. Id nunquam dixit, aut somniauit Herophilus, nam aliter parastatas cirroi-  
des est interpretatus, vt legitur apud Galenum.

### Epididymis.

Ibidem. Epididymis corpus est oblongum, vtriusque testis extremo adhaerens, in medio a-  
liquantulum dehiscenti, excoquendo & dealbando semini dicatum, mediam inter  
vasa & testis naturam obtinet. In superficie quippe membranosum apparet, sed intus glan-  
dulosum est. Contra Galenum assignauit hunc vsum, vel potius actionem epididymidis:  
scribit enim corpus illud interiectum fuisse vasibus præparantibus & testis, tanquam  
medium & intergerinum parietem, quia Natura nunquam solet duo extrema dissi-  
milis naturæ & substantiæ, inter se iungere sine medio aliquo, qualis est epididymis:  
In isto coalitu nemo vnquam dixit epididymida excoquendo & dealbando semini  
dicatam esse, officium istud solis competit testibus, ex Laurentio: Nec istam aduo-  
nem obire potest epididymis, si mediam inter vasa & testes naturam obtinet: ac pro-  
inde non erit glandosa: exsugit quidem vno extremo semen excoctum in testibus,  
traducitque in vasa ejaculatoria, quæ sunt huic corpusculo continuata, vel ipsa epi-  
didymis, est principium vasorum ejaculantium, vt demonstrat continuitas.

## Animaduerſiones in Anatomica Laurentij. 663

*Ibidem.* Separatur ſerè tota epididymis à teſtibus, habet tamen per exiles ſiſtulas cum illis continuatam, unde viſa illa manat ~~impuriorum~~. At dixit in medio dehiſcere, extremis tantùm ſuis adhæreſcere, ergo per ſua tantùm extrema communicat cum teſte: ſed nulla vaſa ad epididymida ſeruntur, quorum tunicæ ſint tenuiſſimæ, vt viſ ſeminis procreantia à teſtibus in ea vaſa celeriùs inſuat. Præter vaſa ſpermatica ſam deferentia, quàm eiacularia, quorum ſutculi ſont denſi & robuſti, nulla deprehendo alia vaſa.

Cap. 4. lib. 7. *Ab epididymide per exiles meatus, & quaſi ſiſtulas in teſtium ſubſtantiam ſemen corrinatur.* Ergo contra doctrinam Galeni, & omniũ Anatomicorum, vult epididymida ſemen excipere, excoquere, & dealbare, dein transfundere per exiles meatus in teſtis ſubſtantiam, quod eſt abſurdum, nam à teſte ſemen reſorbet, & tranſmittit in vaſ eiaculariorum.

*Ibidem.* Errat in propriis tunicis, dum duas tantùm enumerat, exteriorem & interiorem: illam non putat reſtè vocari erythroidem, melius elybraides dicitur. Sed cùm duæ ſint membranæ propriæ à partibus ſuperioribus exortæ, nempe à cremaltère, & peritonæi productione, exteriõr quæ fit à dilatato cremaltère erythroides nominabitur, quia carnoſa & rubra: Interiõr elybraides, quia inſtar vaginæ includit reſtem. Erythroides etiam dici poterit eluoides, quia veuulis & arterioliſ conſperſa, ſed falſum eſt tunicam immediatè teſtis corpus obuoluentem à Galeno *Aurii* appellari, quod nomen tribuit interiõri membranæ ſerotri, & communem facit tunicam.

Cap. 5. lib. 7. *Excoctum, elaboratumque in epididymide & teſtibus ſemen, tandem in vaſa duo epididymidi cotinua, & ab eo prodeuntia fertur, quæ eiacularia dicuntur: ià hoc munus vtriusque conſeſſum eſt, vt ſemen à teſtibus & epididymide in veſiculas tanquam pennæ & promptuarium tranſportent.* Ergo ex doctrina Laurentij, ſemen in epididymide excoctum & dealbatum, in reſtem tranſfunditur, ruſum à reſte ad epididymida reſcurrit, vr ad vaſa eiacularia traducatur, quod eſt abſurdum. Er cùm loquatur de vna epididymide, ipſam non debebat tribuere duobus reſtibus & duobus vaſis eiaculariõis: loquutio non eſt congrua.

*Ibidem.* Eiacularia vaſa ſcribit in exortu ſatis craſſa, ſanguoſa, conuoluta. Verum eſt de conuolutione, non fungoſitate.

### Veſicula Seminaria.

Cap. 6. **V**eſiculaſ ſeminarias ab Herophilo earum primo inuẽntore parafſatas circiſiſides nominari ſtatuit. Sed ante Herophilum, Hippocrates, lib. de Natura Offiſium, notaerat ſemen veluti ſauum, ad vtrumque latus veſicæ aſſeruari, ſed Herophilus non veſiculaſ ſeminarias parafſatas circiſiſides appellauit, ſed anfractuofas extremitates vaſorum ſpermatiorum deſerentium, iuxta inſerctionem in teſtibus, vt patet ex Galeno, & Ruſo Ephelio, quibus credere oportet.

### Proſtata.

*Ibidem.* **D**uo partium genera excipiendo & aſſeruando ſemini ſunt dicata & veſicula ſcilicet quæmplures, & proſtata glanduloſa, quarum varius uſus agnoſcit: vt ſemen contineant, aſſeruentque ea copia, quæ ad coitum ſufficiat: alter eſt, vt ſemen increaſcant, perſiciantque: in cæteris partibus tenue eſt & ſeroſum, hic craſſius candidumque: tertius, vt oleoſa & veluti ſaliuali humiditate vtrebram irrigent: poſtremus ad ventris dulcedinem tenacem humorum gignant. Ergo ſemen in duobus locis aſſeruatur in veſiculis ſeminariis, quæ ſunt quæmplures genitali ſemine perpetuo prægnantes, ne vno coitu totum ſemen eſſentet, quod ſenſim ſicut lac ex mamma, ad veſicæ ceruicem exprimitur, inquit Laurentius. Si ſemen contineant veſiculæ ſeminariæ, & expriment in veſicæ ceruicem: an ſemen illud quod continetur in proſtatis diuerſum eſt ab eo, quod veſiculis ſeminariis coëreer? An à veſiculis ſeminariis deriuatur in proſtatas, inde in veſicæ ceruicem effunditur? At ex Laurentio, veſiculæ ſeminariæ etiam ſemen effundunt in ceruicem.

Præterea, ſi ſemen increaſcant, quod in cæteris partibus tenue eſt, & ſeroſum, quomodo duos alios humores ſeminales planè differentes continere poſſunt, nempe

oleosam, ac veluti salivalem humiditatem, deinde tamen alium humorem, qui pruritus & titillationem excitat.

Inde manifestè colligitur *Laurentium* nescire quid scribat: verisimile est duplicem humorem seminales in partibus genitalibus contineri, vnum prolificum, totumque spirituosum, quodammodo animatum, alterum excrementitium, oleosum, ac veluti salivalem, cuius magna est copia: Prior in testibus, totoque ductu vasis eiaculantis continetur vsque ad prostates, & nisi prodiret à superioribus partibus, frustra hæc vasa dicerentur eiaculantia: exprimitur autem in actu venereo à prostaticis compressis & elisis, ab orbiculari sphinctere prostratas orbiculatim amplexante, alter excrementitius in vesiculis seminatibus concluditur & asseruatur, qui in vethram sensim, & sine sensu destillat, nonnunquam maiore copia in tensione & arrectione penis, sed vbertim profuit cum vero semine, eique permiscetur iu actu venereo. Vero excepta hæc vtriusque seminalis humoris miscella, si in conceptum vertitur, ex vero semine formatur, crescitque corpus animalis, ab excrementitio nutritur, foueturque aliquantulum, & membranæ cum vesiculis aquâ plenius procreantur post descriptum punctum, tertio die palpitans, quod bullam, siue Cor representat, inde homo verè bulla dici potest, quia incipit à bulla. *Theophrastus* in semine plantarum & animalium duas partes agnoscit, vnam veram, à qua vis procreatrix dependet, alteram excrementitiam, & alimentariam veri seminis, lib. 1. de caus. plant. c. 9. ad incrementum.

Ibid. *Vesicula seminata ex multis & anfractuosis canaliculis constata, varique varicum in modum implicata sunt, ut plures videantur. At eodem libro, quest. 2. de testium usu disputans adversus Aristotelem, scribit quod amplitudine & sensu canaliculi ad seminis excretionem esse opus: An non per eiaculatoria vasa ad vesiculas & prostates fertur, ibique asseruatur sine canitate semen?* Peritus erit Anatomicus, qui pugnantes istos locos conciliabit.

Ibidem quest. 7. *De sita glandularum prostaticum supra vel infra sphincterem disputat, sed supra sphincterem sita esse statuit, tripliciter ratione inductus: si enim supra sphincterem sita essent glandule, nunquam sine urina semen excerneretur, & in generibus cum semine egrediretur latum: quæntiam urina super hæc glandosa corpora fluitaret.* Sed ridiculè de situ prostaticum anxius est, si sphincter vesicæ à ceruicis substantia distingui non possit, atque sit ceruicis substantia carnosior, quia sic positus sphincter substratus erit glandulosis prostaticis, suoque officio fungeretur, sine vlllo damno prostratum: At si sphincter sit musculus distinctus à ceruice vesicæ, merito quærit *Laurentius*, an sit supra vel infra glandulas prostaticas, sed cum glandulæ prostaticæ intra se comprehendant & circumdant ceruicem vesicæ, siue supra, siue infra prostaticas collocetur sphincter, nunquam constringet veram vesicæ ceruicem, sed ipsa demonstrat sphincterem esse musculum carnosum, latum duos digitos, orbiculatim prostaticas amplexantem, quas dum arctè constringit in actu venereo exprimit, eliditque semen in prostaticis contentum in vethram, & constringendo prostaticas magis arctat, occluditque ceruicem vesicæ. Dum quiescit, ratione prostaticum vesicæ ceruicis accumbentium clauditur vesica, referatur dum voluntati enitimur urinam fundere lato sphinctere. *Ridicula est ratio de situ sphincteris supra prostaticas, quod urina super hæc glandosa corpora semper fluitaret, eaque tandem acrimoniâ suâ raderet, si esset sphincter locatus infra prostaticas.* At scire debebat vesica ceruicem, vel continuatam esse vethræ, aur ei adhærere, proptereaque urina isto canali conclusa, non potest semper, nec vnquam fluitare super glandosa corpora.

### Penis Virilis.

Cap. 7. **T**otum corpus penis ex duobus nervis canis, utrimque vno, & canali medio lib. 7. constituitur. Nervi illi duo ligamentorum instar, ex inferiore Ossis pubis, & superiore ilij parie oriuntur, & cognosces à tubere ilchij enasci nervos illos duos cavernosos & ligamentales. *Tota eorum substantia fungosa, & atro sanguine oppleta cernitur, ac flex innumeris arteriarum, venarum, nervorumque furculis variè implicatis retia formantur, quod videtur fortasse innuisse Hippocrates, vel alius author libelli de genitura: dum venas & nervos ab universa corpore in pudendum desinere scribit.* Elegans textus, sed malè expositus. Nam tria hæc vasa seminis materiam ad partes genitales deferunt, putà sanguinem & spiritum, ideam patrum referentes.

*Vrethra.*

Ibidem. **V**rethra nihil est aliud, quàm vesicæ substantia ad penis fines elongata, vel si mauis, vesicæ collum productius. Sed cum sit vrethrae substantia spongiosa, nigricans & planè conuulsiu ligamentosis neruis, vt simul cum illis in turgigine, & arrectiōe penis turgescat, & distendatur, cum illis flaccescat: Non potest esse vesicæ substantia elongata, aut vesicæ collum productius: Adde quod per coctionem separari potest à vesicâ.

*Musculi Penis.*

Ibidem. **M**usculus penis paulo aliter describitur, quàm lib. 5. Nam hoc loco musculos à superiore ossis ischij parte ortos excretioni seminis inseruire statuit: lib. 5. Musculos ab appendice ossis ischij ortos penem amplificare scribit: hoc loco musculos à lateribus Ossis pubis ortos erectioni & dilatationi penis destinat: At lib. 5. scribit prostates comprimere, exprimereque semen iaculationis tempore, & vrinae reliquias in fine mictionis. Interea notabis musculos ligamentis neruosis superctenosos ab eodem tubere ischij educi, cum ipsi ligamentis.

Ibidem. *Ad penem sparguntur exiguæ neruorum surculi.* Imò magni duo cum venis & arteriis per longitudinem penis excurrunt parte inferiore.

*Balanus.*

Ibidem. **A**d penis extremum apparet nūmus, seu Glans, pars carnosâ, ceteris mollior, cuius substantia spongiosa, intus tamen solida, non tana. Hic multa inter se contradictoria deprehendo, si glans est, non est pars carnosâ, atqui glandulæ magis naturam retinet: si substantiam habet spongiosâ, falsum est intus esse solidam, noneam, quoniam excavata est ad vrinae egressum.

Denique Balanus prope accedit ad consistentiâ ipsius testis, nisi quod intus paululum nigricet, ab effusione sanguinis, & spirituum, vt in congressu cum ipso penes distendatur.

*Vasa Spermatica Mulieris.*

Cap. 8. **I**n Nepi Laurentius mulieri tribuit epididymida, dum vas spermaticum deferens lib. 7. *In maiore sui portione in epididymida, & testem assumitur, minore ad uteri fundum spargitur, prior illa variis anfractibus implicatur, tandemque epididymida effingit vaticosum corpus, melle & glandosum.* Quæ omnia sunt proflus ridicula & falsa: nam vas spermaticum deferens in epididymida assumi scribit, postea effingere corpus glandosum. Nec recordatur eorum quæ scripsit ex Galeo, quæst. 9. Testes mulierum non habere epididymida, aut si habent ita esse exigua, vt oculorum ferè aciem effugiat. Ac reuera testis mulierum caret omnino epididymide: attamen scribit cap. 10. lib. 7. Testes mulierum habere molliorem epididymida.

Ibidem. *Vasorum seminis præparantium exortus similes in utroque sexu notat, distributiones multum dissimiles, nam vasa hæc in viris tota ad testem & epididymida feruntur, at in feminis, & vena & arteria bipartite finduntur, &c.* Raro vidi arterias spermaticas in mulieribus, vt in viris, aut oculatæ manus me fecellere, deinceps id accuratius obseruabo, sed arteriæ hypogastricæ, vt sæpius vidi, earum vicem occupant, quæ repentes secundum latera corporis vterini, ad spermaticas venas iuxta cornua feruntur & sparguntur, eorumque simul per anastomosim: quod notatâ dignum, ad constitucndum discrimen feminis muliebris, ex Aristotele.

Deinde quis vnquam vidit arteriam spermaticam in muliere bipartitam findi, instar venæ spermaticæ, & distribui eo modo quo vena spermatica: In viris arteria spermatica statim ab exortu commiscetur, & vnitur cum vena spermatica, itaut eius separatio tantum distinguatur in exortu suo.

Cap. 9. lib. 7. *Eiaculatoria vasa in mulieribus magis flexuosa, quàm in viris tradit, vt via breuitas flexuum multitudine compensentur.* Attamen in mulieribus minus flexuo-



sum, & anfractuofum deprehendes, quàm in viris. Id inspectio Anatomica indicabit.

Ibidem. *Horum insertio elegans est, in duas velut ramos dirempta altero ampliare, sed brevior in latera uteri cornua dicta feruntur, altero angustiore, sed longiore per latera uterini corporis inter membranas excurrente ad finem oris interius, vel principium cervicis desinunt, istò semen in uteri fundum ei aculantur, hoc verò dum conceptione factà contractus est uterus, semen in cervicem effundunt.* Nolo proflus repudiare istam divisionem valis ei aculantis, quamvis nonnulli progressum alterius rami latera uterini corporis perreptantis, vsque ad principium cervicis non admittant, freti autoritate Galeni, qui *strophilum* de isto ductu reprehendit. *Laurentius* posset certare testibus adductis, quibus visa & demonstrata fuit hæc distributio, sed oculatissimos testes desiderarem, non lusciosos, & myopas, & adulatores Medicos. *Nec amplius gloriatur Laurentius, se ductum veteribus & neotericis incognitum, in publicis sectionibus observasse, quæst. 22. lib. 2.*

Ibidem. *Vas ei aculatorij portionem exteriorem in latera uteri cornua dicta ferri scribit. Ignorat Laurentius, quid sint cornua, & infra id examinabimus.*

Ibidem. *Meatus ei aculantis vas ad cervicem uteri protensus, ita quæ non conceperunt ita exiguus, ut nisi securis accuratè, sensum effugiat: In gravidis anoplissimus est, propterea gravidæ in coitu magis oblectari puto, quia longior est ductus per cervicem excurrentis. Si in mulieribus quæ non conceperunt, ita exiguus est, cur in gravidis ita grandis? An quia dilatatur seminis affluxu, & transitione ocluso altero meatu per uteri cavitatem. Quod si mulier gravida non amplius virum admittat, aut semen excernat, exarescet, si in gravidis paries spermaticæ puta testes, & vasa ei aculatoria descendant prope cervicem uteri, ascendente fundo uteri, non potest esse ita longus hic ductus, ut imaginatur Laurentius. Ac sanè, si in gravidis aut puerperis vasa spermatica inspexisset, discrimen valorum spermaticorum, & res plurimas nobis descripsisset.*

### Vterus.

Cap. 11. **A**ristoteles *uterum* locus vocat, debebat scribere Græcè *μήτηρ*, inde *μήτηρ*, & dubito, an vox ista extet apud Aristotelem.

Ibidem. *Est matrix nobilissima, ac propemodum divina fauilla, ex qua natura thesauri conditi dipromuntur. Id ex Scaligeri exercitatione 191. adversus Cardanum depremissis Laurentius, sed correxit fauissam, & sæpius repetendo hanc periodum, fauillam ponit pro fauilla, quæ nomen est purè Latinum, quo veteres designabant cellas quasdam & specus, quibus ædificii Capitolini vterentur ad custodiendas res veteres religiosas, si ereditur Agellio, lib. 2. c. 10. vel derivari potest fauilla à fouea, si fides adhibenda Periozo. Repetit istam periodum de fauilla, cap. 4. lib. 2.*

Ibidem. *Vteri substantia membranacea est, ut dilatari ad incrementum Fœtus, cogi ad exclusionem eiusdem posses, hoc enim soli membrana conceditur: Tunicarum exterior communis dicta, omnium, quæ à peritonæo oriuntur, crassissima est, interior reliquæ totius ventris membranas crassitie superat, & valde carnosæ est. At quomodo vteri substantia potest esse membranacea & carnosæ? soli membranæ concedi scribit, ut dilatetur & contrahatur. Imò, nisi carnem haberet adiunctam non posset dilatari, & contrahi, quia solæ membranæ carnosæ huius motus sunt capaces, exterior tonica vteri non est erassior aliis membranis communibus, quæ renes & vesicam inuoluunt: verum est utrum villas habere, sed obliquis non potest Fœtum retinere, sistitur enim quandiu nutritur, tandiu nutrietur, quandiu placenta hærebit utero.*

### Vterus gravida Mulieris.

Ibidem. **P**regnantibus dicta miram, & veteribus incognitum, iam non membranacea videtur vteri substantia, sed tota ferè carnosæ, fungosæ, spongiosæ similis, in multis cervicis fingerum more facili dividua, ut sanguinis & spirituum copiam pro Fœtus alimento & vita contineret. Si ante conceptum erat membranacea, quomodo prægnantibus tota ferè carnosæ redditur? Necessum est prius habuisse carnositatis fundamentum. Istæ observatio pulcherrima est, & veridima: sed primum auctor in nomina se debebat Arantium. Si prægnantibus vteri substantia fungosæ est spongiosæ similis, ut sanguinis & spirituum copiam pro Fœtus alimento & vita contineret, frustra scri-

## Animaduersiones in Anatomica Laurentij. 667.

*hic* Laurentius, per vteri substantiam riuulos diffundere, quorum oscula coyledones dicuntur. Nam per inania spatia substantiæ vterinæ fungosæ, sanguis maternus diffunditur ex venis elapsus, eo modo, quo per spongiæ porositates liquor spargitur: Inde ex illa affusione sanguinis crassefeit, & intumescit vteri substantia, quæ in menses pro Foetus incremento magis augetur, vti maior sanguinis copiam excipiat: itaut contra naturam cuiuscumque corporis, siue membranosi, siue carposi, vteri substantia quò magis amplificatur, eò magis crassescit, excluso Foetu, sensim constringitur ad expurgationem sanguinis, qui ab eo loco vnde manat, vix dieitur: quare eò nullas vasa per vteri substantiam disseminantur, eorum oscula non possunt coire cum osculis valorum vmbilicalium per symphysem, id impedit interiecta placenta, quæ paritibus vteri applicata, exfugit sanguinem maternum, ex placenta vasa vmbilicalia eliciunt, & ad suum quæque locum principale deferunt.

*Ibidem.* Eorum quæ non gerant, vterum vix Ossis pubis, & vesicae altitudinem superat, prægnantium vterum ad illa usque extenditur. Imò ad ventriculum vsque ascendit.

### Ligamenta Vteri.

*Ibidem.* **H**æc vocat cremasteres rotunda vteri ligamenta, & malè. Ac lib. 5. cap. 36. lata ligamenta vteri cremasteres vocari notat. Incertus est quid accipere debeat pro cremasteribus mulierum, quæ habent tantum intus cremasterem, vocatum siue productionem peritonæi, vt alibi dixit.

*Ibidem.* Rotunda ligamenta, muscutorum abdominû extrema, peritonæumque perforantia, ad Ossis pubis feruntur. At non perforant peritonæum, sed per duplicaturam traducuntur, intra productionem peritonæi, eo modo, quo vasa spermatica & alia deducuntur in viris. Adde præterea: hæc rotunda ligamenta aliquando ita dilatantur, vt bubonocelam pariant. Imò bubonocela mulierum fit ab intestino prolapsio, vt in viris per productionem peritonæi, & si non possit maris intus repelli, sectione peritonæi coratur, vt in viris. Non possunt dilatari ad excipiendum intestinum, sed interdum materiam virulentam vteri excipiant, & faciunt in inguine bubonem venereum.

*Ibidem.* Vteri ligamentà conferunt, he totum vteri corpus ab grauissimum grandioris animalis & gemellorum pondus, ob ingentes conatus, & summos in partu enixus procederet. Hæc ligamenta in virgine, & muliere quæ nunquam concepit, sunt minora & adstricta. Inferuire possunt, ne corpus vteri per latera vagetur, & oberret, vel præcidat, sed post partum, cum laxa admodum remaneant, nec quidquam conferre possunt ad eos vsus assignatos à Laurentio. Imò lata ligamenta videntur apposita lateribus vteri, vt existerent triplicem diremptum valis spermatici ad tubam, siue eorum vteri disseminati.

Cap. 13. lib. 7. Nescio cur pudendum muliebri larna nomine donatum scribat: Forsan restituendum nomen valvæ.

### Caruncula pudendi muliebris.

*Ibidem.* **S**ub illis caruncula apparent valvularum instar in virginibus quatuor, quæ florem virginæum caryophyllo nudum plantæ explicatæ persimilem, clausuram virginalem, & hymenem tantopere celebratam constituunt. Sunt porius rugositates carnosæ, contracti pudendi, quam veræ carunculae, quoniam in partu, dilatato & amplificato pudendo muliebri, penitus obliterantur, sola remanente carnositate quæ tæget virinæ mestum, & videtur potius esse extremitas sphincteris muliebris, qui eò ptingit. Ac sanè eiusmodi carunculae in circuiu pudendi collocatæ, magno fuissent impedimento parientibus mulieribus.

Delusit Pinus, & alios Anatomicos Columbus, dum istas carunculas proposuit. Sed Pinus adiunxit, inter se coire membranularum quarundam interuentu, quibus laceratis & carunculis velut attritis, perit flos virginæ: In deo virginatis & corruptis puellis, nisi frequentem scortationem exercuerint, flos virginæ detrimentum, aut iactura, ex laceratis, & carunculis attritis difficillimè dignoscitur. Ingeniosum est, ac subtile figmentum Pinæ.

## Clitoris.

Ibidem. **P** Articulum quæ in superiore & anteriore vulvæ apice apparet, primus inter recentiores descriptus Fallopius, & Clitorida vocavit. Antiquius Albatram, Albucaſi tentiginem. Fateor quidem à Fallopio eleganter descriptam hanc particulam, sed nomen vetus est, à *Ruffo Ephesio*, *Suida*, *Polluce vſurpatum*, Antiquius non Albatram, sed Albatara, si credimus exemplaribus editis. Albucaſi, cum fuerit Medicus Arabs, non nominavit tentiginem, sed interpretis sic appellat istam particulam, quamvis Albucaſi nihil de tentigine huius partis dixerit.

Ibidem. Hæc particula ligamenta habet duo, cana ab Osibus pubis orta, intus spongiosa, atro crassaque sanguine plena, & exiles musculos quatuor. Quot verba tot errores, nam ligamenta non sunt cana, & à tuberculis ischij oriuntur, sunt subatra & spongiosa, musculos etiam habet quatuor, quos debet hic exponere, prætermittit in *Myologia*.

## Hymen.

Ibidem. **I**N medio cervicis progressu tradunt plerique in virginibus reperiri membranam, in medio perforatam, quam vocant hymenem. Ego (*subdit Laurentius*) transversam illam membranam, siue sit in medio, siue in principio cervicis, si reperitur, præter naturam insitutum esse puto. Puellas enim & abortivas Facius vidi quamplurimos, in quibus membrana illa non aderat, quis enim illius fores vſus? Addit quasi. 13. lib. 7. *Virgines sex & septem annorum diligenter observasse, & specillo ad vires vſque internat immisso, nihil quod resistere invenisse, imò fistula externæ pudendi partes, si insinueris, videbis & alas & carunculas contrahi, cervicem autem totam, seu pudendi sinum patere*. Absurda sunt hæc omnia à *Laurentio* proposita, ut eludat, & expungat hymenem, virginis custodiam & testimonium. Si puellas non abortivas, sed recentem editas inspexisset, intra labra membranulam orificio pudendi obtentam, supernè hiulem instar valvulæ deprehendisset, quæ crescentibus & adultioribus puellis, intus magis reconditur sub alis vltra meatum urinæ, & ibi circulum parietibus colli affixum, & in medio perforatum constituit; & hic circulus potissimum in puellis macilentis apparet: quod si carnosum & obesum fuerit corpus, pudendum quoque carnosum & pulposum evadit. Ideoque cius spatium, ut contractius & angustius fiat, præter tuberculum carnosum, meatum urinæ cingens, tres alie rugositates carnosæ ciformantur deficiente illa membrana carnosâ circulari, ut sæpius à nobis observatum. Quare non præter naturæ institutum circumiecta fuit hæc membrana. Cuius vſum si requiras, ut ingressum sinus pudoris laxum, & æqualem amplitudinè sinus vaginalis contringat, præter vſum inutilem ante ventis vſum, & parturitionis tempus.

Notabis etiam in puellis trimis & septennis, aliisque virginibus adultioribus, semper vaginam pudendi ampliorem esse corpore vterino. Itaque ridicula est exploratio specillo facta, cum diductis pudendi labris patere debeat. Ridicula quoque isthæc insufflatio pudoris sinus, quam in viventibus *Laurentium* fecisse probabile est. At si alas & carunculas contrahi vidit, quomodo cervicem totam, seu sinum pudoris intus reconditum patere vidit?

Addit *Laurentius*, *Oribasium* non admittere istam tenuem membranam, quæ sinus pudoris interceptat. At nihil *Oribasius* de illa membrana dixit: ex *Sorani fragmento* id deoptumum est. Interim notabis Græcos illas mulieres imperforatas non *præternaturam* vocare, ut scribit *Laurentius*, sed *ἀγενῆ*.

## Nympha.

Ibidem. **D**istinctis aliquantulum pudendi labiis conspiciuntur alæ, quas vocant quidam nymphas. Sed notabis nympham propriè vocari particulam illam, quæ Clitoris dicitur, nec istud nomen attributum fuisse alis, à veteribus Medicis. Attamen retineo totum illud nomen, & tribuo huic parti, quam describis.

Ibidem. *Clitoris creſcit in quibuſdam tam impoſuit, ut extra rimam propendeat, inſtar mentula, & ea ſeſe mutuo fricent mulieres, quas Tribades vocant. Id verum eſſe, præter teſtimonia à me producta in mea Anthropographia, ſtudioſiſſimus Plempius, in ſuis Fundamentis Medicinæ ſecunda editionis, hiltoriam recitat, de Helena Antuerpienſi, quæ in lupanariſ, mentio habitu virili mulieres exercebat, comprehenſa eâ & viſitata à Chirurgiſ & Medicis, nihil comparuit: quoniam hæc particula reuulſa, intus recondebatur. Erudiſſimus Tulpius, in ſuis Obſervationibus, ſimile exemplum profeſt, de Tribade viriliſ animi, quæ militauerat in obſidione Syriacus, obſeruata à tribus obſterricibus paulò ante vrinæ iter, glanduloſa caruncula apparuit, dimidiati digiti longitudine, & craſſitudine, quæ colem puerilem referebat, & pro vario libidinis ardore prolongabatur.*

### *Cornu Vteri, ſiue Tuba.*

Ibidem, & **A**D latera fundi proceſſus emicant, vulgus cornua appellat, in boſ proin quaſt. *Caſſus non ita mulieribus, ac in brutis conſpiciunt, ſemen muliebri excernitur, quia in hoſ eiacularia vaſa deſinunt. Galenus, cumque ſequentiſ ferè omnes Anatomiæ, cornua hæc in muliebri vtero agnoſcant, ſed ſi vterum amamus, ea tantum in brutis conſpiciunt ſunt, timent quidem, & aliquantum attollunt muliebriſ vteri latera, in qua deſinunt eiacularia vaſa, ſed cornuum & proceſſum mammillarium ſpeciem nullam referunt.*

Cornua vteri proſuſ ignorauit Laurentius, nec vnquam vidit, ſunt enim in mulieribus membranofæ apophyſes rotundæ & ſiſtuloſæ, quæ digiti longitudine ad latera ſuperiora vteri emicant, vtrimque vna, quæ Tuba vteri à Fallopio dicitur, & deſcribitur: Innotuit etiam Ruſſo Epheſio, qui eleganter deſcripſit. In brutis cornua iplam vteri cavitatem conſtituunt & amplificanc, & in illiſ Fœtus continentur. At in mulieribus prægnantibus non mutant figuram, molem, & ſitum: Nec quidquam tribuunt vtero amplificando, etiamſi in cornu vteri conceptum Fœtum exemplis præbetur, ſed hoc rarum & inſolens.

### *Cotyledones.*

Quæſt. 12. **C**otyledones ſunt ora vaſorum ad vterum deſinentia, & cum vmbilicalibus lib. 7. *venis cœuntia. At placenta toto ſuo corpore affixa vtero, exſugit ſanguinem ſine coalitu venarum vteri & vmbilicalium vaſorum: ergo nulli ſunt cotyledones apparentes, vt in brutis.*

### *De Cervice vteri.*

Ibidem. **D**um conuiet cervix rugoſa cernitur, ut bene probatum. Imò nunquam conuiet, ſed ſæpe cervix aperta & deducta cernitur. Verè ſcribis in: *frâ, oſculum internum vteri conuiet, dum clauditur, ſed cervix non clauditur, cum ſit ampla & ſpatioſa admodum.*

Ibidem. *Superior, latiorque vteri pars veſicæ fundo incumbens. At quis vnquam vidit, & dixit incumbere vterum veſicæ, cum ipſemet Laurentius ſcripſerit, cap. 11. ſitum eſſe, inter veſicam & rectum inteſtinum, ergo ſubiacec veſicæ vterus.*

Lib. 8. cap. 4. *Matrix nobiliſſima, ac propemodum diuina fruiſla colligit, ſeſequæ contrahit, & vt Arabiſ diſtione vtar, corrugatur, cſtne hæc diſtione Arabica eſt forſan interpretis, ſed nullum authorem nominauit.*

### *Membrana Fœtus.*

Lib. 8. **I**n brutis præterſim cornutis, membranas tres Laurentius obſeruauit, Chorion, Amnion, & Allantoidem. At in humano Fœtu dua tantum reperiuntur membrana, chorion, & amnion. Superiùs tamen, nempe lib. 3. cap. 25. tres agnoſcit, & ſæpe Ourachon perforatum efficit in humano Fœtu, vt vrinam in Allantoidem effundat.

Ibidem. *Chorion membrana tota vtero adheret, venarum & arteriarum vmbilicalium ita vici: in ea conſpiciunt ſunt cotyledones, caruoſa & ſpongioſa ſubſtantia contexti. Paulò*

post addit. Membrana hac, subfœterniculi & mollioris pulvinaris instar, venas omnes & arterias fulciit, sustinetque: In ea cotyledones non sunt, id est, tubercula illa papillis mammarum similia, ut in brutis, sed massa quadam carnea ex infinitis venarum & arteriarum ramusculis mira artificio implicatis, eorum vicem gerit, placentam vocant, recentiores vterinum iecur: hunc illius usum assignat, ut umbilici vasa per chorion numerosa tamernum ferre sparsa, suis suffulciat, eisque pulvinaris instar subiciatur. Hinc multa occurrunt reprehensione digna. In primis, quod chorion vtero adherere putet, venarum & arteriarum umbilicalium interiectu, quibus conspersa est, cum omnes venas, arteriasque umbilicales fulciat, sustineatque. Attramen parietibus vteri tantum hæret per fibrillas, nec recipit venas & arterias umbilicales, quas postea verè describit Laurentius, à placenta pulvinaris instar colligi, comprehendere, & fuleiri. In chorio conspicuos esse cotyledonas scribit, postea negat in chorio extare cotyledonas, sed eorum locum obtinere massam carneam, quæ placenta dicitur.

Deinde quærit, cur acetabula illa chorion vtero sitmiter alligantia non habuit humanus Fœtus: An quia tam numerosam prolem non gerit mulier? an quia quadrupedum vterus magis extuberat, qui nisi validioribus vinculis necleretur, vix Fœtum posset gestare. Vtraque ratio prorsus absurda. Nam animalia cornuta, quæ vicinam gestant Fœtum, cotyledones habent. Reliqua quæ plures edunt Fœtus carent cotyledonibus. Præterea cotyledones cum sint oscula vasorum in vterum desinentium, in quadrupedibus non possunt validioribus vinculis vterum neclere ad Fœtus gestationem. Deberent hæc vincula esse externa, ad neclendum & sustinendum extuberantem vterum.

### Formatio Fœtus.

*Ibidem.* **H**is innixta obvolata seminis interior & nobilior pars, audacius formationem aggreditur. Tum tres ampullas, quasi guttas pellucidæ bullis similes, quas aqua pluvialis suo in flumen illapsa excitat, partium principum rudimenta, & mille filamenta vasorum, & spermaticarum partium velut stamina cernere licet. Verum est in genitura vnius mensis tres bullas, siue vesiculas crystallinas aquæ pellucidæ plenas, mole minoris pisi, contiguas inter se spectari, ab his tres partes principes formari esse verisimile, nisi quis mediam bullam accipiat pro Corde, alias duas contiguas pro auriculis.

In genitura sex dierum descripta ab Hippocrate, lib. de Natura pueri, interna pellucida inclusus liquor pellucebat, ruber erat. & rotundus, in pellicula verò fibra quadam albæ, ac crassa inesse videbantur, cum sanie crassa & rubra obvolutu, circum autem pelliculam foris cruenta vestigia instar fugillatorum, iuxta medium verò tenue quid eminebat, quod mihi umbilicus esse videbatur, & per illum sane spirationem extra & intra primum facere apparebat, quin & pellicula ambiens, ac complectens tota ex illo tendebatur.

In illa descriptione nulla fit mentio trium ampullarum, sed vnius tantum, ex quatuor formari Fœtum neutiquam eredit: Arabum, ac præsertim Auenicæ inuentum est, duas vel tres ampullas existare, ex quibus duæ partes corporis principes Cor & Iecur formari statuunt: & Pareus, siue alius author lib. de generatione, hoc eleganter ad mentem Arabum exponit.

Dicam liberè quid sentiam de tribus istis ampullis. Nuper ab obstetrice mihi oblata fuit genitura vnius mensis, ovo gallinulæ similis, suis membranis obvoluta, quarum exterior tota erat tomentosa, ac veluti fibrosa, principium ac fundamentum placentæ. Hæc discissâ membranâ, intus conspicua erant tres ampullæ, inuicem contiguæ, instar racemuli vix, vesiculis istis aqua pellucida continebatur, & in vna ampulla media cernere erant corpusculum quoddam instar formicæ, & tenuissimum filamentum ab eo productum. Corpusculum istud Fœtum referebat informem & indifferetum, quantum oculis auidissimè miraculum istud spectantibus deprehendere licuit. Filamentum verò rubicundum denotabat umbilicum.

Memini me legisse in Commentariis Carpi supra Mundinum, similem historiam. Videt in vna secundina vnum Fœtum, qui nondum erat perfectus, & ibi erant tres ampullæ, quasi simul se tangentes, ex quibus ampullis & venis, indicant in ista secundina futurum fieri alium Fœtum. Iste tamen Fœtus non fuisset completus hora primi, nisi velimus dicere, quod prius qui erat masculus, fuit primo formatus & completus, ut semen auctores, & quod secundus fuisset femina. Vel possumus etiam dicere, quod interdum natura incipit plures Fœ-

sui, & eos non complet, sicut etiam pullulant arbores plures flores, & tamen non ligant & complent omnes. Ista demonstrant quingentesi scholaribus in vniuersitate Bononiensi commorantibus, quia secundum erat in matrice vniuersi mulieris pregnantis, qua fuit suspensa Bononia, de qua fecit Anatomiam publicam.

Ceterum, corpusculum illud quod vidi in vna ampulla magnitudine formicæ, mihi reuocat in memoriam, quod ab *Aristotele* scriptum legitur, lib. 7. de historia animalium, mas qui quadragesimo die exlerit, si in quoduis aliud immittatur, discinditur, atque aboletur: sed si in aquam frigidam, cogitur, consistitque veluti in membrana, quâ ruptâ Foetus ipse apparet magnitudine formicæ maiusculæ, & membra iam ei discreta, tum cætera omnia, tum genitalia constant. Si Foetus quadragesimo die tórmicæ magnitudinem non superat, quod abiit tota moles seminis vtriusque, maris & f. minzæ: cum ad procreationem membranarum consumpta fuit, cum ex duabus aut tribus guttulis seminis, corpusculum illud formicæ simile constatum fuerit, quod à puncto, siue atomo incepisse probabile est.

Propterea, non inficietur admodum. vt calumniantur nonnulli Philosophi & Medici, scripsit *Aristoteles*, seminis materiam aquiescere, & in spiritum conuerti, nec suum opusculum totam ing. edi, cap. 3. lib. 2. de generatione animalium.

Sed mirari sinit, quomodo *Hippocrates* adeo perspicax & oculatus fuerit, vt in genitura septem dierum, quam scribit, possidere quæcumque corpus habere debet, obseruauit caroniam in aquam coniectam, omnia membra habere, oculorum regiones, & aures, & manus, & manuum digitos, & crura, & pedes, & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum. Attamen *Aristoteles* itam discretionem tantum apparere scribit quadragesimo die, quo tempore formicæ maiusculæ magnitudinem æquat, & in multis excretionibus genitorz quindecim dierum, & vnus mensis, nulla membrorum discretio etiam accuratè intuentibus apparuit. Ac sanè, si verum fateti volumus. conceptionis rudimenta, & Foetus formatio intra primum mensem nobis ignota est, nostræ cogitationes sunt coniectuales, quia nemo naturam inspexit operantem.

### Vrachus.

**Quæst. 17. lib. 2.** F Ateor à fundo vesicæ hominibus, non minùs quàm brutis, ad vmbilicum ferri productionem nerucam, *Ourachon* vocant, quam instat canalis perforatam in Foetibus belluinis obseruamus. In humano Foetu solidam & imperuiam, atque ita gracilem, vt non sit verisimile vrinam per istam portionem nerueam traduci, quæ non est maior in Foetu, quàm in adultis.

Si quæras; quare à fundo vesicæ duabus arteriis interiecta, ad vmbilicum ascendat, dicerem, vt sit discerniculum duarum arteriarum, quas natura non solet inter se iungere sine medio aliquo. Vltra vmbilicum extrinsecus vena vmbilicalis duabus arteriis interponitur. Deinde in sublimi, & in uersa vesica licèt duplicato peritonæo includatur, fundum etiam isto vinculo indigebat in puerulis, quorum peritonæum mollissimum est; & tenerrimum, quod pondere vesicæ lotio plenæ in pueris deuolueretur, & herniam excitaret pueris familiarem, nisi hoc ligamento reuincta vesica suspensa teneretur. In adultis progressu ætatis, arescente illo ligamento, aut disrupto, vt in mulieribus quæ vtero gestant, vesica duplicato peritonæo firmius hæret, nec amplius indiget isto suspensorio ligamento.

At *Laurentius* duas historias profert, quæ demonstrant clausâ ceruicæ vesicæ vrinam per vmbilicum fluxisse, nondum arefacto ouracho, & sua functione antiqua priuato. Sed cùm duplicaturâ peritonæi contineatur vesica, forsan eroso eius fundo duatum ligamentum traducti per duas peritonæi tunicas vrina sequuta est: sic interdum obseruatum in Ascite etiam inter peritonæum & musculos, aquam fuisse collectam, & per vmbilicum excretam, sicutur, vel aquâ, vel sanguine per vmbilicalem venam depletur interdum. Ourachi soliditas sine vlla perforatione à peritissimis Anatomicis ita perfectè demonstrata fuit rationibus, experientia & fideli inspectione confirmata, vt cæcus sit, & valde contentiosus, qui negare voluerit.

**Quæst. 10. lib. 8.** Nominat populus *Cammatas*, qui vixores habent communes, & quifque filium effigie patris agnoscat. Lege *Garamantas*, ex *Pomponio Mela*. *Aristoteles* lib. 2.

*Politiæ*. Barbaros nominat more Græcorum, qui externas omnes nationes barbaras vocabant.

### *Anastomoses vasorum Cordis in Fœtu.*

Cap. 7. **A** Anastomoses vasorum Cordis omnibus huius sæculi Anatomicis fuisse ignobil. 8. *nat*, putat Laurentius: à Galeno autem omnium primo accurate, sed obscure descriptæ. Sed Fallopius nouerat istas Anastomoses, vt videre est in *Observationibus*, quas postea examinauit accuratius, & descripsit Baptista Carianus Medicus & Anatomicus Iustinensis peritissimus, libello edito anno salutis 1574. quo tueretur & demonstrat Galeni opinionem, & in gratiam pulmonum constructas fuisse anastomoses, nec Cor moueri, ac proinde Fœtum non respirare docet, quid supra Carianum Laurentius probauit? Sed his inter præstantissimos Medicos & Professores nostri sæculi, Laurentium, Medicum Mosspelsensem, & Simonem Pierreum, Medicum Parisiensem tota vertitur, in vsu anastomoseon vasorū Cordis, quas vterque ex Gal. probat, qui in ea re dubius & incertus fuit, modò ad motum Cordis constructas esse, modò alendis pulmonibus destinauit. Ac sanè vtriusque opinio probabilis est diuersis temporibus conceptionis, nec tantum rationibus, verum etiam *an-ψ* probari potest: Nam in Fœta circiter bimestri, nondum excauato Corde, ac proinde non micante, nutriendis & amplificandis pulmonibus, atque Cordi inserviunt. Tunc temporis auricula sinistra amplior est dextra, sed vbi excauatum est Cor, & in sinus duos dissectum, tum micare incipit, fungitur officio suo præparandi, & elaborandi sanguinem vitalem, & auricula sinistra sensim exarescens propter vacuitatem crassior, in modum cristæ pulli euadit. Veritatem huius quæstionis pluribus demonstraui in *historia Fœtus*. Hoc vnum me angit, quod pulli Cor tertio ab incubatu die palpitet, nondum excauatum, ergo ratione animæ lentientis in Corde hærentis micat. Quidni Fœtus humani Cor eodem tempore palpitabit, si rationalis anima tertio die infundatur? vt doctè probat *Fiennus*.

### *De situ Fœtus in Vtero.*

Cap. 8. **T** Otus puellus, quasi contractus & conglobatus sedet in vtero, manibus genua apprehendens, inque caput demittit, vt oculi vtrinque manuum pollicibus velut affixi hæreant. Nasus verò inter genua procumbat. Laurentius non ita depingit situm Fœtus in picturis: Quomodo membra Fœtus collocata & disposita sint, deprehendi in Fœtu mulieris quinque menses grauidæ. Nuper in Fœtu quadrimestri aliter disposita exteriora membra vidi: productus conglobatus suis membranarum arcibus comprehensus, propter aquarum effluuium ab octo diebus, habebat tibias decussatim implexas, & sursum reuulsas, vmbilicus supra femur internum, & sinistrum reuolutus, dorsum ascendebat, vt frontem tingeret, caput supra genua demittebat, brachia versus costas & ilia inflexa erant, manusque extensas habebat supra tempora: hæc figura conuolutus & conglobatus rotunditatem globi exactè recrebat. Si picturas *Fabry* ab *Aquapendente* cum picturis *Vesalii*, de situ Fœtus humani comparaueris, proflus differentia animaduertes, nec conuenire huic positioni ab Hippocrate & Aristotele descriptæ.

Ibidem. *De situ pueri dissentientes* Hippocratis locis conciliare putat Laurentius, sed nunquam apud Hippocratem puellum caput habere pedibus proximum reperiet: Quæritur an Fœtus contractus & conglobatus capite suo sublimi respiciat fundum vteri? An verò decliue caput habeat versus inferiores partes. Iudiciū Aristotelis litem dirimit, quod primis mensibus caput superius sit, appetente partu dorsum deducatur, quod est verissimum, quamuis tamen ad latera caput habere possit, si transuersim iaceat, vt sæpius accidit secundum naturam.

Quæst. 32. lib. 8. Nunquam vidi, nec exstare puto in parte interna Ossis pubis processum styloideum, qui iter Fœtui ad Os paranti aditum occludit, quamuis scripserit Laurentius sæpe adesse. Sed lege potius exitum, quàm aditum.



*De Ossium Pubis distractione in pariente.*

Quæst. 33. **S**æpius inculcauit *Laurentius*, Ossâ pubis in partu non diduci ab invicem: Nunc ex professo quæstionem istam agit: Cum uterus, inquit, in ampla coarum capacitate contineatur, & anteriore parte Ossibus pubis, posteriore Ossæ Sacro & coccyge, utrimque verò Ossibus ilium abutatur, quarum alia per synarthrosim, id est, compactam & immobilē articulationem, alia per symphysim, synchondrosi quippe committuntur: An horum Ossium fiat in partu divisio, dubitationē non caret. At Os Sacrum cum Ossibus ilium contingatur tantum ex Galeno, per symphysim ut Ossâ pubis inter se iungantur per eandem symphysim: ergo ibi nulla synarthrosis. Addit *Laurentius* & Ego ut ingennē dicam, quid sentio, si cum Ossibus ilium & pubis Ossâ dearticulâri posse non pnto. Ita enim videntur, ut nullo impetu diselli queant: quod si divisum finem simul passâ fuerint, cum medio copulabuntur, quo glutine videantur, nona enim fieri synchondrosi non potest, si aliquantulum dehisce velis cum Hippocrate, non repugnabit. Verum est Ossâ pubis in partu non dearticulâri, quia non sunt iuncta per articulum, si deducantur eodem glutine ipsis interiecto, nempe cartilagine crassa quæ tunc temporis crassior evadit, videntur sine vlla alia nova synchondrosi, fatetur aliquantulum dehisce cum Hippocrate, & nos id tantum volumus.

Quæst. 33. lib. 2. Kriëit *Pinea* experientiam, in muliere recens enixa, laqueoque suspensa, visa sunt Ossâ pubis ita distracta, ut coarum altera attolleretur, altera deprimeretur. Respondit *Laurentius* se vidisse in ipso enixo multas mulieres extinctas, in quibus nihil tale apparuit. Ergo certò affirmare possem *Laurentium*, nunquam prægnantium, neque puerperarum cadavera inspexisse, quoniam isthæ non tam audacter protulisset. Id verum esse sæpius observavi, & publicè ostendi, atque trecentis discipulis spectantibus demonstravi, anno Domini 1631.

*Thorax.*

Lib. 9. **T**horax Galeno videtur, imò videtur ex Hippocrate dicitur. Galenus in Exegesi videtur in neutro vocat.

Ibidem. In divisione propriarum partium nullum, & carnosarum, omisit mamma.

*Mediastinum.*

Ibidem. **A**n mediastinum sit pars propria continens, vel potiùs contenta, dubitare posset quispiam: crederem potiùs esse contentam, non continentem, ut putat *Laurentius*, quia thoracis ambitu inclusa.

*Mamma.*

Cap. 2. **I**n maribus imperfecta sunt mamma, ex cute scilicet tantum & adipe constata, ad robur contentarum partium, ad ornatum & titillationem. In viris quidem mammosis possunt aliquid conferre ad robur, vel potiùs ad turclam & conservationem partium, nequaquam verò ad titillationem. Mulier quidem cum titillationem percipit in papilla, dum sugendam præber alumno suo, tum pars ea titillatur. suam vero titillationem communicat propter sympathiam, quæ omnia defunt in viris.

Ibidem. Glandosum illud corpus non unicum & continuum est, ut in plerisque animalibus, sed multiplex est, tamen ad papillâ centrum glans una cæteris maior, cui alia parva & amygdalæ à cortice liberatis similes subiacent. Imò glandosum istud corpus continuum est, non vicium, atque ad papillâ centrum glans una cæteris maior apparet. Verum est in isto corpore glandoso continuo, parvas glandulas, non amygdalis, sed nucleis vasorum similes, confertim sparsas, & inseparabiles reperiri.

Ibidem. Sunt venarum & artierarum anfractus varij, ad exquisitam sanguinis elaborationem. Falsum est venas & artieras anfractuose disseminari ad exquisitam non sanguinis, sed lactis elaborationem. debet enim sanguis extra vasa effundi, ut contactu glandosi corporis abscens, in lac convertatur, sunt autem anfractuosi tubuli, qui

lac distribuunt, & deducunt ad papillas, non venæ, nisi valcula omnia membra causa, venas dixeris, quo nomine sinus dicitur meningis indiguitates.

Ibidem. *Nervus maxime conspicuus est costalis procedens.* Costalis nullos nervos suppleat mammis, sed duo vel tres rami ab intercostalibus nervis superioribus struntur ad mammas.

Ibidem. Cur in brutis animantibus mammae in summe fuerint collocatae, haec inter ceteras causas assignat, quod inferior regio catellis alendis aptior est: Non tantum canibus in ventre sitae sunt mammae, sed etiam reliquis animalibus, ut ipse fiat, idemque non tantum catellis alendis, sed etiam reliquis lactentibus animalibus alendis, locus hic aptior.

Ibidem. *Papilla substantia sangosa est Balani instar.* Attamen Balanus glandulosus & subnigricans, quoniam atro sanguine repletus, papillae substantia constituitur, ex cute mammatum dumtaxat amplificata, prolongata, ac veluti contorta.

### Musculi Thoracis.

Cap. 3. **I**n posteriore thoracis parte adest Trapezium omnium primus, extrimusque, deinde lib. 9. *Rhomboidei, & latissimi portio.* Hi omnes externi, & musculi respiratorii sunt, perfrati, prius ergo secandi sunt, & obiter demonstrandi. At ordo dissectionis postulat, ut in suo situ relinquuntur, quia contentae thoracis partes & musculi respiratorii, exceptis duobus serratis manibus pollicis, & sacrolunibo, omnes demonstrari possunt, nec opus est dorsum dissecare, antequam thorax aperiat. Quare manifeste docet *Laurentius*, se nescire dissectionis ordinem, neque situm musculorum.

### Diaphragma.

Cap. 4. **D**iaphragma Hippocrates lib. 1. de morbis mulierum, *ἡρῶν τὸν κοιλῆν, respiratorym ventris vocat, quasi flabellum ventrales hypochondria, ut alibi scripsit Laurentius.* Sed non potest flabellare ventrem, nisi fluxu aut refluxu moveatur, quod impedit firma medullina ad septum transversum adhesio, propterea non potest esse magis respiratorius ventris inferioris, quam superioris: & *ἡρῶν τὸ κοιλῆν*, interpretandum de transpiratu, seu translatione aeris per totum abdomen, vel levi agitatione, dum contrahitur & descendit, in inspiratione dilatatur, & ascendit in expiratione.

Ibidem. *Ad naturalem intestinarum motum peristalticum iuvandum, & ad faciem expirationem, situm transversum obtinuit:* Si naturalis est motus intestinarum peristalticus, hunc non potest iuvare Diaphragma, nisi in violenta & coacta inspiratione deprimatur: Adde quod nullum intestinum tangit nisi colon, sinistro hypochondrio inclucatum, iuxta Diaphragma, faeces autem comprimit non suo corpore, sed compellendo intestinum colum, atque compellendo ventriculum & iocur, quae compulsa vicinum colum comprimunt.

Ibidem. *Plinius hunc acceptum refert subtilitatem mentis, & in eo praeipuum hilaritatis sedem locat, &c.* Quod deprompit ex *Aristotele*, quem citare debes, si tibi adco notus sit, ut eum continenter laceas.

Ibid. *Diaphragma tenditur in expiratione, laxatur in inspiratione.* Sed cum Diaphragma sit libera respirationis instrumentum, respirationis vero duae sint partes, inspiratio & expiratio, inspiratio prior est expiratione, quia primum trahitur aer, quam eius fuligo excludatur: quinetiam ex *Aristotelis* doctrina, oportet primam esse inspirationem, quia vita cessat expiratione, videturque Natura comparasse thoracem ad inspirationem, quae consimilis est musculorum contractioni, ut expiratio relaxationi, quae motus est per accedens, ex *Galeno*.

Propterea vetisimile est Diaphragma potius tendi, & contrahi in inspiratione, quam in expiratione: Deinde si inflammatum Diaphragma sursum contrahitur, secumque peritonaeum adducit, cum peritonaeo retrahantur hypochondria, Hepar, Lien, Ventriculus, visceraque omnia, hinc hypochondriorum introrsum reuulsio: necessum est istam Diaphragmatis contractionem fieri in inspiratione: dum enim *Laurentius* contractum putat Diaphragma, quia *superne reuulsio & concavum, quae figura deprehenditur in mortuis*, quia vita cessat expiratione, non potest esse contractio Diaphragmatis, sed potius relaxatio naturalis Diaphragmatis, superne reuulsio &

suspensi ope mediastini: nisi enim ex concauo in inspiratione, accederet ad rectam lineam & figuram, non posset tanquam manibus intestina premere, ad siccum expulsionem, quem vsum illi tribuit Laurentius.

Ibidem. *Cor inflammatio Diaphragmati phrenitis superueniat, duplicem causam agnoscit* Laurentius, connexionem scilicet & societatem miram utriusque partis, dein perpetuum Diaphragmatis motum, societatem per nervos insignes sit, continuum vero & validus septi motus fumidos vapores impetu ad Cerebrum pellit, & veluti manu flabelli instar mittit. At nervi Diaphragmatis, qui in centrum nervum inferuntur, à cervicali medulla inter quartam & quintam vertebra oriuntur: quo modo septi motus continuus transmittere potest fumidos vapores? flabellatione sua, potius refrigeraret, aut per venas, aut tracheam arteriam ascendere debent ad Cerebrum, si per venas & arterias, motus Diaphragmatis veluti manu, flabelli instar non transmittet.

Ego malim causam istius phrenitidis à Diaphragmate inflammato, referre ad inflammationem pericardij ipsiusque Cordis, quod non potest non esse particeps illius inflammationis proximæ:

*Sic tua res agitur paries cum proximus ardet.*

### Pleura.

Cap. 5. **P**leura substantia non differt à peritonæo, tenuis enim est, sed firmissima & robusta: nacta plurimum. At tamen differt substantia pleuræ à peritonæo, quia ubique duplici constat membrana peritonæum, pleuræ membrana simplex est, non omni ex parte manifestè duplex, ut opinatur Laurentius, nisi recurrat ad duplicitatem membranarum omnium, etiam pia matris, quam duas diuidi potest, si credatur Laurentio.

Ibidem. Impedit pleura, dum pulmo mouetur, ne costarum spatia sese insinuet. Musculi duo intercostales spatia costarum interiecit, id impedire poterant sine pleura, sed necessaria erat, ut vasa per spatia costarum currentia contingeret.

Ibidem. Si pleura omni ex parte duplex est, ubi ad mediam ferè thoracis partem pervenit, hinc inae duplicatur, ergo mediastinum quadruplici constabit tunica, quia nihil est aliud, quam reduplicatio pleuræ, quam facit duplicem, utrinque simplicem.

### Mediastinum.

Ibidem. **H**uius intersepsi vsum primum esse credit, tam ad viscerum suspensionem, ne in latera & posteriorem partem collabantur, tum ad vasa firmanda, susciendaque. Quomodo suspendat mediastinum viscera, protius ignorat, nec enim explicat, an sint viscera thoracis, an ventris inferioris. Si pulmones suspendit, potest ne impedire, ne in latera & posteriorem partem collabantur, quia pulmones totam cavitatem thoracis implent, nullaque pars est thoracis, quam non attingant, sed mediastinum non suspendit pulmones, qui suspensionem suam habent ab aspera arteria, & connexione ad posteriorem partem sterni, & costarum iuxta claviculam: Mediastinum itaque in homine sublimi, affixum centro nervo Diaphragmatis, supernò reuellit Diaphragma, ac proinde suspendit viscera nutritia, Hepar, Ventriculum, sed potissimum suspensum tenet in medio thorace Cor, tanquam ponderibus suis libratum, dum pericardium intra suam cavitatem ipsum sumiter comprehendit, sic epim Cor, nec in latera, nec in posteriorem partem collabitur, sed mediastinum non potest vasa firmare & fulcire, quia vena Cava, & aorta incubant dorso.

Cap. 6. lib. 9. In enumeratione partium contentarum omisit nervos recurrentes, & asaphagum, de quibus mentionem fecerat, cap. 1. lib. 9.

### Vena Cava.

Cap. 7. **V**ena Cava ex gibbis Hepatis emergit. Imò potius ex simis Hepatis, cum ei lib. 9. sit subdita, vel potius ex capite & fastigio capitis, subtus tamè exsurgit.

Ibidem. Vena azygos communicat cum adiposa & emulgentie per ramulum exiguum. At non potest cum utraque simul communicare, neque enim suam insertionem biudam habet, semper infra emulgentem, in truncum venæ Cavae inferitur.

Ibidem. Non sunt autem mera nuda, quæ sunt in principio azygos valvula, non fan-

guinis refluxum impediētes, vt putat *Amatus Lusitanus*, sed affatim irruenti sanguini obfistentes, de quibus fusiū egimus alibi.

Cap. 8. lib. 9. *Aorta vniū arteriam, rarò duas Cordi suppeditat.*

### Pericardium.

Cap. 9. **I**N pericardio humorem sero & vrina persimilem *Natura coniecit, ne Cor ab lib. 9.* perennes motus assu incanderet, tam vt in coctelut innatans Cor, minus grane esset animalanti. At multi dubitant: *An aqua in viuente animali intra pericardium reperiatur?* Certum est paucam illuc adfisse in bene sano homine, cui non potest Cor innatare, vt Foetus in aquis vteri, nec propter illam aquam Cor leuius existit.

Ibidem. *Oritur hac tunica à vasorum quatuor, nempe vna Cane, vena arteriosa, arteria magna, & arteria venosa membranis.* At cum illorum vasorum membranz sine prorsus dissimiles, quomodo possunt producere membranam vniformem, similisque substantiæ: propterea huiusmodi vasa liberari possunt à pericardio, nec vasa ista inclusa pericardio communem habent tunicam à pleura, quia venæ Cane truncus ascendens perforato Diaphragmate, sese inlinpat in pericardium, reliqua vasa à Corde oriuntur, intra pericardium concluso, ergo destituuntur quandiu latent intra pericardium, membrana comuni. Itaque satis est dicere, pericardium arri à pleura, cuius duplicaturâ continetur.

Ibidem. *Situm eundem quum Cor obtinet, eius enim basis medium exquirit occupat, mucro autem in sinistram latius magis inclinat, quinetiam Diaphragmatis neruæ circulo validè alligatur.* Non potest definiti mucro, neque basis in pericardio, quia figuram habet à Corde, si mucro pericardij centrò Diaphragmatis adhæret, ergo Cordis mucro ad idem Diaphragmatis centrum deducetur: atque Cor feriet suo mucrone centrum istud nerueum Diaphragmatis, quod videtur innuere *Laurentius*, quæst. 3. lib. 9. Dum fuit opinioni cuiusdam Medici Hispani, *Barcinonensis Rosselli*, scribit, Cordis enim mucro ad eam usque pectoris partem peringit, in quam septum transversum inferitur: pulsas ergo pectus Cor non mucrone, sed sinistra ventriculo distendit. Ego verò semper existimaui Cor cono suo, siue mucrone ferire centrum Diaphragmatis, quia resupino & inuerso corpore, circa cartilaginem xiphoidem appressa manu, ibi micare Cor deprehenditur, sed sinistro ventriculo simul cum aorta eminente tangit pectus versus mammillam sinistram, ideoque Cor obliquè subiliens, basi ventriculi sinistri cum aorta ferit pectus, & cono centrum Diaphragmatis eodem instanti, sic prolongauit & extensum.

*Nescio quomodo Laurentius in secunda editione sui libri Anatomici, mutatis consiliū de motu Cordis, in percussione pectoris, quia mucrone suo in systole ferit pectus, vt antea scripserat, sed monitus ab Hispano Rossello mutauit sententiam, & in diastole pectus diuerberare statuit. Epistola Rosselli legitur ad finem Commentationum in libros Galeni, de differentiis & causis morborum..* Si vera est hæc sententia, necessum est Cor in latius dextrum inclinatum habere ventriculum sinistram superiorem dextrò, & pectus respicere: hoc posito, basis & mucro non accedunt ad iuicem per Cordis abbreviationem, vt latius euadat, quàm longiùs, quia tum recedit à pectore basis, sed oportet, vt Cor sine sua abbreviatione infletur & intumescat instar folliis, atque larere sinistro distento, & sublato feriat pectus, dum constringitur, vt expellat mucrone suo vergente versus septum, & feriat centrum nerueum Diaphragmatis.

Hæc opinio sic explicata clarior est, quàm fuit propolita à *Laurentio*, qui non intellexit istum motum, nec unquam vidit in animalibus viventibus, adinuicem manum alteram pectori, alteram corpore, utrobique consimilem istam eodem tempore, quia bruta animalia carent capto. Absurda sequens ratio. Idus arteriarum est in fine dilatationis, ergo idus ille Cordis finis erit dilatationis, non contractionis.

Certum est motus arteriarum sequi motus Cordis, sed alternatiu: Nec enim Cor & arteria eodem instanti simul & semel moventur. Non considerauit Cor, & arterias diuersis temporibus excipere & expellere, ac proinde pares motus eodem instanti non possunt fieri in Corde & arteria. *Rossellus* est valde obscurus in explicanda sua opinione, nec clariùs expressit *Laurentius*, vterque non intelligit quod scribit.

Ibidem. *Vt probet Laurentius aquam intra pericardium contineri, exemplum profert sicæ Scripturæ, dum miles lancæ Christi Saluatoris nostri latus aperuit, exiit illud*

*sanguis & aqua.* Sed cum istud effluuium aquæ fuerit miraculosum, confessione omnium Theologorum, & Medicorum, etiam Lutheranorum, ut videre est in orationibus Melancthonis, insipicras est huius profluuij causam naturalem querere.

Cap. 10. lib. 9. *Mucronem Cordis* Hippocrates, libro de *Corde*, sic vocat, fortasse legendum *niegei*, aut *niegi*. Quod primus emendauit *Paësius* in *Oeconomia Hippocrati*, vnde mutuatus est *Laurentius*, suppresso nomine Auctoris.

*Ibidem.* Debit in aliterutrum latus inclinare *Cor*, non rectè ferri, ne *Diaphragmati* *præmatio* respirationis argano, & perennis motu agitata esset impedimento. Falsalunt ista omnia: Nam dicit *Cor* ratione *basis*, medium locum occupare, reliquum *Cordis corpus* turbinate mucrone scissum in anteriora, & sinistrum latus infra *laeuam papillam* exporrigitur. Ergo non potest in aliterutrum latus inclinare, sed rectè feretur, siue mucrone anteriora pectoris pulset, siue eodem centrum *diaphragmatis* percutiatur, cum mucro sit oppositus *basi*, quæ medium locum occupat: At centrum neruorum *diaphragmatis* respicit *mediam* cauitatem thoracis, & mucro feriendo centrum *Diaphragmatis* directè oppositus erit *basi*, quæ sita est in medio thorace.

*Ibidem.* *Cor* neruus accipit a sexta coniugatione exiles admodum: quid enim illa neruorum cohorte quam *subrinas* Fallopius, opus habet, cum eius motus animalis non sit, sed naturalis? Sed ista neruorum cohors plexum illum neruorum constituit, similem huic plexui neruorum ventris inferioris, qui duobus renibus interiectus est: at plexus ille neruorum in thorace, non solum propter *Cor*, sed ratione *Oesophagi* pulmonum, & aliarum partium extructus est, vnde depromuntur nerui, qui singulis partibus distribuuntur.

Cap. 11. lib. 9. *Cor* natura venam arteriosam, & arteriam venosam construxerit, hanc rationem præfert, quod pulmo per se motus sit expertus, & ad thoracis motum dependatur, debuit ergo illius arteria mollis & lauis effingi, ut inspirantibus nobis, celerius aërem hauriat, & expirantibus fumidos vapores expellat. Artamen dixit, quæst. 21. lib. 9. ad motum pulmonis non moueri venam arteriosam, & arteriam venosam, an osculis suis, vel per teneritudinem substantiæ aërem hauriat, non exponit. Nam crassa arteria, æquè ac tenuis arteriæ substantiâ, suis osculis excepiſſet aërem. Ac cap. 12. lib. 9. caire arteria venosa oscula cum osculis aspera arteria scribit, ut aëri & vaporibus fumidis liber quidem pateat ingressus, existimæ: venam autem dicit esse crassissimam & arteriosam, ne tenuissimus sanguis in ea conueniens ad visceris rarissimi & spongiosi nutritum vaneſceret. Ar sanguis iste cum sit crassior eo, qui continetur in arteria venosa, non potest tam citò vaneſcere, ac spirituosus qui per arteriam venosam tenuem defertur, propterea Collado merito hanc partem cægitat, pag. 252.

Quæst. 16. lib. 9. *Quomodo sit accipiendus triplex iste sinus in Corde* ab Aristotele constitutus, pluribus alibi demonstravi, in mea *Anthropographia*: Ista non reperam.

Quæst. 18. lib. 9. *In diastole corrugantur & contrahuntur Cordis extrema, basis quippe ad mucronem, & mucro ad basim rapitur.* Nunc aliter motum Cordis, quam supra describit, ex opinione *Rafelli*, atque lib. 9. c. 10. scribit in figura conoidæ fibras Cordis perpetuò morus principium habere immobile, cui innectuntur mucronem scilicet *Cor* in diastole ferire pectus scribit, contra doctrinam *Vesalii*, & aliorum Anatomicorum, ut & arteriam sequi motum Cordis eodem instanti, simul dilatari & contrahi cum Corde, quod est falsum.

### Pulmo.

Cap. 13. lib. 9. *Pulmo liber est omnino à connexu, ut liberius moueri possit.* Imò connectitur supernè superioribus collis, & sternò prope clauiculas, sæpius fibrularum interuentu collis, & interdum *Diaphragmati* adhæret, sine vlla spirandi difficultate.

*Ibidem.* *Pulmo suspenditur vasorum, & aspera arteria interiecta.* Imò ab aspera arteria sola suspenditur, sine vasorum vllò adminiculo, quæ potius augeri ipsius pulmonis pondus.

*Ibidem.* *Pulmonem in lobos scissum fuisse statuit, ne cum dorsi fleximus, comprimatur, disrumpatur, fatisceret eisdem caro.* At dorsum non flexitur, propter oppositas costarum iunctas sternò, sed omnis flexio spinæ est in lumbis.

Ibidem. *Tunicam pulmonum attingunt parvi nervuli, à sexta coniugatione cæcæ, nulli autem in pulmonum substantiam diffeminantur. Imo quamplures nervos à plexu illo nervorum derivatos, spargi per substantiam pulmonum deprehenditur.*

*Quæst. 24. lib. 9.* An arteria venosa eodem motu agitetur, quo arteriæ, meritò queritur, cum sit simplici tunica prædita instar venæ, cum etiam triplici officio fungatur, vehendi sanguinem arteriosum, ærem traducendi, & fuligines reuehendi. *Laurentius non putat moveri, quia à dextro potius sinu oritur, & vena Cava propago est, sed si sanguinem arteriosum defert, quidni eodem motu agitabitur, quo reliquæ arteriæ?*

Propterea non probo, quod scribit *Laurentius*, de eius arteriæ motu, *moneri quidem ad motum Cordis, sed non eodem motu, nec eadem vi, qua agitantur arteria, quia si pulsas, & vehis sanguinem arteriosum, non potest non agitari eodem momento, & motu quo reliquæ arteriæ. Nec experimentum illud Galeni de inflatione bronchiorum, sine inflatione venæ arteriosæ, & arteriæ venosæ, non probat quod intendit *Laurentius*, sed tantum ea vasa non communicare cum aspera artetia.*

### Trachea Arteria.

*Cap. 14. lib. 9.* Inter annulos cartilagineos aspera arteriæ, interiecta sunt membranae, subtilissimæ quidem omnino exsangues, in homine, quod nemo adhuc observavit, musculosæ, ut videntur cartilagineum spatium implere musculi perexiguus, sese in modum X interfecantes, non se ut ac intercostales. Ridicula est hæc observatio, nam membranula hæc interiecta æquè rubet in brutis, ac in homine, nec musculosæ dici potest, quia cartilagineis illæ non moventur adductione & abductione, instar costarum.

### Larynx.

*Cap. 15. lib. 9.* Quæ sunt in hoc capite, de Larynge, animadversione digna, iam notata fuere suprâ, in tractatu de Cartilaginibus.

### Glottis.

*Cap. 16. lib. 9.* Inter ligulam & epiglottidam, sicut apparent membranae à veteribus non descriptæ, quæ aeris sunt conceptacula. Sed sinus isti à veteribus fuere observati, præsertim à *Galeno*, lib. de Vocalium instrumentorum dissectione, & vocem dicuntur, male describuntur à *Laurentio*, cavitates, accumbunt enim lateribus glottidis, nec sunt aeris conceptacula, sed liquidioris aut solidioris alimenti receptacula, si quid deerraverit in asperam arteriam, ne præcipiti lapsu descendat in pulmones.

### Oesophagus.

*Cap. 17. lib. 9.* Verum est Oesophagum venas habere à Cava, sed non à coronaria ventriculi, quæ non penetrat Diaphragma, nec ad eum locum intra thoracem ascendit.

Ibidem. Oesophagum musculos habere dicit scribit, quæ à lateribus cartilaginis sinuiformis orti in mediam eius partem, luncâ albâ discretam inseruntur. Sed vnicus adest musculus dictus Oesophagus, qui tamen referendus ad fauces, sive Pharyngem, nec pertinet ad Oesophagum.

### De Pericranio.

*Lib. 10. cap. 3.* Non agnoscit in cranio duas membranas diversas, pericranium scilicet, & periosseum, ut plerique solent. Attamen duplex deprehenditur membrana, una crassior dicta *desquame*, quæ faciliè reuellit, altera immediatè Ossi affixa, ut in aliis Ossibus, quæ non nisi crassa detrahi potest, & ille sui immemor, admissit periosseum, tractatu de musculis, cum agit de temporali.

Ibidem. Nasci pericranium à crassa meningi, videbis in capite infantuli recens ediri, cum sunt Ossa cranij adhuc hiulea, nullis futuris inuicem conferta: tandem progressu ætatis, ubi Ossa ferratili modo arctè committuntur, continuatio hæc ab-

ſcinditur, remanente connexione interna duræ meningis ad ſuturas: ideoque non pericranij intercutis in adultis, dura meningis cranio ſuſpēditur, ut putat Laurentius.

### *Sinus, ſive ſanguiductus extimi Cerebri.*

Cap. 7. **N** Vllus in cranio extat ſinus, nulla cauitas, quam craſſa mening non impleat. At certum eſt non penetrare Sinus, ſolas cauitates internas cranij, quæ ſolæ dicuntur, replet & obliniit, ſed vnica eſt, non duplex, neque diuidua, vt peritonæum.

Ibidem. *Inguſares internæ ſinus, ſive ſanguiductus ingreditur, ut ſanguinem coſpiſſimum effundant.* Imò venæ in principio ſinuum lateralium terminantur, nec ingreditur, & verè ſcripſit ſein ſinuum cauitate, nunquam venas obſeruaffe. Explicatio valde obſcura, quamuis ex *Dureto* deprompta in *Coactis*. Cur ſola frons dicatur contineri, niſi accipiat frons pto anteriore parte cerebri, alioquin ſi de Oſſe caluarie interpreteris, non poteſt contineri.

Ibidem. *Quartus ſinus inter cerebrum & cerebellum delatus clunibus cerebri ſini: ut* Spatium quidem nodi in clunibus, ſive natibus eminenſis, ſed in proceſſu vermiformi terminatur, & inde magna vena, per ventriculos anteriores, tam ſuſum, quàm deorſum diffunditur, conſtituitque plexum choroidem, vt ſanguinem diſtribuat partibus inferioribus cerebri.

### *Cerebrum.*

Cap. 10. **V**lt Laurentius cum Galeno tot meandris interitum, tot anfractibus implexum cerebrum, vt choroides membrana nutrenda cerebro dicata, & vaſorum arum ſuſtinentulum, ſe in penitiores cerebri dultus inſinaret. Verum eſt anfractuolum extrinſecus fuiſſe cerebrum, ad ſecuritatem vaſorum, quæ diſtribuantur per anfractus, quæ colligat & coniungit ſuperiecta, & immediatè obuoluens cerebrum choroides membrana, ideoque anfractus cerebri, non propter choroidem facti fuere, neque hæc membrana nutriendo cerebro dicata eſt.

Ibidem. *Plexus in ſuperioribus ventriculis ſit, qui choroides nominantur, ſint venularum & arteriolarum ſextus labyrinthi, perſennis membranz ſuſum aſcendentis, portunculum excurrentes, in quibus excoquuntur, attenuatur & præparatur animalis ſpiritus:* Sed plexus choroides anteriorum ventriculorum Cerebri, à ſola vena magna quæ prodit à quarto ſinu, manare obſeruat: nec diſſiteor à parte inferiore Cerebri ſuſum alium plexum arteriolarum aſcendere, ſed in illo plexu venularum & arteriolarum ſpiritus animalis conſtati non poteſt, cùm ex ſolo ſpiritu arteriarum perficiatur, ex plexu mirabili procedunt.

Ibidem. *Cum ſint grauiſſimi funiculi, aut nerui odoratus, qui ſeruantur ad Oſſa ethmoidea:* Non poſſunt Cerebri mucosam illuniem exonerare, ut putat Laurentius.

Ibidem. *Sub ventriculis anterioribus duos ſtatim ſinus, melius ventriculos, Arantius, Hippocampi. ſeu bombycini vermis effigiem referre vult.* Non capit mentem Arantij, fatetur quidem proceſſus quorſdam pedibus hippocampi ſimiles anterioribus ventriculis, ad inferiores prorepere, illoſque pedes hippocampi eſſe portiones, ſeu pedes corporis pſalloides vulgò demonſtrati, qui quidem pedes cùm deorſum excurrant, in cauitates ſuperioribus ſubiectas, iſtas cauitates propter progreſſum illorum pedum, ventriculos hippocampi Arantius appellauit. Cæterum corpus pſalloides non tribus columnis conſtat, ſed concameratum, ſive fornicatum teſtæ anteriorum ventriculorum Cerebri ſignificat, apud Galenum.

Ibidem. *Tertius ventriculus continetur inter duas magnas eminentias, quæ Thalamus nervorum Opticorum dicuntur, & cùm ſit ſciſſura eiſmodi duorum tuberculorum, videtur potius eſſe principium canalis, qui ab interioribus ventriculis deducitur ad quartum ventriculum, latitantem intra cerebellum.*

Ibidem. *Non admittit Laurentius rete mirabile, quod ad latera apophyſon elimoidon apparet, manente cum Neoterico choroidem plexum, qui in ſuperioribus ventriculis cernitur, rete mirabile appellari.* Attamen Plexus choroides ſuperiorum ventriculorum totus ex venis contextus eſt: Rete mirabile, ad baſim Cerebri locatum, ex arteriis conſtat, &



& reuera existit, & obseruatur ab Anatomicis peritissimis, & oculatissimis, & soleo demonstrare.

Ibidem. *Quartus tandem occurrit sinus, cerebello & spinali medulla communis, omnium minimus, & solidissimus. Imò multò maior, & amplior est tertio ventriculo, qui pro canali deberet accipi.*

Ibidem. *Quartus hic ventriculus primum amplius, sensim arctatur, donec in acumen desinat ad iustar calami scriptorij, unde Calamum appellant Hicrophilus. Ignorat, quid sit scissura calami scriptorij, hæc exarata est in ea portione spinæ, quæ sit ex radicibus duabus Cerebri ad rachim descendentibus: falsum autem est ab ea scissura quartum hunc ventriculum ab Herophilo appellari calamum scriptorium.*

Cap. 11. lib. 10. *Processus vermiformes duo sunt, eorum alter anterior, meatum à tertio ad quartum sinum apertum retinet, alter posteriori parti spinalis medullæ incumbit, & versus quartum sinum reflectitur, quem apertum conseruat. Si anterior processus ingressum quarti ventriculi apertum retinet, alter posterior non apertum, sed clausum conseruare debet quartum sinum: alioquin spiritus in quarto ventriculo tanquam cisterna reconditi & coactuati, per posteriores vanescerent, aperti & laxatis repagulis.*

Cap. 12. lib. 10. *A medulla p. nali intra Cerebrum processus mammillares oriri putat, secus à Cerebro prodire, facile est ostendere in Anatome cadaueris.*

### Vsus Cerebri.

Quæst. 4. **N**on est adeo ridicula Aristotelis opinio de usu Cerebri ad Cordis refrigerium, quin possit rationibus & experientia probari, sed cùm istud negotium confecerit *Casparus Hofmannus*, ad cùm remitto Lectorem, qui mentem Aristotelis scire desiderat, & in *Anthropographia mea* mentem Philosophi declaravi. Sed adhuc addicio, p. circulationem sanguinis è sinu longitudinali refluens in iugulares venas, vt ad Cor redeat, ipsum maximè refrigerari. Nam cùm sit Cerebrum, *Metropolis frigidi & glutinosi*, siue pituitæ, ipsa permixta sanguini refluat ad Cor: adde quod serum tenue destillat, noctu diuque è Cerebro, fauces irrigans, exceptum tonsillis, à quibus sensim perlabitur in pulmones ad Cordis & pulmonum refrigerium. Ac serum illud, vt & pituita sunt frigidissima, sicque Cerebrum impossibile est collo, siue fistulæ pulmonariæ, vt pulmo stillans è Cerebro recipiat serum, præter illud quod sanguis ad Cor rediens suppeditat: ideoque pituita raro febribus tentantur, & diuissimè viuunt.

### Motus Cerebri.

Quæst. 9. **N**on est dubitandum de motu Cerebri, à propria & insita facultate naturali, lib. 10. *dum aerem trahit, & exatit inspirando, fumos eiiciendo expirando, id est, dilatatur & attollitur, aerem attrahendo, contrahitur & depressitur fumos eiiciendo, quod non tantum rationibus probari potest, verametsam experientia in animalibus viuentibus, magna crany adempta portione, & in hominibus id sæpius obseruatum. Ac sanè credo ratione ventriculorum, qui continent spiritus animales, Cerebrum attolli & deprimi, non continuo motu & regulari, instar Cordis, sed ex intervallis longioribus, vbi necessitas adest sese attollendi vel deprimendi: ad hanc actionem faciliorem suspensa est, ac veluti reuulsa moles Cerebri, ventriculis superiecta, interuentu crassæ meningis, profundè insinuatæ, & discriminantis Cerebrum in duas partes. Qui verò motus spectatur in dura meninge innumeris arteriis conspersa, & palpitante, dependet ab istis arteriis agitatis, & mouentibus istam tunicam, non à Cerebri agitatione siue pulsatione.*

Quæst. 12. lib. 10. *Perum est, aquæum humorem à glandula pituitaria spongia inflare exceptum per cunei foramina pedetentim in palatum & Os exillare, ut nunc scribit: Cùm tamen alibi prodiderit pituitam per cribrosam tabulam sphenoidis transcolari, in sinubus eiusdem Ossis asseruari, dein in palatum exillare. Si tertius ventriculus admitterit, falsum est quartum ventriculum omnium esse minimum, & angustissimum, vt struxit. quæst. 14. lib. 10.*

Quæst. 9. lib. 10. *Vermiformis processus, conarium, nates indicant peculiariter esse motum*

# Animaduersiones in Anatomica Laurentij. 681

*Cerebri.* Concedo de processu vermiformi, non conario, & natibus, quæ sunt partes remotæ, & alteri vliu destinaatæ.

## Facies.

Lib. 11. **F**acies partes communes constituit cuticulam, cutim, adipem, membranam carcap. 1. nosam, sed adeps in facie masculis est intertextus, nec potest reuelli instar panniculi, vt in ventre, & thorace, & artubus: deest quoque membrana car-nosa, quæ vt alibi dixi, terminatur in mento, & membrana carnosa siue musculo-sa enaseitur à summo sterno, clauicula & acromio, totum collum cum altera con-genere membrana obuoluit.

## Oculus.

Cap. 4. **O**culus Hebræi *Oogen* dicunt, quod alium denotat. Monuit Collado no-lib. 11. men esse Germanicum, non Hebraicum, neque per geminum oos, sed per diphthongum au scribi debere: at dicitur in linguam Germanicam ferme to-tam ex Hebiza deriuatam, vt ostendit vir doctus Schrieckius.

Cap. 6 lib. 11. *Conuallium oculi tunicam Alexander Benedictus fundam vocat, sed Pollux, quædam, funda dicta fuit: quid sit, non intelligi: Laurentius. Exponit Fœcium in Occumia, postea tamen notat, quod Pollux, quædam dicitur, quasi funda Ale-xandri Benedicti, & quædam Pollucis, essent nomina distincta, ab officio & vsu di-uerſo.*

Ibidem. *Sed male hoc dicitur à diuersitate colorum, nam totus est candida, nuda, album oculi vulgò dicitur.* Inde manifestè cognoscitur Laurentium prorsus ignorare, quid sit iris in oculo, quam non explicauit, nec nomen dici potest coniunctiua, cum ex *Rosso Ephesio, & Polluce, nomen, aliud significet in oculo.*

Ibidem. *Cornea tunica alimentum ab vna sibi proxima mutuatur, quia venulis, arte-rijs & nervis caret.* Crederem potiùs ab adnata, membrana venulis subtus conspexa, suum alimentum depromere.

Ibidem. *Rhagides tunica non dicitur choroides, quod chorij membrana naturalis instat, vasa feri omnium tunicarum suffulciat: Nam nullæ supra eam expansæ spectantur, qua-les sunt in cornea & coniunctiua, quarum vasa non deducit, sed quæ chorij mem-branam Fortis venularum multitudine æmulatur.*

Ibidem. *Alligatur vna posteriori parte optico, reticulari, & fibrosis nexibus cornea ad iridem vsque adheret.* Quomodo potest corneæ adherere, cum sit distincta, ab hu-more aquico interiecto? Spatium quoque inter vnam & corneam exitit spiritus infi-ci plenum. Præterea, quomodo potest ad Iridem vsque peruenire, cum habeat in-terpositam corneam, si iris dicatur coniunctiua, vt putat Laurentius. Nec potest cor-neæ adherere in iridem vsque, si anteriore parte vndique in æquilibrio est, vt eius foramen, & fenestra quæ pupillam constituit, spirituum & luminis affluxu, non di-latari, vt scribit Laurentius, sed constringi debeat.

Ibidem. *Huius tunica anterior pars, quæ aquam & crystallinum respicit, fusca & nigricans, exterior, quæ iridem constituit, nunc carulea, nunc casta pro diuersa Cerebri, & o-culorum temperie apparet.* Quot verba, tot errores. Debebat dicere, interior pars. De-inde scribit anteriorem partem iridem constituere, at suprà dixit iridem appellari coniunctiua, siue circulum coniunctiuæ. Adde quod interior superficiès vne non est variegata & diuersicolor, vt in brutis animantibus, sed nigricans velut attra-mento oblita, quod erratur.

Ibidem. *Primus vna vsus est, vt crystallinum defendat, ne cornea ledatur duritie.* Sed nihil opis adferre potest, cum crystallinus sit immersus vitreo, & circumfusum ha-beat humorem aquicum.

Ibidem. *Secundus vsus est, vt reticulari alimentum surgerat.* At reticularis est tota immersa, & intertexta vitreo humori.

Ibidem. *Quarta Arachnoides amittit crystallinum.* Verum est crystallinum tunicam habere, sed crystalloidis dicitur, non Arachnoidis, quæ eadem est apud antiquos Authores, *Rossum, Pollucem, & Galenum* cum amphiblastroide, quam describit Lau-

ventius, sed quem humorem amplectatur, non exponit, ac proinde eius usum ignorat. cum tamen tribuenda sit vitreo humori.

*Veni nullo habet, sed à ciliari nutritur.* Quid sit ciliare, non exponit, an sit tunica, an ciliare interstitium. Sed notabis ciliare illud, nihil aliud esse, quàm impressiones vuez supra vitreum humorem in circuitu crystallini, quæ referunt cilia palpebrarum.

*Ibidem. Postrema tunica veteribus incognita inuendi vitrea dicitur, quod vitreum humorem omni ex parte ambiat.* Imò cognita fuit *Ruffo & Polluci*, qui istud nomen primi publicarunt. In huius medio ciliare interstitium apparet, cilij figuram referens, istud ciliare interstitium non est in medio huius membranz, sed orbiculatim cingit crystallinum, atque est impressio quædam pupillæ, supra vitreum humorem in circuitu crystallini: nec est processus quidam choroidis, nec aqueum humorem fecerunt à vitreo, ne confundantur, quoniam aqueus non tantum antè collocatur, sed toti vitreo est circumfusus.

*Ibidem. Aranea species retinet, ne diffuset, ut plumbum in speculo.* At si ambit undique crystallinum, tam anteriùs, quàm posteriùs, claudicat hæc comparatio.

*Cap. 7. lib. 11.* Si aqueus humor situs est anteriori parte, vt sit crystallini propugnaculum, si interstitium ciliare humorem aqueum fecerit à vitreo ne confundantur, quomodo vuez interioriorem partem, quæ madore spongiz similis est, irrigare potest albiginos, ne à perpetuo motu exsiccetur?

*Ibidem. Humor aqueus pars est oculi vitæus & spermatica, non excrementum.* Imò iudicatur excrementum, quia deperditus hic humor, reparari potest in puerulis, vt *Galenus*, & alij obseruauerunt, etiam si *Laurentius* scripserit, quod aqueus si efflueret, reparari vix potest.

*Ibidem. Vitreus humor in medio concavus est, vt crystallinum admitteret. Quatenus excipit crystallinum concavus est, quo detractio nulla cavitatis apparet.*

*Ibidem. Quare vitreus humor crystallino alimentum preparat, & vitres tamen substantia non alitur.* Ergo reticularis non potest nutrire, quæ est vitreo intertexta, cui tamen à choroide membrana alimentum suppeditatur, si credimus *Laurentio*: qui in etiam venulas accipit à ciliari interstitio, quod si præparat alimentum, necessum est illud per totam vitrei substantiam diffundi.

*Ibidem. Princeps oculi pars, qua primà visionem edat, tota est glacialis, eadem vitreo humori immergitur, & anteriori parte humorem habet aqueum propugnaculi instar.* Hanc particulam eleganter impugnât *Collado*, pag. 271.

*Cap. 8. lib. 11. Obseruauit Laurentius, ab inferiore & posteriore Cerebri parte prope spinulis medulle exoritur, opticos nervos oriri. Cur non aliunde exoritur habere poterant examinatus, quæst. 8. lib. 11.* Attamen ex inspectione & sectione accurata Cerebri discimus, ex cavitatibus anteriorum ventriculorum Cerebri enasci, reuolutos supra maiores illas eminentias, quæ thalami neruorum opticorum dicuntur à *Galeno*.

### Auris.

*Cap. 13. lib. 11.* **A**ristoteles meatum secundum auris post membranam, cochleam vocat, alij *Apelamus*. Sed *Aristoteles* meatum auris internæ instar cochleæ tortuosum esse scripsit, sed non distinxit in diuersos meatus cavitatem internam auris, vt secundum potiùs meatum, quàm postremum dixerit, omnes *Anatomici* recentiores, *Eustachius*, *Valerius*, & *Arantius*, quartam auris cavitatem à partibus externis ad internas penetrando, cochleam appellant, & rectè postea *Laurentius* monet postremam cavitatem trochleam dici.

*Ibidem. Ad delatationem speciei sonora, foramina duo exigua, quasi fenestella dicata sunt, superior fenestella ovalis dicitur, inferior nomine caret, eadem ad aëris vernaculi expurgationem canaliculum construxit Natura, qui ad palatum fertur, datus hic cartilagineus est, & quandam pelliculam habet valvula instar, vt ab aëre in Os recrementis expurgandis pateat aditus, non autem recurat in aurem eadem illumies. Alium huius canaliculi usum agnoscunt quidam, vt insus, & congenitus aer, non per Os inspirati appulsu reuertitur. Sed ignorat *Laurentius*, quid sit fenestella ovalis, nam eam separat à tertia cavitatē,*

quæ *Labyrinthus* dicitur, est enim fenestra onalis aditus ad labyrinthum, & basi ossiculi stapedis clauditur.

Canaliculus, qui ab ore ad fauces excurrit iuxta latera interna apophyseos pterygoidis, non est cartilagineus, sed intus Ossa deductus & exculptus, nec habet quandam pelliculam valvulæ instar prætensam, & est *Fallopæ aqueductus*. Huius canaliculi plures usus proficit *Laurentius*, ad æris vernaculi expurgationem, ad lordes aurium expurgandas, ad attractionem novi æris. Sed vernaculus & insitus ær intus autem, est nec adeo impurus, ut expurgari debeat: si insitus & congenitus, non debet externi impuri æris appulsu reparari & recreari.

Quæst. 11. lib. 11. *Mirabilem aurium & vocalium organorum sympathiam refert ad nervum auditorium & canaliculum. Nervus quintæ coniugationis varios de se promit furculos, maior in aurum & membranam exquisitissimi sensus expanditur, minor ad linguam & laryngem excurrit, quæ cum septima coniugatione implicatur: Idcirco surdi ferè omnes muti, aut saltem ægrè loquuntur, afflicto nervo auditorio: Altera huius societatis causa fit per canaliculum cartilagineum velut aqueductum. Verum est aures communicare cum vocalibus organis per nervum & canaliculum, sed quomodo traducatur hic nervus auditorius, & deficiat in fauces non exponit. Ac hanc canaliculus exstructus fuit, ad traductionem portiois nervi auditorij.*

### Nares.

Cap. 15. *Cerebri mucosa illuvies stillat per tubercula mammarum papillis similissima lib. 11. in Ossa cerebriformia & nares. At iam sæpius dictum est; secundum ductum processum mammillarium deduci posse mucosam illuviem Cerebri, sed non excipitur ab istis processibus, qui mammarum ritu nullo modo protuberant, ut sapius dixit Laurentius.*

Ibidem. Intra nares continentur Ossa fungosa, spongia aut pumicis instar, in quibus verisimile est inspiratum cum odoribus aerem alterari, ut in auris cochlea & labyrintho, aer præparetur uditarius. At quomodo Ossa possunt alterare spiritum, nisi carnes spongiosæ istorum Ossium cavitatibus includerentur, quæ stilantem per nares illuviem ebibunt? Sed falsum est in auris cochlea & labyrintho aerem præparari auditorium. Nam auris cochlea postrema est cavitatis, labyrinthus tertia, & ær auditorius ibi conclusus, est insitus & congenitus, ideoque non indiget ista præparatione, à spiritu Cerebri potius reparatur, quam ab ære externo.

Quæst. 12. lib. 11. Quando Aristoteles in summis maribus operculum, inspirantibus nobis patens, cessante inspiratione concidens constituit, intelligit processus mammillares ritu mammarum protuberantes. & incumbentes tabulæ cribrosæ Ossis ethmoidis, quales viderat in brutis animalibus. ideoque in homine reperiri iudicavit, & cum in genere, de partibus animalium ager, earumque usu & actione, illud operculum ad summas nares situm esse iudicavit in animalibus.

### Lingua.

Cap. 18. *V* Trimque ad linguam excavaiones *zenon* & *sigmen* dicuntur à Laurentio: quod ex Polluce depromptum, sed excavaiones illæ sunt intra duplicatam ligamentorum, quæ à Gargareone ad tonsillas producuntur, ipsæque tonsillæ his ligamentis comprehensæ, multis sunt foraminibus pertusæ & excavatæ.

### Vasa artium.

Lib. 12. *R* Amius vena cephalica, qui inter parvum digitum & annularem desinit sub cap. 2. *Wastellam* constituens, non est magis conspicuus aliis inter spatia reliquorum digitorum deductis, proptereaque secari possunt omnes à pollice usque ad minimum digitum, pro saluarella.

Cap. 9. lib. 12. Errant in venis & nervis cruris & pedis, sed cum errores isti castigati fuerint, lib. 4. nil amplius addam, atque hic terminus hærebit.

Quamvis Galenus neminem propter solacisimos iuste reprehendi moneat, modò

et ipsam perfectè describat, præstat enim linguâ quàm vitâ solæcismos barbarissimosque committere, quinetiam libellam aliquando scripsit contra eos, qui in solæcizantes voce & scripto inuehantur, tantum abest, vt ignorantiz partem aliquam solæcismos esse putet, lib. 6. de ordine, atque lib. de libris propriis. Idem confirmat monens se libram composuisse contra eos, qui omnem calumniandi occasionem ex verbis aucupantur. Congrua tamen dictio & eloquutio magis placet quàm incongrua. Propterea, si in libris *Laurentij*, qui eleganti stylo sunt scripti, sermonis improprietas, aut solæcismi reperiuntur, id tribuendum Typothesi, vel eorum correctoribus, nequaquam enim ab eruditione summa viri præstantissimi proficiuntur, cum ei per aulicas occupationes non lieuerit correctioni sui libri assidue vacare.

## F I N I S.





# ANIMADVERSIONES IN THEATRUM ANATOMICVM CASPARI BAVHINI.

## PRÆFATIO.



**A**BSOLVTO Operis Anatomici Andreæ Laurentij examine, ad Caspari Bauhini Theatrum Anatomicum me conféro. Arduum equidem & inusitatum opus molior, dum meditor magnum illud volumen Theatri Anatomici pervenire, n'c sine Germanorum inusuentia, cum Laurentius & Bauhinus in arte Anatomica præstantissimi & peritissimi indidentur ab omnibus, eorumque opera tanquam perfectissima, suisque numeris ab omnis laudentur, ceterisque præferantur: nam hoc sæculo ab his duobus, purissima & verissima petitur scientia Anatomica, quam postremi scripsere, suis propriis observationibus, & cogitationibus instruxerunt, atque aliorum præcedentium documentis adiuvati. Propterea tanquam norma Lesbia, ad quam quisque sese componere debeat, in rerum Anatomicarum controversiis definiendas citantur, & producantur, velut indices & arbitri sapienti rei Anatomica, à quibus ad alios provocare non licet.

Quare cum Bauhinus postremus de re Anatomica scripserit, longè post Laurentium, & anno millesimo sexcentesimo vicesimo primo, sui Theatri Anatomici secundam editionem emendatorem curavit, ubi omnium Anatomicorum veritas & pravae opiniones promiscuè collectas inseruit: Dum examinabo Theatrum Anatomicum Bauhini, sextis curis & cogitationibus elaboratum & expositum, ex autopsia, & opinionibus auctorum concinnatum, atque novis Iconibus adornatum, spatio quadraginta annorum, quibus publicè & privatim Anatomem professus est: scito me quidquid ab aliis prioribus Anatomicis, rectè vel perperam scriptum fuerit examinare.

Atque hoc scribendi genus plurimum laudavit Baptista Carcanus, in Præfatione libelli de Unionè vasorum Cordis in Fœtu. Cum enim, inquit, Vesaly & Fallopij labore & studio tota fuerit Anatomie patefacta, nihilque super sit inveniendum: eorum labor & industria melius & vilius impenditur: in illis examinandis, quæ ab ipsis inventa sunt, quàm si tempus, & operam inutiliter perderemus in rerum novarum indagatione. Sic Herophilus præstantissimus Anatomicus, non dubitavit Praxagoræ sui Præceptoris errores adducere & castigare, ne posteritas eiusdem erroribus deciperetur, quibus ipse fuerat deceptus.

Itaque hac docendi methodo, Anatomica doctrina emendatior in vulgus exibat, & qui legentis sit Animadversiones, erant deinceps in legendis aliorum Anatomicorum libris, meisque commentariis Anatomicis cautiore, accuratior, atque diligentior, nec eniciumque se Anatomicum proficisci tam facile credent, neque amplius aliorum relationi fident, nisi re diligenter prius inspecta & explorata.

Quis enim in Gallia & Germania non admiratur Bauhini sedulitatem, in evolvendis & recitandis Anatomicorum scriptis, & cum per annos quadraginta artem Anatomicam publicè

& privatim agitari, quid dubitares de eius certa & fideli experientia in rebus Anatomicis, ex multis cadauerum sectionibus comprobata. Et ego cum primum me dedit studio Anatomico, Theatri Anatomici primæ editionis anno 1605. publicatæ labore operosum, indubitatæ fidei & experientię certissimæ opus admirabar, sed improbo labore, & assiduo artis Anatomicae exercitio peritiam aliquam adeptus, ubi relegi Bauhinum, & quæ ab eo scripta sunt, in cadaueribus inuestigari, illum falli: & alios incantes, fidentesque eius narrationis fallere animaduerti.

O cæcas Anatomicorum mentes! & pectora cæca! Qualibus in tenebris Anatomicæ scientiæ nunc viuunt? Quapropter si errantes comiter monstrari rectam viam, nemo nostrum institutum damnare vel improbare debet, neque fiduciam nostrâ censurâ videre & despicere, legat prius & postea despiciet, si nouerit non ex studio & certa cognitione, sed ex inuidiâ, & contemptu aliorum Anatomicorum nostras Animaduersiones proficisci.

Cerrò scio, quod huius Animaduersionibus emendatam opus Bauhini non leue huic arti emolumentum adferret: nam studiosis artis Anatomica indicabit, in quibus ille errauerit, & in quibus peritē censuerit, ut postea rectius uti possint Theatro Anatomico Bauhini, & occasione aliis dabit inquirendi, si vera aut falsa scripserim, & si eam fidelitatem & experientiam in rebus Anatomicis, quam in aliis desiderio adhibuerim.

Propterea Medicos Germanos oro, atque obtestor, ut nostram scribendi philosophicam libertatem, & Anatomicorum modestam censuram benignè & humaniter excipiant: neque existiment me ex inuidiâ & contemptu nationis Germanicæ istas Animaduersiones edidisse, quam in omni genere scientiarum exultam, ingeniosam, & admodum laboriosam agnosci, atque libenter & candidè profiteor. Nec dubito, quin artis Anatomicae gloriam ceteris nationibus præripuisset, si parem habuisset opportunitatem adiuuandæ Anatomen, qualem Parisiis, urbe populosissima habemus, ubi singulū menses quatuor, vel sex, interdu[m] plures homines suspensio plecluntur, quorum cadauera Medici & Chirurgi ad usum Anatomicum posulantibus non denegantur.

Proinde non mirum, si eam secandi cadauera humana natū opportunitatem, & ad id stipendiū Regis honorificè inuitatus, me totum addiderim rebus Anatomicis diligenter inuestigandis, scripta veterum & recentiorum cum subtili accuratè comperando, unde cognouit recentiores Anatomicos grauiter errasse, dum inopia cadauerum, aut neglecta Encephali Anatomica, quam nonnulli indicant sordidam, quia laboriosa est, alieno exere sapunt, & quæ ab aliis tradita sunt fideliter exhibebunt: hic errandi consuetudo parit erroribus patrocinium.

Non ignoro tamen humani ingenij conditionem erroribus obnoxiam, imò erroribus interdum delectari, nec fieri posse, ut opere in magno non hallucinemur, aut rerum veram naturam semper assequamur. Propterea condonandum est aliquid aliorum erroribus, ut apud alios nostrū parem gratiam inueniamus. Proinde memor nostræ conditionis, meaque tenuitatis conscient, cum omni modestiâ & humanitate me gressū, parem ab aliis modestam expectans, si meos labores Anatomicos examinare velint, quos rogo, ut postremam editionem anni 1649. velint relegere, tanquam vltima manu flectam & emendatam.

Nec desuturos prouideo, quia erident me quaru[m] & arrogantia statū inflatum & impulsū, istas Animaduersiones edidisse, ut supra ceteras Anatomicas sapere, & maiora præstare videret, hisque prostratis & deuictis, de possessione rei Anatomicæ adepta, tanquam Dissulator triumpharem, atque ingeniosam in hac professione dissoluturam exercerem. Proinde eo potissimum nomine me deprehendent, atque stylum aduersum me exaceruent, & acerbius infestabunt, ut sciam rectam iucantem Laurentij & Bauhini peritiam Anatomicam: Quibus non respondeo, nisi fuerint in rebus Anatomicis exercitati, & ex multis experientia, peritē, scientissimè, ac modeste scripserint.

Ad vitandam hanc inuidiam, potuissim Riolani mutato nomine, & alterius mutato, istas Animaduersiones in lucem proferre, sed à multis freta fuissent, velut ab inficio & temerario quodam homine profecta, qui obreclatione aliena famam gloriam sibi comparare vellet. Alij me Authorem suspicati, aut pro certo agnoscetes, vel incensuram, aut repudiationem vel infamiam exprobrassent, quod non ausus fuissim in medium prodire, & proprio nomine iantere/scere, ideoque lateam insister Apellæ post tabulam, aliorum iudicia exploraturus in eo certamine, quo qui pronocat, notus esse debet.

Me me adsum qui feci, in me conuertite ferrum.

Itaque fretus experientia & fiducia Rudj Anatomicis, constanter profiteor me authorem istarum Animaduersionum, quasi relegendo opus Anatomicum Bauhini, notari.

Si quis laborem nostrum reprehendas, tanquam nimis arduum & curiosum in minutia

quibusdam Anatonicis castigandis occupatum, quæ tanquam præherbale fructibus interfecta, neutiquam eas offendunt, atque ut neui de sermone vatum non redtant sic Anatomica narrationes Laurentij & Bauhini non ideo revolvenda, à viuis ius habent, & leuissimæ maculis interspersa reperiuntur, quoniam tunc eamodi errores non mutant rei naturam, sed decipiunt legentes & iuuant. Acistoteles, lib. 2. Metaph. quatenus quomodo se habeant ingenta ad asseclationes, notas quæ tam nomina exalte ferre: quædam vero tadere certitudinis, aut quia non possunt consequi, aut propter maximam sue minutatim dispositionem, atque ut in morbis: in iust Hippocrates, siquum est iustanta festuati caligere ipsi delirantis ingeny, non philosophantis indurimeit, in minutis quibusdam colligendis occupari. Fateor equidem propter nostram affirmationem, vel negationem, rei essentiam, vel naturalem constitutionem non immutari, sed rei incognita & male descripta, neminem potest scientiam reddere. Adde quod leuis error in principio, maximus evadit in fine, atque ex pravis fundamentis nihil rectum ac solidum exstrui potest, sed errores suscipies, qui doctrina Anatomica veritatem pervertunt, minus perferendi sunt in eo, qui perfectum se Anatomicum profectur, atque suis laboris in studio, per longam annorum seriem exantlati, exemplar aliis utiissimum supra ceteros Anatomicos proponit.

Porro, si quis in Anatomicis Institutionibus Caspari Bartholini, quas ad exemplar Theatri Anatomici Bauhini condidit, iudicio Laurembergij in sua Lauro Apollinea, & Caspari Hofmanni, quasdam Observationes animaduertat nostris non similes, licet aliis verbis expressis, ne puer me iudicio & insulato Bartholino, quem Philosophum & Medicum eruditum agnosco, & de re Medica benemeritum, etiam si deseruerit castra Medicis, ut Theologus vacaret, isthac suffragum satis: ille fuit me primùm de rebus Anatomicis scripsisse anno 1607. deinde anno 1609. meos labores Anatomicos renouasse, & ultioris editioni librorum Parentis mei continuasse: At anno 1611. prodire in lucem Institutiones Anatomicæ Bartholini. Ergo iam quinque effluxerāt anni, quibus Anatomem publicè doceram & demonstrabam, magna audierunt etiam Germanorum frequentia: nec est verisimile Bartholinum, qui omnes Europæ Academiæ perlustravit, & Lugdunobatauam non longè a Lutetia distans adiit, ut Pauulum Anatomicam demonstrantem videret, Parisiensem præterisse, cuius tamen nullam fecit mentionem, ne ab ea aliquid didicisse cogere tur fateri, eam tamen in suis percipitationibus Galliã vidisse testetur. Non improbi tamen Institutiones Anatomicas Bartholini, imò laudo tanquã methodicè & perspicuè scriptas, sed plurima ex Bauhino deprompta sunt, si demus quasdam Observationes Parauinas, & alias nostris consimiles, sed tam ex tetro Mercurio suffragatur, ut ne quidem Lauerna Dea furtum deprehenderet. Num inter Anatomicos non annuueram, quia in præfatione se quassium, ac tyrannem in hac arte cognoscit, cum lectores suos rogat, ut condonent aliquid eius ætati, quæ nondum omnia inuenire permisit, nec peregrinationes, quibus hætenus additus fuit, otiosè singula penitare: Adde quod in eadem præfatione monet, auditores suos copulnere non posse nauate sub eo operæ in Anatomicis, propter editionem harum Institutionum. Nam quæ hic verbotenus, in animalibus, animaliumque partibus, pluris impressis, & manifestè eductis edocti sunt. Vnde colligere licet Bartholinum, hæud satis peritè suas Auditores Anatomicas docuisse, in picturis & animalibus, quæ potius in cadaveribus humanis demonstrare debuerat. Proinde nemo non videt, quanta fides sit tribuenda libris Anatomicis ita conditis & fabricatis.

---qui sapiunt alieno ex ore, petuntque

Res ex auditis potiùs, quàm sensibus ipsis.

Pro certo affirmari: cum Bartholinu nusquam dicat, se cadaver humanum, autem ab anno 1611. usque ad annum 1622. cum in illa editione potrema, nullam mentionem faciat aliorum Anatomicos à se celebrata publicè, vel priuatim, quod non omisit. In tractatu de studio Medico, ingenuè fateor, se ab aliquo annis deseruisse studiũ Medicinæ, ut sapientiæ cælestis doctrinam iuuentuti publicè ac ordinariè, Deo sic vocante, & magno Rege meo, reliquæ quæ magistratu iubente instillare inciperem, itaq. Professor fuit Regis in Theologia, non Medicina, & editione vltima Gossartiz facta, se Theologum profiteretur. Prædenter eius filius Thomas Bartholinus in editione recentis Lugdunobataua istam professionem subieuit.

Quare non amplius gloriatur, de restaurata Anatomia suis & laboribus patris. Ne quis autem sinistrè sentiret de Institutionibus Anatomicis Patris, præfationem ad Lectorem causè expunxit, quam Pater in postrema editione anni 1631. reuocauerat sine ulla verborum mutata, sed filius imprudenter suam insidiam contra quendam Anatomicum declarauit, dem inique succenset cuidam eruditissimo Medico, qui suum præceptorem laudat, sic cum sa-



*studiosè depiscit. Nollem tantè doctissimo cuidam Medico imprudenti non ita pridem excidisset, Anatomicam disciplinam, iam nulla re magis quàm magnitudine sua laborare, cui ultimum complementum sit additum. Istud elogium per meo Anatomico attributum, non potuit decoquere, sine laudantiis, & laudati iniuria & subsidio. Attamè laudari à laudato viro honorificum semper docti, si hoc illi de plicebat, poterat scilicet distimulare, non publicè testari malevolam animam, aliena fama obsecratorem. Appellat Laurembergium Vmbraticum Anatomicum, quod imitatione patris nullum cadaver humanum dissectum, sed ex pelluris & animalium sectionibus Anatomen didicerit, & ex alio libro descripsit.*

*Porrò, non vituperò antipelargiam Filij, qui vi bonorum Patris, sic professionis heres. & successor, patrimonium sibi relictum amplificare voluit, & in paterno fundo laborare, tanquam in proprio excolendo. Sed de siderasset, ut Vallæus, qui libri editioni nova præfuit, & cuius subsidio nitorem, atque lucem novam obtinuit, de erroribus Patris Filium manifestet, nec veteribus novis adhuc cumulasset, quos amice patifaciam, ut agnoscat à Riolano ultimum huius partis Medicinæ complementum additum, quantum sedulitas atque diligentia humana potius assequi, etiam inuito Bartholino Filio.*

*Quoniam Laurembergius non ignobilis fuit Medicus, nec illaudatus obibat, quamvis eum Bartholinus filius Vmbraticum Anatomicum appellavit. Ac sanè, in Processibus contra Laurentium, & in Collegio Anatomico, se declaravit aequè peritum Anatomicum ac Bartholinum. Pertergo ex pelluris, vel ex dissectionibus animalium Anatomen didicit, vel in aliqua Academia perscrutariè vidit, administrantem Anatomicam professorem. Sed nulus Anatomem in humanis cadaveribus exercuit, & manus operi admovit, ideoque ambo, Bartholinus & Laurembergius, Anatomici Vmbratici merito dici possunt. Laurembergius non ita ignes quædam Anatomicas agitas satù acutè, sed nimis severè, quæstiones Anatomicas Laurentij reprehendit, quæ possunt in utramque partem defendi, nihil de conformatione partium reprehensione dignum offendit, quia non intellexit, nec observavit. Multa in Collegio suo Anatomico, ex me deprompsit, innominato, nisi ad reprehensionem insicenter admodum, sed cum ex hoc, qui quotannis, in Germania, Dania, Belgio, in vnaquaque familia mactantur, pro annonæ victus ordinarij, Anatomen didicit, imperitè & ridiculè, ut hunc supremum errorem inter infinitos annotem, scriptis ex collisione vox, collisio hæc fit ab ætère: nam in larynge rimula quædam est, quam epiglottidis cum larynge facit: ignoravit glottida, quam Galenus gloriatur, supra præcedentes inuenisse, instrumentum præcipuum vocis, cum nervis recurrentibus. Miror innumeros errores Anatomicos, qui passim occurrunt, a Bartholino non fuisse notatos & castigatos, cum sine maiori momenti in arte Medica, quàm effusio aquæ & sanguinis à Salvatoris nostri latere, quam animosè tueretur ad sensum Parentis sui, merito reprehensè à Laurembergio.*

*Laudant commentarios Caspari Hofmanni in libros Galeni de usu partium, & ei tantum parem felicitatem in secundis cadaveribus humanis, quæ nobis contingit in Vrbe Parisiensi, totius orbis populossissima, ut suas meditationes, & scripturas Anatomicas, ad inspectionem, itaque normam Lesbiam componeret, sed dum nuper se constituit censorem & arbitrum rerum Anatomicarum in suis Institutionibus Medicis, detegit suam ipsam in hac Medicina parte, ne quid dicam acerbius. Reliquarum partium Medicinæ censuram ab aliis voluit, sed quam adhibuit virgulam censoriam in castigandos Medicos, quos appellat Institutionistas, eandem patienter feret, dum examinabo, quæ scriptis de re Anatomica in suis Institutionibus, quæ tanquam exemplar Medicinæ perfectum supra ceteros Medicos, à se editum haberi voluit, & de his nimis superbiè gloriatur.*

*Ceterum, nolui in singulis Bauhini paginis quæ mea sunt repetere, vel indicare, ut modicam illam quam præ me scribo, ubique servarem: Id Lector curiosus, primam & ultimam editionem Theatri Anatomici, cum libro nostræ editionis anni 1618. comparando deprehendet.*

*Si quis me levisatè & inconstanter arguat, quod vultu Bauhino reprehendo, quorum esse primus auctor fuit: Nemo illa in postremis editionibus à me deleta vel emendata fuisse: sic Soligenes libri de siderum motu editus, non cessabat adducere, semetipsum corrigendo. Ideoque Bauhinus peritus Anatomicus ea sua adjuere & coniungere non debuerat, nisi prius diligenter inspecta & explorata habuisset. Propterea curiose cuncta, quæ ab aliis Anatomicis prædicta sunt inuestigavi, sedulo expendi, ut de iis rectum possem proferre iudicium.*

# ANIMADVERSIONES IN THEATRUM

*Anatomicum Caspari Bauhini.*

Pagina 4. **B** *Auhinus* in hoc theatro secundæ editionis, proficitur se *corporis humani fabricam sexto describere. Ideoque hoc opus debet esse perfectam & absolutissimam.*

## *De diuisione corporis humani.*

Pag. 6. **D** *iuisionem corporis humani à Diole* propositam probari putat à *Paulo Ægineta, lib. 1. cap. 100.* sed epistola hæc Dioelis inserta & adfuta fuit à librariis, cuius nullam mentionem fecit *Paulus Ægineta.*

Pag. 7. *Diuisio spinalis medulla proposita à Galeno, lib. 5. de levis affectis, cap. 4. ut demonstraret origines nervorum, non probat diuisionem Anatomicam corporis humani, ac proinde fallitur Bauhinus.*

## *Ventris Inferioris Diuisio.*

Pag. 10. **V** *Enter inferior* improprie epigastrium dicitur: attamen hæc dictio apud *Galenum*, & totum ventrem inferiorem, vel totum eius integumentum significat, subiungit, *male abdomen nominari.* Imò *Celcus* abdomen vocat: Non inficior tamen integumentum ventris abdomen dici, quod abdat & contegat interiores partes.

Pag. 10. *Falsum est, quod hypochondria Aristoteli vix discuntur, eo quod sub Diaphragmate sit eorum locus:* Fateor vocem *ὑποχόνδριον* non fuisse notam *Aristoteli*, sed dictio *vix* apud Philosophum semper denotat *Diaphragma.*

Pag. 11. *Parti media & interiecta hypochondrii proprie epigastrium dicitur.* Vetum est ita nominari à Recentioribus, sed nunquam à *Galeno*, qui epigastrium pro toto ventre, vel pro vniuersali integumento Ventris acceperit.

Pag. 11. Verum est ventrem, in quo vesica continetur, septo interiecto distingui à peritonæi productione factò, sed falsum quod subiungit, *scilicet productionem illam à ceruice vesicæ, per eius partem posteriorem, & fundum usque ad vmbilicum extendi.* Non obseruauit, duplicatum esse peritonæum, & illam duplicaturam manifestam esse in colloco, vbi vesica continetur, nescio an intellexerit *Vræchum.*

## *Partes continentes communes.*

Pag. 12. **I** *n enumeratione partium contentarum communium, adiungit Tunicam cuiuslibet musculo propriam.* Inde patet nescire quid sit *Membrana Communis musculorum*, quæ præter propriam cuiusque musculi, omnes inuoluere & amplexari debet.

Pag. 12. *Communes membranas notas cingere omnes partes, excepto pene, & Scroto:* Debebat addere frontem, & caput, quia pinguedine carent, & caput carnosâ membrana destituitur, ea potissimum parte, quæ pileolo tegitur. In *Scroto* dartos est continuatio membranz carnosæ.

Pag. 12. *Partibus continentibus propriis nonnulli Omentum addunt.* Si hoc falsum, debebat refellere, si verum est, ergo vmbilicalia vasa pertinent ad partes continentes proprias, quia duplicato peritonæo inclusa sunt.

## *De Cute.*

Pag. 16. **N** *egat Cutem ex carne subiecta & succata generari, quamuis id voluerit Galenus, lib. 3. Methodi, cap. 1.* Quod prius ab *Aristotele* dictum fuerat: si productionem illam impediatur pinguedo interiecta, in *Fœtu* & pueris recens editis nulla deprehenditur.

*Musculorum Membrana propria.*

Pag. 21. **I** Mperitè admodum describit membranam musculorum propriam, quam debebat appellare communem, quia omnes alicuius organi partes musculosas inuoluit, eo modo quo membrana carnosa.

*De Musculis.*

Pag. 23. **R** Arius duplices fibras habent musculi, easque sibi incumbentes mutuò. Imò nullum reperies, nisi Masseterem, qui tamen ratione fibrarum, in duos diuiditur à Galea.

Pag. 24. Rectè agit de muscoli parte præcipua, quæ est tendinosa, sed male membranas non moueri, nisi fibra illarum sint carnosæ, quales sunt musculorum fibræ, sed si ex illo corpore tendinoso dilcepro sint conflatæ, ut ipse statuit, non possunt esse carnosæ: Membranz quæ mouentur, sunt carnosæ, fibris præditæ ad constrictionem.

Pag. 29. Musculi abdominis à fibrarum ductu sunt denominati. At potius à situ nominati fuerè, quia musculorum actio, sit à fibris rectis, quouis situ collocatis.

Pag. 30. Innotat quid sit linea candida in abdominis medio, quam putat constari ex concursu tendinum musculorum abdominis, cum tamen extrinsecus nullum diuisionis vestigium existeret. Eius nota & processus sequitur discrimen rectorum musculorum, proinde à cartilagine xiphoide per umbilicum ad Ossium pubis commissuram excurrit.

Pag. 30. Meam opinionem retinuit de ortu musculorum abdominis, iisdem rationibus adductis, suppresso tamen meo nomine.

Pag. 30. Si musculus obliquus ascendens contrarium ductum tenet, debet ortum habere ab Ossibus pubis. At ille derivat ab appendice Ossis ilium, & Ossis Sacri. Cum tamen ab Ossis pubis, & tota costa Ossis ilium usque ad Os Sacrum enaseatur. Translationem tendinis ex me depromptit, meam explicationem sequutus, ut alia multa quæ subiungit.

Pag. 31. Pyramidales in lineam albam inseruntur, nunquam in rectos, lineam albam deorsum oblique trahunt, & violentis expressionibus abdominis inferiunt. Videtur constituere lineam albam tanquam corpus quoddam, in quod inferuntur musculi, & illud attrahunt. At si linea candida, ex Bantimo, sit ex concursu tendinum musculorum abdominis, pyramidales cum sint istis tendinibus subiecti, non possunt in eos inseri: deinde, linea candida est tantum nota interualli rectorum, propterea quæ musculi pyramidales, si tendones suos intra rectos intrudant, peritonæi membranz affigunt.

Pag. 32. Quando absunt pyramidales, tunc obliqui ascendentes ab Ossis pubis oriuntur, alioquin uniude manant. At semper ex eo loco prodeunt, siue pyramidales adsint, siue desint.

Pag. 32. Pyramidales ne collidantur recti, propugnaculi vel straguli loco esse videntur. Debebat explicare quam intelligeret collisionem: an Ossium pubis, quibus incumbant recti immediatè, hisque superiecti sunt pyramidales, ideoque non possunt propugnaculi, vel straguli vices obire. An mutuam collisionem Ossium pubis in complexu viri & mulieris ad procreationem.

Pag. 33. Rectos educit à partibus infernis. At si nervus à partibus supernis habent & intercostalibus, ut ille notat, si sunt latiores & carnosiores parte superiore, quidniab eo loco prodibunt? Nam si ab inferiore parte nascerentur, dum intumescerent versus inum ventrem, eorum principium, exeunti Fœtui essent impedimento, & facibus excernendis.

Pag. 33. Venas appellat mammariam & epigastricam recurrentes, eiusque nominis inuentione gloriatur improprie, non enim recurrunt supernè, ut nervi recurrentes.

Pag. 35. Quod si musculus quilibet solus agat, tum oblique descendens coxam in suum latem, dexter in dextrum, sinister in sinistrum oblique trahit. Non reiciio coxarum motum, sed peculiarem cuiusque amborum simul admitto, quæ eum Ossis Sacro compa-

# Animad. in Theat. Anatom. Casp. Bauhini. 697

gem illam ossream efformant, quæ monetur à musculis obliquis descendentibus & Rectis, quæ de repluribus egi in mea *Anthropographia*.

Pag. 35. *Obliquus ascendens pectus oblique ad coxas adducit.* Nec istud planè repudio, de quo prius admonueram, cùm à musculis obliquis ascendentibus truncatus corporis incurvari scripsi, dum quis supinus iacens sine manuum adminiculo, truncum erigit, aut in pedes suos salit.

## De Peritoneo.

Pag. 35. **P**eritonæi figura ovalis pendet à contentis, ut saccus figuram habet à rebus conclusis.

Pag. 36. *Peritonæi membrana prope spinam, circa lumbos crassior, quia debuit extenuari: max. subiungit, latis araneorum telis similis:* His verbis inest magna contrarietas. Nam si crassior, non potest latis araneorum telis esse similis.

Pag. 37. *Peritonæum in Diaphragmate tribus foraminibus perforatum esse scribit, ad Vena Cava, Aorta & Oesophagi transiitionem.* Non perforatur, sed ibi cedens producitur & extenditur instar vaginæ, partes istas involuens.

## Umbilicus.

Pag. 40. **U**mbilicus non est segmentum vasorum umbilicalium, quia pars scissa attingitur, sed potius nodosus coitus valorum umbilicalium, quæ intus remanent.

Pag. 41. *Quamvis vasa ex semine prima procreentur, non inde sequitur venam umbilicalem omnium primam formari, & omnium partium principium esse, & venam Portam ab ipsa proficisci:* Rectius sentit *Laurentius*, venam umbilicalem esse propaginem venæ Portæ, quæ ad vteri parietes deducitur, ut exlugat sanguinem ad nutritionem & formationem viscerum.

Pag. 41. 42. *Ne vasorum umbilicalium portiones in corpore relictæ inutiles sint, ut ligamenta degenerant, Vena Hepatis fit ligamentum arteria, umbilicales vesicæ sunt ligamenta lumbalis, quæ omnia sunt falsæ, ut demonstravi in mea *Anthropographia*.*

Pag. 43. *Recte sentit, dum Ourachon solidum & imperminum esse statuit.*

## De Vena Porta.

Pag. 46. **N**unc de Vena Porta & Arteria Celiacæ ramis verba faciendæ sunt, cùm horum vasorum distributio, antequam intestinorum historia tradatur, demonstrari debeat. Sic Anatomica methode, ubi unius tantum cadaueris est copia, requiritur. Imò intestina priusquam venæ Portæ & Arteriæ Celiacæ distributio perquiratur, demonstrari debent, ordine sectionis ita postulante: quia perueritit intestinorum situs, & ecphyseos principium, pancreati & mesenterio immersum dilaceratur, cum magna sanguinis effusione, dum prius vasa administrantur.

Pag. 47. *Venas esse insensiles scribit, proinde iis affectis valida remedia imponere licet, sic in rescindendo varice venæ pars sana refecatur, vitur, nec tamen dolor excusatur.* Attamen *Marius* dolebat plurimum, dum secaretur varix, & curationem morbo crudeliorem esse dixit, nec passus est in altero erare varices percurari præ doloris acerbitate, ut legitur apud *Plutarchum*: præterea in hæmorrhoidibus foras tumentibus, venas dolere senties, ergo venæ non sunt insensiles.

Pag. 48. In descriptione venæ Portæ paulò aliter enumerat, & distribuit ramos qui à splenico & mesenterico prodeunt, quàm veritas, & accurata dissectio & inspectio ferunt: Nec admittit valvulas in mesaraicis venis, quas tamen in aliis tubulis mesaraicis chylo traducendo dicatis, & ab *Affiliis* inuentis, alij pertinaciter tuerunt, nolo tamen ea in re dissentire à *Bauhino*.

Pag. 55. In descriptione Aortæ descendens, mesentericam superiorem constituit primam, quæ nulla est, eius locum tener arteria illa lienalis ambagiosa, descripta ab *Arantio*, quam prætermisit, vel ignoravit.

*De Intestinis.*

Pag. 62. **F** Alcum est omnino in appendice membranosa, vel potius apophysi, feces Foetus contineri, eamque spectari ampliorem in Foetu, quam in adultis infantibus.

Pag. 63. *Valde laborat Bauhinus in adstruenda valvula, quam in principio coli collocat, & male depingit iuxta valvula venarum in plicis suis, sic enim disposita & figurata saeculum refert, cum tamen sit orbiculus membranofus, conflatus ex mutua connectione ilei, & coli intestinorum, estque in medio perforatus instar annuli: talem orbiculum inuenies in pyloro. Et cum plures Anat. huius orbiculi membranosi, nomine valvulae meminerint ante Bauhinum, non debet sibi attribui inuentionem huius valvulae, ut autem perfectè demonstretur, vult ante expurgationem examinari, quoniam à transfusione aquae labefactatur, sed quouis modo administratur, nunquam figuram valvularum in venis, siue sigmoidum in Corde refert.*

Pag. 68. *Non intellexit, cur Galenus triplex mesenterium constituat, lib. de diffell. venarum, cap. 9. quod ratione vasorum Galenus interpretatur, non propter varias adhaesiones.*

Pag. 69. *Maxima glandula ad ipsius centrum, ubi fit vasorum distributio, & ubi vasa magis collecta sunt.* Nulla maior glandula in ventre reperitur, quam alibi, ac proinde falsum, quod refert de glandula maxima.

*De Mesenterio.*

Pag. 70. **M** Mesenterium partem etiam habet, quam mesenterij appendiculam nominant. Non intelligit, quid sit apud Galenum, vinculum mesenterij.

*De Vena Caua.*

Pag. 74. **R** Arius duz venae à Cana supra & prope emulgentis ortum prodeunt, quarum superior glandulae propaginem largitur, quare si venas habet ab adiposa reni superiecta, quomodo potest esse capsula humoris atrabilarij, ut capite de renibus probare nititur.

Pag. 74. *Quod est rarum & insolens de diuisione emulgentis sinistrae, tanquam verum proponit, debeat monere, id praeter naturam accidere.*

Pag. 75. *Vetum est in principio venarum emulgentium tenuissimas valvulas adesse, sed nullas vidi in venis splenicis, quas se obseruasse affirmat.*

Pag. 75. *Aliquando à spermatica sinistra iuxta eius originem rami tres emittuntur, qui in spinalem medullam desinunt. Verum est spermaticam vtramque ramulos proferre in partes vicinas dispersos: sed nullos ordinariè transmittit ad spinalem medullam, qui eo feruntur, à lumbaribus venis prodeunt.*

Pag. 78. *In arteriis emulgentibus interdum naturam ludere non difficit, sed rarè multiplex obseruatur, imò nunquam deprehendi, quamvis Bauhinus id tanquam consuetum proponat.* Erratum naturae potius apparet in venis emulgentibus, quam in arteriis.

*Renes.*

Pag. 80. **O**rdinem scilicet ignorat Bauhinus, vel neglexit. Nam absoluto pancreate, de Ventriculo, Hepate, Cysti felleis, & Liene agere debebat, postea ad venam Cauam & Aortam progredi, priusquam renes aggredieretur, ut vitaret sanguinis profluuium, quod cauere non possumus, si renes prius attingamus, eosque velimus accuratè examinare per diffinitionem Anatomicam.

Pag. 81. *Renes connectuntur beneficio membranae externa à peritoneo pnatæ, lambi, Diaphragmati, quamvis & alia fibra adhuc à peritoneo in renum partem gibbā inferantur.* Ridicula est isthaec insertio fibrularum à peritoneo: Nam renes duplicato peritoneo inuoluti varias habent adhaesiones cum peritoneo per fibrulas, ut videre est in aliis inuolutis, quae faciliè separantur ab aliis partibus.

Cum agit de Glandulis supra renes positis, multa ridicula proponit de earum vsu, quæ transcriptæ ex Bartholini capulis arrabilaris, indictæ & insularæ Authore. *Riolani* quoque opinionem super illis glandulis proponit, simulque confundit, nec cui sit fidendum definit. Id examinabo in *Animaduersionibus ad Institutiones Anatomicas Bartholini*.

Pag. 83. *Renēs membrana duplici teguntur, exteriore à peritonæo iuxta humiliorem diaphragmatis sedem, quæ peritonæo nectitur pronata. Sed hæc membrana exterior nihil est aliud, quam duplicatura peritonæi, ideoque frustra inquiritur eius origo sub diaphragmate.*

Pag. 84. *Rarissimum hominis renēs extrinsecus inæquales esse, & quasi ex multis renibus, seu glandulis exiguâ componi, quemadmodum in bone obseruatur, quod in duobus fetibus, & puella undecim annorum, & in quodam viro Romæ Eustachius notauit. Sed talis figura in renibus Fœtus est perquirenda, talique figura semper conformatos renēs inuenies, vt docui in mea Anthropographia, meamque explicationem reulit Bauhinus, scribens more solito.*

Pag. 85. *In emulgentibus valvulas feri refluxum in cauam impediētes obseruauit, cum eis ramus vnus, aut alter vena sine pari inmisitur, vt scilicet sbuacat & renēs consensat, aliquando cana à trunco iliaco pronata sursum obliquè tendens, infimæ renum sedi inseritur. Quot verba, tot errores: nam in vnaquaque emulgente iuxta suum exortum à caua, vnica valvula tenuissima deprehenditur, & ramus azygi venæ descendens non committitur emulgenti venæ, sed infra emulgentem in truncum cauz inferitur. Nunquam vidi venam à trunco iliaco pronatam ad renēs sursum remeare. nec alium auctorem, qui id confirmet inueni. Notabis pro *Cana* legendum esse *Vena*, errore Typographico.*

Pag. 86. *Caruncula si secundum longitudinem dissecetur, in iis sulci & canaliculi, non secus ac pili tenuissimi excelsi obseruantur, velut linea à centro ad circumferentiam protrahita, quarum causa, eiusmodi caruncula, quæ ex pluribus fibris conuenientibus, intertextæ apparet, ista angustissima, vt vix capillum admittant perforari debere. Nunquam obseruauit carunculas perforatas, multò minùs fibrulas, quibus intertextæ sunt instar spongiarum, ebibunt serum, & exsillant in tubulos Vreteris. Adde quod si carunculae sint angustissimæ, vt vix capillum admittant, & perforentur canaliculo instar pili tenuissimi, non video, quomodo foramina & fibrulas animaduertere poruerit Bauhinus, nisi vsus fuerit conspiciis, quæ res minutissimas augent, & multipliciant.*

Pag. 87. *Remota in cane cauitas reni simplex non est, sed gemina sibi inuicem iuncta, primam quia instar cribri perforata est incerniculum, peluis aliqui vocant, at in humano rene eiusmodi cauitates non reperiuntur. Imò reperies, si renem per cauam partem secueris stylo prius introducto in cauum Vreteris, nam cauitas hæc pelvis erit, cauratis fornice, seu concauerarum foraminibus pertusum instar cribri erit incerniculum, quæ parte superiore incerniculum erit, parte inferiore & latiore serum desillatum excipiente, pelvis erit.*

### Vreteres.

Pag. 89. **F** *Alsum est Vreteres infra renēs, in tres aut quatuor partes, siue ramos quandoque diuidi. Id fit contra naturam, si reperiatur, quod monere debuerat, nulla eius rei apud Schenchium exempla prostant, & alios Auctores quos legi.*

Pag. 89. *In mulieribus lati, recti, & breues sunt Vreteres, hinc minore cum dolore calculos eliciunt. Imò pares sunt, & latitudine, & progressu, tam in viris, quam in mulieribus. Nec maiori facilitate calculos eliciunt a tenibus per Vreteres, facilius à vesica foris extrudunt.*

Pag. 90. *Debeat notare & reprehendere nullas adesse valvulas extremitatibus Vreterum, dum penetant vesicam. At videtur admittere, licet ex aliorum opinione referat.*

*Partes Genitales.*

Pag. 90. **E** *T*fi partes ad nutritionem facientes, necdum abfoluerimus, cum tamen Anatomica methodus, quando unius tantum corporis copia datur, nunc generationis dicatarum partium demonstrationem requirat, earum hiftoriam subneſſemus. Tua methodus Anatomica prorsus incepta, eum ad partes spermaticas descendis, reliſtis ventriculo, Hepate, cyſti fellis, & Lienē, quæ poſſunt & debent monſtrari, ante partes spermaticas, & ſine earum dettimento.

*Veficula Seminaria.*

Pag. 91. **N** *E* canalis penis ab acrimonia ſeminis, vel urina ledatur, oleaginoſum humorem natura creatis, & veficulis indidit, quas ſeminarias alij vocant. Ergo in veficulis ſeminariis oleaginoſus tantum humor continetur, & tibi fauco, & lubenter ſubſcribo.

Pag. 91. *V*enis arteria ſpermatica ampliores ſunt, quia plurimum caloris & ſpiritus vitalis in teſtes influere debet, &c. Imò exiliores ſemper inuenies arterias, tam in viris, quàm in mulieribus, quia venæ nutriunt partes in progreſſu ſuo.

*Vafa Spermatica praparantia.*

Pag. 91. **V**afa ſpermatica peritonæa membrana, & deorſum protenſa fibroſis nexibus committuntur. Contrà, hæc vafa non peritonæo incumbunt, ſed duplicato peritonæo inclufa ſunt, & intra produktionem peritonæi, quæ ſit à tunica externa, deſcendunt ad Scrotum.

Pag. 92. *S*permatici vafis corpus pyramidale varicoſum baſi ſua intima teſtium tunica ramulis largiens, pertinaciter adhaeſit, non verò teſtis corpus ingreditur, &c. Imò teſtis ſubſtantiam ſubit, & ingreditur, vt tranſmittat ſeminalem humorem per teſtis ſubſtantiam.

*Paraſtata, Epididymis.*

Pag. 92. **P**araſtatas & Epididymidas pro eadem parte accepit. Impropiè quidem, cùm apud Galenum inter ſe diſtinguantur. Nam paraſtata circoſides, eſt corpus illud quod vocat varicoſum pyramidale, ſpermatici vafis deferentis continuatio, quæ teſtem conſtituit, Epididymis eſt corpus oblongum vermiculare, ſupra teſtem extenſum.

Pag. 93. *V*ſus paraſtatũ eſt eo ſenſu quo accipiuntur à Bauhino, vt ſemen nondum elaboratum è vafis praparantibus, in ejaculatoria delabi non ſinant, vel in ſemen praparatum ad perfectam elaborationem teſtium, irradiatione adiuuante perducant, ſiquidem ſapienter ſem ne reſerti reperiantur, ita vt teſticulos luceat appellare ad teſtium differentiam, dein vt impediatis, ne libido vehemens erebræque exciſetur. Falſum eſt in paraſtata, ſive epididymide vt accepit, ſemen elaborari & contineri, proptereaque impropiè vocatur teſticulus, nec inhibere poteſt vehementem erebramque libidinem. Iſtæ opinio maniſeſtè repugnat doctrinæ Galeni, & omnium Anatomicorum. Admittit quidem, & tranſmittit, ſed non eſt promiſcendus ſeminis.

*Tunica Teſtis.*

Pag. 55. **D** *V*as tantum proprias teſtium tunicas conſtituit, alioquid ſive erythroidem, & albugineam. Prima à peritonæo proceſſibus enata, externis ſiſtis quibuſdam membranæ, vt aliqui peculiarem tunicam cenſuerint, data connæſcit, & nonnullis ſiſtis utraque vaginalis commiſſatur. Hinc quandoque exigua fibra carnoſa aſſundantur, unde erythroides dicitur, hæſique fibræ aliquæ alteram propriam tunicam facientes erythroidem vocant, & ab elicoide diſtinguunt. Ex hoc diſcurſu maniſeſtè conſciſcit Bauhinum confundere voces illas, elicoidem, erythroidem & clythroidem vſurpat pro eadem parte, nec putat veras eſſe tunicas, ſed tantum fibrulis à proceſſibus peritonæi

enatas elycoïdls, siue elythroidis tunica est interior, testem obuoluens, à productione peritonæi formata, cui superiecta est altera exterior erythroidis à musculo cremastere coufque protensa enata.

### Cremaster.

Pag. 96. **M**usculus cremaster pars videtur esse transversus ex fibris rubicundis carnosus & rectis constare, potius oritur ab infima parte musculi obliqui ascendentis iuxta spinam infernam & anticam costæ Ossis Ilium: Sed male scribit testis capiti tantum adnasci, cum tamen instar vaginæ inuoluat testem, nec potest tangere caput, propter elythroidem subiectam.

### Testis.

Pag. 97. **V**isus testium est facultate sua insita semini non tam formam & colorem, cum in substantiam testium non incidat, quam nomen & vim prolificam tribuere. Attamen certum est seminalem materiam traduci per medium testem, ex doctrina Hippocratis libro de Genitura, & recentiorum Anatomicorum iudicio, cui meum suffragium addo.

Pag. 97. Denique præstantia Cordi sunt similes, siquidem epithemata cordialia testibus applicata in summo virum languore, non minus quam Cordi adnata præstant. Audiui in febribus & sanguinis æstu, ad contemperacionem frigidâ, vel oxyerato frigidò fouere testes, sed cordialibus epithematis ibi admotis Cor recreari, non credo, neque à peritis practicis laudari id remedij genus, nisi fuerit impossitor ludæus, ut Zacutus, qui suis epithematis gemmas, & lapidem Bezoardicum addit.

Pag. 98. Continuatur vasa præparantia, parastata, & vasa deferentia, quibus pro vario officio, & suis nomina imponuntur. Attamen istæ partes & substantia, & officio, & situ inter se distinguuntur. Hæc vasa præparantia cum vase eiaculante continuantur, non cum parastata.

Pag. 98. Vasa vasorum deferentium est semen in parastatis elaboratum, à testibus prolificum redditum, ad parastatas tanquam in promptuariâ quadam deferre. Id valdè probò, modo in toto illo ductu vsque ad prostatas semen prolificum contineri admittas.

### Vesica.

Pag. 102. **A**seuerare possum certa fide, arterias umbilicales nihil conferre ad suspensionem vesicæ, quia non pertingunt, nec ad umbilicem in adultis, & puerperis mulieribus, nec tangunt corpus vesicæ.

Pag. 103. Vesica fibras obtinet carnosas, tum ob custodiam, non solum caloris aliâs imbecilli, cum vi versus suam originem contracta, musculorum paruarum instar vesicam constringant. Quis vnquam dixit fibras ad custodiam caloris conferre, & paruorum musculorum instar contrahi? non assignat earum principium.

Pag. 104. Cervix vesicæ sæpe carnea, plurimis fibris contexta est, aliis quidem rectis, sub quibus transversa latitant, sphincterem musculum constituentes, hunc latentem transversum musculum inter fibras rectas tunica exterioris glandularum corpori connatum, qui videre solet, vesicam leuiter eluxit. Inde patet Bauhinum penitus ignorasse naturam & situm sphincteris vesicæ. Nam totus est carnosus, orbiculariter cingens & inuoluens glandulas prostatas duorum digitorum latitudine. Forsan intelligit interiorem sphincterem vesicæ connatum, sed ignorauit externum sphincterem carnosum fascialem.



## De Pene.

Pag. **P**enis non habet nomen à pendendo, sed à cauda, quam veteres penem vocabant, inde penicillus, ex Cicerone, in Epistolis ad Familiares.

Pag. 105. Coitus abstinētiā magnum efficere penem scribit ex Galeno, lib. 6. de locis affectis, cap. 6. circa finem. Cū tamen alibi Galenus dixerit, frequenti coitu vasa spermatica, & penem, distendi & augeri.

Pag. 106. Penem ex tribus ligamentis constiit, quæ ab inferiore Ossis pubis parte, & superiore coxendicis parte ortum ducunt, quibus tertium nervum & candidum interiectum est, quæ cum canali penem efformant. Nesciuit Bauhinus, ligamenta penis enascl à tubere Ossis Isehij, & superne delata, Ossis pubis affixa & reuincta, derineri ab alio ligamento lato nerveo, quod illis non est interiectum, sed potius superiectum.

## Vrethra.

Pag. **V**rethra membrana duplici donatur, altera interna tenui, ex tenui meninge nervus penis conuolvente enata, alteram habet externam carnosam ex fibris transuersis, ad seminis & urinae expulsiōem constam. Sed quo modo penis nervi duo, qui percrepant eius longitudinem parte exteriori Vrethrae interiori tunicam producere possunt, si illa à tenui meninge producit, quidni & reliquæ membranæ quæ nervos accipiunt ab eadem non orientur? Cū describit pagina 109. nervos penis ab Ossis Sacri medulla prodeuntes, eos in partes externas diffeminari, non autem Vrethram subire statuit. Neque tamen rectè proponi progressum duorum nervorum penis: nam duo sunt, utrimque vnus contigui partem penis exteriorem percrepantes cum venis & arteriis.

## De partibus genitalibus Mulieris.

Pag. **M**ulieribus parastatas adeo exiguas esse statuit, vti illas dari non immerito negarim. Foran per parastatam muliebrem intellexit corpus varicolum, quod semen elaborat cum teste muliebri, pag. 19. at nullas parastatas testibus mulierum ineumbentes reperies.

Pag. 114. Muliebrem testem scribis carere pluribus membranis, unica tantum cingi, quæ dartos dicitur Galeno. Nec vnquam ita appellari tunicam testis muliebris reperies apud Galenum. Nam homini tantum competit, propagatà à communi tunica membrana.

Pag. 117. Vas eiculatorium secundum Veteri latera ad eius cervicem utrimque inter duas tunicas fertur, & infra Os interius sub ceruice in prostates inseritur, quæ non ita ut in viris sunt conspicua, cū feminarum semen non sit corpulentum, quæ semen ad tempus coitus conferant. Dubitat, si portio vasis eiicantis ad cervicem delata, sit soboles vasis eiicantis: an prodeat à tuba Vteri. Mulieres carent prostates glandosis, ne quidem exiguos instar pisii conspicias: ac proinde in iis non accruatur semen muliebri, & istud vasculum eiicatorium ad cervicem Vteri productum est propago vasis eiicatorij.

Pag. 121. Ligamentorum inferiorum Vteri usus est, Vterum ne extra pudendum excidat suspensum tenere, quemadmodum cremasteres in viris testes suspendunt. At cū ab Vtero oriantur, & in partes inferiores extra septum abdominis descendant, quomodo suspendere & reuellere possunt Vtrum proeidentem. Imò potius impediunt, ne in violentis motibus hystericiis sursum attollatur, vel oberret quoquoque uersum.

Pag. 121. Quatenus ligamenti inferioribus fibra carnosæ intertextuntur, catenus motui inferire volunt, & virilis seminis attractionem voluntariam à collo in Vteri capacitatem adiuuare. Possuntne ligamenta hæc mouere Vtrum per eius depressionem, ut semen virile exfugat? antea impediabant Vteri prolapsum, ergo duobus modis contrariis inseruiunt.

Pag. 123. *Intra uteri grandi in Fœtra substantiam fungosam plurimas venas & arterias sparsim per eas disseminari. Verum est substantiam uteri carnosam, fungosam esse, sed per eam nullas venas disseminari reperiens. Nam à partibus infernis iuxta veram cervicem, sanguis in partes superiores distribuitur, per canales & tubulos intra uteri substantiam exsculptos, ac proinde vasa desinunt paulò supra cervicem.*

Pag. 123. *Fibra carnosæ inter membranas uteri feruntur, quæ ipsius parenchyma constituunt, quæ uteri calor ad conceptionem augeatur, quibus forsè muscutorum instar, uterum motui voluntarius excutatur. Si carnosus est uterus non indiget fibris carnosis, aut ex iis solis conglobatus est: fibræ omnes debent esse nervæ ad robur, siue carnosus partibus conueniant, siue membranosis. Deinde quis vnquam dixit, uteri motum esse voluntarium?*

Pag. 124. *Hypogastrica vena ramî uteri substantiam ingreditur, cum superioribus à spermatica procedentibus ramis cœunt, & oscula interiorum uteri cauitatem subeunt, quæ cotyledones, seu acetabula dicuntur, quibus in conceptione Hepar vterinum, seu secunda adhaerens. Denudò repeto, falsum esse venas, tam spermaticas, quàm hypogastricas disseminari per uteri substantiam. Ac proinde cotyledones non possunt esse oscula vasorum uteri cauitatem subeuntium. Sed placenta seu corpus vterinum parietibus uteri affixum, exsugit sanguinem ab ipsa uteri substantia fungosa, & sanguinis plena, alioqui in partu euulsa placenta, ex oculis vasorum refertatis sanguis affatim, & qua data porta impetuosè rueret.*

Pag. 125. *An mensium tempore sanguis vitalis redundans expurgetur, ignorare se fatetur: quidni, cum ille per hypogastricas arterias utero distribuitur? sed tollit istam dubitationem circulatio sanguinis.*

Pag. 126. *Cornum uteri vsus est, ut uterus propter Fœtus commoditatem capaciòs reddatur, cum hisce duobus angulis, tanquam duobus basiis, duo Fœtus inniti videantur. At tamen in grauidis mulieribus vsque ad parturitum tempus, cornua uteri remanent æqualia, & quo magis ascendit uterus, eò magis descendunt, ut prope cervicem utero adstare videantur.*

Pag. 128. *Quo semen exceptum faciliùs retineretur intra canalem cervicis, inferiori eius parti tuberculum oblongum additum, quod foramen exquisitissimè occludit, & in mulieribus similem vsum præstat, atque in viris caruncula, extremitatibus vasorum etiaculantium apposita. De isto tuberculo primus egi, & exemplum propoliis dubitando, an semper tale inueniatur, accuratius inuestigandum, sed malè si similem vsus ei tribuit, qualem habet caruncula extremitatibus vasorum etiaculantium apposita, quia nulla vasa occludit.*

## Hymen.

Pag. 131. *Pudenter admittit Hymenem, membranam virginis custodem, sed imperitè scribit vocari Hymen, quasi limen. Nam Hymen per excellentiam membrana virginis nota nuncupatur. Hymen dixit in neutro genere imitatione istius vericuli,*

*Et magnum crimen perturbare Virginis hymen.*

## Clitoris.

Pag. 135. *Constat clitoris ex tribus corporibus, quorum duo lateralia ligamenta dicuntur, ab ossibus ischijs inhere interno enata, Tertium medium & candidum à supra parte communianis Ossium pubis nascitur. Rectè quidem scribit de duobus lateralibus ligamentis, sed medium & tertium ligamentum quod est latum adstringit, firmatque duo ligamenta circa symphysem Ossium pubis, & respondet ligamento tertio, quod lateralia: duo ligamenta penis virilis Ossibus pubis simiter affigit, proptereaque corpus clitoridis ex duobus tantum ligamentis constatur, quorum structuram & compositionem ex me deprompsit.*

Pag. 137. *Labra pudenda scribit esse carnosæ, quodammodo glandulosæ, spongiosæ, quibus aliqui musculos duos adscribunt à penis sphinctere enatos. At nullo modo labia deprehendens glandulosæ, sed tantum pingua cum isto musculo, quem potius labium*

Nan

destinare quàm clitoridi, atque musculorum clitoridis, vt & labij pudendi pri-  
mus auctor & inuentor fui.

### Podex.

Pag. 139. **P**odex tribus donatur musculis, quorum unus est orbicularis sphericus, alij duo la-  
terales, & laterales sibi: Sed nullo modo oriuntur à ligamentis pubis, sed  
coxendicis & Ossis Sacri internis partibus affixi, ad marginem ani descendunt, at-  
que si diligenter inspexeris, & secueris musculos ani, duos sphincteres reperi-  
es, & quatuor leuatores ani, vt in *Antropographia* demonstraui.

### Lien.

Pag. 143. **L**ien non recipit arterias à celiaca, sed habet insignem sibi peculiarem, quæ  
varicosa ambagiosè progreditur ad Lienem, & priusquam ingrediatur  
parenchyma, iungitur per anastomosim venæ splenicæ.

Pag. 143. Lien membranam habet unicam tenuem, ab omenti membrana, qua Lienis  
reliqua linea innasitur, & à peritoneo fuit producta. Ridiculum est omentum à perito-  
neo enasci, & inde produci istam membranam, satius est dicere à prima confor-  
matione ad natam fuisse hanc membranam, cum eius propagatio à peritoneo; vt in  
Hepate non possit demonstrari. Attamen per fibrulas ligamentosas Lien annectitur  
peritoneo, qua parte Diaphragmati superius iunctum est.

### Hepar.

Pag. 148. **H**epar sub Diaphragmate situm est, digiti circiter transversè distantia, ne ipsius  
motum impediatur. Imò Diaphragmati affixum & appensum est Hepar, quod  
motum Diaphragmatis sequitur, in suo situ continetur per tria ligamenta, quæ re-  
cte descripta sunt à *Banheo*, p. 150. Vnde cognosces per primum & latum ligamen-  
tum, Hepar Diaphragmati adherere, sine digiti distantia.

Pag. 151. Diligenter notanda est insignis illa anastomosis, quæ canalem amulatur, &  
velut communis & continuus ductus existit, qui stylum satis magnum admittit, à quo  
in omnes undique, tam Cava, quàm Porta vene fibræ minimas via patet. Si talis repe-  
ritur anastomosis, nullo modo dubitandum erit de concursu & vnione ramulorum  
Portæ & Cava intra Hepar. Cum isthæc prior anastomosis sit sufficiens ad illam  
communione & commeatum sanguinis, & impuritatum: Sed non reperitur ille  
ductus cuique venæ communis.

Pag. 151. Scribit arterias paucas & exiles à celiaca sumam tantum Hepatis partem  
percurrere, cum connexa pari à perpetuo Diaphragmatis motu, tanquam stabello ventiletur:  
quali verò Diaphragma stabellatione sua calorem natium partis conseruare possit,  
vt arteriæ, quæ palpiratione sua nullam ventilationem excitant in parte, sed mo-  
tu suo expellunt sanguinem arteriosum. Adde quod Diaphragma non mouetur in-  
stabilis, quia sistitur & retinetur per illam adhesionem mediastini, præterea ie-  
cur ferè immediatè adheret Diaphragmati cum exigua distantia.

Pag. 151. Nervis duos paruos icuri tribuit à sexto pari, quorum alter à stomachico pro-  
dit, alter à ramo, qui costarum radicibus dextri lateris exporrigitur: Ergo ambo nervi  
non prodeunt à sexto pari, cum stomachicus sit soboles sexti paris, sed costæ  
lis differt à stomachico, nec oritur à sexto pari: Sed à Cerebro vertebra inferioris  
cervicis perreptando, ad radices costarum duabus vel tribus fibrulis adiu-  
ctus sub pleura traductus penetrando Diaphragma, iungitur stomachico, & am-  
bo constituunt plexum neruotum inter duos renes.

## Cystis Fellea.

Pag. 155. **A**N cystis felleis duplici constet tunica, una propria, altera communi à peritonæo, diligentius inquirendum.

Pag. 156. In poro bilario valvula tres bilis regressum impediens sita sunt, & mensura communis per quem natura post bilis fractionem, eam ad intestina transmittit: Canalem communem vocat camparterem, in quam canalis cysticus, & canalis Hepaticus, velut in vnum mentum ad canalem Hepaticum fere medium conueniunt, & in intestinum iclium infiguntur. Falsum est valvulas in poro bilario cystico reperiri: est quidem angustus & varicosus prope cœuicem: sed nutare valvulas non licet, bilis regressum impediens, canalis quoque communis fictitius est: Nam bilis ab Hepate recto tramite decurrit, per canalem Hepaticum in ieiuni principium. Alter canalis angustior cysticus, à cysti fellea productus inferitur, in medium canalis Hepatici, & bilem alteram in cysti collectam transmittit. In descriptione vesiculæ felleæ, & expurgatione bilis multa de promptu ex *Isabina*, quæ confundit cum *Laurentio*, præsertim cum agit de canali illo communi, quasi tertius esset ab aliis duobus distinctus: quin etiam picturas *Isabina* de vero situ & valis vtriusque bilarij, atque bilioli humoris proposuit, nulla facta veri authoris mentione, à quo etiam *Piccolominus* veram bilis expurgationem de promptu, iuxta *Fallopj* observationem.

## Ventriculus.

Pag. 160. **A**D ventriculi latus sinistrum sub Diaphragmate, cavitas membranis inclusa accurrit, quam forte Hippocrates intellexit, dum inter ventriculum pituitam collecti scribit, quæ dolorem adferat, exitum non habens ad ventrem. At malum solui, ubi pituita per venas ad vesicam mittatur. His verbis agnoscitur *Bauninum* non intellexisse sensum *Aphorismi* 54. sect. 7. Nam cavitas inter septum & ventriculum pituitæ plena, nihil est aliud quam omentum glomeratum versus Lienem, in quo pituita multa cumulat.

Pag. 162. In pyloro intus sicut præter fibras transversas, circulus crassior & spissior, musculus orbicularis forma, sphericiter seu modo circumciscitur. Verè scribit circulum crassiores intra pylorum. At circulus iste cum nihil aliud sit, quam orbiculus membranosus, existens similis valvulæ coli intestini, merito valvula pylori dicitur.

Pag. 163. Ventriculi exterior tunica communis respectu aliarum à peritonæo prodeuntium, crassissima est, cum ab ea omenti superior membrana prodire debuerit: At ipse *Bauninus* dixit cum *Laurentio*, esse illam, quæ utrum succingit.

Pag. 163. Admittit venas quæ sparguntur per ventriculum suis osculis intus foris humanis, chylis tenuiorem portionem exagere, & deferre ad truncum portæ, sine ulla transiitione per intestina & mesaraicas venas. Quod si verum est, quidni Lien propinquior quam Hepar, & qui plures à ramo splenico ventriculo suppeditat venas, serofos & superfluos humores, siue aquositates ebibet?

Pag. 165. Nervi stomachici complantantur, ut veluti plexum reticularem iuxta dorsum vertebrae supra renes consueuant. An is quem Fallopius ad basim Cordis collocant, ut inde in partes adiacentes sarcula distribuatur? Nescit *Bauninus* duplicem esse plexum retiformem nervuorum, vnum infra Diaphragma iuxta renes ex stomachicis duobus & binis costalibus constatum: alterum intra thoracem sub basi Cordis, ex isdem stomachicis contextum, à quo nervi in partes vitales distribuendi deprimuntur.

Pag. 169. Male describit circumferentiam inaequalem Osii ilium, spinam dici. Cum tamen costa nominari debeat, cuius extremitates acuminatæ & protuberantes, spinæ dicuntur.

## De Thorace.

Pag. 175. **A**mbitus exterior thoracis, ut voluit Hippocrates, magnitudinem Cordis sequitur, non hoc dixit Hippocrates, sed Galenus, in commento, ad particulam lib. 6. Epid.

Pag. 181. Glandula quæ mammarum corpus constituunt, non sunt totius corporis maxima, nec earum una maior sub papilla sua est, nec papillæ substantia peni similis est, quia corpus mammarum ex substantia dura & spongiosa constitutum est. multis glandulis, cæralorum nucleis similibus conspersum, substantiam papillæ constituit sola complicatio cutis, quæ tribus vel quatuor foraminibus pertusa est, nec potest Balano similis esse, quia toto genere differunt inter se.

Pag. 184. Quadratus musculus, seu platysma myodes, non est buccis & labiis communis, sed maxillæ deprimendæ inseruit, cum eius basi tenacissimè adhzreat.

## Musculi Intercostales.

Pag. 185. & 186. **M**usculus intercostales rectè constituit internos & externos: Internos ab inferiorem costarum parte superiore, ad superiorum costarum partem inferiorem contrahit, quam exteriores ductu ferri. Sed in usu musculorum intercostalium assignando graviter errat, dum omnes thoracem deprimere, seu contrahere scribit, tantum ad dilatationem facere per accidens. quatenus musculus intercostalis, carnosus sunt ligamenta. Hoc posito malè describit ortum musculorum intercostalium. Nam externi ut interni à parte superiore costæ infernæ enascentur, si in subsidium Diaphragmatis veniunt, & Diaphragma contrahatur in expiratione, rectè derivantur à partibus infernis, sed cum Diaphragma moueatur in inspiratione, & costas inferiores nothas deprimat, non possunt omnes oriri à partibus infernis. Invalida sunt rationes, quibus vitatur ad demonstrandum eorum musculorum intercostalium ab inferni partibus. Prima est, quod nullum instrumentum voluntarium potest locum, in quo continentur dilatare, aut costam à costa seicungere, nec costas attollere possunt, cum musculus costas attollentes extra thoracem sit sint, si aliunde eorum habeant. Verum est ambos musculos intercostales non posse dilatare costas, quibus interiecti sunt, sed externus primus attollens primam costam, & reliqui externi costas attollent consequutione quadam, & adiuti à musculis maioribus externè collocatis. Sic interni deprimendo thoracem costas dilatabunt, quoniam ex reuulsis & adductis, supernè deorsum deprimuntur abductæ, & sic dilatatis musculis, & disiunctis costis, verum est musculum non enasci, & inseri à parte mouenda, sic origo externi & interni intercostalis distincta est, ratione costarum, dum vnus oritur à parte inferna vnus costæ, & inseritur in partem supernam alterius costæ.

Pag. 190. Nescio an cartilaginem xiphoidem vnquam viderit duplicem, in modum herbæ hypoglossi, ut maiori partì minor incumbat.

## Diaphragma.

Pag. 194. **D**iaphragma dum quiescit sursum elatum manet, ut in corporibus mortuis videre est, magnamque cavitatem repræsentat in ventre. Vbi vero agit & contrahitur, deorsum fertur. Verum est, concauum esse Diaphragma intra abdomen interuentu mediastini reuellentis, & suspendentis Diaphragma: Concauitas illa maior est in mortuis resupino corpore, ex incumbente & propellente Hepate: At in viuentibus, & erecto corpore, exigua adesse concauitatem verisimile est, propter pondus viscerum dependentium ab ipso Diaphragmate, & eum agit & contrahitur, ex concauo efficitur rectum, tumque reuellit, & infernè trahit nothas inferiores costas, inspirando.

Pag. 194. *Si demonstret eorum musculi Diaphragmatis à lumborum verticbris, & finem cum tendinem in parte nervosa & media, istud axioma myologicum proponit: Cum omnia musculi capite suo alieni rei inniti debeant, & plerumque à parte immobili reperiantur, & in partem immobilem implantentur.* Hoc est planè ridiculum & ineptum. Nam om-

nis musculus qualiscunque in partem mobilem implantatur, ex eius doctrina, capite de multis abdominis, cum agit de origine recti musculi.

Pag. 191. Diaphragma præter duas membranas, vnam à peritoneo, alteram à pleura, quibus utrinque obuelatur, nullam habet propriam, vt ab omnibus aliis partibus propria circumscriptione distinguatur, quicquid scilicet scripserit Bauhinus.

Pag. 196. Scribit nervus diaphragmaticus cum ramulis neruorum, in maxillarem & labiarum musculis distributos permisceri, unde ex Diaphragmatis percussione, risu Sardonium oboritur, quia musculus faciei, & labiorum conuelliuntur. Valde dubito, an obseruauerit istam communionem, certo scio musculos faciei, & labiorum conuelli in spasmo cynico, quirisum Sardonium præ se fert à neruo tertie coniugationis, qui per foramen inferioris orbitæ traductus, ramulosè spargitur in totam faciem, vnde go se & o versus foramen orbitæ, cessat omnis conuulsio Galenus accusat, & authorem facit spasmu canini, musculum latum, lib. de musculorum dissectione.

Pag. 196. Vfus primarius Diaphragmatis est, vt sit respirationis libera organum, fibra namque aequaliter retractæ, trahunt omnes costas mendoas versus thoracis centrum, sicque extrema thoracis ad vertebra trahunt, & partem inferiorem constringunt, quare tenditur & attollitur, & expirationis ingruit: Elic in motu perpetuo contractum & tensum apparet, cum expiratione vita cesset, & si thorax intercostalis, aut Diaphragma perforetur, statim flaccidum deorsum concidit. At fibrae laxati decumbunt, mendoas enim costas laxantur, & infima thoracis, & consequenter pulmones dilatantur, & inspiratio fit. In his verbis maxima confusio & contrarietas apparet, nescit quid scribat, vult enim Diaphragma ratione situs & originis costas constringere, & deorsum trahere, attolli & extendi in expiratione, dum conuulsu redditur, non tam vt ipse potat ex sepi cum mediastino colligatione, quæ fortè naturalis esse possit, quam ex proprio motu, postea laxaris fibris scribit Diaphragma decumbere, & infima thoracis dilatari, & inspirationem fieri. Deinde nunquam obseruamus in perforatione thoracis, siue casu contingat, aut fiat ad puris euacuationem, Diaphragma concidere, & viscera ab ea dependentia propendere.

Pag. 197. Alter usus est, hypochondria ventilare, maximè Hepar, cum conuexa sui parte arteriis carcat, & etiam vaporibus humidis in inferioris ventris capacitate contentis, ne quiescentes putrescant, cuius nomine Hippocrates inferioris ventris respiratorium vocauit. Impossibile est Diaphragma cum Hepar habeat sibi reuinctum, vt hypochondria & præsertim iecur ventilet: Nec ventilatio defectum arteriarum supplere potest, neque enim fluxu & refluxu instar flabelli mouetur Diaphragma, & cum ventris respiratorium dicitur ab Hippocrate, non flabellationem solum intellexit, sed transmissiorem aeris in cavitatem ventris inferioris, quia porosum est, & aer cuncta rerum permeabilis.

### Pleura.

Pag. 198. **P**leura substantia peritonæo similis, sed robore & crassitie nonnihil id superans: est vbiq; duplex, quæ inter utramque intercostalia vasa tussimè ferantur. Nunquam obseruauit pleuræ substantiam crassitie & robore superare peritonæi membranam, quæ quidem vbiq; duplex est, non autem pleura, cuius duplicatura non apparet, nisi in mediastino, alibi non potest diuidi in duas membranas, ac proinde intercostalia vasa non traducuntur intra duplicem membranam pleuræ, nec inter eas duas tonicas materia pleuritica colligitur, vt opinatur Bauhinus.

Pag. 198. Quemadmodum muscoli intercostales aliorum musculorum instar, propriam membranam obtinent, periosse innumeris venulis confersa cinguntur. Quis vnquam dixit musculos intercostales periosse cingi? aut mendum est insigne, aut nomen costæ deest, quod tamen emendabitur in editione noua.

Ordine sectionis post mammæ, detracto musculo pectorali, & resecto sterni, vbi fuerit Diaphragma inspectum & administratum, muscoli intercostales explicari debent, & demonstrari, reuulsa pleura, quem ordinem non seruauit Bauhinus.

*Mediastinum.*

Pag. 199. **M**ediastini membrane pleura tenuiores sunt & molliores, ut Cordis musculus facilius sequantur, cavitatem intra se constituunt, quæ in canibus capaciore est, nullis tamen fibris intertexta: At robore sunt æquales mediastini membranae, cum mediastinum nihil sit aliud, quam utrinque reduplicata pleura. Mediastini cavitatis non potest esse capaciore quam in homine, quia facta fuit ad continendum Cor, quod est grandius in homine, quam in cane, proptereaque rectè scripsit mediastinum inferuire ad suspensionem Cordis, quatenus pericardium eius membranis includitur, & adhærescit.

Pag. 200. **I**ntra duplicaturam mediastini infra Cor iuxta dorsum, nervi stomachici feruntur, qui sub vasis Cordis plexum nervosum constituunt, quem ab intercostalibus nervis efformari quidam volunt. Super eare nihil statuit Bauhinus, ego scripsi à stomachicis nervis constari plexum nervosum. Fallopius ab intercostalibus, qui tamen ab exortu suo perreptant costas, sine vlla propagine, aliunde transmissa ad plexum illum constituendum, quem reperies intra duplicaturam mediastini infra Cor, & extra pericardium.

*Thymus.*

Pag. 201. **F**ateor equidem Thymum venæ Cavae superiicis, sed subterni, nunquam vidi.

*Pericardium.*

Pag. 202. **P**ericardium ex tunica duplici constat, siquidem instat aliarum membranarum duplex est, altera exterior à mediastino, altera interior à tunica vasorum Cordis producta, siquidem vasa hæc toto illo spatio, quod est inter basim Cordis & pericardium, communi hæc tunica à pleura destituuntur. Fateor pericardij membranam produci à mediastino, & cum mediastinum sit reduplicata pleura, secunda tunica interior nulla esse potest, quia si producitur à vasorum tunica communi à pleura deprompta, ea deberet esse externa, cum vasa intra pericardium ea careant, quis enim admitteret aortam intra pericardium tunica communi succingi, & venam Cavam eadem velari, quæ penetrato Diaphragmate sese insinuat in pericardium. Adde quod ipse Bauhinus facit vasa hæc toto illo spatio, quod est inter basim Cordis & pericardium, communi hac tunica à pleura destitui.

*Observatio nova.*

Pag. 205. **I**ntra Cor anteriori & interiori Cavae parieti membranam quandam vult appositam Eustachius, quæ ad medium foraminis in multiplices fibras desinat, quæ variè complicata reliquum semicirculum compleant, & toti foramini sine coniunctione obducantur, quo abruente materia impellitur & repelli possit, quæ tamen aliquando contextu fibrarum destituatur, & quasi cornuta Luna speciem quemadmodum in coronaria referat, quæ etiam aliquando adeo est parva & angusta sit, ut quasi nulla sit, prætereatur, quæ ratio ut hanc nondum observavimus. Ergo si Bauhinus nunquam observavit istam membranulam, ridiculè depingit tabula octava appendicis Iconum Anatomicarum. Nec ego unquam observavi, nec exstare puto, & absurda penitus hæc descriptio: Forasan intelligit Eustachius valvulam illam membranosam, quæ obturat orificium venæ Cavae ad apertum in arteriam venosam, quæ membrana interdum penilis exsiccata remanet in adultis. Forasan intelligit Eustachius, reticulatam membranam in auriculæ limine appositam.

*Azygos.*

Pag. 207. **D**e exortu venæ azygi in brutis animantibus ex Eustachio rectè deservit, sed non intelligo, nec observo, quæ recitat ex Fallopio, de altera venâ azygo sinistra, quæ à ramo subelavio ortum ducit, cuius distributio in partes inferiores confusè admodum & obscurè proponit, & si talis reperitur, ta-

rissima est, & præter naturam, propterea moneo Anatomicos, ut & tempus & operam non perdant in istis ramis perquirendis.

Pag. 208. *Dexter venæ azygæ prope Diaphragma bifida varus, aliquando supra emulgentem venâ Cauz iungitur, rarius emulgenti, communiter in ultimam lumbalem implantatur.* Si hoc verum, quomodo per vrinæ empyicorum purulentia expugari potest. Aliam causam huius connexionis proposui in *Anthropographia*.

Pag. 209. *Pernegat Bauhinus, valvulam adesse in istâ venâ azygæ, Riolanum assertorem proponit, nec refellit, quomodo meam opinionem ad verbum transcripserit: sed qui diligenter & accuratè principium azygæ emergentis à trunco Cauz inspicere, manifestè deprehendit, duas valvulas sursum reflexas, affatim irruenti sanguini obistere, nec impedire eius refluxum.*

### *Iugulares Vena.*

Pag. 211. **I**ugularis externa prima numeratur à Bauhino, tanquam prima in exortu suo à ramo subclauo: eum tamen iugularis interna præcedat origine & situ iugularem externam. *Falsum est internam iugularem à veteribus in apoplexia tantò & fortissimè in istâ fuisse, infra maxillæ inferioris angulum, quia profunda est, nec tactu aut visu deprehendi potest, quia tegitur musculo mastoideo, & cum habeat neruum sextæ coniugationis & carotidem contiguam, tutò nun potest secari, propterea veteres tantum secuere iugularem externam, quæ sese prodit & exierit, iuxta angulum inferioris maxillæ.*

### *De Nervis Thoracis.*

Pag. 213. **S**tomachicus dexter latus sinistrum, quemadmodum sinister dextrum petit super *æso-phago*. Falsum est stomachicos nervos sese decussatim interfecare, nec sinister dextrum latus petit, dexter verò sinistrum, iunguntur quidem & communicant inter se, sine vlla tamen decussatione, & lateris mutatione: Verum est costalem neruum concurrere simul cum stomachicis, ad plexum neruorum constituendum iuxta renes, sed insignem ramulum ad resles transmittit intra duplicatam peritonæi supra muscolum ploam, qui inferitur in testis substantiam: inde consensus testium cum pulmonibus, & transeundo, colo intestino ramulus suppeditat. Inde post diuinum dolorem colicum raucedo sequitur.

Pag. 213. *Costalem ad secur diffundi, & peruenire scribit.* At supra dixit iecur nervos habere à stomachico, distributionem costalis nervi in omnes partes ventris inferioris describit, ac si vidisset, cum tamen omnes nervi à plexu illo iam commemorato deriuentur.

### *Cor.*

Pag. 215. **E**xpende, an rectè dicatur Cor respirandi instrumentum. Ideoque primum erit mouens pulmones, quod videtur desumptum ex *Aristotele*.

Pag. 216. *Cardis mucro antrosum infra laeuam papillam exporrigitur, itaut certilagine colla sexta & septima sinistri lateris, ubi sterno articulantur, inuicente quidem rectâ in priora respiciat. At paulo post scribit, Cor in medio tanquam in loco nobiliori basi suppositum esse, cono suo centrum Diaphragmatis pertingente.* Non potest mucro, siue conus læuam papillam ferire, & ad centrum nerueum Diaphragmatis pertingere.

*Ibidem.* Rarum est, sed non lethale, si Cor feriat latus dextrum pectoris, & situm mutet. Id visum in quadragenario, qui sanus ad hoc tempus vixit, & hoc vidi in Regina Matre Regis Ludouici XIII.

Pag. 217. Si magnitudo Cordis non omnibus eadem, quomodo inaequalem istam magnitudinem potest describere, qua longitudine sex digitos transuersos aequat, latitudine quatuor, quemadmodum & altitudine.

Pag. 218. *Sæpe in dissectione Cordis ventriculis, in ipsorum cavitatibus frustula quedam, si non adipis, saltem adipi simillima obseruamus, itaut magis mirum sit, quomodo is ibi concresecat, quam is qui supra Cor ipsam.* Mirari desinet, qui sciet concretionem illam adipis mortis causam esse, eamque substantiam concresecere intra vasa, extra septum Cordis, &



vbi irrepsere in sinus Cordis, vbi mortem repentinam adserunt, vel ægrotantes cum animi deliquio continuo moribundis, sine pulsû per aliquot dies decinent, donec Cor enitens excutere istud onus conciderit, obritum & suffocatum.

Pag. 218. *Per venam coronariam anima naturalis in spiritu naturali insidens, in Cordis substantiam cum omnibus suis facultatibus perfertur. Quasi Cor fons vitæ, indigeret anima naturali, cum spiritu naturali: quænam hæc sarrago loquendi, & philosophandi?*

Pag. 219. *Si Cor facultatis vitalis sedes & origo, spiritus & sanguine arterioso sit referunt, indigebatne arteriis ad conservationem caloris nativi. Imò potius ad nutritionem externarum partium, ut sanguis arteriosus cum venoso permisceretur, indiguit arteriis, quia solus venosus non nutrit.*

Pag. 219. *Nervus qui suppeditatur Cordi, nunquam tamen si raro, repente obstruitur, unde repentina & impropinqua mors sequitur, prædixit, & vitali, & pulsifica facultatibus, in Cor permeare inconueniens. Ego vitalis & pulsifica facultas non est insita Cordi, defluit à Cerebro per nervum. Banhius in scholia secunda editionis iniquè fert, quod à Riolano reprehensus fuerit, quia Piccolomini sententiam refert, nec ex sua loquitur: reprehendere Piccolonium debuerat, aut abstinere ab ea opinione, quam non improbauit, quoad nervum in hac secunda editione emendauit, ut omnes intelligerent huius nervi obstructionem non posse inferre mortem repentinam, sed monitus à Riolano.*

Pag. 221. *Dilatatur Cor, quando mucro ad basim rectis fibris retrahitur, tumque breue quidem redditur, sed Cordis latera ita discedunt, ut quasi sphericum appareat. Contrahitur vero quando mucro à basi discedit, & tum Cor productur quidem, sed angustius enadit: At supra pag. 217. mucronem quiescere scripsit, nec villo modo moueri, quo fibra, inquit, perpetuò motu principium immobile habeant, mucronem scilicet, cui inter mouendum iuntescunt: Præstat autem ut mucro quiescat, cui fibra iuntescunt sit vnus, quoniam sanguinis & aeris receptio in parte superiore perficitur, quænam hæc contrarietas?*

Pag. 221. *Adiuuant non minimum, imò omnium maximè totam præpmodum efficiunt contractionem, ligamenta robustissima, qua in intimis ipsius Cordis ventriculis tenduntur, utque dum contracta confident, etiam Cordis tunicis intus simul contrahere possint, desinunt namque ligamenta ad medium septum, roboris & alterius usus gratia. Quæ sint illa ligamenta non exponit, nec alia esse possunt quàm valvulæ tricuspidales membranosæ & fibrosæ, columnis carnis affixæ, quæ eodem enascantur à cono, & inferantur valvis materiam ad Cor deferentibus, retrahunt basim ad conum: per Tunicas, intelligit credo valvulas, nullæ sunt aliæ.*

Pag. 224. *Motus Cordis in sinistro eius ventriculo originaliter residet, quare dexter ventriculatio non indiget, nisi à sinistro communicata, argumento sumta vasa, qua à sinistro ventriculo oriuntur, quibus solum vis pulsifica communicatur, motus vero qui in dextro apparet, similis est ei, qui in auriculis Cordis apparet, qui potius sit, quod pars vicina moueatur, aut ex sanguinis agitatione, quam quod facultas illi assilias.*

Hic absurda multa reperio. Nam motus Cordis in dextro potius originaliter residet, quia vltimus mouetur & moritur, deinde vena arteriosa palpitat, quæ cum à dextro ventriculo prodeat, vnde motum istum mutuetur? Dubitant Anatomici, an arteria venosa pulsum habeat. Præterea, cum dexter ventriculus magnam copiam sanguinis hauriat, necessariò debuit magis dilatari, ac proinde moueri, quàm sinister ventriculus. Adde quod dextra auricula etiam vltima micare deprehenditur extincto motu sinistra auriculæ.

Pag. 226. *Valvularum alia ab exteriori initio in Cordis ventriculos feruntur, ad quas etiam ligamenti fortibus ad septum maximè versus mucronem annectuntur, quo in dilatatione Cordis ligamenta tensa trahunt ad se, & velut resupinant valvulas ad Cordis corpus. Ergo in dilatatione Cordis basis trahitur ad mucronem, si valvulæ cum ligamentis trahant versus mucronem, ac proinde mucro non accedet ad basim, sed immobilis quiescet.*

Pag. 227. *Foramini vena Cava ab Hepate ascendente, quam primum hæc in dextram auriculam degenerat, membrana arisfy & admirationis plena præficta est, qua illius anteriorem & dimidiatam partem occupat, & deinceps reticulum efformat, quemadmodum Eustachius notauit, at eius vena Cava officio in ipso ventriculo membraneus circulus Cordi robur*

præbens adnascitur, qui antrosum procedit, & non prout à principio in tres valvulas truncos spides scinditur. Iterum moneo me dubitare de ista membrana reticulari intra venam Cavam ad introitum auriculæ circumfensa, atque membraneus iste circulus sit ex concursu trium valvularum tricuspidum.

Pag. 228. *Causam adfert ex Hippocrate, cur vena arteriosa tunicam habet arteria, ne dexter ventriculus, qui sinistro minus calidus est, æque ac sinister refrigeretur. Quare aer solum ad reficiendum dextri ventriculi spiritum intrat. Falsum est ab Hippocrate causam istam fuisse assignatam, atque ætrem dextrum Cordis ventriculolum subire ad dexteri ventriculi spiritum reficiendum, aut ambo ventriculi æquè conferant ad spiritus vitalis elaborationem, aut ær solum defertur ad sinistram ventriculolum.*

Pag. 229. Scribit arteriam venosam pulsare, licet nemo sensu deprehendere possit, quia tamen sinistro ventriculo continua est, inde coniecturam aliquis fecerit: sed tunicam non habet arteria, & vis pulifica per membranas arteriarum transfunditur, ex Galeno.

Pag. 410. *Vena ad orificium huius, id est, venæ arteriosæ, de qua prius agebat, & Aorta occurrunt utrinque vasis coniunctis, intercedente satis magna & crassa partícula, quæ in Fœtu perforata erat, & canalem constituēbat. Fallitur Bauhinus, nec enim Aorta iungitur cum arteria venosa per canalem, sed cum vena arteriosa.*

Pag. 210. *Observavit Bauhinus, ab arteria venosa ventriculo sinistro egressa rami in sinistram supra pulmonem sinistram delatam & reflexam, secundum arteriam magnam latam sinistram descendente sub Diaphragmate, in emulgentem implantari. Fatetur id semel à se observatum, & propterea rarum & insolens, de quo certa scientia tradi non potest.*

Pag. 212. *Arteriarum duabus tunicis Galenus, aliam quæ tunicam menitur, addit, quæ interna superius telis araneærum persimilis, & in magnis arteriis circa originem maximè conspicua. Illam tertiam tunicam nunquam mihi contigit videre, in tres pelliculas, diuidendo corpus arteria, sed interior non est araneærum telis similis.*

Pag. 211. *Negat asiculum in hominis Corde reperiri, cum tamen in senibus ex radice, seu origine Aortæ indurata & ossæ exurgat, & id sæpius occurrat, mihi plusquam vigesies observatum.*

Pag. 234. *Si Cor & Arteria momento moueantur, quomodo fiet attractio & expulsio à Corde in arterias eodem momento. Nam istæ duæ actiones attractio & expulsio alternatim fieri debent, & quando Cor expellit, arteria excipitur, ergo ve Cor dilatatur, dum excipit, sic quoque arteria, ac proinde contracto Corde dilatantur arteria.*

### De Anastomosis Vasorum Cordis in Fœtu.

Pag. 236. **P**rimorum gratia constructas esse vasorum Cordis Anastomoses putat in Fœtu, cum Cor non moueatur, pulmones tamen augeri & nutrirī oportuerit: Sed in Autopsiographia demonstravi Cor moveri, & Anastomoses illas vsum habere ante perfectam & absolutam Cordis conformationem, dum nondum excavatum est, & in ventriculos discretum.

Pag. 236. *Fateri rarissimum esse, utramque Anastomosis in adultis remanere, sed ea quæ sit à vena Cava cum arteria venosa sæpissime, ne dicam semper ad aperta remanere, quamvis secus sentiat Bauhinus.*

Pag. 237. *Ad inspectionem & demonstrationem Anastomosis aorta cum vena arteriosa, quæ sit per canalem, non debet dissectari Aorta, sed citra dissectionem manifestè spectatur in extis vitulorum euidentiùs, quàm in Fœtu humano.*

### Aorta eiusque Rami.

Pag. 238. **I**ntercostrales arteria inferiores, utrinque ad octo inferiorum costarum intervalla mittuntur, nec tamen inferioribus costis distribuuntur, sed etiam superioribus, quæ ad claviculas, propterea quæ non rectè scripsit à subclavi quolibet, intercostalem superiorem tribus quatuorve costis superioribus distribuī.

Pag. 238. *A tenui minore Aorta, utrumque insignis producit ramus, qui ad sui lateris costam primam sub clavicula fertur: Quare subclavia arteria dicitur, dein totum truncus in duas carotides abit. Ergo ab Aortæ ascendētis trunco procedunt duæ subclaviæ arte-*

riz, & duz carotides, quod est falsum, postea scribit *subclavia dextra ab Arteria carotides scinditur*, quasi subclavia duas carotides proferat: at illas à trunco oriri scripsit. Magna confusio in descriptione arteriarum superiorum.

Pag. 239. Cervicilis retrò versus corpora vertebrarum prodit, nunquam à carotide, quæ est antrorsum sita, poterit enasci, *quamvis aliter sentiat Bauhinus.*

Pag. 239. & 240. *Ascendentes trunci reliquam aspera arteria incumbens, iuxta claviorem sterni partem thymo suffultum, adhuc in thoracis caute in duos ramos impares scinditur, quos carotides, seu spirales vocant.* Inde manifestè liquet, ex ignorantia Anatomies, inconstantia Bauhini, qui modò à subclavia, modò à trunco, carotides enasci scribit, vel multiplicat.

### Pulmones.

Pag. 240. **P**ulmones quamvis folle per asperam arteriam indito inflari possint, vix tamen tantum spargi, vi in vasis apertis, quod experimentum proponit Aristoteles, vi demonstret aërem non penetrare ad ventriculos Cordis, sic inflati pulmones totam thoracis capacitatem replent.

Pag. 240. Pulmones ad thoracis latera fibrosis nexibus ab asperum membrana productis, (quod in homine naturaliter tanquam in sapientissimo animalo servatur) pluræ adnascuntur, quod pulmones, qui ex sese motu omnis experies sunt, thoracis motum facilius sequantur: At sæpe deprehenduntur pulmones liberi solutique omni vinculo ad costas, & Diaphragma: Nec tantum in homine isthæc adhæsiō pulmonum ad costas reperitur, verumetiam in animalibus, & si in homine reperitur, non id contingit, quod sit animal sapientissimum.

Pag. 241. Falsum est pulmones, thoracis motum fuga vacui sequi, quatenus distento thorace, & inspiratione venter impleti dilatantur, eodemque contracto, & expiratione enacati contrahuntur. Proinde natura necessitatem motus pulmonum agnoscens, ne percusso thorace aer per vultum ingrediens, pulmonum dilatationem, quæ vacui fuga si penitus impediatur, eos plenus adnasci voluit, ut sic pulmones necessario thoracis dilatationem sequantur. Ergo in brutis pulmones adhærere debent costis, ut sequantur motum thoracis, si fugâ vacui, distenduntur pulmones ab inspirato aëre, sed à multis dubitatur, an pulmones motus initium præbeant thoraci, an vero thorax pulmonibus?

Pag. 244. *Nervi pulmonum carnem non attingunt, ne ex aliâno motu dolcant, & lesentur.* Imò dissimulantur per carnem pulmonum, ne membrana succingens pulmones, ex continua collisione ad costas doceat.

Pag. 246. De vasorum tunicis intra pulmones incipit philosophatur, scilicet vena arteriose tunicam esse crassam ac densam, quod nihil nisi tenuissimum clavisinat: cùm enim pulmones sint in perpetuo motu, magna copia hauriunt sanguinem, nisi venæ corporis exsudationem impediret, arteriæ vero corpus tenuissimum est, quo sanguinem copiosissimum ac spirituosum abundantè tribuant. Ergo totus sanguis arteriosus confluit in pulmones, per ténertudinem arteriæ venosæ, cùm tamen corpus deberet esse crassius instar reliquarum arteriarum, ad impediendum nimium affluxum.

Pag. 246. *Savilem dubitationem monet Bauhinus, de motu vasorum Cordis intra pulmones, sed valde obscura est eius expositio, nec quidquam definit, & resolvit: statueret aliqui vasa Cordis intra pulmones, scilicet arteriam venosam, & venam arteriosam moveri simul cum Corde, ita ut duo hæc vasa in dilatatione Cordis simul dilatarentur, & delerent aërem in utrumque ventriculum ad Cordis refrigerium, in contractione Cordis affatim effusum & ejaculatum sanguinem per systolem transmitterent in omnes pulmonum partes: sed hoc aduersatur circulationi sanguinis per pulmones.*

### Oesophagus.

Pag. 252. **O**esophagus ad nonam vertebra thoracis, membranarum beneficio sublimè & 253. *admodum elevatus supra arteriam magnam, nec in crassorum ciborum transitum iam comprimit, & circa undecimam thoracis vertebra ventriculi orificio sinistro, non dextro implantatur. Suspendio hæc oesophagi quam fingit, non reperitur. Implantatur autem ventriculi orificio superiori, quod est sinistrum, dextrum est pylorus. Reliquis diuiset ventriculi orificium superius & inferius.*

Pag. 252. & 253. *Oesophagi substantia inter carnem & neruum media est, tribus donata tunicis, una communis, & duabus propriis, prima à ligamentis vertebrarum enata, quæ duarum propriarum inuolucrum existit, tertia est interna & dissimilari substantia, ipsa externa membranosa durior.* Multa hic reprehendo. Imprimis quod oesophagi substantia tota est carnosa, tunicam habet communem non à ligamentis vertebrarum enatam, sed à pleura, quamvis intra mediastinum sit inclusus oesophagus, tertia tunica & interna si sit nervosa non potest esse dissimilari substantiæ, & si sensibilibus externa, non est credibile duriorē esse & membranosiorem, cum enim sit tenuissima, ortum habere crediur ab ea tunica. quæ os, palatum & fauces subiungit.

Pag. 254. *Oesophagus venas habet paucissimas à Cava, & vix à Porta ramo coronario.* Imò quandoque continetur intra thoracem supra Diaphragma, non potest furculus venæ coronariæ irrigari.

### De Pericranio.

Pag. 169. *Pericranium Pericranij à dura meninge non bene intelligit, neque describit: Nec enim à dura meningis processibus tanquam scutioribus membrans, seu potius ligamentis suturas cranij transcurrentibus consistit, quæ hinc & inde sibi mutuo occurrunt, & exaltantur, & ex ipsius omnibus cothinnis membrana sit.* Nam videre est in infantibus vsque ad biennium, suturas cranij nondum inter se dentatim confertis, per ea intervalla Ossium produci pericranium, duræ meningi continuatum: sensim progressu ætatis, ubi hæc Ossium intervalla dentatim inter se per foruras striatius committuntur, rescatur ista continuatio, remanente dura meninge iuncta & suspensa intus ad futuras, sine vlla productione ad partes exteriores.

Pag. 170. *Rectè pericranium membranam in cranio, distinguit à pericranio, quamvis Fallopius & Laurentius aliter sentiant.*

### Sutura.

Pag. 172. *Sutura propria sunt duplices, vel vera tres, vel mendosa sex, communes autem quinque sunt.* Numerus iste suturarum admitti non debet, quia contra Galenum, & ipsam rei veritatem. Sunt enim propriæ quinque tantum, tres veræ, coronalis, sagittalis & lambdoides: duæ mendosæ quæ temporales dicuntur, circumdantes Os temporale, propterea quæ hæc sutura non potest, nec debet in tres partes dividi. Communes verò suturæ sunt tres, sphenoides, frontalis, & ethmoidica. Istas suturas copiosè demonstravi in commentariis ad Galeni librum de Ossibus, quas in plures portiones frustra sciat Bauhinus, cum sint omnes continuæ, atque similis naturæ.

### Ossa Cranij.

Pag. 178. *Ossa cranij in propria, & communia dividit, propria sunt sex, communia verò capitæ cum maxilla superiore duo sunt, cuneiforme & spongiosum.* Sed spongiosum, siue ethmoides non meretur magis nomen communis Ossis, quàm frontale, quod separatur sutura communi frontali, & Ossa maxillæ eiusdem tangit, sed nullum est, æque commune ac sphenoides, quod tangit Ossa maxillæ, & terne omnia Ossa cranij, exceptis duobus Ossibus incipientis.

### Os Frontale.

Pag. 178. *Inu fatū ampli, inter utramque tabulatam Ossis Frontalis supra nasum in superioriorum regione, ut plurimum geminis, interdum membrana viridi succialli & separati, quæ corpus molliusculum & medulliosum, ac veluti oleosum continet, sunt foramina, & in variam amplitudinem desinentia, & unum quod in calvariam desinit, statim supra septum Ossis spongiosæ, quo assallus organa distinguuntur. Sunt qui velint à materia contenta, quæ veluti oleosa est, per foramen, quod in oculi angulo maiore est, transire, oculum humectat, & lubricum reddi, quod æquissime mouetur.* Tota hæc narratio falsa est, nec enim istud corpusculum medulliosum, ac veluti oleosum, viridi membrana fuccinatum, inter alius frontales reperitur, qui nulli sunt in pueris vsque ad decem vel qua-

tuordecim annos, & in adultis sæpissime deficiunt. Cùm exstant, duobus foraminibus pertusi sunt in nares, foraminulum illud quod est supra cristam Galli, non est peruium in sinus frontales, sed inseruit firmiori adhesioni sinus longitudinalis duræ meningis: deinde nulla materia oleosa ab istis sinibus frontalibus potest destillare in oculos, per foramen lacrymale, cùm foraminula sinuum frontaliū nullam habeant communionem cum foraminibus lacrymalibus oculorum, per quæ humor aqueus, materia lacrymarum, si intra orbitam superfluat, vel exstulat transcolatus per glandulam lacrymalem extra oculos, dum quis lacrymatur, vel sine lacrymatione sub coniunctiua per foramen lacrymale in nares delabitur, nec alio humore præter adipem circumfusum oculus rigatur.

### Os Occipitale.

Pag. 181. **I**n describendo Osse occipitali, sinus nonem habere, interius septem, exterius duos semicirculares. Debebat dicere fossas, ut exemplo. *Syluy & Laurentij*, sinus distingueret à fossis, & foraminibus, ne isthæc nomina quæ res diuersas significant, confundantur.

Pag. 182. In Osse occipitis præter processus, seu capita, quæ excipiuntur à cauitatibus primæ vertebra, processus paruus affurgit, ut à prima vertebra excipitur. Quid intelligat *Banbini* non capio, quamuis nitatur auctoritate Anatomicorum. Nec enim iste processus paruus in Osse occipitis occurrit, ut à prima vertebra excipitur, præter istos duos processus, qui coronæ occipitis dicuntur, nec alius processus reperitur.

### Os Temporale.

Pag. 183. **I**n Osse temporali tres processus constituit, duos externos, & tertium internum, qui 284. **I**n infantibus Os labyrinthi nominatur, quod squammosis subicitur, & articulari agglutatur, ut tandem coeat. Rectius dixisset esse epiphysem in pueris, Os nempe separatum, quod tandem in apophysim, seu processum degenerat in pueris, usque ad septennium: stylo ferreo & acutissimo euellitur facillè, eoque extracto comparet tota auris structura. Inde manifestè liquet, istud officulum ignotum fuisse *Banbino*.

### Os Sphenoides.

Pag. 185. **I**n Osse sphenoidis, siue basilaris parte externa versus palatum, clauum, ossum 285. **I**ste scribit, & Os longum latumque, in ortu cartilagineum affigi, quod cetero in atro vomeri præcænti simile est. Ergo os *Vomer* portionem Ossis basilaris constituit, cùm tamen sit Os distinctum & separatum, etiam iudicio *Faloppi*, quod refert ad maxillam superiorem, & pro vndecimo Osse impari recenset.

Pag. 185. In Osse sphenoidi sinus sunt exsculpi extrinsecus & intrinsecus, ad sinum infundibuli, & glandula pituitaria, unde postea in palatum ac nares defluit. Ab hoc enim sinu ad latera vitæque canales gemini superficie tenui solum cavi prodeunt, quorum superiores antrorsum ad secundum amplius foramen peringunt, per quod lacryma in oculos stillant, & pituita quæ hinc per quartum foramen, quod in oculi sede est, vel ad nares, vel ad fauces fertur: Per inferiores verò pituita in rimam, quæ inter Osse petrosâ scincipitis & canisformis sita, & inde in palatum destillare creditur. Nunquam intellexit *Banbini*, quod scripsit: Nam canales istos vtrique geminos debebat monere esse productiones ipsius choanæ, ex tenui meninge formatas, per quos canales pituita destillat in fauces, & palatum, nullo modo ad nares & oculos.

Pag. 186. Falsum est cauitates Ossis sphenoidis, quæ sinus propriè dictos constituunt, cernissimâ membrânâ repleti, eo modo quo cauitates geminae frontis, & quæ in malis sunt. Et hæc vel vacuæ sunt, vel in iis viscida pituita continetur. Ergo viridis erit membrana huius sinus sphenoidis, ut in frontali, & corpus contentum erit medullosum, ac velut oleosum, quod est plant falsum.

Pag. 186. Cum dixit *Galenus*, Os sphenoides cribri modo perforatum esse, intellexit foraminula sella sphenoidæ accumbentia. Non autem perforantia tabulatum: sic enim per eiusmodi foraminula, in palatum & fauces delabitur pituita, & cùm *Galenus* ignorauerit istos sinus, siue cauitates Ossis sphenoidis, non est verisimile eum intel-

tellexisse pituitam, per foraminula primæ tabulæ transcolari & asseruari in istis sinubus.

### Os Ethmoides.

Pag. 288. **O**s Ethmoides, ratione productionis Officæ & spongiosa intra nares, spongoides dicitur ab Hippocrate, quia foraminulentum instar spongiæ, sed non posset propter duritiem pituitam conseruare & retinere, nisi cauernulæ istius Ossis spongiosæ, refertæ essent carunculis spongiosis, ad retentionem pituitosi humoris, de quibus carunculis primus monui, & polypum ibi generari.

### Cerebr. Meninges.

Pag. 289. **C**rassa meninx à calvaria, quemadmodum & à Cerebro tantum distat, quantum pericardium à Corde, cranio tamen tenuibus membranisque fibris ab ea enatis, validissimè connectitur, quæ per capituli suturas foras excidunt, sibi quæ mutuò occurrunt, ut pericranium procedunt. Si crassa meninx à calvaria tantum distat, quantum à Cerebro: Ergo suspensa tenetur ut pericardium, quod distat à Corde, ratione aquæ, quam sua capacitate continet, crassa meninx immediatè involuit Cerebrum, & cum eo attollitur, proptereaquæ impedire non potest motum Cerebri. Fateor tenuibus membranisque fibris adnecti cranio per futuras, sed in adultis non transeunt, & egrediuntur foras ad constituendum pericranium, cuius propagatio à dura meninge in craniis infantibus perquirenda, priusquam futuræ dentatim arduissimè cõmittantur.

Pag. 290. Crassa meninx duplex, quemadmodum & cætera corporis membrana, cuius superficies, seu pars exterior, quasi tendo quidam latus alteri expausus, ac connatus videtur. Interior verò superficies splendida, lavis, lubrica multoque candidior, omni adipe destituta, ut quæ parte Cerebrum spectat, magna sensu palles, quæ verò cranium, minori sensu prædita est, cum Ossis duritiem attingere debeat. Quamvis prima meninx sit crassa ratione alterius tenuioris, non potest tamen in duas membranas diuidi sine laceratione frustulatim facta. Nec superficies euulsa tendonem quendam latum referre potest, nisi velit intelligere superficiem istam amulari aponeuroses musculorum obliquoꝝ descendentiũ abdominis: at superficies crassæ meningis tota est perfusa venulis, quales non reperiuntur in istis tendonibus latis musculorum abdominis. Non debet notare interiorẽ superficiẽ omni adipe destitui, quum ne quidem guttula in vlla parte superficiei externæ reperiatur. Præterea, cum crassa meninx sit corpus continuum & indiuiduum, peræque sentire videtur, tam foras, quàm intus, ideoque exterior superficies minore sensu non est prædita.

Pag. 290. Credit crassam meningem reduplicari in capitis vertice. & Cerebrum in dextrum & sinistrum, & Cerebri medietatem. siue corpus callosum separare. Certum est duram meningem dum sese insinuat intra Cerebrum, simplicem esse, non duplicem, proptereaquæ non potest dici reduplicata.

Pag. 291. Qua parte cerebellum à Cerebro distinguit, imò & cerebellum integrit quadruplicatur, vel si maius triplo, quàm in reliqua sede crassius, duriorque. Non intelligit, quid sit quadruplicatio crassæ meningis in occipitio, quemadmodum enim crediderunt Anatomici, crassam meningem, medium Cerebrum secantem, & penetrantem duplicari. sic in ea parte qua diuiditur Cerebrum à Cerebello, quadruplicari. Itaut vtrimque sit duplex. At duplicari tantum obseruo, vel vtrimque simplex appareat, quia Cerebrum partem inferiorem cerebello incumbentem non succingit, solumque cerebellum crassa meninge obvoluitur, proptereaquæ quadruplicationem perperam interpretatur, de crassitie & duritie triplo maiore.

### Sinus crassa Meningis.

Pag. 291. **C**onstatem communem torcular dici scribit, unde tanquam ex torculari sanguis è venis & arteriis effusus, in vniuersum Cerebrum exprimitur. At venæ fugulares inter hæc sinus non subeunt, ergo sanguis arteriosus inde deriuari potest.

Pag. 291. Tertius sinus, qui veluti vnus sanguinis existit, & interdum à Galeno vena nominatur, alii Herophilus torcular censetur, restat secundum capitis longitudinem sub sagittali sutura delatus, hic triangulum referret, nisi parte superiore semicirculum imitaretur. Et nunc

enim quemadmodum & duorum priorum cavitat, duas costas introsum, tertiam vero extrosum curvatos habent. Quot verba, tot errores, nihil enim statuit de sinu, qui nominari debeat Torcular, & malè longitudinalem sinu in Galea venam vocari scribit, cum ipse Galenus, lib. 9. de usu part. intellexerit venam, quæ quartum sinum constituit, ex concursu trium conflatum, quæ quidem vena supra cerebellum excurret ad medietatem Cerebri, vt constituat plexum choroideum. Quæ subiungit de figura triangulari & semicirculari sinus longitudinalis, adeo sunt obscura & falsa, vt à perito Anatomico non dico demonstrari, sed ne quidem intelligi queant.

Pag. 292. Quattuor sinus triangulo trium equalium cystarum introsum curvatarum correspondet. Non capio istam similitudinem, atque istius canalis cavitates est rotunda.

Pag. 293. Horum sinusum usus est, & vena & arterie officium prestare, quare & sinus his arteriarum instar pulsant, venas & arterias excipere, ipsarum materiam quam continent in se recipere. Si sanguinem venosum & arteriosum simul contineant, & sinus ipsi venarum naturam referant, quomodo pulsare possunt instar arteriarum. Proinde sanguis arteriosus permixtus venoso, eandem pulsationem in venis excitaret, vt facultas pulsfica ex Galea infusa est tunicis arteriarum, atque nullæ arterie in istos sinus tradatur. Quare Cerebrum proprio motu elevationis & depressionis attollitur & exprimitur, atque pulsatio procedit ab arteriis, quibus confecta est crassa meninx.

### Tenuis Meninx.

Pag. 294. Tenuis meninx choroidea, id est, secunda, siquidem chorio permissis sit, quatuorvis hæc similitudo proposita fuerit à venteribus, non est legitima, quia chorion membrana Foetus, est crassa & venulis conspersa, tenuis meninx tenuissima est, & nullis venulis conspersa.

Pag. 294. Quomodo autem crassa plurimum à tenui distet, & quanto intervallo scire volueris, foramine facto in crassam introducta fistula susflaminabis, & regionem ei subditam accehand medice impleri conspicias. Verum est crassam meningem separatam esse à tenui, spiritus quoque in eo spatio contineri: proinde non mirum si in petexile foramen intrusa fistula, & infusata distendatur.

### Vena & Arteria Cerebri.

Pag. 295. Fecit venas & arterias per Cerebrum diffeminari, sed iugulares externæ, perreptant dumtaxat partes externas crani, sola iugularis interna subit, & ingreditur sinus: proptereaque frustra scribit iugularis externa portionem, per temporis Ossis foramen iuxta mammillarem processum, crassa membrana sinum subire, & pagina 296. falsa scribit eiusdem iugularis externa arteriam, ex narum amplitudine per cribrosi Ossis foramen, in crassam quoque membranam distribui, quia nulla venula per cribrosi Ossis foramina in Cerebrum ascendit. Recte notavit ex cervicali nullam portionem ascendere ad ipsum Cerebrum, & vtrumque in sinum crassæ membranæ desinere.

Pag. 296. In hominibus rete ex arteriis contextum, nisi reuera detur, inique tamen notum est, sed respectu brutorum, potius umbra quidam est, & arteria in hac propagines non absunt. At tamen pag. 297. paululum superius progressa vtrunque arteria prima, vtrunque bipertita confluunt plexum choroideum, qui ex quatuor arteriis componitur. Arrete mirabile ad basim Cerebri in circuitu sellæ sphenoidæ, & potissimum supra nervos opticos: expansum spectatur, ex furculis quatuor cavosarum arteriarum inuicem implexarum contextum. Atque plexus choroidea formatur à venis magna, quæ quartum sinum constituit, & diffundit sanguinem venosum & arteriosum è torculari depromptum in penitiores Cerebri recessus, ad nutritionem omnium interiorum partium Cerebri, qui sanguis diffusus per anfractus eximi Cerebri non eò peruenit.

Pag. 297. Verè scribit in Cerebro, & eius membranæ, venarum & arteriarum distinctum esse distributionem, quam in ceteris corporis partibus, ubi vena arteriam perpetuo habet comitem. At in Cerebro venarum officia deorsum spectant, arteriarum sursum, quia venæ rigide Cerebrum laudabili iucca, arteriæ spiritum continent, qui obstituit aë facile ascendit. Vt autem vena officia haberent deorsum, debuerunt prius ascendere, per duræ meningis duplicationes. Falso scribit venas ascendere per duplicationes crassæ meningis, vt quoquoersum in parte s

inferiore distribuuntur, cum venæ iugulares terminentur in principio lateralium sinuum, nec excurrant per istos sinus. Venulæ quæ à sinu longitudinali prodeunt, sunt propagines istius sinus, vel potius canales ex tenui meningē efformati: proptereaquæ *Pelops, Galeni Præceptor*, cum videret istas venas nullam habere communione cum aliis, venas omnes à Cerebro oriri credidit.

Pag. 298. *Præter venas & arterias, Cerebrum priuatum vas habet, sinum crassā membranæ, qui sanguinoductus dicitur, & arteria instar vi ab arteriis accepta pulsât, in quem venæ tres & arteria una materiam effundunt. Sicque sinus pro vario ipsius incasso, in quatuor sinus diuiditur, qui venis caluariæ petentibus capaciores, & nequaquam venarum modo teretes sunt; cum horum canaliculæ triangulæ speciem exprimat, qui tribus costis longitudine paribus, & in illar quattuor partes circuli incuruati constant, à quibus rami, seu ductus venis similes pulsant, & sanguinem, tam vitalem, quàm naturalem in Cerebri substantiam distribuunt. Quot veiba, tot errores. Nam non duæ tantum arteriæ suum sanguinem effundunt in istos sinus, sed quamplures à rete mirabili prodeunt, & sparæ per duram meningem eò ascendunt, neque pulsant sinus, vi ab arteriis accepta, vt supra monui, quia pulsatio duræ meningis, deceptit Anatomicos, neque tres venæ subeunt istos sinus: Sed tantum vtri inque iugularis internæ portio, neque sinus isti sunt triangulares, sed rotundi, & si ab iis ramuli, venis similes pulsant, sanguinem tam vitalem, quàm naturalem per anfractus Cerebri deferunt, aut sanguis vterque permixtus erit intra sinum, aut secretus distribuetur, non per propria vascula, sed per ductus venis similes, atque isti quatuor ductus funguntur officio venarum, ac proinde nullæ aliæ venæ per duram membranam disseminantur, nisi nouæ derivatæ ab istis sinibus.*

Pag. 299. *Cerebri propugnacula plurima, capilli, cutis crassissima, pinguedo, carnea membrana, pericranium, petrosium, caluaria. Recte quidem, si demas pinguedinem, quæ nulla subiecta est cuti in hac parte.*

### Cerebri diuifio.

Pag. 303. *Cerebrum mediante crassa meningē duplicata, qua falcem messoriam refert in elatore eiu parte, per totam longitudinem in partes duas aequales, dextram & sinistram, vsque ad ipsum callosum corpus, instar alicuius septi diuiditur: diuifionis vsus est, quod sinus crassæ meningis, vnde exigua vasa prodeunt, quæ per anfractus percrepant, tuto serantur, quò alimentum in Cerebri substantiam dispergatur. Diuifio quidem fuit in duas partes Cerebrum, vt portio duræ meningis simplex, non duplicata sese insinuaret vsque ad callosum corpus, vt suspendat tectum, seu fornix anteriorum ventriculorum, atque ita descendens, & insinuata crassâ meninx, facilius sustinet molem, & amplitudinem Cerebri: Dein verò substantia exterior mollis sic difelusa, facilius sustinetur, & à compressione defenditur: proinde diuifionis vsus non est ad faciliorem distributionem sanguinis, & sinus longitudinalis commodiorem situm.*

Pag. 305. *Non repudat diuifionem illam substantiæ & medullaris Cerebri, in corticem, & veram medullam. Cortex corpus est cineritium medullam proximè ambiens: Medulla corpus est medium & candidum, quod intra corpus cineritium est reconditum, & solidius. Sed non probo corticem & medullam actu separari, si deus caput hominis sani repente interfecit, & dextrè mox dissecetur.*

Pag. 305. *Non est verisimile venas per Cerebri medullam mollem, ceream deferri, & transire, potius sanguis roris modo destillat in subiectas partes, quod compressâ Cerebri medullâ cognoscet.*

### Callosum Corpus, & Psaloides.

Pag. 305. *Audio plurimum, callosum corpus, pituita ex Cerebri superioribus partibus destillare excipere, & in anteriora derivare. Sic enim nullus humor excrementitius in cavitates Cerebri destillat, sed lateraliter in anteriora decurrit, propterea crederem duplicem humorem excrementitium in Cerebro gigni, alium supra callosum corpus exilto cortice cinericio superimposito, qui per nares expurgatur, alium medullaris substantiæ solidioris, qui ex ventriculis destitit in choanam, & per palatum expurgatur, alioquin si tota pituitosa materia, quæ per nares vberim profuit in coryza manaret ab ipsis ventriculis, non posset non offendere ventriculos anteriores Cerebri.*



Pag. 305. Notabis corpus callosum, & Psaloides idem esse, extinguentis callosum dicitur, intusfecus Psaloides, quamvis aliter sentiat Bauhinus, & cum illis Allostomichis in re errauerit, contra doctrinam Galeni.

Pag. 308. Foramen natus Picolominus, quod sub processibus mammillaribus medium sit, & biatum, cuius pari unata ventriculi anteriores exporrigatur, altera in palatum in pulmone, quod plerisque incognitum sit, nec conspicuum fieri, nisi in cerebris sanis: unata vita priuata, & max diffecta. Foramen illud fictitium est, nec reperitur, quia ventriculi anteriores non sunt peruij antrosum, à parte inferiore suscipiunt aerem, si necessarius sit ad confectionem spiritus animalis.

Pag. 309. Si corporis psaloidis substantia, est callosi corporis instar, cuius pars existit, & durior, cur tenui membrana nullibi obducitur, ut iudicauit Bauhinus, atamen supra teuoluta tenuis meninx obducit instar parietum ventriculorum anteriorum. Huius suppositi psaloidis corporis productiones posteriores deorsum reflexæ, nonnæ cauitates constituere videntur, quas ventriculos Hippocampi ab animalis forma, nominauit Arantius: Sed demonstrari alibi istam comparationem inanem, & falsam esse, quia aliter structi & conformati pedes Hippocampi, atque eiusmodi productiones sunt portiones anteriores neruorum optidorum, qui oriuntur ab anterioribus ventriculis Cerebri.

### Plexus Choroides.

Pag. 310. **P**lexus choroides, non tam à chorio membranâ Foetus, cui similis perhibetur, nomen habet, quàm à textura admirabili venularum, quæ tanquam in choro iunctæ & vnitæ, mirabilem hanc structuram effingunt: Est ille plexus dumtaxat venosus, nec vllas arterias admittit, ut putat Bauhinus, sed sola vena magna, quæ quartum sinum constituit, plexum choroidem producit, in his plexibus spiritus animales excoqui, archuari & præparari, alij in rete mirabili inchoari, in his absolui & perfici volunt: super hac difficultate nihil statuit Bauhinus. At opinor ego ad solam nutritionem partium inferiarum & cauitarum Cerebri, plexum illum formatum, cum solum sanguinem venosum contineat, nisi permixtus sit arterioso, manante à sinu longitudinali, vnde torculari.

### Conarium.

Pag. 311. **N**on tantum glandula pituitalis, sed alia quoque partes Cerebri in brasis, multis maioræ sunt, quare in vitulorum capitibus inuenire solemus, quò ad hominum Anatomem aptiores deducantur. Imò omnes Cerebri partes, cum sint minores in vitulo, minùs patent, ac proinde non leue discrimen in eiusmodi partibus cernitur. Nec ex inspectiõne Cerebri vitulini perfectè cognosci potest structura Cerebri humani.

Pag. 312. Conarium glandulam nuci pineæ similem, penis figuram perbellè exprimere volunt nonnulli, quibus Cerebri penis dicitur, quia non improbauit hanc comparationem. Bauhinus videtur approbare, quamvis sit ineptissima.

### Nates Cerebri.

Pag. 312. **N**ates quæ sunt parua eminentia subiecta glandula pineali, rectius cerebello remoto conspiciuntur, & nonnulli, testes quæ sunt parua eminentia subiecta natis ipsi continuari volunt, & lineatantum per transfusum lata diuidi. Nates possunt perfectè conspici nullo modo remoto cerebello, aut distracto: Testes autem sunt parux eminentiæ subiectæ natis, à quibus sunt omnino separata, & in cerebro vni verso, dum more Varoly Anatomem administramus, spectantur è diametro oppositæ coniunctiõni neruorum optidorum, & constituere videntur terminos anteriores choroæ.

Pag. 213. Natus usus est Cerebri molem sustentare, ne ventriculus testius, seu meatus exterior quartum accedens comprimatur, sique spiritus animalis transitus præbeatur. His enim eminentiis per medium diuisis, altera tertij ventriculi parti sub testibus sita, in posteriorem ventriculum desinens conspiciuntur. Fateor utrumque nates caulem à tertio ventriculo in quartum continuantes molem Cerebri sustinere sed thalami neruorum optidorum, maiores illæ eminentiæ in medio Cerebri vtrinque sitæ, instar columnarum, totam molem sustentant.

*Ventriculus quartus.*

Pag. 313. **V**entriculus posterior quem quartum Anatomici vocant, omnium minimus, & subtilissimus est, cuius cavitatis inferior & posterior, in spinali medulla est, cunicularem habens veluti sectionem, quem sinum Herophilus cavitati calami, quo scribimus assimilauit. Certum est ventriculorum quartum maiorem esse tertio, vt dignosces ex administratione Cerebri vniuersi. Tertius enim est tantum canalis interiectus, duabus illis magnis eminentiis, quæ Thalamos neruorum opticorum constituunt, ad quartum ventriculorum protensus, propterea non est omnium minimus quartus: Nec intelligo, quo fine subtilissimus sit. Non intellexit Bauhinus, cur finem quartus ventriculi definientem in spinalem medullam propter fissuram spinali medullæ insculptam, calamo ad scribendum aptato comparauerit Herophilus, est enim fissura similis medullæ bipartite.

Pag. 313. Quartus ventriculus tenui meninge obvoluitur, si credimus Arantio tenui meninge desutitur, contra naturam aliorum ventriculorum, vt spiritus animalis facilius permeet in neruos omnes ad basim circumiectos.

Pag. 313. Hic ventriculus duplex non est, sed simplex, cum ex ipso, vt voluit Galenus, produci debuisset spinalis medulla, quæ simplex est, cum in imo, animali duas facere spinas non fuerit commodum. Fateor ventriculorum quartum simplicem esse, sed spinalis medulla ex duabus partibus, duabusque cavitatibus constata est, vt videre est in hemiplegia. Attamen ita vniuntur inter se, vt intra spinam sint inseparabiles, discrimen autem spinalis medullæ manifestum est, & cum hiato in Cerebro inuerso, & ipse admittit, pag. 328. spinalem medullam duplicem esse.

Pag. 214. Quartus ventriculus, quemadmodum & alij inter dissicandum, aqueum humorem continere conspiciuntur: Certum est in viuientibus hunc ventriculorum quartum debere esse siccum, omnis humoris expertem, cum sit principalissimus ex Herophilo, maiorum virorum & facultatis, vt Galenus loquitur: propterea si in viuientibus influat humor magna copia in hunc quartum ventriculorum, subitæ mortis inenitabilis causa esse potest.

*Glandula Pituitaria.*

Pag. 315. **G**landula pituitaria substantia, ceteris glandulis durior & compactior est. In corpore humano alie glandulæ duriores & compactiores reperiuntur sub mento, axillis, & in inguinibus, in mesenterio, & alibi, debuit esse mollis substantia glandulæ pituitariæ, vt facilius exciperet humorem.

*Expurgatio Cerebri.*

Pag. 1. **L**auda plurimum expurgationem excrementi Cerebri, quod supra callosum corpus generatur, & alterius excrementi quod intra ventriculos cumulat, sed in describenda vacatione excrementi ex cavitatibus Cerebri grauitè errauit: Quæ, inquit, in ventriculis colliguntur, per suum foramen ad infundibulum deferuntur per palatum, vel simplici spintione vel excretionē, nannunquam enim Cerebrum non adeo sanum est, quoniam in ventriculis humida excrementa colliguntur, tenuiora quidem in palatum stillare solent: Crassiora vero in ventriculis collecta, sensim in peluim & infundibulum dilabuntur, inae per canales ad Os sphenoides, per palatum pederentim, & ad nares feruntur. Manifesta hic apparet contrarietas & inconstantia. Nam antea verè scripsit crassius excrementum Cerebri, quod appellat mucum coaceruatum supra callosum corpus, intra fissuram & diuisionem Cerebri in nares deriuari, postea duplex excrementum constituit, tenuius, & crassius in ventriculis collectum, quod sensim in palatum destillat, aliud per peluim & infundibulum ad palatum, & nares. Non potest tenuius & crassum per aliam viam externi, quam per choanam, quæ cum sit formata ex tenui meninge, utrumque duos canales emittit in palatum, per quos destillant excrementa ventriculorum Cerebri.

*Rete mirabile.*

Pag. 316. **P**lacuit mihi Bauhini iudicium de rete mirabili, quod in hominum, ut brutorum ca-  
pitibus reperiri afferit, sed displicet, quod in vitularum, & boam capitibus mole  
maius & manifestius conspici credat. Rete autem illud mirabile scribit non simplex esse, sed co-  
inmodi, ut si vulgaria piscatorum retia plura, alia aliis cumulata supericiat, cui hoc inest  
extrinsum, quod alterna replicationibus, alternis replicationibus sint connexa, ita ut ex ipsis se-  
inuisum nihil omnino capere queas, cum omnia serie continuâ inter se sint connexa. Non in-  
telligo istam nouam descriptionem retis, quæ mihi videtur valde mirabilis, si eo mo-  
do confirmata, nec tamen vnquam similem obseruau.

*Motus Cerebri.*

Pag. 310. **P**rudenter monet Bauhinus, Cerebrum moueri per sui dilatationem & con-  
& 321. strictionem, dum dilatatur ex sinibus spiritum vitalem, & à naribus aerem  
astrahit, ad spiritus animalis refectionem & collodiam, dum verò se contrahit, anima-  
lem spiritum in Cerebri substantia elaboratum per neruos propellit, quo modo autem sanguis  
arteriosus feratur, docet: Spirituosus, inquit, tenuiorque sanguis per arterias carotides à Cor-  
de sursum ad Cerebrum fertur, in cuius crassa meningis subit, dum dilatantur, infundit-  
ur, huius aer inspiratione per naves attractus permiscetur. Fateor Cerebrum moueri per  
sui corporis dilatationem & contractionem, siue eluationem & depressionem, sed  
non potest ex sinibus spiritum vitalem & aerem attrahere, quia nullæ arteriæ sub-  
eunt sinus: Adde quod aer naribus attractus, non potest subire sinum longitudina-  
lem, alioqui continenter permeans, sanguinis fluxionibus faciliem præberet occa-  
sionem. Præterea crassæ meningis sinus, dum dilatantur sanguinem & aerem admit-  
tere scribit, ergo motum habent instar arteriarum, ac proinde facultas pulsifica si  
pulsant, non est insita arteriis, & insluit à Corde per continuitatem eiusdem substan-  
tiæ arteriosæ. Adde quod duplex sanguis intra sinus, huic pulsationi, si spirituosus  
sanguini tribuenda, valde contrarius est. Tandem concludit cum Galeno, quod ve-  
rè Cerebrum contractione trahit, quod est absurdum, nec veritati consentaneum.

*Cerebellum.*

Pag. 322. **C**erebri totam massam in Cerebrum & Cerebellum diuidi cum Varolio censet,  
propter visum & auditum, quia visus substantiam mollem requirit, auditus du-  
ram, quali est cerebellum. Ego verò putarem cerebellum diuim esse à Cerebro, ne  
humorum illuue spiritus, qui continentur in quarto ventriculo, latitante intra ce-  
rebellum inficerentur, aut meatus, qui ab eo ventriculo in neruos feruntur, ad di-  
tributionem spiritus animalis obstruerentur.

Pag. 322. Cerebellum in brutis rotundum & acuminatum, totam ferè occipitis regionem  
occupat, & spinali medulla exiguo spatio, ubi ad medullam constituendam portione præ-  
ber, unitur. Nec tantum in brutis, sed etiam in homine parte posteriore cerebel-  
lum rotundum est, parte anteriore qua iungitur Cerebro acuminatum, & pluri-  
mum confert ad constituendum spinalem medullam, cum eius duæ radices funda-  
mentum habeant intra cerebellum.

Pag. 323. Cerebellum sinum quem cisternam aliqui nominant, habet in medio latum, non  
autem profundum, qui quarti ventriculi elatiorem sedem efficit, cum reliquam sedem tenuior  
meninx obducit, immixtus nullas cauitates vti Cerebrum obtinet, cum tot excrementis non  
abundet, & qua colligit faciliè extrinsecus deponat. Sinus intra cerebellum est ipse quar-  
tus ventriculus, quem cisternam nominauit recte Arantius. Nec sinus ille quarti  
ventriculi elatiorem sedem efficit, sed etiam reliquam structuram huius cauitatis.  
Fateor basim, siue pavimentum huius cauitatis, siue ventriculi quarti tenui menin-  
ge stratum esse, sed Bauhinus antea totam superficiem internam quarti ventriculi  
tenui meninge velatam esse scripsit. Verum est hunc ventriculum excrementis non  
abundare, & si quæ colligit faciliè extrinsecus deponit, alioqui si subsistat ibi, &  
magna copia irruant, subitanæ mortem inferunt, ut antea monuimus: deponit  
autem in choanam excrementa per canaliculum ad finem canalis à tertio ad quar-

tum ventriculū, iuxta scolicoidem apophysim anteriorem, alioqui si obstruatur canaliculus iste, labetur humor in spinalem medullam, & paralytim excrabit.

Pag. 324. *Bauhinus non intellexit, quod Galenus proposuit de membrana tertio & quarto denticulo circumscripta, nempe dissipationem spirituum prohibente, quam potius factam fuisse putat, ad colligationem spirarum processus vermiformis, quam ad eius colligationem ad nates, quos vltus præstare non potest, quia detracto isto velo remanent adhuc spirarum processus vermiformis: Sed nun probō vltum processus vermiformis anterioris spirituum transitus præstare, dum in lumine cavitatis situs, quatenus extensus sit, ingressum occludere, & contractum viam patefacere, imò cum spiritus sint cunctarum permeabiles, processus ille potius a fluxum humorum interciperit viam obturando, attamen consentit *Eauhinus*, vtrumque processum vermiformem, tam anteriorem, quàm posteriorem sustinere cereculi molem, ne obstruatur, ac deprimatur quartus ventriculus. Istud officium præstare non possunt, quia sunt molliores ipso cerebello, & ex spiritis tanquam plicaturis quibuscumque conflati, vt distendi & elongari possint in eleuatione & compressione ipsius cerebelli, quod propter quartum ventriculū facietur *Bauhinus* eundem fuisse, & ex me desumpsit.*

### Spinalis Medulla.

Pag. 325. *S*pinalis medulla in corticem, & medullam diuiditur, siquidem colore & consistencia discrepant: Illa, quæ medullam vndique cingit cineritia est: medulla vero alba est solida, firmior, & compactior substantia, quæ duæ partes in recentibus capitibus, lineæ quibusdam obliquis variis distinguuntur, itaut scalpello separari possint. Monere debuerat talem substantiam intra caput iuxta quartum ventriculū, & in Cerebro inuerso spectari, quæ tamen substantiæ vt internosci, sic nullo modo separari possunt. Sed medulla alba intra corticem inclusa, non est solidior & firmior, sed mollior: nec cineritia albæ pabulum magis iudicari potest, quàm cineritia Cerebri substantia pabulum alterius candidæ, quam includit.

Pag. 326. *Medulla spinalis duplex constituitur potest, altera globosa, altera oblonga. Globosa magna mole constat, in qua ventriculi excavati sunt & ab hac, altera oblonga dependet, quæ diuidi potest in eam partem, quæ oblongata intra cranium conclusa continetur, & in eam quæ cranio iam exiit, & propriè spinalis medulla dicitur. Hoc sensu Cerebrum & Cerebellum essent tantum radices spinalis medullæ, in quibus ventriculi sunt excavati. Attamen faretur tam Cerebri, quàm cerebelli productionem esse spinalem medullam, ex quibus tanquam ex radice caudex procedit. An potius esset epiphysis, quàm apophysis? Nam intra Cerebrum duæ magnæ illæ eminentiæ, quæ Thalamos nervorum opticorum constituunt, sunt duæ radices spinalis medullæ, vt intra cerebellum aliz duæ. Ex quibus quatuor simul iunctis, duplex funiculus intra cranium ad basim quarti ventriculi effingitur, qui descendens intra cranium, in vnum caudicem coalescit, nullo aut exiguo diuisionis vestigio remanente.*

Pag. 326. *A* spinali medulla nervi Cerebri dicti, cum olfactus organis in quinque sensuum organa propagati producuntur: Attamen neque nervi optici, neque olfactus organa, siue processus prodeunt à spinali medulla, supra magnum occipitis foramen, sed nervi optici sunt reuoluti circa eminentias illas magnas, quas *Galenus* Thalamos nervorum opticorum appellat, & processus mammillares sunt productiones, quæ ad ventriculos anteriores pertingunt.

Pag. 328. *S*i motus ille in ingenua Cerebri substantia ineat, & medulla spina eandem naturam & substantiam sit adepta, quàm Cerebrum habet, rationi consonum, vt etiam medulla motu asiduo, quo Cerebrum moueatur, quanquam sensus non sit conspicuus. Sed cum sit epiphysis potius, quàm apophysis Cerebri, non potest eisdem motus habere, dilatationis & constrictionis. Nam spiritus à Cerebro & cerebello continenter expelluntur in spinalem medullam, quæ instar canalis excipit, nec vllam facultatem habet generandi spiritus animales, cum ad eorum custodiam & distributionem comparata videatur.

Pag. 328. *Rectè Bauhinus monet medullam spinalem à tenui meningi in duas partes usque ad lumborum vertebra diuidi, itaut vtrumque canalis aliqua appareat, quod sane non solum in leuiter cæta bouis medulla demonstrari potest, sed etiam paralyti, vbi modo vnum, modo alterum latius solum occupat, declarat. Sed mihi displicet, quod postea subiungit,*

quod ipsa medulla in hominibus simplex, ac indiuisa, deorsum per totam ceruicem & thoracem usque ad lumbos, & infra feritur, & nervos geniculatim à se diffundit. Si istam simplicitatem & indiuisiorem, ut ita loquar, accipiat, pro nervorum productione, quæ nulla sit usque ad lumbos, falsum est: nam per totam ceruicem, & dorsum nervos emittit.

### Nervi Cerebri.

Pag. 331. **N**ervus substantia donatur alba medullari, medulla Cerebri à qua initium ducit simili, per substantiam quæ in centro est, tanquam præcipuam nervi partem, actio perficitur: Cum per ipsius substantiam, non per tunicas facultas sensibiles, & motrix a Cerebro deferatur. Ideoque nulla cautate quæ sensu cognosci possit, nisi fortè optici, sed porositate donatur, in crassioribus vero nervi ex multis fasciculis consistunt. Quamvis Galenus scripserit nervi substantiam medullæ Cerebri similem, non inde sequitur talem esse nervi substantiam, quia in optico tantum nervo consimilis spectatur. Alij nervi ab exitu ex pluribus filamentis sunt contexti, & quod crassiores sunt nervi, eò pluribus filamentis consistunt: Proptereaque mirum est, quo modo spiritus per nervi substantiam deferatur. Verisimile est intra membranam inuestientem, & constringentem ista filamenta, spiritum permeare. Ideoque nervus non actionem obtinebit à sua medullari substantia, quæ nulla est, sed tantum officio canalis fungetur.

Pag. 334. Verè scribis nervos nentquam se interfecare, excipit sextam nervorum coniugationem, in qua Galenus observavit decussatam intersectionem, cum tamen nulla sit intra cranium, nec extra.

### Processus Mammillares.

Pag. 336. **A**d processum mammillarum quemlibet, è ventriculo foramen manifestum, Fallopio volente pertingit, à quo foramine meatus ad ethmoides, ceterosque foramina abit, qui in humano angustissimus est, ita ut non nisi in recentissimo Cerebro conspici possit, in bovino verò magnus. Nullum tale foramen cernitur in Cerebro humano, cum ventriculi anteriores non sint peruij, sed secundum ductum & progressum processum mammillarum naribus attractus aer, à basi ad Cerebri ventriculos anteriores superne fertur. Processus mammillares ex Cerebri substantia in basi ipsius iuxta nervos opticos enasci statuit, cum tamen supra notaverit à spinali medulla cum reliquis nervis prodire.

### Nervi Optici.

Pag. 338. **N**ervi optici non per intersectionem, aut simplicem contactum, sed per medullam confusionem inter se coire indicant. Cum tamen simplex contactus in nervis opticiis appareat, per vinculum quoddam aut canaliculum medium interiectum.

Pag. 338. Ne res una duplex asstmetur, nervi coeunt, non in medio via cursu, sed in Cerebri medulla, unde omnes nervos prodire diximus, ubi quoque omnium sensibulum obiecta uniuntur. At præter motorios nervos oculorum, nulli inter se coire deprehenduntur, nec à Cerebri medulla prodeunt, cum antea verè scripserit à spinali medulla nervos omnes enasci.

### Nervi Motorij Oculorum.

Pag. 340. **D**istributionem nervi motorij accuratè scribis, ut iudicares illum secuisse orbitam, & fibrularum seriem persequutum fuisse. Quod spectat ad reliquorum nervorum descriptionem, adeo prolixus & curiosus est, ut non possum ipsius relationi fidere.

### Septima Coniugatio.

Pag. 350. **S**eptima nervorum cervicis coniugatio, musculo bncearum quadrato surculum largitur, non mirum ergo, si spasmi cynici gravi sit, cum hic musculus in hoc spatio primus connellatur. Galenus lib. de diffict. muscul. Spasmi cynici affecto mus-

## Animad. in Theat. Anatom. Casp Bauhini. 717

culo latissimum est, qui ad faciem ascendit, excitari scribit. Sed deprehensus fuit nervus alius, qui in coniugatione inter duas tabulas pavimenti orbitæ ocularis traductus, & postea extra marginem inferioris orbitæ egressus, qui in musculos faciei & labii, non furcalosè distribuitur anserini pedis ritu, unde eo nervo versus orbitam reflecto, cessat canina convulsio spasmodicæ.

### Nervi Ossis Sacri.

Pag. 353. **S**I nervus Ossis Sacri Bauhinus imperitè admodum describit, qui sunt manifesti & crassissimi. præsertim pollicus, quæ fides nunc tribuenda aliorum nervorum descriptioni, qui tenuiores & obscuriores sunt. Bauhini tutor, descriptionem Ossis Sacri comparabit cum ea, quam in *Anthropographia* retuli.

### De Varolio Anatomico.

Pag. 358. **F**ateor Varolium anno 1573. epistolâ quibusdam editâ novam administrandi Cerebri sectionem proposuisse. Ergo Varolius hoc tempore Academicis Italiæ innoverat, tanquam Anatomicus percelebris, cum Bononiæ publicè Anatomicum opus exerceret. Proinde cum valvulam coli intestini accuratè descripserit ante Bauhinum, non peccavit Galenus contra dignitatem & famam Bauhini, si valvulam istam Varolio adiudicavit.

### De Plexu Choroide.

Pag. 366. **I**n ventriculis plexus retiformis dictus repositus est, & tunc optici origo ex ea sede spinalis medulla, qua internam ventriculi cavitatem respicit, commodè videri potest. Rectè monet optici originem ex interna ventriculi cavitare repetendam, sed qui in ventriculis plexus reperitur, non est ille retiformis, sed choroides, ex venis constatus, non ex arteriis, ut plexus retiformis. Inter cetera reprehendo, quod in capite vitali recentissimo, non minus quàm in humano, omnia rectè conspici posse assereret.

### Processus transversalis in basi Cerebri.

Pag. 357. **P**rocessus ille transversalis, quem Varolius pontem cerebelli vocat, eo sine factus fuit, ut sub eo spinalis medulla feratur, eo modo quo canaliculus quidam fluens sub aliquo ponte feratur. Ego contra, processum istum transversalem instar fasciæ, radices duas anteriores, & iunctas spinalis medullæ coniungere, & cum canalis à tertio ad quartum supra illas radices traducatur, instar pavimenti subternitur, ad impediendum effluviū spirituum, qui per eum canalem ad quartum feruntur.

### Ortus Nervorum.

Pag. 358. **N**ervi quidam nascuntur à Cerebra tantum, & non à cerebello, quales sunt optici, quidam à cerebello tantum, & non à Cerebro, quales sunt auditivi. Quidam ab utroque simul, sicut nervi spinæ, nullus autem immediatè ex aliquo duorum principum, sed omnes ex suis principibus nascuntur, vel mediante medulla spinali, vel mediante processu transversali dicto. Vno verbo dixissem omnes nervos oriri à spinali medulla intra Cerebrum, vel extra, neque processus transversalis pars est cerebelli, sed spinalis medullæ, proptereaque nulli à cerebello mediante processu transversali prodeunt.

### Nervi Optici.

Pag. 358. **N**ervorum opticorum cum in occipitis penè origo sit, hinc cauteria occipiti infixæ, oculis, & visionis magnum usum inferre quotidie experimur. At supra dixi à superna sede ventriculorum nasci, ac sane optici ad basim Cerebri radicibus anterioribus spinalis medullæ accumbunt, sed revoluti ascendunt ad superiores ventriculos, emineatque illis magnis infiltrati, quas Thalamus nervorum opticorum vocat Galenus.

*Nervi Motorij Oculorum.*

Pag. 359. **N**ervi motorij infra opticos interfectione facta progredi conspiciuntur, & ad principij spinalis medulle intimam partem nascuntur, & in ora sic ununtur, ut in angulo se mutuo contingant. Verum est in exortu uniri, sed illa interculo ante unionem non obseruatur.

*Ventriculi Cerebri.*

Pag. 360. **V**entriculus quatuor esse, communis est sententia, licet quidam sex esse velint. Sed reuera sunt tantum duo, cum enim Cerebrum & hominis, & aliorum animalium duplex sit, videtur aequum fuisse, ut vnaquaque pars ventriculum haberet. Valde laudo istud iudicium de numero ventriculorum, itaut Cerebrum vnicam cauitatem habeat amplissimam, deorsum ampliatam, cerebellum alteram, proptereaque duo anteriores Cerebri ventriculi constituent vnicam cauitatem, tertius ventriculus erit tantum canalis ad cauitatem cerebelli, quae vulgò sumitur pro quarto ventriculo.

*Iterum de plexu Choroide.*

Pag. 364. **P**lexus quem choroideum cen retiformem vocant, in Cerebri ventriculis existens, ex toto glandulosus videtur, & in hac proportionem habita, glandulae, in maiore copia sunt, quam in mesenterio infimi ventris, quod pulchre apparet in capitibus eorum, qui Cerebri sunt humidi, quare multo magis natura reiconuenit, si plexus glandulosus quam retiformes appellantur, ut Varolius asserit. Equidem reperio glandulam insignem conarion dictam ad principium huius plexus appositam, sed alibi per totam eius longitudinem nullas glandulas deprehendi, nisi mucum incrassatum huic plexui adhaerentem. Totam illam narrationem de Cerebri noua administratione, incipiendo à basi, ad verbum transcripsit, ex Varolio Bauhinus, à pagina 355. vsque ad paginam 364.

*Animella.*

Pag. 386. **N**escio cur glandulas faciei, Bauhinus post Platerum vocarit Animellas, nomine insolenti & inaudito.

*Vasa Faciei.*

Pag. 367. **V**asa quae per faciem feruntur, vena sunt & arteria: Vena sunt iugulares duae, interna, & externa. Verum notabis solam iugularem externam ad partes externas capitis, & faciei assurgere & disseminari. Omisit nervos, & praesertim cum qui facit spasmodicum, siue conuulsionem caninam, de quo supra dictum est.

*De Fronte.*

Pag. 368. **F**rontis cutis mouetur, non solum membrana carnosae beneficio, quae subiecta carni connata, in musculosam substantiam fibris rectis donata abeat, sed musculis duobus, quod & ductus fibrarum & motus, qui in his, quemadmodum & aliis musculis apparent, quia in membrana carnosae non reperiuntur. Sed in fronte, ut in reliquo capite membrana carnosae musculosa est, nec praeter istos musculos frontales, inuenies aliam membranam carnosam, illis superentem, aut cuti immediate haerentem.

Pag. 369. Musculum orbicularem Aquapendens supercilij tribuit, qui à palpebrarum circulari musculo differat, quod supercilij musculus fibras crassiores & carnosiores habeat, & quod totus musculus maior sit, quare supercilium maximè deorsum ad oculum ducere, & cum annulato referat, etiam palpebram inferiorem validè trahere. Sed ego musculum istum orbicularem, eundem esse cum illo circulari musculo palpebrarum, nec villo modo differre statuo, proptereaque nouus iste musculus frustra adiectus fuit, ab Aquapendente.

Pag. 354. Notat Bauhinus, ex oculi antro humorem serosum interdum ad totam fa-

cium mitti, præcipuè verò ad genas, tempora & aures, quod comprobant vulnera hisce partibus inflicta, quæ quamvis sanata videantur, solent tamen per duos aut tres menses quotidie humores aquæ purissimi, magna copia per foramen in vulnere relictum, quod nulla arte consolidari possunt, affluere. potissimum in musculi temporalis vulnere, quam observationem Aquapendens debemus. Hoc verum sit valde dubito. Nam si Ossa faciei fuerint integra, nec euri affecta, nec rhodæ laborent oculi, exsiccari poterunt vlcera faciei.

Pag. 375. Glandule insuper utrique angulo appositæ sunt interdum binæ, interdum plures, quæ sua substantia dura & laxa excrementum illud serosum Cerebri depasiant. At tantum reperio duas glandulas, viam in angulo maiore, foramini lacrymali intrusam, alteram latam & planam, versus minorem angulum intus latitantem, nec plures reperiuntur.

Pag. 376. Supercilia etsi à musculis frontis sursum trahantur, in aliquibus duo musculi in occipito suis reperiuntur, quorum caput posterius versus abducendo, & eos attrahunt. Iulius Placentinus eleganter pinxit, ex quo figuram sumpsimus. Non difficit musculos illos existare, qui sunt productiones panniculi carnosus, sed figura Iulij Placentini, quam sequutus est Bauhinus, fictitia est, & eorum musculorum descriptio ab eo desumpta, omnino falsâ, quam retulit Bauhinus, pagina 369.

Pag. 378. Membrana carnea palpebre subtenso, ita tenuis est, ut cum musculis vix aliarum partium membranam cui subiectam aquet, ita ut orbiculares ipsius musculi, nihil aliud esse videantur, quam prædicta membrana, carnes fibræ minimè commixta. Ergo orbicularis musculus palpebræ subtenso, nihil est aliud, quàm carnea membrana. Attamen pag. 379. scribit musculum orbicularem palpebrarum inter membranam carnosam, & eam quæ à pericranio producitur, sitam esse.

Pag. 379. Notat Bauhinus, membranam pericraniam sub palpebris duplicem esse, quasi reduplicaretur & reflecteretur à tarsis usque ad orbitam, ut producat coniunctivam. At potius videtur post productionem coniunctivæ à margine ipsius orbitæ simplicem produci, & subterni utrique palpebræ.

Pag. 380. Musculum orbicularem utrinque palpebra dividit in duos, quos vocat semicirculares, postea ratione fibrarum continuarum obliquarum, eundemque musculum esse statuit: deinde concludit duplicem esse musculum, masculæ rationes rectè profert, & meam opinionem de musculo orbiculari, & altero ciliari recitat, sub nomine alterius, unde licet cognoscere inconstantiam Anatomici.

Pag. 381. Pilis palpebrarum præcedit Hippocrati, palpebra à frequenti palpitatione, Plinio citia. Nullus unquam pilos palpebrarum nominavit, rectè quidem cilia dicuntur, non palpebræ.

Pag. 383. Inter partes oculum constituentes, quas quinque enumerat, Adipem, musculos, vasa, tunicas, humores, Omisit glandulas: meminit quidem glandulæ iacentis in angulo exteriori, prætermisit glandulam lacrymalem, ideoque constituentes oculum partes erunt sex, adiaciendo glandulas.

Pag. 387. Trochleam musculi maioris obliqui in oculo bouis, sed imperfectam hactenus demonstravimus. Inde manifestè liquet oculos bouis seligere ad demonstrandam trochleam, quæ investigari & spectari debet in oculo humano. Ideoque Bauhinus, pag. 385. testatur se in gratiam tyronum singulis annis aliquot bouinos oculos secare, quo ad humani oculi sectionem paratiores, quando cadaver humanum datur, accedant: Inde cognoscere inopiam cadaverum humanorum ad vsum Anatomicum.

Pag. 388. Potest etiam oculus integer ex sua orbita cum trochlea in interiore angulo sita, eximi & demonstrari. Falsum est oculum ab orbita eculsum præ se ferre trochleæ artificium, quod oculo intra orbitam remanente demonstrari debet. Quis non animadvertit Bauhinum, nonquam ante oculos humani Anatomem administrasset?

Pag. 389. Nervos opticos mutuo variis scribit, non per adiacentiam, aut intercessionem, vel quod alter alterum conscendat, sed per omnimodam unionem, & medullæ confusivam ita iunguntur, ut alter ab altero separari non possit. At deprehendo tantum coniungi inter se nervos opticos, interuenta mediæ corpusculi, ita ut sic iuncti referant figuram literæ maiusculæ H. Ideoque non per omnimodam unionem, & medullæ confusivam iunguntur.

Pag. 400. Membrana crystallini humoris improprie dicitur Aranea. Nomen crystalloidis potius ei convenit. Nam arachnoides membrana pertinet ad vitreum humorem, & eadem est cum amphiblastride.



Pag. 401. *Rufus partem anteriorem crystallini, visionem, & pupillam appellat, sed foramen vuez est pupilla.*

Pag. 401. *Ablata membrana crystallini (dextrè enim secundi integra ab humore separari potest,) figura eius destruitur, non amplius humor levis, æqualis & politus, nec in seipso constans, quia molem & formam, & efficaciam huic suæ membranæ debet. At in humano oculo ista tunica est inseparabilis, in bovino oculode trahi potest, & quamvis euellatur, compacta remanet crystallini substantia instar cere solidæ.*

### De Tunicis Oculi.

Pag. 401. *Non putat Bauhinus, hyaloidem membranam eandem esse cum Arachnoide, & Amphiblastroide, quoniam ab utraque substantia differt, cum tenuissima sit, & virentem humorem undique singat. At ex Pollace, & Ruffo Epheso, hyaloides, amphiblastroides, & arachnoides eandem membranam significant.*

Pag. 402. *Amphiblastroides tunica mollis est, rubescens, mucosimilis, venas & arterias plures & conspicuas, & multo crebriores licet extes, quàm suæ molei conveniat, continet: Nam cum nervi omnes tenuis meningis portione obducantur, venam & arteriam secum rectius deferret. At si attentè consideraveris amphiblastroidem, tunicam albam, non rubescentemprehendes, venulis & arterioliis destitutam.*

### Aqueus humor.

Pag. 403. *Aqueus paucus est admodum, in hoc hypochymata suffusiones sunt, quas vulgè cataractas vocant. Ignorat locum in quo concrevit, formaturque hypochyma, nempe intra vream, & foramina vuez, nempe pupillæ cataracta circumtenfa est. At humor aqueus totus extra vream, vniuersum spatium, quod inter anteriorem vream tunicam & corneam habetur, vna cum spiritu adimplet, ex Bauhini opinione, ergo malè iudicauit de situ cataractæ.*

Pag. 403. *Ex Anatome scimus mediante tunica crystalloide, crystallinum ab aqueo humore distingui. Crystalloidem membranam quasi intergerinum parietem constituit, fecerentem humorem aqueum à crystallino. At ex Bauhino, Aqueus est extra vream, crystallinus intra vream continetur, vitreo humori immerfus, & cingitur tenuissima membrana, vix separabili, quæ crystalloides dicitur.*

### Musculi Auricula.

Pag. 417. *Musculorum in auriculis Fallopi debetur inuentio: sunt autem duplices, communes, & proprii, in iis quibus aures manifestè mouentur, rectè conspicui. Tres communes describit, & quartum proprium. Musculos autem aurium communes, primus Fallopius descripsit, sed sæpius accidere notat, ut non reperiantur. At cum sint portiones & frontalis musculi, & occipitalis, atque musculi latissimi, qui ad lobum lateraliter supra parotides assurgit, semper existere deprehendi. Quartus à Bauhino descriptus pro communi, est proprius, nec à Placentino priùs obseruatur, cum iste musculus communis ex Fallopio, à mammillari processu angusto principio exortus, & parum latior factus, veluti si in tres digitos diuideretur, posteriori auriculæ implantatur. Proptereaque pictura Placentini de hoc musculo elegans est, sed fictitia, quam sequutus est Bauhinus. Hic musculus sub ligamento cartilagineis auris, interdum crassior, interdum tenuior, in tres portiunculas carneas diuisus obseruatur.*

### Canalis Auris in Os productus.

Pag. 423. *Canalis ex aure in Os fertur, & intra naves, & intra os terminatur, iuxta apophysis pterygoideis radicem. Huius meatus extremitas externa, qua narium cavitatem mediam respicit, cartilago robusta est, plurimum extuberans, & narium tunica mucosa obducta, & meatui finis, quasi iantrix vernula præficta esse videtur: cavitatis latitudine ealamm quo scribimus ferè adquat, mucosa tunica valvula instar obducta est, ne semper hic*

meatus

maius in ore, patente sit orificio, sed pro necessitate pateat, ne facile mali vapores ex ore in aures transiant. Vsu praeipuum expurgationi auris inferuire, & aerem implantatum expurgare. Equidem probo istam descriptionem canaliculi, qui è concha in Os decurrit inter processum inammillarem, & appendicem styloideam ad apertum, sed membranz duz ligamentales, quæ includunt glandulas conillas, excipiunt terminum extremum huius canaliculi, quem non claudit membrana instar valvulæ. Fateor etiam expurgandis auribus inferuire, ærem quoque implantatum expurgare. Ideoque si obturetur crasso humore, vel muco, humores vel flatus irruentes in cavitates auris, nec exitum habentes. vel sordiditatem, aut tinnitus, vel fusuiros producant, quod deprehendes, si utraque aure exquisitè obturata, non percipias foris instrumenti musici, ore aperto, & baculo dentibus apprehenso, & chordis instrumenti musici imposito. Ideoque defectu huius canaliculi peruij ad euacuationem flaruum, quidni conferret stylo tenuissimo pertusa apophylis mastoïdes cauernosa, quæ comunione habet cum concha. Sed cum iste canaliculus sordes aurium & flatus transmittat, non probo per eundem ad insiti æris refectiõnem, & reparationem nouum ærem per hunc meatum ex ore suppedirari: nam impurus eò confluere, insiruque perturbaret, propterea quæ à spiritu animali ad aures delato conseruatur, & resarciatur.

### De Tympano Auris.

Pag. 437. **S**i membrana Tympanum à prima conformatione crassior & densior producat, surditatem incurabilem profert, sic videmus interdum ante membranulam hanc externam tunicam quandam crassiorem præ maturam enasci, cuius *Ægineta* lib. 2. cap. 23. meminit, quin etiam curandi modum docet: *Aquapendente* affirmat sepius hanc obseruasse, & cum adest, præsertim à natiuitate surdas facit. Laudo quidem istam obseruationem, sed detrahendi membranam modum ignoro, nec exposuit *Paulus Æ. ineta*: Nec probo membranam hanc tenui humore si madeat, aurium tinnitus, sibilationes & murmura adferre, quæ potiùs dependent à flatibus, quàm ab humiditate membranz.

### Oficula tria Auris.

Pag. 435. **O**ficula tria auri in recens natis iam perfecta sunt, & eandem quam in adultis magnitudinem habent. Postea addit, non tamen ita dura, ut in adultis, cum in infantibus humiditas abundet, unde etiam infantes obtusius adultis audiunt, sunt etiam caua, quo leuiora sunt, & medullam pronuersione continent. Verum est, in recens natis ferè eandem magnitudinem & soliditatem obtinere, sed non sunt caua, nec medullam continent.

### Musculus Auris Internus.

Pag. 437. **M**usculus internus auri cernici malleoli affixus, in canibus perum ante insertionem, carneam & rotundam glandulam adnexam habet. Idem in infantis aure deprehendes, scilicet musculum illum in exortu suo globosum esse, vel glandulam ei affixam, si globulum illum non admittas, esse portionem musculi.

Pag. 439. Musculus internus auri, id est, collocatus intra meatum auditorium vltra Tympanum, descriptus fuit ab *Aquapendente* & *Cassero*: Alter ab eodem *Cassero* semel deprehensus, fictus est.

### De Structura Auris Internæ.

Pag. 441. **S**tructura auri & auditus organa, utpote membranulam, oficula tria, musculum internum, chordam, meum auditorium, & cavitates auri in pueris, quàm in adultis facilius integra & distincta demonstrare posse notauit Bauhinus. Sed quo modo id fiat, non exposuit. Fateor è quidem auditus organa exceptis cavitatibus, in pueris recens natis faciliùs demonstrari quàm in adultis, præsertim si cœcillas epiphyum illam ossæ internæ Ossis petrosi, qua reuulsa speculabitis musculum inter-

Pag. 401. *Rufus partem anteriorem crystallini, visionem, & pupillam appellas, sed foramen vuez est pupilla.*

Pag. 401. *Ablatâ membranâ crystallini ( dextrè enim secanti integra ab humore separari potest, ) figura eius destruitur, non amplius humor levis, æqualis & politus, nec in seipso constans, quia molem & formam, & efficaciam huic suæ membranæ debet. At in humano oculo ista tunica est inseparabilis, in bovino oculodetrabi potest, & quamvis euellatur, compacta remanet crystalli substantia instar ceræ solidæ.*

### De Tunicis Oculi.

Pag. 401. *N*on putas Bauhinus, hyaloidem membranam eandem esse cum Arachnoide, & Amphiblastroide, quoniam ab utraque substantia differt, cum tenuissima sit, & vitreum humorem undiqueque tingat. At ex Pollace, & Ruffo Epheso, hyaloides, amphiblastroides, & arachnoides eandem membranam significant.

Pag. 402. *Amphiblastroides tunica mollis est, rubescens, exo similis, venarum & arteriarum plures & conspicuas, & multo crebriores laces exiles, quàm suæ molis conuenias, continet: Nam cum nervi omnes tenuis meninges portione obducantur, venam & arteriam secum rectius deferri. At si attentè confideraueris amphiblastroidem, tunicam albam, non rubescentem deprehendes, venulis & arterioliis destitutam.*

### Aqueus humor.

Pag. 403. *A*queus paucus est admodum, in hoc hypochymata suffusiones fiunt, quas vulgè cataractas vocant. Ignorat locum in quo concrefcit, formaturque hypochyma, nempe intra vucam, & foramina vucæ, nempe pupillæ cataracta circumfensa est. At humor aqueus totus extra vucam, vniuersum spatium, quod inter anteriorem vucam tunicam & corneam habetur, una cum spiritui adimplet, ex Bauhini opinione, ergo malè iudicauit de situ cataractæ.

Pag. 403. Ex Anatome scimus mediante tonica crystalloide, crystallinum ab aqueo humore distingui. Crystalloidem membranam quasi intergerinum parietem constituit, secernentem humorem aqueum à crystallino. At ex Bauhino, *Aqueus est extra vucam, crystallinus intra vucam continetur, vitreo humori immersus, & cingitur tenuissima membrana, vix separabili, quæ crystalloides dicitur.*

### Musculi Auricula.

Pag. 417. *M*usculorum in auriculis Fallopio debetur inuentio: sunt autem duces, communes, & proprii, in iis quibus aures manifestè mouentur, rectè conspicui. Tres communes describit, & quartum proprium. Musculos autem aurium communes, primus Fallopius descripsit, sed sæpius accidere notat, vt non reperiuntur. At cum sint portiones & frontalis musculi, & occipitalis, atque musculi latissimi, qui ad lobum lateraliter supra parotides assurgit, semper exstare deprehendi. Quartus à Bauhino descriptus pro communi, est proprius, nec à Placensino prius obleruatur, cum iste musculus communis ex Fallopio, à mammillari processu angusto principio exortus, & parum latior factus, veluti si in tres digitos dinidetur, posteriori auriculæ implantatur. Proptereaque pictura Placensini de hoc musculo elegans est, sed fictitia, quam sequutus est Bauhinus. Hic musculus sub ligamento cartilaginæ auris, interdum crassior, interdum tenuior, in tres portiunculas carneas diuisus obseruatur.

### Canalis Auris in Os productus.

Pag. 423. *C*analis ex ante in Os fertur, & intra nares, & intra os terminatur, iuxta apophysis pterygoidis radicem. Huius meatus extremitas externa, qua narium cavitatem mediam respicit, cartilago robusta est, plurimum extuberans, & narium tunica mucosa obducta, & meatus fini, quasi ianitræ vernula præfecta esse videtur: contra latitudine calamm quo scribimus ferè æquatur, mucosa tunica valvula instar obducta est, ne semper hic meatus

meatus in ore, patente sit orificio, sed pro necessitate pateat, ne facile mali vapores ex ore in aures transiant. Vsu præcipui expurgationi auris inferuire, & aerem implantatum expurgare. Equidem probò istam descriptionem canaliculi, qui è concha in Os decurrit inter processum inammillarem, & appendicem styloideam ad apertum, sed membranzæ duz ligamentales, quæ includunt glandulas tonsillas, excipiunt terminum extremum huius canaliculi, quem non claudit membrana instar valvulæ. Fateor etiam expurgandis auribus inferuire, aerem quoque implantatum expurgare. Idcoque si obrueretur crasso humore, vel muco, humores vel status irrucientes in cavitates auris, nec exitum habentes, vel surditatem, aut tinnitus, vel susurros producant, quod deprehendes, si utraque aure exquisitè obturata, non percipias sonum instrumenti musici, ore aperto, & baculo dentibus apprehenso, & e chordis instrumenti musiciis imposito. Ideoque defecta huius canaliculi peruij ad euectionem statuum, quidni conferret stylo tenuissimo perforata apophysis mastoidea cauernosa, quæ communionem habet cum concha. Sed cum ille canaliculus fordes aurium & flatus transmittat, non probò per eundem ad insiti aeris restitutionem, & reparationem nouum aerem per hunc meatum ex ore suppeditari: nam impurus eò conflueret, insitumque perturbaret, proptereaquæ à spiritu animali ad aures delato conferuatur, & refarcitur.

### De Tympano Auris.

Pag. 427. **S**i membrana Tympanum à prima conformatione crassius & densius producatur, surditatem incurabilem præfert, sic videmus interdum ante membranulam hanc externam tunicam quandam crassierem præter naturam enasci, cuius Ægineta lib. 2. cap. 23. meminit, quicquam curandi modum docet: Aquapendens affirmat sepius hanc obseruasse, & cum adesset, præsertim à natiuitate sardos facit. Laudo quidem istam obseruationem, sed detrahendi membranam modum ignoro, nec exposuit Paulus Æmetæ: Nec probò membranam hanc tenui humore si madaat, aurium tinnitus, sibilationes & murmura adferre, quæ potius dependent à flatibus, quàm ab humiditate membranzæ.

### Oficula tria Auris.

Pag. 435. **O**ficula tria auris in recens natis iam perfectæ sunt, & eandem quam in adultis magnitudinem habent. Postea addit, non tamen ita dura, ut in adultis, cum in infantibus humiditas abundet, vnde etiam infantes obtusi, adulti audiunt, sunt etiam caua, quo leuiora sint, & medullam pro nutritione continent. Verum est, in recens natis ferè eandem magnitudinem & soliditatem obtinere, sed non sunt caua, nec medullam continent.

### Musculus Auris Interna.

Pag. 437. **M**usculus interna auris cerni malleoli affixus, in canibus parum ante insertionem, caruncam & rotundam glandulam adnexam habet. Id etiam in infantis aure deprehendes, scilicet musciculum illum in exortu suo globosum esse, vel glandulam ei affixam, si globulum illum non admittas, esse portionem musculi.

Pag. 439. Musculus auris externæ, id est, collocatus intra meatum auditorium, vltra Tympanum, descriptus fuit ab Aquapendente & Casserio: Alter ab eodem Casserio semel deprehensus, sicutus est.

### De Structura Auris Interna.

Pag. 441. **S**tructuram auris & auditus organa, utpote membranulam, oficula tria, musciculum internum, chordam, neruum auditorium, & cavitates auris in pueris, quàm in adultis factis integre & distincte demonstrari posse notauit Bauhinus. Sed quo modo id fiat, non exposuit. Fateor equidem auditus organa exceptis causiis, in pueris recens natis facilius demonstrari quàm in adultis, præsertim si euellas epiphyum illam auris internam Ossis petrosi, quæ reuulsa speculabatur musciculum inter-

bum cum glandula ei adnexa, ossicula tria, filum Tympano attensum, sed cavitates, nempe cochleam, labyrinthum, concham non datur perfectè intueri, quia deest tunc temporis labyrinthus, eo modo excavatus, quo in adultis.

Pag. 443. *Repetit, per canalem in palatum ab aure protensum, aërem novum, ad ingenti nutritionem succedere, quod est falsissimum.*

### *Cavitates & Canales Auris Internæ.*

Pag. 445. **L**abyrinthi cuniculus in superficie interiore, membranula quadam mollissima, ac tenuissima vestiri natans Bauhinus, quod est falsum. Nam si ossicula tria periosteo carent, ut magis resonarent, labyrinthi canaliculi, in quibus sonus tantquam in Echo resonantior sit, eadem membrana destituerentur.

Pag. 446. *Cochlea & labyrinthus, & eius cuniculi, eo modo quo etiam dentium cavitates naturales, membranula quadam mollissima, ac tenuissima vestiuntur. Verum est dentium cavitates repleti à vena & nervo, sed cavitates auris, tam cochlea, quam labyrinthus periosteo carent.*

### *Nervus Auditorius.*

Pag. 447. **D**istributiorem nervi auditorij non ausim omnino repudiare, sed valde suspectam habeo, quando scribit in aurem externam, & masserem, & buccas mouentem musculum distribui.

### *De Aëre insito Auri.*

Pag. 448. **S**i aër insitus & congenitus, & unadificatus, constat ex seminis substantia aërea, eaque purissima, cui sanguinis materni substantia aërea purissima affunditur, ut proprium quasi corpus sortitur: Quomodo potest nutriri, reparari ab aëre illo, qui ab ore per canalem ad aurem transfertur, propterea dum oscitamus, addit, multum spiritus affluens aures intrinsecus subit.

Pag. 450. *Huius aëris interni naturam eandem cum animali spiritum, quem aëreum esse constat, censuimus, & utriusque eadem, & conseruationis, & refectionis ratio, reficitur autem & restituitur aëre per nares, & per os inspirato, maxime verò per os, qui per viam amplam, & patentem ad aures per canalem, per quem etiam expurgatur, transfusus. Si spiritus auditivus sit portio spiritus animalis, ut insinuat, eiusdem spiritus animalis portio est, assidue reparabitur à spiritu animali, nec est probabile aërem crudum nondum preparatum, subire & penetrare aures cavitatem.*

### *Musculi Nasi.*

Pag. 456. **M**usculi narium duplices sunt, communes & proprii, hi que vel dilatant, vel & 457. *constringunt, communis unus est, portio musculi orbicularis superius labra cingens, qui cum labrum superius deorsum trahitur, nasum deprimat. Musculi nares dilatantes quatuor sunt, nares constringunt quatuor. Quod spectat ad musculum quem vocat communem, inutilis est ad deprimendum nasum, nec potest columna nasi deprimi, nisi labrum superius violenter deorsum moveatur, & intrò cedat. Musculi autem nasum dilatantes, sunt tantum duo, qui à futura frontali iuxta angulum anteriorem nascuntur, & in pinna narium desinunt. Nasum constringentes sunt tantum duo, in narium amplitudine sub tunica succingente reconditi, qui in nasutis tantum reperiuntur. Alij duo constringentes externè positi, & transversim supra alam extensi non constringunt, sed dilatant pinna narium, sine eluatione, lique sunt conspicii manifestè in nasutis.*

### *Ossa Nasi.*

Pag. 458. **O**ssa narium propria constituit tria, externa duo, & tertium internum, quod est *458. Os vomeris, communia duo sunt spongiosa intra nares conclusa. Sed non magis merentur nomen communis Ossis, quam Os vomeris proptereaque duo commu-*

nia sunt portiones laterales Ossis maxillaris, quæ pertingunt usque ad lineam frontalem in angulo maiore oculi.

### *Tunica Nasi Interni.*

Pag. 460. **T**unica narium amplitudinem faccingens, à crassa meninge per foramina ethmoidis erumpente oritur, & tunica oris palati, lingua laryneis, ætiosphægi, & ventriculi communis est. At quo modo penetrare potest angustissima foramina Ossis ethmoidis, quæ transitu suo penitus obturaret? Idcirco potius per foramina palati egreditur, & traducta per interiores cavitates, supra palatum in nares expanditur, sicque continua est omnibus partibus commemoratis.

### *Processus Mammillares.*

Pag. 462. **P**rocessus mammillares à Cerebro prodeuntes, intra cranium supra sinus Ossis ethmoidis sedem habent. Dicendum potius supra tabulam Ossis ethmoidis, vel supra fossas, quia sinus nomen non convenit Ossis ethmoidis.

Pag. 463. Recitat Galeni iudicium de operculis foraminum nasi, quæ confutit Aristoteles. Sed sententiam Philosophi, quam nimium acerbè reprehendit Galenus, lib. de instrumentis odoratus, exposui in *Anthropographia*, & interpretor de tuberosis eminentiis processuum mammillarum, quales reperiuntur in brutis, non in homine, & sic operiuntur foramina narium, tanquam à velamine superiecto.

Pag. 466. Mentum à memorando quibusdam dicitur, quod eius inter recordandum aliquis usus esse videatur, in sibi Ciceronem citat. Sed inepta est hæc etymologia, veriores alie cæstant apud Etymologicos auctores.

### *Musculi Labiorum.*

Pag. 467. **M**usculi buccis & labiis communes quatuor sunt, utrimque duo, quadratus & buccinator dictus. Quadratus sub colla cute latiss, membrana est fibris carnosiss, à nullo tamen Ossis pronatis adactis, quæ à spinarum vertebrarum cervicis regionibus, scapularum, claviculæ, & pectoris Ossis, sedibus, sensim vario ductu, insensum ad faciei medium ascendit, & musculum latum ac tenuem efficitur. Buccis non conuincunt isti duo musculi, quamvis buccinator dictus buccarum spatium occupet, quadrati fibræ carnosæ, ut in reliquis musculis ab Ossibus non produuntur. Attamen postea addit ab Ossis, siquidem pectoris & claviculæ regione ferè media fibra secundum colla longitudinem recta ductu feruntur.

Pag. 468. Quamvis Galenus cynicum spasmodum ex eo musculo quadrato affecto enasci scripsit, tamen non ascendit usque ad labia, neque in totam faciem expanditur, propterea cynicus spasmodus potissimum accidit musculo buccinatori affecto, ratione illius nervi, qui pedis asnerini modo, ramulosè distribuitur in eum musculum.

Pag. 469. Buccinator à summis gingivis in summis gingivis, circuli instar terminatur. Nam cum circulum amuletur, & in circulo quidquid sumatur, illud idem & principium, & medium, & finis sit, parum refert, an à superis in inferas, an ab inferis in superas progrediatur. At observamus ab utraque maxilla iuxta molares dentes enasci, & ad utrumque labium inferi, propterea non agnosco circulum in eo musculo, quamvis ad eius medium perueniat nervus iste iam læpius commemoratus.

Pag. 469. Buccinator cum circulum amuletur, variisque fibris intertextus sit, aliqua sui portione, & in quibusdam visentibus fontem, quæ in genis apparet, efficit. Videtur hæc fovea pro vario adipis cumulo diversimodè excitari: Dum alicubi in buccis deficiente submis adipis cutis musculo buccinatori adhærescit, adipis circa adhæSIONEM orbiculatim circumfuso.

Pag. 469. In huius musculi centro, Placentinus observans vinculum quoddam robustum exterius enatum, & os genarum perreptans, ubi musculus quendam parvum, & gracilem buccis directè oppositum terminatur. Quid sibi velit, non intelligo, nisi accipiat pro isto ligamento, musculum Zygomaticum quem nominavi, & primus descripsi.

Pag. 470. Labiorum musculos proprios in hac editione octo enumerat, cum in prima sex tantum proposuisset superioris labij, primum par ab Ossis ingulis suavia extrema, & ea quæ primum Os maxillæ superioris à tercio separat, & ab Ossis mole enascitur, & in labij latus se in-

ferit, & labrum superius, & sursum, & deorsum, & introrsum, & extrorsum mouere potest. Si à parte superiore oriatur, quomodo labrum superius potest deorsum mouere? origo istius musculi est infra Os malarum, ideoque non oritur ab Ossis iugali.

Pag. ead. Secundum par à canitate malis subiecta carnosum, gracile in frangum, vbi labra communia, inseritur, & labrum deorsum vertere voluit. Quomodo labrum superius deorsum vertere potest, si à parte superiore oriatur?

Pag. 471. Inferioris labij par vnum est, aliu duplex, quod à maxillæ inferioris humiliori parte, vbi asseruit quidam insculpta est, ad mentis quasi latera carnum extoritur, in labij medium implantatur. Sic vnum tantum par musculorum tribuit labio inferiori, & ex ea origine quam assignat, labrum inferius deorsum trahet, quodnam aliud par sursum attollet? sunt qui labio inferiori paria duo adscribunt, &c. Riolanum subleuant. Tandem musculus vtriq; labio communem & orbicularem constituit, qui labiorum propriam substantiam effingit, & labium vtrumque inoris circuitu efformat. His ita positis, non reperies apud Bauhinum, octo musculos proprios, quos labijs assignauit, sed tantum septem, annumerando musculus illum orbicularem & communem.

### Musculi Maxillæ Inferioris.

Pag. 443. **M**axillam inferiorem moueri scribit sursum à temporali, deorsum à digastrico, ad dextram & sinistram à Maioribus primis: Retrorum à Maioribus alteris, siue in ore latitante. Antrorsum à quinto pari. Miror, quomodo asseueret maxillam inferiorem retro sibi agi, cum sit articulata Ossibus temporum, quæ motum retrorsum impediunt.

Pag. 475. Tertium par, quod pterygoidem appellare dices, sub temporale maius in Ossis temporum canitate humiliori sede situm est, &c. maxillam antrorsum mouet, & exiit: huius actionem adinuas aliud par à Fallopio propositum, quod ab externa ala processus aliformis prodens, dum intumescit, maxillam antrorsum lenius propellit, quando videlicet dentes inferiores superioribus prominent. Ille musculus à Fallopio propositus, & à Riolo descryptus, vt existat apud Bauhinum, idem est cum tertio pari, quod pterygoidem appellat: propterea ignorat musculos.

Pag. 476. Maioribus alter, seu in ore latitans à Galeno dictus hic temporalem musculum, qui iuxta iustitiam productionem & insertionem admodum conuascitur, adinuas maxillam introrsum & sursum trahendo, sed etiam maxillam productam retrorsum reuocat. At musculus iste, qui à capto pterygoidis nascitur, in angulum maxillæ inferioris internæ inseritur, neque vlllo modo attingit, neque conuascitur tendini musculi temporalis, & destinatus est in subsidium musculi temporalis, proptereaque maxillam non potest retrorsum agere.

Pag. 476. Digastricum musculum rectè scribit, media sua parte Ossis hyoidis adherere, & trochlea quidam imaginem obseruari, circa inferioris maxillæ angulum inferiorem, vbi voluit ad trochileam aduoluitur. Sed non obseruauit Bauhinus, istum musculum circa styloceratoidem iuxta Os hyoides, & ab angulo maxillæ inferioris, ad Os hyoides ligamentum protendi, quod sustinet istum musculum, ne supernè reuellatur agendo, quia cum oriatur ab appendice styloide, non posset maxillam inferiorem deorsum trahere, nisi hoc artificio redecteretur, id est, descendens ad Os hyoides vbi adheret, supernè remearet.

Pag. 477. Mouet Bauhinus quadratum musculum maxillæ inferioris, ossi insigniter inflexi, ideoque reuocari posse à maxillam inferiorem, vt deorsum trahat. Incertus tamen si iuuicis & labijs mouendis inseruit, proptereaque cum nihil defuiat, musculum istum confidenter asseueramus, pertinere tantum ad maxillam inferiorem.

### Maxillæ Superioris Ossis.

Pag. 481. **M**axilla superioris ossa sunt communia, & propria: Communia sunt Os sphenoides, seu septimum & octauum capitis: Ab hoc pendunt duo Ossis spongiosa in naso inserta, & iuxta inserta duo, quæ oculi orbium interiorem perficiunt, & processus uariam superiorem partem astringunt. Verum est Bauhinum, lib. 3. pag. 282. Ossa capitis communia constituere, Os sphenoides & ethmoides, siue spongiosum, sed mouere debet haec spongiosa Ossa intra nares sita, & alteram portionem, quæ oculi interiore in orbem perducit, esse portiones Ossis ethmoidis, quod quidem non verò numeratur inter Ossa communia, vt supra docui.

Pag. 482. Si tertium Os maxillam oculi interno latere positum, quartam partem Ossis spongiosi constituit, non debet accensere Ossibus maxilla, sed expungere: Si effringantur cellulae Ossis spongiosi, manifestè conſpiciuntur, & ea parte sunt inuestiganda, cum cartilaginibus intra cellulas conclusis.

Pag. 483. Rectè quidem Bauhinus, foramen in margine orbitæ ocularis exſculptum, nervum tertij paris solum ex oculi sede in faciem transmissere. Sed huius nervi dignitatem, & usum ignoravit, quoniam ab eo palmus cynicus oritur, qui non cessat nisi secus, aut vitus fuerit, iuxta suam radicem.

Pag. 483. Cavitatem sinusam ossis maxillaris eleganter describit Bauhinus. Sed reprehendo, dum tenuissima pellicula inuestiri, sæpe etiam muco repleti notavit, quod est contra naturam in adultis.

### Os Nafi.

Pag. 483. **O**ssa nafi suprascripta esse communia & propria, propria tria continebat, externa duo, & tertium unum scilicet Os vomeris, communia referebat Os duo spongiosa intra nares sua. Nunc ad maxillæ Os revocat Os duo nafi propria, & quartum quod númerat, narium & oris partem anteriorem constituere, notat, cuius tamen nullam mentionem fecerat inter Os communia nafi, debebat etiam more aliorum Anatomicorum, præsertim Fallopij periti Anatomici, Os vomeris addere.

### Dentes.

Pag. 487. **I**n maxilla utriusque circuitu & margine, quam regionem Galenus vtrum vocavit, canitates, seu sinus occurrunt, quos h. m. Galenus appellavit. Expende, an circuitus maxillæ quia reò appellatur à Galeno. Nam solus Galenus diuersum sensum ab alijs auctoribus huic vocabulo tribueret.

Pag. 489. Dentes soli aciei ferratissimi, igne ac flamma, haud facile cum reliquo corpore cremantur. Quod est falsissimum, quamvis ab Auctoribus antiquis id proditum fuerit.

Pag. 493. Oculares dentes vocant, non quod ita producantur, ut oculorum ambitum ferè attingant, cum vix alarum nasorum inferiorem transcendunt, sed quod nervi oculos mouentis portuncula in eos feratur. Per quam viam traducatur ista portio non explicat, certò scio, nullum furculum huius nervi denti canino suppeditari.

### De Iconibus Anatomicis Bauhini.

Pag. 497. **E**quidem Vesalij, & aliorum tabulas imitati, nervos maiores longè delineatos propositum, quam in sectione ostendi possunt. Ex illa ingenua confessione cognoscitur Bauhinum Icones suas ex aliorum picturis deprompsisse: rationem inuestigandi nervos, ab Eustachio mutuatus est suppresso nomine, & quæcumque scripsit de dentibus, ex Eustachio, fideliter transcripsit.

### De Gargareone.

Pag. 506. **I**n istis paginis, ubi de Gargareone agit, multa ex me deprompsit, in 507. dicto & insulato auctore.

### Pharyngis Musculi.

Pag. 511. **P**haryngis musculi sex existant, & describuntur à peritis Anatomicis: Sed Bauhinus duos alios addit, quos in secundo pari describit, qui sunt iidem cum sphenopharyngeis.

### Musculi Ossis Hyoidis.

Pag. 513. **O**ssis hyoidij partium numerus minimus trium est, maximus tredecim, magna tamen ex parte undecim in adultis constat. Fateor ex vndecim portionibus ossis, vel cartilagineis constare, qui numerus est maximus, nonnun-



quam tredecim partibus Os hyoides conflatum visum est, sæpius ex septem ossiculis contextum.

Pag. 515. *Musculorum Ossis hyoidis paria quatuor recensuimus, licet sint qui sex adscribant, duo enim paria lingua adnumeramus, cum Ossis hyoidis, & lingua motus germani sint. Attamen quinque paria musculorum recitat.*

Pag. 516. *Styloceratoidei aliquando in medio perforantur, ut musculo maxillam aperienti aditum præbent. Sed nunquam observaui styloceratoidem perforatum, ut transiunt præberet digastrico: Sed reuolutus est digastricus circa styloceratoidem, & qua parte nervosus est, adhæret Ossis hyoidi, iuxta insertionem styloceratoideis.*

Pag. 516. *Mylohyoideus aliqui addunt, quod Genyohyoideus par istud subsistatur, & ab interiore maxilla parte, qua dentes molares sunt, procedat. Verum est Riolanum tribuisse Mylohyoideum Ossis hyoidi, qui antea myloglossus erat, sed Genyohyoideo superlectus est, non subiectus.*

### Lingue Nervi & Musculi.

Pag. **N**ervi sensifici in unicam linguam, non carnem diffeminantur. Idem pag. 519. 514. nulli nervi à Cerebro, qui motuam facultatem tribuant per linguam substantiam internam discurrant. Nonne nervi sensifici & motui sunt iidem, simulque deferunt sensum & motum partibus, & tribus interiectis lineis nervos in linguam substantiam diffeminari scribit, rectè à tertio pari nervos suppeditari, omisit sextum par, quartum nihil scribit, sed 341. agens de tertio pati nullam eius distributionem in linguam profert, vide inconstantiam vel inscitiam.

Pag. 522. *Inter musculas linguæ myloglossas enumerat, quos in Osse hyoide iam descripserat, eique adscripserat.*

Pag. 522. & 523 *In describendis actionibus musculorum linguæ, eas non simplices, sed varias unicuique imperitiè tribuit, ut dum styloglossum linguam introrsum ducere, & sursum rectè elevari notat, ut dum genyoglossum linguam extra dentes & labia exerere, & introrsum ruotare scribit, dum ceratoglossum linguam sursum, deorsum, antrosum, retrorsum, dextrorsum, sinisterorsum, sive in latera movere assumerat, quomodo isti musculi ratione originis, tam diuersas actiones præstare & edere possunt, hoc impossibile.*

Pag. 529. *Galenus voluit musculos dilatantes & constringentes thyroidei, aperientes & claudentes arytanoides implari, quia dilatio & constrictio pendens à thyroide, ut clausio & apertio ab arytanoides. Et rectè ista omnia proponit, ideoque debebat musculus secundum istas actiones distribuere.*

### De Oesophageo musculo.

Pag. **I**ncertus est Bauhinus, quid statuat de oesophageis, quos modo laryngi, 530. modo pharyngi attribuit. Nam pag. 522. ad pharyngem pertinere scribit, & tanquam duos proponit, pag. 531.

### Musculi Laryngis.

Pag. **B**ranchy in suo corpore, quia tenuissimi inscriptiones nervosæ habent, quales in rectis abdominis musculis reperi diximus, à quibus robur accipiunt, cum longi sint, & ob tenuitatem debiles. Istas inscriptiones, siue internodia nondum observaui, nec exflare puto, cum sint communes toti laryngi, tantum funguntur officio trahendi deorsum laryngem: proptereaque non possunt thyroidem infra constringere, & sic rimulam in graui voce dilatare, & vñ nonnihil asperam arteriam contrahere. Similiter, cum hyothyroidei laryngem totum sursum trahant in deglutitione, non possunt thyroidis partem inferiorem dilatare, superiorem constringere, & laryngem sursum trahendo, rimulam breuiorem & angustioiorem reddere. Sunt enim hyothyroidei, ut & Bronchij actiones simplices, & rectæ per ascensum & descensum laryngis in deglutitione: ideoque communes dicuntur, quemadmodum alij proprii, qui locis suis mouendis cartilaginibus destinantur.

Pag. 531. *Propriorum laryngis musculorum decem sunt, cum propria quinque, quorum sex dilatant, quatuor constringunt. Ergo nulli claudunt & apertient arytanoidem, si dila-*

tatio & constrictio, ut supra dixit, ex Galeno, pertineat ad thyroideam cartilagineam. At in descriptione musculorum, sex illos dilatantes, quos ordine proponit, ad thyroideam cartilagineam refert, & cricothyroideam anticam, thyroideis inferiorem partem constringere, superiorem dilatare scribit, & cricoarytænoides laterales, cum partim extra, partim intra capacitatem sui sint, fortè parte exteriori aperire, interiori verò adstringere scribit.

Pag. 533. Idusculum thyroarytænoides, si inflammatio accedat, angina exitialis invehitur, nihil aut famulum, nec ore, nec ceruice exhibens. Nam in angina aliquando iterum & ceruix rubet, rubet sternum propter musculi bronchy continuatatem, rubent ceruicis latera, propter œsophageos, & colli anterior superiorque pars propter musculorum hyothyroideorum continuatatem. Concedo quidem isto musculo thyroarytænoides affecto, aut inflammato anginam lethalem excitari posse, sed non rubet sternum propter musculi bronchy continuatatem, quia superiectum habet musculus sternohyoideum & mastoideum, & musculus latum, dein traducitur sub sterno, nec possunt rubere ceruicis latera propter œsophageos, quia subiecti sunt laryngi, & incubant corporibus vertebrarum ceruicis, neque colli anterior superiorque pars propter musculorum hyothyroideorum continuatatem tubere potest, quia sunt multis aliis musculis contecti & obuoluti.

### Laryngis Cartilaginee.

Pag. 534. **C**artilaginee Laryngis quatuor sunt, Thyroides, Cricoides, & Arytænoides geminae. Imò quinque cartilaginee constitui debent, scilicet Thyroides, Cricoides, & Arytænoides unica, glottis, & epiglottis.

Pag. 535. Cricoides cartilago cum sic appellata fuerit à Galeno, improprie vulgò innominata dicitur, idque debet reprehendere.

Pag. 537. Cartilago arytenoides communiter pro una cartilagine recensetur, eo quod ex toto inuicem separata non sint, & simul sumpta, & non scorsim actionem absoluant, pro diuersitate subiecti, sic ut plurimum figura variat. Inde probatur cartilagineam arytenoidem unam esse, ac proinde duplicem antea falsò dixerat.

Pag. 537. Inferiores processus cartilaginis arytenoidis, glottida, seu rimulam modulanda voci commodam constituunt, qua parte ex toto diuisi sunt, cum rimulam mobilem, liberamque esse oportuerit. Ergo si processus ex toto diuisi sunt ab arytenoide, non erunt portiones ipsius cartilaginis, sed cartilago glottidis erit omnino libera & seiuincta.

Pag. 537. Articulationis arytenoidis cum cricoide motus, quadruplex est, flexio, extensio, & ad latera motio, sique sursum, deorsum, dextrorsum, & sinistrorsum mouetur, &c. Istos motus non intelligo, nec respondent doctrinæ Galeni à Bauhino approbatæ, pag. 529. dum clausiorem & apertionem attribuit arytenoidei, proinde ridiculæ sunt aliz motiones arytenoidis.

Pag. 538. Sinuum qui sunt ad latera glottidis usus est, ærem attractum ne impetu illabatur aliterare, quemadmodum ab auriculis Cordis fieri solet, qui sinus in canibus ventriculis similes sunt. Cum sinus isti sint patentes & ampli, quomodo subeunt ærem alterare possunt, potius inferuiunt retinendis liquoribus, aut solidioribus, si deerrant in laryngem. Glorietur Bauhinus, quod Seuerinus Pinam retulerit: de laryngis duplici sinu nihil penitus scripserunt, quod sciamus, quotquot à Galeni temporibus auctores extiterunt præter Cassarum Bauhinum: At video omnibus Anatomicis ante Bauhinum sinus istos innotuisse.

### Glottis.

Pag. 539. **G**alenus singulam non modo membranosam, sed etiam adiposam, glandulosamque constituit. Galenus, et si de glottide ista scripserit, tamen monere debebat glottida in homine esse tantum cartilaginofam & membranofam, utramque adiposam, sed glandulosam substantiam non reperiri: At in pinguioribus animalibus, ut sue notat Aquapendens, talem esse glottida, quod pernego, bruta carent glottide, falluntur Aquapendens, & Bauhinus.

*Musculi Epiglottidis.*

Pag. **I** *N* brutis ruminantibus musculi epiglottidis reperuntur, quos breuiter attigimus, 543. cuius nomine quod in bonis larynge sapius studiosi exerceantur, in humani defectu, cuius nomine, in totis hoc opere sapius binarum, maxime eorum, in quibus iuuenes exerceri consueuerunt, ut Simiarum, Porcorum, autium, possimum autem canum partes, in quibus ab humano differunt, recensuimus. Vnde licet coniectare Bauhinum, ex inspectione & dissectione istorum animalium, suum Theatrum condidisse, & imperiis suis discipulos etudisse in Anatomicis. Satis erat monuisse epiglottida in homine solo carere musculis, suos brutis relinquere debebat musculos, cum solius hominis Anatomen describat.

*Musculi Brachij.*

Pag. **P** *R*efertur Bauhirus se in toto opere suo Anatomico methodum quamta fieri potuit diligentia obseruare. Quare cum capitulum & ceruicis musculi, si uisus tantum cadaveris copia adfuit, demonstrari non possint, nisi prius brachij & scapulae musculi separati sint, horum hystoriam post musculos trachij, scapulae & thoracis ordine Anatomico describit. At si exacte sequi uelit methodum Anatomicam, incipere debbat a musculis omoplatae, quoniam trapezius & rhomboides primi occurrunt, ab inferiore parte dorsus usque ad ceruicem. Isti musculi omoplatae remotis & demonstratis omnes musculi pollicis capitis, & ceruicis apparent.

Pag. 551. *Humeri* seu brachij motus abfoluendis, musculi septem constituti sunt. At Bartolinus ab aliis octo, à Cafferis nouem constituti notat, & rotundum minorem atque coracoideum, quem appellat perforatum addit, quamuis istius numeri, atque eorum musculorum primus auctor fuerim.

Pag. 551. *Pectoralem* propter diuersos exortus & fibras, quae contraria serie producta, in modum chiasmi sese intersectant, in tres uel quatuor diuidi posse censuit, postea addit nonnullam uel quibusdam hominibus, portio quadam in acutum tendens reuertitur, quae quasi peculiarem musculum imitatur, cum tamen huius pars sit. Verum est musculum pectoralem in duas partes diuidi posse: sed falsum in tres uel quatuor secari partes, fibris contrariis praeditas. Nam secunda portio pectoralis ab exortu suo iuxta clauiculam, usque ad insertionem ad brachium manifeste diuisa est, trahitque brachium anterius & sursum, dum manus dextra imponitur humero sinistro. Quod Bauhinus accuratius exponere debuerat.

Pag. 553. *Musculum rotundum* ualde describit, sed graniter errauit, dum ad huius musculi partem inferiorem, siue à scapula costa inferiore portionem distinctionem obseruari notat, per uisum, prope quinti musculi insertionem, implantatam. At si ad musculi rotundi partem inferiorem, deest iuxta pectoralis insertionem, portio carnosa distincta obseruatur, quomodo potest, ut ipse ait, à scapulae costa inferiore enasci. Nam scribit neuoso sine prope quinti musculi, id est, supercapularis inferioris insertionem implantari.

Pag. 553. *Superscapularis inferior* imperiè dicitur, uelut infra spinatus, huius manus brachium ad exteriora eueuagere. Nullus musculus circum actioni humeri deputatus est, circumactio sit ab omnibus musculis successiue agentibus.

Pag. 554. *Superscapularis superior*, seu rotundus minor. Confundi istos duos musculos, qui sunt omnino diuisi, & longe distincti. Nam rotundus minor est in extrema scapulae parte situs infra spinam, & iunctus infra spinato.

Pag. 554. *Subcapularem* seu immersum cum superscapulari superiore brachium circumagere scribit. Cum tamen circumactio brachij, ut supra monui, perficiatur ab omnibus musculis alternatim agentibus.

Pag. 554. *Huius* insignem illam musculosam portionem ab scapula processu anchora similis exortam, & humero insertam, nonnulli humeri musculum octauum esse censent. Alij bicipitis, siue primi cubiti musculi portionem faciunt. Equidem musculum istum separatim semper demonstrari, & coracoideum appellari, siue Coracobrachicum, & uidetur inservire eleuationi brachij, dum ad alterum humerum sursum trahitur.

*Ligamenta Humeri.*

**Pag. 517.** **L**igamenta, quibus humerus cavitati scapulae coarpeatur, & adstringitur, quinque numerat: Cum tamen vnicum orbiculare reperitur robustissimum, quod roboratur à tendonibus quatuor musculorum, nempe supraspinati, infraspinati, rotundi minoris, & subscapularis, qui omnes simul iuncti, constituunt tendonem robustissimum, qui caput humeri orbiculatim amplectatur.

*Musculi Thoracis.*

**Pag. 519.** **T**horax motu proprio mouetur respirationis causa, quae duplici thoracis motu ab-  
soluitur, vel cum dilatur, quando inspiratio fit, & aer in pulmones attrahitur, vel contrahitur, quando expiratio fit, ita tamen, ut dum inspiramus thoracis partes inferiores dilatentur, superiores vero angustentur, & contrà, cum expiramus, inferiores constringantur, & superiora dilatentur. Quae omnia ex Columbo de prompta sunt suppressio nomine, sed si in inspiratione thoracis partes inferiores dilatentur, superiores verò angustentur, & contrà in expiratione: Si hoc accidat ex contrario motu costarum superiorum & inferiorum: ergo musculi intercostales externi in costis superioribus & inferioribus diuersas habebunt origines, similiter quoque interni diuersos habebunt exitus, quod est contra veterem doctrinam, vel officio fugeantur ligamenti carnosii costis interiecti.

**Pag. 559.** Respiratio duplex est, alia libera, alia coacta. Libera, ut & violenta duae sunt partes, inspiratio & expiratio, utraque à solius septi transuersi motu efficitur: Illa quidem ex septi contractione, in qua nonnullae costarum fines sursum nonnihil colliguntur, thoracis parte anteriore & inferiore coangustata, posteriore verò ad aërebras deducta, & costis inferioribus septem diremptis, thoracis dilatato. Daens sum, non Oedipus. Istud ænigma soluere non possum, nec intelligo, quomodo costarum nonnullarum fines sursum colligantur thoracis parte inferiore coangustata, & costae inferiores septem sint diremptae, thorace dilatato.

**Pag. 560.** Haec vero, id est, expiratio, ex septi laxitate fit, tum enim thorax pendere suo facile concidit. Ergo in expiratione laxatur diaphragma, non contrahitur, ut antè dixerat.

**Pag. 560.** Ex inspiratione verò plures musculi reperiuntur, cum impetu fortiore efflemus, quam in quiete. Sunt autem sacrolumbi, triangulares, intercostales omnes, quorum exteriores costas inferiores sursum adducunt, interiores costas deorsum adducunt, et dominus musculus octo, & forte in magna necessitate humeri, & scapularum musculi, in subsidium veniunt. Quomodo intercostales omnes inspirationi inferuire possunt, si ex ipso Bauhino, pag. 181. exte-  
riori siue superiores, à superiorum costarum partibus inferioribus in costarum inferiorum partes superiores feruntur. Interni verò intercostales ab inferiorum costarum parte superiore ad superiorum costarum partem inferiorem contratio, quàm exteriores ductu feruntur.

Præterea, si ex ipso Bauhino, ex musculis abdominis octo, obliqui externi & recti à partibus supernis oriuntur, videlicet thoracis, quomodo possunt deprimendo thoracem, inferuire expirationi? Fateor in magna necessitate, scapularum musculos in thoracis subsidium venire, sed nequaquam musculi humeri conferunt ad eam actionem.

**Pag. 561.** Si musculi recti abdominis usque ad claviculas in brevis animantium perculant, non possant esse musculi separati, qui à claviculis ad rectos descendunt.

**Pag. 561.** Serratus posticus inferior costas tres vel quatuor inferiores extra trahendo, thoracis partem inferiorem dilatat, quemadmodum secundam, nempe serratum maiorem octo, vel maiorem superiores attollere, & superiorem partem dilatare diximus. Non potest serratus posticus inferior quatuor inferiores costas extrà trahendo, thoracis partem inferiorem dilatare. Neque serratus maior attollere potest thoracem, nisi scapula prius vel simul attollatur, quoniam musculus iste nascitur à basi scapulae, quae incumbit thoraci.

**Pag. 561.** Ex sacrolumbo sex noni quasi musculi, carnei producuntur, qui tam ortu, quàm insertionem nervi sunt, & in superiores costas sex implantantur, ut à duodecima costa usque ad

*sextamprofiliatis tendines, qui ad singulas costas sex superiores producantur. Sed ob id non multiplex esse potest musculus, exansulis tendinosis, quos suppeditat costis. Id recitat ex Fallopio, & probat, quod refutare debuerat.*

Pag. 562. *Triangularis musculus immixtus, carilagines inuicem adducendo thoracem constringere. Quod valde probo, sed dubitat, an iussit tomenti partem internam sublinat, ut Cordis basin mollius excipiat: At pars quàm ferit Cor destituitur isto musculo, præterea basin Cordis tangere petiit scribit, quod repugnat eius doctrinæ antea propositæ, de motu Cordis.*

Pag. 562. *Fallopius tres alios musculos statuit ad thoracem eleuandum, quos in cervice collocat, hos 3. scilicet partes musculorum, cernicem, & dorsum occupantium in sua apologia existimant, alij scalenum in tres partes diuisum volunt. Ego verò musculos istos nequaquam opitulari thoracis eleuationi credo, quia sunt musculi ceruici dicati: Nam scalenus flectit cernicem, & oritur à costa: Transuersarius erigit cernicem, & oritur à transuersis apophyibus & spinis vertebrarum superiorum dorsi. Propterea, cum eiusmodi musculi inter musculos ceruicis enumerati fuerint, frustra hic repetit, cum exortus & insertio manifestè repugnent.*

### Musculi Capitis.

Pag. 564. *C. Apud utrumque septem musculi extendunt, quorum tertium par addit, præter splenius & complexus, quod portio est, siue productio musculi spinati ad caput vlque pertingens, iuxta processum mammillarem.*

Pag. 563. *Obliquus superior è medio occipitis in processum transversum primæ vertebrae inferantur. Imò potius à processu transverso primæ vertebrae in occipite desinunt, ut rectè statuit Fallopius, quamvis aliter scripserit Sylvius.*

Pag. 566. *Novum par à Fallopio additum, sed à Galeno primò descriptum & inuentum, sub oesophago in anteriore Coli parte situm. Non tam profunde descendit, ut perueniat ad septimam vertebram, nec semper exstat, quod monere debuerat.*

### Musculi Cernicis.

Pag. 567. *I. Inter musculos ceruicis recenset scalenos, quas antea tribuerat thoraci, & nunc oriri à costa prima, & in apophyses transversas inferi scribit, dum flectunt cernicem: Nunc à vertebis ceruicis nasci, & in costam desinere, quando thoracem eleuant. Quæ confusio, vel ignorantia in rebus Anatomis.*

### Musculi Dorsi.

Pag. 567. *B. Aulinius de musculis dorsi agit, & tamen fatetur motum hunc lambis potius, quam dorsi adscribendum esse, cum dorsum, sint ea pars, quæ inter cernicem & lumbos media est, immota videatur: Siquidem motus in vltima dorsi vertebra, quæ libera est, fiat, quæ vndique excipitur, & non excipit. Utrumque tamen ad mouendum dorsum quatuor musculos constituit. Secundum par, scilicet longissimi omnium musculorum corporis nostri, siquidem ab Osis Sacri extremo ad primam vertebram thoraci, aliquando ad Osis temporum processum mammillarem exporriguntur, ab vndecima ad primam angustiores redditi, vnum nervum tendinem interna sede iussit ansula cuiusdam nervi obliqua versus exteriora largitur, quemadmodum sacrolumbi ab exteriori sede costis singulis tendinem offerebant. Sed musculus iste videtur idem esse cum musculo sacrolumbo, nisi semispinatum velis in duas secare partes, quod est impossibile, qui quidem semispinatus, non à spina duodecimæ vertebrae, aliquando vndecimæ exoritur, si motus totius spinæ facit ad duodecimam vertebram, ut antea dixit, quod rectè dixit de motu dorsi, id ex Riolano de promptu.*

Pag. 572. *Notabis diligenter, si verum sit ligamentum quoddam primum substantum, ex vertebrae foramine sede interna, ad radicem processus posterioris inter duos ascendentes, aut descendentes processus exoritur, quod in vertebrae subsequenti sedem inseratur.*

*Musculi Radij.*

Pag. 572. **R**adius motus manuum, vel pronam, vel supinam reddit, Cubiti verò motus quatuor muscularum beneficio ab oluitur, qui Cubiteri dicuntur, non quod in cubito siti sint, sed quòd eum moueant. Notandum omnes musculos aliunde oriri, quàm ex osse quod mouere debent, propterea Bauhinus, magnum non profert secretum Anatomicum.

*Musculus Palmaris, & alius manus.*

Pag. 576. **M**usculus palmaris usum, cuiusq; vola in apprehensione rerum firmiter corrugare, ne cutis facile moueatur. Rectius dixisset curim firmiter & contumaciter huic aponeurosi adhærere ne discedat, & dehiscat in rerum apprehensione, atque isthæc aponeurosis propriis digitorum articulis adnexa, colligandis & coniungendis inter se digiris confert in flexione.

Pag. 577. Verè quidem vult præter palmarem musculum, in principio manus internæ iuxta carpi osiculum oclanum, reperiri carnem quandam vniuersalem: sed non muscularum tenuium, ac breuium effigiem duorum frequenter, aliquando etiam trium refert, ut ipse putat, eòdè sit æquabilis & indiuisa, quæ non ad musculi palmaris tendinem latum implantatur, sed ad pollicis thecarem profertur.

*Musculi Pollicis.*

Pag. 580. **F**lectentes pollicem musculos sex malè describit, ab ossibus carpi vel metacarpj enatos, qui sunt abductores & adductores pollicis. Compara hunc locum cum mea Anthropographia.

*Musculi Lumbricales.*

Pag. 581. **M**usculus vermiculares, siue lumbricales, qui in vola hærent, digitos extendere verè scribit, sed insertionem malè describit, circa primi articuli medium in secundum, quare ipsi ad principia contractus digitorum secundi & tertij articuli interosses adiuuantibus primario extenduntur. Rectius dixisset tendines lumbricalium cum tendinibus interosseorum coniungi, & confundi, & peruenire vsque ad tertium articulum: Cuiusque phalangis digitorum, insertionem fieri extrorsum versus radicem vnguium. Ideoque extensioni digitorum inferuire, ex doctrina Fallopij, quod diligenter notandum in vulneribus volæ manus, vbi extensor digitorum relictus est.

*Musculi extensores digitorum.*

Pag. 582. **E**xtendentium digitos musculorum sex, qui inseritur in minimum digitum & annularem, portio est musculi digitis omnes extendentis, interdum separata reperitur, interdum confusa & inseparabilis.

Pag. 583. Extendentium digitos musculorum oclanus à carpi osse quarto carneus enatus, & per metacarpj partem inferiorem delatus, ad minimi digiti radicem, est musculus hypothenar, minimo digito abducendo dicatus.

Pag. 584. Tertium & quartum par extendentes pollicem musculos, situs in eo spatio, quod est inter pollicem & indicem, iam in flectentibus pollicem musculus exposuit: ideoque ineptè eos adhuc repetit.

*Musculi Interosses.*

Pag. 584. **M**etacarpium musculos octo obtinet, cum in singulis ossium interuallis bini respondentur, eorum lateribus attingit. Sed cum inter quatuor digitos demptq; pollice sint tantùm tria interualla, erunt demtaxat sex musculi interosses.

*Ligamentum annulare Carpi.*

Pag. 589. **A**nnulare ligamentum in Carpo, ad continendos tendones digitorum flexentium & extendentium muscularum duplex constituit: Cum tamen vnicum sit, orbiculatim cingens & amplectens carpum: alioquin, si duplex constituat, vnum internum, alterum externum, non erit annulare vtrumque.

*Vena Brachij.*

Pag. 590. **C**ephalica in plerisque quadrupedibus à iugulari externa promanat. Imò in brutis animantibus semper, à iugulari enascitur, non autem in homine.

Pag. 590. Cephalica iuxta brachij tuberculum in ramum interiore & exteriorem diuiditur. Debebat dicere iuxta brachij flexum internum, eam diuisionem fieri.

Pag. 591. Saluatella Arabum, siue inter pollicem & indicem constituatur, siue inter medium & annularem digitum sita sit, non est soboles medianæ, sed cephalicæ.

Pag. 591. Quæ scribit de vena communi profunda, ex basilicæ profundæ & humerariæ venæ ramo enata, & in ramos tres diuisa, est eadem cum mediana. Nec distributio ista venarum differt à medianæ propagininibus: Nam pag. 592. istam venam communem & profundam saluatellam constituere scribit, vnde manifestè demonstrat, se ignorare prorsus venarum distributionem, & vbi assignanda sit saluatella.

Pag. 593. Basilicæ diremptum non exactè & verè proponit: compara meam Anthropographiam.

*Nervi manus.*

Pag. 597. **N**ervorum manus descriptionem confer cum mea Anthropographia, & agnosces discrimen.

*Radij vsus.*

Pag. 603. **V**su radij, ut manus in pronam & supinam, & in orbem summa agilitate duci possit. Verum est à radio manum pronari & supinari, neutiquam in orbem duci, hoc dependet à brachio obliquo.

*Carpi Ossa.*

Pag. 603. **B**rachialis, seu carpi Ossa medulla medius plena sunt. Imò solida sunt, & medullæ prorsus expertæ. Eorum articulario non potest pertinere ad eam, quam Galenus neutram & dubiam appellauit, ut ratione compositionis diarthrosis sit, ratione obscuri motus synarthrosis. Nam intet se iuncta sunt ossa carpi per symphysium, & immobiliter. Primus ordo Ossium carpi cum radio per arthrodiam iungitur, & mouetur. Secundus ordo cum metacarpio, per eandem arthrodiam articulatur, cum obscuro motu, aut nullo.

*Cur solus homo sedet.*

Pag. 611. **C**ur solus homo sedere possit, quadrupedum autem nullum, veram causam non assignat, quam edisserit à Galeno, lib. 2. de vsu partium.

*De Pede.*

Pag. 611. **M**inor pes diuiditur in pedium, metapedium, & digitorum. Metapedium non dicitur. Peds continentibus partes quatuor communes recenset, cuticulam, cutim, pinguedinem eam suam membranam, & panniculum carnosum. Rectè quidem, sed imperitè, propriam partem constituit continentem musculorum membranam propriam, quæ pedis musculos iouesit, & separat, debebat nominare membranam communem, ut in ventre inferiore.

*Musculi Femoris & Tibiæ.*

Pag. 613. **C**um femoris musculus priusquam tibiæ remoti sint, demonstrari nequeant, de tibiæ musculis primò æquius, sectionis serie ita exposuimus. Imò musculi femoris omnes intactis musculis tibiæ, & levari, & demonstrari possunt: propterea Bauhinus manifestè prodit suam incertitiam in administrationibus Anatomicis.

Pag. 614. Tibiæ seu longissimus flexionum primus fasciam præ se ferens, tibiæ flexit inrorsum, simulque sursum elenat. At Anatomici petitiore tibiæ extendere, & inrorsum ducere statuunt, quia nullo modo flexere potest, nisi per adductionem ad alteram.

Pag. 614. Gracilem sine flexionum secundum scribit in mulieribus obesis, quando femora ducunt, instar ligamenti cuiusdam, vel nerui rigidi apparere, cum in illis neruosus sit, quod nondum obleruauit.

Pag. 615. Semimembraneus à coxendicis Ossis tuberculo, seu appendice nascitur. Tuberculum Isthij non est appendix, sed apophysis.

Pag. 617. Vastus internus prope patellam in crassum, & admodum carneum semicirculum extiterat, ex quo tendo validus enascitur, qui patellam quoque occupat, & eam portionem aliquos musculum distinctum facientes, carneum vocant. Verum est crureum separatum esse à duobus vastis, quamvis firmiter eis adhæreat, sed enascitur à parte superiore femoris infratrochanterem paruum.

Pag. 617. Extendentium quartus sine rectus, ab ilij Ossis tuberculo internus supra coxendicis acetabulum posito nascitur, quo lasso necessarîo moriendum statuunt, quod non est verisimile, Auctorem huius rei nominare debuerat.

Pag. 619. Gloutij secunda fibra, cum prioris gloutij fibrâ decussationem faciunt, quod non est verum.

Pag. 619. Extendentium quartus, seu iliacus externus pyriformis, eo quod Ossis Ilij cavitatem inferiorem & exteriorem, quasi totus suum obliquè implet, & pyramidæ teretem, vel potius teres referat, qui & liuidus existit. Sed Ilij Ossis cavitatem inferiorem non implet, nec liuidus existit, nec est pyriformis, atque tantum tres gloutij repetiuntur.

Pag. 621. Quadrigeminum quartum marsupio subiici notat, quem à Fallopio primò explicatum putat, cum tamen à Sylvio primùm descriptus fuerit, pro quarto quadrigemino, qui tribus præcedentibus paulò latior à toto tubere Ossis Isthij, in latus externum & posticuum trochanteris magni inseritur.

Pag. 623. Quem putat ab Arantio inuentum sub quadrigemino quarto latentem, est obturator externus ab ipso Bauhino descriptus. At prinde his repetit eundem musculum sub diuersa appellatione.

Pag. 623. Existimat Bauhinus, obturatoris interni tendinem contineri intra marsupium carneum secundi & tertij quadrigemini: quod est verum, & ex me desumptum, et alia plura quæ refert sub nomine quidam.

Pag. 625. In principio cuiusque Gastrocnemij, ne in cruris directione capita retro ferantur, singula ossicula sesamina apposita sunt: Quod verum est in simiis, in homine raro, aut nunquam reperitur.

Pag. 625. Plantaris pedem inrorsum vertit, & contorquet, quod præstare non potest.

*Musculi Pedis.*

Pag. 627. **P**eroneus primus pedem flexit. Imò potius extendit, vt peroneus secundus flexit.

Pag. 628. Hic nonnum addunt Vesalius & Fallopius, qui potius pars secundi digitumtensoris, quam peculiaris musculus existit. Et hic quoque musculus mihi ignotus est.

Pag. 629. Digitumtensor longus versus pedem carnosam portionem à latere externo descendit, quæ deorsum protensa pedis musculum novum quibusdam dictum constituit. Et reuera musculus est separatus à longo digitumtensore, & pedicus dicitur.

Pag. 630. Tendinis pollicis flexoris priusquam secundo pollicis Ossis inferatur, sesaminum ossiculum magnum præponitur. Imò non vnum, sed duplex appositum est ossiculum, ad securitatem tendonis.

Pag. 631. Lumbrales in pedis planta siti, non à tendonibus musculus secundi digitumtensoris enascuntur, vt in manu, sed à massa carnea.



Pag. 632. *Decem interossei in pede reperiuntur. Imò tantùm octo, quia sunt quatuor dumtaxat intervalla.*

### *Vena femoris & Tibia.*

Pag. 632. *Saphena inter cutem & panniculum carnosum ad genu versum malleolum internum de-*  
632. *scata in pedis superiora versus digitos, pollicem præsertim, varie dividitur, hæc à*  
*Medicis in variis affectibus, præsertim in mensium retentione, circa malleolum secari consuevit.*  
*Sane in coxendicis dolore venam ad malleolum externum felici successu hactenus secare infirmus,*  
*sic etiam à nostris supra pollicem in capitis affectibus pro vena Cephalica inciditur. Verè qui-*  
*dem scribit Saphenam ad malleolum internum deduci. Sed imperitè eam secari ius-*  
*sit ad malleolum externum in coxendicis affectibus. Nam pag. 635. cum agit de ischia*  
*maiore, notat hanc in coxendicis affectibus circa malleolum externum incidi: sed*  
*malo accusare lapsum memoriz.*

Pag. 634. *Poplitea ex duobus ramis cruralibus iunctis conficitur. Attamen continua-*  
tio est ipsius saphenæ, quæ iuxta poplitem in duas partes secatur, quarum una ad  
malleolum internum descendit, altera inter duos gemellos, siue gastrocnimios de-  
orsum excurrit.

Pag. 639. *Notat cruralem arteriam inter calcem & malleolum anteriorem, pedis humiliora*  
*subire, & ad malleolum internum pedi ramulum offerre, qui ad pollicis musculum accedit. At-*  
*tamen observatur malleolus internus arteria carere.*

### *Nervi Pedis.*

Pag. 640. *Nervi pedis & cruris distinguere debebat in anteriores & posteriores, tres sunt ante-*  
640. *riores, & unus posterior, isque amplissimus & longissimus. Sed falsum est à se-*  
*cundo anteriore, ramum venæ saphenæ ad pedis pollicem usque attensum, iuxta mal-*  
*leolum descendere: Cum tamen solitaria sit saphena in toto suo progressu, & iuxta*  
*malleolum nervo & arteria destituta.*

### *Tibia ligamenta.*

Pag. 644. *Tibia & femoris ligamenta sex describit, cum tamen tria tantum reperiuntur.*  
644. *Vnum commune, & duo interiecta, eaque eruenta.*

Pag. 645. *Ligamenta, quibus Os tali cum vicinis partibus iungitur, plurima descri-*  
bit, quæ non existant.

Pag. 648. *Erravit quoque Bauhinnus, dum Offa calehoidea, cuneiformia, quod cu-*  
neum referant, nominari scribit.

Pag. 659. *Pedum secunda pedis pars est. Si secunda pedis pars est, & meta carpo in*  
manu respondeat, alij metatarsum vocarunt: ergo metapedium non potest esse se-  
cunda pars pedis, ut antea dixit.

Plurima prætermisi ex *Laurentio* deprompta, quia iam correctâ: interea non pos-  
sum dissimulare præfationem libri de partibus similibus, totam de verbo ad verbum si-  
ne vlla mutatione desumptam fuisse ex libro *Anatomico Caroli Stephani Medici Pari-*  
*siensis*, sibi que propriam fecisse.

F I N I S.



ANIMADVERSIONES  
IN LIBRUM ANATOMICVM  
DE FABRICA HVMANA  
ADRIANI SPIGELII  
Professoris Anatomici Patauini.

**N**olo cum laevis lullari, siue litigare cum mortuis, eorumque manes inquietare, & exire sepulchris. Imò precor Deum, ut molliter Offa quiescant; & simulis iocenter flores superaddiderem, propter egregiam nauatam operam in rebus Anatomicis. Sed cum mortui uiuant adhuc per ingenij monumenta, id est, libros superstitēs, non displicebit, ut spero Lectori, si librum Anatomicum Spigelij examinem, ut vitæ scopolis, rutis per uallum Anatomie aquarum nauigare possit, sequendo meam Anatomicam numeris cynosuram. Tam mentem iudicium de Spigelij libro Anatomico proposueram in editione Gallica, priusquam ad me peruenisset Synagmā Anatomicum Vellingij, ubi didici Spigelium testamento suo precepisse, ut viginti quatuor lectiones Anatomicas, quas exornauerat ad editionem, dumtaxat ederentur in lucem. Bucretius amicus & discipulus Spigelij, non solum, sic mutilum & imperfectum suum Praceptoris opus Anatomicum exire in lucem: Conatus est ex schedis Authoris, & proprio Marte perficere quod decrat: idque praestitit, additis Iulij Casserij Iconibus Anatomicis, rucogne errores non Spigelio, sed eius discipulo tribuendis (aut, qui non tam Spigelij peritiam & eruditionem in rebus Anatomicis adeptus fuerat. Sed ista, incipiam à secundo libro, quia primus partes tantum exterius declarat, quae non sunt Anatomicae, quia spectantur sine dissectione partium, & percurrendo celeriter, praecipuos dumtaxat errores annotabo, cum magna pars in Laurentij & Bauhini libris Anatomicis, emendata fuerit.

*Partes similes.*

Cap. 1. **P** Artes similes dicuntur, quamuis plures, non quia confimiles, sed  
lib. 2. quia sunt simplices, non ex aliis compositae.

*Differentia Ossium.*

*Ibidem.* **I** Psz differentiae Ossium sunt confusae admodum, & inanes ac inutiles, idcoque praetermittendae.

*De Apophysi.*

Cap. 1. **F** Alsum est processum acutum dici collum & ceruicem: Nam collum est quidem  
2. processus, sed capite terminatus, siue magnum, siue paruum fuerit,  
Qqq ij

*De Articulationibus.*

Cap. **N**on rectè percipis mentem Galeni de articulo, & symphyfi, nec quidquam mandandum in doctrina Galeni fuisse demonstranti commentariis in Galeni librum de Ossibus, & lib. 6. Enchiridy Anatomicæ. Quod spectat ad quinque illas differentias symphyleos quas constituit, reiecta syneurosi, non sunt admittendæ: siquidem enumerat syssareosim, per carnes, synchondrosim, per cartilagineas, syndesmosim, per vincula, syntenosim, per tendones, synumenim per membranas. Attamen tres à Galeno descriptæ alias comprehendunt, si per syssareosim intelligimus musculos, habent tendones, syneurosis comprehendit, non nervos dumtaxat, sed nervosa corpora: Sic membranz duæ nervosæ articulis circumiectæ, sunt vincula, ligamenta, ex Galeno libro de Ossibus, propterea tres illæ novæ symphyleos species, reiciendæ, de quibus Spiegelius gloriatur, cum nullus ante ipsum verba fecerit.

*Humor Articulorum.*

Ibidem. **H**umor albus, tenax ac glutinosus, in spatio quo extremitates Ossium inter se articulantur, continetur. Id verum est, & in morbis articulorum crescit & luxuriat magno ægrorum detrimento, in bobus magna quantitate colligitur in articulo femoris cum tibia, & nostra lingua vocatur goute de bœuf, & vtuntur pro vitione articulorum & spinæ, in debilitate corporis ad motum, quia humor iste defecit & roborat, in homine sæpius abundat in genu, præsertim mulieribus, propter frequentem & longam adgeniculationem.

*De Nutritione Ossium.*

Cap. **O**ssa nutriuntur sanguine, communi alimento partium, effunditur per venas & arterias in cavitates Ossium, ut in medullam converteratur, quæ est proximum alimentum Ossis. Sed intra cavitates maiorum Ossium medulla continetur non tantum ad nutritionem, sed etiam levitatem & humiditatem Ossium, sine qua nimium à motu assiduo exarescerent, & in febribus ardentibus: dein inservit regenerationi calli in Osse fracto.

*Ossium principium.*

Cap. **O**ssium principium rectè spinam esse statuit. Id confirmari potest autoritate Aristotelis, lib. 2. de partibus Animalium, cap. 9.

*De usu suturarum.*

Cap. **E**rudis istam rationem, suturas factas esse in Ossibus cranij, ut fractura cum ossè finiretur, sed experimento edoctus, vitas plures per ipsas suturas penetrasse. Debebat dicere vitra futuras, sed hoc rarum est, si verum.

Ibidem. Suturas mendosas, siue nothas cum Baulino constituit, & communes quinque, sed etiam non sunt multiplicanda sine necessitate, ipsæ futuræ quas adiungit, præter temporales, sunt portiones futuræ sphenoidæ, & etlamoidæ, & frontalis, quæ sunt tres communes separantes caluam à facie, siue maxilla superiore, & circumdant Ossa communia cranij. Ideoque Galeni doctrinam sequi oportet, in numero suturarum mendosarum, cui adhæsit Laurentius, & rectius exposuit meo iudicio, quam Spiegelius.

*De Cauernis Frontis.*

Lib. 2. **C**auernas frontis membranula viridis succingit, materiam in se continens viscidam, & Cerebri substantia non valde dissimilem. Substantia illa mucosa in pueris reperitur ad incrementum Ossium, non in aliis ætatibus: neque viridis est hæc membrana, sed potius periosseum æmulatur, putatur ad hauriendos odores conferre, vt ibi retineatur, posset hic vsus admitti, sed tantum per accidens, non primario naturæ instituto, voci canoræ potius inferuire credo, quod inficiatur.

*De Bregmate.*

Ibidem. **V**erum est præcipua duci, non ut præcipua in capite, quod Cerebrum ibi semper sit madidum. Addere debebat, propter sinum longitudinalem, & coudum quatuor sinuum in vertice capitis.

*Ossa sincipitis.*

Ibidem. **O**ssa sincipitis superficiem internam habent asperiusculam ob vestigia, quæ venæ iugulares per Cerebri meninges dispersa imprimunt, & hac Chirurgis solidè notanda sunt, ne vbi terebra cranium aperiendum erit, impetire venas cum vitæ periculo vulnere, sed caute agenda illas illæsus conseruent. Notabile præceptum, si verum, debebat monere locos, siue spatia vbi locatæ sunt istæ venæ. Imò nullæ iugulares venæ per meninges disperguntur, neque per ipsos sulcos Ossis traducuntur, sed ipsæ venæ sunt externæ, & propagines iugularis externæ, per totum cranium expansæ, quæ ramulos transmittit, per foramina caluariz, huc & illuc dispersos, quorum cognitio nulla certa haberi potest, & cum ipsæ venæ sint externæ, tum sunt abscissæ dissectæ eute, antequam terebra perforaretur cranium.

*Os Occipitis.*

Ibidem. **O**ccipitis Os capita, siue appendices duas habet ad basim sitas, quæ prima callosè vertebra articulantur: Non sunt appendices, sed apophyfes, planæ etiam in pueris, ad securitatem ipsius motionis.

*Ossa Maxilla Superioris.*

Cap. 12. **O**ssa maxilla superioris non sunt dura, solida, sed quæ pumicis in modum cauer-nulis medulla plenis conficitur. Ossa quamuis tenuissima, sunt tamen solida, sunt quidem pumicosa versus dentes, sed alibi nullam medullam continent, neque medullarem succum. Omisit enumerare cauernas, siue sinus istius magui maxillaris, quod in pueris est medullosum ad incrementum maxillæ, postea crescente capite, & absorpta ipsa materia, cauernosum Os remanet, ad vocis resonitum.

*Sutura & Ossa maxilla superna.*

Ibidem. **D**odecim suturas & totidem Ossa maxillæ superoræ constituit, sed numerus vndeuarus prior, & præferendus, vt demonstravi in Osteologia Galeni.

*De Cartilaginibus interiectis.*

Ibidem. **C**artilago, quæ inter caput & sinum maxilla inferna interponitur, lauis est ac mollis, errauit cum Laurentio, est mobilis & dura, vt in articulatione clauiculæ cum sterno, & femoris cum tibia. In his articulis interiecta est cartilago duriuscula, mobilis, seruanda ab incostructione cartilaginosa vtriusque Ossis.

## De Articulatione Dentium.

Cap. **I** Nsuperius hallucinatur in explicanda articulatione dentium, verè scribis esse gomphosum, sed articulationis speciem duplicem: nam ratione nervi, potest esse symarthrosis, ratione gingivarum fissuræ. At superius expunxit syneurosim, ut alias tres novas symphyseos species introduceret, nunc ipsam admittit: Præterea sypharcosis, & syneurosis sunt species, symphyseos, non articulationis, est potius syndesis, quàm syndetismus Ossium.

*Ibidem.* Admitto cum Spigelio incisorum & caninorum dentium radices sæpe reperiri incurvas, quod dum accidit rarè euellitur dens, sine portione alveoli, quod occasionem præbet doloribus, & symptomatis grauioribus.

*Ibidem.* Membranula quæ alveolum replet, est dilatatio nervi ad radicem dentis inserti, filamentum nerveum radici adnatum.

## De Dentibus Ocularibus.

*Ibidem.* **T** Olerabilis est opinio, dentes oculares superiores recipere nervum ab illo, qui spargitur in musculos faciei, & egreditur ex orbita inferiore oculi, sed dentes inferiores canini maxillæ infernæ, portionem istius nervi non admittunt: Ideoque non possunt dici oculares.

## Os Hyoides.

Cap. **O** S hyoides in mulieribus ex paucioribus ossiculis nunquam etiam ex tribus componitur. Tantumdem ossicula deprehendi, in mulieribus, in viro ac muliere consimilis est structura.

*Ibidem.* Connecuntur hæc ossicula cum variis partibus, omisit epiglottida quam æquè fulcit ac linguam. Sed illa connexio si per illam unionis speciem, qua varia est, ac multiplex, syneurosis, sypharcosis, symmetosis. Ergo admittit syneurosim, quam repudiaverat, & ista connexio non est vera symphysis, ex doctrina Galeni, sed potius syndesis.

## Clavicula.

Cap. **C** Lavicularum usus est sustinere scapulas, ne una cum humero in pectus cadant. 15. Crederem potius repellere, ne incidant in pectus, nec satis validæ sunt ad sustinendam scapulam cum tota manu, hoc munus præstant robustissimi muscoli extra scapulam, & alij incumbentes scapulæ, qui totam manum sustinent.

## Orificium superius Ventriculi.

Cap. **I** N parte inferiore sterni canitas occurrit, nostris scrobiculus Cordis, Veteribus cordis, 16. Cor dicta, quod ibi cordis sita sit, siue orificium superius, & sinistrum ventriculi, cuius dolores omnino similes apparent doloribus Cordis: Verum longè distat ab ea parte sterni orificium superius ventriculi, quia situm est ad undecimam dorsæ vertebra, eique adhæret, habetque interiectum Hepar, & corpus ventriculi, nec sine ratione veterum appellarunt ipsam partem Veteres, quia Cor proximum adstat inclusum pericardio, quod centro nerveo Diaphragmatis connectitur. Ideoque propter viciniam affectis Hepati, Ventriculo, Cor ipsum verè condolefcit, & compatitur.

## De Articulo Scapula.

Cap. **L** Audo ipsam observationem, iam à me notatam, scapula canitatem imparem 17. excipiendo capiti humeri, adiacentem fuisse lumbi cartilagineo, qui diligenter inspicendus & notandus, ut in restituenda luxatione humeri, quantum fieri possit, conferretur, metu relaxatus.

*Dorsum.*

Cap. 18. **S**i dorsum vocas doctrinæ facilioris gratia quidquid à prima colli vertebra ad Os Sacrum protenditur, facilitè explicabis musculos dorſi, ſed ipſa doctrina noua eſt.

*De articulatione Vertebrarum.*

Ibidem. **V**ertebrarum connexio, qua pacto inter ſe fiat, libro tertio, ubi de ligamentis agemus, fuſius ducitur. At nullibi articuli ſpeciem declarauit, quæ eſt gynglymus, iſque compoſitus, ex tribus vertebris conſtarus. Non nouit articulationis differentiam in vndecima vertebra dorſi, cum inferiore, & cur vndecima clauis dicatur, cur ſpinæ morus fiat ſuper duodecima vertebra, propter ipſam articulationem ab aliis differentem, quæ non eſt gynglymos, ſed arthrodia. Ignorauit etiam ſpinæ figuram deſcriptam eleganter ab Hippocrate, & recitaram à Laurentio, quod eſt admirabile, nec prætermittendum, quia perneceſſarium ad vſum artis.

*De Offe Sacro.*

Cap. 21. **C**omparatio Offis Sacri cum cuculla monachorum, primum enuntiata fuit ab Andrea Lacuna in ſua Methodo Anatomica, ſed odioſa eſſe debet Monachus, & miror hoc expreſſum fuiſſe in Italia, pœna inquisitionis dignum, quam luit in corpore Rucretius incarceratus, crimen expiauit mutatione Religionis ex Lutheranus factus Catholicus.

*De prolapſu Podicis.*

Cap. 22. **L**audo iudicium Spigelij de prolapſu podicis in pueris, propter molliem cœcylus, ſed mulieribus procidit in partu difficile, ac reſtituitur ſuſcita circa mater ualde conſtricta: Prius indito in podicem digito, ſuo loco coaptatur, & ſaſciatio illa poſtea conuenient.

*De Offe Ilium cum aliis.*

Cap. 24. **I**nſtutura Offium in Offe Ilium in pueris ad ſeptimum uſque annum maxime euidens eſt, in adultioribus cartilagine illa exſiccata, ſenſim perit, ut adeo per ſymphysim in ſimplex & vnicum os, ita illa abeant. Ergo ſymphylis eſt coalitus Offium ſine motu, & cartilago eſt interiecta, non circumiecta, abſoluitur cum medio, quo oblitterato remanent inter ſe iuncta, ſed ſymphylis inter Offa pubis mediante cartilagine remanet in feminis, magis conſpicua, quàm in viris ratione parturitiginis, in qua laxatur emollita.

Ibidem. In Offe Ilium ſemicirculus ille, ſpina Offis Ilium dicitur. At cauitas coſta, gibboſitas uero dorſum, malè iſtas partes indiget, ſemicirculus eſt coſta, extremitates, ſpinæ dicuntur.

Ibidem. Quod ſpectat ad relaxationem Offium pubis in partu, & Offium Ilij cum Offe Sacro, illam admittit, & in Theatro Anatomico ſe offenditſe affirmat, quod verum eſt, eique ſubſcribo, ut alibi copioſè demonſtraui in hiſtoria Fœtus humani.

*De articulatione femoris cum Tibia.*

Cap. 29. **N**atura in ambitu vtriuſque cauitatis ſuperioris tibiæ, cartilagineum appoſitis, quæ crassa verſus centum attenuantur, & ligamentorum ope annectuntur. Ipſa cartilago eſt magni momenti, ibi appoſita ad firmitatem articulationis, excipit capita duo femoris, eſt ſermè circularis, mobilis, & reuelliur, ſeparata ab incruſtatione cartilaginofa Tibiæ: hanc primus detexit Riolanus.

*Ossa Calchoidea.*

Cap. 30. **E** Rruit cum aliis Anatomiceis, cum Ossa ~~peruani~~ cum Fallopio interpretatur cunciformia.

*De Cartilagine Trochleari Oculi.*

Lib. 3. **C** Artilago quæ in oculi orbita inferuit musculo obliquo maiori, non cap. 2. est inuentum Fallopy, sed *Rondelety*, quam descripsit eleganter in sua historia de piscibus, quæ edita fuit ante editionem *Observat. Fallopy*, atque in Delphini Anatome ipsam pluribus verbis expcissit.

*Ossis Hyoidis ligamenta.*

Cap. 5. **O** Ssis hyoidis ligamenta ignorat, & quibus Ossibus sit alligatum & ap-  
pensum, nempe styloidi, & mastoidei apophyſibus, non inuacio *ruanda*,  
& cartilaginea ligamenta, quibus, partibus adiacentibus adnectitur. Nam soli cartilagini  
thyroidi adnexum est, per duo cotnacula ipsi coaptata, quæ habeantur pro ossiculis.

*Carpi ligamenta.*

Cap. 6. **S** I duo sunt in carpo ligamenta, vnum externum, alterum internum, non  
possunt esse annularia, sed vnicum est orbiculatum, amplectens totum  
carpum, ideoque rectè annulare dici potest.

*Ligamenta Femoris & Tibiæ.*

Cap. 7. **A** Vt non vidit ligamentum interiectum articulationi femoris cum acetabulo  
Iſchij, & aliud interpositum duobus Ossibus femoris & tibiæ, quæ  
sunt ciuenta, contra naturam aliorum ligamentorum, & hoc notatione dignum erat.

*Novam doctrinam de Musculis, Spigelius sibi arrogat.*

Lib. 4. **D** E *Actiōe & Vſu Muscularum*, ita ab omnibus traditum est, ut siquam  
cap. 4. mihi gloriam nouarum opinionum vendicem, quæ veritati propius accede-  
re statuat, quàm recepta sententia: Non meritiſſe proſeſſo à quoquam arrogantia ſua repre-  
hendendus, eſſo. Sed ſi meas opiniones fortim ſurreptas & uſurpatas deprthendam,  
liceat mihi inſclamare, hæc mea ſunt. Nam agnoſco ex mea *Anthroponographia* huſcili-  
brum de Musculis magna ex parte contextum eſſe. Tractabo tantum de exiſtentia  
& actiōe muscutorum, non de origine & inſertiōe, in quibus multum peccatur.

*Frontis Musculi.*

Cap. 5. **F** Rontis musculos deſtinat ſupercilio attollendo, quæ fuit *Riolani* opi-  
nio.

*Musculi Palpebrarum.*

**I** N musculis palpebrarum ſequitur *Riolanum*, dum non orbicularem vnicum, ſed  
duplicem ſtatuit, rationibus iſdem vitut.

*De Tonico motu Oculorum.*

Ibidem. **T** Onico motui in homine peculiareſ musculi ſuſciti non ſunt, ſed recti ad ſua  
principia ſimul contracti, in homine præſunt. Imò tonicus motus in ocu-  
lis humanis neceſſarius eſt, in aſſidua contemplatione, vel lectiōe fixis oculis,  
quod præſtant musculi obliqui duo in vnoquoque oculo, cum recto leſtorio, qui  
trahunt pupillam, ſiue oculum veſtus nares, & aliquandiu ſiſtunt. Rectorem actiō

instabilis est, quia in actione pares sunt, & possunt dumtaxat leniter sistere vnum oculum in directa visione. In descriptione musculorum oculi particulari multa cognosco, quæ mea sunt, sed illa prætermitto.

### De Trochleatore Musculo Oculi.

*Ibidem.* **M** Vsculum obliquum maiorem Trochleatorem primus appellavi, & Trochleæ mentionem adiudicaui *Rondeletio*. *Huius musculi usus est oculum versus internum angulum circulari quadam motu volvere, sicque pupillam à naribus abducere.* Si oculum versus internum angulum voluit, non pupillam à naribus abducit, sed potius adducit. Erravit quoque, dum vsum obliqui minoris describit, pariter monet utriusque obliqui tendines simul coire, ut idem tendo utriusque esse videretur ex *Riolano*, sed oculum obliquè deorsum ad externum angulum circulari motu volvere, sicque pupillam naribus admonere male scribit: Si hoc efficit, versus internum angulum trahit pupillam, ut ambo sistant firmiter oculum in longo intuitu.

### De Musculis Buccarum.

*Ibidem.* **E**x *Riolano*, buccarum musculos non buccis, sed labiis communes facit, & buccinatorem non instandis tibiis, sed potius constringendis buccis cum labiis inferiure putat.

*Ibidem.* Malè describit musculos labiorum. Non attollentem labium superius, nullum verò deprimentem assignat, labro inferiori depimendo quandam destinat, nullum attollentem, præterea ad buccas reuocat musculum quadratum, & in mento terminatur? ille pertinet ad musculos maxillæ inferioris.

*Ibidem.* *Maxilla inferior habet motus sex simplices, quorum beneficio sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum, & retrorsum ducitur.* At non potest retrorsum moueri, quia Os habet oppositum, omisit antrorsum duci, quum dentes inferioris maxillæ super eminentes superiores, quod fit à pterygodeo interno, qui propellit antrorsum maxillam, dum intumescit: malè describit Digastricum, qui refectitur in media parte gracili & tenaciosa, circa styloideum musculum osu hyoidis, cui alligatur per nervosum ligamentum, & ne, dum agit, introcederet, natura ligamentum à styloide apophysi vsque ad angulū inaxillæ infernæ produxit, cui attentus est digastricus, quatum par pterygodeum abducit maxillam & antrorsum ducit: Quantum par maxillam abducens facit, quod à causis pterygoidis apophysis nascitur. At illud par cum temporali potius adducit, & attollit maxillam, & ipsemet id fatetur: Ideoque adducens dici debet, non abducens: addere debuerat quadratum musculum, quem imperitè attribuit buccis, nam cum digastrico deprimit maxillam. Quæ scribit de musculis auriculæ falsa sunt, mea narratio vetior est, ac fidelior.

### Lingua Musculi.

*Cap. 6.* **N**on improbo, imò laudo, quod scripsit *Spigelius*, de linguæ corpore diuiso in duos musculos, quod discriminat mediana linea: bis mihi videre contigit ipsos duos musculos linguales separatos, remanente membrana præuenul, quæ duas ipsas partes adhuc vinciebat, sed lingua erat adeo scabra & arida, ut tota & siccata videretur instar linguæ bubulæ fumo desiccata.

### Musculi Pharyngis.

*Ibidem.* **M** Vsculos pharyngis primus *Riolanus* descripsit, & nominauit, & *Spigelius* fideliter expressit.



*Musculi Laryngis.*

Ibidem. **C**um describis *musculos laryngis*, bronchum à se nominatum fuisse sternothyroideum, tamen nomen nostrum more ab usu & insertione, sed velim sciant omnes Anatomici, nomina musculis post *Sylvium*, à Medico Parisiensi eius discipulo *Michaeli Mercutio* imposita fuisse, & *Banlinum*, dum fluderet Parisiis ista nomina, quibus usus est in sua *Anatome* retinuisse, & tanquam à se inuenta propoluisse. Idem facit *Spigelius*, sed malè ipsorum actiones exposuit, confusè admodum, quas tamen faciles esse, & perspicuas quisque recognoscet, si referat ad motum totius laryngis in suo ascensu, & descensu, deglutiendo, motiones thyroidis, quæ dilatatur & constringitur, motiones arytenoidis cartilaginis, quæ elauditur & aperitur: Compara meam explicationem de musculis laryngis, cum ipsa descriptione, & agnosces discrimen.

*Musculi Capitis.*

Cap. **M**Ali scribis caput supra secundam colli vertebra, circa processum dentiformem circumvolutione quadam velut ad axem duci. Imò levis est motus folius capitis, dum verò circumvoluitur ad humeros, dependet à colli motu.

Ibidem. Complexum musculum quatuor partes fecit, dein ex quatuor quinqueve initiis, aut musculis constare videtur. Nili quis peritus fuerit in separatione istius musculi, quia ex variis tendonibus implexus est, in plures dividit, modum administrandi ipsum musculum docui in Manuductione myologica. Sed *Spigelius* non recordatur sui præcepti myologici: Omnes musculi simplices, aut plures erunt, prout una membrana, vel plures inter se iuncti, aut distincti fuerint. At ipsi musculi parvi, in quos complexum diremit, non habent proprias membranas, ergo non sunt distincti musculi.

Obliquus minor potius ab apice tranfuerſi processus primæ colli vertebræ enascitur, & inseritur in occiput, paulò supra magnum foramen occipitale.

*Musculi Thoracis.*

Cap. **D**Escribit *musculos thoracis & dorsi*, ubi multum erravit, vel hallucinatus est in dilatatione thoracis, non totus dilatatur, sed tantum eius partes inferiores, superioribus contra modicè angustatis: In contractione verò inferiores constringuntur, superiores partes à diverso nonnihil dilatantur. Ergo musculorum intercostalium, tam internorum, quàm externorum diuersa erit origo & insertio, in spatiis costarum inferiorum, aut superiorum.

Ibidem. Musculi dilatantes & constringentes thoracem, non alij sunt quàm diaphragma, & intercostales. Diaphragma solum in libera ac naturali respiratione moti, in coacta intercostalium opem sibi adiungere scribit.

*Diaphragma.*

**D**iaphragma *Plinio & Celso præcordia dicuntur, quasi præcordia*, iuxta Cor posita, quoniam ipsi Cor adnectuntur propter adhesionem circulares pericardij. Musculum duplicem esse statuit, & probat, quod iam refutaueram in libello Gallico contra *Chirurgum*, & id repetij in *Anthropographia*. Principium in centro collocat, finem in circuitu costarum. Hæc omnia non reprehendo, sed non possum admittere diaphragma. In inspiratione dum constringitur, inferiores costas quibus inseritur, sic propellit, ac cavitatem ipsius ampliorem reddere. Si contrahitur diaphragma abbreviatur, ac proinde adducit intra costas inferiores, & cavitatis angustior erit, sed dicere debebat, non inferiores costas dilatare: sed medias superiores supernè vergentes naturaliter, sursum reuulsas, cavitatem thoracis ampliorem reddere.

*Musculi Thoracis.*

**I**ntercostales musculi externi contracti ad suum principium, sursum & extroorsum costas ducunt, unde thorax dilatatur, & sic cavitatis maior fit: Interni sursum & introorsum unde constringitur, & cavitatis fit minor. Illa non percipio, nec intercostales externi & interni, agendo seorsim, costas sursum ducunt: Externi eleuant costas, interni depriment: Itaque externi mouent costas sursum & extroorsum in inspiratione, interni costas ducunt deorsum & introorsum in expiratione.

*Musculi Dorsi.*

**Ibidem.** **M**usculos thoraci, siue dorso attribuit sex, utrimque tres ad extensionem. Primus est longissimus ab Osse Sacro usque ad costam extensus, secundum longitudinem dorsi. Secundus est semispinatus, tertius est sacrolumbus. Ipsa concedi posunt ad erectionem spinæ, sed tres istos musculos vnum dumtaxat constituere non admitto, quamuis difficillimè secerni queant ab imperito Anatomico. His musculis annumerat serratos posticos, superiorem & inferiorem, qui tamen nullam actionem edunt, sed instar fasciæ arctissime comprehendunt, ipsos iam commemoratos, ne in suo motu dehiscant, & laxentur: Cum tamen ab omnibus peritis Anatomicis designati fuerint, eleuandis costis in vehementi inspiratione, quæ non sequitur motum naturalem diaphragmatis: nam cum ipsis musculis agunt musculi omoplatae leuatores, & per consequens serratus maior attollit totum thoracem, & violentum ipsum motum sequitur diaphragma. In exsufflatione, siue violenta expiratione, etiam musculi abdominis agunt, retrahentes deorsum thoracem. Non admitto istam rationem de serratis posticis, quomodo dilatabitur cavitatis thoracis, trahentibus his musculis costas ad spinas, & quidem superiores, cum potius in dilatatione thoracis inferiores ipsius partes extendantur, superiores constringantur, vt demonstratum est: sed nec à quoquam dubitari potest, imò valde dubito, & iam id improbatum ac refutatum articulo de diaphragmase.

**Ibidem.** Flexitur thorax cum versus terram incuruamur, huic motui nullum musculum assignant Anatomici: ego vero Rectos ipsius abdominis, siquidem flexio recta fiat, ergo à pubis Ossibus oriuntur. Cæterum fateor musculos supra dorsum extensos, conferre ad extensionem & erectionem totius spinæ, sed motus spinæ dependet à lumbis, siue articulatione vndecimæ vertebræ cum duodecima, vel huius postremæ cum prima lumborum, propterea non intellexit Spigelius ipsos motus, & confundit. Nec amplius gloriatur de lumborum motu, cuius ante ipsum nullus Anatomicorum mentionem fecerat: Sylvius vsum primus declarauit, & postea Riolauius, qui demonstrauit verum dorsum non moueri flexione, quia costas oppositas habet, adnexas sterno.


*De subclauio Musculo.*

**Cap. 9.** **S**ubclauium musculum contra Anatomicorum opinionem ad vnum, eriri statuit, à costa subiecta iuxta Sternum, & inferi in claviculam iuxta acromion: Huius officium assignat retrahere claviculam, quando attollitur simul cum scapula, ideoque retrahente indiget musculo. At si eleuatur cum scapula, cum eadem deprimitur, & redit ad suum locum naturalem. Scapula habet suos musculos deorsum trahentes: ergo non opus habet clauicula deprimente peculiari, cum non habeat leuatorem proprium, ratio aut nunquam facit flexentem musculum, aut leuatorem, quin etiam contrarium extendentem, aut deprimentem crearit, ex Galeno, lib. de motu muscularum: Sed vt verum fatear, quia prima costa est breuissima & latissima omnium costarum, credo musculum istum, obscurum, vel nullum edere motum, instar ligamenti interiecti, & sequitur naturam aliorum musculorum intercostalium, itaque clauicula interposita est sterno & scapulae, vt repagulum, quod impedit scapulae procidentiam in pectus, atque sequitur motus scapulae, ideoque nullos habet proprios musculos.

## De Musculis abdominis, noua opinio examinata.

Cap. **C**irca propriam cuiusque horum musculorum actionem & usum, maximas difficultates inuenio, sed nec satis mirari possum, quomodo res praeclarissima ingenia, quae hactenus tot scilicet floruerunt, & in hoc ipso gnaniter tanta industria insudauerunt, iam alicui tamen, siue à veritate, siue ab aliqua solidiore cognitione fuerint. Quamobrem quae adhuc usque, nostra industria assignare potuimus, tantò maiore nunc fide ac diligentia, quantò obliuiscera alius fuisse proponemus. Nunc expendamus, quid inuenerit Spigelius, supra praecedentes Anatomicos, probauit musculos obliquos ascendentes, ex doctrina Galeni enasci à costis, non autem ab Ossibus pubis aduersus Columbum & Laurentium. Id iam probatum & confectum fuerat à Riolo, & iisdem rationibus Spigelius usus est, cap. 8. praecedenti, obliquum ascendente oriiri statuit à partibus infernis, Rectum Galeni à sterno prodire putat, & in Ossa pubis inferi. Columbum & Laurentium ei potius ortum assignant in Osse pubis, insertionem in sterno. At Spigelius ab utraque parte Rectum enasis contendit, in medio caute inter se duas illas partes, quod est nouum & inauditum. Inde colligit duplicem habere actionem, quia mouet thoracem antrosum incuruandum truncum corporis, & attollit Ossa pubis ratione originis in sterno, qui motus sunt omnino contrarij. Transuersum musculum ab extremitatibus costarum notharum, & transuersis apophysis lumborum vertebrarum deducit, nulla facta mentione adhaerentis ad collum Ossis Ilium, & Ossis pubis, quae vera est origo, nec erat praetermittenda. Omnes istos musculos, exceptis Rectis, peruenire scribit ad medium ventris, per latam & membratam aponeurosim usque ad lineam candidam, sed incipit tendi membranisque circa lineam semilunarem, à me vocatam, quae sit ex concursu tendinum musculorum: Ista linea est terminus carnosae partis iuxta rectum musculum vtrimque, & istam lineam semilunarem distinguit à linea candida, quae est terminatio tendinum, quorum concursu effigitur. At cum istae membranae tendinosae sint continuae, vt aequabilis esset tensio abdominis agentibus simul musculis, cum seorsim non possint agere, nullum est indicium & vestigium candidae lineae, quae est perquirenda intra Rectos musculos, quibus interiecta pinguedo denotat rectam lineam. Restat diligentius examinare nouam structuram, nouamque actionem musculorum Rectorum, de quibus gloriatur Spigelius, aliam adhuc additionem, inquit, multis nobiliorum illà quam Galenus assignauit, scilicet pectus ad pubis Ossa, & pubis Ossa econtrà ad pectus trahere, sicque thoracem flectere, mirabile sane dictum & auditum, ex contractione eorundem musculorum, duos diuersos motus cieri: sed dum vnum extremum agit, alterum quiescit, pectore quiescente, mouetur Ossa pubis, his quiescentibus mouetur pectus. Si quis dubitet de duplicitate istius musculi Recti, obseruabis nervos habere in duobus extremis, venas etiam & arterias: quod spectat ad motum Ossium pubis, multis experimentis probat, quae tamen docent vnum lateris Ossa pubis moueri, siue attolli, dum alterum latus innititur femori, sedendo in lecto, vel super lectum. Trunci corporis eleuationem, siue erectionem ab istis musculis ab Osse pubis enascentibus probare nititur, similiter Ossa pubis, & femoris erigi inuerso & supino corpore, ab istis musculis, tum enascentibus ab Osse pectoris, sed quo fine isti motus nobiliores fiant, non exponit. An vt nates ostendamus spectatoribus in ludibrium, instar simiz?

Incipiam examen istarum propositionum à motu Ossium pubis, & Ilium cum Osse Sacro iunctorum, quae compagem constituunt mobilem, ad actionem nobiliorem ea, quam proposuit Spigelius, nempe ad congressum cum muliere, ad prolem destinatum, siue fiat iacendo in lecto, siue stando. Non potest fieri congressus sine agitatione ipsius compagis ossae, cui adheret penis virilis, & ad eiuationem seminis in vitroque sexu, quae necessaria est ad conceptionem. Plura non dico, ne saluam moueam, & Lectores inoitem ad experimenta: sed alium usum illius compagis ossae inuenio, in iis, qui truncata femora habent, vel paralytica & arescata, gradiuntur suffulti manibus, huc & illuc discurrunt, quales occurrunt Parisiis quamplures mendicantes, per vias & templa. Primus est Inuentor & Author Riolanus, istius motus in illa compagine Ossium Ilium cum Osse Sacro simul iunctorum, quae de re, Lector legat penultimam, & postremam editionem mea Anthrographia. Sed non possum praeterire insignem errorem Spigelij, de motu istorum Ossium. Concludamus ergo Ossa Ilium, & pubis moueri, sed Ossa Ilium per se, propter articulationem cum Osse Sacro, Ossa vero pubis per accedens, quatenus Ilium Ossibus iunguntur per synchondrosim, vnde illis motu,

*motis & ipsa cidentur.* Videtur ipsa Ossa disjungere ab invicem, & ab Osse Sacro, cum nullum scorum moveri queat: sed ista tria simul cidentur, iuncta cum altero congeneri & vicino, quæ simul iuncta constituunt istam pelvim ossæam à Galeno designatam, quam appello compagem ipsorum Ossium Ilium cum Osse Sacro. Pergo ad examen structuræ musculi Recti, potestne esse duplex propter geminas arterias, venas, & nervos per duo extrema excurrentes ad medium, talisne in corpore musculus existat consimilis, cui nervosas intersectiones non habet pars inferior, ut superior, ad robur partis superioris sunt comparata ista genicula nervæ, & cum in ista regione superne contineatur ventriculus, colum intestinum, & Vetus instanter patitur, Natura partem superiorem corroboravit istis geniculis nervosis, ut musculus verius suum caput retractas, quod est in interno, & intus intumescens compelleret partes istas lubricitas commemoratas ad expulsionem rerum contentarum versus inferiorem. *Laurembergius*, qui istam opinionem de duplicitate recti musculi tuetur pressa nomine *Spigely*, istam comparationem adiecit, de *ergatis quæ juxta trahunt, & deorsum ab his trahitur sunt vineæ natus, per quem*  *paucissima ligna attolluntur rursusque ad summum laqueæ, in pavimento est principium, in laqueari finis, cum è laqueari ligna demittuntur in aream domus, tum in laqueari est principium, in area finis.* Ista comparatio imperfecta est: nam in musculis, quod ad eam in ergatis, de est, instrumentum nempe lignum transversum oblongum, suffultum aliis duobus, quæ figuræ ergati constituunt, quæ defunt in isto musculo recto. Præterea idem *Laurembergius* adducit exemplum arcus, qui tensus esse non potest nisi chorda duobus extremis fuerit adnexa immobilibus, & invicem adductis. Exemplum producit aliud, de duobus operariis, qui seceram in ligno reciprocant, dum trabem scindunt, unus est superior trahens, alter inferior retinens. Respondeo, in actu tenso adducti fuerunt duo extrema, & chorda manet tensa, non vero musculi Recti tensi manent in muro conico: in seceram reciprocatione scindentis lignum, & tractæ a duobus viris directe oppositis, manifestum discernimen apparet ab illo motu musculi recti. Nam stabiles manent, & habent, trahentia diuersa, quia extremitas inferna recta, est tendinosa, nec habet nervos, extremitas superna multis nervis conspicuis abundat, & est carnosæ. Præterea cum *Spigelius* hæc dantes musculos Ossa pubis, siue moventes antrosum descripserit, omisit extendentes, siue retrahentes retrorsum, itaque imperite admodum musculorum abdominis structuram, & actionem, & motum Ossium pubis exposuit, sequutus in ipso motu *Baehnum*. Atque ut paucis absolvam sustin. o ossæam illam compagem femoribus suffultam moveri cum lumbis, & succussatio illa lumborum in actu venereo, & progressio illa corporis in paralyticis curibus, debetur istis Ossibus, quæ moventur cum lumbis, immotis scilicet femoribus & spina superiore, siue dorso, quæ si moventur, sequuntur motum lumborum, & compægis ossæ Ilium cum Osse Sacro.

Cap. 12. *Cremaster aritur à ligamento illo valido, quod à spina Ossis Ilium, ad Ossis pubis usque excurrit.* Nullum est ibi ligamentum, & enascitur ab extremitate carnea obliqui ascendentis. *Non adhæret valde sime vasis spermaticis*, quia inclusa sunt, apophylli peritonæi ad Scrotum productæ.

### *Musculus Vesica.*

Ibidem. **I**gnorat musculum fasciælem & annularem vesicæ prostaticæ superiectum, & miror cum fuerit Chirurgiæ Professor *Spigelius*, scripserit *leso sphinctere ab imperitis lithotomis in extractione calculi, perpetuum urina Halicidum succedere*, cum à nostris lithotomis quotidie incidatur, & reparetur sine villo damno, nec aliter fieri potest.

### *Musculi Podicis.*

Ibidem. **L**enatores ani sunt duo externi, lati, membranosi, ac tenues sub vesica sitii. Nunquam vidit, vel dissecuit istos musculos, sunt carnosii duorum digitorum latitudine ad robur, ut relearent podicem in cacatione fortè, protuberantem & procidentem.

*Musculi Penis.*

*Ibidem.* **P** *Emem erigentes musculi, in penis corpora prope exortum implantari solent.*  
Imò attentis nervosis corporibus penis, ultra medium progrediuntur, quos appellamus Acceleratores, ipse vocat *Vrethram trahentes*, quia ipsam distrahunt, ut aperiantur, alioquin *urina non efflueret*. Nos verò ipsos destinamus expellendæ urinae, & potissimum sub finem mictionis, guttas resistentes in flexura *Vrethrae* expellunt, compressione sua.

*De Serrato Maiore.*

*Cap.* **S** *ue serratus maior anticus oriatur à costis, & in basim scapulæ terminetur, 13.*  
Semper inseruit attollendo thoraci in maxima & violenta expiratione. Nam tum musculi levatores omoplatæ agunt, ac proinde retrahitur serratus ille, costis affixus.

*Femoris Musculi.*

*Cap.* **Q** *uarta portio musculi tricipitis, quem quadricipitem feci, à me introducta fuit, & descripta pro musculo sic dente femur, cum psoa & Iliaco, & à situ pectuncum appellavi.*

*Ibidem.* Obturatores duos, & quadrigeminos qui non apparent, nisi remotis tribus gloutiis, malè describit. In hoc errarunt omnes Anatomici, quia isti musculi parvi requirunt industriam laboriosam Anatomici, ut peritè detegantur, & separentur. Confer *meam Anthropographiam*, & discrimen agnosces.

*De Musculis Tibia.*

*Cap.* **I** *nter musculos tibiam extendentes omisit crurum, vel ei ignotus fuit, & 23.*  
Incepit pro portione vasti utriusque, quemadmodum brachium externum in cubito prætermisit, & carneam massam extendentes musculos roborare dixit.

**L**iber quintus venas tradit, sextus arterias, septimus nervos describit. Omnes istos libros non examinabo, quoniam istorum vasorum in ventre inferiore, & circa caput difficilis est inuestigatio & demonstratio propter effluuium sanguinis, ex vasorum diuisione & laceratione incogitanter facta, etiam si digitorum vnguibus absque ferramentis ista tractentur. In ventre inferiore, propter partium multitudinem cumulatè congestarum quas distrahere, & qualdam lacerare conuenit ad apparatum & inspectionem aliarum. In capite propter vasorum distributionem in carnes & Ossa capitis, quam tamen indagationem vasorum sæpius exequutus sum, & publicè ac priuatim cum magna sedulitate & curiositate. Nunc tantum eos errores annotabo, quos facillè demonstrare possum, in publicis Anatomis, si quis tamen Anatomiz deditur, velit discrimen, quod est inter descriptionem vasorum à *Spigelio* traditam, & meas obseruationes super illis vasis agnoscere, authoris utriusque libros inter se comparabit. Certus sum ex libro naturæ, me diligenter excerpissè, quod deprehendit peritus & æquus Anatomicus, nulli iparti additum, si velit meam encheiridium sequi. Multas quæstiones Physiologicas de sanguine prætermitto, non tamen inprobo lectionem istorum librorum, quædam enim continent non contemnenda. Pergo ad octauum librum.

*Peritoneum.*

*Lib. 18.* **P** *eritoneum in hypogastrio manifestè in duas tunicas dissepitur, in quarum cap. 4*  
ample intervallo vesica continetur & *Vterus*. Verum est de vesica non vtero, malè intellexit *Riolanum*, qui notauit Vterum in puellis reflexum esse versus vesicam, eique adhærere, itaut videatur inclusus illa duplicatura peritonæi.

*Ibidem.* Sunt autem oblongæ productiones exterioris peritonæi, membrana cucurbita, quas *Chymici* videntur, perquam similes, atque superius, inferius laxæ, in mulieribus ad in-

guina producantur, & in vulva clatiorem sedem terminantur. Hoc non est verum, nisi vulvam accipiat pro parte superiore cunni. Nam non possunt superne remeare, ad vulvam siue Vterum.

### Epiploon.

Cap. **M**aximum Epiploon inter cetera animantia homines habent, reliquis enim umbilicum vix attingit. At homini saepe ad Ossa vsque pubis porrigitur, falsum est homini maximum esse epiploon, sues amplius habent, & reliquis animantibus extensum est supra intestina, vsque ad imum ventrem.

Ibidem. Falsum est orificium omenti esse orbiculatum, ut depingitur apud Vesalium. Nam orbiculus non exstat, nisi laceretur & distendatur.

Ibidem. Componitur ex membranarum duabus, superior ad ventriculi fundum à tertia ipsius tunica, & communi oritur, inferior à peritoneo: Nonne idem est exortus, eadem substantia, si communis, & tertia tunica ventriculi ex peritonæo deprompta fuerit, portio omenti latitans inter Ventriculum & Lienem Spigelio ignota fuit, nec eam expressit.

Ibidem. Vsum omenti describit ex Laurentio iisdem verbis, quem refutavi, sed citatus textus Hippocratis, non dicit in omento tanquam æstuario asseruari.

### Nervi Stomachici.

Ibidem. **D**ecussatio nervorum stomachicorum, ut dexter in sinistrum, & sinister in dextrum abeat, proposita fuerat à Riolano, quam sequutus est Bauhinus, & postea Spigelius, sed Riolanus emendavit in hac editione postrema, quia deceptus fuerat.

### Explicatio Aphorismi Hippocratis.

Ibidem. **E**xplicationem Aphorismi 55. sect. 7. Hippocratis, quam nemo ante ipsum intellexerat, sic interpretatur: canitua ad sinistrum otificium ventriculi, sub diaphragmate membranarum inclusa oc. urrit, in qua aquam, flatum, & pituitam quæcervari sæpenumero observamus. Via autem per quam pituita ad hanc cavitatem pervenit, pori sunt & insensibiles illi meatus membranarum ventriculi, per quos transscendat, cum totum corpus sit transspirabile, ex Hippocrate: sed in eo loco nulla adest cavitas, nisi facta fuerit ab ea portione omenti, collocata inter ventriculum & Lienem, quam ignoravit. Aliam & veriorē interpretationem huius Aphorismi proposui, capite de omento in mea Anthropographia.

### De Intestinis.

Cap. **R**etinuisti ex Laurentio multa, dum à barbaris supra scripsit membranam carnosam, panniculum carnosum vocari, & intestina chordas. Has dictiones non esse barbaras in Animaduers. ad Laurentium demonstraui.

Ibidem. Intestinarum substantia consistat tribus membranarum, prima à peritonæo procedit, &que communis cum aliis partibus. Duae sunt propriae, quarum exterior membranosa est, secunda & interior nervæ, quamvis ob crustam enatam ad extremitatis tertie costiosis ipsarum carnosæ videatur. Omnes Anatomici carnosam iudicant ad motum peristalticum intestinarum, & regenerationem, si quando in dysenterijs erodatur, crusta qua lorican- tur & ineruantur intestina, mucus est crassus, siue pituita crassa, parietibus intestinarum agglutinata & condensata, quæ abraditur, atque consentio, nullo adipe firmata & oblita intrinsecus intestina.

Ibidem. Duodeni mensura digitorum duodecim invenitur, à pyloro vsque ad incipientem contortionem intestinarum in principio ieiunii, quæ est sub pancreate, versus sinistrum hypochondrium, sed hoc videri & demonstrari non potest, sine diuulsione partium incumbendum, & aliqua sanguinis effusione, ob venas exiles disruptas, & laceratas: Duodenum solum non adhect: mesenterio statuit. Cùm tamen colon intestinum careat etiam mesenterio, ut ipse fatetur paulò post, colon mesenterio non adnectitur, ut cetera intestina.

*Valvula Coli.*

Ibidem. **V**alvula coli intestini membranosa orbicularis, sursum spectans, et no verbo similis sigmoidiformibus, quæ in cordis sinibus reperiuntur. At sigmoidoides valvulæ sunt semicirculares: ergo si orbicularis, ut est, non est similis istis valvulis.

Ibidem. *Colon in superioribus partibus ventris tacet, ut à musculis obliquis descendens, tum à diaphragmate commodius comprimeretur. At musculi obliqui ascendentes oriuntur ab Ossibus Ilium, & agentes contracti intus intumescunt versus hypogastrium, & Iliæ, ut comprimant partes subiectas intestinorum & vesicæ: ergo pro musculis ascendentibus legendum descendentibus, ut supernè comprimant adiuti diaphragmate.*

*Motus Intestinorum.*

Ibidem. **E**t si quidam motus obscurus intestinorum tenuium, quo chylum à supernis ad inferiores sedes promouunt: nec tantùm tenuia sunt isto motu prædita, sed etiam crassa intestina. Iraut sint in perpetuo motu, ut videre est in vulneribus ventrem penetrantibus, quæ per angustum foramen exiliunt, nisi maturè manu intus compellantur. *Galenus istum motum descripsit, lib. 6. Epid. sect. 5. part. 27.*

*Mesenterium.*

Cap. **M**esenterium in duas partes diuidit, *Mesaraum quod tenuia intestina colligit, & Mesocolon, quod crassa continet*, supra dixit eolum intestinum mesenterio carere. Ergo tantùm rectum intestinum comprehendit: at non extenditur ad istam partem.

Ibidem. *Mesenterium multis glandulis refertum est, sed in medio maxima consistit. Non reperio istam glandulam maximam, nec sunt omnes glandulæ æqualis magnitudinis.*

*De Venis & Arteriis Mesaraicis.*

Ibidem. **V**enz solæ, ut communis fert opinio, chylum deferunt ad Hepar, sed etiam arteriæ, ut *Galenus clarissimè l. 4. de usu part. ostendit, & supra lib. 6. demonstrauit, adducto altero loco Galeni, ex libro, an sanguis in arteriis contrineatur: sed Galenus tantùm in hæc is lactentibus obseruauit lactem humorem intra arterias, in adultis alicuius rei plenas, forsan erant venæ lacteæ Asclepij, sed nullus chylus obseruatur, intra arterias in animalibus viucentibus dissectis, ut in venis, ideoque ridicula & explodenda hæc opinio.*

*Lobus Hepatis exiguus.*

Cap. **D**e exiguo lobo Hepatis, *nemo ut credit ante ipsum loquutus est, sed Riolano 12. non fuit ignotus. qui sulcum & culcitram venæ portæ appellauit, nec solitarius est, sæpe duos obseruauit contiguos. Admitto hunc lobum constare molliore carne & tenuiore, quam reliquum Hepar: membrana succinctus est.*

*De Vena Porta.*

Ibidem. **P**utret sunt vena porta furculi quam caua, adeoque si numerum velimus definire, triplo plures existant, quod verum esse fateor, & notandum ad praxiæ medicæ & circulationem sanguinis per medium Hepar, si fiat.

*De Hepate.*

Ibid. **H**epar duos recipit nervos exiguos, horum alter à ramo, qui superius orificium ventriculi adit, transmittitur. Alter à ramo illo, qui radicibus costarum dextri lateris expanditur. Id obiter monebo, de nervis qui distribuuntur visceribus inanem esse persecutionem & deriuationem à costali & stomachico, vel à sexta coniugatione,

quia difficilis est inuentio nisi occurrant cum venis, sed persequi originem difficultimum. Itaque satius est dicere partes omnes ventris inferioris à sexta coniugatione nervos mutuari, quatenus illa plexum constituit inter duos renes, à quo omnes nervi depromuntur cunctis partibus distribuendi.

### *An chylus diffundatur per Hepatis substantiam.*

Ibidem. **E**xistimas chylum non excidere vasis, & deferri per substantiam Hepatis, sed suis vasculis inclusum, insula facultate Hepatis, in sanguinem converteri, quia numquam in nullo animali, quod post partum aperuit, chylum, vel sanguinem per totum corpus Hepatis diffusum inuenit: Ego verò sanguinem deprehendi extravasatum intra Hepar, & leuiter punctum in viventibus, sanguinem effundit magna copia, nullo vasculo læso. Nullo istam questionem Physiologicam examinare, & rationibus certare, ad Physiologiam pertinet.

Ibidem. Homo ex omnibus sanguineis plurimo abundat sanguine, ne deficient spiritus, in tot obeundis animæ functionibus, quas plures præ cæteris animalibus accepit: Id concedo proportionem sui corporis habita.

### *De Liene.*

Ibidem. **N**on possum probare Lienem ingemita facultate, per ramum splenicum crassiores ac terrestriorem partem chyli ad se allicere, ut ad Hepar, non usque laudabiliores partes deferantur: Pars illa chyli recepta in Liene, coquitur in sanguinem, partem Lienem ipsum, partem viscera omnia ad qua splenica vena pertingit, emittit, puta ventriculum, omentum & coli sinistram partem, ac rectum iniectionum. Ergo Lienis sanguis plures partes nutrit, quam mesentericus ramus, qui mesenterium tantum, pancreas, & tenuia intestina nutrit. At ex te vena porta triplo plures habet ramos per Hepar dispersos, quam vena Cava, eique tenuiorem portionem distribuit restituibilem intra portam crassiore sanguine, qui sufficiet ad nutritionem omnium partium ventris inferioris. Quid opus est altero sanguine, ex crassissima chyli portione genito: potestne Lien planè degenerare ab Hepate conficere sanguinem aptum alendis partibus? Scio istam opinionem ab Hasmanno propugnatam, sed ei testis in mea Anthropographia, & in Encyclopidio Anatomico.

### *Vesicula Fellea.*

Cap. **V**esicam felleam calidioribus maiorem esse deprehendis, & in dysentericis dissillis usque adeo grandem sepe vidis, ut naturalem magnitudinem multis modis superaret. Id credo, & interdum vidi in cholera morbo, & dysentericis post obitum, vesiculam nullo modo suo felle priuatam & exhaustam: Ac si necessaria esset istius bilis tenuioris in vesica collectio quia Hepati supposita, & intus inculcata: inde licet colligere duplicem bilem, vnam fluentem assidue in intestina, quæ ipsos motus excitauit. Alteram quæ non fluit, nisi copia distendat vesiculam.

### *De Meatibus Cholidochis.*

Ibidem. **B**ilis meatum duplicem constituit, unum cysticum, alterum Hepaticum. Primus Riolanus ita nuncupauit à parte, vnde originem trahit, sed imperitè ista nomina adaptat. Nam facietur communem canalem ab Hepate ad intestini ilei principium ductum deducere bilem crassiorem, & in progressu suo aliam à vesicula admittere, quod admitto, sed præterea vesicula duos alios canales, qui ad ipsam tenuiorem bilem deferunt. Finiunt enim multiplices fibrulæ inter vena porta radices exsurgere bilem, & in truncum columnæ in superiorem vesicula partem eam, qua sinui Hepatis adhaeret, & ubi longus quidam valvula oblonga insit ductus est, terminantur, alter meatus similiter infinitis ramulis in Hepate, inter cana radices excurrit, & postea in unum conducem, vniuersæ omnibus propaginibus collectis transit. In ipso articulo magnam, & in re, & in verbis confusionem & obcurritatem inuenio: nam nulli sunt canaliculi, qui bilem tenuiorem ex radicibus cauz eliciant, & transmittant in vesiculam: sed ipsa immerfa Hepati toto suo corpore



poroso vel transpirabili in hac parte, exfugit bilem nutriti Hepatis, conseruat ad tempus, atque obstructio Hepatico meatu cholidochi in suis radicibus intra Hepar, in magna obstructione Hepatis, vesicula eius officium suppleret, ad expurgationem istius humoris naturæ insensibilis ac perniciosissimi. Plenissime & perspicue ista declarui in mea *Anthropographia*. Atque cogor fateri Bucetium hic multa perturbasse, dum voluit, quæ mea sunt occultare, ne furtum agnosceretur.

### *Fierum de Lienis.*

Cap. **S**i vincula Lienis rumpantur, obseruatum à nonnullis herniam natam esse, 14. in qua parte ventris nata fuerit, non explicat. An circa vmbilicum, vel in imo hypogastrio, quia Riolanus notauit vinculis laxatis & ruptis, Lienem deuolui versus vmbilicum, & hypogastrium imum, id accepit pro hernia. Monebo Leæorem in hoc capite de Lienis plurima ex mea *Anthropographia* editionis penultimæ deprompta, hanc enim solam propono, non postremam.

*Ibidem.* De capite & cauda Lienis ex Riolo desumptum, vt etiam de expurgatione Lienis per quatuor partes ex Hippocrate, de expurgatione per vrinas, & per hæmorrhagias.

*Ibidem.* Nugatur, dum scribit Lienis nervos exiles à sexto paris ramo suppeditari, qui in ipsius membranam exporriguntur, in substantiam autem non penetrant.

### *Actio Lienis.*

*Ibidem.* **T**andem concludit caput de Lienis per eius actionem, de sanguificatione, quam lenibus rationibus nullius ponderis & momenti probat, quas refellere facillimum. Addit præter ramum splenicum, etiam arterias, à ramo cæliaco derivatas chylum exsugere, & ad Lienem deferre, cum absurdum esset arterias illas, quæ copiosiores sunt venis, etiusas esse in illa viscere. Ergo arteriæ dicatæ sanguini arterioso vehendo distribuunt chylum Lieni: vnde postea mutabitur sanguinem arteriosum: quid si dixerim ramum splenicum, non à cæliaco deriuari, sed ab ortu descendente ante exortum & directum cæliaci rami, quomodo ex intestinis hauriet chylum cum eò non perueniat, sed totus ambagiosus iuxta longitudinem diaphragmatis ad Lienem contendat extra pancreas dispositus. Ridicula hæc ratio: voluit Natura nutrire plures partes ab illo sanguine in Lienem elaborato, quia crassior, in crassiore substantia calor est validior. Imò partes culinaris sordidæ putrefactioni obnoxii debebant nutrirî sanguine puriore: præterea si splenicus ramus venosus deportat chylum ad Lienem, quænam venæ defecerint sanguinem? Ergo venæ & arteriæ cæliacæ destinatæ vehendo chylo, etiam reuehent sanguinem. Hæc absurdissima, nec Spigelius, & alij qui sequuntur istam opinionem, non considerant consequentia ridiculas, quia non sunt Anatomici, & per imaginationem quandam de istis rebus disputant.

### *De Renibus.*

Cap. **M**embrana renem externam est à peritonæo, vulgè vocatur adiposa, quia circumiecto adipe velata. Spigelius iactat à se nominatam nominem, quod in ea veluti matrice renes continantur. Rectius nominasset *Reinigen*, ad imitationem *Aristeris*, qui *Reinigen* vocauit partes renem circumiacentes.

*Ibidem.* Glandulas renes superiellat factas arbitratur ad implendum vacuum, quod inter renes & diaphragma interstat, & ad sustentamentum ventriculi eo loco. De istis glandulis, in mea *Anthropographia*, & in *Animaduersionibus* ad Bartolinum & Vellingium accuratius inquiram.

*Ibidem.* Notat ex Fallopio ramum sinistram à vena azygo à thorace in sinistram renem transmitti, per quem insignis sit thoracis cum rene sinistro consensus, ut per eam viam, pus & serum soleant expurgari, quod non crediderim: sed esto, hæc via non placet Spigelio, aliam inuenit per arteriæ magnæ poros insensibiles. At si truncus Aortæ pus exfugat, excipiat, quidni per eosdem poros effundet roris instar, sanguinem arteriosum pure subtiliorem, ergo multa inde incommoda succederent, ex illa effusione sanguinis arteriosi.

*Nota de calculosis.*

Cap. **N**otat Spigelius, eos qui grandiore calculo laborant, dolorem in umbilico perferre grauem, ex dolorifica distensione vesicæ, quæ communicatur vracho. Id ego non sum expertus, qui grauissimos dolores perpeffus sum, & bis sectus fui, ad extractionem calculi, nec alios similiter vexatos sensisse hæc symptoma est verisimile, diligentius inquirendum.

*De Vesica Vrinaria.*

Ibidem. **F**alsum est solum cervicem vesicæ carnosam vulneratam coalescere, cum alibi cæla vesica resarciatur, vt quoridie experimur: Idque indicat substantia illa carnosa, siue musculosa, quæ constituit secundam membranam vesicæ.

*De Vasis Spermaticis.*

Cap. **I**nter vasa spermatica præparantia arteria sunt ampliores venis, quod nondum vidi, saltem sunt æquales arteriæ, aut minores vtplurimum.

*De parastata epididymide.*

Ibidem. **V**asorum præparantium plexus varicosus, est veterum parastata cirroides: parastata enim est corpus explantatum testis, vel quod attestat, vt probè etymologiam referat, *pari* in *viciniam* nunc *ipsum*. Ideoque parastata non potest esse epididymis, vt ipse putat Spigelius, neque habet substantiam teste durior, sed molliorem naturaliter.

*De Teste.*

Ibidem. **T**estes musculum habent cremasterem, ab Osse Ilium enatum, & capiti inferum, quomodo potest inferi capiti, cum sit supertensus membranæ peritonæ, quæ deducit intrâ se vasa spermatica, tunicam constituit elytridem. Imò cremaster ipse constituit exteriorem membranam subrubram, quæ erythroidis dicitur.

*De longitudine Penis.*

Cap. **N**on est tam absurda illa ratio de longitudine & breuitate penis, pendere posse à laxiore vel strictiore scissura vasorum umbilicalium. Cum enim Vrachos sit ligamentum vesicæ, quæ licet sit inclusa duplicato peritonæo, habet tamen hoc ligamentum suspensorium, quod si fuerit laxius, longior erit vræthra paulum deuoluta vesicæ, si strictius, superne retrahetur, ac proinde vræthra breuior erit. At ligamenta iuncta vræthræ, & componentia penem, sequuntur longitudinem vræthræ.

*Quid sit Penis septum lucidum?*

Ibidem. **N**escio quæ de causa membranam ligamenta duo cum pene coniungentem septum pellucidum vocat, & de hac re gloriatur.

*Musculi Penis.*

Ibidem. **M**usculi Penis, etsi carni sint, substantiam habent plurimum cum Penis substantia conuenientem, quia eo erecto statim ad sua principia contrahuntur, & cum eodem flaccescente remittuntur, sed iussu obediunt, intensi vel relaxati. Nec propter viciniam vel contactum istorum corporum, accedunt ad illam substantiam, qualis obseruatur in ligamento Penis.

## De actione Testium.

*Ibidem.* **T**estes affirmas semen in se non generare, nec semen in ipsis reperiri, sed in parastatis, quos appellat alibi epididymidas, venulas & arterias referas elaborari, nullum esse genitorem spiritum in testibus, cum unicus adsit in corpore, à Corde manans, diffusus pervinire sum corpus, à quo omnes operationes perficiuntur, hunc exceptum in istis parastatis, constituere spiritum illum genitorem. Ergo patrocinatur opinioni Aristotelis, & tanquam pondera telis textorum appensa, ad tensionem vasorum inferuire, quod est contra doctrinam Hippocratis & Galeni promulgatum: & si quando Eunuchi semen emittunt, reliquis fuisse parastatis, ac proinde continuatio vasorum seminalium remansit ademptis testibus. Multum chartæ insumerem in refellenda hac opinione erronea, relinquendo excutiendam Physiologis, qui disputationibus oblectantur.

## De plagio manifesto Spigelij.

*Cap. 19.* **V**ersus *Iuuenalis*, qui multos & peritiores Criticos torserunt, ad eorum sensum eruendum, illum ex Anatome facile inuani, mutata secunda versus initiali dictione & cuius loco reposui ad, & post femur docui addiciendum esse comma, ut in mea *Anthropographia* fufius demonstravi, correctos istos versus citavit *Spigelius*, ac si tales legisset apud *Authorem Iuuenalem*. Versus elegantes, quos ex *Catullo* primus retuli ad florem virgineum, recitat sine vlla mentione *Riolani*: quæ narrat de fricatricibus mulieribus ex me deprompta sunt, atque de excrecentia carnea apud *Hippocratem*. Approbat hymenem, & seipsum inuenisse profitetur, tandem concludit caput his verbis. *Non sunt negligenda cæca duo foramina, quæ statim apparent dilactis labiis, sed ferè tantum in viuis, cum admodum parua sint, in quibus serosus humor quidam non parua quantitate prodit & qui maris pubem in coitu madefacit*: Hæc mea est observatio, quam sibi arrogat.

## De osculo interno Vteri.

*Cap. 20.* **O**sculum internum vteri perpetuò conuincere probat, sed in coitu adco dilatari, ut penis glandem suscipiat, hoc rarum & insolens: Nec credo tantam fieri illius oris dilatationem & apertionem in voluptuoso coitu, ut possit admittere balneum penis, nisi fluentibus mensibus, ac depresso vtero, quia nobis Gallis non est tanta longitudo & fortitudo penis, ut queat introduci in cavitatem vteri, penetrando istud osculum, aliàs hoc non potest fieri. Quod si talis introductio perficiatur, id potius continget in postica venere, quàm antica, ut demonstravit *Mercuriales*, libro de procreatione hominis, quia istud osculum matricis, in corpore muliebri inuerso, & penis glans simul occurrunt, sicque facilis est feminis attractio & receptio, sed credo hoc genus congressus, non adeo delectabile mulieri, ac illud consuetum, naturale dicendū conuersis frontibus, quamuis alij ad prolem, aliud certius esse existiment.

## De ligamenti latius Vteri.

*Ibidem.* **L**igamenta lata alas vespertilionum expansas referunt in suo situ, matrice reuulsa & affixa ad fundum vesicæ, & refert corpus vespertilionis matrix, non autem in muliere quæ concepit, nisi manu extendantur: hanc comparisonem primus *Riolanus* introduxit.

## Inferna ligamenta Vteri.

*Ibidem.* **I**nferiora ligamenta in inguine supra infraque glandulis sulcuntur, ut propter ea hæc nonnullis cum sint concava, exteriusque Vteri humores transferre videantur. Solus est, & primus *Riolanus*, qui detexit cavitatem istorum ligamentorum, ibi asservari seminale humorem & impurum huc transferri ad inguina, ut bubones venereos exciter, aliosque tumores.

*De Vase deferente muliebri.*

Ibidem. **V**At deferens parte aliqua in Vteri cervicem implantari, quod Andreas Laurentius se inuenisse gloriatur, nec nos unquam reperire potuimus, & aperte à Galeno negatur, lib. 2. de femine, cap. 3. Attamen exstat, licet obscura portio illa vas deferentis manifestius spectatur in muliere prægnante mortua, ut mihi bis videre contigit amplissimam.

*Cornu Vteri.*

Ibidem. **M**Ale describit cornu Vteri, siue Tubam Vteri, rectius ipsam delineauit in mea *Anthropographia*.

*De Corde.*

Lib. 9. **M**Aius est Cor homini, quam aliis animalibus, quia homo omnium animalium maximè sanguineum est, ut Hepar quoque maximum obtinuit: id verum proportionem habita corporis, & hoc notandum ad sanguinis circulationem, & eius doctrinam in morbis.

*De Providentia Diuina.*

Ibidem. **V**Oluit summus parens, ut pulmo nutrire sanguine arterioso, &c. Non est quod admiremur istas benignitates largitionis, quas benigna parens Natura, & Deus summus opifex homini concessere, cum hæc sint communia brutis animantibus, quæ ante hominem fuere coudita. Ergo tuam providentiam super animalia extendit, priusque eis contuluit quàm homini. Itaque in iis quæ sunt brutis, & homini communia, non oportet admirari, & laudare naturæ, & Dei providentiam, quoniam ita esse voluit, nec melius fieri posse præuidit.

*De Septo Cordis.*

Ibidem. **A**rbitratur Spigelius, sanguinem neutiquam per foraminula septi in Corde transcolari, quia sunt imperuia, scilicet & impressa fuerit ad nutritionem Cordis, cum vasa ea non possint perungere. At experientia & ratio aliter suadent, & conuincunt.

*An Aer ad Ventriculos Cordis perueniat.*

Ibidem. **N**Ec quidquam aeris ad ventriculos peruenire potuit, quia generationi spirituum contrarius, id confirmatum fuit à *Cesalpino in questionibus peripateticis*. Dubito de aeris receptione, quamvis fuligines quasdam excerni credam, adhuc sub iudice lis est, nequid satis definita.

*De Structura Anastomoseon in Vasis Cordis in Fætui.*

Ibidem. **M**iratur, cur omnipotens illud Nomen, vena in dextro ventriculo arteria crassietem, & arteria in sinistro vena substantiam concesserit, quod est brutis commune, id à me explicatum libello de Fætui humano, sed in arteria venosa. Ratio quam adducit, non valet, si sanguinis traductionem per pulmones admittat, quia duo sanguines sibi essent impedimento per arteriam istam fluentes, vnus ad finistrum ventriculū, alter ab eo ad pulmones, adulto, quia plurimo sanguine pulmo indiget, copiose is excideret, qui tamen non nimium in arteria venosa, ut in vena arteriosa dissipari potest, quod est falsissimum, quia propter ténacitatem arteriæ venosæ, sanguinis maior copia infuleret in pulmones.

Ibidem. Cur post partum Anastomoses in Fætui obliterentur, nemo quod sciam hactenus apernit, id declaratum ab excellentissimo Viro Principe Medico Fætui, amico suo. Sic multi

mutuò se scalpunt *Riolanus*, ex *Galeno* id demonstrauerat, quia suo antiquo vsu priuatæ sunt, edito in lucem *Fœtu*, qui respirat ore, abolentur, istæ *Anastomoses*, quæ ex eius opinione pulmônis gratia constructæ erant. Vsum istarum *anastomoses* non male exponit. Comparo meum tractatum cum ista particula de *anastomosis*, & agnosces discrimen.

### De Cartilaginibus Bronchiorm,

*Ibidem.* **D** Et exi & monui diuersitatem cartilaginum in bronchiis per pulmones dispersis ex *Rondeletio*, qui primus ante *Fallopium*, id animaduenerat libro secundo de piscibus.

### An aër perueniat ad Cor.

*Ibidem.* **P** *Ertinaciter contendit nihil aëris insinare in Cor ad generationem spiritus vitalis*, imò plurimum officere, si eò appellat, sed tantum qualitate aëris frigidi recreari: videbis locum, atque non longè recedo ab eius opinione, quap̃ obstinatè defendit *Casalpini*, primus huius author ex *Aristotele*.

### De Figura Pilorum.

*Lib. 10.* **P** Illi figuram habent, non uti vulgò creditur teretem, sed optici instrumenti beneficio res augmentis obseruare licuit, quadrangulam more stipitum cauliumve quarundam plantatum, nec id possum improbare, si hoc instrumento idprehenditur.

### De ortu Pericranij.

*Cap.* **M** Anisfisse imponit praesentibus & posteris *Spigelius*, dum scribit pericranium s. fibras carneas producere, per suturas penetrantes ad crassam meningem, quibus suspenditur. Quamvis autem non ignorem, aliis dissectionum professoribus, quasi omnibus contra visum fuisse, atque ego statim, cum credant emergere potius ex intus: quibus caluaria aditus à crassa meningi, qua pericranio originem communicat: quominus cum ipsis factam diligenter: pericranij in recenter natis infansibus inspectio mihi persuasit, docuit me & hanc, & istud cura osium sinuipitis commissuram anteriore sede committi quidem inter se valide at aetate paulo post crescente, discedere inuicem, nec nisi nexibus fibrosis coniungi. Contrarium docet inspectio ad quam reuoco, & locus iste sufficiens est ad refellendum & suspirandum falsi, omnes experientias & inspectiones *Spigely*.

### Sedes Hemisrania.

*Cap.* **Q** Vi putant ab affecta alterutra parte Cerebri Hemisrania oriri falluntur, cum s. ha non internæ capitis partes, sed foris temporales musculos obfideant, bilis humoribus irruentibus. At fallitur *Spigelius*, cum hemisrania sit cephalalgia similis, quoad dimidium Cerebri affectum, siue ex membrana crassa affecta, siue ex sero vel fumo in venulas effuso, quæ perreptant anfractus Cerebri extimi, non tamen distinet Hemisranias quasdam esse externas, affecto pericranio alterutrius lateris in capite, forsan etiam serum, dum continetur sub musculis temporalibus: Id dignoscitur, si pertingat dolor vsque ad articulum maxillæ infernæ, & insertionem musculi temporalis.

### De Inflammatione Cerebri.

*Ibidem.* **A** Dimitto cum *Spigelio* inflammari Cerebrum, pati veram inflammationem, & abscessum purulentum.

*De dominatu Luna supra Cerebrum.*

Ibidem. **L**ando observationem de dominatu Luna supra Cerebrum, quæ à Medicis diligenter notanda in ictibus Cerebri, quod magis patitur in deliquio Lunæ, quam in nouilunio, & plenilunio, dum turget, ex observatione Fallopy.

*De rete mirabili.*

Ibidem. **A**dmettis rete mirabile circa glandulam pituitariam collocatum. Ibi sedem habuisse credo, ut ibi spiritus vitales inciperent refrigerari à pituita, & inde perfluente in palatum, sed non est amplius istud rete in capitibus bubulis & vitulinis, quàm in homine.

*Processus Vermiformes.*

Cap. **P**rocessus vermiformes figuram habent vermium, qui cariosa ligna depascuntur, 5. multipliciter orbiculati. Imò potius vermes sericeos crassioris æmulantur, & exprimunt in sua contractione & extensione, ac figura.

*De spinali medulla.*

Cap. **S**pinalis medulla non est nacta substantiam duplicem, ut Cerebrum, sed medullarem, est gemina, diuisa longa sectione in medio, quàm bipartitionem, celsior sibi patefaciet, quod postea negat. Lando quod scripserit, circa finem in filamenra caudæ equinæ speciem resoluti, id video à quibusdam negatum, cum sit verissimum, & à me sæpius publicè in theatro Anatomico ostensum.

*De sectione Cerebri more Varolij.*

Cap. **S**cribit per sectionem Cerebri à Varolio introductam, elegantius insundibulum, 8. & glandulam pituitariam tum rete admirabile spectari, quod pernego: Ista detrahendo totam molem Cerebri è sua sede, effringuntur, per alteram sectionem ordinariam ista melius deteguntur in suo situ naturali, sine vlla laceratione: Propterea valde dubito, an isto apparatu Cerebri structuram demonstrarit, nam errat in limine. Ad hoc, caput humanum recensiter obruncatum eligendum esse monet, quod admitto, sed non probò, quod subnequit, humani defectu substituendum vitulinum, vel osuulum, cum præter magnitudinem sistorum corpuscularum, qua testes & nates constituent, nullum se monstret discrimen ab humano.

*De Arteria vertebrali.*

Ibidem. **P**robo vertebralem arteriam per transversos vertebrarum cernicis processus ascendere, & concurrere cum carotidibus ad contexendum rete mirabile, ut inde cognoscas texturam admirabilem huius plexus vere mirabilis, propter insignes utilitates, & fabricam.

*De quarto Ventriculo.*

Ibidem. **Q**uartus ventriculus isto nomine prorsus indignus est, cum in ipsa Cerebri cerebellivæ substantia non sit situs, neque primaria intentione à natura excelsus, sed ex corporum dispositione necessario talis emergat. Miror Spigelium, tam malè sentire de isto ventriculo, quem præstantiorem aliis, & cisternam demonstravi cum peritioribus Anatomicis.

## De usu Cerebri ex Aristotele.

Cap. 8. *S*atis appositè defendit Aristotelis opinionem de usu Cerebri, ad Cordis refectum, & nullam in Cerebro fieri spirituum vitalium mutationem, sed solum alterationem temperamenti, quod approbo meo suffragio.

## De Fœtu humano.

**P**iget metransire ad libellum de formato Fœtu, cum sit posthumus, nescio an ei manum adhibuerit *Bucetius*, quia sub alio nomine fuit editus.

Cap. 3. Mirari subit, cur veteres Medici & Philosophi non accuratè descripserunt massam illam carneam, quæ chorio agglutinata est, sed eius loco cotyledonas brutorum. Forsan, quia se exercebant in Anatomiis brutorum, vel non adhibebant parientibus mulieribus, cum Medici veteres essent Philosophi, nec tractarent mulierum morbos, quorum cura obstericibus demandata erat: sic *Galenus* cælis vixit, nec de morbis mulierum scripsit, itaque cotyledonas acceperunt pro ista massa carnea, siue placenta. *Aristoteles* videtur aliquid designare, quod refert aliquo modo placentam, dum in Fœtu grandiore & perficito obliterantur cotyledones, cœuentes in vnum corpus, quod mammam refert, in qua reponitur aliuentum sanguineum pro Fœtu. *Spigelius* reprehendit *Aranium*, quod assignarit huic placenta actionem depurandi sanguinis, qui ad Fœtum feriat, quod verum esse confirmo, quia ibi venosus & arteriosus materis ab isto corpore carneo ex parietibus Vteri exsuctus colligitur, & à vasis vmbilicalibus elicitus deferretur ad Hepar, inde ad Cor. Ideoque credo hanc carnem esse promum condum sanguinis Fœtus, ex quo in summa penuria sanguinis materni hauriat quod sibi conuenit, dum mater ægrotat, & sanguis ei copiosius detrahitur. Inde fit, vt Fœtus in columis sæpe subleuatur post summam sanguinis materni vacationem: Ecquid aliud significat *Spigelius*, cum alios vltus assignat. Intersacet vasa ad commodiorem annexum, intellam, & diuisionem vasorum, itaque verus usus est, vt sit radix Fœtus, per quam iunxit à matre alimentum, totum conceptaculum, & veluti mesenterium alterum Fœtus, quod à matre tanquam terra trahit alimentum.

## De Allantoide.

Cap. 5. **C**ontra doctrinam multorum Anatomicorum admittit allantoidem, quia Vesicæ ipsam agnoscit, & modum discernendi proposuit, quod etiam in brutis reperitur, si in his, cur non in homine? Nil rationibus facile est respondere, deceptus fuit *Vesalius* in hac membrana Fœtus humani, vt in aliis rebus Anatomicis, atque describit, & inuestigat, vt in brutis inuenit: si reperitur in brutis, non sequitur semper adesse in humano Fœtu. Allantois in brutis membrana est separata, quæ aquas Fœtus belluini includit, & conseruat, deferretur aqua ex vrina in Vrachum, qui manifestè perforatus est. At Vrachii humani foramen est imperuium & imperceptibile. Aquæ oleosæ viscidæ sunt Fœtai circinnicæ, magna naturæ providentia, ne Fœtus grandior pondere suo & contactu corpus Vteri læderet, ne mater Fœtum ante tempus excuteret. Nam si velit Fœtum elidere, vel suffocare, aquæ obuiam euntes impediunt. Itaque natura quantum potuit, studuit conseruationi Fœtus humani, & æqueum humorem intra annum membranam reposuit. Humor autem ille non est vrina, sed sudor, vel potius serum ex vniuerso corporis habitu & ambitu profluens, tanquam excrementum tertie coctionis nondum epidermide progenita.

Cap. 9. Quod scribit de progressu & extensione vmbilici supra Fœtum humanum, ex *Riolano* desumptum, atque primus Anatomicorum ex libro *Introductory*, qui *Galeno* vel *Herodoto* tribuitur, demonstrat filamentum neruicæ à fundo vesicæ in humano Fœtu exoriri, quod accipitur pro Vrachio, & terminatur in vmbilico, paulò extra cutem digiti intervallo, quod etiam admittit *Spigelius*, asserens non esse verum, vmbilicum constare ex Vrachio. Ideoque non potest vrina è vesica

fica traduci in Allantoidem, quamvis incertus *Spigelius*, postea dicat urinam è vesica in Allantoidem deferri.

Cap. 2. partis secundæ. *Observavi in Corde aliud ab aliis Anatomicis non animadvertum*, nempe utrumque ventriculum Cordis habere parietem æqualis crassitudinis, cum in adultis sinister sit crassior dextro: id antea dictum fuerat à *Riolano*.

Ibidem. C o' ostrum propriæ matris non ita insensum Fœtui crederem, ac alienum, quod mulieres, nec Medici permittunt exhiberi infanti recens edito, quia impurum creditur, sed male edoctus fuit de Medicina Gallorum, qui infanti nuperitumè nato, ad euacuandum Meconium exhibent syrupum rosarum pallidarum solutivum, quod est falsum.

Tertiæ partis, cap. 5. *Vesica duplo maior in Fœtu apparet, quàm in adultis, quod verum est*, inde licet cognoscere urinam in vesica coaceruari usque ad parturiginis tempus, nec opus esse Vrachio, nec Allantoide in Fœtu humano.

F I N I S.







# A N I M A D V E R S I O N E S

## IN CASPARI BARTHOLINI

### DOCTORIS MEDICI, THEOLOGI,

#### ac Professoris Regij

#### INSTITVTIONES ANATOMICAS.

Talis est u-  
tulus edi-  
tione. Facit  
Grelli, a-  
nno 1612.  
à patre ic-  
cig. a-  
Halm, mo-  
no 1615. Ca-  
lendu. de-  
piembit,  
quo itaq;  
re Theo-  
logum docu-  
bat.



*X* Praefatione laudo ingeniuam confessionem Bartholini filij de recentata & antea editione noua Institutionum Anatomiarum patris sui. Ego uero qui laudis societatem affecto, dum aliena benedicta, & inuenta, vel primus enuncio, vel repeto secundus, ab æquis Lectoribus plausum merebor ob laborem, vel ueniam ob ætatem, quæ intra a'iorum dicta, factaque se adhuc continuit. Candide proficiat se ex aliorum laboribus Anatomicum opus parentis locupletasse, nec potuisse adhuc quidquam, ex sua Cerebra in Anatomia parturire, propter iuuenilem ætatem. Ideoque irasui non debet, neque mihi succensere, si ausim opus parentis, filij Labore auellam, & exornatum examinare. Id feci fretus, & ætate senilis, & studio, atque exercitio Anatomico per quadraginta quinque annos continuato, mihi multa vetustas scire dedit, & exercitatio assidua. Propterea mihi non potest exprobare, quod feci Laurembergio: Omnia ferri possent, si ab Anatomico dicerentur. Eum uero, cui nunquam uera Anatomiz imago de propriæ industriz speculo illuxit, quis ferat, tam audacter & proteruè per luseptum argumentum decurrere. Reuerentius pro secundo prælo, est quidem auellere, si id non emendatis priore, mirorque Valgum perissimum Anatomicum, cui operis vniuersi nitorem, & renatæ denuo vitæ causas debet, & agnoscit, tot errores Anatomicos reliquisse. Post Valgum postremus accedo, aberrantes partes & filij patris excensaturus quàm emendaturus, quoniam in summo famæ fastigio patre venerantur, quotquot seposito partium studio rem æqua lance expendunt, artis huius heroës æternitatis albo inscripti, qui posthabitis aliorum in re parili voluminibus, eam publicis Acedemiarum theatris vindicarunt, digni quæis patre gratia referatur, & ællimium. Itaque laudem aliquam merui ex parte Bartholini filij, atq; à theatris Acedemiarum, & heroicis artis Anatomica, ferreoneis emendationem, obsequis lucem restituerim, ut opus elegantius abeat in manus Anatomicorum. Cum autem videat plurimas erectas mentes, quibus promptum cum veteribus paria facere, & si opus, quadam ex dignitate obseruationû, pleraque huius artis, ex præfenti vfu emendare. Miror quomodo errorè patris non emendatis, nec ad usum præsentem suam Anatomiam accommodatis. Equidem animaduerti in his Institutionibus uellitis à furore lanceam saturâ, & cum Veteribus nouos errores cumulatis. Imò priorem quatuor editionum, quas habeo barbarissimas, ne dicam saltem, ne uiquam emendatis, tantopere placuit patri scribendi phœsis filio, ut nihil quidquam de parentis scripturione nouare uoluerit. Quoniam filius incrementum istud inseruit, non quod parentis filij historiz, tanquam ob uerri ignorantiam falsæ, addi aliud uerius, aut demum possit, sed ut in his iam habeatur probatus, quibus se uicra emendationem dudum se protulit. Ergo iussus est & inculpatus, qui nondum fuit accusatus. Itaque non intendendo tanquam fenerator Aristarchus, & mordax Zoilus res Anatomicas ignorantiam patris exprobare, partimque famam læterare, sed cum tantum in Anatomia aberrationes à me detellæ, alijs occultas, ideoque intellæ excensare: ut intelligas filius se imprudenter in-

*incerpasse virum doctissimum Primerosium, quod scripseris, à Rialano, rei, Anatomicæ ultimum complementum additum fuisse. Exemplari usus sum secunda & postrema editionis Leidensis, ut agnoscat Filius, me non fraudulenter agere, ex infinitis aberrationibus paucas annotabo, ne videat improbus, & nimis ingeniosus in alienis laboribus. Quoniam Filius Institutiones Anatomicas Patris sui capite deverticavit, Praefationem & eandem retinuit, nempe admonitionem ad Lectorem. Istantiniuriam reparabo, & istam praefationem elegantem, sinceram, memorabilem, ab ipso Authore recentem, in postrema editione correctam, & locupletatam, Hassiae, Anno Domini 1622. Calendis Septembris, ne pereat, adiungam, qua fateatur ingenium per quos profecerit, & libenter sui ingenij partum, examini & censura petitorum Anatomicorum subiciit.*

## AD BENEVOLVM LECTOREM MEVM

## Præloquium Bartholini Patris.

**N**on animatus eram, mi Lector, in lucem hæc Institutiones efferte, priuatis auditorum meorum vñbus dicatas. Nam ægrè fortassis hi ferent, magno labore & industria à se exceptas, atque in chartam coniectas lectiones, modò publico cuiusvis bono divulgari, nouasque varias obseruationes & opiniones offerri omnibus, quæ ipsis pridem loco noui beneficij. Sed vicerunt hos alij: imò hi seipfos. Etenim in viris eruditissimis, Philosophiæ Medicinæque proceribus, vrgent plurimi per literas, suadent per amicorum voces vicarias, adeoque persuadent editionem. Fraudare me putant iuuentutem, si publico hæc operam inuideo. Quibus respondere possent editæ ab iis, qui in fama multa sunt, Anatomicæ Institutiones. Verùm, vt hi post alios scripsere: ita etiam nunc in sæcula ire aliorum lucubrationes oportere regerunt, ob vtilitatem publicam rei literariæ, quæ ex plurium sententiis & obseruationibus augmentum capit: Res enim, ætas, vsus, semper aliquid apportant noui. Vicetunt ergo horum monita, vicit bonum publicum, vicerunt ipsi haud pauci, qui calamo ex dictanti ore exceperunt. Vti enim fieri adsolet in dictationibus, harum regionum Academicis vñtatis, non pauca itrepunt, his vel illis inter scribendum sphalmata, alij non assequuntur omnia, neque omnibus, ob meam, quæ interruptit menses aliquot ægritudinem chronicam, contingit lectio obigit. quo tempore ita suadentibus huius vel illius occasionibus, nonnulli Academicæ valedixerunt. Et hi præcipuè rogant, instant, vrgent ob vñsum compendiarium publicationem. Nec minus calcographus nolentis volentis manibus, prece pretioque extorquet. Vincor. Ceteros tamen penitere non potest, quibus continuatio obigit uauata opera. Nam qua hic verbo tenus proponunt, illi in animalibus, animalium partibus, picturis impressis, & manu scitè ductis edocti sunt. Qui hæc summam adferuntur controuersiarum cumuli, illis vberius ex legentis discursibus incidenter factis enucleati sunt. Vincor itaque, inquam, & præsertim publica ab vtilitate, cui velificari decretissimum semper fuit. Tu, mi Lector, si quæ non ardeant, quia contra communes authorum sententias proferuntur, cogitabis, & illis authoribus non vitio verum antecessores reliquisse. Vbi enim oculi & manus fidem faciunt, Authorum posthabentur decreta. Interim censuræ doctiorum, præsertim Anatomici pulueris magistrorum, & inter alios dictaturam gerentium, libens me meumque hunc Fœtum subiicio. Imprimis vestræ, qui laudem in hac arena quæsiuistis, Felix Platero, & Caspare Bauhine, Professores Basileenses celeberrimi: quippe quorum & scripta quæ existant, Anatomica elaboratissima me informauerunt, & diserta lingua, à quibus olim Basilea non insigni absque fructu pependi, & tua manductio, Nobilissime & Clarissime Caspare Bauhine, qui quemadmodum lingua, calamo, cultro olim me hæc in arte erudire, & insuper ut filium semper amare voluisti: ita etiam nunc à te discitum non animo (hæc enim optima nostri parte sumus longè coniunctissimi) sed corpore, eodem animo insinere per literas haud graueris. Vos enim binos scio, ipretis authorum, etiam ipsius Galeni, vbi oculi aliter fidem faciunt, auctoritatibus, rupe veritatis innixos fundamenta ex natura petere, quod ex scriptis vestris, vel ex ætienti dispallefecit. A Teutonum biga Anatomica, ad Italicam iam pridem ad immortalitatem huius artis alis euectam me conuerto: Magnos videlicet illos humani corporis dissectores & seruatorum: Hieronymum Fabricium ab Aquapendente, Patavinum Gymnasij

Anatomicum ordinarium & percelebre, ac *Iulium Cæssarium Placentinum*, ibidem Chirurgizæ Professore publicum, atque Anatomicum laboriosissimum. Vos imaturam hæc ad iudicij vestri Anatomici Solem optimè percoquere potestis. Ad te, *inquam*, me conuerto, *Fabrice*, venerande senex, *Pataine Esculapi*, quem ego Chirurgorum Deum & regem vocare soleo, Anatomiz verò instauratorem non postremum: ita vestigiis antecessorum tuorum *Vesalii & Fallopi* insistis, ut tempore saltem, neustiquam eruditione experientiaque te iis posteriorem probes. Quod si forte à præxi tua omisieris in hoc opusculum incidere, leuicque oculorum es operam dederis, deprehendes discursus tuos publicos, quos *Pataui* nunquam absque delectatione, addo & fructu, auribus vsurpant, ad hominem Danum non inanes rediisse. Vbi ab aliorum distas opinionibus (sicuti à veritate, quàm authoribus pendere mauis) ibi tuam quoque, prout ex ore tuo & conuersatione percipere lieuit, sententiam, lubens addo citoque: neque tamen, quod alij fastidiare non sunt veriti, tanquam meam mihi reddico. Quæ verò mea sunt, meoque labore innocentia, lubens tuo iudicio dexterrimo submitto. Et tuo quoque charissime & clarissime *Castelli*, quo adeo familiariter vsus sum quotidie, ut fratrum loco nos inuicem haberemus. Facies ergo hoc, quod posco, pro amicitia nostra, quæ inuiolata semper manebit, facies pro bono publico, cuius etiam gratia, quæ in Anatomicis præstitisti, quantum quidem ex te cognoueram huic operi inferere volui. Institutum enim fuit præcipua conuertere, quæ vel ex aliorum scriptis, vel ore, vel proprio labore, & inuentione comparare possis. Et Deum fidemque testor, ob publicum bonum: Cui vtinam omnes plusquam propriæ ostentationi, vanæque gloriolæ velificarentur. Cæterum neque vestrz sententiz acrimoniam in postremis habitam volo, Anatomici reliqui in Italia præclarissimi: *Iulii Lassine*, Neapoli, *Flamini Rota*, Bononiz, & *Iohannes Faber*, Romæ. Facturos enim vos quoque, quod superiores rogatos volui, certò mihi polliceor, ob insignem illam, & nunquam non mihi deprecandam beneuolentiam, humanitatisque omnia officia, quibus vobiscum eum essem, prolixè me cumulastis: tu cum primis, *Lassine* celeberrime, vnà cum *Mario Schipano*, Philosopho & Medico insigni, qui in *Academia Neapolitana* vobiscum, *Bartholinum* liberaliter desinere, ut lectiones humanorum corporum instituerem, voluistis. Sed aliud tum animus suadebat, aliud iter, quod in Siciliam ingrediendum fuerat, aliud etiam scena, cui seruiò in hoc theatro, meæque conditione, quas quidem omnes præsens vobis ego aperire non sustinui. At tamen non sine aculeo discessi à vobis auulsus, quasi anima à corpore. O vos amoris, & venerum ita plenos: De quo eximio amoris & fauoris genere, uti tunc gratias egi, habuique insignes, ita modò eisdem repeto, vestramque grata mente benignitatem agnosco. Easdem ob causas, idem quod superiores, rogo peritissimos Anatomicos, *Iohannem Tessonium*. Serenissimi Regis Vng. Medicum, & *Petrum Pavum*, Lugdunensem in Batavia Anatomicum & Botanicum publicum. Quos, quia clarum inique beneuolentia in me ediderunt, ille quidem Praga, hic Lugduni Batavorum dum degerem, hoc etiam officij genus mihi benignè collaturos nullus dubito. Tandem, ut adhuc in hac styli linea hæream, præstantissimum *Pinxum*, Chirurgum *Parisiensem* publicum & præclarum, & quoscumque alios quacumque mundi Europæ meliorū in plaga, partim amicos & notos, partim fama saltem cognitos, Obsecro, ut si in plusculū peccatum est, sanando suggerant, moneantque, aut censoria animaduersione notando corrigant. Ego enim vitæque adfectu vsar unum in finem corrigendi & discendi, adeoque docendi. Dabit is hoc, si quid est, si qui estis memores vestrz meique conditionis, vestra equitati meæque ætati, qua nondum omnia inuenire permisisti, nec peregrinationes, quibus hactenus addictus fui, otiosè singula pensare. Et nemo vnquam ita ingenio, aut memoria poruit, ut omnia intelligeret, colligeret. Quæ præ me fero, eum delicti culpam modestè agnoscedo, non minus honoris adquiratur, quàm laudis famam gloriosè demerendo. Interim Sophocleum istud pro me vsurpo: οἷα' ἡμῖν αἰ τοὶ θεοὶ χαῖ' ἡμῖν αἰ εὖ ποιοῦν.

Quocum conuenit illud Menandri.

Μὴ πῦρ βλάψῃς, εἰ τοῦτοπος λόγῳ, ●

Ἀλλ' εἰ Φρονοῦντος τοῦ λόγου ἀνδρὸς ἐστῶ.

*Zailos & Memos improbos*, quos desuturos nunquam dubitari, contemno: ὅ enim non nisi indocti, rapaces, petrones: & tamen ne nudi ab ingenio videantur, nullaque scientia fulturi subnixi, quidvis arrodunt, & adlatrant. Et cunctis virtutis comes est indoctus, inuis-

*dia.* Quamobrem nunc ad te Lector, qui candidus, redeo, methodumque, quam sequutus declaro. In parte quacumque explicandâ prodest quidem eius structuram seu fabricam ritè primùm aperire: deinde verò actionem, tandem vsum. Quam quidem methodum primis capitibus non aliam ob causam usurpavi, nisi ut iuniores & discipulos hunc ordinem edocui, similiter ipsi totum opus pro placito disponderent. Quia vero hæc methodus cogit nos sæpe multa verba repetere, & prolixitate incumbere: deinde verò non omnis pars actionem habet, neque semper accuratè adeo distinguuntur Actio & Vsum: Malui in toto reliquo opere cum aliis Anatomicis brevitatibus causâ, cuius apprimè studiosus esse cupio, facere. Maxima namque pars scientiarum brevitas capimur. Et præstat rectum quàm longum currere. Itaque primò partis fabricam dilucidare lubido fuit, eius situm, magnitudinem, numerum, figuram, superficiem, connexionem, foramina, meatus, cavitates, membranas, vasa, particulas, &c. recensendo: deinde verò vsum omnes. Vbi opus fuit, partis causas explicavi: Efficientem, materiam, formam, & finem. Alicubi partes definiti nonnullas: ut eodem modo discipulos cuiuscumque nullo negotio definitionem contexerent. Illa enim semper adhibere & repetere, quæ quivis de facili præstiterit, hominis non est tantùm otio & chartâ abundantis & abutentis, sed etiam aliorum ingenii dispendis, atque superstitiosè ad gloriolam etiam compertissima inculcantis, ut Chalcidius in principio Timæi dicebat. Partium verò omnium exactam satis plenamque exhibeo explanationem, non tamen quasi omnia, sed quasi principia dixerim. Obvia pleraque & minuta dici præstat, quàm scribi, imò ostendi, quàm dici. In controversiis gravioribus, quid apud alios, ut *Vesalium*, *Columbum*, *Laurentium* desideretur (quamquam & idem radio ingeni) spissam veritatis caliginem euincere conati sunt, ideoque suâ laude, si cum antiquis contendatur, non spoliandi) summam sparsim adnotatum est. Atque ita id operis, quod diuturnis per varias Europæ orbis Academiarum peregrinationibus, magnis sumptibus, studiis & vigiliis continuis, non raro cum vita periculo & discrimine edidit sum, publico bono non inuidebo: ne fraudetur iuventus, si diutius supprimo, & occulto Euclonius novi instar, hanc lare secreto aniam. Quin calidè potius in lucem efferam: quòd cum alios me proficere videbo, rectè ego, qui natus mihi ipsi non sum, profecisse intelligar. *Huius ergo fructus, mi Lector, & si accepta fore cognovero, largus ero in pluribus huius generis non minus variis, modo reliquum via, viamque Deus meus prosperaverit, publicandis: si verè probaveris: catus cautusque in supprimendis, si iuste damnaveris.* Anno 1610. 18. Decembre.

### *Divisio Ventris.*

Lib. 1. **C**um limites ventris inferioris describit, utrimque costis terminari notat. pag. 8. Debebat addere *notas*.

*Ibidem.* Nullus Anatomicus unquam appellavit dextrum hypochondrium *tri-*  
-*precordia* nomen est ambiguum, quod potius diaphragma denotat, quam hypo-  
chondria, quasi *diaphragma*.

*Ibidem.* Inter partes continentis, communes enumerat pinguedinem cum sua membrana  
distinctam à panniculo carnosio, & tunicam cuiusvis muscoli propriam. Pinguedo non habet  
membranam separatam à panniculo carnosio, sed ambo simul mixta, vel coherencia,  
alicubi carnosam membranam constituunt, alicubi adiposam, omni carne priuatam,  
& si quando pinguedo separatur à panniculo carnosio, membranae sunt pinguedini  
intermixte, ad firmitatem & coherentiam adipis. Inter partes continentis commu-  
nes, male recenset tunicam cuiusvis muscoli propriam, sed nesciuit membranam per  
totum corpus expansam esse, quæ involuit omnes musculos, tam abdominis, quàm  
thoracis, & artuum, amplexu firmo & orbiculari, ut demonstravi in mea *Anatome*,  
ad hunc lapidem celspirant omnes Anatomici.

*Ibidem.* In recensendis partibus internis, siue contentis intra alveum abdominis,  
omisit aortam, cum arteria Lienali, & Coeliaca.

## De Cuticula.

Cap. 11. **O**bservatus fuit, qui instar exuviarum serpentis cuticulam depoluerit, cap. 1. id satis frequens in morbis acutissimis, qui recidivas frequentes habere, & corpus vniuersum extorruere, itaut fermè corpus vniuersum, expolietur.

## De Cute.

Ibidem. **A**Ristoteles fatur ex carne exsiccata constare cutim, sed senescente numquam dixit, quasi senes tantum veram cutem haberent.

Cap. 2. **Zacutus Lusitanus Indanus** imponit, & illud nobis Chrysianis, dum scribit in longa media succum ex impositis emplastris elici ad nutritionem, quod est impossibile. Ideoque cum magna caurione legendus est, præsertim in sua Praxi admiranda, quia vt probè notauit Crato, Hebræi non tam mederi, quàm Christianos fallere didicerunt. Itaque dicere verè possum de Zacuto, quod scripsit de Amato Lusitano Crato, ab eo plura conficta, quàm facta sunt, & interdum opiniones suas illo modo confirmare voluit, præfatione in Ferniculum.

## De Panniculo Carnoso.

Cap. 4. **C**um agit de panniculo carnosio duas lineas interfecit, quæ videntur de-notare panniculum carnosum, ex quatuor membranis distinctis constare, in homine aliquo si fiat exalta separatio, apparebit cum constare ex quatuor membranis distinctis, quampis hæc periodus sit malè locata, & clariùs explicanda, pro quatuor integumentis communibus totius corporis, enumerauit tamen quinque membranas communes.

## Membrana communis Musculorum.

Ibidem. **I**gnorantiam suam declarat in membrana musculorum propria, cuius ortum alij à perialtes derivant, quomodo inde possit deriuari, non video, consequutionem demonstrabit Filius.

## De Musculis in genere.

Cap. 5. **C**onnexio musculorum totius corporis inter se arctissima est, hiant tamen quando eos flatus, serum, alimæve intercedit, vt in plenius de spuria, & de mulie à Turcis flagellato, Vellingius nobis retulit, adeo diductos fuisse musculos, vt flexo teniter corpore singuli suum suum extuberarent. Notat Hippocrates vniuersum corpus intra carnes per sanitatem repleti spiritu & sanguine, in morbis flatu & sero, inde sunt rheumatismi: quod ad flagellationem militis mihi reuocat in memoriam, nostros lanici animalia cæsa & calentia insufflare per calamum, postea diuerberare buculis optimi animalis insufflatam, vtfacilior sit sine laceratione excoriatio, & carniū separatio, & id tentandum foret in corpore humano recenter strangulato, vt partium omnium facilius esset separatio.

Ibidem. Authorem facit peruersæ opinionis Ioannem Valæm, qui putat perire esse, siue in principium, siue in medium, siue in finem muscoli nervus inferatur. Attamen aduersatur Galeni doctrinæ, qui scribit naturam nervi recurrentem contorsisse trochleari flexu circa ramum descendens aortæ, vt nervi in musculorum linguæ, Ossis hyoidis, laryngis inferioris, maxillæ, capitis (Mastoidem intelligo) in capita infererentur. Ibi nota industria naturæ, quæ poterat sine vilo recurfu nervi directè tradere musculis nervos, intransitu sexti panis descendens.

Ibidem. Pancer in musculo tendo est, vt in musculo quodam inferiorem maxillam apertente, debebas vt Anatomicus nominare istum musculum siue sit par primum vel secundum, siue nomen habeat peculiare.

Ibidem. In motibus musculorum vnus ex altero sequitur. Nam thoracis musculi dum agunt, dilatant & constringunt, attrahunt aërem & fuligines expellunt, respira-

tionemque efficiunt. Debebat dicere, dilatant, & alij constringunt. Alij uttrahunt aërem, alij fulgines expellunt, & respirationem efficiunt. At ista confusè proponit, ac si ab iisdem musculis petagerentur.

### *Recti Musculi abdominis.*

Cap. 6. **C**asserius rectos pro pluribus habet, & rectè. Ante Casserium Carpus eius fuit lib. 1. opinio, nec ab ea longè recessit Vesalius, sed refutavit Ioannes Casus Britannus, & satis iudiciôsè, Laurembergius in Collegio Anatomico, & antea Riolanus id examinaverat, & improbaverat in sua Anthropographia, & primus indicavit Carpū.

### *Obiter de ligamentis rotundis Uteri.*

Ibidem. **L**igamenta Uteri rotunda in pudendum prope nympham desinunt: Vterius extenduntur in modum pedis asnerini dilatata, attingunt quidem clitoridā, non verò nympham, nisi velit nympham significare clitoridā.

### *De obliquo descendente.*

Ibidem. **Q**ui negant musculum obliquum descendentem viri à costis, sed potius à pube immobili: Resp. costa sunt quiescentes resinicta lineæ candida. Ergo musculus ille utrahit lineam candidam, cum ita ambo vniantur, ut mutua sit antitaxis eadem, in compressione abdominis retracti versus principium, & intus tume facti, ut compellant subiectas partes.

Ibidem. *Natura sententia quæ Galeni est, probatur musculum descendentem superne viri, non inferne.* Ante Bartholinum Riolanus id demonstraverat quatuor annis, duplici editione Scholz Anatomicæ, antequam lucem viderent Institutiones Anatomicæ Bartholini, & qui comparavit utrumque Authorem, multa ex Riolo depremissa deprehender, quamvis intepolata.

### *De motu ossæ compagis.*

Ibidem. **R**iolanus Author est istius motus compagis Ossium pubis & Ilium, cum Ossæ Sacro, nec Bartholinus filius istum motum bene intellexit, nam sursum trahere, & thoracem obliquè deorsum inclinare sunt motus contrarij & impossibiles, si oriantur à parte superiore, & præter insertionem ad lineam candidam, inserantur etiam Ossibus pubis, immoto thorace, antrosum trahunt, compagem Ossium pubis ad actum generationis, & progressum in iis, qui carent tibiis & cruribus.

### *Origo Rectorum Musculorum.*

Ibidem. **R**ectorum initium ab utroque latere cartilaginis eniformis à sternis, & à quatuor notbarum costarum cartilaginibus, imò à duabus veris costis, & duobus notis oritur.

Ibidem. Non intelligo, quid velit Bartholinus filius, ex Rectoricis alijs, nisi intelligat solum Spigelium, Rectum voluit habere duo principia, duosque fines. Principium unum, & unum finem in pectore, alterum verò in Ossibus pubis. Quasi rectus possit habere principium & finem in pectore, & Ossibus pubis, & duos motus edere, esse musculus particularis in specie sua, ut diaphragma. Rationes, quibus probare niritur multitudinem rectorum destruxit iam pridem Riolanus.

Ibidem. In interna rectorum superficie duæ venæ coniunguntur, quas nominatè debuerat, nempe mammariam, & epigastricam.

*Rectorum Vfus.*

Ibidem. **R**ectorum musculorum proprius vfus fecundum Riolanum & Spigelium est *Offa pubis sursum trahere, & thoracem inclinare, ad supra refutatum.* Longè diuerfa est Riolani opinio, ridicula Spigely, & eorum qui ipsum fequuntur.

*Vfus Pyramidalium.*

Ibidem. **V**sus pyramidalium est rectos innuare in compreffione fubiacentium partium. Nil poffunt comprimere propter exilitatem, nifi veficam. *Nam poffunt effe ftacula quidam mufculorum rectorum, fi tendonibus rectorum fint fupetiecti pyramidales mufculi, ex hoc loco obferuauit aliquibus gracilem tendinem & rotundum prodire, vfque ad umbilicum.* Quod prius annotauerat Riolanus.

Cap. 7. lib. 1. Peritoneum connectitur anterior linea candida. Linea candida est imaginaria, quomodo poteft habere connexionem.

*De Peritoneo.*

Ibidem. **P**eritonæa membrana ab umbilico ad pubem, funt adeo diftantes, ut in eorum capacitate vefica contineatur, adque in hunc vfum, ut fit robuftior membrana, ubi granatur. Imò tenuior eft, quia feparata per infignem cavitatem, quæ includit veficam, quod paucis obferuatum notat Bartholinus. Primus detexerat & reuelarat Vefalius, in obferuationum Fallopij examine, & Riolanus poftea laudauit iftud inuentum.

Ibidem. Malè reprehendit Fernely opinionem fub finem libri primi Anatomici exaritam, quam expofui, & veriffimam demonftrari in mea Anatomie.

*Vfus Peritonæi.*

Ibidem. **V**sus peritonæi eft claudere venarum ofificia, hinc iecur, fi membrana non adduceretur, ora eius venarum in confpectum venirent, inde quoque ea pariter, in quibus plures funt arteria-craffius peritoneum acceperunt, ut Lien. Manifefta eft propagatio membranæ iecoris à peritonæo, dum inueltit diaphragma, reuoluitur & expanditur fupra iecur, quod interuentu iftius membranæ firmiter alligatur diaphragmati. Potefte etiam claudere venularum ofificia definentium ad extimas partes: fed detractâ iftâ membranâ non ideo conspicua venarum ofificia. Lien habet tunnicam propriam, nullam à peritonæo, eius propagatio demonftrari non poteft, per fibras tantum nothis coftis alligatur: interdum diaphragmati parte fupiore, interdum ventriculo adhærefcit, propterea facilè procidit vique ad hypogaftrium.

*Omifis Vafa Vmbilicalia.*

P. g. **P**atermifit descriptionem vaforum vmbilicalium qualia deferibuntur ab Anatomicis, & reperiuntur poft partum in omni ætate, & malè remitteret fuos Lectores ad cap. 37. vbi deferibuntur qualia funt in Fœtu. Depingit vafa vmbilicalia, 324. 3. nec ea explicat capite peculiari. Scripfit cap. 7. *Vrachon effe imperium: In figura notat Vrachon, Fetus vrinam à vefica fundo in fecundum Fœtum inuoluentem tunnicam exporgat.* Hæc omnia perturbant Lectorem, & incifiam fcribentis indicant.

*Omentum.*

Cap. **O**mentum fitum eft ad ventriculi fundum, indeque intefinis inftitutum, quorum 8. anfractus ingreditur. Id non fit naturaliter, quia expanfum directè fupra intefina reperitur. Tantum cognouit pendulam omenti portionem, fed maiorem inter ventriculum, Lienem, & diaphragma reconditam inuoluit. Principia varia, quæ defcribit in pta funt, quot tantum connexiones, ad expanfum omentum in omnes partes.

*Figura Omenti.*

Ibidem. **F**iguram ineptè describit, dum superius orificium orbiculatum habere statuit, inferius rotundum esse, figura omenti ex *Vesalio* deprompta, sed ridicula multos Anatomicos ex picturis & libris eruditos decepit: nam parte inferiore potius est quadratum, quàm rotundum: foramen nullum deprehenditur, nisi discindatur, rotunditas nulla nisi insitetur, inde cognosces figuram omenti ex picturæ forma descriptam fuisse.

*De textura Omenti.*

Ibidem. **F**alsum est ramum costalem esse sexti paris portionem. Falsum quoque omento innumeratas adesse glandulas interiectas, potius adeps certis locis induratus ad diuisionem vasorum, figuram & usum glandulæ æmulatur. Non potest omenti portio ventriculi fundo adnexa multum iuuare coctionem ventriculi, sed portio illa magna Lienis & ventriculo interiecta id præstare potest, quæ etiam instar pulmonaris subternitur ventriculo.

Ibidem. Citat *Valerius* opinionem de copiosa distributione vasorum per omentum, cum rami vena Porta sint, ut plus sanguinis per Hepar ad Cor redire possit, quare & plus possit sanguinis ab Hepate perfici. Hic articulus est valde obscurus, nisi intelligatur omentum esse diuerticulum, & penurarium, copiosioris sanguinis. Ergo per circulationem sanguinis, qui recurrit ad Hepar, iterum ab Hepate perficitur, in suo transitu, quod est absurdum.

*Quo situ dormiendum à cœna?*

Cap. **N**on percipio sensum eiusmodi verborum. *Ventriculus dextram versus paulatim attenuatur, ut cibus sensim eò protrudatur, verius dixisset, paulatim inclinatur.* Quasi sit facilior descensus cibi in dextram partem fundi, quàm sinistram. Addit ex quo fundamento scitur dormituri conducere, primum sinistro lateri decumbere usque ad coctionis abolitionem, deinde verò dextro, secus quam vulgo putant. Imò præstaret iacere in dextrum potius latus quàm sinistram, ad facilitiorem coctionem.

*Explicatio textus obscuri de Ventriculo.*

Ibidem. **C**um *Valerius* editionis primæ & secundæ curam suscepit, quando agitur de præsicio superiore, non emendauit locum valde obscurum: ita quoque illam operculo adretinendos fumos regimus, ne decubitu vario alimenta in os regurgitent. Parens non correxit istum locum in secunda editione: filius retinuit in secunda editione loco illam, substitutum fuit illud, quod refertur ad orificium operculo te ætum. Quis vnquam ita loquutus? forsan Parens intellexerat ollam, nisi hoc nomen retineatur, nullus erit sensus in hoc articulo, sic benignè errores emendo, vel excuso.

Ibidem. *Si orificium superius est situm ad vertebram thoracis undecimam, est supra diaphragma, ut naturaliter esse debet, non potest esse in epigastrica regione.*

Ibidem. *Orificium dextrum vulgò inferius distat à fundo, quemadmodum sinistrum se re.* Voluit intelligere orificia illa duo æqualis esse altitudinis.

*De cauitate sub Ventriculo prope Lienem.*

Ibidem. **F**alsum est ad ventriculum in sinistro latere sub diaphragmate insignem formari cauitatem membranis inclusam, partim à ventriculo, partim à diaphragmate, partim ab omento. Nulla est cauitas, sed tantum maior omenti portio ibi collocata, magnum spatium occupat, & instar spongiæ ebibit, absorbetque sordes tenuiores ventriculi & Lienis. Imò interdum adeo intumescit, ut mentiatur tumentem Lienem, decipiatque medicos incautos. Istum Aphorismum scilicet. 7. 54. de ista cauitate interpretatur.



*De Ventriculo.*

Ibidem. **C**ommuniter feminis ventriculus, quam viribus minor, ut Viterocrescenti locutus deus, ex Spigelio. Imò cum feminæ sint viris voraciores, ex Aristotele, nullumque intestinum ieiunum habeant, si non amplioris, saltem æqualis magnitudinis ventriculum habent.

Ibidem. Interior tunica ventriculi rugosa est ob crassam carnosam sibi adhaerentem. Crusta illa statuitur esse ab excrementis tertii coctionis ventriculi, etque spongiosa, habet meatus veluti fibras breues, ab infima superficie ad extimam, ut pars chyli tenuior penetret, & à venis exsugatur. Ergo venæ sunt applicatæ istis fibris, ut exsugant chylum, quis hoc dixit, quis talem structuram vnquam vidit? Rugosa quidem est interna superficies ventriculi, ac veluti villosa ad retentionem chyli, sed istam subtilitatem Bartholini nunquam inspexi, etiam si curiosè id indagauerim.

Ibidem. Arterias accipit ventriculus ad vitam, quæ venas comitantur, etiam per arterias accipit sanguinem à Corde quo nutritur. Qualis confusio sanguinis, & repetitio arteriarum, quæ videntur separatz.

Ibidem. Nervus à sexto pari ad orificia geminos à ramis, qui recurrentes, & pulmonibus atque pericardio prospexerunt. Ignorat diuisionem sexti paris neruorum, quod quidem intra thoracem diuiditur in recurrentem & stomachicum, recurrens nullum neruum suppeditat inferioribus, sed totus recurrit ad collum. Decussatio neruorum stomachicorum ad orificium superius ventriculi, ex Riolano depronipta est, quod emendauit in postrema editione. Costalis neruus qui inferitur ad fundum ventriculi, & pylorum, non est portio sexti paris, sed emeigit, ac prima & secunda vertebra dorsi, & corpora vertebrarum lateraliter perreptans, ad inferiorem ventrem decurrit.

*Fermentatio Ciborum.*

Ibidem. **D**E fermentatione ciborum in ventriculo, scripsi satis accuratè in responsione ad Valium.

Ibidem. Venas ventriculi aliter explicat, lib. 3. cap. de vena Porta.

*De Intestinis.*

Cap. I. Intestinatorum tunica secunda est cæteris crassior, si non carnea, saltem cario. Iniformis, qualis data omnibus partibus, quæ contrahi & dilatari debent, ineptum dicere fibras carnosas donatam fuisse, eùm fibræ omnes ad robur debeant esse neruosæ.

Cap. 11. Bartholinus pater & filius ita accuratè describunt vasa duodeni intestini, ac si intuiti essent. Nervos tribuunt exiguos stomachicos, & ieiuno assignant à costali, quæ sunt differentes ob partes valdè remotas, satius est vno verbo dicere partes omnes ventris inferioris neruos mutuari, à plexu illo neruorum inter duos renes collocato, qui formatur ex duplici costali, & stomachico.

*De Colo Intestino.*

Ibidem. **L**igamentum à paucis descriptum, vel vinculum quoddam medij digiti longitudine per Coli medium parte superna intextitur, deinde ob amplitudinem duo ligamenta fortia habet, vnum sursum, alterum deorsum, ut supernis & infernis partibus alligetur. Vinculum istud primum à Laurentio descriptum fuerat, postea à Riolano. Debebat dicere istud ligamentum ab apophysi illa cæci extendi secundum longitudinem coli, vsque ad rectum intestinum. Ligamenta illa duo adiuncta secundum longitudinem fuisse à Riolano proposita, sed vnum detraxit in hac editione postrema, & secundum reliquit oppositum alteri latiori ad robur intestini coli.

Ibidem. Appendiculæ, siue fimbriæ carnosæ à Riolano fuisse primum obseruatæ & descriptæ, ne hoc inuentum tribuat Spigelio.

Ibidem. Rectum intestinum connascitur etiam peni in viris, dicere debebat Vrethra.

*De Podice.*

Ibidem. **P** *Odex tres habet musculos, ex quibus forte quinque constitui possunt, ex Ri-*  
lano id desumptum.

Ibidem. *Musculi lenatores ani lati, & tenuer, orti à ligamenti pubis Ossis Sacri & c-*  
*xenditis. Sunt lati, sed valde carnosi, ut robur habeant ad releuandum podicem, nec*  
*possunt enasci ab Ossibus pubis. Admitto de Ossis Sacro, & Ischio, non de Ossis*  
*pubis.*

*Mesenterium.*

Cap. **D** *Iuidit mesenterium in mesaraum, & mesocolon, quod crassa connectit intestina,*  
12. *alij rectum intestinum. At colon caret isto vinculo, supernè alligatur ven-*  
*triculo interuenti omenti, parte inferiore, dextræ & sinistræ membranæ adiposæ v-*  
*triusque renis.*

Ibidem. *Mesenterium habet interiectas glandulas, & maiorem unam in exortu glandu-*  
*lam habet, quam pancreas post Fallopium Afellius vocat. Non potest pertinere ad me-*  
*senterium, idque monere debebat Bartholinus, quia pancreas separata est magna glan-*  
*dula, quam proprio & seq. cap. descripsit Bartholinus.*

*Pancreas.*

Cap. **P** *Ancreatisitum bene descripsit, sed non probo quod sequitur. Oritur ad*  
13. *primam lumborum vertebra, quia corpus est separatum carnosum, quod*  
*nullam habet connexionem, cum lumborum prima vertebra, & ultra citraque ex-*  
*tenditur, tres aut quatuor digitos longum facit. Imò sex vel septem æquare debet, in*  
*corpore bene conformato.*

*Ductus Virsungianus.*

Ibidem. **D** *E isto ductu qui reperitur in pancreate, quid sentiam, in mea Anato-*  
*me declarau, qui quidem magni est momenti in medicina, ad ex-*  
*purgationem bilis variz ibi collectæ, potius per vomitum, quam per secessum, &*  
*posterius quædam addam, in Animaduersionibus ad Vesslingium.*

*Hepar.*

Cap. **M** *Alie describit tria ligamenta Hepatis, cum tantum vnicum appareat, quod*  
14. *est vena umbilicalis arefacta, quæ inferitur in fissuram Hepatis: cum au-*  
*tem traducatur per duplicaturam peritonzi, cognitem habet ipsam membra-*  
*nam, quæ reuoluta supra Hepar, excurrit susquedeque ad ipsum diaphragma quod*  
*inuestit, ac proinde adnectit ipsum Hepar diaphragmati à quo dependet, nec enim*  
*pro ligamenti accipiendæ sunt fibrulæ, seu filamenta quædam nothis costis Hepat*  
*nescentia: Aliud est ligamentum à xiphoide cartilagine, quod ad fissuram Hepatis*  
*contendit.*

*Anastomoses vena Porta & Cava.*

Ibidem. **A** *nastomoses, sive coniunctiones radicum vena Porta & Cava admittit. Sed*  
*insignem anastomosis Baubini, quæ canalem amulat ab vna in alteram,*  
*quæ Hylum admittit, posuit, Bartholinus non potest dermansrare. De his anastomosis*  
*meam sententiam exposui in mea Anthropographia. Notandum contra circulationem*  
*sanguinis per Hepar, variisimè inslando, Valæus obseruauit vnam in aliam aperiri, quod re-*  
*ferat anastomoses.*

*Diuisio Cava Vena.*

Ibidem. **R** Adices Cava in unum truncum coeunt, qui statim ad Hepar in duos ramos diuiditur magnus, ascendentem, & descendentem. Ignorat continuitatem, & rectum tramitem trunci, à clauiculis ad inguina directè extensi, & indiuisi, id-eoque inutilis isthæc diuisio trunci in ascendentem, & descendentem, nisi doctrinæ gratia, pars trunci supra Hepar, dicatur truncus ascendens, pars infra Hepar truncus descendens. In describenda sanguificatione, chylum deferri ad Hepar notat per mesaraicas, notare debebat lacteas, & spiritus crassius chyli: per ramum splenicum transferitur ad Lienem, ergo ramus splenicus destinatus erit vehendo chylo ad Lienem, & reuendo sanguini ad nutritionem patrix, quod est absurdum.

*De Vesica biliaria.*

Cap. **V** Vesica biliaria & canalis biliaris, pori cholodoci dicuntur, quod est improprie scriptum, nam vesica differt à poris cholodocis, qui duo sunt.

Ibidem. Post Galenum canalis huius bilary descriptio vera Fallopio debetur: at paulò antè reprehendit Fallopius, qui bilem scripsit rectè ire ad vesiculam.

Ibidem. Nonnunquam ductus abis in fundum ventriculi cohibilem effundens, quomodo id fieri queat non video, quia fundum ventriculi latus sinistrum occupat, ad latus dextrum consistit pylorus eleuatus.

Ibidem. Si vero meatus cholodocus ad ieiuni finem inscribitur, deiectiones semper biliosas obtinent. Non potest meatus cholodocus ad ieiuni finem inferi, quia eius extremitas est in umbilicali regione sita, & si ad eum locum perueniret, pedis longitudinem meatus cholodocus æquaret. Noluit Valens, vel filius mutare latinitatem patris, propter scripturæ antiquæ religionem, nam scribere oportet, deiectiones semper biliosas obtinent, quod non fuit emendatum in omnibus editionibus, neque in postrema.

*De Lienē.*

Cap. **L** ien connectitur per membranas tenues à peritonæo natus ipsi peritonæo, omento & rens sinistro, aliquando & septo, quod negat Fernelius, qui excusari non potest, nisi cum centrum diaphragmatis intellexisse dicamus, huc enim non adnectitur, licet contrarius sit Riolanus. Verum est Lienem alligatum esse peritonæo & omento, per adhesionem omenti, peritonæo per filamenta membranosa robusta, sed nunquam reni sinistro, qui est obuolutus multo adipe, atque inclusus membrana adiposa. Fernelius vciè scripsit non esse alligatum Lienem diaphragmati more Hepatis, sed potius filamenta accipit parte superiore, quemadmodum lateraliter à peritonæi membrana. Nec vnquam Riolanus scripsit centro neruo diaphragmatis adnexam esse Lienem. Tunica Lienis propria est, nulla communis à peritonæo, quis vnquam dixit ab omenti membrana Lienem accipere tunicam tenuem & simplicem: Addidit filius, Hepatis membrana crassiolem, quæ in senescentibus plurimum, & sæpe induratur. Fa-teor per morbos crassescere posse, & cartilagineam fieri, sed non est secundum naturam talis.

Ibidem. Lien arterias habet magnas multasquæ à cœliaca secus quàm Hepar. At nullas recipit ab illa arteria, sed habet peculiarem arteriam à trunco cœliacæ statim ab exortu, vel separatam à trunco aortæ prodeuntem. Ac proinde vanæ sunt, & inanes deductiones chyli per mesaraicas arterias, quæ à quibusdam statuuntur, nempe Spigelio, & Hofmanno.

*De actione Lienis.*

Ibidem. **B** Artholinus putat ramum splenicum succum crassiolem chymi, non vero excrementum melancholicum ab Hepate trahere. Dicere debebat succum crassiolem chyli, male enim chymus vsurpatur pro chylo, quia sanguis dici potest chymus.

Deinde

Deinde ex doctrina *Asellij* quam admittis frustraneæ sunt Melaraicæ ad vecturam chyli in Hepar & Lienem, quia lacticæ venæ isto funguntur officio, quarum nullæ ad Lienem perueniunt: propterea non potest Lien inferuire sanguificationi, si non habet vasa, neque arterias, neque venas videntes chylum ad ipsum, quomodo ramus splenicus venosus potest inferuire deductioni chyli, & postea reuersioni sanguinis ad nutritionem partium, relabimur in idem impedimentum quod veteres inuenerunt, & *Galenus* soluisse putat, designando itum transitum diuersis temporibus, ratione partium diuersarum trahentium: sed ridiculæ sunt rationes, quas adducit *Bartholinus*, vt probet sanguificationem in Liene. *Viscera ista sunt magis sordida & terrestria, ideoque salem sanguinem requirebant. At ex eodem Authore sanguis Lienis est magis dispositus ad putredinem quam Hepatus.* Itaque istæ partes meliore & puriore sanguine erant naticidæ, quia sunt corruptioni magis obnoxie, si velimus admirari & admittere naturæ prudentiam & solertiam in fabricandis partibus. Addit pinguedinem facilius putrescere, quàm in aliis locis, ac proinde requirebant puriorem sanguinem, ex quo elaboratur in Liene. *Adducit argumentum firmissimum, quod ubi pars reperitur viscerum substantiam habens, venas habet à porta, seu ramus Lienis.* Contrà. In ventre produco renes, vtrumque sanguinem recipiunt à Caua. Noli igitur Lectorem inelcare, vel deludere lectione controuersiarum Anatomicarum tui patris, sunt ertoneæ, nec ausus fuisti istas producere, quales existant excusæ.

### De Lienis vsu.

Ibidem. **O**pinio *Valzi* de Lienis vsu noua est, & elegans si probari posset, quia solum humorem acidum massæ sanguinæ exlugere statuit, quem chylo, & sanguini postea communicat, dum attenuatus est, & elaboratus in Liene, si vera est, destruit omnes opiniones de vsu Lienis. *Concludit enim melancholiam ex Hepate, vel chylum per ramum splenicum, neuiquam ad Lienem deferri.*

### De Renibus.

Cap. **M**ale renes à fluendo dicti, quod per eos materię fluant, dicere debebat, 17. quia sunt riuii vrinæ.

Ibidem. *Ex Benerouicio vno rene affecto, alterum urinam non expurgare, & merito reprehendis, quia id non vsquequaque verum deprehenditur, sed interdum accidit, & demonstrauit *Riolanus* ante Benerouicium.*

### Vnde stupor cruris in calculosis.

Ibidem. **S**tupor cruris è directo renis affectu, tribuitur à *Riolano*, non tantùm pfoæ musculo compresso, ab incumbente, & premente rene calculoso, sed potius neruis tribus, qui includuntur musculosæ carni pfoæ, ex quibus constat ille insignis nervus, qui in erus vsque ad pedem exporrigitur.

### De Situ Renum.

Ibidem. **Q**uis unquam vidit sinistram renem interdum Liene superiorem? semper videtur subiectum. In brutis Lien deorsum magis vergit, quia longior, & linguæ bubulæ similis, & semper eiusdem figuræ, ob id dexter ren in illis altior est, & intra Hepar absconditus, dum Hepati ipsorum sinus insculpitur ab rene, quod in homine non fit. Imò sæpius ren dexter in homine elatior est sinistro, & intra Hepar absconditus. Nunquam vidi, nisi præter naturam, dextrum renem sinistro maiorem.

*Figura Renum.*

*Ibidem.* **H**ippocrates renes pomis comparavit sine dubio latioribus sed meo iudicio non pomis valuit per similitudinem, verum similitudinem renum cum aliis brutis indigere. Hæc interpretatio longè abscondita à sensu verborum Hippocratis, sunt enim ex ipso verbi ipsiusque, *οὗ ὅμοιοι τῶν πομπῶν* iudicium. Cur sint ipsiusque, ex Cl. Salmasio demonstrari æquales in situ, sed colore sunt similes pomis, forsan poma intelligit rubicunda, qualia habemus caluiana, & consimilia in Græcia exstare puto.

Riolanus primus in Fœtu, & in puello usque ad triennium, & ultra, humanos renes vitulinis similes indicavit, quod subicit, & plurima ex Riolo de prompta.

*De Carunculis papillaribus Renum.*

*Ibidem.* **C**arunculas papillares, quæ reperiuntur intra medullarum renem, primus Riolo accuratè declaravit, & retulit earum inventionem ad Iacobum Carpum, sed ad inveniendas istas carunculas, imperitè scribit renes secandos esse secundum longitudinem. Nunquam secuit renes ad percutiendas istas carunculas, modum sectionis, & indagationis reperies in mea *Anthropographia*.

*Ibidem.* In hominis renibus nulla sunt canitates, siue ventres, nisi qui ab emulgentibus & preteritis formantur, cribrum benedictum, somnium esse statuit, veritatem istarum rerum, nempe duos ventres, siue cavitates reperiri in humanis renibus, & ipsum cribrum non esse fictitium discet ex mea *Anthropographia*.

*De Valuulis emulgentium Venarum.*

*Ibidem.* **V**aluulas ex Valas eluxit in vena emulgente, ne obstatent reversioni sanguinis per venas ad circulationem, attamen reperiuntur satis cuitdentes.

*Circulatio nulla in Testibus.*

*Ibidem.* **R**iolanus demonstravit in responsione ad Valam nullo modo dari posse circulationem sanguinis à renibus ad testes.

*Ibidem.* Laudo refutationem opinionis Beuercusii de sanguificatione quadam facta in renibus.

*De Capsulis Atrabiliaribus.*

**H**uius nominis capsularum atrabiliarum autorem fateor esse Bartholinum, sed nomen est inane sine subiecto: Ac ne videatur absque ratione repudiata capsula atrabiliaris nomenclatura, usus: Rationes qualdam in mediis proferam. Ren infantis recens editi adipe circumiecto caret, eius vicem tenet corpusculum glandulosum, planum, superiori parti renis applicatū, adipi indurato persimile, figuræ renis æmulum. Ideoque paruus ren ab Eustachio nuncupatur, quamvis eius usum non exposuerit, in adultis hæc glandula adipi renali immersa oblitescit: Interdum tamen curiosè rimanti & inuestiganti supra renem adipi inculcata, iuxta diaphragma occurrit: Sed falsum est istam glandulam cauam esse, & in ista capsula biliarium humorem crassum, & excrementitium continere, qui à sanguine in Hepate, vel Liene, vel utraque confectio, nondum expurgatus fuit, ideoque à renibus in hunc locum refundi, dum per angustos renum meatus penetrare nequit, ibi asseruari & vinci, interdum reflueri in renes, & urinæ atro colore inficere. Multa falsa deprehendo in descriptione capsularum atrabiliarum. Appellat impropiè vasa, hoc nomine apud Anatomicos designantur canales, atque vasa hæc habent etiam vasa, venas & arterias, & nervos, magnitudo non semper æqualis in istis capsulis deprehenditur, si cavitatem habent, adeo exigua est, ut vix renis psum admittat, quo sine exigua portio humoris etiam atrabiliaris, eò secedit, & recipitur, eiecta ab Hepate & Liene, nonne potest sanguinis permissione mitigari, & edomari in istis locis, & transeundo per cauam, & emulgentes, in renes derivari absq. ullo diuerticulo, & ascensu, & iuxta diaphragma

Falsum est in adultis, sæperenibus respondere. Id tantùm in Foetu observatur, & in pueris vsque ad semestrem: verissimum est quod subiungit, *sæpe depressa sunt substantiæ inilar placentæ*: nec de suo filius addere debuiz retinere *causatam*. Verum est figuram habere quadratè oblongam, sed ista vasorum distributio vera est, & utilis in Foetu: ab emulgentibus venis & arteriis potest eò furculus deriuari: sed cum sint inutiles glandulæ istæ post partum, tanquam victæ & marcidæ hæcescunt, instar vasorum vmbilicalium. Filius de suo addidit, *in Foetu renes adæquare, forsân, quia humidiores temporis progressu aucta melancholia arctandæ, magnitudine naturalis uicem vomitum non superant*. Mirum est istas capsulas grandiores esse in Foetu: ergo non sunt destinatæ humori melancholico excipiendõ, *progressu ætatis aucta melancholia arctantur*, deberent esse ampliores ex affluxu melancholiæ, cuius prouentus vberior est in annos sequentes. Interim monebo à Medico impropiè melancholiam appellari, humorem melancholicum, est enim nomen morbi: ergo quò magis nostrum corpus crescit, eò magis decrescunt istæ capsulæ, *quæ sunt depressa instar placentæ, vel raro eandem figuram seruant*. Inde earum nulla necessitas deprehenditur in adultis, in Foetu & infanthulo edito, sunt magnæ, fermè æquales reni, & in adultis decrescunt, mutantque figuram, & arctiores euadunt. Adde quod in vitulis & agnis reperiuntur consimiles glandulæ, an ad excipiendam melancholiam in illis destinatæ erunt? Existimo excipere quandam succum adipi renali generando dicatum, quia in corpore infantis non generatur adeps, nisi postquam editus est in lucem. Gloriat̃ Bartholinus se verum inuenisse vsum, aliis Anatomicis incognitum, *recipiunt capsula humorem bilariam (debebat dicere atrabiliarium ex titulo) crassum, & excrementitium, qui à sanguine in Hepate vel Liene, vel utroque confecti, nondum expurgati sunt, ibique seruantur, & viciunt, quia per angustos renam meatus penetrare non potuit, ergo patentes & liberares via ad capsulas*. Quot verba, tot errores, si Lien destinatus sanguini crasso, fæculentõ, seu atrabillario asseruando, inutiles capsulæ illæ imaginariæ, vel sunt subsidariæ Lieni. Deberet igitur à Liene ad capsulas, viam & vasa demonstrare: nam ab emulgentibus interdum à rene ad ipsas atrabillarius humor refluit in venam superiorem, ut derivetur in capsulas, *quæ alæ deliramentum*. Si ibi cunctatur & effluit quotidie, tingere deberet vrinas nigro colore: non solet natura excrementa maligna tandiu seruare, nisi excreantur, ergo refluit in venas, aut recurrit ad Lienem per circulationem sanguinis ex *Hæmo & Valæ*: atque si sequeris opinionem *Valæ*, de vsu Lienis, inutiles erunt capsulæ atrabillariæ. Ego verò vsum eiusmodi glandularum perquirendum esse reor in Foetu: sunt enim glandulæ rotundæ, figurâ reni consimiles, succenturiati renuli dicuntur, qui adstant renibus nondum exactè formatis, & cum ipsis exactè communicant. Miror, cur Bartholinus filius Iconem eiusmodi capsularum non expresscit.

### An Valvula Vreteribus affixa.

Cap. 19. **F**alsum est, præter obliquam Vreterum insertionem ad vesicam apponi implantationi duas membrannulas transversas, instar valvularum, & folium, occludentes Vreteris introitum, ne vrina egredi queat. Nullæ ibi membrannulæ, atque in hoc contextu multa reprehendo: instar valvularum & folium: debebat dicere instar valvularum in foliis. Addit *occludentes Vreterum introitum, ne vrina egredi queat, an extra vel supra?* debebat dicere, ne vrina semel ingressa vesicam regredi queat.

### Vesica Vrinaria.

Cap. 20. **C**onnectitur fundus peritonæo, non vmbilico per Vrachum, & duas vmbilicales arterias. Ignoravit vesicam duplicato peritonæo inclusam in homine solo, atque sic suspensam & inuersam teneri instar lagenæ inuersæ propter firmam illam adhesionem cum peritonæo: nec satis erat dixisse initio capitis sitam esse vesicam, inter duas peritonæi tunicas, id clarius debebat exprimere, aut filius de suo addere:

*De Membranis Vesicæ.*

Ibidem. **V**esica duas habet membranas, & unum musculum circumvallantem totam vesicam, quem alij omnes Anatomici, excepto Aquapendente, tertiam eius membranam faciunt, non musculum. Non potest hæc membrana carnea musculus dici, alioquin ventriculus, intestina, & Vterus, quæ habent similem membranam carnosam, ut facilius dilatari & contrahi queant, haberent musculum orbicularem. Experimentum Valæ non valet in vivis canibus, puncta vesicæ, urina ad distans fluit, ac si per penem eiceretur. Ergo sanguis secta vena brachij ad distans flucns, haberet musculum expellentem.

Ibidem. Si vesica ab hypogastrica in viris arterias habet, cur in feminis à vasis Vteri ceruicem preteritis arterias repetis? Non alia sunt quam hypogastrica, & simili modo fabricata est vesica in muliere, ut in viro, excepta Vrethra, & situ, ratione Vteri.

*Deferentium Vasorum Spermaticorum nova divisio.*

Cap. **V**asa spermatica deferentia, scilicet vena & arteria iunguntur inter se per infinitas Anastomoses usque ad testes principium, postea caprularum virtum insistant deferantur. Talis vere plexus constitutus vocatur à nonnullis corpus vniuersum (qualis est Riolanus.) & statim esse parastatam eirsoidem pampiniforme & pyramidale filium de suo addit, quæ ita aliis distinguuntur, ubi primò ex angusto principio vasa preparantia in latiorum veluti basim se explicant pyramidalia dicuntur, ubi vero postea ante ingressum ad testes flagellorum instar vitis hinc inde crispantur, dicenda pampiniformia: novum est istud discrimen spermatici vas deferentis usque ad testem, cum tamen ex doctrina Galemi, Ruffi Ephesi dumtaxat, commiscetur & implicatur inter se venæ & arteriæ, & faciunt parastatam eirsoidem.

*Tunica Testis.*

Cap. **I**n recensendis tunicis testiculi erravit, cum erythroidem rubram, fibris carnosis donatam pro secunda enumerat, quæ priori statim intus obducitur. Cum tamen prima debuisset enumerari, quia erythroidei circumiecta, & à musculo cremastere propagatur.

*Epididymis.*

**I**n historia testium prætermisit Epididymida corpus superpositum testi secundum eius longitudinem, vel ignoravit, & existentiam eius corpusculi, atque usum, quod declaravi in mea Anatomia ex doctrina Galemi.

*Cremaster.*

Ibidem. **T**estis musculum habet, egreditur per processum peritonæi, & initio testis adnascitur. Imò ambir & involuit processum peritonæi, & cum ipso simul pertingit ad testem, ut processus peritonæi producit elytroidem tunicam, musculus verò cremaster erythroidem.

*Testium consensus cum Corde, unde?*

Ibidem. **M**aximus est testium consensus cum Corde. Videmus enim episthemata cordialis in virum defectu testibus applicata iuvare, ac si Cordi admoventur, quæ eius rei causa sit dictu difficile, inquit filius. Ego verò facilem inuenio, ratione circulationis sanguinis: nam in inguinibus continentur venæ & arteriæ crurales, vasa spermatica deferentia, descendunt in scrotum, & eiulantia supernè remcantia: Inde fit ille consensus testium cum Corde, & refrigeratio maxima.

*Vesicula Seminaria.*

Ibidem. **I**n vesiculis seminariis virulæ perpetua sedes, recentiorum observatione, Riolanus est Auctor, ut alterius articuli: Viri corrupti seminis totius vaporibus non ita crudeliter infestantur, ut mulieres, quia testes & vesiculæ semina extræ eorum peritonæi continentur, sepiusq. membraneo separantur, id est peritonæo.

*Vasa deferentia semen, siue ei culantia.*

Cap. D *uidit vasa deferentia semen, in principium, medium & finem. Principium*  
 23. *parastata vasa, quas dum describit, epididymida Galeni depingere vi-*  
*detur, subdit, Alij vasa preliari distinguunt, ut epididymides semen preparant, parastata*  
*ulterius perficiant. At epididymis distincta est, ex Galeno à parastata, nec sequitur e-*  
*ius actionem parastata, sed precedit. Medium vasorum ab isto corpuseulo vsque ad*  
*vesiculas seminarias extenditur, quæ quidem vesiculæ extremitatem vasorum defe-*  
*rentium definiunt. Sed non intelligit, quid sit parastata apud Galenum, & Medicos*  
*antiquos. Parastata enim est corpus varicosum ante testes positum, quod anrestat,*  
*constitutum ex vena & arteria spermatica, vbi rudimentum seminis acquirit materia*  
*seminalis. Multa in eo capite ex Riolo de prompta sunt suppreffo nomine.*

*Duplex Penis.*

Cap. Q *uidam aliquando Bononia dissectus duplicem penem habuit, id interpretan-*  
 24. *dum ratione duplicis canalis spermatici & vrinarij. Sed penem distin-*  
*ctum non credo, vel monstrum est.*

*Pori seminary intra Vrethram.*

Ibidem. I *ntra Vrethram iuxta illam verrucam naturalem discernentem foraminula va-*  
*forum deferentium, sunt alij pori, per quos elegantissimus humor è proflatis exitit.*  
*Interdum adest membrana inftar valvula circumtensa, ne semen ad orificium vesicae re-*  
*fluat. Id obseruatum à Riolo in pueris vsque ad vigesimum annum, modò gonor-*  
*rhæa non laborant, quæ erodit istam membranulam.*

*Nervosa ligamenta Penis.*

Ibidem. O *rtum nervosorum ligamentorum penis male describit, ex inferioribus par-*  
*tibus Osium pubis, cum à tubere Ischy oriantur, quod distat duobus digi-*  
*tis à priore loco. Ligamenta quæ describit ad summam Osium pubis, ex Riolo de-*  
*promptit, sed male describit, alterum quod ab una Osis Ily, repone Ischy, proutuberan-*  
*tia ad alteram porrigitur.*

*Penis Musculi.*

Ibidem. M *ale describit penis muscolum erigentem, educit ab appendice coxen-*  
*dicis, cum dicere deberet à tubere Ischy, id est, eodem loco à quo pro-*  
*dit, & nascitur nervosum corpus cauernosum constituens penem, & lateraliter cin-*  
*gens istud corpus ultra medium prorepat, si erigit penem, non potest flectere: secundum*  
*per musculorum penis dilatate Vrethram credit, cum expellat guttas seminis & vrinæ,*  
*nunquam vidit incisionem peritonæi ad extrahendum calculum, non enim scriberet*  
*inter istos duos musculos sectionem fieri. Nam operatores lineam attingerent scro-*  
*ti, quod vitant, imò supra muscolum secant suppositum habentes in vesicam intro-*  
*ductum, cathetere fenestratum, supra quem sectionem faciunt.*

Cap. 25. Trifida vas spermatici distributio in muliere ex Riolo decepta, sup-

presso nomine, ut quamplurima mutuatus est infalutato Authore.  
 Ibidem. Arterias in femina, quæ masculos pepererat defuisse memini, nescit  
 arterias hypogastricas locum tenere spermaticæ, & lineæ præcedenti, id dixisti ex  
 Arantio, & Riolo.



*De Vasis Spermaticis Mulieris.*

Cap. **S**cribis nullum adhuc authorem quippiam veri, publico scripto prodidisse de vasis deferentibus. Ego verò asseuero malè descripsisse. Nam per vasa deferentia, tubam Vteri, siue cornu deferibit ab Vteri fundo nati: nec perueniunt altera extremitate ad testes, aut ullam aliam partem: non sunt perua & occlusa, & caeca, ut sint inilar intellim cœci, & quasi appendix Vteri. Ista omnia sunt absurda, & omnino falsa, quæ filius addit, ex Riolo delumpfit, sed ea oculo non contingit, nisi concidentibus in sese similitus huius extremitatis, quæ laciniata est, tanquam a vermibus erosa. Si sunt à testibus omnino separata deferentia vasa, & ab Vtero ortum ducunt, quomodo possunt semen muliebri deducere? vbi generant semen? per quæ vasa deducitur ad Vterum? Per tenuissimas membranas alis vespertilionum similes saltem alligantur testibus, per quas venæ & arteriæ multæ disseminantur à testibus in hos meatus delatæ, & semen ex testibus huc transferentes. Scribis nunc semen muliebri per venas & arterias in hac vasa deferentia deferri: ergo non sunt vasa deferentia semen, sed tantum conceptacula, siue loculi conservandi seminis. Propterea non possunt esse cœci meatus, quoad figuram & substantiam deferentibus similes. Quid intelligat, nescit, & ego non possum percipere. Tenuissima membrana non sunt vespertilionum alis similes, sed ligamenta lata Vteri expansa potissimum in virginibus, & aliis, quæ nunquam Vtero gestantur, vespertilionum alæ expansas referunt. Qui veram descriptionem vasorum deferentium desiderat, comparet Riolanum cum Bartholino.

*De Tuba Vteri.*

Ibidem. **F**Allopium reprehendit, quod vasa deferentia sub nomine Tubarum descriperit. R: Cuius quam Bartholinus, atque vasa deferentia dici non debent, sed ciculantiæ, quemadmodum in viro, quia cum impetu semen ciculantur mulieres.

*Crassus Vterus in grauida Muliere paritura.*

Cap. **I**Neertus est Bartholinus filius pro more suo in recitandis opinionibus Anatomicorum, nec quidquam determinat, nunquam vidit mulieris grauidæ in partu, vel post vel ante partum mortuæ Vterum: nam absolucè affirmaret Vterum digito crassum, & meam opinionem confirmaret, reiecta Fallopij opinione, qui tenuiorem fieri credit Vteri substantiam, ut in dissecis grauidis obseruauit. Dicere maiorem grauidis.

Ibidem. Malè ligamentum rotundum expansum per membranam communem femoris musculum appellat.

Ibidem. Magna pars huius capitis ex Riolo deprompta suppresso nomine.

*Orificium Internum Vteri.*

Cap. **I**N partu orificium interius Vteri dilatatum à Gallicis obstetricibus vocatur, Couronnement de la mere. Imò dicitur puer peruenisse ad coronam, vbi caput edium protulit vique ad istud orificium ampliter dilatatum, sicque infans coronatus dicitur.

Cap. 10. Quæ scribit de vesse insertæ ad cervicem Vteri ex me delumpfit, sed nominare debbat Vrethram, de qua ista sunt intelligenda.

*De Hymene.*

Cap. **I**N historia hymenis multa de suo iure repetere potest Riolanus, ut in aliis capitibus partium genitalium mulieris.

Ibidem. Quæstio gravis est, an primo coitu regredi debeat sanguis in omnibus virginibus. Patet scripsit egredi, filius in duplici editioe regredi dixit. Nescio cur ita loquuntur.

Cap. 32. *Imperitū cunnus à lanceo, aut impressione forte dictus.*

Ibidem. *Quod scribis in fissa duo foramina diductis labris apparere.*

Ibidem. *Poteit sine lesa virginutis nota virgo concipere, quod frequens esse in Antartico solo Americus Vespugius reuult, & id y. modis fieri possumus concipere. Ne hoc Conceptum Saluatoris quidquam offisi, quam asserimus sine horum aliquo factam. Riolanus quod refertur ex Americi Vespugij relationibus, mulieres postmultiplices partus corpus integrum, & virginalē prae se ferre refutauit, & intelligendum de angustia istarum partium propter siccitatem corporum. Bartholinus filius asseuerat quinque modis virginem concipere sine lésione virginutis, quos debebat exponere: Ego verò vnicum modum rarum, & præter naturam concipio: Si hymen crassior leniter perforatus, non fuerit ruptus in congressu, intra labra Vteri, atque etiam alas iniectum maris semen potest exfugi & rapi à caulliente & famelico Vtero. Alter modus est, quem proposuit Bartholinus in quæstis Liceti, de muliere, ex se sola concipiente est impossibilis, & falsissimus: at hoc à Gazetario Parisiis promulgatum: licet illi impunè meriti, tanquam narrationem verarum & falsarum propolæ: nec recedè, sed improprie dicitur, non officere Saluatoris conceptioni. Nam sacratissima Virgo Maria nostrum Saluatorem concepit, Virgo ante conceptionem, & post: In partu & post partum inuolaua Virgo permanit. Nescio, an istam hæresim dèdiceris à patre tuo Theologiz Professore Regio.*

Ibidem. *Quod ridendo scripserat Riolanus, Italicè de virginibus in quadam provincia regni Neapolitani, quibus anno duodecimo ab aëre humidiorè disrumpi hymenem proditor, & nullas post hunc ætatist terminum reperiri virgines, Bartholinus filius, id tanquam verum recitat de virginibus Prayanis, vt accipit.*

### Clitoris.

Cap. 34. **C**litoris corpus habet ab Ossibus pubis ortum, ad coniunctionem cum Osse lib. 1. *Ischij. At circa ossum pubis coniunctionem, duo ligamenta spongiosa coniunguntur, & penis corpus constituunt. Hæc valde sunt obscura & falsa, nisi ita exponantur: clitoris ex duobus corporibus spongiosis ortum trahit, à tuberculis Ischij, distinctum habentibus, & circa ossum pubis coniunctionem contunguntur, penis quoque corpus constituunt. Nam Os Ischij subiectum est Ossi pubis, nec ligamenta orta ab Ossibus pubis descendunt ad Ossa Ischij, vt supèrnè remigrent.*

### Musculi Clitoridis.

Ibidem. **M**usculos clitoridis primus detexit, & descripsit Riolanus, ex quo fideliter exscripsit more suo, Bartholinus.

### Ordo Anatomicus.

Cap. 35. **Q**uia Bartholini patris institutum ordine conueniens omnia, qua sub cultellum Anatomicum veniunt exponere, de alis & labiis pudendi muliebris debebat tractare ante clitoridem, quia hæc non potest detegi, neque demonstrari perfecte, absque cultello Anatomico.

Ibidem. *Foramen inter has alas medium obseruauit Riolanus, alteram magna vima partem in virginibus æquare. Meam mentem non percipit, & corrupit.*

### Labiorum Substantia.

Ibidem. **F**allum est alarum pudendi substantiam esse glandulosam, quod recitat de inferna labiorum commissura, ex Rioloano deproptum.

*De Fœtu humano.*

Cap. 36. **Q**uoniam raræ sunt dissectiones cadaverum prægnantium mulierum, isthæc tractatio seorsim fieri debet. Attamen, quia Bartholini institutum est exponere omnia, quæ sub cultellum Anatomicum veniunt, quadam etiam proponenda sunt, quæ in Vtero mulieris grauida continentur, ut sunt Fœtus, cuius structura non adeo differt ab adulto homine, nisi quoad uniones vasorum Cordis. Imò Riolanus demonstravit proprio capite structuram Fœtus differre fermè in omnibus partibus adulti hominis.

*Membrana Fœtus.*

Ibidem. **M**embrana circa Fœtum humanum dua sunt, circa brutorum tres. Ergo tollit Allantoidem, & proinde Vrachum.

Ibidem. Quod scribit filius de Fœtu galeato ex Vtero prodeunte, ex Riolo de sumptum, & quod filius adiunxit de substantia, & forma placentæ.

*Vasa Umbilicalia Fœtus.*

Cap. 37. **V**ena umbilicalis venarum aliquot longitudine, ab Hepate usque ad Vteri placentam progreditur, in itinere vero infinitos ramos spargit per secundinam, vena umbilicalis non est longior arteriis. Ista longitudo non est adeo magna, siue Vnas Gallicas, siue Belgicas & Germanicas intelligat, dimidio breuiores Gallica. Nam Germanicæ vna longitudinem cum dimidia æquat etiam instante partu, quod scribit in itinere infinitos ramos spargere per placentam, id est impossibile: nam est inclusa membrana coriacea, & cum peruenit ad secundinam, est terminus itineris.

Ibidem. Filius addit, hæc quatuor vasa, dum ab umbilico ad placentam progrediuntur, inter se contorquentur, non aliter ac funiculus maior è minoribus confectus, quod factum est, ne flexuosis umbilicalium vasorum ductu sanguinis impederetur motus. Imò si flexuosus est umbilicalium vasorum ductus, & instar funiculi sunt conuoluta hæc vasa, magis impeditur sanguinis motus.

*De Mamma.*

Lib. 2. **I**n isto capite Riolanus multa agnoscit ex se deprompta, quia primus pro cap. 1. posuit, sed nescio, cur scripserit Hællerus, se duplicem in Vtero mammam hac reddentem vidisse, quod est falsissimum, cum papillam duplicem in utraque mamma viderit. Accusat Riolanum, quod scripserit conformationem mammae in viris nihil conferre ad tutelam Cordis cum dependeat à musculo pectorali, an ex papilla, maius habeat munimentum exminabis.

*Musculi Thoracis.*

Cap. 2. **O**bscure explicat Vesalij opinionem de musculis thoracis, quasi vellet internos & externos, qui motam habent contrariam, angustando thoracis munimentum sibi ferre auxilium, secus scripsit Vesalius.

Ibidem. Musculi intercostales arterias accipiunt ab intercostalibus utraque, nemo à sexto pari, ex filio, ipse nouerit nullam esse intercostalem arteriam, sed ex trunco Aortæ tot furculos utrimque suppeditari, quot sunt costæ & nervi spatia costarum perpertantes, sunt intercostales à foraminibus vertebrarum prodeuntes.

*Diaphragma.*

Cap. 3. **R**ellius Diaphragmatis initium statuitur in tota circumferentia, duabus suis appendiculis lumborum vericulis valde inferitur. Nisi benigna fuerit interpretatio huius loci, ex sequenti articulo, aliquis crederet originem esse in tota circumferentia costarum, finem in vertebra lumborum. Sed postea scribit centrum mem-

branosum esse loco tendinis, ad quem fibræ carnosæ à thoracis peripheria, tanquam ad centrum excurrunt.

*Ibidem.* Intra thoracem vestitur membrana à pleura, intra ventrem inferiorem membrana à peritonæo. Sed fallum, propriam quoque habere tunicam.

*Ibidem.* Quomodo diaphragmatis nervi in maxillarum & labiorum musculos transmittere possunt ramulos, non video cum oriuntur inter quartam & quintam vertebra collis, & partes illæ, quæ recipiunt ramulos istorum nervorum, sint externæ.

*Ibidem.* Nervi diaphragmatis sunt occulti, quia ex coniectura Hofmanni, externis illis parere non debuerunt, ne vita nostra nos effemus arbitri. Lædi potest diaphragma ex arbitrio nostro, & sine huius partis læsione, vita ex nostro arbitrio dependere, quod religio Christiana, & leges Politicæ vetant, quamvis impiè scripserit Plinius, hoc hominibus à diis concessum, quod à miseris, quando libuerit se libetare possint.

*Rebus in adversis facile est contemnere mortem,*

*Fortius ille facit, qui miser esse potest.*

*Ibidem.* Quia diaphragmatis nervi ramulis in maxillarum & labiorum musculos diuarcatis permiscuntur, hinc in percussione diaphragmatis, risus sardonius oritur. Galenus hunc risum Sardonium tribuit musculo lato, siue quadrato, quia ad labra peruenire credidit, si vera est distributio nervi quam describit, veram causam assignauit, sed video in castratione, amputato alterutro teste, istum risum Sardonium superuenire interdum, prænotium futuræ convulsiois lethiferæ.

*Ibidem.* Si in inspiratione tenditur diaphragma, in expiratione remittitur, motum habere contrarium musculis externis thoracis, ex ipsomet Bartholino, quia externi costas attollunt, & thoracem, constringunt, faciuntque ad expirationem.

*Ibid.* Opinio Falci de motu diaphragmatis, est ridicula, eodem quo explicatur à Bartholino, plicari carnosam partem circa appendices in valida inspiratione, & hac ratione diaphragma abbreviari amplius, & thoracem amplius elevatione costarum dilatari. Id ita fieri est impossibile.

### Mediastinum.

Cap. **F**allum est inter duplices membranas mediastini nullum adesse spatium, sed tantum effingi, dum sternum renellitur. Imò tantum est spatium, ut etiam Cor cum pericardio contineatur, & supra pericardium ea cavitates deprehenditur. Propter ea fallitur Falcobergius, & fallit Lectores Bartholomæus, qui talia scribit: Ista cavitates deprehenditur elevando sternum, utrimque resectis costis cartilaginosis.

### Pleura.

*Ibidem.* **P**leura nervos dabet duodecim à vertebra thoracis, ergo habet nervos differentes ab illis musculorum intercostalium, quos à sexto pari prodire, & propagari dixisti.

### An Mediastini cavitates aliqua?

*Ibidem.* **S**i nulla est cavitates inter duas Mediastini tunicas, quod nemo ante Falcobergium animadvertit. Cor postea addis, in hac duplicitate si vulnus antèrius inflictum penetraret, satis tutum est, & absque periculo, quod Anatomes imperitus lethale pronuntiaret. Certum est vulnus inflictum sternum penetrans supra quintam costam, non adeo lethale ac si supra sextam, vel inter illam & sequentem inflictum fuisset, quia subest pericardium affixum sterno quod vulneraretur.

*De Thymo.*

Ibidem. **T**hymus à similitudine thymi folij dicitur. Absurda est hæc originitio; & comparatio, disces ex Riolano capite de Thymo.

*\*De Aqua Pericardij.*

Cap. **Q**uidquid scribat Bartholinus, non potest excusare errorem patris, dum scimus, quod pericardio continetur, simile statui errori aqua permixto, qui continetur in thoracis cavitare, hinc latere Saluatoris aperto, sanguis & aqua effluxerunt. Ea in re imitatus est Laurentium, & ipse ex Rondeletio id mutuatus fuerat, & alij in eum lapidem turpiter impeerunt.

*De Cordis.*

Cap. **P**urima in hoc capite deprompta ex Riolano, notabit curiosus Lector.

Ibidem. *Basia Cordis* verè dicuntur extrema pars lateris, quæ vasa quatuor admittit. Non est suprema, nisi Cor transuersim situm fuerit, vel obliquè cono suo tangat eentrom nervæum diaphragmatis: Nam si conus feriret pectus, esset suprema pars, vt basis infima pars.

*De Frustulis & Officulo intra Cor.*

Ibidem. **R**arissimum est frustula quadam adiposa in utroque Cordis ventriculo reperiri. Id frequenter accidit, & frustula illa sunt adiposa, interdum carnea, interdum sanguini concreto simillima, pro vario humore per aduersionis gradus exsiccato & concreto. Officulum Cordis vidi in senibus, & in Regina Matre post obitum ad pollincturam aperto cadauere.

*De Vena Coronaria.*

Ibidem. **P**rudenter notat aduersus Licetum, tribus rationibus adductis, frustra coronariam venam destinatam esse transcolando sanguini ad sinistrum Cordis ventriculum.

Ibidem. *Fibras Cordis* quæ sunt adnexæ valvulis tricuspidibus ampliores, parvis pericardij deprehendit Veslingius, & per omnes calorem deferri suspicatur Alexander Benedictus. Id nondum obseruavi, alias curiosè indagaturus.

*De Nervis Cordis.*

Ibidem. **M**agna cohors neruorum, non est ad basim Cordis attenta, sed iuxta dorsum reperitur, ex permixtione neruorum stomachicorum, inde depromuntur nerui, qui in Cor & pulmones, & reliquas partes distribuuntur, quidni Cor potest esse musculus in sua specie, vt diaphragma, quod perpetuo mouetur?

*De Auriculis Cordis.*

Cap. 7. **S**i auricularum substantia peculiaris est, qualis nulla est in alia parte, non potest esse Cordis substantia attenuata & dilatata, neque valorum vicinorum dilatata substantia. Falsum est auriculam sinistram plures habere foveas, quam dextram, quia angusta est admodum, & fermè exsiccata: in Fœtu, & infantibus, sinistra auricula est latior dextra.

*De transcolatione sanguinis in Corde.*

*Ibidem.* **A** *E*firmas sibi demonstrata in septo auricularum foraminula, per qua sanguis à dextro in sinistrum ventriculum fertur, quomodo id fieri possit, non capio, cum sint duorum digitorum distantia disjunctæ auriculæ, sed debebat dicere, à vena Caua per anastomosim iuncta cum arteria venosa, si membrana obtusa foramini fuerit occlusa, in isto septo membranulæ, remanere foraminula, per quæ transire potest sanguis ab auricula dextra in sinistram, sed hæc sinistra auricula non est capax recipiendi sanguinem in adultis propter angustiam, & sæpe soliditatem. Probo quod de auricula dextra recitat ex *Valæ*, scilicet esse mensuram sanguinis, quam recepturus est ventriculus dexter Cordis. Vfus autem ille in auricula sinistra deficit, propter causas iam allatas, atque credo istam mensuram ampliorem, quàm par sit.

*Ibidem.* De duplicitate vel triplicitate ventriculorum Cordis, amplè tractavi in mea *Anthropographia*, & alibi.

*Ibidem.* *Fauet Bartholinus translationi sanguinis per septum Cordis contra doctrinam Valæ*, multis in locis huius capitis, cum agit de vsu ventriculi dextri, & de vsu septi Cordis.

*De Arteria Venosa.*

*Ibidem.* **D** Vbitare licet, si pulsum habeat arteria venosa, quia continenter fluit sanguis, qui non est arteriosus, nec habet substantiam arteriæ: existimat non suo & proprio, sed motu Cordis agitari, vel etiam vena Caua à iugulo vsque ad Hepar vibratur cum Cordis motu.

*Iterum de Transcolatione Sanguinis.*

*Cap.* **S** *I* Folius in omnibus istum ductum, sine canalem Anastomosin venæ arteriosæ cum aorta, arbitratur apertum & peritum, insigniter errauit. Nam tæpe paulò post partum exciseatur, & si fluere sanguis per istum canalem non posset intrare per aortam in sinistrum ventriculum, quia obstarent valuulæ sigmoides. & impetuosa sanguinis atteriosi ei aculatio. Ideoque *Bartholinus* confundit istam Anastomosim cum altera Cauæ iunctæ cum arteria venosa, per quam fieri posse sanguinis translationem existimo, & ante Folium in Latina & Gallica editione mea *Anthropographia* annotaueram: atque figura duplex ex *Falso* desumpta, excusat ipsum ab errore insigni, quem illi imputat *Bartholinus*, atque etiam imponit *Bosello*, qui describit eum *Folio* primam Anastomosim, quæ à dextro ventriculo fertur in sinistrum.

*Pulmo.*

*Cap.* **M** Embrana cingitur pulmo tenui, laui, poris multis insignita, qui pori inflato pulmone solibus, satis conspicui, quos aliquoties *Iohannes Valæ* pisi magnitudinis in videram dissectione obseruauit, hinc sanies thoracis penetrare potest, & per eum exire. Hoc si verum, quidni sanguis effusus in pulmone, exstillabit in thoracis capacitatem, in violentis motibus pulmonum? hæc non fauent transitioni sanguinis per pulmone ad circulationem.

*Ibidem.* *Nervos plurimos assignat pulmone Riolanus, nescio quàm bene.* Certum est ex stomachicis duobus neruulis quamplures adire pulmone, non ad motum, sed ad sensum, atque sensilis est dolor pulmonum inflammatorius, non acutus, propter molitiem & fungositatem parenchymatis.

*Ibidem.* De motu pulmonum eleganter disserere *Pater & Filius, quæ laudo*, quamvis ista quæstio sit disputabilis in utramque partem, ad Scholam remitto.

*An potus portiuncula ad Pulmones suas?*

Cap. **S**i verum est potus aliquam portiunculam decurrere in pulmones, & perlabi posse guttam aliquam ad pericardium probabile sit, ab experimento factis a lasolino, qui in dissecto cadavere cum inieisset pericardium adeo humore distentum, ut expresso aliquid humoris per Os efflueret. Quæto, an tutum in suspitione, vel certa coniectura pericardij multo sero distenti, & pressocantis tentare blandum emeticum, nam violentum Cor suffocaret, ut thorax agitur cum pulmonibus, per eos, vel resorbatur serum, vel excutiat in pulmones, ut per eas vias quas subiit remigret. Scio Hippocratem in asthma, & aliis affectionibus pulmonum vomitum consuluisse.

*Musculi Laryngis.*

Cap. **C**ommunes laryngis musculi sunt, qui in laryngem implantantur, ab ea tamen non oriuntur. Ergo usus est communis, non particularis: communis est, quia totum laryngem ex quinque cartilaginibus compactum movent, in deglutitione, ascensu & descensu laryngis atque hæc est ipsorum actio propria.

Ibidem. *Sternothyroides per veteribus dictum.* Si per veteres intelligit *Sylvium*, admitto, si *Galenum*, vel alios Græcos, pernego.

Ibidem. *Usus est rimam laryngis coarctare, dum scutiformem detrahit.* Verum est ipsius officium, sed nullo modo potest deprimendo cartilaginem thyroideam coarctare glottida.

Ibidem. *Hyothyroides rimam dilatat, dum scutiformem attollit, imò debet contringere.* At hoc præstare non potest, quia nulli cartilagini est adductus iste musculus, sed totum laryngem attollit.

Ibidem. *Ex propriis musculis primum per potius Thyrocriceides appellandum, quam Cricothyroides, ut alij Anatomici volunt, intelligit Ruianum, at filius adiunxit cricoideam, sine innominatam cartilaginem basim esse reliquarum, & immobilem.* Ergo musculus in larynge oritur à parte mobili, nempe thyroide, & inseritur in cricoideam immobilem, ex *Barbolineo*.

Ib. *Omnes musculi laryngis proprii destinantur rimæ, ex Bartholino, vel glottidi cartilagini.* Ergo inferiunt, vel contringendæ, vel dilatandæ glottidi. Attamen alij sunt dicati thyroide dilatandæ vel contringendæ: Alij arytenoidi aperiendæ vel claudendæ: Alij glottidi cartilagini sunt peculiares, quia dilatatio & contractio dependet à thyroide, ut apertio & clausio ab arytenoide. Quapropter inscienter admodum Pater, & Filius, musculos proponunt.

*Sinus duplex iuxta Glottidem.*

Ibidem. **A**notandus est sinus, qui formatur inter guttalem & scrutalem, à membranis cartilagineis colligantibus, &c. Sinus ille existat ab utroque latere, & situs est inter glottida, & arytenoidem.

*De Glottide.*

Ibidem. **N**on quivis sonus est sed qui in glottide. Sonus articulatus vox est, & formatur in glottide qui articulatio est, & sermonem exprimit in ore: formatur à variis partibus, lingua, gargarone, dentibus, labiis.

*De Vesiculis Amygdalarum.*

Ibidem. **A**mygdale adhas sibi habent duas vesiculas candidas, quæ à glandulis serum recipiunt, & in Os eructant. Non reperiuntur in homine, nescio an in brutis tales apparent. Sunt quidem membranæ ligamentosæ ad Vaula ad amygdalas protensæ, de quibus egi in mea Anatomia.

*Oesophagus.*

Cap. 12. **O**esophagus venas habet à carotario ramo Porta, nequaquam ab isto ramo, sed ab azygo, & intercostali, vt notat *Filius*. Habet membranam externam à pleura quandiu aluco thoracis continetur, corpus ventriculi intra ventrem à peritonæo, inepta sunt, & omnino falsa, quæ scribit de *musculis oesophagi*, & de *quarto musculo*, in quo omnes Anatomici errarunt, nam nullus à mento oritur.

*De Collo.*

Cap. 13. **I**n hoc capite quædam ex *Riolano* deprompsit, quia primus inter Anatomicos proposuit, quamuis ex aliis Authoribus traducta.

*Figura Capitis.*

Lib. 3. Cap. 1. **C**aput est sphericum, sed simul compressum & oblongum. Addere debebat compressum ad latera, medulla in spina existens non potest esse, pars contenta caluæ.

*Pili.*

*Ibidem.* **Q**uadrangulares esse pilos docuit *Spigelius*, non *Bartholinus*, cauos esse ante monuerat *Rulandus*.

*Productio Pericranij.*

Cap. 2. **P**robatio producti pericranij à dura meninge ex *Riolano* deprompta est, & ridiculus *Laurembergius*, qui id pernegat.

*Ibidem.* An Cerebri substantia moueatur, vel dura meninx, licet dubitare, super ea re meam sententiam aperui.

*Ibidem.* Sed de motu Cerebri. Laudo iudicium *Bartholini Filij*.

*Meninx Crassa.*

*Ibidem.* **C**rassa meninx non quadruplicatur, vbi Cerebrum à cerebello distinguit, neque duplicatur in vertice, vt demonstravi in *Anthropographia*, capite de Cerebro.

*Sinus dura Meningis.*

*Ibidem.* **C**um agitur de sinibus, male tertium sinum venam à *Galeno* nominari scribit, ex *Riolano* id mutuatus est, demonstrauit principium esse membranosum, plexus choroidis, qui implet canalem, siue sinum quartum, cum sit intextus, instar plexus, choroides dicitur, & in ventriculos omnes expanditur, à *Galeno* nominatur magna vena. Torcular non est in concursu trium sinuum, sed in tertio sinu longitudinali cum *Galeno* constituendum, quia distribuit sanguinem in omnes partes Cerebri & cerebelli.

*Ib.* Falsum est horum sinuum communem concursum nullum esse, nam ad principium quarti sinus coeunt inter se, & tu fateris quartum sinum oriri, in concursu trium sinuum priorum.

*Ib.* Nuda sunt quæ subiungis de aliis sinibus tribus, quos tamen non semper offendisti, sunt tantum coherentiæ ipsius duplicati Cerebri, interuentu tenuis meningis, maioribus subternuntur.

*Ib.* Quæ pro venis à sinibus ortis habita sunt hæcenus vasa per Cerebrum distributa, nos docuit dirigens eorum ad sinus usque persequutio nostra secandi modo. Itaque usus sinuum est continere sanguinem utrumque à venis & arteriis sibi continuis acceptum. Ex hoc discursu colligo venas non intrare sinus, quia quæ à sinibus vasa per Cerebrum distribuitur, sunt arteriæ, & tamen fateris venas & arterias sibi continuas effundere suum sanguinem in sinus. Rectius dixisses ex plexu mirabili carotidum ad basim Cerebri, arterio-las propaggines carotidum per duram membranam ascendere ad sinus, siue sanguinibus illos duræ meningis: venas autem iugulares terminari in principio laterali sinuum sinuum, siue sanguinem vehant ad Cerebrum, siue reuehant.



*Pulsus Canalium dura Meningis.*

Ibidem. **M**iror quomodo Valrus in Cerebris viscerum animalium dissectis, & cranij fracturis nunquam potuit observare pulsum in istis canalibus, cum sit evidens in fracturis calvariz, & in iis, quibus trepano aperitur cranium. Si vera esset opinio Valai, sola dura meninx pullum haberet, nec credidit, aut admittere voluit pulsum in istis canalibus, propter confusionem sanguinis venosi, & arteriosi, ex tua opinione, si canales inter se non communicent, quomodo recursum & deliceum sanguinis habere potest in iugulares.

*De Calamo Scriptorio quarti Ventriculi.*

Cap. **I**n parte globosa medulla spinalis instat caudicis cuiusdam, inscriptus est calamus  
3. Scriptorius, vel quartus quibusdam ductus ventriculus, in quo nos statuimus veram esse animalis spiritus generationem. Nugaris dum hæc scribis, calamus scriptorius non est instar thecæ, sed est fissura dirimens truncum spinalis medullæ in duas partes, quæ fissu est similis fissuræ aptati calami ad scribendum. In hoc quarto ventriculo, qui reconditus est intra cerebellum, est receptaculum spirituum, qui diffunduntur in spinalem medullam, & in omnes nervos Cerebri & spinalis medullæ abeunt.

*De Fissura Cerebri.*

Ibidem. **Q**ua scribis de anfractuosa Cerebri fissura falsa sunt, sed nescis Cerebrum per falcem dividi usque ad corpus callosum in duas partes, & parte anteriore circa frontem separatum esse, & parte postica supra cerebellum, ita ut pars illa extima Cerebri calloso corpori incumbens possit facile adimi, trium digitorum crassitie. Cohæret tantum ad medium Cerebri eminentiis istis magnis, quæ radices anteriores spinalis medullæ constituunt.

Ibidem. Nervi nulli per Cerebrum disseminantur, ideo sensus expertus est omnis, quomodo sentis dolorem, ut dixisti supra, nisi ratione meningum.

*Motus Cerebri.*

Ibidem. **C**erebrum naturalem habet motum, enimque perpetuum dilatationis & constrictionis. At supra filius decrevit, ex opinione Valai non moveri, quia eius substantia mollis, & flaccida, ad motum ineptia existit: dicerem tantum moveri, dum attollitur & amplificatur, vel subsidet, sed non pari passu, ut arteriæ Cerebri, moles illa Cerebri respondet motui pulmonum, ut arteriæ Cerebri Cordi.

*De Sede, & receptaculo Spirituum.*

Ibidem. **P**rimus in Cerebro propriè dicto, vel cortice, in medulla verò tota, tam quoad caput, quam quoad caudam reservari spiritum pro motu, ergo nervi motorij distincti à sensorijs, & duplex spiritus sensorius & motorius, si spiritus sit in cortice, sine ambiguo Cerebri, quomodo fluere potest ad spinalem medullam, quæ tota suppeditat nervos Cerebro, totique corpori, ac proinde omnis spiritus animalis eò debet confluere. Idem nervus sensum & motum defert.

*An principia motus & sensus distincta?*

Cap. **V**t probeat Cerebrum plus conferre ad sensum, medullam ad motum, ad-  
4. fert exemplum constitutionis Cerebri, & spinalis medullæ in piscibus. Sed hoc destruitur ex allegatis supra, atque ex eius sententia. Verum erit durius ad motum, Mollius ad sensum corpus conferre. Ergo nervi dividi debent in duros & molles, & à diversis locis oriri: At nullos à Cerebro dixisti oriri, sed omnes à cerebello.

*Rursus de Calamo Scriptorio.*

Ibidem. **V**idetur quoddammodo emendare, quod supra scriptis de quarto ventriculo, qui calamus scriptorius à nonnullis dicitur, quia in macronem exacutus, sed non satisfact. Si velit explicationem ampliozem calami scriptorij, legat Scholia Ioannis Casij Britannij, in libros administr. Anatom. Galeni.

Ibidem. Non potest in hoc quarto ventriculo generari & elaborari spiritus animalis, cum sit exordium spinalis medullæ, probabilius est iam elaboratum spiritum animale in plexu retiformi, & Ventriculis eò deferri.

*Iterum de Preparatione spiritus Animalis.*

Ibidem. **N**ostra ergo sententia est spiritum animale preparari in rete mirabili, & magis adhuc in plexu retiformi generari, & elaborari in hac medulla oblongata cantate siue ventriculo nobili, postea vero conservari & retineri in toto Cerebro tanquam promptuario. Quot verba, rot errores Rete mirabile differt à plexu retiformi, in quo magis preparari feribit, potestne generari & elaborari in hac medullæ oblongatæ cavitare sine distributione in spinalem medullam, si ab ea omnes nervi oriantur nullo excepto? Cur vis ab isto loco resuere in totum Cerebrum spiritum animale, ibique conservari & retineri tanquam in promptuario? Si à Cerebro nulli nervi oriantur, debet redire ille spiritus ad spinalem medullam.

*De Cerebello.*

Cap. **Q**ua scribit de mirabili Cerebelli structura, quod ex plurimâ laminâ sibi innicem superentis, inter quas vascula, siue sint venulæ, aut arteriola implexa tenui membris excutunt. Id nondum à me observatum, nec ausum refellere, accuratius examinaturus in recenti capite humano detruncato.

*De Rete Mirabili.*

Cap. **C**onstat rete mirabile ex arteriâ Carotidibus à Corde sursum elatis ad basim Cerebri, & ex venarum iugularium ramulis, ut deprehendit Valzrus, quæ sanguinem & spiritum vitalem in hoc rete deferunt. Ergo contra doctrinam circulationis venarum iugularium ramuli perveniunt ad texturam plexus mirabilis, quia totus est arteriosus, & talis debet esse, & prorsus inutiles venæ quæ dicatæ sunt reuocando sanguini arterioso, non aduchendo.

*De Glandula & Choana.*

Ibidem. **E**xcrementa, glandula modo in palatum eiciit, modo defluere sinit per basia cranij foramina. Nescit infundibuli quatuor esse canaliculos, siue tubulos, qui pituitam vel serum pituitosum destillant per quatuor foramina acumbentia, siue adiacentia sellæ sphenoidæ, atque sic pituita supra palatum defluit in eo interstitio, siue lacuna, quæ Osse vomeris separatur in duas cavitates.

*De Figura Ventriculorum anteriorum.*

Ibidem. **V**entriculi anteriores Lunæ falcatæ non male assimilantur, quamvis tales nunquam inter discendum demonstrantur, forsân in Leidenâ Academia, sed in Academia Parisiensi, & Lunæ crescenti similes, vel solez equi.

Ibidem. Antea proposuit quatuor ventriculos Cerebri, nunc prius esse unicum Cerebri ventriculum, excipiendis liquidis excrementis destinatum, si sectio fiat more Valsely.

*De Plexu Choroidæ.*

Ibidem. **P**lexus choroides vel reticularis dictus ex venâ & arteriâ tenuissimâ contextus, missus partim ab arteriâ, partim ex vâsî sinu, quarî dura matris. Remitto Bartholinam ad Galenum, vt intelligat, quid sit vena magna, quæ constituit plexum choroidem. Quæ confusio vasorum, arteriæ & venæ simul mixtæ & derioatæ à sinu quarto intexunt istum plexum choroidem, qui malè reticularis dicitur, atque nullam habet communionem cum rete mirabili, quod est ad basim Cerebri collocatum.

*Iterum de plexu Choroidæ.*

Ibid. **F**alsum est plexum choroidem ex venâ & arteriâ contextum esse, atque glandulosum, & usum habere rei mirabilis, vt demonstravi variis in locis.

Ibidem. Ventriculos non esse conceptacula excrementorum iam copiosè docui in mea *Anthropographia*, & in *Encheiridæ* contra Hofmannam.

*Obliqui Musculi Oculi.*

Cap. **I** mperitè describit musculos obliquos oculi, quia obliquum minorem iuxta 8. *Iridem infari scribit.* At Iris est profundissime locata intra oculum: malè etiam scribit inter oculos & tendines situm esse, melius originem debebat exprimere. Quod spectat ad obliquum maiorem, scribit à recto angulo ascendere ad eum locum, vbi quintus inferebatur. At obliquus minor ascendens inferitur supra angulum externum iuxta Iridem. Videat Filius, si ascendat ad eum locum obliquus maior, trochlearis cartilago primum inuenta à *Rondeletio*, non *Fallopio*, erant tamen contemporanei, alter *Paracelsus*, alter *Monjessuli* docebat.

*De Motu Vneæ.*

Ibidem. **V**neæ immobilis est, & pro diversitate obiecti & luminis contrahitur, & dilatatur. Non vneæ mobilis est, sed eius extremitas quæ pupillam constituit, in quibusdam mouetur, & iste ambitus pupillæ membrana est separata, de qua abundè dixi in mea *Anthropographia*.

Ibid. Quia vero vneæ tunica varios colores habet, hinc oritur Iris, vel circulus, qui variè conspiciunt coloribus pradius. Nescit, quid sit Iris, limbus est pupillæ variegatus, diuerficolor in diuersis hominibus, cui attextus est circulus ciliaris.

*De Humore CrySTALLINO.*

Ibidem. **H**umor crystallinus habet superficiem suam exsiccatam pro tunica, si talis sit intra oculum, si liquidus, tunicam habet prætenuem. Si amphiblastroides humorem vitream reticuli instar ambus, frustra addis tunicam vitream, quæ vitreum humorem vestit, & à crystallino separat.

Ibidem. Vtus crystallini humoris & vitrei, quos proponit ex *Sebænero* & *Valæ* sunt elegantes, si veri, dependent ex obseruatione facili in oculis bubulis, & humanis, quod expendam, & admirabor si verum deprehenderim.

*Musculi Auris.*

Cap. **M**usculos auris belluinæ describit, non humanæ, vide meam *Anthropographiam*.

*De Canaliculo ab Aure in Os.*

Ibidem. **N**otandum est quidam ductus exiguus, cartilagineus, ab aure ad palatum abiens valvula donatus: Certum est è concha, secunda auris cavitate, istum canalem à *Fallope* descriptum, ad fauces ire iuxta latera apophysis pterygoideæ, ut per eum sordes auris internæ effluent, aer quoque paucus & purus recipiatur, hinc auribus capias spirare, id est aërem trahere in Cerebrum existimavit *Alcmeon*, & per eum canaliculum surdi per accidens audiunt, si in Os loquaris, propterea que valvula inutilis, nec unquam vidit *Barbolinus*. Atque fateor per eum canalem fumum Nicotianæ ore haustum effluere, si per aures emittant, ut vidi.

*De causa nativæ surditatis.*

Ibidem. **S**i causa surditatis nativæ ab ortu, sit membrana altera crassa ipsi tympano agglutinata, impossibilis est operatio quam proponit *Paulus Ægineta*, promptius & securius foret auxilium, tentare ruptionem tympani, forsitan, si non acutè, saltem obsecrè audirent.

*Musculi Nasi.*

Cap. **P**ures musculos nasi describit, quàm convenit: Compara mea *Anthyro*. *pographia* capiti de musculis nasi, cum isto capite, & agnosces errorem.

*Musculi Labiorum.*

Cap. **A**liud par carnosum gracile, teres, à cavitate mali subicella ortum & insertum, ubi labia conveniunt, hoc par deorsum movet. Ratione originis & insertionis potius sursum trahit, quàm deorsum, & sequentibus verbis addis, *disti omnes musculi superius labium movent*.

Ibidem. Mali describitur musculus labiorum, nam labio superho nullum assignas, neque labio inferno attollendo.

Ibidem. Musculos maxillæ satis accuratè describit, præeunte *Riolano*.

Ibidem. Alij pro alio per agnoscunt partem quadratam ad mentum infixi. Hoc verum ex *Riolano* est, musculus latissimæ portio, quæ affixa basi maxillæ inferioris, ipsam deorsum trahit:

*De Vuula.*

Cap. **F**alsum est *Riolanum* scripsisse vuulam formari à musculis ibi desinentibus, & quæ filius adiunxit, ex *Riolano* desumpta sunt suppresso nomine, atque certum est ipsam vuulam ad vocis elegantiam, & modulationem confectæ.

*Os Hyoides.*

Ibidem. **F**alsum est ex tredecim ossiculis constare os hyoides, ne quidem in puerulis talis numerus reperitur.

Ibidem. Quæ de musculis hyoidis ossis scripta sunt, iure repetere potest *Riolanus*; accuratius descripta, quàm ab alijs Anatomicis.

*Musculi Lingua.*

Cap. **M**ale tribuit decem musculos lingua, & octo ossi hyoidi, si velit, emendabit 13. istum numerum, ex *Riolano*:

*De Arteria Subclauia.*

Lib. 4. **F** Alsum est truncum arterie subclauium dextrum, sinistro ampliotem cap. 1. esse.

*Musculi Brachij.*

Cap. **C** Vm agit de musculis brachij describis nouum musculum, quem appellat perforatum: Ego verò coracoidcum, quia otit ab apophysi coracoidè, vtilem esse dixi ad brachium scapula processu adducendum. Pro certo affirmarem Bartholinum nescire quid scribat, nec possum intelligere istam vtilitatem perforati musculi, nam brachium antrorsum trahit supra pectus. Addit hunc musculum, alij saltem musculofam portionem vocarunt, debebat, declarare cuius musculi sit portio, enunniabo bicipitis musculi, neruose & firmiter adhærens brachio. ideo pro musculo separato sumitur. Vtilitas absurda & impossibilis, lege processui.

*Musculi Scapula.*

Cap. **M** Vlt mutatur in hoc capite ex Riolano, sed dum explicat Trapezium musculum, male scripsit scapulam mouere sursum, obliquè, deorsum, & rectè ad dorsum. Reprehendo, quod obliquè dixerit moueri scapulam, quod est impossibile. Leuator musculos non antrorsum trahit, sed scapulam artollit, & eleuat, non explicat musculos scapulam deorsum trahentes, nec vllum assignat.

*De Musculo Subclauio.*

Cap. **M** Vsculus subclauis non potest primam costam sursum & extrorsum trahere: 4. **S** pigelius inquit claviculam deorsum trahere. Sed hoc impossibile, cum suis duobus extremis clavicula fitmiter sit adnexa, vt motum non habeat, nisi cum scapula per se sola non mouetur.

*De Sacrolumbo.*

Ibidem. **A** D quem vsus sacrolumbus sit destinatus non explicat. Forlan, quia non putat separari posse à longissimo dursi musculo, cum ramen sit laticilis separatio perito Anatomico.

*Motus Capitis.*

Cap. **M** Alè explicat motus capitis, dum supra secundam vertebram antrorsum & retrorsum flexi scribit. Supra primam veluti axim circumduci, contrarium dicere debuerat.

Ibidem. Male describit obliquos musculos capitis, atque etiam reliquos eiusdem partis.

*Musculi Dorsi.*

Cap. **M** Alè musculos dorsi describit, & sequitur errorem Laurentij & Bauhini, 7. atque prætermisit musculos lumborum, vel ignorauit.

*Ordo dissectionis ignoratus.*

Cap. **I** Sta monitio ad Lectorem inutilis est, & malè ibi applicata, & non intelligit. 8. quod scribit, nec ordinem sectionis, & demonstrationis, atque multa ex Riolano mutauit esse.

*Musculi Cubiti.*

Ibidem. **D** Escribit ex Casserio in posteriori parte articulationis cubiti duos musculos paruos, quos non puto exstare, nec vnquam vidi. Nisi intelligat quadratum musculum, & rotundum minorem, qui inseruiunt reuolutioni ra-

## Animad. in Caspari Bartholini Anatom. 787

dij ad pronam figuram. Subticere debebat *Cassery* opinionem nisi clarius exponeret. Quintus musculus cubiti quem tribuit *Casserna* est *Angoneus*, sic à me dictus, qui portio est brachii externi, interdum separatus est, & responderet popliteo, ut seruetur manus, & pedis æqualitas.

### *Musculi Femoris.*

Cap. E Rrauit in describendis muscularis femoris, qui abducunt & circumagunt 11. femur, more aliorum Anatomicorum, & in describenda insertione triapitis musculi, qui prope poplitem inferitur, vel lineæ asperæ, ad minorem rotatorem, sunt duæ extremitates Ossis femoris oppositæ: liuidum musculum aliqui addunt, solus *Riolanus*, qui pectineum à situ nominauit.

### *Musculi Tibiæ.*

Cap. M Alè describit musculos tibiæ, qui à tubere Ischij nascuntur: nec intelligo, quomodo muscoli anteriores tibiæ amplexantes molam, ibique genu pro ligamento est. Debebat dicere istum tendonem inferuire genui pro ligamento, vel ante genu addere in Errauit cum *Syluius*, sed posthumus est labor, *Isagoge Anatomica*, vel error Typographiæ.

Multa pater *Bartholinus* ex *Riolano* desumpit in descriptione muscularum, additiones Filius ex eodem *Riolano* mutuatus est, suppressio nominat *Riolani*.

### *Quis Author Circulationis?*

Lib. de Venis P Aulus Seruus Venetus, valuulas indicauit *Fabricio Aquapendentis*, cap. 2. & circulationis Author est: hanc Iniquiam *Harnes* factam iniustam esse demonstrauit, animaduersionibus in epistolas *Valerii*.

### *De Valuulis Vena iugularis internæ.*

Ibidem. R Eperiuntur in orificio vena iugularis bina valuula, superne deorsum spectantes. Cum sint duæ iugulares interna & externa, qualem intelligat explicare debebat. Dico internam esse iugularem, quia iugularis externa caret valuula, atque hanc valuulam primus inuenit *Riolanus*, aliis indicatam & incognitam.

Ibidem. In arteriis nullæ sunt valuulæ: Verum est, sed in carotidibus intra foramen caluarie ingressus ipsarum est obliquus, & ibi apposita officula duo, quæ constringunt arteriam, ne affatim sanguis ingrediatur.

### *An Nervi Cauti?*

Libello 3. de D Vm examinat, an nervi sint caui, adducit *Riolanum* patrem, qui Neruis cap. 1. nervos omnes solidos credidit, exceptis, nervis pudendi mansisse cauis, qua veritate ipse viderit, ut insultet patri meo istud protulit, Parens meus à quadraginta duobus annis denatus videre non potest, ipse videbo. Loquutus est *Riolanus*, more *Galenii*, qui ligamenta caua pudendi nervos cauos appellat: non considerauit structuram eiusmodi neruorum & originem, neque gloriam rei Anatomice affert, & in suis Institutionibus Medicis prætermisit partem Anatomicam, quam mihi reliquit exornandam.

### *An in Aure quartum Ossiculum?*

Lib. 4. Q Vartum Os auditus inuenit, nobisque monstrauit *Franciscus Syluius* rotundum, exiguum, *Nicolao Fontano* squammæ piscis lapi simile, ilapedis, qua incudi committitur per commune ligamentum ad latus annexum. In vitulinis capitibus potius reperitur quàm in homine. Id nondum vidi, sed occasionem dabis diligentius inuestigare in auribus vitulinis & humanis.

*De quibusdam ligamentis Ossium.*

Lib. 4. de Ossibus. **M** *Alibi describitur ligamenta, quæ Ossibus inter se nectunt, cum natus, cap. 16. la sine, sed tantum interuentu cartilaginis vniantur inter se, atque etiam Ossis Sacri ligamenta, quæ ipsum cum Ossibus nectunt, cum ista connexio fiat interuentu crassæ cartilaginis. Non diffiteor tamen ab vno Ossis llium ad aliud transuersum esse ligamentum, quod sustinet intestinum rectum, & musculos leuatores Ani.*

Si Filius offendatur, quod in præfationis examine dixetlm, *Filium retinuisse barbarissimos, nedum solacissimos patris*, nunc publicam facio declarationem, istos errores vicio Typographiæ irrepsisse, licet in omnibus editionibus expressi fuerint, quia in eoq. ita omitti, nec animaduersi, & crediderunt valibus in plurali recte dici, quia bis repetitum. Patris elegantem scribendi dictionem attestatur antiqua præfatio, quam retinui propter elegantiam orationis, quæ istos defectus reparat, & sinceram de suo labore confessionem.

F I N I S.





# A N I M A D V E R S I O N E S I N C A S P A R I H O F M A N N I A N A T O M I C A S V I S I N S T I T V T I O N I B V S I N S E R T A.



**A**TRIENNIO Hofmannus Institutiones Medicae emisit in lucem coactas, postquam vidit non sine lacrymis, quam male consuleretur nostris adolescentibus. In his vera & utilia continentur, quibus perlectis, addo & bene intellectis, spondet fide sua, progressus secundos Deo, & proximo amantibus: Magna est hac operis sui fiducia, sed tanto fastu & arrogantia. carpit Authores Medicos septem, quas selegit castigandos, tanquam ignavos, imperitos, ut viris doctis & probis displicant eius Institutiones Medicae, nec pepercit Fernelio, quem Schola venerant omnes, & agnoscunt à Galeno secundum,

---cui Phoebi chorus assurrexerat omnis.

Ego, inquit, hoc ago, ut nauseam illis creem, ad mentionem hominis immeritissimè tanti. Passim ipsum surgebat, & insulte ac iniuriose reprehendit: Scripsit Hofmannus, notas absurdas & erroneas, adversus libros Fernelij, universae Medicinae, cum Praefatione ad Lectorem temeraria & insolenti, qua hominis rabiem & insaniam manifestè declarat: Ipsum enim Fernelium adeo contemnit: ut ne quidem in censu habeat, illorum Medicorum contra quos disputavit, obiter in suis Institutionibus: ideoque reponendam esse censet inter eos, qui famam habent, nec merentur. Adducit duos adimplatores Alexandrum Massarium, alienae laudis invidum, Italem ex suis scriptis mediocriter eruditum: alterum Schribium suum praecceptorem per septennium, qui quantum fuerit Medicus & Philosophus, ex eius disputationibus Philosophicis, & Medicis satis intelligitur, quorum indicia cum Hofmanno, ut doctus in Medicina versatus floccifaciet: indicium Crasovii istis duobus longè praevalens, qui nunquam praefationes libris proposuit, nisi laudatissimis, quales fuerint, Fernelij opera, Scaligeri exercitationes contra Cardanum, opera Fallopii: nec id fecit ad quaestum librarii, sed ad commendationem tantorum virorum, quibus grata posteritas plurimum debet: eo prociis Hofmanni temerarium iudicium de Fernelio, ut eius Hylani Plantij esse sustineret, qui quidem discipulus & Amannensis fuit Fernelij, sed ipsam tueretur ab illa calumnia in eius vita. Nam Fernelium in Lingua Latina elegantiore Ciceronis, & Cornelij Celsi, versatissimum fuisse, eius opera Iuvenilia de Mathematicis scripta testantur, dum Lucretia Philosophiam doceret in Collegio Sancta Barbara, antequam sacris Medicinae fuisset initiatus: nec contentus Fernelij doctrinam malignè contempsisse, invidiam suam ad Medicos Parisienses transtulit, Fernelij fautores & collegas, qui partium indignantur honorem, ne teneant inter principes Medicinae, vitamque volunt pro laude pacisci. De Fernelio, & Argentario usurpare possum, inquit, quod Galenus dixit de Thesallo, ex Cercida

--sedere sublimi in Throno

--inter blenosos arietes,

Quid hoc? si non Medicis Parisiensibus conivitum facere, eiusque nomen è catalogo Medicinæ procerum delere, dum ipsum Fernelium conatus est infamare. Appellat Patrem meum



*simiam Fernelij, & eius Institutiones medicas tanquam ridiculas fastidit. Sed illi obviare possem, quod Martialis cuidam Zoulo.*

Sunt quidam qui me dicunt non esse Poëtam,

Sed qui me vendit Bibliopola putat.

*Riolani Institutiones plusquam vigesies à quadraginta quinque annis suere excusæ, & diuenditæ in Gallia & Germania, talem applausum nunquam recipient Institutiones Medica Hofmanni, quia obfcura, nulla methodo descripta. Sed sinamus hominem frui sua pluitantia.*

Ipse sapit solus, reliqui velut umbra vagantur.

*Nolo maledictis cum eo certare, vel retaliare, quia par pari referre hostilitatem est, laudans ipsius Studium Anatomicum, in conciliandis Aristotelis & Galeni opinionibus, exoptans ei cadaverum humanorum dissectionem, vel inspectionem, ut fidelius & accuratius tractaret Anatomica, cum viderem ipsum ex picturis, & aliorum relatione loqui: Non muto adhuc sententiam, agnosco Hofmannum Medicum eruditum, ut testantur monumenta ingenij, sed insolenter abutitur sua doctrina, in contemptum aliorum. Reprehendus Institutionistas suos, quod prætermiserint Anatomicam doctrinam, ac proinde multas & imperfectas descripserint Institutiones Medica: ipse præcedentibus accuratius Anatomica proposuit, sed adeo erronea & absurda, ut ipsum visis illis Animadversionibus, pudere debeat sua scriptio: libenter abstinuissim ab ista Animadversione, nisi minuenda esset eius auctoritas, quam sibi arrogat in rebus Anatomicis, ne isdem erroribus Medici decipiantur, quibus ipse deceptus fuit. Reliquæ Medicina partes excutendas, & erroribus vita humana permissos expurgandas alius relinquo. Nec debet more suo bene momenti oppedere, & sarcasmo exsultare, ac explodere istas Animadversiones, quia prodeunt ex Officina Professoris Anatomici, qui censent in operibus Artis, atque ex tuo iudicio insi illas possidet. In Anatomicis, qui tantum temporis, & tædij fumere non vult, nonumat sibi licentiam arbitrari de tantis viris, ne in bonam quidem partem, (quod notandum.) Nam ubi error, ibi quoque malum est: si Anatomie falsum quid afferat, & quod in praxi nos errare faciat, ne Anatomie quidem dicenda est, ex Hofmanno Insistent. medicarum, pag. 69.*

### *Ut differunt Membrana à Tunicis.*

Pag. 52. **Q**uod scribis de membranis & tunicis, iam antea propositum fuerat à plurimis Anatomicis, membranas esse tantum velamenta. siue tegumenta partium, tunicas corpora formare concava, ac proinde crassiores esse membranis.

### *Transmissio Sanguinis per Cor.*

Pag. 55. **A**gnosce translationem sanguinis à ventriculo dextro per medios pulmones, ut perveniat ad sinistrum, sed dubito an verè scripseris, in hoc ipso itinere ventiletur quidem sanguis, depositis fuliginibus in bronchia aspera arteria, qua interiascent utriusque divisiones, refrigeret etiam non modicum contactu bronchiorum refrigeratorum. Vide quantum istud iter perstatile noceat, & refrigerationes sanguinis, ad vitalem sanguinem formandum in sinistro Cordis ventriculo, è quo postea in totum corpus diducit.

### *Ortus Vena Cava.*

Ibidem. **O**ritur vena Cava ex Hepate, tam est falsus, quam falsum est venam Cavam, & portæ duo esse distincta, & per anastomoses iuncta vasa. Ego verò assevero venam Cavam à Corde enatam, esse vas distinctum à vena Porta, sed admitto quoque isthæc vasa non esse iuncta per anastomoses: vel saltem exiguas.

*De Nervi Origine & Compositione.*

Pag. 59. **D**ico nervi non simpliciter sunt ex Cerebro, sed partim ex Corde, ex Cerebro sum ratione transformationis, quatinus in oculis incutitur, ex Corde quatenus vasa à Corde in Cerebrum sublata excidunt à calvaria cum utraque meningi, non sine substantia Cerebri alba. Idcirco discretissime docet Galenus, lib. 10. de usu partium, pag. 2. ut nec contradicere quisquam audeat. Ego verò iure tibi resistam, quamvis sciam ex Galeno nervum esse substantiam Cerebri conglobatam, & vestitam iisdem membranis: sed sensus ocularis demonstrat, nervos ex filamentis simul implicitis contextos esse, tam in Cerebro, quam in spinali medulla, sed evidentius in nervis spinalis medullæ id apparet. Non potest duplex membrana in nervo demonstrari, multo minus substantia Cerebri, venulæ nequaquam comitantur nervos, sed cum in progressu suo sint interiecti venis & arteriis, inde rorem aliquem mutuatur ad sui nutritionem, sed non sunt caui nervi: quomodo possunt esse vehicula spiritus animalis: cum sit tenuissimus, intra membranam penetrare potest.

*An cognitio Musculorum inutilis Medico.*

Pag. 61. **D**ifferentia musculorum plurima sunt, homini nostro hand scire necessarie, ut & peculiarior nomina aliisque fitta. Quod ignoras, cur ab aliis nesciri velis, ante latet Galenum præ cæteris partibus commendasse Tyroni cognitionem musculorum, tanquam Alphabetum Medicinæ: Cur repudias nomina ad distinctionem & doctrinæ facilitatem prudenter excogitata & imposita?

*Articulationes Ossium malè descripta.*

Pag. 64. **A**rticulationes Ossium non fideliter descripsit ex mente Galeni, cuius doctrinam non est assequutus, nec expressit. Rectius exposui articulationes quàm Hofmannum, etiamsi notas in librum Galeni de Ossibus evulgarit. Non dico plura, ne longior sim.

*Cur mentum muliebre glabrum?*

Pag. 66. **C**ur mentum viri præ muliere sectum esse pilis debuerit, non videre me fateor. Causam materiale, efficientem & finalem licet assignare fuliginosum excrementum sanguinis calidioris in adolescentia, primam materiam suppeditat pilis, calor vegetior foras protrudit, finis est ad distinctionem sexus, quod factum magna Dei providentia, ne promiscuus esset sexus uterque.

*Anatome debet esse recta.*

Pag. 69. **S**i falsum quid afferat, & quod in praxi nos errare faciat, ne Anatomia quidem docenda est. Ergo totus discursus errorum plenus, non est verè Anatomicus, quia in praxi nos errare faciet.

Pag. 81. *Requirit in Institutionibus brevitatem, facilitatem, reiectis superfluis:* Cur replet caput de ventriculo, longa explicatione ventriculorum in brutis animalibus.

*Ileon Intestinum.*

Pag. 84. **I**leon nomen intestini tertio inditum improprium esse sustinet, quia convenit morbo intestini, cupit sibi locum exhiberi, profero *Rissum Ephegium*.

*Cacum Intestinum.*

Ibidem. **N**omen caci imposuere intestino, illi qui porcos secabant, non homines, quia sacculus ille cacus evidenter in porcis, quam in homine. Iniuriam facit omnibus Anatomicis antiquis, quod Anatomiam ex porcis didicerint.

*Vena Cava distinctè aperta.*

Pag. 86. **V**ena Porta, non est vas quoddam natura distinctum à vena Cava, quin est appendix illius. Hoc falsum esse supra monui, & ipse falsus est.

*An Lien chylicet?*

Ibidem. **F**alsum est omnem chylum recipi in Hepar, ubi cò peruenit, splensens ramni sifnister trahit alium, ut Aristoteles loquitur chyli partem impatiorem quamdam ad Lienem rapit. Non is fuit sensus Aristotelis: nam Lienem è ventriculo impuritates humidas trahere scripsit, nec verisimile est Lienem chylum ad se rapere, si destinatus sit excipiendis sordibus crassæ massæ sanguineæ, vel superfluas humiditates ventriculi exfugat. Miror quomodo assueret arterias Lienales chylum etiam ad Lienem deferre, si sint huic officio dicatæ, per quas vias distribuetur sanguis arteriosus.

*Nullum ordinem Anatomicum seruat.*

Pag. 86. **N**ullum ordinem seruat Anatomicum in explicatione partium: nam de Omento loquitur post ventriculum, Intestina, Mesenterium, quod aperto abdomini primum occurrit, & explicari debet in titulo capitis 32. promittit explicationem pancreatis, de quo verbum vnicum dixit, nempe interiectum esse intra mesenterium, venis & arteriis mesaraicis, quod est ridiculum, cum sit corpus separatum à mesentericis, subiectum Hepati, ventriculo, ad Lienem pertingens, de quo miranunc prædicantur, ratione structuræ, & officij, quæ antea veteribus erant ignota.

*De Membranis Omenti.*

Pag. 88. **F**alsum est membranas omenti à peritoneo, & à ventriculi membrana propagari. Cum sit continuatio ipsius mesenterij supernè sublatis extensi.

*Ignoratio Aphorismi Hippocratis.*

Ibidem. **N**on intelligit explicationem præceptoris sui ab Aquapendente, super istum Aphorism. 14. lib. 7. Si fideliter exterpississet in suis schedis post visas vel auditas lectiones, interpretationem huius Aphorismi nobis dedisset, qui magni est in Medicina momenti, ut videbit in mea Anatome, capite de Omento.

*An Hepar fissum in lobos?*

Pag. 90. **S**i in brutis quæ prona sunt, Hepar in plures lobos sit divisum, cur bouis iecur simile est humano? hoc tibi excutiendum relinquo.

*Iterum de chylicatione in Liene.*

Pag. 92. **M**ultus est in probanda hæmatosi, quæ fit in Liene, cuius se iactat inuentorem, vel restauratorem, quod ne ipsa quidem inuidia negare potest. Sed nolo cum ipso litigare, alio loco commodiorem disceptabitur hæc quæstio, ne iactet se triumphare, fretus trium doctorum vitorum approbatione.

*De Meatibus Cholidocis.*

Pag. 94. **N** Eget rectam iter bilis ex Hepate in Intestinum, atque duplicem illam hñem; quam cum Lufino constituo, & rationibus, atque experientia demonftrari: nolo hic repetere, quæ fcripti eam in rem in mea Anthropographia quam adibunt, qui refutationem Hofmanni defiderant: Nolo hic hzere in refutandis eius ineptiis quas effutit pueriliter, cum non fit Anatomicus, nifi vmbraticus ex pñcturis, & aliorum relationibus: propterea querit vnde est commentum illud de recto bilis ex Hepate in Intestinum itinere, profectò non potest de illo cogitare, sine expreffo naturæ conuicio.

*Veteres.*

Pag. 97. **V**eteres nervos habent duplices, tam ex lumbis, quam à sexto pari. Cùm sint membranofi non indigent nervis, exquisitus dolor pendet à distensione membranz, & vexatione à calculo delabente.

*Vafa preparantia Spermatica.*

Pag. 101. **V**afa preparantia vbi ad testes peruenere, mixtæ mixis modis in se inuicem intorquetur, quod epididymis & parafata vocatur. Malè collocat, & interpretatur istas partes, intextura, & contorfio venarum & artinarum spermaticatum varicosum corpus quoddam; distantia pollicis à testibus constituunt, quod parafata circofides dicitur, epididymis est corpus transuersum testi superiectum. Parafata adenoides, aliter prostata nuncupatur, accumbit ceruici veficæ.

*Musculus Testis.*

Pag. 102. **D**ubitat de musculis testicularum, quos cremasteras vocant, eùm tamen sint notati caculis & mediastinis exercitij Anatomici.

*Multa falsa de partibus genitalibus mulierum.*

Pag. 103. **F**alsum est mulieres habere epididymida multò minorem quàm in viris. Verum quæque est ex Herophilo parafatas circosides in feminis nunquam visam. Denegat mulieribus semen prolificum, ridet & eludit tubam Vteri Fallopij, affirmat testes mulieribus non minus nota gratia inesse, quam mamma, aut si ita vti, papillas illarum in viris: Sed hæc questio de semine muliebri cùm sit Physiologica. alio loco tractari debet, satis est Anatomico demonstrare instrumenta præparationi & conseruationi seminis dicata, qualia descripsi in mea Anatome.

*De Tuba Vteri, & semine muliebri.*

Pag. 106. **T**uba Fallopij tam non est vas deferens, ut illi volunt, quam dies non est nox. Vides explorari & reiectam tubam Fallopy. Subiungit inferiora ligamenta, quæ pro musculis habentur, sunt cana, per quæ effluit semen in iis in quibus est, quamobrem tam despicabilis non est. Herophili sententia, semen muliebri, in quibus est excerni fas, imò vera est. Quis non rideat magni istius Anatomici hunc discursum? semen muliebri foras effluere per coxuitatem ligamenti inferioris rotundi ergo vel ad summiratem labiorum iuxta clitoridem, vel extra labia profluet semen. Primus est Hofmannus inter Anatomicos, qui talem vsum assignarit inferioribus & rotundis ligamentis Vteri. Repetit pag. 117. semen muliebri, si quod sit, foras effunditur per cremasteras uti dixi, accipit etiam cremasteras musculos pro ligamentis.

*De Costis Spuriis.*

Pag. 114. **C**ostarum spuriarum vti ad thoracem non pertinet, quod pauci sciunt, fallæ igitur sunt tales, & bibnerant hunc sium propter tunc diaphragmatis ventrali, Hepatis, & Lienis. Huius conficiarium est, veras quidem tegi à pleura, nobis v-

rò à peritæno, vera nutriuntur ab azygo vena, spuria à pœrenicis. Quot verba, tot errores, nunquam vidit situm & insertionem diaphragmatis ad circumferentiam notharum costarum. Concauum est diaphragma, quia suspenditur, & veluti tetrahitur à mediastino tanquam vinculo, fortissimoque suspenforio, idcirco spurix costæ pertinent ad thoracem, vestiuntur pleura, nutriuntur ab azygo more aliarum costarum, mouentur cum aliis simili motu, sæpissime solitarie mouentur beneficio diaphragmatis, in libera respiratione secatur, & aperitur i thorax in empyemate inter tertiam & quartam costam, spurias, vt purulenta materia euacuetur, quæ supra diaphragma continetur. Si Barbitonfor Rualis interrogatus pro magisterio id dixisset, repulsam pateretur.

### De Diaphragmate.

Pag. 116. **N**unquam potuit credere liberam respirationem fieri à solo diaphragmate, nec sine abdominis musculis, quod in se, & in aliis expertus est. Contrarium videmus quotidie in iis, qui facile & libere spirant, quiescente & sedente corpore.

### Mediastinum.

Pag. 117. **I**n mediastino verum est tertiam esse thoracis capacitatem, quæ per fossa respiratio non laeditur. Id laudo & admitto, sed falsissimum habere ramos à iugularibus & foporalibus.

### De plexu neruorum intra thoracem.

Pag. 119. **C**ertum est ad basim Cordis versus spinam exstare plexum quemdam neruorum stomachicorum, à quo depromuntur nerui qui disseminantur in pulmones, & Cor, & reliquas partes: non solum Fallopius vidit hunc glomum, sed ego, pluribus aliis demonstraui.

### Negat transitum sanguinis per septum Cordis.

Pag. 122. **Q**uod de transitu sanguinis fingunt isti, hoc illis, Non dy, non homines, non concessere columna. Ergo negat transitum sanguinis per medium septum. Quod accuratius explicat pag. 122. rationibus parum validis, quibus refutandis non immorabor cum in tractatu de circulatione sanguinis, demonstraui translationem sanguinis per medium septum Cordis, esse verè naturalem, aliam per pulmones, per accidens fieri, cogente nec essitate.

### De Thymo.

Pag. 125. **T**hymus est glandula, quæ vena Cava arteriaque magna substermini, ne periclitaretur. Imò supertensa est trunco venæ Cavae, nec eò pertingit aorta.

Pag. 127. Scribis contra sententiam omnium Medicorum & Anatomicorum, aërem per pulmones quouersum distributum ad vtrumque ventriculum deferri, dexter enim, aquæ caret, aquæ pulsat, aquæ sanguinem emittit, & quidem per arteriam quoque. Verum nolo hoc persuasus ab Aristotele, dicente aërem externum, spiritibus analogum non esse. Ergo ex te non est necessarius aër ad formationem spiritus vitalis, neque Cor ingreditur per solam arteriam venosam, sed si eò peruenit, potest per vtrumque ventriculum æqualiter meare.

### De Motu Arteriarum.

Pag. 128. **A**rteria nihil aliud consernit quam quod tubi sunt, pulsus enim sanguis, non arteria, pulsus facit non vlla commentitia facultas vitalis, sed matrix Aristoteli, quæ vegetatissima exalata in animalibus rectè dicitur. Hæc planè aduersantur doctrinæ Galeni, omniumque Medicorum, qui motum Cordis, & arteriarum non à sanguine, sed ab insita facultate, siue pendeat ab anima, siue à calido innato repetunt. Hæc questio Physiologica est alibi tractanda.

## De Motu Cordis.

Pag. 126. **S** Vbtilis, si vera esset, alterni motus Cordis, & pulmonum causa ex *Aristotele*. Cor, inquit, *impulsu sanguinis ebullientis in ipso inflatur & dilatatur, dum expellit in pulmones, intumescent & dilatantur, compressi expellunt in sinistram ventriculorum*. Nemo adhuc ex circulatoribus sanguinis, tam audax fuit, ne dicam fatuus, ut talem causam adduxerit motuum Cordis, & pulmonum: nam cum pulmo dilatatur, non instar vtris, sed follis, & necessario impellitur ad eam actionem respirationis causa, attrahendo aërem, & vicissim expellendo fuligines. Isthæc quæstio Physiologica alio loco est exagitanda, satis est errorem detexisse.

## De Pericranio.

Pag. 136. **R** Eprehendit Anatomicos, qui pericranium & periosteum in calvaria agnoscunt, *utriusque enim origo ex crassa meningis per suturas delabente: hoc verum de pericranio, non de periosteo, quod ossibus calvarie adhærescit, ut in aliis ossibus.*

## De Carnositatibus Calvarie.

Pag. 137. **I** N cerebrentibus calvaria, ubi ad medium peruenit, est, ostendunt se *carnositates plurimas & humidas, ab Hippocrate observata, quæ si digitis teras, conuertuntur in cruorem*. Fateor id dictum ab *Hippocrate*, sed medullium illud fungosum, ossis potius naturam retinet, quam carnis, & alicubi cruentum propter effusionem sanguinis ex venis externis, per foramina istam calvarie substantiam penetrantibus.

## De Cavitate Frontis.

Pag. 137. **I** N Offe frontali cavitates duabus laminis interiecta est supra supercilia, quæ nunquam medio septe difflusa est, in adultis tantum apparet, ex amplificatione ossium, ut sit *exim quoddam naturale, ut ipse scribit alibi, quod ab eo decerpisse Riolanum putat*. Iam istas cavitates *Riolanus* notaverat ante *Hofmannum*, usum talem exposuerat, & assignaverat cavitatibus ossis mammillaris & sphenoidis, quæ sunt propinquiores ori, ideoque magis inserviunt ad resonitum vocis. In cavitatibus frontalibus genitum fuisse lapidem, & per nares excretum, non est impossibile: sed crederem potius & lapidem, & vermes in ista lacuna formata supra palatum, & difflusa osse vomeris, officulis spongiosis, & carunculis referta, procreatos fuisse, ex putredine istius loci, ubi innumeri morbi narium gignuntur, maligni, & putridi, ac putidi admodum.

## Processus Mammillaris.

Pag. 138. **P** rocessus mammillaris mastoideus admirabilis est, in homine quidem, bubus spongiosus est, & sivo perficitur, in ovibus, capris, leporibus totus canis, & substantia lapideæ percipit. Verum est in pueris apophysim illam mastoideam esse spongiosam, sed in adultis caua efficitur.

Ibidem. Os ingale non regit musculum temporalem, sed dumtaxat tendonem.

## An per Cavitates Sphenoidis coletur pituita?

Pag. 139. **V** Erum est hoc esse sphenoidem non minus per palatum quam per nares vacuari. Cerebri excrementa pituitosa, hinc præterius superioris faculi os colatorij decedunt, sed ipsa videntur solida esse, sed reuera habet foraminula quædam, quæ recipiunt pituitam, ita loquor, non enim opus magnis & perspicuis foraminibus, qualia sunt in cribroformi, quin in vapores soluta pituita transire possit. Renouat errorem *Galenus* de transitu pituitæ per foraminula sella sphenoidicæ. Debebat explicare cavitates insignes ossis sphenoidis, quæ habent apertionem & exitum in nares, ut pituita ibi collecta fluat in nares. Cavitates ossis sphenoidis etiam ad formationem vocis conferunt, nunquam aut raro pituita differtæ reperitur, hoc monere debuerat *Hofmannus*, si esset Anatomicus loquutus, & errat more vulgi.

## De Origine Nervorum.

Pag. 144. **V**asa, qua procedunt à sinibus dura meningis cum substantia Cerebri, duabusque meningibus elabentia nervos faciunt. Quznam fabrica nervorum? quis vnquam hoc dixit, vel detexit? Aliud est tractare Anatomem in hypocaulis, aliud in libro naturæ, nempe cadauere humano.

## An sinus recipiant vasa?

Ibidem. **H**ic tam de sinibus, quàm de ductibus vello avrem Anatomicis nostris, & monco considerem in posterum quoque analogiam, qua est inter vasa inferiorum duorum ventrium, & huius nostri, utemini ibi & peritonæum, & pleuræ adnebas vasa omnia communi tunica, ita his dura quidem mater velut illa, quæ in sinu absumuntur, pia autem illa qua ductus constituunt. Ergo ex Hofmanno venæ & arteriæ ad Cerebrum ascendentes per sinus diffunduntur, pia autem meninx efformat ductus, siue canaliculos per Cerebri substantiam dispersos.

## An Arteria ad sinus Cerebri perueniant?

Ibidem. **H**ic obiter taxanda venit andaria Fallopij, dicit enim solas venas, arterias nullas ad sinum ire, cum iis, quæ ego in Physiologia mea c. 192. hic parciat ero. Iam à viginti annis sua Physiologica promittit, capita designat, nec vnquam ad hoc visa, cur tantas arca flagellat opes? cur nos toties ad ista remittit? Certum est solas venas ire ad exordia sinuum laterallium, qui perreptant Cerebrum iuxta tramitem futuræ lambdoidis: Arteriæ autem in basi Cerebri postquam plexum, siue rete mirabile contexuere, diffunduntur in duram membranam, & ascendunt ad sinum longitudinale, qui torcular dicitur, effunduntque ibi suum sanguinem, qui permiscetur venoso. Ideoque pulsar dura meninx, vbiq; & in canaliculis, quia inclusi dura matre, non autem Cerebri moles, quæ tamen à spiritibus ratione ventriculorum eleuari & deprimi potest. Id observabit diligentius Hofmannus, cuiusque fautores accuratius indagabunt. Per circulationem sanguinis ista corruatio aliter exponitur, & arteriæ separantur à venis, in officio vehendi & reuolendi sanguinem.

Pag. 145. Diægramma istud planè falsum est, quamvis ex aliis Anatomicis depromptum.

## De processu vermiformi.

Pag. 147. **E**steor gyros Cerebri & cerebelli longè differre, sed gyri Cerebri, cum sint externi non possunt efformare processus vermiformes totis similes, qui sunt remera in Cerebello, non in Cerebro, & quidam credunt, fortasse Galenus ipse. Nunquam Hofm. vidit, aut intellexit, quid esset processus vermiformis, qui intra Cerebrum latet, positus in ingressu, & limine quarti ventriculi, quem instar ianitoris claudit, & tescrat, & collosibilem facit ineptè.

## Quid sit Hippocampus Cerebri?

Pag. 148. **I**gnorat, qui sint pedes Hippocampi Arantij. Inueniet in mea Anatome, & telegat Arantium. Falsum est plexui choroidi multas glandulas immisceri, quamvis id scripserit Varolius. Falsum quoque quod in ipsis ventriculis est fornix, siue canarium: item pars, corpus testudineum, sunt supra ventriculos, & constituant testum & coneameratum, neque fornix & corpus testudineum differunt, rem eandem significant. Falsum est in quarto ventriculo contineri quatuor illas eminentias à priscis dictas nates & testes, in eodem esse conarium, sunt enim istæ partes extra quartum ventriculum, & constituunt latera vallis, quæ à tertio ad quartum deducit ventriculum. Conarium verò est illis eminentiis superiectum.

## De quarto Ventriculo Cerebri.

Ibidem. **I**am Cerebellum quoque suum habet ventriculum, quem cisternam nominat su-  
pralaudatus Arantius Obseruat. 6. quasi res una foret, at vocat illum Estabi-  
stratus 7. sentent. Hippocratis 3. Vocat Herophilus 2. de v'sa part. 11. C. Verum est  
quartum ventriculum cisternam spirituum contineri in Cerebello, sed falsum di-  
stinctum esse ventriculum à quarto, ut ipse constituit. Nam quartus ventriculus est  
inter Cerebrum & cerebellum, postea addit cerebellum, habet quoque suum ven-  
triculum, non cisternam nominat' ARANTIUS.

## Vbi generatur &amp; continetur spiritus Animalis?

Pag. 149. **C**ontendit Hofmannus spiritum animale non fieri, nec contineri in ventricu-  
lis, sed in corpore Cerebri, quia ventriculi sunt destinati excipiendis sordibus, qua-  
si tanta amplitudo anteriorum ventriculorum sit occupata colligendis excrementis Cerebri.  
Imò spiritus animalis in basi Cerebri formatus in sinus, siue ventriculos inferiores  
effunditur, ut repleat inanes cavitates, & perveniat ad quartum ventriculum, ci-  
sternam spirituum. Admitto quoque eundem spiritum animale à rete mirabili, per  
arterias duræ meningis ad sinus pervenire, atque in ambitum & corticem Cerebri  
diffundi. Sed falsum est dumtaxat ventriculos factos esse colligendis expurgandis-  
que Cerebri excrementis. Ridicula est isthæc ratio effluxuros spiritus per infundi-  
bulum: quidni etiam dixit per naves? Infundibulum est obturatum glandula pitui-  
taria, & spiritus mobilitate sua sursum feruntur. At de essentia eorum est disjuncto, quid  
coges illos ridere in angustias nervorum? quia sequentes ductum ventriculorum diri-  
gentur ad quartum. Vellem ut mihi demonstraret ductus spiritus animalis ex am-  
bitu, siue cortice Cerebri ad nervos revocendi. Idcirco contraria opinio non erit  
in æternum falsa, ut opinatur Hofmannus.

## Iterum de Nervorum origine.

Pag. 151. **R**epeto vellem nervos ex Cerebro deductos unâ cum vasculis à Corde elatis interiri v-  
nitatem animæ. Antea dixisti nervos habere comites ductus, siue venulas  
à Cerebro prodeuntes, cum ipsâ medulla, nunc à Corde derivas,  
Quo tenam modo mutantem Præca vultus?

## Motus Capitis.

Ibidem. **D**E motu capitis amplectar sententiam Galeni, motum quidem rectum cum  
vel annuimus, vel recuimus fieri super secunda vertebra, obliquum super  
prima. Quinque Anatomici tibi & Galeno contradicent, & hoc non potes verissimè  
probare, quia obliquus super prima vertebra fieri non potest, alioquin caput lu-  
xaretur.

## De Foramine Osis Pubis.

Pag. 153. **I**n Osibus pubis, magnum illud foramen per quod obturatores muscoli eunt, &  
quod lenitatis tantum causa factum esse non credo. Falsum est obturatores mus-  
culos traduci per istud foramen. Obturatur quidem à duobus musculis obturato-  
ribus externo & interno, qui inferiunt rotationi femoris, & inferuntur in cavi-  
tatem Trochanteris magni.

## De Figura Spina.

Pag. 154. **C**um scripsit Hippocrates, totam spinam esse dorsalem, relicturam, quicquid e-  
nim inducent alij, ipsa Hippocratis lectio mihi persuadet, vocem hanc & se-  
quentes, idcirco & idcirco, non esse de curvatura, sed de naturali figura, tum videlicet, cum vel  
stamus, vel alterutro lateri incumbimus. Credit Hofmannus istas voces duas pertinere  
ad variam figuram spinæ, dum naturaliter movetur, vel contorquetur ad latera, sed



nondum adhuc vidit, aut intellexit veram figuram spinæ ex Hippocrate, quam indicauit primus, & explicauit eruditissimus Duræus comm. in Coacas: retinuit Laurentius, & transcripsit in suum librum Anatomicum: ad istos authores remitto Hofmannum, & monco, vt, sectione cadaueris absoluta, remoueat omnes carnes spinæ incumbentes, tumque animaduertet admirabilem spinæ figuram ab Hippocrate descripiã.

### Motus Spina.

Pag. 155. **S**ed qualis est motus spina? *curuatus, circularis, qui fit singulis vertebris paruum motus, quàm primum autem fit curuatus, angularis, anteflexio fit, aut subflexio proma-iori inclinatione.* Turpiter hallucinatur Hofmannus in motu spinæ, à principio dorſi vsque ad Os Sacrum, qui dependet ab articulatione vndecimæ vertebræ dorſi, cum duodecima, vel eiusdem cum prima lumborum. Propterea natura istam articulationem effinxit dissimilem ab aliis, & clauem spinæ nominauit Galenus, illam vertebram supra quam editur ipse motus, rectus & obliquus, quod monuerat Galenus, & miror ab Hofmanno prætermisum, vel non intellectum. Forſan dicet ista omnia esse in suis Physiologicis explicata, quæ non sunt edita, & si placet, emendatiora prodibunt, sed quodammodo circularis redditur motus spinæ, dum antroſum fertur, quod intelligendum de tota & integra spina.

### De Coccyge.

Pag. 155. **Q**uid Os coccygis facit? *Nihil est, canda in non candatis nota.* Tu ne adeo ignarus es rei Anatomicæ, vt nescias coccygem sustinere rectum intestinum, ac proinde in mulieribus ceruicem vteri, siue vaginam ipsi recto intestino incumbentem, & ab isto officulo leuatorem musculum ani prodire, inseruire quoque firmando sphincteri latissimo ani.

### An dura mater pulset?

Pag. 157. **Q**uariatur an pulset dura mater obvoluens spinalem medullam? *credis Hofmannus: Id nondum vidi, nec ausim refellere Hofmannum.* In brutis animalibus cum magno cultro laniorum, secto dorſo id explorari posset.

### De nutritione spinalis medulla.

Ibidem. **D**e ratione nutritionis spina interrogati nostri respondent *venas & arterias in substantiam vertebrarum ingressas pergere in medullam ipsam, quibus ergo dico, cum vasa illa procul dubio sint insignita, non posse effugere sensum, atque nemo hactenus ostendere ausus est, propterea maxime in sententia alibi dicta, vehere secum alimentum ex Cerebro.* Scies Hofmannus, venas & arterias, non in substantiam vertebrarum ingredi, sed per foramina vertebris interiecta, iam in dorſo, quàm in lumbis venas & arterias subire spinalem medullam & nutrire: Propterea falsum est alimentum spinalis medullæ defluere ex Cerebro, imò per venas & arterias, tam thoracis, quàm ventris materia morifica sæpe transferitur in spinalem medullam, & paralyſim infert. In sua Epitome, pag. 111. sententiam suam mutauit, vasa habet spina dorſalis ab azygo & vicinis vasis.

### De Compositione Nervorum.

Pag. 157. **D**e ortu nervorum loquens Galenus, 1. loc. aff. 6. c. Nervi, inquit, *proximus ab initio malis sunt simul concreti, & communibus inuolucris contenti, qui à Cerebri meningibus oriuntur.* Ex his falsi arguitur Rondeletius, qui cap. de Paralyſi fibris hanc obseruationem. Inde colligo nervos ex filamentis tenuis meningis contextos esse, inuolui dura meninge, ideoque fibræ illæ, ex quibus nervi constanter, non sunt vasa illa quæ ex Corde sursum ierunt ad Cerebrum, in quibus sanguis vnâ eum spiritu suo it, vt percutit Hofmannus.

## De Nutritione Nervorum.

Pag. 158. **N**ervi nervos putat sanguine illo, quem à Cerebro vehunt, non autem partium illarum in quas distribuuntur. Quis vnquam vidit venulas, aut quid eruentum intra nervos? Credo potius nutriti roscido illo humore, qui effluit è vasis arteriosis & venosis, quibus semper sunt interiecti nervi.

Pag. 158. In muscularibus spinalibus declarat suam ignorantiam, dum proponit difficultatem, & subterfugit laborem.

## De Pupilla.

Pag. 163. **E**xtrimitas foraminis, quod in vava est in felibus mobilis, qui nabis quoque mobilem esse perpendunt, confundunt, id quod à causa externa sola fit, cum eo quod causam internam habet. Imò à causa interna in quibusdam mobilis est pupilla, sed contra naturam, quia morbus est qui dicitur *truu*, qualis à multis, & mihi quoque visus, afficit pupillam.

## An Membrana varia in orbita?

Ibidem. **N**escio quid nugatur Hofmannus, dum membranas orbita varias describit, una est à pericranio immediate deducta totam orbitam inungens, altera duplex est, in complexu suo habet humorem quandam vinctuosum, qua nimirum aulla sunt *ad-*huc dicta, primus membrana usus est, qui omnium periosteorum, huius alligare oculum cranio. Difficile est deradere periosteum à superficie orbitæ internæ, vt fit in caluaria, altera membrana duplex, quæ continet humorem vinctuosum, non reperitur, usum quem assignat alligare oculum cranio, præstat adnata, siue coniunctiva tunica, vt faceris. Pag. 167. Ergo tuz membranæ inanes ac nullæ.

## De Glandulis, &amp; Foraminibus Palpebrarum.

Pag. 164. **V**erè ex Galeno adfers glandulas cuiusque oculi numero binario, quarum una maiori angulo intrusa verè glandula est, altera latior & planior consistit versus minorem angulum. Prior glandula carnosæ est, & impedit inuoluntarium effluxum ferrosi humoris vel pituitosi, si redundat in oculo, qui fluere debet naturaliter in nares, per foramen lacrymale Ossis vnguis.

In Epitome Pag. 117. scribit in vitroque angulo palpebræ sunt duo foraminula; per quæ lacrymæ exeunt, puncta à Fallopio dicuntur. At discees in voo tantum angulo atque magno reperiri ista puncta, & à Fallopio dicuntur lacrymalia.

## De Musculis Oculi.

Pag. 169. **R**edius fecisset, & honori suo consuluisse Hofmannus, si musculos oculi, quemadmodum aliarum partium neglexisset more suo tanquam inutiles instituendo tyoni, non turpiter errasset in describendo musculo sexto obliquo maiore, qui ad angulum minorem profectus inuenit ibi cartilagineam perforatam orbitæ appensam, quam primus attendit Fallopius, vocanteque trochleam, & musculum ipsum trochleatorem. Obliquus iste musculus ab inferiore parte orbitæ ductus ad angulum maiorem proficiscitur, eiusque tendo tanquam ductarius funis per cartilagineam traducitur, angulo maiori iuxta carunculam, appositam. Nomen trochleatoris musculi inditum est à *Riolano*, imperitè describit musculum obliquum minorem, quem deducit per angulum maiorem orbitæ, & obliquos musculos præbere obtatum obliquum, peius adhuc istos musculos describit in Epitome, pag. 12.

*De Nervis Opticis.*

Ibidem. **D**ubitat, an nervi optici decussati sint interfecti intra Cerebrum, priusquam ad oculum perveniant. Ego, inquit, olim credidi negantibus, nunc persuasit mihi Celsalpinus, 2. quæst. med. 10. & 5. artis 42. planè id necessarium esse, licet sensus id nos destitueret. Ergo ista decussatio mentis potius quàm visu concepienda, & quod non est tale sibi in animo fingere oportet, qualis hæc Anatomia? vel potius amentia?

*An lobus auricula perforatus?*

Pag. 171. **N**ondum observavi foraminulum quoddam in lobo inferiore auricula naturaliter factum, quo natura ipsa velle videtur Halagmia, seu inanes huc pertinere. Figmentum est Casseri in fauorem mulierum Italarum & virorum, qui suas aures sic ornare solent.

*De Aure Interna.*

Pag. 173. **E**x Hofmanno Aristoteles tortuosam cavitatem auris novit, ignotam Galeno: at ipse paulò post 9. de usu partium, c. 10. quærit cur seta parva in aurem introducta non inueniat exitum, ait propter viam tortuosam id fieri.

*De Cochlea.*

Pag. 174. **C**ochlea in infantibus integra eximi potest, fateor, sed cum toto Osse lapidoso, quod continet tres cauitates, concham labyrinthum & cochleam. Sed falsum est in omnibus adesse membranas tenuissimas vestientes illas cauitates, quia omnes carent periosteo post tympanum.

*Quid sit Chorda Tympani?*

Pag. 175. **F**atetur ingenuè se nescire, quid sit chorda tympani in aure. Ego tibi declarabo, est filamentum transversum tympano artensum intus, unde oritur, quæres? à nervo auditorio, percutitur, dum sonus ad tympanum allidit: Inde resonatus per totam aurem, ideoque chorda tympani non est lusus naturæ, sed res naturaliter existens, & necessaria ad auditum perfectiorem.

*An Masseteres differant à temporalibus?*

Pag. 181. **E**xistimat Hofmannus, musculos masticatorios non differre à musculis temporalibus apud Hippocratem, quamvis à Galeno distinguantur. Malo favere Galeno quàm Hippocrati, quia masseteres sunt omnino distincti ortu, & origine.

*De Symphysis.*

Pag. 182. **Q**ui relictæ symphysis ad synarthrosim tendunt, toto calo errant, ubi enim motus, & quomodo molere possint, si mobiles essent, scio quid obici possit ex Proemio libri de Opibus. Deservisti Galenum, & eius doctrinam de articulis: nam motus non est de essentia articuli, cum sint quædam ossa iuncta cum motu obscuro, aut nullo, qualis est gomphosis dentium, harmonia, & sutura.

*De Musculis Linguae.*

Pag. 186. **M**otus linguae non vult explicari per musculos, ut in aliis partibus, propter volubilitatem linguae. Idem de musculis reliquarum partium, quae celeriter moventur. Describit Arantium, dum scribit, motus linguae communicat cum Osse hyoide dicto, quia est immobile, quippe super quo mouetur lingua tanquam firma basi. Describit eundem Arantium, in eo quod exsertio linguae extra dentes debeat Osse huic, imò hoc Osse immobili manente exsertitur lingua cum ipsa spiritu motus target. Verum est in masticatione & volubilitate linguae Os hyoides non moueri, dum agunt muscoli linguae, sed dum lingua demittit cibos, veluti manu in pharyngem, os hyoides attollitur cum larynge, ut descendat alimentum, atque istum motum laryngis, & Ossis hyoidis, qui fit per ascensum sine alimento descendente possumus efficere, sed in exsertione & productione linguae extra septum dentium, necessum est Os hyoides quodammodo attolli, si volumus longius extendere linguam. Os hyoides ita pertinet ad linguam, ut dixeris appellari Os linguae.

*De Musculis Ossis Hyoidis.*

Pag. 188. **D**um serò mediter, incipio sensim condescendere in sententiam illorum, qui musculos Ossis hyoidis tribuunt motum tonicum, quia viximus motus sit super te quiesca, quatuor illa muscularum paria sibi inuicem opposita tenent linguam in aequilibrio suspensam. At tibi oppono motum tonicum non esse perpetuum, atque laboriosum & dolorificum: Nescis Os hyoides corbibus suis, apophyibus styloideis appensum, & fortiter alligatum esse per robusta ligamenta, sicque suspensum sustinet, & linguam & laryngem, dum quiescant illi muscoli, qui non possunt esse diu in antiali simul agentes,

*Caro Palati.*

Ibidem. **F**alsum est carnem palati esse glandosam, asperitatibus Ossis firmiter est affixa, vnde rugosum existit palatum.

*Gargareon.*

Pag. 189. **G**alenus auctor est gargareonem esse plectrum vocis, negat Hofmannus, quod experientia refutat, ideoque non opus est alius testimonio ad probationem, ut videbit in mea Anthropographia.

*De Musculis Laryngis.*

Pag. 192. **H**ofmannus patefacit suam ignorantiam in musculis laryngis propriis, quia sunt 192. **H**ec exister, ut fugere possint etiam hunc aliquem, praesertim caduere iam exsiccato. Ego verò sustinco conspicuos esse & euidentes, qui à luscioso possunt apprehendi extracto larynge à suo loco, non in corpore exsiccato, alioquin obscuriores essent.

*Nervi recurrentes.*

Ibidem. **N**on intelligit Hofmannus, artificium naturae in nervis recurrentibus, cum plurimi nervi laryngis, Ossis hyoidis, linguae, maxillae inferioris oriuntur à partibus infernis, & nervi semper inferi debeat in caput musculi, idcirco natura istos nervos recurrentes fecit, quibus dissectis, aut alterutro, vox minuitur, aut deperditur. Itaque nervi non trahunt, tanquam bubena musculos, sed infundunt vim motionem, nempe spiritum versum caput musculi.

*Quid scoptula aperta?*

Pag. 169. **D** Vm Hofmannus Celsi locum de scoptulis operis restituere laborat, per dictione *scoptula*, reponit *scoptula* in neutro genere: sed nescit, ubi referre debeat dictionem *aperta*. Ego vetò dico Cellum intelligere scapulam in homine viuentem, quæ scopolum dicitur opertum, dum musculis tegitur, ut scopolum significat eminens quoduis, *aut à muris*.

*Scapula usus nouus.*

Pag. 197. **Q** Via reuocat scapulam ad manum, ideo eius usum primarium potat esse apprehensionem. Est autem eius articulatio diarthrosis per *synchondrosim*, partim in explantatione muscularum quorundam brachij. Debebat dicere Omoplatam suspensam esse per *syllarcosim* instar Ossis *hyoidis*, quod tamen habet ligamenta, quæ defunt in scapula. Iungitur autem brachio per diarthrosim, non per *synchondrosim*, ut ipse dixit, sed per *syneurosim*, & *syllarcosim*: debebat quoque explicare, quænam species diarthrosicos esset hæc articulatio brachij cum scapula, quæ non est *synchondrosis*, sed *arthrodia*, quæ continetur per *symphyim* eiusque speciem à me declaratam.

Ibidem. Ego cùm intuer claviculas, affirmo robur brachiorum, vel maximè consistere in clavicula, quæ scapulas ita affirmant sterno, ut totus truncus ad brachij actionem concurrat. Quot verba tot errores: claviculæ enim sunt intericæ sterno & scapulis, ut repellant scapulas in dorsum, alioqui brachium in thoracem incideret, scapulæ non sunt affirmatæ sterno, sed longè disunctæ, incumbunt septem costis supernis iuxta dorsum. Quomodo totus truncus ad brachij actionem concurrat? Fateor quidem scapulam per acromion alligatam esse per validum ligamentum ipsi claviculæ, ut suspendatur quodammodo, ne musculi scapulæ superiores sint in perpetuo motu tonico.

*De Ligamento Femoris interno.*

Pag. 207. **S**cribis ligamentum teretè & robustum, quod est in ipso acetabulo articulum ita firmare, ut vel cervix, vel appendix abruptatur potius, quàm articulus excidat. At videmus quotidie luxationes femoris, & subluxationes, à laxato leuiter, vel omnino disuncto isto ligamento. Impropiè loquitur, dum caput femoris appendicem vocat, aut quid intelligat clarius exponere debebat.

Ibidem. *Trochanteres facti sunt ad muscularum quorundam, tum emissionem, tum inflexionem.* Verum est plurimos musculos eò inferi, qui rotationem femoris dirigunt, inde rotatores istæ apophyses dictæ, sed nulli inde repetunt originem.

*Proverbium, Vara vibiam sequitur, emendatum.*

Pag. 207. **E**xplicat & emendat proverbium ex *Ausonio* petitum, *Vara vibiam sequitur*. *Vibia* nomen ignotum grammaticis mutat in *fibulam*. Ego vetò lego *Vara tibia* sequitur, id est claudicat, prout *tibia* est conformata.

*Ossa Chalcidea.*

Pag. 210. **Q**uamvis Hofmannus sit in Græca lingua versatissimus, incogitanter scripsit, tria *tertia* Ossa *chalcidea* dici, quod ferri instar solida esse credantur. Quod de æte interpretandum,

*Interdumque bonus dormitat Homerus.*

Priusquam hoc examen claudam, cogor tres doctissimos Professores Anatomicos, Ioannem Guinterium Andernacum, Germanum, Iacobum Sylium, Medicos Parisenses, Fallopium Italum ab iniqua reprehensione Hofmanni vindicare. Miserum est alienæ incumbere famæ, qui in alium paratus est dicere, vitio omni catere debet.

*Tempus est Dolari, cum culpa redarguit ipsum.*

## Defensio Guinterij Andernaci.

Hofmannus non pepercit famæ & doctrinæ Guinterij Andernaci, qui primus fuit reftitutor Anatomies in Academia Parifiensis ex doctrina Galeni. Habuit auditores & difcipulos *Rondeletium & Vesaliũ*, Medicos illuftres in Anatomicis. *Guinterij* vitam inuenies in vitis illuſtrium Germanorum Medicorum. Creatus fuit Doctor Parifiis anno Domini 1630. oſtauum gradus locum obtinuit, in ſuo decurſu ſocius *Fernelij*. Ratione paupertatis, & propter inginem eruditionem, & induſtriam in vendendis Græcorum libris Medicis, dimidiam partem ſumptuum pro ſuo doctoratu Schola ei remiſit. Inſtitutiones Anatomicas ſecundum Galeni doctrinam Parifiis edidit anno 1556. quæ adeo placuere *Vesalio*, vt eas rurfum typis commiſerit *Bononia*, & Venetiis in duodecimo, anno 1538. cum præfatione ad commendationem *Guinterij*, ſic de illo loquitur. Fuit *Guinterius*, vir multis ingenij dotibus præditus, cui non ſolum ſtudioſi, ſed omnes vera Medicinæ Profeſſores plurimum debent, quod is rem medicam plurimum inauertit. Pallet enim non minus admiranda quadam vertendi promptitudine, quàm ſingularis rerum varietate. Magnam ſtudioſum meorum partem illi acceptam fero, quo uſus ſum præceptore, cum humaniſſimo, tum doctiſſimo. Reprehenduntur tamen ab *Hofmanno* eius Inſtitutiones Anatomicæ, quod ſint imperfectæ, nec de omnibus partibus, quæ à poſterioribus Anatomicis fuerunt inuenta traſtaſit. Quid mirum? non vni homini omnia ſcire datum. Satis illi fuit doctrinam Anatomicam ex *Galeno* in Scholas introducere, quædam tamen de ſuo addidit. *Fernelius* adhuc alia inuenit, ſed *Syluius Galeni* Anatomem de uſu partium in Latinum ſermoem tranſtulit, & nouis inuentis illuſtrauit, quæ continentur in eius libris Anatomicis. Multa caſtigat *Hofmannus*, in *Guinterij* Inſtitutionibus Anatomicis, quæ nullam merentur cenſuram. Quod ſi legiſſet eius Anatomem renouatam, inſertam commentariis de veteri & noua Medicina, rectius iudicaſſet de *Guinterio Andernaco*, & hanc Anatomem examinare debebat. Nec poteſt eſſe adeo peregrinus in Medicina, & lectione librorum, vt ignorarit illos commentarios *Guinterij*: Ille in Præfatione ſuarum Inſtitutionum candidè proſitetur, ſe illas ſcripiſſe, vt veram Medicinam diſcentibus gratificaretur. Nihil hic ſcriptum eſt, quod *Galenum* non redeat, cuius doctrinam ex preſſiſſo imitatur, nihil aſſertum quod non ipſe videret: de ſe id non poteſt proſiteri *Hofmannus*.

## Defensio Syluij.

Deſiderantur in *Syluijo*, quod ſimiles partes ſearſum in alio libro explicare debet, non miſcere Anatomia, qua eſt doctrina de diſſimilariſſimis partibus, alterum quod toto libro ſecundo *Tabulatore* agit. *Tabula* perpetuo ſiuidant Cerebrum. Niſi *Hofmannus* ſnam eruditionem aliis libris declarafſet, hic delirare, vel nugari crederem. Liber Anatomicus *Syluij* reuera poſthumus eſt. ſed adeo breuiter & perſpicuè partes ſimilares exponit, vt nil ſuperfluum & erroneum occurrat. Muſculorum ſyluam, vel potius confuſionem in ordinem redegit, nominibus diſtinxit, & per tabulas ita diſpoſuit, vt vno intuitu tyro Medicinæ ſue Chirurgiæ, poſſit comprehendere: originem, & inſertionem venarum, arteriarum, & neruorum ſeriem & continuationem per tabulas ita deſcripſit ad facilitatem memoriæ. At minuta iſta non ſunt neceſſaria tyronibus: Attamen commendantur & præferuntur à *Galeno*, omnibus Medicinæ partibus, tanquam rudimenta & primordia, propædeumata, à quibus incipere oportebat. Nonne *Galenus* ſuos libros Anatomicos de uſu partium, & de adminiſtrationibus Anatomicis à muſculis exorſus eſt, in quibus atque etiam vaſis tyronem diligenter exerceri cupit, priuſquam ad viſcera, id eſt ad partes internas accedat, & dum muſculos ſearſim expoſuit *Syluius*, vaſa, id eſt venas, arterias, & neruos voluit more *Galeni* in vno cadauere ſpectati, vt in vno latere muſculi demonſtrentur, in alio vaſa. Fateor tamen librum tertium breuiorem eſſe quam par ſit, ideoque imperfectum, quia poſthumus eſt. Sed primus & ſecundus liber, vt utilitate ſua compenſant tertij libri deſectum.

*Defensio Fallopij.*

Quis non rideat, si Anatomicus fuerit, *Hofmanni* iudicium de *Fallopij* Observationibus, quem Anatomicorum Coryphæum, & Musagetem meritis vocabo, atque *Herophilo* assimilabo. Appellat Observationes Anatomicas scriptum *leui-dense*, quod cauda & capite caret: Quod est tale, quid sit parabantur à nobis Patavijs post *vis-sas sessiones*. At quæ à te notabantur, absurda erant, aut nulla, cum non potueris proferre ullam explicationem istius Aphorismi de Omento, in quo explicando vnam horam insumebat *Fabricius* ab Aquapendente. Ipse *Fallopius* in suis Observationibus ordinem *Vesaly* sequutus, eius errores emendauit, & quæ supra *Vesalium* obseruauerat, annotauit: atque vti nam sic omnes scriberent Anatomici ex voto *Galeni*, ut ea dumtaxat, quæ supra præcedentes Anatomicos inuenirent, scriptis traderent, vel quæ præuè scripta sunt, emendarent. Tale fuit votum *Carsani* Anatomici discipuli *Fallopij*. At ista displicent *Hofmanno*, qui si Anatomicorum correctionem non suscepisset, melius suæ famæ conlulisset.

Quod spectat ad *Bauhinum*, Germanus aliquis ipsum tuebitur.

*Exoriatur aliquis eius ex Offibus vltor.*

*Bartholinus* reliquit filium, suæ virtutis & eruditionis hæredem, qui paternæ iniuriæ ultorem & vindicem se constituet, atque vti nam *Hofmannus* falsa in re Anatomica redarguisset, totus est in Logicis quæstionibus, nihil de re Anatomica pronuntiauit.

*Iudicium de Hofmanno.*

Ut liberè dicam, quod sentio de *Hofmanno*, nimis liberè & licentiosè castigat omnes Medicos in suis Institutionibus Medicis, ut solus sapere videatur. Affectat gloriam rei Anatomicæ, quam ignorat, nisi mutuetur ex aliis, & mutet aliis verbis instar furis versipellis, qui lapidum pretiosorum capsulas transformat, ne furtum dignoscatur: non tali audacia usus fuerat in suis commentariis ad *Galeni* libros de *usu partium*. Modestius egit cum aliis Anatomicis: ac sane si expendantur, quæ castigat in *Bauhino* & *Bartholino*, pertinent ea tantum ad quæstiones Anatomicas Logicas, nihil de facto, aut opere Anatomico tractauit, quia non intelligit. Nec vnquam manum operi Anatomico admouit. Finio quia plura

*Scripta pudet rectare, & nugis addere pondus.*

Nolo inquirere in alios libros Anatomicos, ne videar *seuerus Aristarchus*, contentus ero isto examine Anatomicorum, quæ suis Institutionibus Medicis inseruit, tanquam rei Anatomicæ exemplar perfectissimum.

FINIS.



# ANIMADVERSIONES

I N

SYNTAGMA ANATOMICVM

IOANNIS VESLINGII

PROFESSORIS ANATOMICI PATAVINI.

## PRAEFATIONIS CONSIDERATIO.

**I**OANNES Veslingius postremus Anatomicus de re Anatomica scripsit, *compta & eleganti oratione, interdum obscura, quia terminis & vocibus usitatus non est vsus, usque ad caput de Peritoneo, ubi stylo Medico & humiliori capis scribere, sed vixit in locis eodem cothurno resurgit admirabilis. Notat se à communis fonte hausisse, sed suo vasculo, id est, ex corporis humani sectione & observatione propria suam Anatomem condidisse per tria lustra in gratiam discipulorum, & ad animorum recreationem, Iconas adiunxisse, quibus omnino non esse fidendum, & ex illis nequaquam ediscis posse perfecte Anatomem erudenter moneri. Attamen satis elegantes, & precedentibus meliores in multis iudico. In suo discursu nemini contradixit, nullius testimonium & auctoritatem produxit, & adeo caute & prudenter se gessit, ut nemo quidquam inueniat, quod possit redarguere vel redere. Ipsum sedulam in eo studio mansisse operam, non solum mirando, sed suam agendo, & administrando propriis manibus Anatomica, fidem faciunt, & professio Anatomica in celeberrima Academia Patavina, quam à 25. annis cum magna sui nominis celebritate sustinet & exercet: atque testimonium quod proferit decaderibus virorum, mulierum, etiam pregnantium, infantiumque in Theatro Anatomico publicè dissectis, adhibitis suam in auxilium & ministerium operis, doctissimis viris Bertoloneo & Virsungo, quos tamen è vitiis ereptos deplorat, quod aeterebus, metumque incutiet aliis, qui eundem laborem suscipere exoptarent. Vt autem probet suam industriam in administranda Anatomia, suam methodum particularem proponit, quæ seriem partium euoluit, quemadmodum in dissectione ipsa ad oculos manifeste sese profert. Ideoque cum sit alienum ac inutile pluribus perficere, quod pauciorum corporum dissectione consequi licet, in pectore adductorem humeri, seratosque scapulæ musculos ante demonstrat, quàm intercostales, si velis aperire pectus, undique resecto sterno ad cartilagineas costarum, & elevato, Pectoralis distrahendus est, quem relinquens adnexum brachio, sed possunt manere in suo situ laterali duo, maior & minor, atque resectis ad suum ordinem, ubi seriatim demonstrantur omnes muscoli. Lumbales musculos post dorsii extensores demonstrat, id series Anatomica postulat, scapulæ motores ante capitis dorsique musculos recenset, detracto Trapezio, qui cum suo pari integrit dorsum, cervicem usque ad occiput. Possunt musculi Capitis posteriori secari & demonstrari, sine elevatione Rhomboidis, si aliquatenus impedit, revellendus ab origine insinuat Trapezij, qui ad inflexionem affixos dimittet, linguam laryngi cum osse hyoide coniungit. Id rectè facit, quia hæc tria simul demonstrari, & secari debent. Nec vnum*



*sine altera potest ostendi. Ossa artuum ante musculos contemplanda exhibet. Atque prudenter agit, imò scaletum integrum & Ossa separata ad manum præcisa esse debent, & ostendit, sed sunt Ossa fixa: itaque post musculos omnes corporis demonstratos, ut Ossa rectius innotescant, in coxendice repositis omnibus ramulis, Ossa nuda sunt proponenda, ut facit Riolanus, & docuit in suo Encheridion Anatomico. Prudenter addit, se nervos, venas, arterias cum Ossibus & musculis demonstrare: sed ista vasa in altero latere cadaveris demonstranda. Nam muscoli ratione vasorum, si conservare velis, non possunt commode & munde refecari. Sed si velis bene consultum suis auditoribus & spectatoribus, omnes musculos à capite ad calcas, post demonstrationem Cerebri & Oculi persequetur, & in altero latere omnia vasa demonstrabit. Postea Ossa caruibus spoliata in eodem cadavere ostendet, ut sunt inter se reunita per ligamenta articulationibus intrusa & rubicunda, per alia ligamenta circumiecta, per cartilagineas intermedias, mobiles, seuunctas, vel Ossium extrema ambientes, & incrustantes. Postea medullas Ossium, cavitates, spinæ figuram admirabilem, medullam in formam cauda equina desinentem investigabis. Hæc omnia pertinent ad opertis Anatomici complementum, libere tamen fateor, ac libenter agnosco, & prædico inter Anatomicos quos recensui, nullum clarissimum Vellungio doctiorem, & peritorem in Anatomicis legisse. Lator plurimum, quod in multis ipsum habeam imitator, præsertim in musculis, quorum primas origines & insertiones, numerum, & nomina proposui supra præcedentes Anatomicos, & nomina accuratè ex libro Naturæ persequutus sum. Similiter ille ex fonte naturæ hausit, & suo vasculo: propterea nullo modo, vel in paucis, sumus dissentientes: Nisi mihi succubisset operti Anatomico, crederem me eius genio animatum, eadem scribere aliis verbis interpretata, tanta res est veritas in peritis Anatomicis. Propterea non Animadversiones, sed potius Scholia, vel interpretationes Syntagmatis Anatomici scripturus sum, parum gratiam, & Animadversionem amicam ab ipso præstolaturus, se se laesum sentiat.*

### Diviso Cavitatum.

Pag. **D**ivisio trium ampliarum cavitatum, est elegantibus verbis descripta, sed nonnihil obscura, ei qui nondum sacris Medicinæ initiatus est, quia non designat propriis nominibus partes in abdomine contentas, putà partes nutritias & genitales, neque in secundo ventre Cor, neque in capite Cerebrum, quâvis facile Medicus intelligat per fontem vitalis caloris Cor, per partem principem in capite Cerebrum, quamvis & oculus intelligi possit.

### De Cute.

Pag. **D**vbito, An alicubi incisa cutis à pinguedine statim deducatur, & barbato in leprosis curandis experimento, quia firmissimè coherent enter se. At penetrando pinguedinem, si inter pinguedinem, siue panniculum carnosum, & musculos in abdomine tubulus introduceretur, credo quod statim violenter impulsus, penetraret & pervaderet, ut fit in excoriatione animalium à nostris laniis, atque laxitas ista in tota longitudine spinæ observatur: hinc tot fluxiones à capite intercutaneæ, nec sine ratione bullata cutis in dorso, collo, Arabum more, affirmaretur, ac compingeretur cutis carnibus.

### De Adipe.

Pag. **E**legans ista comparatio adipis circumiecti ad conservationem caloris & spirituum, qui confertim exhalarent, ad oleum liquoribus superfusum. Sed præter istum vsum, credo esse emunctorium & spongiam totius corporis, & cum Hippocrates muliebri corpus dixit esse spongiosum, intellexit potius adipem, quàm carnes.

*Membrana Carnosa.*

Pag. 6. **M**embranz carnosæ non simplex est constitutio, eum in pinguibus corporibus sæpe duplex, nonnunquam multiplex occurrat. Id nondum observavi, simplicem semper inueni: occurrunt adipi intertexta filamenta membranosa ad colligationem, siue cohesionem substantiæ adiposæ ne diffusæ, forsan à cute manant, cui tenacissima adhæret pinguedo.

*Membrana communis Musculorum.*

Ibid. **M**embrana carnosæ interno latere musculorum partibus ossiumque ligamentis, ac membranis proxime conspicitur. Imò distat, quia interpositam habet membranam communem musculorum, quam inter partes continentes abdominis non enumeravit, ipsam subiecit, neque nominavit more aliorum Anatomicorum, quibus de nomine tantum fuit cognita. Hæc tamen existat, & à perito Anatomico facile separatur à musculis abdominis, quibus supertensa est, instat fasciæ omnes musculos complectens.

*Articulatio.*

Pag. 11. **O**ssium magna pars in sinus curvantur, obliqua loquutio, licet elegans, clarius, magna pars in externis excavantur.

Ibidem. In processibus lumbalium vertebrarum sunt obliqui quatuor, duo superiores, totidem inferiores, rectè, sed ratione articulationis clarius, superiores sunt declivius, inferiores acliues.

Pag. 12. Verè quidem scripsit, *vertebras lumborum inter se articulari per gynglymum*: sed addere poterat gynglymi speciem, quæ fit ex tribus ossibus, non ex duobus, ut in alio gynglymo, qualis est cubiti cum humero. *Anteriori unguuntur per harmoniam*, intelligendum de corporibus vertebrarum.

*De Osse Ilij.*

Pag. 13. **O**ssis Ilij extrema anteriori & posteriori que spina nuncupantur, quod verum est, quemadmodum conspicitur à lateribus prominentia, *supercilia & labra* isthæc particula est obscura, lucem addo restituendo costam inter spinas, quam omisit, cuius margines, siue prominentiæ supercilia & labra dicuntur: ista nomina à recentioribus indita sunt, ad distinguendas musculorum abdominis origines & insertiones, & ipse *Veslingius*, p. 14. in descriptione musculi obliqui descendens, mentionem facit collæ Ilij, nec extertus margo Ossis Ilij in origine intelligi potest, nisi costæ addatur.

*De hexu Ossium Pubis.*

Ibid. **C**artilago duobus ossibus pubis interiecta ad arcuam commissuram, est adeo robusta, ut non indigeat circulari, & membranosa ligamenta. Laudo tuum iudicium de diductione istorum ossium, & ossium Ilij ab osse Saero, modò non scribas in *difficili partu*, quia vidi in omni partu, ætiam facillimo, diductionem istorum ossium.

*Traductio processus peritonæi per foramina Tendinum.*

Ibid. **N**otabis, si placeat *Riolanum* primum indicasse traductionem processus peritonæi, & ligamenti torundi in mulieribus per tendines musculorum abdominis *circa inguina*, ut proposuisti: sed non declarasti artificium, quod perforatio illa non est in istis tendinibus directa, sed alternata, itaut incipiat à tendine obliqui descendens versus spinam anticam Ossis Ilij, dein digiti distantia perforatur tendo obliqui ascendens, postea iuxta inguem pertunditur tendo transversus, ita sunt perforati tendines, ne præcipiti lapsu rueret intestinum in inguen, sunt enim prius hæc effringenda foramina, vel dilatanda: Isthæc vberius exposita sunt in mea *Anthropographia*.

*Geminatus Tendo obliqui Ascendens.*

**Q**uomodo sit intelligendus geminatus tendo musculi obliqui ascendens rectum complectens, docui in mea *Anthropographia*.

*Musculus obliquè Descendens.*

Pag. **S**cribitur musculos obliquè descendentes sub serrato pectoris musculo maiore præcipuum trahere, dentatis productionibus. Potuisses dicere, utrumque musculus dentatis productionibus inuicem implexum esse: propterea infra musculus serratus situs est musculus obliquus descendens, qui æquè meretur nomen serrati, propter mutuam intertexturam firmam & stabilem ad exortum obliqui descendens.

*Musculus Rectus.*

Pag. **R**ectus musculus inscriptionibus binis, ternis, interdum & quaternis, in plures veluti musculos dirimitur: hoc falsum alibi demonstravi, sed prudenter agis, quia dictio veluti, nihil determinat, & litem remouet.

*An Lumbales Musculi ad Ventrem referendi?*

Pag. **A**ccenseri possunt infimi ventris musculi lumbales duo, Sacer & Quadratus, sed directus cum dorsi musculis deseguntur. Poterat alios musculos nominare sacrolumbum, & spinatum, qui sunt lumbales musculi, & constitunt cum vertebrae lumbales, & Osse Sacro, posticam partem ventris inferioris, videlicet orti ab osse Sacro.

*Processus Peritonei.*

Ibid. **I**n corpore virili considerabiles sunt peritonei processus, geminam item tunicam præbentes, quibus spermatica vasa cum testibus excipit. Imò processus peritonei unica constat tunica, quæ est externa, producta usque ad testem. Interna peritonei tunica ipsius ambitu coercita, non est perforata in pube, nec descendit ad Scrotum, ut demonstravi in mea *Anthropographia*; capite de Peritoneo. Atque hoc factum à natura, ad euitandum prolapsum intestinorum in inguen, vel Scrotum.

*Omissa Vasa Umbilicalia.*

**O**portet ordine Anatomico vasa umbilicalia quæ sunt duplicatura peritonei inclusa demonstrare, quæsi exstant, exsiccata, inter se vincta & vincta, constituunt nodosum umbilicum extra Vterum. Quando exsiccantur, suo vsu antiquo præiata, ut nunc, inferiunt pro ligamenti partis cuiusque ad quam pertingunt, &c. Eorum explicatio non debet referuari ad historiam Fœtus, quia hicaliter explicantur, attamen in Iconibus expressit.

*Omentum.*

Pag. **O**mentum glandulis conspersum, nunc paucioribus, spongiarum instar superfluis humiditates rapientibus. Nunquam obseruare potui istas glandulas, sed tantum adipem crassiorem & densiorem interfusum diuisionibus venarum.

*Omisit quandam partem Omenti.*

Pag. **Q**uamuis scripserit omentum duplex esse, tunicisque duabus inter ventriculum & Lienem, & intestinum colicum, non raro puri, serosis humoribus, statisque receptaculum præbere. Non tamen declarat magnam portionem omenti glomeratam, interiectam Lieni & ventriculo quam non ignorasse, sed neglexisse credo: Eius usum admirabilem à me declaratum, instar spongiæ excipientis sordes, inuenies in mea *Anthropographia*.

*Nervus sexta Coniugationis.*

Pag. **V**erus locus agendi de nervo sextæ coniugationis, atque demonstrandi eius progressum vsque ad tænes, est in demonstratione partium thoracicarum. Ideoque mesenterium separatum ab intestinis affixum dorso relinquendum, & cautè & delicatè reliquæ partes tractandæ, sibi proponendo huius nervi conservationem. Nec enim potest plexus iste conspici & ostendi, nisi remoueanrur intestina, vena porta quoque prius demonstrata fuerit: Nec recordatur etiam quæ dixit, *ferriem partium sic enucleo, quemadmodum in dissectione ipsa ad oculos manūque sese præfert*, quicquid faciat, totum eius ductum & continuationem non potest publicè in theatro demonstrare, nisi apertothorace, & multis partibus reuolutis, & dissectis, vel laceratis.

*Temperies Ventriculi.*

Pag. **M**ibi non probatur ista scriptura de ventriculo, *frigidum siccumque ventriculi* 27. *temperamentum, circumscriptum viscerum calore misceat.* Imò ventriculus potius est carnosus quàm membranosus, & eius temperamentum natium non nutrit calore viscerum circumstantium, sed fouetur & augetur ad cõctionis officium.

*Oesophagi, & Pharyngis Musculi.*

Pag. **N**omina musculorum pharyngis descripta à *Veslingio*, quamuis existant 2-28. *pud Spiegelium*, sunt ex *Rislando* deprompta, ideoque debebat dicere pertinere istos musculos sic nominatos ad pharyngem principium oesophagi, quem non descripsit, ne quidem nominavit proprio nomine, improprie enim dicitur gula. Ad do clarissimum *Vossingium*, non seruare suum propositum, quia in theatri orationem, siue explicationem partium, sequi debet demonstratio. At pharyngis & oesophagi demonstratio pertinet ad Anatomen, siue dissectionem partium thoracicarum. Nam in ventris Anatomicæ, non potest ista demonstrare, ergo non est ad vlium theatri comparatum istud Syntagma Anatomicum.

*Oesophagi Glandula.*

Pag. **O**esophagi inferiores glandula in thorace non dua, sed plures aspera arteria ramū 28. *accumbunt* Dnas notabiles quæ oesophago accumbunt, primus *Laurentius*, vt opinor declarauit, sed quomodo asperæ arteriæ ramis plures accumbunt, non video, cum sint per pulmones disseminati, nisi collocatas esse dicat glandulas intra pulmones, quas nunquam vidi, nec existare auidacter sustinco.

*De Carnosa tunica siu.*

Pag. **V**Idi & legi intimam intestinorum tunicam esse carnosam, mucō pituitoso 29. *tanquam crusta loricatam eo sine sic dispositam, vt erosā, transitione lordinum acrium, facilius repararetur.*

*Mensura Intestinorum.*

Ibid. **M**ensuram intestinorum in proprio corpore noluit definire, dum scribit, *aliquoties superans*, confidenter poterat asseruare septimam mensuram æquare, vel superare.

*An duplex interdum Ventriculus?*

Riolanus monuerat se interdum duplicem ventriculum obseruasse, & quo  
 30. modo id fieret, declarauit. D. Veslingius aliter explicat, *duos enim interdum laxitate & amplitudine insigni præditum esse, ut maiori ventriculo, minorem alterum addat*, sed omisit duplicem pylorum adesse, nempe priorem ventriculum constringi, vel in angustiam definere, quæ refert pylorum.

*Duodenum Intestinum.*

Ibid. **D**uodeni intestini longitudinem eandem esse, quæ veteribus statuit, neque diminuta esse corpora, itaque integra digitorum duodecim latitudine determinandum est. Ego verò dico istam longitudinem cum pyloro sub pancreate versus sinistrum hypochondrium perquirendam esse, vbi incipiunt contorqueri, & in principio flexus incipit ieiunum. Fateor in duodeno intestino, ad primum anfractuum à pyloro occursum, metiendam esse longitudinem primi intestini, sed vsque ad inflexionem & eleuationem ieiuni, quod transuersum iacens sub pancreate sursum assurgit, proptereaque à pyloro vsque ad istum terminum duodecim digiti repetiuntur, prout intestinum est transuersum instratum dorso.

*Ileum Intestinum.*

Ibid. **S**cribit ileum intestinum longitudine reliquis productius esse, quòd verum est, tum venarum & arteriarum multitudine conspectus, quod negabant omnes Anatomici, atque ipsemet Galenus.

*De Ilco Morbo.*

Ibid. **S**cribit ileum intestinum ruptis internis tunicis lethali voluulo ansam præbere, dato ea de re, obseruauimus insignem phlegmonem, & gangrænom in parte aliqua ilei, produxisse voluulum. Interdum reuoluitur intestinum instar digiti chirothecæ reduplicati, quod omnimodè obstruit viam intestini, inde vomitus excrementorum per superiores partes.

*Coli Ligamenta.*

Pag. **V** Incula, siue ligamenta coli intestini, sic describit, *vinculum, inquit, habet proprium, quo cellularum ordo continetur. Ligamentum iteò singulare, addeproctensum, quo superius inferisque partibus coniungitur.* Contrà, ista duo ligamenta lata per longitudinem intestini excurrentia, sunt apposita ad robur membranarum, quæ statibus distenderentur & laxarentur, cum nullum aliud statuum conceptaculum natura creauerit præter colum intestinum. Admitto quidem à latiore ligamento formari cellulas, sed superius inferisque partibus coniungitur per adhesionem peritonæi.

*Motus Peristalticus.*

**M**iror à Veslingio motum intestinorum peristalticū prætermissum, de quo multa proferri possunt ad usum artis necessaria, de quibus à me adibi actum est.

*Leuatores Ani.*

Ibid. **L**euatores musculi in viro, penis radici, in femina Vteri vaginæ sese iungunt. Verum est in femina, sed falsum in viro, nisi intelligat Vrethram reflexam ad finem

## De Pancreate.

Pag. **P**ancreas quod antea neglectum fuerat, & de quo pauci priores Anatomici dixerant. Primus ei *Riolanus* vltum insignem ex *Fernelio* tradidit, vicarium Lienis viscus appellauit, Iecoris & Lienis spongiam, & emunctorium esse probauit. Recentiores Anatomici accuratiores, nouos vltus inuenere. Laudo diligentiam *Vessingij* in explicando pancreate, de quo plura scripsit, quàm de nobilioribus partibus, chylo enim attenuando & depurgando, adeoque Iecori Lienique præparando deputat: quæ hæcenus necatum mansuetorum communio nondum obseruata fuerat, tamen exflare putas ramulos, qui aqueam chyli portionem Lienis suppeditent. Ergo ex eius opinione Lien peculiarem conficit sanguinem ex chylo pancreaticis, quod est absurdum: Alij venam splenicam id officium implere credunt, alij artetias cœliacas. Vtrumque tamen falsum, vt demonstraui in historia Lienis.

## Origo Lactearum Venarum.

**O**riginem lactearum venarum repetit à pancreate, tanquam fundamento & seminario furcularum, & quamvis non habeant ramulos truncum, natura voluit istos ramulos disponere in pancreate, ut in Cerebro nervos distinctis intervalis produxit. Ergo pancreas novum est viscus ex doctrina recentiorum, quod ex se producit vasa propria, quod non præstat Lien, altera hæmatoleos officina, si quibusdam creditur.

Pancreas permeare arteriam cœliacam sinistram existimat, quod tamen falsum est, cum nulla reperitur arteria intra pancreas, sed extra transuersim imposita dorso iuxta diaphragma, ambagiosa, pertendit ad Lienem, vt primus obseruauit *Aranzius*, in *Observat. Anatom.* & hæc vel est separata, vel portio Cœliacæ, in suo exortu ab aorta descendente.

Chylum in pancreate perquirendum esse notas spirante adhuc animali, & si cuspidi cultri fauiscietur, largietur ipsum effundere, si id visum, concedo chylum eò deferri. Non credo valvulis venas lactæas præditas esse, suscepti liquoris ad intestina regressum impediendibus. Nam sunt adeo exiles, & facultas Hepatis attractrix adeo potens, vt non opus sit istis obiebus adeo obscuris, & inaspectabilibus. Sed mireor partem adeo necessarium Iecori & Lieni, sordium istarum partium esse receptaculum ex *Vessingio*.

## De Canale Pancreatico.

Pag. **Q**uod spectat ad canalem in pancreate repertum à *Virsungio*, satis excrementum biliosum ipsius pancreaticis excernere in intestinum, & cum pancreas hæcat arte cum intestino duodeno, ex eo magnam chyli portionem elicit. Quod si verum est, ergo vascula ipsius Pancreatis affigi debent instar hitudinum ipsi intestino. Quidni per canalem istum *Virsungianum* largitet exurgeret.

Cum primum iste canalis inuentus fuit à *Virsungio*, & depictus, ea de re, & e-pistolam, & picturam ad me misit, meum iudicium sciscitaturus. Vtrumque referam, & ex manuscripto describam.

**R**ecordatio etiam in distanti piam renouat amicitiam, ita mihi contigit, *Vir Clarissime, Amplissime, & olim Præceptor*, mihi æternum colendissime, licet per 23. annos continuos, clarissima tua præsentia, & prima luce mea Anatomica priuatus sim, non possum tamen, quin omni tempore, præsertim eo, quo primitus doctrinâ tuâ & demonstratione lucidissima instructus & imbutus fuerim, tui piissimam recordationem, & mentionem faciam, simul & beneficiorum tuorum in me collatorum infinitas tibi recenscam gratias, undæque fidelitatis tuæ stigma animo meo impressum renouem. Quod tibi attestabitur

Clarissimus Vir, & quondam meus Præceptor Gaspar Hofmannus, Professor Altorffienſis. Cuius ſtimulo hiſce paucis te moleſtare, ut ante feci auſim. Non minus clariffimus & mihi familiariffimus vir Paulus Marquartus Slegel, Profeſſor Ieneniſis, & omnis is, qui ex Schola veſtra Pariſienſi ad noſtram P'atavinam peruenit, quod præſtare poteſt doctiſſimus vir harum lator. Rogavi namque a clariffimo Hofmanno, ut & ipſe à te faceret, petij ſententiam de uſu & actione ductus cuiuſdam in Pancreatè nouiter reperi, ſed cum à neuro bucuique quidquam impetraverim, non niſi magna diſtantiæ loci, & tranſmiſſendarum litterarum difficultati adſcribere poſſum. Naſta itaque bona hac occaſione per præſentem harum latorum humillimè repeto, & ut olim, ita & nunc, ad verum fontem, & principium, unde capì recurro. Ductus præſatus, cuius Icones hic habes, in hunc modum ſe habet, oriſcium aut principium, ſi ubi maior truncus ibi principium dicere liceat, amplum ab inteſtino duodeno iuxta cholidochon deducit, ſtylum ab inteſtino pancreas verſus diffiſculter, ab hoc vero in inteſtinum facile admittit, & per medium in uniuerſum pancreas, ſecundum longitudinem verſus Lienem abit, infinitas ramificationes & minimos tandem ſurculos latere tenus ſupra, infra, & ſubtus vaſa ſpleniæ, per iſum pancreas repentiæ de ſe ſpargit, Lienem non adit, quem reperi aliquando, tam in humano, quàm brutorum ſubieſtu duplicem, breuem in loco ſolito, & longum infra paulò. Item reperi eundem non ſolum in corporibus humanis adultis nuper natis, & foetibus. verumetiam in ſimus, canibus, catu, ſuibus, gallinis, muribus, ranis, imò in omnibus, in quibus diligenter inquiſiui. Arteriam an venam dicam? ſanguinem nunquam in eo deprehendi, ſed ſuccum quendam obſcurum, ſtylum argenteum inſtar fellis tingentem. Res in Aprico eſt, quidnam ſit, & quem uſum & actionem habeat, quoniam me lateo, ideoque cenſura & iudicio tuo humiliter ſubmiſſo, cogitans, ut ſi quid certis hac de re conſtitueris, pro ſolita tua humanitate & beneuolentia mihi aperire non dedigneris, partim ut veritas eluceſcat, quam ſemper intrepidus protuliſti, partim verò ut hoc pacto nominis tui celebritatem magis adaugere poſſim, quod me facturum ſpondeo, quoad manus mea à te inſtruita, cultillos regere valeant. Plura ne nimium moleſtus ſim non addo, niſi ut valeas, & diſcipulum olim tuum redamare non deſiſtat. Datum Patavij 7. Iulij, 1643.

Excellentiæ tuæ

Omni Studio & Obſervantia,

IO. GEOR. VVIERINGVS.

ERVDITISSIMO MEDICO, ANATOMES  
 & Chirurgia Professori peritissimo D. Virsungo, Ioannes  
 Riolanus, Regina Matris Exarchiatros, Anatomes &  
 Pharmacia Professor Regius, atque Professorum Collegij Re-  
 gij Decanus.



EVOCAS me ad studium Anatomicum, quod per deceoniam inter-  
 miseram, accitus ad Aulam Reginae Matris, fungens officio primarij  
 Medici: miserabilem eius fortunam sequutus, in diuersis peregrina-  
 tionibus, atque in aula turbulenta, mihi non licuit Musis Anatomicis  
 tranquille litare, cum essem distractus à theatro Anatomico Pa-  
 rificensi, & mea iucundissima Bibliotheca, quæ nunc est meæ feneſtræ solatium, &  
 oblectamentum. Ideoque tua inuitatio mihi gratissima est, ad perſcrutandum iſtum  
 canalem in pancreate à te repertum. Ac ſane oon poſſum non laudare tuam inſtriâ,  
 ac ſolertiam in rebus Anatomicis indagaodis, qui deprehenderis, quod manus meas  
 oclatas in contrahendo ſæpius pancreate effugerat, quamuis monitis fuerim à *Fal-  
 lapi* repertas à ſe in pancreate venulas proſus ab Hepate ſeparatas, deſcendentes olea-  
 ginolum humorem, quo pars ipſa ſcatet, & turget. Figmentum *Fallapij* olim iudi-  
 caui, & ita ſcripſi in mea *Autropeographia* Gallica auctiore ex Mantiffa, quam tradu-  
 ctiori ſubminiſtravi: animaduerteam quoque intra pancreas plures venas hinc inde  
 ſparſas, quas primus vocauit *Pancreaticas*. Sed Leon à te delineata canalis pancreatici  
 propagationem æcuratè demonſtrans, me cogit prædicare tuum admirabile in-  
 uentum, ad cognitionem & curationem morborum hypoehondriacorum vtiliſſi-  
 mum, quod meritò poſſum æquiparare, imò præferre inuentioni venarum lactearum,  
 abſque vllò *Aſſilij* Medici præſtantiffimi & Anatomici præiudicio, vt paucis ex-  
 ponam. Suppono conformationem iſtius canalis talem eſſe, vt depinxiſti, nec enim  
 adhuc licuit eum obſeruare in cadaueribus ſuſpenſorum, vel in noſodochiis publi-  
 cis ob æcis inquinamenta: hoc poſito, aſſeuero verum pancreatis vſum à nullo Ana-  
 tomico, præterquam *Fernelio*, fuiſſe probè cognitum. Hallucinantur enim omnes,  
 dum culcitram ventriculi eſſe dicunt, alij fulcrum venæ Portæ & ramiflænicij, alij  
 ſpongiam vapores culinz abſorbentem. Doctiſſimus *Virſungus* exiſtimat pancreas  
 chylum antè præparare iecori, quam diſtribuat, & ad pancreas chyliſeras venas  
 coire, inde in Hepar deſerri. Itaque canalis tranſuerſim ſitus, & immaerſus pancrea-  
 ti, & perforatio in inteſtinum duodenum iuxta foramen ductus bilarij, maniſeſtè  
 demonſtrant ad eoſdem vſus verumque canalem conditos fuiſſe, vt enim bilarius ab  
 Hepate directè productus ad inteſtinum, bilem craſſam ex radicibus portæ, vel ca-  
 uis partibus Hepatis ſecretam deducit, ſic alter ramus craſſiorem, viſcidam, ac pi-  
 tuitæ permixtam bilem ex chyloſecretam à pancreate repurgat, & excernit in eodem  
 inteſtinum. Propterea Pancreas in uocetiorum Hepatis & Lienis appellarem, quia  
 chylum per eius ſubſtantiam traductum deſecare ſolet. Nec enim chylus vaſis ex-  
 cidit, ſed in ipſis manet, parenchyma glanduloſum pancreatici recipi, colligit hinc  
 inde diſperſas venas lacteas, & à chylo ſordes exſugit, niſi fuerint à meſenterij glan-  
 dulis attractæ, vel in adipem diſſuſæ. Quod ſi per canalis pancreatici foramen chy-  
 lus eliceretur ab inteſtino duodeno, hæc duo incommoda luccederent, vel cum chy-  
 lo ſe ab Hepate continenter fluens ad ſe raperet, ſicque chylus inquinaretur, vel in  
 vomitionibus coactis elicitur humores à folliculo fellis, & ab Hepate ex violenta cõ-  
 cuſſione, ac veluti conuulſione ventriculi, qui vicinas partes exagitar, excuteret, ſi-  
 militèr chylus rubefactus ab ipſo pancreate educeretur magna copia: At hoc non  
 obſeruatur, imò cum varietas humorum per vomitum reiicitur, non poſſunt ab iſſe-  
 dem locis iecoris & folliculi manare: Lien verò non poteſt expurgari vomitu, niſi  
 per vaſ breue, ſi fuerit amplum, etiam aſſuetum vacuandis ſordibus, aliqui vena  
 eſt nutriendo ventriculo dicata. Ergo pancreas ſuppeditat magnam portiohem iſtius  
 humoris varij & multiplicis, qui vomitu reiicitur, per iſtum canalem io duodenum:



inde ruit in ventriculum, sicque facilis ac brevis est via expurgandæ illiusci primæ regionis, quæ in cauis partibus Hepatis, Pancreate, & Liene cumalata firmiter in hærefcit, quando est appaia ad excretionem, natura viam istam monstrante, vel fortibus eliquata, fluxilis reddita fuerit. Atque ita febrium diuturnarum malignarum, atque chronicorum morborum formes, qui delitescēbat in Pancreate eruitur, atque excernitur per vomitum, qui quidem humor nullo morbo cedeat medicamentis per inferiora vacuantibus. Hæc mea est de vsu Physico, & Medico, canalis istius Pancreatici sententia, quam tuo & peritorum Anatomicorum iudicio subicio.

### Color Hepatis & Sanguinis.

Pag. 40. **A**lbicat quidem Iecur ratione primæ texturæ ex filamentis, ideoque nonnulli Iecur naturæ suæ albicare crediderunt, deinde flauescens diutius conspicitur, non audet adhuc affirmare adscititium esse illum colorem à sanguine in Corde elaborato: idque tamen probat ex iecinoribus animalium diuersi coloris à sanguine, quamuis in venis rubicundus contineatur. Ergo sanguis istum colorem rubicundum transeundo per Cor induit.

### De Vesicula Fellea.

Pag. 42. **R**esse describit secretionem, & expulsionem duplicis bilis, quia bilem & vesicula dumtaxat, statim temporibus natura expurgat: At quotidie & paulatim rella via ab Hepate per porum biliarium ampliore, deferitur ad intestinum duodenum, ut viuentium animalium dissectio confirmat, atque tuæ opinioni libenter assilipulor, quam copiosè demonstrauim in mea *Anthropographia*.

### Vtilitas fellea bilis.

Pag. 43. **V**aldè dubito de vtilitate huius bilis excrementitiæ, quam assignat *Veslingius*, his verbis. Quod si iusta natura lege dispositum corpus est, calidus hic atque aris humor, & chylum a putredine tuctur, & facilem excrementorum expulsionem voboribus intestinis promouet, ex quo tum firmior valetudo, tum vita longior consequitur. Memini tamen aliquid simile proposuisse de bile coërgita in capitulo fellea, capite de Vesicula fellea in mea *Anthropographia*.

### De Liene.

Ibid. **L**ienem existimas chyli partem agnoscerem quidem, sed admissa portione terrea lutulentam in sanguinem commutari. Miror, quomodo id tueatur, cum non possit assignare vias, per quas deferitur ista aquosa & lutulenta chyli portio ad Lienem, incomptas & inspicitabiles esse fassus est.

Ibidem. Vnicam assignatunicam Lienem à peritonæo productam, cum tamen propagatio & extensio non possit demonstrari, ut in Hepate. Propterea facile sua sede dimouetur, & in ventrem inferiorem procumbit.

Ibidem. Colorem Lienis tribuit chalcanthino salt, in attracto liquore dominant. Ergo dissimilis iste sanguis, ab illo Hepatis: rectius dicetur absque terminis chymici, pendere istum colorem Lienis ab humore melancholico, qui per varios aduersionis gradus immutatus, diuersos colores Lienem imprimit. Nec probo Lienem, sicut aliterum, non officio minus, quam schemate representari. Dissimile prorsus officium, vtiusque diuersa substantia, diuersa constitutio naturalis, & contra naturam, quæ differentiam vtriusque visceris declarat.

Pag. 44. Fateor quidem ex doctrina Hippocratis & Aristotelis, splenem allicere tenuiorem succum, & superfluum ex ventriculo vicino, & sæpius connexo, non per exudationem, sed per venas manifestas. Miror, quomodo fuerit ausus scribere, contra doctrinam omnium Anatomicorum veterum, & recentiorum, per venam splenicam, & ab ea productos ramos, nihil ad Lienem deferri, ut abunde viuentium animalium dissectio, atque in his insignita vasorum ligatura patefecit. Id excipit ex Epistola Valis de Circulatione sanguinis, quod experimentum impossibile est facere, sine rptione va-

## Animaduers. in Ioannis Veslingij Anatom. 815

forum propter venam splenicam inclusam Pancreati. Atque hoc fauet opinioni *Hartui & Valui* de reuersione sanguinis à Liene ad Hepar. Ideoque *Veslingius* aliter debebat declarare vsum istius venæ splenicæ, quod non fecit. Laudo quod refutaret quorundam opinionem, qui contendunt per arterias coeliacas quæ tendunt ad Lienem, portionem chyli deduci, qualis est *Hofmannus*. Itaque cum nulli sint mentis, quibus chylus ad Lienem deferatur, frustra asseritur confectiōi sanguinis opitulari, nisi in casu necessitatis, vt opinor, deficiente Hepate, atque tum vena splenica attractum chylum per venas mesaraicas transmittit ad Lienem: Nam defectu lactearum venarum, in subsidium veniunt mesaraicæ. Sed is sanguis confectus in Liene, impurus est, & valde ineptus alendo, quia suis excrementis non est probe defæcatus, vt sanguis in Hepate.

### De Capsulis Atrabiliaris.

Pag. **V**eslingius, vt faucat *Barbelsino*, descripsit, & depinxit glandulam renalem, tenem succenturiatam, & capsulam atræ bilis appellat, nulla tamen facta mentione authoris, qui capsulam atrabiliariam primus vocauit. Verique glandulæ vnas, arterias, nervos sedulo & curiosè perquisitos assignat: sed magnitudo vtriusque distat, quæ nucem vomicam frequenter adæquat, si corpus ætate prouectius sit, hæc omnia diligenter notata, mihi dubitandi non leues causas adferunt: Nam ea ætate grauioribus esse deberent, quæ magis luxuriat atrabilis, leuem obtruncat canitatem, color rubicundior existit, nunc adipi circumfusæ similiter. Ergo glandulæ non sunt tinctæ isto nigricante humore nisi intus, sed quæ ex ipso *Veslingio*, pag. 88. cur etiam glandulæ, quæ succenturiatas vocat, magnitudine in *Fetu* mirabiles sunt, quo tempore non dominatur humor atrabiliaris, non accumbentes renibus, vt sit in adultis, sed ipsæ incumbentes partemque superiorem lato veluti sinu complectentes. Hæc stratura destruit vsum illum à *Barbelsino* assignatum. Atque prudenter dixit *Veslingius*. Quis illarum sit vsum, humana mentis coniectura nondum satis cepit: nam & trallum seris humiditatis adiuuare credantur, atræque bilis particulam recondere, quæ coaguli instar, seri à sanguine separationem promoueat. Eleganter expressus vsum & actio istius glandulæ renalis, si verus esset. Nam si ex fugit a sanguine, atræ bilis particulam, vt condenseret in coaguli formam, ad separationem seri à sanguine, vsum ille valde noxius esset vitæ humanæ, quia ferescens sanguis corrumpitur, & venenum est: debebat addere istud coagulum in renes influere, & ibi serum à sanguine separare. Sed quo fine istæ papillares carunculæ renibus intrusæ, nisi ad secretionem seri, à sanguine & benè tronato, se non è vero.

### De Superficie Renis.

Pag. **Q**uamuis multa cadauera dissecuerim, nunquam vidi, quod obseruauit *Veslingius*, sapius renum inaequalem superficiem è compactis veluti glandulis, vt in *Fetu*, sic in adultis reuincere. Nam post septennium vel ocyus, supra istas carunculas quæ componunt renem, accrescit, & inducitur carposa substantia, æquabilis; instar corticis carnosæ.

### De Vesica suspensione.

Pag. **N**otat quidem vesicæ fundum ab Vracho, & umbilicalibus arteriis in ligamenta conuersis suspendi, ne ab incumbentibus intestinis comprimeretur. Debebat addere duplicato peritonæo inclusam esse vesicam, vt firmior esset illa suspensio.

*An Vrachus inferuiat vesica vacuanda?*

Pag. 54. **C**ontingit aliquando fortuitorum violento occursa, ut laxatus Vrachus etiam in senescentibus, vrina calculisque infectam per umbilicum viam præberit. Non video, quomodo id fieri possit, cum ex *Verulmij* opinione, in Fœtu sit tantum porosus, vixque permeabilis, & edito in lucem fœtu in ligamenti soliditatem compingatur. Verisimilius est per fundum vesicæ duplicato peritonæo incluse, vlcera- tum, aut erofum, intra duplices membranas peritonæi, secundum ductum Vrachii effluere vrinam per umbilicum. Si casum sit fundum vesicæ versus inum ventrem, calculos etiam extrahi, & eiici posse credo, atque hæc operatio olim tentata, & nunc administratur satis feliciter.

*Quo ordine demonstranda Vena Cava & Aorta descendens.*

Pag. 55. **I**nter venas & vesicam publico dissectionum ordine sic ferente, & observatione dis- signisunt vena Cava, atque arteria magna descendentes trunci. At soleo secare re- nes, omnesque Anatomici id faciunt, qui manum adhibent operi, ante demonstra- tionem, & dissectionem renum, iuxta effusionem sanguinis quæ tam accidit, vel vno orationis filo, Profcissor Anatomicus ista recitat, non se accingit ad dissectionem & demonstrationem.

*Anastomosis Venarum Lumbalium cum spinali medulla.*

Ibid. **V**etus est, & à me notatus occurfus, siue Anastomosis lumbarium venarum & artiarum penetrantium in spinalem medullam, cum ramis iugularis internæ & carpidis descendentes deorsum, supra spinalem medullam vsque ad lumbos, inde ille consensus & communicatio partium genitalium cum Cerebro, in viro, quàm in muliere.

*De Vena Epigastrica.*

Pag. 55. **E**pigastricam venam duplicem in muliere primus demonstrant. Vnam quæ fer- tur ad Vterum, alteram quæ assurgit vsque ad musculum rectum, suntque sibi oppositæ, ex eodem ramo Iliaco prodeuntes, inde rectus excursus laetis à mam- mis ad Vterum.

*Vasa Spermatica.*

Pag. 61. **N**on improbo vasa spermatica seminalem materiam deferentia, qualia sunt venæ & arteriæ simul implexæ reticulari forma, & membrana ob- uolutæ, pyramidalia corpora vocari, siue pampiniformia, sed non comparet isthæc in- textura vasorum seminalium, nisi reuulsa membrana, atque corpus istud pyramida- le, ex *Galeo*, parastata est circoïdes.

*Epididymis.*

Pag. 62. **E**pididymidis officium est sanguini in vasis preparantibus, & pyramidalium ca- pæulis nonnullis immutato, semini rudimentum præbere, testibusque ad ulterio- rem perfectionem transmittere. Crederem potius in testibus admissum semen exsugere, & attrahere iuxta insertionem vasorum deferentium, cum sint epididymides prin- cipia vasorum eiacularantium.

*Membrana Testis.*

Pag. 62. **S**cribis testes cingi membrana propria, densa & valida, quam ob coloris speciem al- bugineam vocant: hanc solum tribuit testis corpori. Attamen internam aliam ad- mittit, quæ testes immediatè contingit, cum *Russo* neruea dicenda: istæ duz debent accipi pro vna eademque tunica. Alias tres constituit, pag. 63. prius vasis testibusque cir- cumdatas, nempe elithroidem, aliam erythroidem, tertiam nerueam, iam exposi- tam, quæ testes immediatè contingit. Ergo quatuor erunt membranz propriæ, præ- ter Scroti cutem duram, quod est omnino falsum: Nam albuginea & neruea sunt ex- dem, ut dictum est: Rectius distinguerentur tunicæ in communes & proprias.

Ibidem.

*Ibidem.* Testes non idcirco influentis cuiusdam calidi fontes habendi, propter mutationes, qua perditis illis contingunt, circa vocem, totiusque corporis temperamentum, & robur, non tam infusi caloris, aut influentis à testibus defectum, quam eiusdem copiosa materia, qua faessere in semen debet, oppressionem arguunt. Noua quidem hæc opinio. sed nequaquam admittenda: Nam materia feminis non est alia, quàm sanguis ab emulgente, & vena Caua depromptus, & per arterias ab aorta: Si semen à toto deciduum, id fit ratione spirituum, non materię feminis ab omnibus partibus decurrentis ad testes: Mirabilis est consensus testium cum pulmonibus & thorace, declaratus ab Hippocrate, & illustratus ab Andrea Laurentio in opere Anatomico.

### *De Capsulis seminariis.*

Pag. **V**erum est semen contineri in testibus, sed in capsulis & prostaticis perfectionem ultimam consequi, non credo. Nam in capsulis humor tantum oleaginosus, quo perpetuo inungitur Vrethra, generatur, & ille simul cum semine puro & vero confunditur: dubito an sit excrementum veri seminis, quod eo ablegatur à testibus. An ibi generetur ex multiplici & admirabili contextu venarum & artieriarum, quæ istas capsulas amplexantur, & ita contegunt, vt non compareant, nisi remotis istis vasculis: præterea capsulæ seminales, & prostaticæ, inter vrinam & sterus collocatæ, potius ab istis sordibus detrimentum, quam perfectionem semini adferrent. Seminalis materia corporea, quæ alimentum est ipsius seminis prolifici in congressu exilientis, & eiaculari à testibus, simul effunduntur in sinum muliebrem, excepti feminis veri, ac retenti facultas prolifica, siue genitrix, beneficio spirituum ex materia illa corporea in capsulis congesta, vel in prostaticis effingit, formatque corpusculi humani lineamenta, siue stamina, quibus postea aduenit subtegmen ex sanguine materno.

### *Cremaſteres Musculi.*

Pag. **O**riuntur musculi cremaſteres à ligamenti Osium pubis. Nulla sunt in Osse 64. pubis ligamenta, iunguntur inter se per symphyſim mediante cartilagine, enascuntur isti musculi à spina Ossis pubis, vel sunt portiones musculi obliqui ascendents, carnosi iuxta Os pubis:

### *Iterum de Capsulis seminariis.*

*Ibid.* **S**cribis capsulas seminales meatu singulari ad Vrethram principium peruias esse, in quod partem seminis dilutiorem propellant. Vbi quæſo crassior seminis portio continetur? Non explicas. Extremum spermaticorum obiscent eiacularia vasa, quæ & prostatica glandulosi nuncupantur, quia sunt contermini capsulis seminariis, ab his semen accipiunt, quod aut qualitate moleſtum, in canalem virilis membri exprimunt, allaborantibus pariter vicinis musculis. Non exponis, quale semen excreant, an crassiorem partem, nec quinam sint vicini musculi allaborantes: debebas designare musculos penis, sed capsulæ seminarie meo iudicio continent oleosum & viscidum humorem quo madet Vrethra, isque fluit in tentigine virgæ, sine eiaculatione veri seminis, quod partim reconditur in prostaticis, partim eiicitur per vasa eiacularia subtilissimum, in ipso uero directè profluens à testibus ac impetuosè.

### *Membrana Vrethra.*

Pag. **P**enis duplicem habet membranam intus nigricantem, quod antèr 65. ius golum, vt inſerui queat in coitu, cum ligamenti penis, Musculi Vrethræ, non tam à musculo ſphinctere ani emergunt, quàm à tranſuerſo ligamento vtriuſque coxendicis, cui firmiter adhærent, non dilatant Vrethram. ſed veſiculas ſeminales in peritonæo collocatas comprimunt, & guttas vrinæ & ſeminis propellant, ideoque acceleratores dicuntur.

*Valuula Vresbra.*

Ibid. **M** Alè describis in principio vreshæ valuulam, est Verruca, siue monticulus carnosus, qui diuidit orificia, siue foraminula vasorum eiacularantium, & iuxta adfunt pori alterius materię feminallis à prostaticis compressis effluentis, vt conspicitur in cadaueribus.

*Noua doctrina de partibus spermaticis.*

**A** Gnoscio in partibus genitalibus post epididymidem, nouam doctrinam, in reliquarum partium serie & appellatione. Nam principium vasis seminalis materiam è teste deferentis, quia varicosum, *parastatam varicosiformem appellauit*, continuationem vasis ascendentis supra Os pubis, & deorsum reflexi circa cololum vesicę, vocas *vas deferens*, in eo loco statuis capsulas seminarias spermaticorum extremum obtinentes, *vocas eiacularia vasa, quę & glandulosi prostatici dicuntur*. Peruertis antiquorum & recentiorum doctrinam de partibus spermaticis, & nomina partibus ad libitum adaptas, vt legere est apud Galenum, Roffum Ephesium, & alios recentiores Anatomicos. Nam ex aliis, prostaticę circoides sunt extremitates vasorum præparantium, & deferentium seminale materiam ad testes, epididymis est testis transuersim supertensa. Ab vno extremo epididymidis vas emergens, & superne reflexum, est vas eiculatorium, cuius extremum bifidum in corpora glandulosa inseritur, quę prostaticę dicuntur, vel parastatę adenoides. Alterum extremum vasis eiacularantis attingit vesiculas seminales. Atque hæc est vera continuatio, & appellatio partium spermaticarum.

*Testes Mulibres.*

Pag. 71. **N** Otas, testes muliebres glandulosa substantia, imò ex pluribus vesiculis simul iunctis sunt contexti, in quibus serosus humor coëctetur, & dissectis erumpit impetuosè in faciem prope spectantium. Ideoque fateris pag. 77. testes femininarum materiam à præparantibus vasis susceptam, in liquorem aquoso lacti per similem conuertere.

*De Vasis Spermaticis Mulieris.*

Pag. 71. **I** D ex Riolano depromptum, *hypogastrica vasa, spermaticis vasis infra & supra uterum innat*, interdum deficiente arteria spermatica, supplet eius officium hypogastrica, quod est notabile.

*Vnde Humor circumfusus Fætui.*

Pag. 72. **N** On possum probare quod assentras, aquosum humorem tenello Fætui circumfusus, à testibus mulieris emanare: Ergo generationi & conformationi Fætus inutilis erit, & si effundatur in Vterum, non potest non corrumpi, & varia symptomata, quibus vexantur mulieres inferre, quin etiam nocere Fætui, & quo modo circumfusus, nisi subeat penetretque membranas, quibus obuoluitur.

*Cornu Vteri.*

Pag. 73. **T** ubulus nervosus, qui reperitur intra tubam, siue cornu Vteri, inuentum est Riolani. Quod de semine contento intra tubam Vteri proponis, id etiam prius obseruatum à Riolano, supra alios Anatomicos. Plura de istis cornubus dicerem, nisi in mea *Anthropographia* essent accuratè explicata.

*Duplex materia seminalis in Muliere;*

Ibid. **F** *Aterū secundas mulieres spermaticam materiam consistentia, sine habitu duplicem, in partibus spermaticis fouere, aquosiorē qua Vteri partes laxat, Fœtumque reficit, ac conseruat, tumescipulentiam in tubis, qua ad Fœtus constitutionem requiritur, utrique semini permiscetur. Viraque materia à tuba Vteri proficiscitur. Ideoque post Fœtum conceptum affluens corrupta suffocabit Fœtum. Cur non in homine duplicem materiam feminalem agnoscis, aquosiorē, quæ fuit in æstu & cæstro venereo, agitatius partibus spermaticis, fluitque lacrymante pudendo, alteram crassiorē & prolificam, quæ manat à testibus in actu venereo.*

*De mirabili substantia Vteri in gravidis.*

Pag. 74. **V** *Alde probo quod scripserit, membranas Vteri intercedit, quæ secundum proximamque cernicem, ambiunt carnosum contextum, qui post Fœtum conceptum, affluentium humorum obertate spongia in modum imbutus, sensimque laxatus, mirabilem in Vteris gravidis crassitiem efficit. Id primus animaduertit Araninus, & probauit Riolanus, ex quo mutatis verbis ista deprompta sunt.*

*Diductio Ossium pubis in partu.*

Pag. 75. **L** *Audo quod approbaueris Ossâ pubis, & Os Sacrum cum Ossibus Ilium diduci in partu absolute, non difficili, vt antè dixeras.*

*De Ligamento rotundo Vteri.*

Ibid. **Q** *Vad proponis de ligamento rotundo Vteri, id totum prius obseruatum à Rioloano, quamvis suppressio nomine descriptum à Spiegelio vel Baerretio. Est enim eiusmodi ligamentum à te nominatum vermiforme, rectius lumbricale diceretur, cauum atque humoribus interdum refertum, ac distentum circa inguina: Attingit Clitoridem, quæ confricata propter ligamenta Vteri vicina, in lasciuia mulieribus tentiginem excitat, seminisque profusionem. Per eiusmodi ligamenta materia bubonis veneret deponitur ad inguina. Sed non eredo clauso Vteri osculo feminalem materiam ex illius cavitare, ad anteriora pudendi excerni: atqui hoc ridiculum: debebas potius dicere ad interiora pudendi excerni si in vaginam pudendi ligamenta hæc penetrarent, quod falsum. Sed errandi occasionem dedit Spiegelius. Interea notabis ad egressum huius ligamenti non esse perforatum peritonæum, sed intra duplicaturam peritonæi traduci, vt virorum vasa spermatica, venæ & arteriæ cruales atque nerui.*

*Tuba Vteri.*

Pag. 76. **I** *N mulieris Vtero, vt in belluino, cornua æmulantur tubæ Vteri aliquate: nus flexuosæ, in quibus etiam humanum Fœtum concipi, vt in cornubus belluinis est mirabile, atque certissimum multis experientis comprobatum.*

*De Clitoride.*

Pag. 77. **Q** *Vanum ex tua relatione de clitoride coniecere possum, ipsam ex alieno scripto describis, nunquam à te accuratè inuestigatam & demonstratam. Inerementum illud enorme, endemium Arabibus Ægyptiisque malum. Id credo ex tua relatione, cum ibi commoratus fueris, & Medicinam exercueris.*

*De Hymene.*

Ibid. **C** *Ogor ingenuè fateri, te pudendi vestibulum in virgine decenni, & paulò vitra hanc ætatem non exactè lustrasse. Nam tria in hoc loco posita corpora non describeres. Virginibus pudendum obuiat membrana carnosæ expansio*  
Zzz ij



*Mamma.*

Pag. 106. **M** Iror, quomodo Veslingius scripserit, *mammæ lac generare, non tantum ex sanguine, & paucis paruisque vasis subministrato, sed ob largiter affusos à Pancreate ventriculoque vapores, ac lactescentem humiditatem insillu naura, & sequenti*

Pag. 107. *Declarat, nondum perfectum satis esse, quibus vix. mamma materiam in lac conuertendam admittant. An iple ignorat thoracicas venas materiam, siue sanguinem abunde suppeditare? mammarias internas per foramen in medio sterno exeuntes, expandi in mammæ: Mammarias alias externas, à ramis subclauis extrinsecus descendere ad mammæ intercostales ab azygo. Propterea valde absurdum est proferre à Pancreatis ventriculique vaporibus materiam lactis suppeditari vberibus, quamuis aliquid simile scriptum fuerit ab Hippocrate, libro de natura pueri, de Omento, quod materiam lactis præbet, sed malè prolatum à Prospero Martiano suis in eum locum commentariis, si mammæ sitas haberet mulier in ventre, vt reliqua animalia. Hæc opinio, aliquam probabilitatem præ se ferret, sed quomodo isti vapores possunt penetrato diaphragmate, traiectioneque pleura musculis intercostalibus ad mammæ peruenire. Si hoc ita contingit, reuoluimur ad illam opinionem Asclepiadis, qui per quandam euaporationem serum sanguinis ad vesicam deferri putabat. Atque verisimilior est hæc opinio, quia vesica lepto, & aluco abdominis inclusa est. Rectius sic exponeretur sententia Hippocratis, omenti membranam extensam supra intestina pluribus venis sanguine turgidis abundare, quàm par sit. Ideoque in hoc loco penuarium esse sanguinis, si opus habeat iecur, quare mammæ vacuæ & exsiccæ, vicinæ iecori, inde repetunt materiam, quæ si deficiat in iecore, depromitur ex venis omenti. Imò quidam dixere omenti copiosum adipem, in summis inediis, transire in alimoniam partium vicinarum abdominis, sed via breuior, si mammaria sub cartilagine xiphoide, ramum transmitteret ad omentum contiguum, adhærens ipsi peritonæo interdum.*

*De Mucronata Cartilagine.*

Pag. 107. **V** Alde dubito, an cartilago mucronata ad umbilicum vsque producta visâ fuerit, si videris, nolo refragari.

*Diaphragma.*

Pag. 110. **N** E Veslingius reprehensionis ansam præberet in assignandis ortu & insertione diaphragmatis, atque actione siue motu, cautè nihil quidquam de his enunciauit, dumtaxat scripsit ad inspirationem cum externis costarum musculis cor e irrere, an attollit costas inferiores?

*De Cordis substantia.*

Pag. 118. **A**ffermat Cor spermaticis partibus, secundum sinuum recessus, plurimis præditum esse, figura neruorum æmulis, quarum ampliores, quisquis à recentis dissectione accuratius inspexerit, poro inius præditas deprehendit, quasi vellet originem neruorum inde repetere cum Aristotele: de poris nondum mihi constat, inquiram deinceps.

*Auricula Cordis.*

Ibid. **C** Vm agis de auriculis Cordis, sinistram scribis paulo habitiorè, magisque solidam esse, utramque concavam, verum est sinistram esse crassiorè, sed angustiorè, & sæpius solidam reperiri, suo priuatam officio, quoungebatur in Vtero, dum amplior erat dextra.



*De tertio Ventriculo Cordis.*

Pag. 119. **C** Arasum sepimentum Cordis aliquando tertium in homine duobus ventriculis addere putas, quod nondum obseruavi.

*Harueus Author Circulationis.*

Pag. 121. **A** Pprobas citulationem sanguinis, cuius notitiam, hoc primum seculo Guilielmi Haruzi industria debemus, ergo malitiosè Bartholinus, & ex eo Valani tribuunt Paulo Sarpy, Veneto.

*Traductio sanguinis per Pulmones.*

Ibid. **S** Anguinem in pulmonibus exsuperantem, arteria venosa in se rapere, ventriculoque Cordis sinistro suggerere, verè perhibetur. Inde cognosco ipsum admittere traductionem sanguinis à Corde per pulmones, vt perueniat ad sinistram ventriculum.

*Trachea Arteria.*

Pag. 136. **A** Rteriam tracheam diuidit in bronchum & laryngem: Dubito, an ista diuisio sit admittenda, quia bronchia dumtaxat, dicuntur ramuli tracheæ arteriæ dispersi per pulmones, & bronchi dicuntur cartilagine asperæ artetiz, est tamen tolerabilis.

*Arytanoides.*

Pag. 137. **L** Aryngistectiam & quartam cartilagine Arytanoidem appellat, quam duplicem facit, cum omnes Anatomici vnicam agnoscant, cuius est apophysis, vel cartilago separata glottis, de qua hoc solum dixisti, quod rima Arytanoidis glottida constituit.

*Os Hyoides.*

Pag. 139. **O** Ssis hyoidis colligationem ad apophyses styloides, cum vinculis nervosis ignoras, & musculum genioglossum reuocas ad hyoides, inductus à Riolano, qui primus hyoidiadiudicauit.

*Lingua.*

Pag. 139. **D** Vbito, an lingua rectè dici debeat sermonis promptuarium, rectius instrumentum. Elegancia Latinitatis doctrinam Anatomicam valde obscurat. Satiusest consuetis verbis loqui, quàm obscuris.

*Gargareon.*

Pag. 140. **G** Argareonis musculos primus detexit Riolanus, cuiusque labori debetur istud inuentum.

*De Trapezio, siue scapulari Musculo, atque scapulari Religioforum.*

Pag. 147. **C** Redix Riolanus, se rectius descripsisse ortum & insertionem trapezij musculi, quàm Vestingius fecit. Nam deducit ab occipitio, cum à partibus inferis potius oriatur, nisi diuersos ortus, & diuersas actiones ei tribuas, vt attollat scapulam, retrorsum trahat, & deorsum, simulque ad erectionem dorsii renibus vtque ad caput. Hunc musculum notat à quibusdam vocari cucullarem, quia cucullum

*Religiosorum adumbrat.* Veslingius prudenter loquutus est quàm Bacretius, qui Os Sacrum comparauit cucullo Monachorum. At nunc odiosum est hoc nomen Monachi: Atque inde capio occasionem indicandi cucillum Monachalem primi parentis eiusque sobolis humeris impositum fuisse, tanquam tesseram vitæ religioſæ, quia musculus iste Trapezii cum suo pari eleganter exprimit cucillum Monachalem, ac proinde scapularis dicitur, quia scapulas nostras obumbrat.

### *Serrati Postici.*

Pag. 148. **S**errati postici à multis Anatomicis neglecti, vel non animaduersi, quia in eleuando Trapezio, nisi diligenter aduertat, simul detrahuntur: Quid sentiam de eorum actione, exposui in mea *Anthropographia*: ex Veslingio, utramque par alim hand ineptè tuius sua potius à costis, eorumque interuallis, suum autem in spinis vertebrarum obtinere videtur, atque ad vertebrarum circumactionem conducere. Non possunt eam actionem præstare, quia non potest spina circumagi, propter arcum gynglymum vertebrarum, qui solum motum rectum admittit, non obliquum. Deinde in illa circumactione, & spina & thorax moueretur, at si oriantur à costis, debet istud principium esse stabile & immotum.

### *Sacrolumbi.*

Ibid. **S**acrolumbi costas varia tendinum serie præcipiunt, ut in expiratione thorax comprimatur. Ergo in expiratione costas deprimuntur, quæ tua non fuit sententia alibi declarata.

### *An longissimus in dorso, de spinato, semispinato.*

Pag. 149. **L**ongissimi musculi, sacrolumbi & semispinati simul vniui videntur, & vnicum constitutur. Musculum ab inferis partibus ad collum superius usque extensum, si spectetur principiorum consuetudo, membranarum continuitas, operisque communio, si tendinum multitudo, terminorumque diuersitas consideretur, repræsentare musculos quamplurimos. At peritus Anatomicus istos faciliè separat, & tres distinctos facit! Semispinatus addit dorſi vertebriſ inſtratus ab ima ad summam ipsas inſtrere tendine. At semispinatus oritur ab Osse Sacro, & præter istum nullus est longissimus. Interdum tamen semispinatus affurgit usque ad collum superius, tumque rectius spinatus diceretur, quam semispinatus, itaque nullus est longissimus musculus in dorſo præter semispinatum aut spinatum, si velis producere & extendere usque ad collum.

### *Os Frontis.*

Pag. 156. **O**s frontis cavernam ad natium confinia possidet, quam medullasam stipat corpus membranula fere viridi succinctum: idque ætri ad Cerebrum commeanti, præparandi gratia factum creditur. Caverna hæc non est oppleta corpore medulloſo, nec membrana viridi in adultis, atque periosio caret. Non potest inferuire ætri præparando ad Cerebrum commeanti, cum non sit perforata versus Cerebrum, habet quidem foraminulum, utrimque vnum ad nares, sed aer admissus ista caverna debet per eadem foramina regredi, ut subeat Cerebrum per foramina Ossis ethmoidis. Atque ut obiter moneam, ignorauit Veslingius, cavernam Ossis maxillaris, cavernam Ossis sphenoidis, atque si explorasset diligenter ossa cranij, vidisset intra nares, pate-re foramen sinus, siue cavernæ maxillaris, in summis naribus apertum esse sinum frontalem, sinum sphenoidicum in duas cavitates diuisum, foramina habere in nares per-ua, supra palatum iuxta ossa spongiosa. Utilitates istorum sinuum declaravi commentario in librum Galeni de Ossibus, atque tota hæc historia ossium cranij demonstrare debet in ſceto, & sub ſinem Anatomis, vsus demonstrari in capite cadaueris, effractis ossibus.

*Musculi Superciliorum.*

Pag. **V** Etisimilius est frontis musculos attollendis superciliis adscribere, quam  
162. ad cutis corrugationem, quæ indecora est, & nulli vsui, nam dum in-  
tuemur sursum, eluara palpebra, suggrundatio superciliorum debet explanari, quod  
perficiunt frontales musculi, supernè reuellent supercilia.

*Ciliaris Musculus.*

Ibid. **A** Ddunt his ciliarem musculum, qui cilia palpebrarum cingens, ad earum  
exquisitam commissionem concurrat. Hoc primus significauit *Riolanus*, ex  
quo multa deprompsit in descriptione musculorum, quoad origines, insertiones,  
nomina musculorum, & numerum.

*Latius musculus.*

Pag. **L** Atum musculum à sterno & clauiculaeductum in mento terminari sta-  
163. tuit, cum tamen veteres & recentiores agnoscant faciem, frontem &  
occiput obuoluere: & reuera versus angulos maxillæ, lateraliter ascendit ad aures &  
frontem, constituitque musculos frontales, & musculos auriculæ.

*Buccinator Musculus.*

Ibid. **B** Vccinator ita dictus, quod in buccinantibus, collecto spiritu protube-  
ret. Verum est ita protuberare in buccinatoribus, sed propter distensio-  
nem, cohibito spiritu & clauso ore per vehementem exsufflationem, distensio illa non  
est motus naturalis, sed violentus, istius musculi actio est ad reuolutionem cibi in  
masticatione, & intrò pellitur, dum frustula cibi extra septum dentium detrudat in  
fauces. Proptereaque bucco potius dici debet, quàm buccinator, quia buccas im-  
plet, & cfformat. Accedit ad *Riolani* opinionem.

*Labiorum Musculi.*

Pag. **L** Abio superiori deprimendo nullum musculum deputat, & duplicem assi-  
163. gnat labio inferiõti deprimendo.

*Pterygoideus externus & internus.*

Pag. **P** Terygoideus externus maxillæ à *Riolano* primum nominatus & descriptus  
165. fuit, cum actione propria, dum maxillam inferiorem abducit, atque an-  
trorsum mouet, dentes inferni procedunt vltra superiores ea distantia, vt minimus  
digitus introduci queat. Sed falsum est *Pterygoideum internum maxillam inferiorem ad-  
ducere, & retrorsum agere, cum extrorsum conuersa est.* Nam maxilla non habet opus ad-  
ductore musculo, nec retrorsum agi potest, propter opposita ossa, atque motus an-  
terior maxillæ inferioris fit per tumefactionem musculi pterygoidei externi. Pte-  
rygoideus internus tribuitur maxillæ attollendæ.

*Preparatio Cerebri.*

Pag. **C** *Erebrum in conspectum daturus, eius velamenta, vt subducas necessum habet.*  
171. Addo & ollæ ossæ, siue cranij operculum conuenienter resectum &  
euulsum.

*Meninges cur Matres.*

Ibid. **A** Raker meningibus Matrum nomen imposuerunt, quod consuetum ipsi sit, blando hoc vocabulo mollem res cuiuscumque sedem ac tutelam exprimere. Imò matres verissimè nominantur, quia ab ipsis peritiores Anatomici veteres, & recentiores, productionem & coniguationem membranarum pleuræ & peritonæi demonstrant, quæ quidem membranæ amplissimæ partibus intra se contentis alias imperiunt, vnde sensus membranæ sine neruo, vt in meningibus.

*An crassa Meninx venas habeat.*

Ibid. **M** Embranam crassam venis, arteriisque non paucis præditam esse censet. Dubito de venis, non credo solas arterias percipere istam membranam. Inde palpitatio, quod asseueras pag. 173. cum agis de motu Cerebri.

*An Crassa Meninx duplicata.*

Ibid. **C** Rassa meninx duplicatur gemino processu, qui supra medium Cerebrum antrosum percipitur, falx nuncupatur. Addo deorsum demissus, diuidit Cerebrum in duas partes, & inde falx dicitur, quod pagina 173. falsus est. Ista diuisio facta à membrana penetrante & dirimente non est duplicata, sed simplex, & indiuidua, licet crassa.

*Torcular.*

Pag. 173. **A** D concursum quatuor sinuum tanquam commune veluti forum, torcular Herophilanum constituitis loco feri, quadriuium melius conuenisset, non in isto quadriuium collocandum, ex doctrina Galeni, & Herophili, sed in sinu tertio longitudinali, à quo per innumeras venulas diffunditur sanguis quoquouersum, & in partes inferiores.

*De Mutatione Cerebri.*

Pag. 173. **L** Audo opinionem Veslingij, de incremento & dispendio cerebrealis medullæ, secundum Lunz quadras, & quod scripsit de motu Cerebri, nempe motus veluti commotæ arteriarum agitatione membrana, ideoque non ab insita vi, sed à Cerebro communicata potius virante.

Pag. 173. Cerebellum gyros habet in parte inferiore, vt Cerebrum in parte superiore, sed cerebelli gyri non sunt ita profundi, existimo gyros utrobique conditos & fabricatos, tanquam conceptacula ad conseruationem spirituum. Itaque spiritus animalis erit per vniuersum Cerebrum sparsus, vt possit in functionibus animalibus obeundis sufficere, qui iam decurrit versus cerebellum ad nervos Cerebri, & spinalis medullæ tractatus per quartum ventriculum.

*De Plexu Choroide eiusque sanguine.*

Pag. 175. **V** Alde dubito de natura sanguinis contenti intra plexum choroideum, an sit venosus, vel arteriosus solus: si admittitur in Cerebro circulatio sanguinis, duæ arteriæ carotides amplissimæ, & duæ vertebrales arteriæ suppeditant sanguinem arteriosum, qui ascendit ad sinus superiores crassæ meningis, inde distribuitur per vniuersum Cerebrum, superfluous decurrit in venas iugulares, vt remeet ad Cor. Galenus venam magnam ingredi istum sinum quartum scribit, & constituere plexum choroideum. Crederem istum plexum à vicinis iugularibus excipere sanguinem ad nutritionem intestinarum partium Cerebri: at sufficere potest arteriosus, qui nutrit & viuificat Cerebrum. Itaque non possum probare quod scribis, in plexu choroide, quemadmodum in rete mirabili, sanguinem ad spirituum animalium generationem in Cerebro preparari: Ventriculus autem anterior in iuxta cum sequentibus, vel ad aërem, vel ad pituitæ redundantem collectionem preparatos esse. Ergo ex tua opinione in ple-

xu choroide, vt in rete mirabili continetur spiritus animalis, qui cùm sit subtilissimus, non potest istis vasculis solis tenuissimæ substantiæ contineri. Adde quod plexus choroides sanguinem mutuatur à partibus supernis, rete mirabile accipit arteriosum ex carotide, quæ in plures ramulos dissecta istum plexum mirabilem effingit, quare diuersum sanguinem continent: Alibi demonstraui ventriculos spirituum plenos esse, qui vndique excurrunt, & præsertim in spinalem medullam, & nervos inde deductos. Propterea non admitto ventriculos enarratos iuxta cum sequentibus, vel ad æris, vel pituitæ redundantis collectionem comparatos esse, *quamvis auctore Veslingio, acceptor Medicorum Scholæ, veriorque sententia est. Id à me refutatum contra Hofmannum, in Encheiridio, & in Anthrographia.*

### De Fornice.

Pag. 175. **F**ornix ex tribus cruzibus tanquam columnis subnixus, propago est nervorum opticorum, qui sunt reuoluti circa illas eminentias laterales & posteriores primorum ventriculorum, & coeunt inter se in parte anteriore, inde depromunt suum animale spiritum tenuissimum, & ambo referunt eandem speciem ad ventriculos anteriores.

### Ordo dissectionis & demonstrationis in Cerebro.

Pag. 176. **O**rdine dissectionis prius demonstrandum cerebellum, eiusque ventriculus quartus, processus vermiformis, quàm ad nervos accedamus, quia persequendo nervos cerebelli structura destrueretur.

### Processus Mammillares.

Ibid. **N**ervos olfactorios appellas, processus mammillares, & primum par nervorum constituis, quod non improbo, quamvis alij Anatomici pro nervis non acceperint, quia cranio non excidunt.

### Nervi Optici.

Pag. 177. **P**ar nervorum opticum oriri statuis, *posterius à spinalis medulle initio, quæ crura fornicis duo exporriguntur, & si diligentius persequutus fuisses, crura fornicis deprehendisses, esse continuationes nervorum opticorum ex doctrina Galeni, quod est verum.*

### De plexu retiformi.

Pag. 179. **V**idetur Veslingius dubitare de plexu retiformi arterioso, dum scribit eius *sub humano Cerebro rudior expressio, vix comparationi locum permittit, cùm tamen manifestus & verè mirabilis deprehendatur, verimque circa sellam sphenoidis expansus, & diligenter observandus & considerandus in arte Medica.*

### Ventriculus quartus.

Pag. 180. **M**eo iudicio eleganter describis ventriculum quartum, & in eius cavitatem priorem aerem asseruare, ex anterioribus ventriculis haustum ad spirituum animalium refactionem. Ergo in hoc ventriculo continentur spiritus animales, quod suprà negaveras. Attamen non probo spiritus animales aëre refici in hoc ventriculo, qui cisterna est, vel promus condus distribuendi spiritus animalis in omnes nervos Cerebri, & spinalem medullam, cùm enim cò peruenire sunt perfecti, quales debent suppeditari ac transmitti.

*Musculus Obliquus Oculi.*

Pag. **M** Vsculorum obliquoꝝ vsum esse notas, *Oculum versus angulum interi-*  
 201. *um circumuolare, & ob trachea sua robur, maior obliquus in obtutu rerum*  
*assiduū patit.* Hunc vsum *Riolanus* primus assignauit. Nescio cur minorem muscu-  
 lum tendit ad eundem propagari scribis, non potest eò pertingere, aliter explicari  
 poterat incitio.

*Ligamentum ciliare.*

Pag. **L** *Ligamentum ciliare, quod est limbus, pupilla contractionem ac dilatationem, tum*  
 202. *crystallini ipsius, senem versus antera & posterioraque motum dirigere statuit,*  
 quod ego probo, quamvis primus id obseruauim: sed non possum recipere, *choroi-*  
*dem & vuca geminam tunicam constituere, ita ut vuca sit anterior, choroides postica.* Ista  
 duo nomina vni membranæ conueniunt, quæ vel vuca, vel choroides dicitur. Reti-  
 formis, siue amphiblistroides tunica humori vitreo est intertexta, proptereaque non  
 indiget externa, quam appellas vitream, & in animantium oculis leni prius coctione  
 densatis, ab humore contento discernis, ut crystallina, in crystallino cocto sepa-  
 ratur, cortices potius sunt densati per coctionem humoris.

*Aqueus Humor.*

Pag. **V** *Idi aquæcum humorem intra corneam in parte postica contineri, ut in an-*  
 203. *tica, quod dignoscitur leuiter secta parte postica, intacta choroidæ tuni-*  
*ca, tum exilit, & euacuatur humor aqueus, sed non puto intra vuca membranam dif-*  
*fusum esse.* Valde obscura sunt ista verba. Colligitur *aqueus humor* anterior intra corneam;  
 posterior à crystallina, vitreaque tunica & ciliari ligamento comprehenditur, nisi dicas crys-  
 tallinum cum ciliari ligamento, repagulum aqueo humori constituere, ne euage-  
 tur, & sic intra corneam listi.

*Cauitates Auriculæ.*

Pag. **C** *Auitates in auriculis tres constituis, sunt potius circuli, quàm cauitates,*  
 210. *excepta illa quæ cochleam vel concham refert.*

*Tympanum Auris.*

Pag. **T** *Tympani membranam peristij expansionem quandam putas, quo separato, & ipsa*  
 212. *protinus secedit.* Credere potius à nerui portione conflata esse, vel à  
 prima conformatione ibi formatam & collocatam, quia deest ibi periosteum.

*Duplex interdum tympanum conspicitur.* Nescio an istæ membranæ sibi mutuo sint  
 applicæ vel separatæ, & vbi secundum tympanum sit locatum, non explicat.

*Chordam tympani membranæ attensam, notabilem tamen omisit, atque cauita-*  
 tes auris internæ aliter exposuit, dum secundam vocat tympanum, non concham  
 cum Fallopio.

*Scapula.*

Pag. **C** *Vm describis scapulam, mentionem facis coracoidis apophysis, nihil de*  
 225. *acromio. Ista ligamenta quæ articulationi humeri cum scapula proponis*  
 falsa sunt. Nec reperiuntur, & à te describuntur.

*Tibia articulus cum Talo.*

Pag. 230. **T**ibia non potest committi inferius cum Talo per gynglymum, cum iste articulus sit arthrodia, à malleolis utrimque comprehensa.

*Articulationes.*

Pag. 232. **D**eservisti *Galenum* aliquatenus in descriptione articulationum, ut quaereris *Usculum*, aliosque recentiores. Obiter monebo synchondrosim, syneurosim, & syllarcosim, non esse articulationes, sed symphyfes quæ conueniunt omnibus articulationibus, quia ossa non possunt per articulationem iungi, & contineri, nisi per synchondrosim, vel syneurosim, vel syllarcosim.

*Gynglymus.*

Pag. 233. **D**iminutè describis gynglymum, quamvis enim *Hippocrates* scripserit verberas inter se iungi per gynglymum, debebas monere tres necessarias esse, ad efficiendum istum gynglymum.

Pag. 241. *Manus admirandorum operum instrumenta, vario validoque musculorum flexu carere non possunt.* Isthæc elegans Latinis mihi non placet (motu) nomen aptius, quia in manu musculi sunt flexæntes & extendentes.

*Musculi Humeri.*

Pag. 242. **M**usculos circumagentes humerum tres proponis supra scapularem, infra scapularem. Debebas exprimere subscapularem, qui oritur ab interna facie, seu cauitate scapulæ quam opplet, ut illi duo iam nominati sunt externi, ille subscapularis internus est immerfus, vel larirans sub scapula. Circumactio humeri fit ab omnibus musculis alternatim agentibus, ut notauit *Galenus*, ideoque nulli, huic motui sunt deputati musculi.

*Biceps Musculus.*

Ibid. **B**iceps dicitur à gemino principio, non à figura piscis, interdum usque ad insertionem diuisus est, duplici tendine, semper reperitur diuisus usque ad tendinem.

*Angoneus.*

Pag. 243. **A**ngoneus inuentum est *Riolani*, qui tale nomen ei indidit.

*Quadratus Pronator.*

Ibid. **D**iminutè describis pronatorum radij primum musculum, debebas monere situm esse in extrema parte radij iuxta carpum. Atque breuem esse laritudine trium digitorum, & vix longitudinem pollicis æquare.

*De musculis extreme manus.*

Pag. 245. **N**on exactè describis musculos extremæ manus, debebas thenaris, antithenaris, ut hypothhenaris nominibus designare.

*De Musculis Femoris.*

Pag. 253. **F**emur flecti putas à quatuor musculis, psoa, iliaco interno, tricipiti, & li-  
uideo. Triceps non flectit, sed adducit, vr videre est in iis, qui malos & an-  
rennas nauium scandunt, *Lusidum* appellas, vt credo à colore, cùm tamen sit portio  
suprema tricipitis, quem quadricipitem agnosco, & primum caput nominaui *pecti-  
neum*, ratione insertionis, & inseruit flectendo femori, remanent pro tricipite tres  
aliæ portiones inferiores

*De alijs Femoris Musculis.*

Ibid. **M**inorem *Gluteum* occupare faciem externam Ossis Ilium debebas mo-  
nere. Malè describis paruos musculos, tam quadrigeminos, quàm ob-  
tutatores. Correctionem inuenies in mea *Anthropographia*.

*De Musculo Sutorio.*

Pag. 254. **I**n tibia membranofum musculum appellas, quem *Sylvius*, & alij fasciam la-  
tam, & musculum sutorium oblongum, qui imponit tibiam alteri, vt fa-  
ciunt sutores, appellas musculum *fascialem*, *sive sutorium*, nec rectius & emenda-  
tius describis musculos extremi pedis.

*De Valuulis.*

Pag. 267. **M**iror *Vesslingium* scripsisse valuulas sanguinem ad extrema remeantem  
coercere: id fauet opinioni *Hernai & Valai* de circulatione sanguinis  
contra doctrinam aliorum Anatomicorum, qui existimarunt affuenti sanguini ad ex-  
tremas partes affatim, obistere.

*De Nervis pedis.*

Pag. 268. **N**ervos totius pedis malè describis, & præsertim posticum. Cùm sis Profef-  
sor Anatomicus à quindecim annis in Italia, miror te non vidisse elegan-  
tissimas septem figuras nervorum totius corporis accuratè delineatas, Romæ excu-  
sas, vbi notasses aliam nervorum distributionem, qualem tradideram, antequam ad  
manus meas peruenissent.

F I N I S.





DE  
**MONSTRO NATO**  
 LV TETIÆ.

ANNO DOMINI M. DC. V.

DISPV TATIO PHILOSOPHICA.

*Per IO ANNEM RIOLANVM, Filium, Doctorem  
 Medicum, Anatomia & Pharmacia  
 Professore Regium.*

Eodem tempore Lutetiæ edita.

---

• NOBILISSIMO ET ILLVSTRISSIMO D. D.  
 ANDRÆ HV RALTO MESSÆO,  
 Sacri Consistorij Regij Consiliario,

IOANNES RIOLANVS S. D.



**V**IRTVTIS & Naturæ est pulchritudo, ut optimos quos-  
 que in sui amorem trahas: eorum quæ à natura & virtute re-  
 cedunt, tanta deformitas, ut communi hominum odio mala, &  
 Monstra nominentur. Vnde Plato, ut corporum, sic animorum  
 vitia, Monstra appellauit. Herculem verò scelerum ultorem,  
 Græci ἀλεξίεργον, Poëta Monstrorum domitorem dixerunt, & eo nomine ad cæ-  
 lum euexerunt. Monstrum est peruersio ordinis, quo naturalium causarum se-  
 ries, virtutis splendor, populi salus, Regis autoritas conseruatur: Tu igitur  
 cum iamdudum Regis Christianissimi auspiciis, & maiorum tuorum exemplo,  
 isa Rempublicam regas, ut priuatis publicisque consiliis omnia in ordinem redi-  
 gas, humane societatis Monstra subigas, tuaque virtute externos Regi concilies,  
 ut satis testantur Veneti, qui te Legatum Regium pacis Internuntium habue-

runt, nunc absentem colunt & venerantur: Academiam verò Parisiensem, Scholamque Regiam suam, & illustrissimi Archiepiscopi Senonensis fidei commissam, ignavis fucis ignorantia Monstris repurges: Quidni Gallicus Hercules, ordinis, pacis, virtutis vindex, Monstrorumque domitor diceris? Olim Athenis ad expiationem Monstrofi parius, carmen à virginibus canebatur, & Iunoni donum offerebatur: Nostra Musa satrica virgineo & candido animo adferunt libellum, qui Monstri Parisiis nuper editi generationem & causas exponit, tibi que alteri Deo Gallie sospitatori donant, consecrant, ut sinistri ominis, quod ex hoc Monstro impendere creditur, inanis metus, te assertore tollatur, tuaque singulari prudentia quidquid periculi aliunde imminet, à nostris cernicibus aucciat.

## P R Æ F A T I O.



ON ita pridem Lutetiae natae sunt octimestres gemellae, quarum amplexu mutuo, sterno & ventre ad umbilicum uniebantur: reliquas partes optime conformatas habebant, unicuique suum erat caput, sua brachia, sui pedes, in quos ex Vteri latebris prodierunt. Vnde Agrippinae dici possunt.

In dissectis repertum est Cor & Iecur vnum, utrumque tamen per amplum aequabant dno parua: Cor enim quadrigeminis sinibus, totidem auriculis, & octo vasibus constabat, ac si natura geminum Cor efformare voluisset. Iecur parte superna continuum apparebat, inferna in quatuor lobos sectum; inter quos duae venae umbilicales inferebantur: Ceterae partes naturales binae erant, omnes tamen membrana utrique ventri communi, per medium distinctae, communi quoque diaphragmate à vitalibus separatae. Sed hoc diligenter notandum, quod quemadmodum gemellae eadem secundina includebantur, ita vnica aderat umbilicalis, qui vasa cuiusque propria continebat, in quibus hoc erat discriminis, quod fenestra quae in latere sinistro figurae iacet, duabus arteriis umbilicalibus praedita erat. Ideo prima se obtulit, & egressa est, cum membrorum palpitacione, vitæ adhuc superstitis indice. Altera quæ mortua in lucem prodiiit, vnicam arteriam umbilicalem habebat, & in iis tantum partibus ab invicem differebant. Dissectio publicè facta fuit in Lyceo Aesculapio, cum magna Medicorum frequentia, inter quos variae subortae sunt quaestiones.

*Prima, essentne in catalogum monstrorum referendae.*

*Secunda, si vnica anima essent praedita, cum haberent Cor & Iecur commune: an potius differentes haberent animas, cum suum quaque haberet Cerebrum.*

*Tertia, si tale monstrum vivens esset interficiendum.*

*Quarta, si quid sinistri Republicae porsenderes, raro enim monstra apparent impune, semper aliquid triste minantur.*

Istis quaestionibus, paucis & perspicue respondebo.

Atque monebo consimilis monstri descriptionem & Anatomen contineri, in libro Anatomico Nicolai Masse.

AN ISTÆ GEMELLÆ DEBEANT IN  
censu monstrorum haberi.

CAPVT PRIMVM.

**A**RISTOTELES iure reprehendit *Democrium*, quod in explicandis causis generationis rerum naturalium potissimam præterisset, nempe finem. Omnes enim causæ quæ per se, non per accidens efficiunt, *Deum, Naturam, & Artem*, agunt aliquo fine, finis regit earum actiones. Est autem finis perfectio rei, idemque est finitum, quod perfectum, idem perfectum quod totum: totum verò cui nulla pars deest. Itaque cum natura in ortu rerum contendat ad certum finem, molitur semper opus perfectum, cui nihil desit, aut superabundet, eorum quæ sunt necessaria ad usum vitæ. Quando dico naturam aspirare semper ad opus perfectum, non intelligo perfectum absolute, sed in sua specie, neque enim cum facit bouem, intendit hominem, sed bouem perfectum, & numeris omnibus completum, pro fine seu exemplari forma sibi semper proponit opus in suo genere absolutum, hoc est, à *Aristotele*, quod *Aristoteles* 1. Physicorum appellauit, naturæ generantis paradigma. Si cadat hoc fine, si impedita cogatur edere opus imperfectum, hoc contingit præter illius institutum, proinde opera imperfecta, siue excedant, ut Gigantes, & qui membrum aliquod iusto prolixius habent, siue deficient, ut *Pigmei*, & quibus deest pars aliqua necessaria, siue non referant suæ speciei imaginem, etiam si fiant à natura, nempe à facultate genitrice indita semini, tamen, quia efficiunt ea, præter institutum, imbecilla quippe vel impedita, potius errata, & deformitates, quàm opera naturæ dicenda sunt. Accedat, quod cum natura nihil sit quàm ordo, vel potius causa ordinis in vniuerso, opera inordinata, quæ non seruant ordinem in specie, aut in individuo consuetum, proprie dici non possunt naturalia. An contra naturam? Non videtur, quia sunt à natura ipsa perfectum quiddam habente, sed aliqua causa, vel materiæ vitio impedita. Amergo quemadmodum *Auerroës* existimat, ignis motum in orbem, neque esse secundum naturam, quia corporis simplicis vnicius est, & simplex motus naturalis, natura autem sua, mouetur sursum: Neque contra naturam, quia nullum violentum perpetuum: At mouetur perpetuo in orbem, quin etiam isto motu conferuatur, cum violentum omne naturæ aduersetur. Vnde concludit eum moueri in orbem præter naturam, qui est modus medius, inter id quod sit secundum, & contra naturam. An inquam errata, & deformitates insignes, quæ contingunt in natura, neque sunt secundum naturam, quia excitantur à natura impedita, aut imbecilla præter illius institutum, neque contra naturam, quia sui ortus principium acceptum debent naturæ, nempe formatrici, quamquam impotenti. Natura, inquit *Plutarchus*, vel novos morbos, ita noua parit monstra: itaque præter naturam.

Concludamus igitur omnia errata quæ natura committit in generatione animalium, præsertim perfectorum, aberrans à suo scopo, omnes insignes deformitates, quæ contingunt in specie, aut individuo, præter consilium naturæ animal meditantis, monstra posse nominari, ideoque eum istarum gemellarum ortus sit insigniter deformis, insolens & irregularis, quis dubiret optimo iure monstruosum dici posse. Duabus dari vnicum iecur, Cor vnum, est extraordinarium, nec in specie, aut individuo consuetum, communi ventre vniri nouum est, & deforme, itaque monstruosum. Verumtamen monstruosi partus habent suam latitudinem. Alij enim alijs sunt monstruosiores: Nam monstra in specie, ordinem naturæ magis peruertunt, quàm monstra in individuo: A natura longius recessit *Minotaurus*, quàm quæ ob oculos ponuntur gemellæ.

## DIFFERENTIÆ MONSTRORVM.

## CAPVT II.

**V**ERÆ differentiz sunt quæ diuidunt genus, & illi iunctæ certam constituunt speciem. Monstrorum non sunt certæ species, proinde nec essentielles, seu specificæ differentiz. Species enim est essentia communis, in multis singulis eadem semper obseruata. Monstra autem sunt tam varia, vt vix duo reperias eiusdem essentiz, quibus eadem definitio possit conuenire. Cum enim fiant inuita natura, sintque illius illegitimi partus, idcirco ab illa deferuntur: Non est conseruationis illorum valde sollicita, vt est naturalium omnium specierum: Itaque non est sperandum, vt in certas species secundum differentias essentielles distinguantur, materialibus tantum & aduentitiis qualitatibus, vt figuræ, numeri, aut magnitudinis vitio distinguantur. Non absurdum tamen in hæc duo prima genera reduci possunt. Monstrum in specie, aut in indiuiduo. Appello monstrum in specie, mixtum genus prolemque bisformem, quando partus refert animalium diuersæ speciei effigiem, capite hominem, reliquo corpore canem, aut piscem, qualia *Aristoteles* commemorat 4. de *historia animalium*. Hoc modo *Empedocles* existimabat naturam ab initio res suas genuisse, sed vsu longo & experientia sapientiorum, in species vnus generis, quibus videmus constare mundum, illas tandem discreuisse. Verum natura, quamuis per se irrationalis, agit tamen semper cum ratione nisi impediatur, quia dirigitur à sapientissimæ moderatore, nempe Deo, cuius est ministra, vel quia vnicuique causæ ille propriam vim ab initio ingenuit, à qua ordinatè, & magna cum ratione fiunt hic omnia. Creauit mundum perfectum, species omnes, quibus tanquam primis & præcipuis partibus constituitur, numeris omnibus perfectas. Præter illius consilium (materiz potissimum vitio, quæ non patitur se regi à formalibus principiis, calore, spiritu & anima) contingunt errata omnia & insignes deformitates.

*Immeritò erroris causa, inquit Galenus, nature tribuitur, cum potius parentibus imputari debeat, qui ebry cum ebrijs coeunt, quo fit vt generata principum vitietur, quod etiam mulieris vitio gestantis peccata sequuntur, cuiusmodi sunt in corpore medicoriter exerceunda delicta, cibi immoderate sumpti, ira, ebrietates, balnea, venereorum usus intempestius, quæ nullus numerando percipere possit. Attamen aduersus totiniurias natura obliuiscitur, ac plerumque vitii compos efficitur.*

Monstrum autem in indiuiduo vocatur, quando ex congressu animalium eiusdem speciei, vt viri & mulieris, tauri & vacæ, proles nascitur, non tantum penes accidens, vt fit sæpius, sed etiam penes substantiam, insigniter deformis. Huius generis est monstrum, cuius effigiem in hac tabella exhibemus.

CAVSÆ MONSTRORVM SECVNDVM  
speciem.

## CAPVT III.

**C**UM semper aliquid noui adfert Africa: cur plena monstrorum è alibi rara, illic tam frequentia, vt desinant esse monstra. An quia cum sit arenosa & arida, ideoque siticulosa è locis distantissimis ad vnum eundemque ananem, coguntur venire potum diuersæ speciei animalia, quæ dum stimulis ventris agitata in furias ignemque ruunt, promittue, inter vilo speciei delectu sese immiscent, ex permissione diuersorum seminum nascitur monstrum bisforme, vt vitulus cum capite arietis. Quondam Perianther interrogauit Thaletem, vnde putaret Athenis, tam frequenter exoriri monstra, & quam arte eorum generationem impediri posse existimaret? respondit: caue

edicto, ne quis post hac sui gregis curam adolescenti committat. Vir sapiens paucis verbis causam simul, & remedium monstratum in specie demonstrauit. Vt enim quædam sunt mulieres, quæ malunt canibus, & cercopithecis congregi, quam viris, Pasiphae cum Tauro, Semiramis cum Equo, Alcippe cum Elephanto: ita sunt quidam viri, qui mulierum concubitum adeo oderunt, vt malint capram, aut vaccam inire quam mulierem. *Franciscus Primus Auchenione anno 1543.* mulieris cuiusdam facinus flammis expiauit, quæ cane amasio utebatur. Simile scelus Lutetiæ non ita pridem vidimus simili supplicio castigatam: mulierem hircum admisisset testis est *Heredotus, in Enterpe*. Ex tali congressu non dubito, quin sit nascitura proles biformis, cuiusmodi olim fuerunt Cynocephali, homines canino capite. Dum enim vtrumque semen ad productionem similis contendit, habetque vnumquodque speciem pro exemplari, sit autem vnum alteri impedimento, non est mirum, si mixtus Fœtus nascatur, quibusdam partibus hanc, aliis alteram speciem præ se ferens. Fieri tamen potest ex vnius seminis victoria, vt Fœtus vnius speciei inde procedat. Refert enim *Platarchus* in *Paralellis*, *Aristoxenum Ephesium* ex alina, formosam puellam suscepisse, cui Onosceles nomen fuit. *Fulvium* quoque *Stellum* equæ se immiscuisse, ex qua suscepit puellam, quæ *Hippone* vocata fuit.

Dignum est quæstione an essent monstra? Non videtur, quia in illis nullum observatur naturæ erratum, nulla deformitas, imò verò formosæ puellæ ab historicis perhibentur: Tamen si ad causam originis animus reflectatur, nempe ad promiscuum & inordinatum, ideoque monstruosum concubitum, poterunt haberi in monstris, non per se quidem, sed ratione suæ causæ. *Aristoteles* has historias haberet pro fabulis, quia non putat animalium adeo differentium semina ita commisceri posse, vt tertium quiddam inde exsurgat, quia natura vtrique semini diuersum tempus actionis præscripsit. Verum experientia potior est ratione, peruenit tempus ordinatum inordinata commisitio.

De Satyris mouetur similis quæstio, eademque videtur reddenda ratio, faciem enim humanam præ se ferunt, reliquo corpore, vt pedibus ceruus. Sunt tamen bipedes, & erecta facie incedunt, nec ceruis celeritate cedunt. Fieri potest, vt syluestres quidam homines, fortè melancholici per sylvas vagantes, cum belluis rem habuerint, vel belluæ ipsæ, mulieres in sua antra traxerint, vel expositos, vt *Romulum* & *Romulum* ablaçarint, quorum commixtione cum adoleuissent, natæ sunt proles istæ biformes.

An ex mulieris congressu cum virgo natus fuerit puer ille villosus, qui captus à nauis oblatas fuit *Henrico* Regi dubitari potest? Hunc Rex Christianissimus educandum, & tam bene instituendum curauit, vt cum adoleuisset, publicè in Scholis iuris Pontificij de iure coram rege ipso, & Episcopis innumeris responderit. Verùm oblitus suæ sortis, vt erat agrestis & procliuus ad libidinem, nupsit infimæ sortis mulieri, ex qua suscepit prolem sibi planè similem, hoc est toto corpore, quin facie totam villosam: nisi fuisset bipes, & erectam ad cælum habuisset faciem, dixisses vrsulum.

Dissimilis fuit eorum conditio, qui expositi à lupis in antrum fuerunt deportati, vbi edoratione tandem didicerunt lutorum modo, quadrupes venatum ire, & per sylvas discurrere. Talem *D. de Humieres* inuenit per syluam *Compendiensem* vagantem, quem obtulit *Carolo* Regi: Ille vniuerso corporis habitu villosus erat, manibus & pedibus incedebat, & tamen equum pernicitatem superabat. Vidit etiam *Germania* anno 1544. in comitatu *Landgrauio*, puerum cum lupis educatum, more ferarum gradientem, & in pecudes grassantem.

Sed memorabile, quod refert *Alexander ab Alexandro*, circa littus maris, in cauernis habitare amphibia quædam animalia effigie humana, cuius generis erant veterum *Tritones*, qui mulieres circa littus oberrantes inuadunt, & in sua latibula vi transferunt, vnde tot monstra marina cum humana effigie. Nec fabulosum est, quod de *Sirenibus* narratur. Visæ enim sunt Romæ mulichri facie desinente in piscem. Peregrinarum nauigationum Authores referunt piscem nauiculam piscatorium manu prehensisse, vt eam submergeret à gubernatore amputatam, humanæ planè similem exstitisse, tum recessit, non procul à cymba, & extra mare caput extulit cum voce lacrymabili, facies autem illi erat humanæ planè similis, ad *Sirenum* similitudinem accedens.

Verisimilius est homines terrenis, quàm aquaticis animantibus immisceri, & ex commistione ista, Monstra cum humana effigie exoriri. Proinde si vera sunt, quæ de Sirenibus & Tritonibus circumferuntur, profectò verisimiliora haberi debent, quæ de Satyris & Faunis, & quæ de Africæ monstris perhibentur.

An etiam verisimile est, quod de monstris ex congressu incuborum dæmonum cum mulieribus, aut virorum cum succubis narratur? Vix hoc credidit, quia aut dæmon non habet semen, aut si habet, est improporcionatum, proinde immiscibile humano. Ea enim sola miscentur quæ sunt *congenera*: ea autem vocat *Aristoteles* *homiothesa*, quæ sunt eiusdem generis, communemque habent materiam. At dæmon & homo differunt genere physico, cumque eorum, si quod habent semen, longè sit potentius humano, dæmonem non hominè generaret. Itaque huius opinionis fautores hoc excogitarunt effugiū, dæmones tanta ingenij & corporis subtilitate pollere, ut possint semen viri clanculum excipere, quod in sinum muliebrem citissime transmittant. Verùm refrigescit, & ad ptolem ineptum redditur, si feratur per ductum penis longiorem, quia spiritus vanescit, minuitur calor, cum utroque facultas formatrix infringitur. Quo modo igitur poterit excipi, contineri & transmitti à dæmone, in locum proprium & convenientem? Fabulæ sunt confictæ olim à scortatoribus, ad celandam mulierum impudicitiam, quæ à diuis & heroibus compressæ dicebantur, cum parens ignorabatur. Sic solent poëtæ impudicos congressus ad diuos referre, utque Medici appellant diuinum cuius causa ignoratur, ita illi diuinum partum cuius est ignotus pater. Melancholicorum potius sunt somnia, effectus imaginationis læsæ, cum verulæ se subigi affirmant à dæmone. Noxæ sunt Medicis causæ incubi. Fortassis à sapientibus cum ratione confectum est, ex Martis cum Rheæ concubitu natum *Romulum*, ut gens Romana ad gloriam bello quærendam inflammaretur, quoties ad suum progenitorem cogitationem reflecteret: quo potissimum nomine Romani duces, suos milites ad prælium incitabant.

Estne tanta vis imaginationis, ut possit effingere Fœtum, qui dæmonis eant referat effigiem, qualem pictores ostendunt? Possitne mulier quæ conceptus, aut gestationis tempore attentè inspexerit vulgarem Cæcodæmonis effigiem, similem Fœtum producere? Quidni, cum tale monstrum in vrbe Brabantiz Bulcoducensi apparuerit. Si Auerroës iute phantasiam potius, quàm appetitum existimet esse primam motionum causam: Verisimile est vi foris imaginationis, non quidem plurius, aut tonitruus excitari posse, ut falsò Magi persuadere volunt. (Nam extra corpus nihil, aut minimum potest, circumscribitur illius potentia proprio corpore.) Sed phantasmatis visa, vel auditu perceptis, quidni similitudo quædã imprimetur materię molli, ad recipiendas quasvis imagines paratissimæ? Non est dubium imaginationem in humores & spiritus tantum habere imperium, ut non tantum vigilant, sed etiam dormienti obiecta formosę mulieris imago tentiginem excitet, transmissio ad penem multo spiritu genitore. Quid mirum igitur, si spirituũ ministerio humores ita moueat, ita contemperet, obsequentem materiam ita delineet, ut rei vis, vel auditus, vel cogitatus imaginem in molli Fœtu, vel in toto, vel in parte representet? Cur ad aspectum oscitantis oscitamus: Quia commota phantasia impellit spiritus ad actionem similem, cedunt causę inferiores superioribus, sublunares celestibus, ex sublunariis ministræ reſtrictibus. Potest imaginatio rei quam mater attentius inspexerit similitudinem imprimere, ut concolorẽ Fœtum efficere, sic enim *Æthiops* album, & alba nigrum Fœtum edidit. Potest & stigmata rei visę, auditus, cogitatus imprimere, quidni ergo visi dæmonis cum forti apprehensione effigies tenello Fœtu imprimetur? Potest phantasia immutare subiectum penes accidentia, ut indiuiduales quas vocant proprietates, sed non potest immutare rerum species, non faciet dæmonem, sed hominem, qui ex toto vel ex parte referat speciem & similitudinem visi dæmonis.

Sunt ne Hermaphroditi in catalogum monstrorum referendi? Quidni, cum sint partus inordinati & deformes, qui neque speciei, neque indiuiduorum communes seruant leges, propterea sunt monstra in indiuiduo, attamen in laitudine monstrorum: genitalia enim habent vtriusque sexus, sed iustò minorā, ambo irrita, vnumque alteri solet esse impedimento. Legimus tamen quosdam vtramque venerem exercuisse. Refert *Riccius Gaguinus*, quod anno salutis 1478. regnante *Lodouico*

*Vnde* apud Aruernos in coenobio Issoricensi: monachus quidam cū Hermaphroditus esset, grauidus est affectus, asseruatulque summa diligentia donec paruerit. In Scotia anno 1461. visa est Androgyna quædam ancilla, quæ cū herilem filiam in eodem lecto cubantem imprægnasset, in pœnam viua sub tetram defossa est. *Hieronymus Montanus* nouit Hermaphroditum, qui muliebris sexus putabatur, viroque nuperat, ex quo filios & filias susceperat, suas tamen ancillulas comprimere, & in iis generare solebat, quod non credo.

Alia est ratio virginum, quæ in viros mutatz sunt, cū cœperunt hircire, calor auctus per ætatem, quæ latebant genitalia foras expulit, nihil hic deforme, nihil inordinatum, quanquam rarum & insolens.

Sed summe monstrum est, ex muliere nasci serpentem, ranam aut simile aliquod animal imperfectum, quod olim visum historiarum monumentis proditum est. Vnde hoc monstri genus, nili à corrupto semine & menstruo putri? Vt enim grandiores vermes, & qui serpentem magnitudine superant, aliquando in intestinis nascuntur ex materia putri, ex qua etiam pediculi, & alia in aliis partibus animalia, ita non dubito in Vtero ex menstruo & semine corruptis fieri posse animalia imperfecta, cooperante imaginatione, puta si mater obuium serpentem exhorruit, aut ranas auidè concupierit. Quantum enim possit appetitus in ortu, ostendit malacia, si denegetur, quod mater auidè concupiuit primis citationis mensibus, inuretur Fœtui stigma rei expectatæ. Semine corrupto, principia quoque Fœtus constitutiva, formatrix quippe calor & spiritus corrumpuntur, nequæ habent pro exemplari speciem congecerem, proinde quod oritur imperfectum est: quia enim non potest speciem, facit genus, quando non potest hominem, facit animal. si non facit quod vult, saltem facit quod potest. Viuit adhuc mulier, quæ quoties gestat Vtero, toties tam miserè cruciatur, ut perpetuò sibi ab animalibus quibuldam Vterum distantiari conquaretur. Cogitur abortum prouocare doloris impatientia implet tres pelus humorum, & iterum alienarum colluic, tam deformi, ut quidquid est vspiam mali, eò concurrere videatur. Vidistis vnquam abscessum enormem, de quo infinita heterogenea, ut clauis, lapilli, vermes exeunt? Illi planè simile est hoc excretum vterinum, cuius causam eandem existimo, nempe assensu caloris victoriam, non sit hoc à corrupto semine, sed à menstruo putri, cuius calor similis febrili, quidquid appellit laudabilis sanguinis, mox corrumpit. Non dubito ex talimateria genitos in Vtero vermes serpentibus non dissimiles, à quibus tantopere cum insigni motu sentis se torqueti, sed vsu filis bubuli, quo propter inopiam rei domesticæ cogitur abortum prouocare, iate. fœtorum exuuiæ tantum apparent humoribus permixtæ.

At irritus Fœtus & mola, sunt non à putri & corrupto, sed imbecillo semine, siue sit per se tale, siue relatum ad materiam rebel'em.

An huc quoque referri potest Fœtus ille Senonensis, qui gestatus viginti & octo annis cum matris incredibili molestia, tandem caduere dissecto inuentus est lapideus? Discreta erant membra, nihil deforme, nisi quod concreuerat in duritiem lapideam. An hoc acceptum ferendum est frigida Vteri intemperatura, fortassis frigidorum assumptorum, vel admotorum longo vsu contrada? An potius calore partes tenuiores resulente, eo modo quo fiunt lapides in renibus, & in vesica, quinimo in qualibet corporis parte: Nam à vulua famulæ Dyseridis excretum lapidem vidit *Hippocrates*. Sic fiunt topi & seirhi, sic abscessus primarij, atheromata, steatomata, & melicerides, aliquando in lapidosam duritiem degenerant, discusso tenui, crasso remanente.

## DE CAUSIS MONSTRORVM IN INDIVIDVO.

## CAPVT IV.



VÆCVMQVE causæ insignes deformitates pariunt in indiuidois eiusdem speciei: quæcumque præstant, vt contra indiuiduorum consuetum ordinem aliquid contingat, monstruificæ dici possunt. Ex autem quanquam sint propemodum infinitæ, tamen ad certa capita reduci possunt: ad materiam præsertim & formam, aliquando ad loci angustiam: Appello materiam menstruum, & semen muliebre, quod comparatum virili, habet rationem materiz. Peccant autem, vel quantitate, si deficient vel excedant, vel qualitate si fuerint intemperata. Denique si materia non sit sequax, & obediens formatrici, si non pariat facile se formari ad similitudinem exemplaris formæ, accusanda est. Nomine formæ complector formalia principia, calorem, spiritum, & vim formatricem, quæ si fuerit imbecillior, vel pauciores habeat spiritus, languidum calorem, aberrat à scopo. Dicitur malè formare Fœtum, vel quia maiorem vel minorem facit quàm conueniat, vel quia illius partes maiores vel minores, plures vel pauciores efficit, quàm vsus postulet, plures, vt si cum sex digitis nascatur, pauciores, si cum vno pede. Aliquando partes quidem omnes iusta magnitudine & numero conueniente conformat, sed malè sitas, vt si Fœtus oculum in media fronte gestaret, vt plurimum vitium est in figura, cuius causa est non tantum impotentia formæ, quæ materiam non potuit regere, sed etiam sæpe imaginationis vitium. Dum enim parentes alienum quiddam cogitant, similitudinem in tenellum Fœtum imprimunt. Hinc absurdæ figuræ totius vel partis. Imaginatio enim, vt dixi, in humores & spiritus manifestum habet imperium, proinde eorum ministerio, dum efformatur Fœtus, inordinata & insolenti figura delineatur, qualem videlicet mater viderat, vel auditam altius animo imprefferat. Hinc *Aristoteles* fieri putat, vt frequentius homines, quàm bellæ deformes Fœtus pariant, alienis notis insignitos. Bellæ enim tantum ad veneris opus animum intendunt, neque alio phantasiam transferunt: sed homines variis distrahuntur cogitationibus, varias animo versant imagines, quarum effigiem conceptus retinet.

Monstrum cuius effigies proponitur, monstrum est in indiuiduo, natum legitimo concubitu. Cuius causam externam, si quæ esset à parentibus perquisiui, vidissent ne, audissent, aut cogitassent aliquid simile, negarunt: proinde coniectura est formatricem facultatem discretas & perfectas gemellas instituisse, sed vel inopia, vel contumacia materiz non potuisse leuare & Cor geminum efficere, fortassis propter, angustiam Vteri, aut prauum situm, sterno & ventre agglutinatæ sunt, propterea enim gemino Cordi & lecori non suberat satis spatij.

Quemadmodum ouum duos habens vitellos membrana secretos, gemiuos profert pullos, quàm si rumpi contingat, vniuntur ea parte qua sit concurrentium humorum concretio, vnde partus monstrosus, vt cum duobus capitibus, duabus tantum alis & pedibus, vel contra cum vno capite, quatuor alis totidemque pedibus: Ita ab initio tunicis discretis Fœtus, iis humoris acrimonia erosis, aut violentia aliqua effractis, vniuntur ea parte, qua membrana rupta fuit, propter seminis & humorum concursum. Hinc alij capite, alij ventre, alij dorso coherent.

Sed si verum sit gemellos vnus sexus iisdem secundis inuoluui, facilius adhuc fuit nostrarum gemellarum coalitus.

Cæterum obseruatione dignum est, in gemellis thorace & ventre connexis, sæpissime Cor vnicum reperi tum fuisse, etiam si *Albertus magnus* asserat monstrosas figuras rarius apparere in partibus Cordi, vel lecori vicinis, eò quòd virtus conformatrix ibi vegetior eluceat, circa remotiora segnius operetur.



## AN GEMELLIS VNICA ANIMA,

an sua cuique?

CAPVT V.



**Q**VAESTIO contrariis argumentis disputari potest: Nam si Cor sit sedes animæ, vt placet *Aristotele*, esset autem vnicum, verisimile est ambabus vnicam datam fuisse animam. Item cùm iecur sit fons & principium sanguinis, anima autem, Physicorum, vt *Empedoclis* opinione, sita sit in sanguine: Vt sanguinis, sic animæ vnicum erit principium. *Aristoteles* putat esse idem viuere quod nutrirī, vtriusque verò principium Cor. Siue ergo iecur, siue Cor constituatur vitæ principium, vt erat vnicum, ita vna anima gemellas regebat, communis vita. Proinde *Aristoteles* gemellos, quibus est Cor commune, pro vno & eodem animali habuisset, etiam si suum cuique esset caput distinctum.

Contrā, Medicorum, & *Platonis* opinione Cerebrum est sedes rationalis animæ, illi *Hyacinthi* residere hoc signo demonstratur, quod Medici, quanquam iurati Peripatetici, tamen laxa ratione, memoria, aut imaginatione capiti admo- uent topica, non Cordi aut Iecori. Atqui vnaquæque suum, quin etiam valde amplum Cerebrum habebat. Quare probabilius est, vt duas femellas discretas & perfectas natura instituerat, ita differentes animas indidisse, geminum tamen Cor & iecur propter causas commemoratas perficere non potuisse.

Accedit quod, in ipso embryone facultas formatrix quæ cōsta delineat, in ipso Cerebro residet, propterea in prima typosi, cæteris partibus caput grandius appar- ret, & reliqua membra quantō recesserint à capite, minora, donec plenæ forma- tionis typum fuerint consequta. Itaque non est dubium, quin gemelli capite distincti suam animam particularem habeant, vt ex diuersis gemellorum affectio- nibus confirmari potest. Anno millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo in Anglia non procul ab Oxonia, natum est monstrum biceps, quatuor manibus donatum, sed ventre vnitum, & partibus inferioribus vnicum. Ex istis gemellis vno vigilante, alter dormiebat, dum hic latam faciem ostenderet, ille tristis & mœstus apparebat, quindecim dies vixere, sed alter vnico die alteri supernixit. Memorabilis est historia monstri cuiusdam in Northumbria orti, quod ventre co- hærebat, gemino capite, quaternis manibus, sed inferiores partes communes ha- bebat. Id Rex diligenter, & educandum, & erudiendum curauit, ac maximè in musicis, quæ in re mirabiliter profecit, quin & varias linguas edidicit, & variis voluntatibus duo corpora secum discordia dissentiebant, ac interdum li- tigabant, cùm aliud alteri non placeret, interdum veluti in commune consul- tabant. Illud etiam in eo memorabile fuit, quod cùm infernè crura lumbive of- fenderentur, vtrumque corpus communiter dolorem sentiret: cùm verò supernè pungeretur, aut alioqui læderetur, ad alterum corpus tantum doloris sensus per- ueniret, quod discrimen in morte fuit magis perspicuum: Nam cùm alterum cor- pus, complures ante alterum dies extinctum fuisset, quod superstes fuit dimidio sui putrescente paulatim contabuit. Vixit id monstrum annos viginti octo, ac decessit administrante rem *Scoticam Ioanne* prorege.

## AN ROMANORVM PRÆCEPTO

monstra interfici debeant.

## CAPVT VI.



**E**GIPTVS duodecim tabularum præcipitur, vt monstra in profluentem abiciantur. Quam legem Romani ab Atheniensibus acceperant, apud quos monstrofi Fœtus in mare proieciabantur. Hanc intermissam consuetudinem *Constantinus Imperator*, Monstrorum frequentia perterritus renouauit.

Omnes meliùce, tribus potissimum rationibus hanc legem promulgarunt, prima, quòd cùm sint aberrationes naturæ à suo scopo, & insignes deformitates, præstat ea non nasci, aut quàm ocyssimè aboleri, quia faciunt iniurias naturæ, & ordinem vniuersi pervertunt. Vt ergo artifex errata sua mauult occulta, quàm aperta: Ita natura sparios istos Fœtus mauult supprimi, quàm diu vsura lucis frui, propterea aut non viuunt, aut statim pereunt. Secunda ne eorum aspectu mulieres vj fortis imaginationis, similes conceptus procreent. Quantum enim possit ad conformationem Fœtus, fixa & vehemens cogitatio, omnibus notum esse puto. Tertia, quia monstra sinistra esse ominis existimarent, triste quidpiam semper postcedere. De singulis causis dicam paucis, & non obscure quod sentio.

Prima ratio videtur egere distinctione. Monstra enim in specie, quia nata sunt contra naturæ leges, quæ vetat promiscuos concubitus, videntur mox interficienda, eoque magis quo longius recedunt à natura, vt si mulier serpentem, ranam aut murem genuerit, quandoquidem partus, tam desprimes & irregulares, nullo modo dici possunt naturales, nec si Minotaurus, satyrus aut cynocephalus nasceretur, videtur mihi reseruandus. Denique vt vnico verbo expediam, monstrum io specie videtur protinus interficiendum, nisi forte hoc obstat, quod ex promiscuo concubitu procedat aliquando Fœtus vnius speciei, isquæ legitimè conformatus, in quo ulla partium deformitas, nullum apparet naturæ erratum, vt *Hippones*, & *Oniscus* exemplis demonstraui. Alioquin multi essent interficiendi, quia nascuntur ex equo & asina. An villosus ille, qui vt existimo, ex vris congressu natus erat, quique de iure Pontificio publicè responderi, à primis annis interficiendus erat? Non videtur, quia constabat anima rationali, quam non licet iniussu Imperatoris à corpore separare. Hunc si Ecclesia admittat ad baptismum, quidni magistratus ad ciuilem vitam? Danicæ reges ducunt sibi laudi, quod genus traxerint à patre *Trugilli Sprachaleg*, quem constat ex eorum annalibus, ex puella ab vris compressa natum.

Tales ideo feroces, vt vris, retinent enim paternos mores, non sortes, quia parum consulti & prudentes, non est autem fortis *Aristarchus*, qui idem non sit prudens. Ex vacca quidam nebulo in Germania, genuit filium formosum, qui viuere omnino addictus pietati, ad expiationem sui ortus: Verum stupet illi animus, & belluinum quiddam redolet, ex *Delia*.

Concludamus igitur monstra in specie, iis exceptis quæ oihil habent deforme & inordinatum, nec sunt monstra nisi ratione suæ originis, protinus interficienda. Monstra autem in individuo, vt *Pygmæi*, *Gigantes*, *Macrocephales*, & eos qui nascuntur cum sex digitis, aut vno membro priuatos, aut qui capite, dorso, ventre, præter ordinem naturæ cohzrent, seruanda quidem, sed spectantium oculis, vt fieri solet, non esse exponenda. Ideo *Plato* in sua Republica monstrosos partus clam enutriti voluit, procul ab omnium conspectu & consortio, ne eorum imaginibus lubrica mulierum phantasia commota, ad similis generationem impellatur. Sit hoc pro multis exemplum: Maritus qui die Michaeli sacro (vt erat in more non ita pridem) vestitu diabolum mentiebatur, hoc habitu congregiatur cum vxore: si forte horrendo isth spectaculo territa similem gignat Fœtum, an erit propter figuræ deformitatem interficiendus? Minimè, quia constat anima rationali: Verùm cubiculo aliquo videtur includendus, non exponendus in vulgus spectaculi, vt fieri consuevit.

Sed si ex legitimo concubitu oriatur monstrum horrendum, quod parte superna hominem referat, inferiore in simiam, vitulum, aut canem desinente, videturne referuandum? Quia naturæ & generi humano facit iniuriam protinus enecandum. Ideo *Mauritius* Romanorum Imperator in Thracia natum ex legitimo congressu, propter deformitatem interfecit, oculis enim & palpebris, atque etiam brachiis carebat, & ad coxendices cauda piscis innata dependebat.

## AN MONSTRA ALIQUID TRISTE minentur.

### CAPUT VII.



**M**ULTIS argumentis suaderi potest ex ortu monstrorum, lxxuum quidpiam prælagiri. Primò, quia obseruatione longa maiores nostri hoc annotarunt, natiuitatem monstri semper aliquam insignem calamitatem esse consequutam. Secundò, quod deformitas insignis sit prænuntia insignis alterius deformitatis. Deus qui peccatores non vult perdere, sed poenitentes ad se trahere, his veluti iræ suæ interuentis admonet populum sui officij, & ad resipiscentiam tacitè cohòrtatur, sunt signa vindictæ prænuntia, pestis nimirum, belli, famis, nisi redeat populus ad semitam virtutis, à qua dellexerat. Postremò, quod monstrosas monstrorum coniunctiones, aliz calamitosæ comitentur, pestis, belli, famis effetrices, quibus vt paucis satisfaciam, locus hic postulat. Hoc enim malitia hominum fieri puto, vt monstrum sinistri esse ominis existimetur. Imperitæ plebeculæ familiæ est hoc argumentum, hoc post hoc, ergo propter hoc. Si tam diligenter animum aduerteret ad felices successus, qui monstra comitantur, vt pacem, natiuitatem summi alicuius principis, serenum & salubre cælum, annonæ copiam, non pauciores obseruarent euentus faustos & felices, quàm infortunatos. Quo die Veneti cum Genuensibus foedus inierunt, quod tot & tam insignes strages terminauit, natum est monstrum cum vno capite, quatuor manibus, totidem pedibus. Quidni pacem significasse diceretur? An quæ voluntate & libero hominum arbitrio geruntur, vt pax & bellum, possunt ab astris præiudici & prædici? fac præiudici, quis vsus prædictionis, si fatum astrologicum sit inuitabile? Signa cum re signata similitudinem aliquam habere oportet, quæ similitudo indiuidui cum toto Reipublicæ corpore? monstra quæ quotidie nascuntur in Africa, quidni illis quoque significant, quæ prospera aut aduersa sunt euentura? Quæ coniunctio illie monstrosa fingi potest, quæ quotidie nonorum monstrorum sit genitrix? Perennem enim esse oportet, non temporariam. Nonne potest Deus suam voluntatem aliis signis denuntiare, quàm deformitate, vt hominum cum beluis congressu monstrum præcedente? Summus ordinator potestne dici author tantæ inordinationis? Quid est quod perditum nebulonem ad amorem istum pellexit præter appetitum planè brutum? Astra quibus Deus curam commisit vniuersi, quorumque motu & lumine ordo aspectabilis huius mundi conseruatur, efficiuntne deformitates, tam insignes, quibus mundus planè redditur immundus? Quotiescumque alicuius effectus causa est manifesta, frustra ad occultam recurritur.

At appetitus inordinatus impulit hominem ad subigendam capram aut vaccam, in quem astra nullum habent ius & imperium, ipse mouet semetipsum, motus ab appetibili, vt voluptate. Cur ergo finguntur astrorum coniunctiones monstrorum effetrices, aut significatrices? An quemadmodum Sol cum homine generat hominem, ita est constellatio, quæ cum virgo & muliere generat vrsu? Voluntas libera est, cogi non potest, alioquin homo non esset sui iuris.

*Esse malum à superis affirmans, cum tamen ipsi,  
Criminibus propriis homines sibi damna parant.*

Etiæne ad insecta & aues pertinent monstrosæ coniunctiones? Atqui facile est cuique in auum genere efficere monstrum: Nam si ouum habeat vitellus membrana discretos, nascuntur gemini pulli. Verùm si membrana portionem euulseris,

seris, moxque eum incubanti gallinæ supposueris, nascetur pullus cum vno capite, quatuor alis & pedibus, vel cum duobus capitibus, alis & pedibus non pluri- bus, dixerisne quod ars effecit, aliquid sinistri prædicere?

Apud *Aristotelem* in *Metaphysicis*, tria sunt prima rerum planè differentium principia effectiua, in quibus singulis consistendum est: Mens, Ars, & Facultas. Mentis nomine Deum, & intelligentias cælorum motrices, seu angelos comprehendit: Mens reatrix, & omnium prima per seipsam, vel angelorum ministerio facit miracula. Quæ *Plato* in *Apologia*, dæmonia, quasi dæmonum, non hominum opera, *Metaphysica*, non naturalia nominauit. Quærenti ergo à quo procedant effectus admirabiles, qui superant naturæ vires, causasque habent humanæ menti incomprehensibiles? Respondetur à Deo ipso, aut illios angelis procedere: Roganti verò vnde opera artificialia, & dificla & calcei? Respondetur ab artifice profecta esse omnia, qui ad exemplar formæ quam circumfert animo, singula componit. Itaque Ars est primum principium rerum artificialium, in quo veluti extremo conquiscentium. Calceus enim est opus cerdonis, domus architecti, non Dei, non naturæ, nisi obliquè & indeterminatè, quia scilicet Deus dedit archi- tecto animum architecturæ capacem, natura verò suggesterat illi materiam quam apparauit, & in eam formam tandem perduxit, à qua nomen & definitionem accipit. Facultatis nomine videtur animalem simul & naturalem comprehendisse, quærenti, quæ vi ignis calefaciat? Respondetur, quia natura calidus. Si quæzias præterea, cur à natura præditus sit vi calefaciendi? Obmutescam, ignarus illius consilij & instituti. Eodem enim iure rogare possis, cur potius ignem fecerit natura calidum, quàm aquam.

*Sic placuit superis, quæ rerum plura nefas.*

In primis cuiusque scientiæ principiis consistendum est, ne fiat progressus in infinitum, alioquin nulla esset scientia, quæ status animæ perhibetur, in quo quiescit, tanquam vltima causa inuenta.

Ad animalem facultatem pertinent actiones arbitrarie, vt congressus, est enim actio voluntatis, quam aliquando regit ratio, vt in ordinario, naturali & legitimo concubitu, aliquando non tantum est brutum, sed inordinatum, vt cum homo bellum immiscetur. Hinc seminum commixtio, à qua monstrum in specie. Nam dum vnum quodque ad suum finem, seu formam exemplarem contendit, conantur singula effice- re suæ speciei simile: præstant quod possunt, non quod volunt. Impeditur enim vnum ab altero, hinc proles deformis, vt cynocephalus, monstrum capere referens canem, reliquo corpore hominem, nisi fortè vnum semen alteri manifestè præualeat, tum enim Factum producet suæ speciei congenerem, vt de *Hippone & Onocle* dictum. Huius generis monstrorum causa fuit commixtio seminum, commixtionis coitus, coitionis appetitus irregularis, bono apparente, nempe volupate impulsus, in quo veluti in vltimo principio consistendum est, neque præterea ad astra, aut Deum confugiendum est, ne illos nostri scelcris conscios, & authores faciamus.

Monstrum in indiduo habet suas causas in alterutra natura deprauata, materia quippe aut forma. Quando enim totum maius est aut minus, quàm postulet ordinaria speciei magnitudo, vt *Gigas*, aut *Pigmeus*, aut pars vna, aut plures sunt impropor- tionatæ toti vel speciei, vt caput *Macrocephalis*, (quod primum arte, deinde consuetudine in naturam degenerante, conformatione naturali effectum scribit *Hippocrates*;) siue plures sint, aut pauciores partes quam totum postulet, aut actio instrumenti læsa sit, accusatur potissimum excessus, aut defectus materiæ. Quod si partes tot sint & tantæ, quot & quantæ desiderantur, verùm fuerint malè sitæ, angustia, aut contorsio yteri damnatur.

Si verò prauæ figurentur, puta si visio cacodæmonis in tabella, similem referat effigiem, imaginandi potentia, aut formatricis deprauatio pro causa assignantur. Frustra igitur ad mentem, aut artem recurritur, cognita genuina & coniuicta causa. Deus enim, cælum, Ars, natura, sunt causæ ordinis, non inordinationis, nisi fortè priuatiuè, eo modo quo Sol dicitur ab *Aristotele*, causa interitus simplicis, id est ab- iectæ formæ nobilis, vt acquiratur ignobilior. Quod si Sol vniuersalis causa generatio- nis ordinariæ, non concurrat ad generationem monstrorum, nisi fortè per acci- dens, neque Deus, aut illius minister angelus, ad enormes istas cupiditates con- currat nisi priuatiuè, quia tales homines deseruit, & illis dimidium mentis abstulit.

Cur altius ad istas sublimes causas assurgimus? Cur ab illis sinistroseuentus significari comminiscimur?

Quid sinistra præhument nostræ gemellæ, nec scio, nec inquirō, nec ab iis metuō, aut metuendum pato. Hoc vnum affirmo, earum natiuitatem felicem fuisse, & fortunatam toti familiæ, parentes enim ex illis fecerunt, & faciunt quotidie vberissimum questum, earum beneficio ab angustia rei familiaris, qua premebantur liberati sunt: Concursum enim frequentissimus vndique factus est ad illas inuisendas, illi neminem admittebant, qui iustum non persoluisset. Naturales partus illi erant oneri, paupertatis onus gemellæ istæ suo exortu à familia excusserunt.

Interea gratias ago eruditissimo Philosopho & Medico D. *Laceto*, quod in suo libro de *Monstris*, nostrum primum ingenij partum laudarit his verbis, doctissimus *Riolanus Filius* disertum edidit opusculum de Monstro nato Lutetiæ.

FINIS.



IOANNIS  
RIOLANI  
ANATOMES  
ET PHARMACIÆ

Professoris Regij, & Decani.

SPONGIA ALEXITERIA:  
ADVERSVS VIRVLENTOS TACTVS  
ÆMILII PARISANI:

*SIVE RESPONSIO*

Ad singulare certamen  
de Diaphragmate:

FOR THE  
RIOT  
AND  
TOM

THE  
LONDON  
MAGAZINE  
AND  
LITERARY  
REVIEW



# IOANNIS RIOLANI

SPONGIA ALEXITERIA.  
ADVERSUS VIRULENTOS TACTVS  
ÆMILII PARISANI.

**I**VBENTER abstinuissem ab ista responsione, & placidè frui sua philautia *Parisanum* reliquissem, nisi me provocasset ad examē Diaphragnatis, quod appellat singulare certamen, sine alterius suppositione, vel mutato nomine, in quo triumphum tibi decernit ante victoriam, quam gloriatur obtinuisse de omnibus Anatomicis, ac potissimum de *Riolano*, quem supplantavit: Superbiam & arrogantiam hominis cognosces, in epistola ad Imperatorem, ibi iactat, & inuerecundè asseuerat, se aliam à populari inuenisse fabricam, quam instantatam hominū fabricam nuncupat, ex eius lectione promittit Imperatori, se plura ac potiora scuturum, quàm Alexandrum ex Aristotele, Imperatores & Consules Romanos ex Galeno, quia mirabiliora ac diuinitiora tradit, quæ nemo prius attigit, quia maximarum rerum subtilitatem proponit, ideoque nobiles meritis suo Exercitationes appellauit, Lectorē rogat, ut si placuerint, Deo Optimo Maximo laudem præbeat, quod sapientibus abscondita illa reuelarit. Isthæc omnia quid aliud sonant, nisi omnes cæcutire Philosophos ac Medicos, solum *Parisanum* esse sapientem, omniscium, naturæ *Amasium*, Phæbo ante alios dilectum, quoniam

--- est Gallinæ filium alba,

*Nos uiles pulli, nati infelicibus ouis.*

Atque ut clarius innotescat hominis fastus & insolentia, suo præceptorī *Fabricio* ab *Aquapendente* eniquè conuictus est, quia per annos quinquaginta magna eum laude, & ornamento Scholæ Medicæ *Patanina*, Chirurgiam & Anatomien docuit, & exercuit, ut eius scripta doctissima testantur. Hunc tamen *Parisanus* appellat virum tardi motus, atque etiam parum subtilis ingenij, quid hoc significat, nisi bardum & stupidum? Insanum istius hominis scribendi cacoëthes ex hoc intelligitur, quod omnes eruditos viros, tam Italos quàm externos, qui de rebus Medicis scripsere, scriptis suis atrociter & inscienter insectatus fuerit, ab iis nullo modo laecessus, nec vilo modo nominatus, quia istum hominem indignum commendatione & reificatione iudicauerunt. Ille tamen audet semper argutos interstrepere anser olores, quia subtilitatem proficitur, suamque prædicat. Vis dicam quis sis, magnus es ardellus, vel si maius propter tuam insignem subtilitatem, ingeniosus es nugasor, ut de *Antisthene* dictum fuit, quamuis in centenis cadaueribus diligenter scissis, sua explorasse confidenter affirmet. Credat *Iudæus Apella*, non ego. Nunc certus sum, potius ex picturis, & imaginatione propria, chimerica, speculativè scripsisse de rebus Anatomicis, nunquam intuitivè, res visu & tactu, secundo cadauera hu-



mana examinasse. Atque vrinam oratione tersa, nitida & congrua scripserit, non adeo fastidiosus esset Lectori, qui non potest probare barbarissimos & solæcismos, quamvis ira loquutus Medicos excuset *Galenus*, & libellum scripserit aduersus eos, qui reprehendunt Medicos solæcizantes: *Præstat*, inquit, *in oratione peccare, quam in moribus*. Attamen barbaries sermonis, & solæcismi, tædium & nauseam Lectoribus parit, authorisque doctrinam incongruam declarat. In *Parisianis* libris, tam frequentes occurrunt barbarismi & solæcismi, ut nulla pagina sit tam primæ, quàm secundæ & tertiz partis de Subtilitate, quæ non fordesat ista spurcitie sermonis: nec maiorem diligentiam, & curam adhibuit in postremis libris, etiam si monitus fuerit à *Riolano*, qui magis indignatur ob istud incongruum scribendi genus, etiam obscurum nec intelligibile, quo vsus est aduersus eum, ne intelligeretur, sic euadit sæpia manus piscatorum, effuso atramento suo.

*Clarus ob obscuram linguam, magis inter inanes,  
Quam de graues inter Græcos qui cetera requirunt,  
Semper enim Stolidi magis admirantur, amantque,  
Inuensis quæ sub verbis latitantia cernunt.*

Veniamus ad rem, ut passim loquitur *Parisianus*, contra *Riolanum*, quod inuersis litteris merdam significat, sit honos, auribus, nec odor in naribus, qualis est eius cacata charta: prius examinabo eius Exercitationem de Diaphragmate, quæ exstat in prima parte, dein accedam ad exercitationem alteram, in qua disputat contra *Riolanum* singulari certamine.

*Parisianus* prius Philosophus & Medicis improbat, quod Diaphragmatis naturam, siue constitutionem, & opus, siue actionem ignorari, dum plures vocant, quasi ad sapientiam conferret vel vrasibilem facultatem ab appetente distingueret, aut dumtaxat sepius insisteret, & discerneret duos ventres inferiorem & superiorem, ne culina sordibus cor inquinaretur.

Quos tamen vsus non contemnendos esse sapiens Philosophus & Medicus iudicabit, quamuis *Hippocrates* non vsus fuerit isto nomine Diaphragmatis, istud seipsum agnouit, appellauit, lib. de *Virginalibus*, *diaphragma*, & lib. de *Flatibus*, *vesicula*. Vsum designauit, dum stibellum ventris, & respiratori inservire censuit, atque tanti fecit in Medicina, ut eius affectus contra naturam, non tantum vtrique Ventri nocere, sed etiam capiti monuerit, inde tot morbos, & symptomata huius partis descripsit neglecta vel ignorata, quorum explicationem *Galenus* exposuit libris de *difficili* respiratione.

*Parisianus* agnoscit cum *Galeno* Diaphragma esse musculum plane distinctum ab aliis, esse enim ossibus suis circumductum, pensile in medio nervosum, in circuitu carneum. Ortum habet a circumferentia costarum spartarum, suam in centro, siue nervosa parte: & primum & ad equatum respirantis libera instrumentum, dum solutus agit: sic autem reuertitur, contrahitur fibres omnibus ad centrum adductis, erigitur sursum, dum ad rectam lineam accedit, velut iuxta humeris pulmonum alas, quæ confectis implentur aëre, in expiratione relaxatum deorsum fertur, & connexum euadit per descendentiam spontaneam, cum non habeat musculum contrarium ad eam actionem. Postea istius assertionis immemor, musculos intercostales, tam externos, quàm internos cum Diaphragmate agere scribit, nullam mentionem facit duarum apophyseon carnosarum, quæ ad lumbos pertingunt.

Præterea, initio suæ Exercitationis de Diaphragmate reprehendit *Aristotelem*, qui respirationis causam, sanguinis in Corde ebullitionem & refrigerationem constituit.

Recentiores omnes Diaphragmati, & recte quidem acceptam referunt respirationem, sed quia *Parisianus* ignorauit morum, siue actionem Diaphragmatis, eiusque structuram, propterea ubique in suo discursu errauit: debuit obseruare illas productiones carnosas, & in fine nervosas diaphragmatis, quæ vtriusque bifido, interdum trifido tendine adherent, transuersis apophyibus lumborum vertebrarum, sicut obliquè à cartilagine xiphoidæ ad extremitates notharum costarum circumtentum vsque ad lumbos, in quo litu intra thoracem conuexum est, intra ventrem concauum: qua figura continetur per mediastini adhesionem, tam ad circumferentiâ nervosæ partis, quàm superâ & infrà, ne pondere viscerum Diaphragmati appësorum deprimeretur. Ignorauit intra illam duplicatam adhesionem mediastini ad Diaphragma contineri pericardium, quod circumdat illud centrum nervæum Diaphragmatis, iraeuersionem pericardii confluat centrum illud nervæum Diaphragmatis, quo sine, ut dirigat conu. Cordis ad centrum, quod percutitur à Corde in sua systole. Per istam diueterationem ascen-

us sanguinis ab Hepate ad Cordis ventriculum dextrum promouetur, & rapitur sanguis ocyus, vt enim basi sua Cor extensum & compressum expellir in aortam, sic cono percutiens centrum Diaphragmatis, simul Hepatis verticem succutit, vt cuomat sanguinem directè ad Cor.

Propter istorum ignoracione Parisianus malè intellexit, & descripsit ortum Diaphragmatis, nam oritur à lumbis per suas apophyses, medium suum, id est ventrè habet in centro nerueo, quod recipit nervos illos duos insignes Diaphragmaticos. Finis est in circumferentia notharum costarum, dum agit & contrahitur in inspiratione, ex conuexo euadit rectum, & ducit lentè nothas costas infernè, vt spatium amplius efficiat intra cavitatem thoracis, ad expansionem alarum pulmonum. Dum relaxatur, & ad naturalem suum suum, & figuram redit, comprimit pulmones ad expirationem: istà liberam spiracione gubernat Diaphragma, non per solitarium suum motum, sed etià cum agitatione leui notharum costarum. At in respiratione violenta vel morboſa, quæ coacta est, aut voluntaria, ad certas actiones edendas, Diaphragma vehementius agitur, atque deprimitur deorsù, & attollitur agentibus musculus thoracis, maioribus, & intercostalibus, tam externis quàm internis. In motu Tonico est Diaphragma, cum musculus thoracis maioribus, dum inspiratio longa perficitur clausis laryngis muscularum quantum licet, donec coacti cedant ad expirationem. Ideoque Diaphragma non habet in situ & adione differentes motus, sublimes in leui & spontanea respiratione, & depressos, atq. pares in violenta, sunt enim eiusdem tenoris & nature, differunt tantum secundum magis & minus. Considerate quæſo incitiam Parisiani, qui nesciuit diaphragma conditum esse ad respirationem, quæ facti fui propter refrigerationem sanguinis assidue in Corde ebullientis, itaque finis respirationis est refrigeratio, causâ efficiens, siue instrumentum Diaphragma.

Dum Parisianus voluit explicare causam Sardonij risus, læso Diaphragmate, quam refert ad *trachynam puerilis*, ex Galeno in isto libri de diffinitione musculorum, imperitè appellat latum Platysma, si nugas Aristotelem scripsisse, asseuerat de Diaphragmate: Non mihi licebit appellare Parisianum, nugatorem subtilem, cùm affectet istam subtilitatem ingenij, quæ potius eius fatuitatem, & insipientiam declarat.

Riolanus iuuenis annos 27. natus, post 8. annorum exercitium in Anatomicis propria manu administratis, cum sua scripta publicè prælecta probari, & à suis auditoribus desiderari, & transcribi propter musculorum accuratam descriptionem, permisit editionem, & titulum *Schule Anatomice* præfixit: in hoc libro scripsit Diaphragma in inspiratione contrahi, fibris ad centrū retractis & collectis, quibus in expiratione relaxatis, Diaphragma explicatur, & ad naturalem figuram redit. Naturalis autè figura Diaphragmatis talis est, vt in abdomine concauum sit, in thorace conuexum, in ea figura continetur à mediastino, cui Diaphragma connectitur, tumque relaxatio est Diaphragmatis, quam alij Anatomici contractionem esse putant.

Riolanus centrū Diaphragmatis tum statuebat esse principiū, contrahi in inspiratione, laxari in expiratione, sic censuit Parisianus in Exercitatione sua, quâuis ignorarit cum aliis Anatomicis istam connexionem mediastini cum Diaphragmate, ac ille in eo dissentit, quod in expiratione descendere credit, & conuexum fieri in expiratione exsurgere & rectam figuram accedere, & contrahi. His positis terminis, nemo est qui nō agnoscat perfidiam & incitiam Parisiani aduersus Riolanum quam detegere confutare est. Agtamen eius contrariis rationibus respondebo.

1. Ratio. Si superius conuexum Diaphragma in inspiratione contractū, ad rectā figuram accedit, vt Schola docet, ergo trahet deorsum conuexam partem, qua media est.

Resp. Totum Diaphragma, ac proinde media pars, deorsum trahitur ad rectam lineam, siue planam superficiem, suæ connexionis oblique ad circumferentiam costarum inferiorum, sed nō infra lineam rectam descendit, vt reddatur intra ventrem conuexum, sed dum contrahitur, abbreviatur, & costæ nothæ ab inuicem separantur, siue dilatantur, deorsum tractæ.

2. Ratio. Ergo Diaphragma ad circumferentiam trahit.

Resp. Si principium musculi sit in centro ex Riolano, circumferentia vndique ad centrum trahitur, non capbit ad circumferentiam, quæ finis erit musculi.

3. Ratio. Si sic, quomodo retractis & collectis foris.

Resp. Id verum, ex te, si circumferentia esset principium, sed ex Riolano est finis.

4. Ratio. Si eius motus sit ad centrum retractis & collectis foris, quomodo in hoc motu plana & recta figura fiet.

*Resp.* Per abbreviationem totius musculi undiqueque contracti.

5. Ratio. *Quomodo conuexitas relaxatio erit.* *Resp.* Quia relaxatum Diaphragma supernè reuelltur à mediastino, vt impellat pulmones ad expirationem.

6. Ratio. *Quomodo relaxatio quiete fieri, & versus musculus suum.*

*Resp.* Id concedo, & reperitur in relaxatione Diaphragmaris, releuatum quiescit versus finem, nempe costas nothas, quæ fuerant distractæ, tum ad situm naturalem redeunt. 7. Ratio. *At fibrarum collectio principii versus sit.* *Resp.* Id concedo, *igitur si ad medium colligantur, medium erit principium,* id non concedo, *quæ omnia sunt pugnantia,* non possunt esse pugnantia, si scripti medium neruû Diaphragmatis esse principium, finè in connexionem ad costas inferiores. Non intelligit *Parissius* quod scribit, & quid impugnet, istas ridiculas & futes obiectiones in te retorquere possem, qui status Diaphragmatis caput in medio quod est neruofum, finè in circumferentia constarum, in inspiratione tendi & contrahi, in expiratione deorsum inclinare, & conuexum fieri. Tu debebas improbare istam suspensionem & reuulsionem Diaphragmatis per adhesionem mediastini, nec conuexum esse intra thoracem, concauum intra abdomen, sed istam relaxationem & conuexitatem fieri deorsum, tu non intellexisti istam subtilitatem. Pergo ad examen nouarum Obiectionum quas proponis in singulari certamine contra *Rislaum*, sed cum tua subtilitas sit instar sphynxis, optarem Oedipi ingenium, ad intelligendû tuas subtilitates, quas nullus poterit Anatomicus enodare, conabor penetrare tuum sensum.

Obiectio noua. *Si naturalis Diaphragmatis figura est, vt sit conuexa in pectore, & concaua in abdomine, vt in cadaueribus, & hæc fiat fibrarum relaxatione, quies erit motus & altio, Diaphragmatis motus qui retractio ad sursum ad suum principium, quæ contra à relaxatione deorsum.*

*Resp.* Repeto quod iam demonstratum, & in quo cardo controersie versatur: in inspiratione Diaphragma paulum descendit, & ex concauo fit rectum ac planum, in expiratione sursum redit, dum relaxatur, & cessat ab actione sua, quæ est contractio. In ista figura conseruatur & suspenditur per mediastini & pericardij colligationem, atque necessaria fuit illi connexio, ne pondere viscerum ab eo dependitum, infernè reuulsio, vltra rectam, & planam figuram intra ventrem descenderet. Ideoque viscera, Iecur & Lien sunt abscondita sub nothis costis, quæ absque isto vinculo suspensorio delaberentur vsque ad vmbilicum, & vltra, in magna & violenta, & longa inspiratione: ideoque mediastini adhesio naturalis ad diaphragma eius descensum definit, sed eius supernam reuulsionem adiuvant nerui duo ad centrum implantati, atque adhesio pulmonum ad Diaphragma. Deinde cum Diaphragma duos habeat motus acti- uos, vnum primarium, qui est contractio, Alterum secundarium, qui est superna reuulsio, ad motum thoracis & pulmonum, necessariò debuit Diaphragma descendere & ascendere, vt instar stabelli aliquatenus euentilet proximas cauitates, quas determinat. Præterea æquè necessaria est exspiratio, ac inspiratio ad fuliginum expulsionem, & sordium contentarum in alueo & capacitate thoracis: At ista expulsio non peragitur, nisi in expiratione, quæ fit ascensu Diaphragmatis, atque hoc ita verum esse in viucentibus mortuiue, vt in empyemate: Si sedtio fiat inter tertiam & secundam costam post copiosam euacuationem liquoris, sequentibus diebus nihil aut paucum excernatur, etiam in vehementi exufflatione, quia latera Diaphragmatis contingentia & operientia plagam, nihil effluit, itaut denuo pertundi debeat pectus, inter tertiam & quartam costas spurias, qui locus est opportunus in omnè paracentesi faciendâ, ad exhaustiendum liquorem in capacitatem thoracis effusum. His positis terminis, facilis est solutio tuarum obiectionum, si possunt intelligi tuæ subtilitates à perito Anatomico.

1. Obiectio. *Si Diaphragma ascendit, grane erit in quiete & relaxatione, ac suapte natura sursum tendet.*

*Resp.* Hoc non infirmat ascensum, quia mediastinum reuulsio infernè, vbi cessat actio, siue contractio Diaphragmatis, innox sursum retrahitur, sic insticum à natura, & causas assignari.

3. Obiectio. *Ergo relaxatio erit ad musculus caput, & supra. Altia qd ipsius cauda & finem.*

*Responso.* Actio cuiusque musculi est contractio versus suum principium. Inque si principium diaphragmaris est in centro, versus centrum fit contractio, relaxatio erit circa finem. tumque relaxatum ascendet, superne reuulsio, vt faciat expirationem compellendo puluones, qui in inspiratione pressere deorsum diaphragma ad inspirationem.

Quarta obiectio. Si relaxatio sit alio opposita contractioni, quid verat allionem istam ab ipso cauda & sine, id est carnosâ circumferentia pendere, dum laxatur, ibi maxima sunt absurda.

Responsio. Nulla video, nisi in tuis obiectionibus ridiculis, atque fateor, & à cauda, & à principio pendere istam relaxationem.

Quinta obiectio. In illis, quæ tibi figura creditur naturalis, est omnino præter naturam, violenta & lethalis existit, vixit quantulum in mortuis absque actione visitur.

Responsio. Imò talis est in viuentibus, quod sic explorabis, in sano & bene conformato corpore. Nam viscera nutritia, lecur, & Lien vix latitudine digiti versus nothas costas descendunt, in magna respiratione magis deuoluuntur. Fateor tamen in demortuis magis concauum apparere diaphragma, quia vita cessat expiratione, tumque refrigerato corpore magis rigidum & retractum fieri mediastinum, ac proinde reuulsam. Diaphragma in viuentibus non adeo laxatur, eiusque motus considerandus, tam in libera, quàm in violenta respiratione, quia multum inter se differunt, cum in agendi modo, tum in figura diaphragmatis, quod magis attollitur in violenta expiratione, imò magis agere videtur in exsufflatione, quia violenta est exspiratio, quàm in mediocri ad comprimendos pulmones, siue per os & nares excernimus aliquid tussiendo, vel non tussiendo, siue Tuba militari aut venatoria canamus violenter exsufflando.

Sexta obiectio. Quum diaphragma sit præcipuum liberum spontaneæ respirationis instrumentum, in homine ad arbitrium agere, & quiescere, ut constat, & cum aëres per se summum rectum fiat sese contrahendo, quiescendo relaxatum descendens infra rectum oportet.

Responsio. Fateor diaphragma esse liberæ respirationis instrumentum, & ad arbitrium agere necessitate cogente. Tum quod est summum descendit in contractionem diaphragmatis inspirando, atque tum rectum & planum euadit, sed non sequitur infra istam figuram rectum descendere, ut fiat conuexum intra ventrem sed relaxatum, repetit suum locum naturalem reuulsam à mediastino, ut promoueat expirationem compellendo pulmones, ideoque solum diaphragma dirigit liberam respirationem.

Septima obiectio. Miraris, quomodo diaphragma supra rectum, possit contineri à mediastino.

Responsio. Quia mediastinum eius vinculum est susensorium, à natura constitutum in prima formatione partium, & antequam spiret Fœtus, habet diaphragma sic constitutum, in brutis animantibus deest ista adhesio, quia prona terram spectant, in homine recto necessaria propter appensa viscera, quæ grauitate sua deorsum traherent diaphragma, in hydrope pulmonum, in empyemate thoracis deprimeretur ad vmbilicum, sine isto susensorio vinculo. Si velis scire hanc figuram diaphragmatis naturalem esse, obserua in Fœtu grandiore septimestri mortuo in ventre matris, tum non respirauit. Attamen diaphragma non est reuulsam in expiratione, nec conuulsam ex morte violenta. Tum deprehendes, sic extructum & collocatum diaphragma, ut conuexum sit in thorace, curuum in abdomine, per istam responsum corrumpit tuæ obiectiones.

Octaua obiectio. Quomodo à mediastino continetur diaphragma supra rectum, & quomodo eo loco ascendit? non suapte natura, ex motu rectum non ascendit, ergo violenter trahitur, ergo non liberum respirationis instrumentum.

Responsio. Quamuis iam abunde satisfactum fuerit istis affantiis, quas iterum proponis & inculcas. Addam adhuc istam retractionem superne factam esse moderatam, naturalem in libera respiratione, in violenta ferme conuulsam.

Nona obiectio. Non potest trahi diaphragma à mediastino spontaneè, quia non adsunt talia media vincula, nec continencia, necdum trahentia, nec talis mediastino facultas inest.

Responsio. Iam toties ostensum est diaphragma reuelli sursum, ut expirationem faciat ad compulsionem pulmonum, naturalem esse istam adionem, secundariam, dum relaxatur & redit ad suam figuram naturalem, ope mediastini, quod etsi non sit musculus, tamen robore suo, quia duplici consistat membrana, toti dorso & sterni firmiter affixa, suspendit diaphragma, & permittit descensum certo quodam termino naturali. Ista subtilitas excedit satuum & bardum ingenium parisiensium, vel cæcus est. Qui vult videre & agnoscere partium thoracicarum & aluiarum concatenationem ad Diaphragma rite rescindere debet sternum & contemplari in suo situ

Diaphragma. Nam Cor per adhesionem pericardij ipsum tangit, pulmone quoque sæpissime adhæret. Iecur & Lien ab ipso dependere, atque etiam ventriculus proximus ratione stomachi, siue orificij superioris, tenes eius apophysibus longis incumbunt, mesenterium propter adhesionem, siue originem ad lumbos, cum ipso communicat. Atque etiam Vterus per ligamenta sua lata, affixa extremitatibus nervosis diaphragmatis, quæ perueniunt ad Os Sæctum, vnde nervos à spina mutuatur, ut motus principium suum repetat à lumbis, ideoque ætui diaphragmatici, potius reuulsioni supernæ diaphragmatis inserviunt.

Decima obiectio. *Si naturalis figura diaphragmatis sursum est, ergo non relaxatur, quia talis eius situs est supra positum sui agentis elatorem, qui per se rectum est, ergo non datur quies, quia non relaxatur, quia versus suum finem non descendit, sed supra ex actione situm, qui tibi rectus est, ascendit, & est connexus, vel si est quies in homine, erit quies libera violenta, quod à saculo inauditum monstrum.*

Responsio. Ad excutiendū sensum istius obiectionis Delio natatore opus esset: nam ingenuè fateor me nihil intelligere, vel talem responsionem dabo. Naturalis figura diaphragmatis est, ut sit concavum in abdomine, convexum in thorace dum relaxatur: Dum contrahitur digiti distantia descendit, quia convexitas, siue centrum nervæ adducitur ad rectam figuram, propter abbreviationem musculi contractis fibris, tumēte inferioris spuriæ, quibus affigitur diaphragma, deprimuntur deorsum. Ab ista actione usque ad relaxationem fibrarum dilatatur, & elevatur diaphragma, compellitque pulmones ad expirationem, ab illa relaxatione usque ad aliam contractionem, quies siue spatium aliquod temporis interiectum est, quæ quies in libera & placida respiratione est libera, in violenta respiratione ista quies est violenta, vel ferme nulla, ut in pulsu velocissimo.

Obiectio 11. 12. 13. 14. & 15. *Reliquas obiectiones uno fasciculo comprehendam, quia sunt consimiles. Denique si diaphragmatis actio in contractione ad sui rectitudinem est, quam priusquam agat, per se sursum & supra musculi rectitudinem caput, quiescat prius relaxatum esse, ut ad rectitudinem perveniat, oportet.*

12. *Ergo si ad rectum trahit, quum connexus sit, supra rectum trahit deorsum, si sursum trahit, supra connexus.*

13. *Igitur non trahit ad suum principium ad rectum.*

14. *Ergo adhuc ascendit, & non descendit. Si descendit, non suapte natura, quia ut patet non agendo, neque quiescendo, nec contrahendo scilicet sese, nec relaxando.*

15. *Igitur trahitur, sed quorsum? quo modo, à quo, quum subtilitates hæc, trivialium ingeniorum non sint epulæ, quin etiam baud vulgaria iudicia excedant multa.*

Responsio. Ergo Riolanus indignus & incapax istarum subtilitatum, quas nullus Anatomicus quantumvis præstantissimus assequeretur, & num Parisanus seipsum intellexerit, valde dubito. Quod spectat ad primum articulum huius obiectionis, ipsum admitto: ad secundum articulum dico diaphragma ex convexo fieri rectum, sed sursum nihil trahere, sponte redire ad suam figuram naturalem, nec supra ascendere. Ad tertium articulum respondco diaphragma trahere nothas costas deorsum ad suum principium, quod est in centro & apophysibus. Instas in quarto articulo, ergo ascendet potius quam descendet. Negatur, sic petis in quinto articulo, ergo suapte natura descendet. Nego, quia trahitur à facultate motiva, dum agit sese contrahendo, ut trahat deorsum nothas costas in inspiratione cessante, contractione relaxatur, & ascendit in expiratione, sed notandum istam actionem naturalem diaphragmatis perfici à libera respiratione, in violentia perverti. Nam musculi thoracis intercostales, & musculi omoplate simul agentes, totum thoracem attollunt celeriter, alij antagonizæ deprimunt, nempe intercostales interni, & musculi abdominis ascendentes, cum sacrolumbis tumque cogitur, diaphragma istos motus sequi coactum. Nam attollitur in inspiratione, & deprimitur in expiratione, atque in magna spiritus comprehensione & retentione quæ inspiratio est, clauso larynge, violentè deprimitur diaphragma, & descendit ultra rectam & planam figuram; ut intra ventrem intumescens, & convexum redditum, compellat intestina, ventriculum, & Vttrum gravidum in enixu, vel ad sæcum expulsionem, & ad vomendum. Itaque mea opinio de motu diaphragmatis probabilior & vetustissimior, quam altera Parisani iudicabitur à perito Anatomico ex mea responsione.

Ut autem meam postremam opinionem de diaphragmate post varias meditatio-

nes, sciat & intelligat Lector meus, paucis exprimam. Diaphragma est musculus in sua specie particularis, in sua structura & actione admirabilis, quia non æmulatur formam aliorum musculorum, neque sequitur aliorum actionem. Nam duabus constat partibus præcipuis, vna nerua in medio collocata, cui circumiecta est altera carnea, per duas apophyses ad vertebrae lumbales vsque ad Os Sacrum extensas. Vestitur vndiq. tunica ex vtraque facie, pleura, & peritonæo: habet nervos duos insignes centro neruo infixos. Alios versus apophyses à lumbalibus nervis, venas & arterias à lumbalibus vasibus enatas. Huic centro neruo affixum est orbiculatum pericardium, quod continetur intra duplicaturam mediastini, quod vtrinq. cingens & obvolvens pericardium simul eo pertingit, inde fit, vt ipsum mediastinum sit diaphragmatis suspensorium vinculum, quo si careret, isthæ membrana carnea amplissima, pondere viscerum nutritiorum. Hepatis, Lienis, Ventriculi deorsum deprimeretur, magno partium abdominis impedimento. An sit simplex musculus, vel duplex, dubitare licet propter eius amplitudinem, geminata vasa, duplices apophyses, ne in paralyti, vel eius vulneribus cessaret eius actio: nihil adhuc definitio, donec certior fuerim ab experientia: centrum nerueum simplex, indivisum, mihi dubitandi occasionem præbet.

*Situs Diaphragmatis obliquus*, diligenter considerandus, à prima vertebra lumborum assurgens ad circumferentiam notharum costarum, vsque ad cartilagineum xiphoidem.

*Figura Diaphragmatis talis est*, intra ventrem concavum, intra thoracem convexum, suspensum à mediastino, & sæpissime pulmonibus affixum, vt earum partium motus sit patilis & confamilis in respiratione, suspendit etiam multas partes ventris inferioris, ideoque istarum partium, vitalium & nutritiarum concatenatio ad diaphragma diligenter observanda, ad diagnosis, prognosim & therapeiam istarum partium ægotantium. Ac præsertim pericardij adhæsiæ centro neruo, inde Cor vicinum Hepati, & aliis visceribus cognoscere cõpati & affici ex vaporibus & sanguine vitiosis.

Admirabilis est Diaphragmatis actio, siue motus perpetuus, noctu diuque perseverans instar Cordis, si non passibus æquis. Motus ille auctus est respirationis liberæ, spontaneæ, placidæ, leniter & obscurè moto thoracis, tumque movet leniter pulmones, quiescentibus costis veris. Cùm autem respiratio consistet duabus partibus, inspiratione & expiratione, istas duas partes respirationis efficit, ac dirigit Diaphragma, ideoque moveri debuit duplici motu, vno ad inspirationem, altero ad expirationem: Quomodo fiat duplex iste motus, nunc inquirendum, si prius originem & insertionem istius musculi exposuerimus, relictis super ea re variis sententiis, quid sentiam enuntiabo.

Credo equidem non inutiles esse istas apophyses carneas Diaphragmatis, sed ortum præbere huic musculo obliquè ascendenti, & ad circumferentiam notharum costarum hærenti, isthæc adhæsiæ finem musculi constituit. Centrum nerueum est medium musculi, nec enim potest esse finis, propter adhæsiõnem pericardij ad partem nervosæ circumferentiam: itaque dum agit, & movetur Diaphragma, contrahitur, abbreviatur versus suum principium, & ex convexo redditur rectum, id est paulum, depressum, siue descendens ad rectam figuram accedit, retrahitque costas inferiores, vt amplior sit cavitatis thoracis ad amplificationem pulmonum in inspiratione ad aeris attractionem, dum cessat diaphragma ab ista actione laxatur, ascendit, reditque ad naturalem situm, atque compellit pulmones suo tumore ad expirationem. Reuelliur sursum, partim ratione nervorum, qui eius centro implantantur, partim ratione mediastini ad circumferentiam centri nervei adhærentis.

Vnde procedat iste motus, non certò constat inter autores, haud dubiè à Cote de manat, quod indiget flabellatione, & aëre ad refrigerium, vel ad spiritus vitalis generationem, sed cum centro neruo Diaphragmatis pericardium adhæreat, consequenter Cor Diaphragma tangit, vel percutit. An vt vicinum Hepar succutiat in vertice, vt sanguinis ascensum ad Cor acceleret?

Vt inueniat *Parissinus*, quod roderè queat, & caninos suos dentes exercere, ex ipso contextu sine ordine, recitat ex *Riolano* fragmenta euulsa & separata à continuatione sermonis suæ periodi, quæ sensum his addit, & interpretationem vt ipsa fragmenta sine continuatione periodi, ridicula & absurda præsentet. *Examen istarum partium incipit à fluxu & refluxu mediastini. Riolanus* dum examinat actionem

Diaphragmatis, quærit dubitando, an Diaphragma quod est stibellum ventris, ex Hippocrate, moveatur fluxu & refluxu instar ventriculi. *Riolanus* infert, non est verisimile, fluxu & refluxu agitari Diaphragma, quia id prohibet mediastini colligatio ad circumferentiam circuli nervi. Non potest bardum & stupidum ingenium *Parisani* id comprehendere, & postulat quomodo, à quo, ubi, quomodo, &c. quamvis non absolute admittam talem motum. Attamen ne videar sapientibus ridiculus, explicabo: in libeta inspiratione leniter fluit deorsum per modum levis contractionis in expiratione refuit sursum, propter suspensionem & colligationem quam habet cum mediastino, & sæpissime cum pulmonibus ipsi Diaphragmati adherentibus, in expiratione relaxatum, & ad naturalem figuram convexam reducitur, quia talem figuram possidet ob dictas causas, siquæ istis postularis satisfecisse puto.

*Riolanus*, quia non placuit iste fluxus & refluxus Diaphragmatis, maluit adhærere dilatationi & contractioni Diaphragmatis: ita ut moveatur contractum in inspiratione, relaxatum in expiratione. *At arguit Parisanus, colligatio mediastini id impedit*, quia obstitit descendenti Diaphragmati dum contrahitur, & ad figuram rectam & planam accedit. Id pernego, quia Diaphragma enascens à vertebra lumbalibus per duas apophyses caruosas, crassas & robustas, oblique inclinatum, ad circumferentiam costarum inferiorum convexam, dum deorsum trahit costas inferiores in inspiratione descendit, nec ista retractio est violentia, quia voluntaria, & indolens, sed mox ascendit reuulsum à mediastino, & expanditur, reditque ad figuram convexam in expiratione. Atque nisi adesset ista colligatio mediastini præ pondere viscerum ab eo dependentium, non posset resurgere, ac erigi sursum, istud contraponendum inferuit ad descensum Diaphragmatis. Ac proinde duplex est motus Diaphragmatis, descensus suo in inspiratione, ascensus in expiratione.

Reprehendit quod dixim ex *Galeno*, motum Diaphragmatis, quoad motus speciem, sphincteri ani consimilem, qui collectus & contractus vndique fibris contrahitur, ad retinendum lotium, & laxatur ad emittendum, erravit primus *Galenus*, sed nullum inde erratum potest notari, quia dixi ratione motus dissimilis, quamvis Diaphragmatis structura sit planè dissimilis, nec perforata, ut ani musculus, despicit dum negat sphincterem non dilatari, quando laxatur, sed tantum arctari. Ergo sphincter vesicæ latus caruosus non dilatatur & laxatur ad egressum urinx, similiter sphincter aulæ exitum fecum: Inficiatur musculus, ani orbicularem amplexantem non esse perforatum, & ridet istam distinctionem de musculo ani & Diaphragmatis quam attuli.

Reprehendit quod dixerim, quæritur an dilatatio, siue relaxatio & contractio, proprii sint motus Diaphragmatis, ut systole & diastole in Corde. an unus per se, alter per accidens, nempe relaxatio, ut in omnibus musculis: insultat mihi, ac si dixerim motus Diaphragmatis esse similes Cordi, comparative id proposui, atque dubitando, an quemadmodum systole & diastole sunt proprii & essentielles motus Cordis: ita dilatatio & contractio Diaphragmatis? an sunt motus aliis musculis consimiles, in quibus alter est essentialis, nempe contractio: alter per accidens? quid ibi reprehensione dignum offends, attamen impericè exeret in hoc articulo suam subtilitatem, & sustinet coincidere & laxari Diaphragma in minima inspiratione.

Dicebat *Riolanus* motum Diaphragmatis non esse consimilem aliis musculis, quia non habet oppositum musculum, id falsum esse asseuerat; quia in maiore thoracis motu constringitur, non in minimo, cui constringentes musculi inserviunt. Mea propositio est de motu libero Diaphragmatis, qui perficitur ab ipso solo Diaphragmate: nam aliter in motu violento agit coactum, ut mox dicitur, neque in libero motu habet alios sibi oppositos, cum per se solum dirigat respirationem liberam, placidam, ferme immoto thorace. Tandem *Riolanus* concludit, essentielles esse motus Diaphragmatis, relaxationem & contractionem, quia diversis actionibus inserviunt. At ille infert. Dixilli unum esse per accidens, alterum per se & essentialiter, id protuli dubitando, & querendo, an talis sit motus Diaphragmatis, ut in aliis musculis.

Quod spectat ad Columbom, fateor in eo gitante mutatas fuisse istas voces, pro inspiratione legendum expiratione, attamen Columbom fallum scripisse certum est: nam in inspiratione, quomodo potest Diaphragma sursum ascendere, in expiratione relaxatum descendere, cum impediatur istam relaxationem & descensum



sum colligatio mediastini. Nam cum descendit in Inspiratione, ad id cogitur per suam contractionem. At concidit & relaxatio diaphragmatis est spontanea ex *Laurentio*. Vix cessat expiratione, ideoque reuulsus & contractus diaphragma perpetuo cernitur, viden vt *Columbo* contrarius est *Laurentius*, quod non animaduertit. Rationes quas adduxi probabiles, ad confirmationem ipsius opinionis *Columbi* & *Laurentij*, si placeat *Crispiano*, ipse tanquam meam opinionem adducit, cum tamen sequentibus lineis contrarium docuerim, vt paucis multa comprehendendo. Aliorum opiniones temerarie non solum negligere, sed rationes quasdam addere volui, ad probabilitatem demonstrandam, vt ipse fuitur, *consilio* 18. Saepius in sectionibus viutorum animalium deprehendi septum in inspiratione contrahi, in expiratione relaxari. Inde falsò colligit *Parisianus*, nec velle in inspiratione sursum attolli diaphragma, in expiratione relaxari, & descendere, quod nunquam dixi, sed semper improbaui, quoad descensum.

*Forsan hic motus est violentus & convulsivus in moribundis animalibus*, quid inde reprehensionem dignum, fuisseam fortem contractionem dixi, forsane esse violentam in animalia coesto & pereunte, quod quispiam tale iudicaret, & hac particula *forsan*, id significat.

Quærit *Riolanus*, unde pendeat motus ille diaphragmatis irrequietus, noctu diuque periclitans, an sit congenitus, an aliunde fluat, an à Corde centrum diaphragmatis perpetuo feriente. Id impossibile credit, nec ab vilo homine scriptum & imaginatum, nec ferire centrum diaphragmatis. Nunquam vidit pericardium orbiculatim centro neruo diaphragmatis adnexum, & sic dirigi consilium Cordis ad centrum diaphragmatis, quod percurrit, dum contrahitur, & elongatur, ad expulsiuio arteriosi sanguinis, & Aortam eminentem ferire pectus, versus mammillam sinistram.

Dubitatur *Riolanus*, num motus ille diaphragmatis, pendeat ab amplificatione & contractione pulmonum, qui affixi sunt diaphragmati: dum amplificantur in inspiratione, deorsum impellunt diaphragma, atque tum contrahitur, sed redarguit hanc particulam, quando in isto tractu, sursum pulmones impellunt ab ipsis impellitur. Inceptus homo non intelligit ab ipsis pulmonibus amplificatis pelli deorsum diaphragma, tumque contrahi in inspiratione. Dum supra reuelliunt, & ad suam naturalem figuram reuertitur, impellit pulmones ad expirationem. Quid opus est tot exclamationibus absurdis in hac particula, Deus optime, & Deus pluitquam optime.

Novum idipsum scripsisti, in expiratione contrahi & compressis pulmonibus, ex ascensu diaphragmatis relaxati, & intra thoracem protuberantis fuga vacat, superne reuelli diaphragma, & ad suam naturalem figuram redire. Adde etiam adiuuante istum motum Mediastini colligatione, quid absurdum ibi offensis? In Thorace quiete, quando horax deprimatur, & cum diaphragmate relaxatur, & consequenter coincidentibus pulmonibus, quomodo pulmones contrahuntur?

*Resp.* Aliud est loqui de libera, aliud de violenta respiracione, in libera solum diaphragma agit & compellit pulmones ascensu suo, in violenta expiratione deorsum trahitur à musculis Thoracem deprimentibus, & cogitur sequi motum thoracis, tum diaphragmate priuato suo libero & spontaneo motu.

*Eludit & irridet*, quod dubitando dixi, existimares aliquis diaphragma in expiratione contrahi, hac potissimum inducitur ratione, quod dum contrahitur, crassum euadit, & tumore suo deorsum prelit.

*Resp.* Nonne verum est omnem musculum dum contrahitur abbreviari, & intumescere, intumescitiam illam in musculis abdominis compellere subiecta corpora, similiter diaphragma, quod in violenta expiratione contrahitur, vt intumescat, & suo tumore, siue protuberantia, intus compellat ventrem in vomitu, fundum vteri in parturiente, ad Fortis expulsiuonem, & fixam excretionem in colo resistantium: Subiecit *Riolanus* responsionem huic difficultati, & malignè cum ipso agit, textum mutando, aliter interpretando, vt inueniat, quod obrodat.

His addo, si contingat laxari deorsum diaphragma, & nequeat superne reuelli intra Thoracem, lædatur respiratio: & quibus est ita relaxatum, stantes & erecti, sentiunt in dorso & ferno chondarum tensionem ac diuulsionem, ex pondere viscerum aggrauantium diaphragma. ex inferna retractione Mediastini: ideoque cognatur puluillo oblongo ad regionem stomachalem appresso, cum cingulo siue fascia sustinere pondus viscerum, vt commodè respirent absque dolore. Id à me saepius obseruatum, quod indicat necessitatem ipsius vinculi suspensorij, ex Mediastino suspendente diaphragma, quod delapsum ultra suum terminum, nec superne reuulsus,



maximè incommodat vitæ. Eodem artificio vtendum in prolapsu Lienis, vt in suo loco contineatur, & sùstatur, suàmque adhæsiõnem ad ventriculum, peritonæum & diaphragma restauret.

Præterea, dum agit & contrahitur diaphragma, dilatat non seipsum, sed thoracè, dum retractum deorsum cõtrahitur, spatium relinquit amplius pulmonibus dilatandis. Præterea dilatatio thoracis, differt à dilatatione diaphragmatis, quia tum cessat ab actione, & redit ad suam figuram, atque angustior redditur amplius thoracis, ob ascensum diaphragmatis. Vnde & peritè demonstrat *Tulpius in suis Observationibus*, in viuentibus reuolui magis diaphragma, quam in mortuis, & ob id inter tentam & quariam costam incidendum thoracem, ad euacuacionem materiæ contentæ, atque reuulsiõnem diaphragmatis ad superiora adeo vehementem esse statuit, vt per exiguum foramen attraxerit ventriculum, & eolum intestinum, ex relatione *Ambrosii Parisi*, qui hoc notauit. Ex *Galeno libro quarto de locis affectis, cap. 4.* Quendam equus in septo transuerso calcitrato suo læserat, exinde remansit in hac parte imbecillitas, dum respiracionem inchoabat, omnes thoracis musculos mouere cogebatur, etiam sanus esset. Atus: Et Athleta nomine Secundus, cum in sepio transuerso imbecillitatem nonnullam perciperet, omnes vna respiracione musculos thoracis mouebat. Hoc vitium, inquit *Galenus*, ælimare oportet, dum quietem agimus: nam tum sola diaphragmatis actio sufficit, quod si tunc omnes thoracis partes mouentur, aliquid contra subesse suspicandum est. Ex hoc loco colligo, solum diaphragma in sano & bene habito corpore, naturalem spiracionem dirigere, absque auxilio reliquorum musculorum.

Tandem post istos tactus 24. virulentos, quos absterisi spongia Alexiteria, declaras, quomodo moueatur diaphragma, respiracionis principium & author, cuius motus, siue actio parua & placida dependens à neruis diaphragmatis medium ingredientibus non sicut à recurrente neruo, deorsum alis, parumper eleuantur proximi & conuigui pulmones, ab aère vltimus ingresso dilatati, altiusque elati, quam primas diaphragmatis motus coegerit, postea sese in elatore positum sustinere non valentes, in suum naturalem statum concidunt efflantes, & suo pondere in expirationis actu paulatim deprimunt, ac de pectus diaphragma, quod in tali minimo motu, cum non habeat contrariam musculum mox exurgit, semper agendo & offerendo, & sic perpetuo in actu est, vt musculus in bratis oculum suspendens, vt musculus aut leuiteres, musculi anam & vesica collium constringentes qui in officio sunt semper, naclū digne, nisi voluntas seculi imperet, & vis cogat. Eandem sententiam protulit parte prima suarum Subtilitatum, sed textum præsentem solocismis repurgauit, ne fastidium adferrent Lectori.

Multa hic noto absurda. Imprimis motus diaphragmatis est à neruis duobus instar recurrentis nerui. Concedo, si diaphragma ascendat in inspiratione, & ex conuexo intra ventrem exurgat, contractis atque adductis fibris, ad rectam figuram accedat. At non constat inter nos de naturali figura diaphragmatis in suo situ: nam extra deberet esse conuexum intra ventrem, concauū versus thoracem. At in mortuis inspectio contrarium docet, atque Mediastini colligatio: nerui quidè diaphragmatici reuulsiõni diaphragmatis inferuunt in expiratione ad eleuationem. Ridicule comparas motum diaphragmatis, musculis sphincteribus aut, vesi, a, musculo suspendenti oculum in bratis, qui sunt in officio naclū digne, nisi voluntas imperet, & vis cogat. At illi sunt perpetuo quieti & contracti, nisi laxentur necessitate cogente, diaphragma est in perpetuo & irrequieto motu, vide quam iuste comparas diaphragmatis motum actioni musculorum sphincterum, & reprehendis *Riolanum*, qui contractionem diaphragmatis comparauit contractioni sphincteris ani ratione villorum contrahentium.

Pro coronide sui triumphi, *Papianus* *Riolanum* accusat, quod imperit articulo actionem, siue motum tribuerit. Nescit ille, articulum de finiri, ossium commissuram cum motu. nec vllus extat articulus, qui non habeat motum manifestū, vel obsecutum. Inde duæ articuli species, diarthrosis & enarthrosis. At symphysis quæ opponitur articulo, est ossium connexio, sine motu. Ergo motus requiritur ad essentiam articuli: at ille postquam demonstrauit ossa moueri per musculos, actionem ossium dependere à musculis, morum articuli esse passiuum fateitur. Ergo actio ossis, est passiuæ, & eo sensu intellego. Præterea, *Riolanus, comm. in lib. Galeni de Ossibus, articulo de generatione ossium, demonstrat*, ossa nullam habere actionem, sed vsum, ne quidem dentes. Præterea ridiculus est *Papianus* in ista reprehensione, nodum in scirpo quærit, nec potuit in tota mea *Antrographia* vllos errores annotare.

Non contentus *Parisianus* reprehendisse *Riolanum* in structura Diaphragmatis, etiam in oculi fabrica ipsum atq. *Laurentium* redarguit: id cautè fecit, nam scripserat Italicè, ne *Riolanus* intelligeret. In ista tertia parte suarum Subtilitatum ingenuè fatetur, se proximè annis Platonis, septuag. simum annum agere, memoria fermè destitutum, facultatibus amabilibus demerentibus, quo tempore *Plato* è Schola fuit expulsus, & tamen audet in arenam prodire.

*Quo mori tunc vis, meioraque viribus andes,*

*Non tale auxilio, nec defensoribus istis Tempus eget.*

*Ipsè exoptat,* ut *Riolanus* suis obiectionibus respondeat, quod præstat: Non sine eius dedecore & infamia, nec ad alendas *Græcæ* expectabit, ut *ipsè* scribit per contemptum.

Quod id à ceratrum deprehendis in examine tunicarum oculi, & earum hypatxi. Dixit *Riolanus* p. 412. *Anthropographiæ* præcedentis editionis, duas tantum esse vellas tunicas, quæ ambiunt & circumdant oculum, quales sunt cornes & vuez. Reliquæ sunt earum portiones, vel humorum ligamentales: postea pag. 414. postquam Veterum & Recentiorum sententias de tunicarum oculi numero examinavit, sic statuit. In tanta Authorum dissensione, super numero, & appellationibus tunicarum oculi, humerum talem proponam, quem possibile sit demonstrare, & appellationes Veterum tribuere. Itaque sex dumtaxat tunicas constituo, & demonstratio, &c. quænam in istis continetur?

*Riolanus* non potest demonstrare pupillæ è tunica. Modum ipsum separandi docuit, & quid esset, atque rara de parte ipsa proposui, ignota *Parisiano*. Nil nisi nugas aduersus Amphiblistoidem suggerit, quæ non merentur ullam responsionem. Quod spectat ad æquem humorum, omnes Optici dicunt oppositum esse Crystallino instar crystalli, ne obiecta maiora representet Crystallino, principi parti oculi, à qua depicet vitros: ille exprobrat hoc ab ipso depromptum fuisse, nec ita fieri obiectorum representationem, sed per lineam pyramidalem, cuius extremitates perueniant ad opticum. Ego ipsa vuez latior in Crystallino, exilis erit in nervo optico. Interim obfervanda sunt ignorantia hominis, qui Retinam, Reticularem, Amphiblistoidem, diuersas tunicas constituit. Vitrei humoris usum reprehendit, ut si quid luminis Crystallino insuperit, in eo hebetetur, nec ab opaco coloratque corpore vuez ad Crystallinum transit, quoniam ea lucis percussio visionem interturbaret: si vndeque pellucet Crystallinus, potest parte postica reflecti imago, & ad partem anteriorem retrocedere, idque visum interturbaret: quodnam eratrum in ipso vfu Vitrei humoris assuetum. Tæc obiectiones ridiculæ dissipantur ex ipsa responsione.

Retineo etiam, quod *Riolanus* dixerit Vitreum, esse excrementitium aliquid, fore, ac vivificare Crystallinum sibi unum sibi & inculcatum, quod est nutrire. Fætor non habere venas, nec sanguinem nutrit. At tamen semineo spiritu nutriti instat: cui optici ridiculum est, nisi adustus feminalem materiam ubique, & potissimum in Cerebro collectam esse: si Crystallinus pars est animata, vivit, & nutritur.

Ineptè & pueriliter de Aristoteli vasa vasorum Cordis in Fœtu, & de illo transitu sanguinis à dextro sinu in sinistram, iuxta sententiam *Fallopj* disseruit, contra *Ioannem Vesaliu*, qui licet ab eo fuerit læssus, ipsum senem delirum at repuerascentem designasse est, nec eius delirii respondere voluit. Nihilominus superbe & insolenter gloriatur, se certasse cum omnibus cuiusque nationis præcipuis Anatomicis, Gallis, Hispanis, Anglis, Regijs Medicis, & protomedicis, præcipuis Patavinis lectionibus, ac cum Venetis, demum cum Germano Anatomia Professore Patavino in arenam descendisse.

Quod spectat ad *Riolanum*, tam vultus & triumphatus læcet & gemit,

*Hec pator telis vulnera fissa meis!*

Nunc contemptus ab omnibus, quoniam utrinque nostrum luculentum iudicium à celeberrimis Doctoribus Parisinis scriptoribus, Academicis, Rer. que Medicis latum est. Eloquar, an similem, istamne iniuriam nostro ordini & Collegio factam dissimulabo, quod approbarent ineptos & indoctos *Parisian* libros: quid Itali, Germani, & Angli iudicabunt de tali iudicio, cum libros *Parisian* improbauerint? Numquid tales eruditos viros credè contra decus & dignitatem artis, & scholæ peccasse, nili vidcam autographum: supponit enim istas epistolas laudatorias, alioqui mirarer *Parisianum*, eruditos viros, ab eius si lucra & ostentatione potius seductos, inuenisse præcones & laudatores operis sui, atque solum Gallos fatis perspicaces, nullos alterius nationis, nequidè *Patavinus*, & *Venetos*, quorum suffragium & approbationem, si ambiuit, illi decederant. Gallos

tamen non reor in odium & contemptum *Riolani* istas laudes emendicatas, vel vitro oblatas, & consolationes *Parisano* dedisse, sed potius ipsas epistolas laudatorias quas habent, accuratas, meditatas, & paratas ad ostentationem ingenij transmississe, sunt enim qui hoc scribendi genere delectantur, verè cymbala mundi, vel potius publica famæ Tympana, sicuti *Appian Grammaticus*, qui immortalitatem pollicebatur us, ad quos scribebat, inde famam aucupantur, vel amicitiam extorunt, mutua, ac reciproca laudatione veniunt & ambiunt, sperantes editionem ipsarum epistolarum publicam, ab his hominibus scripturientibus, parum tamen solliciti quid iudicaturum sit præsens & futurum sæculum de tali iudicio, quando à doctis & peritis Lectoribus immeriti, atque laudati Authoris inficitia & imperitia detegerit. Aut nunquam ipsius authoris opera legisse verisimile est, aut suam ignorantiam in ea re patefacere, de iudicio posteritatis securi, aut in alium Antagonistam maleuolum animū testificari voluisse: quàm pulchrum laudari à laudato & prudenti viro, alterius laudatio de decorat. Errantem qui laudat, ad errorem magis allicit, atque alios decipit, totique posteritati fucum & iniuriam facit. Sua approbatione vadem & spondet libri se collituit, instar veri & pij patris, qui spondet de Christianissimo infans, quem de sacro fonte baptismi leuauit. Numquam *Crato*, *Galerus*, *Ærasmus*, *M. Iulii* doctissimi & cordatissimi, præfationibus, & epistolis libros alienos commendauerunt, nisi mererentur, qui scirent, famam suam prostituere, & merito pro veris adulteribus haberentur. *Galenus* suspectus habet ipsas laudationes medicamentorum, quibus non esse fidendum monet, & magna cum cautione ipsa medicamenta usurpanda. Ita de ipsis epistolis commendatis sentio, & iudico. Quis enim medicorum humanioribus literis, Philosophia, & Mathematicis, feret, libros *Parisani* de Subtilitate præfationibus *Cardani* & *Scaligeri* de Subtilitate, & adeo anxie expeti, vt deterius sit illi viuendum, si careret: ergo similes habent labra lactuosa, ad bene viuendum. Namquid mihi placuit *Pliny junioris* consilium de laudatione librorum, siue plus, siue minus, siue idem præsit, lauda: vel inferiorem, vel parem, vel patrem. Superiorem, quia nisi laudandus ille, non potes ipse non laudari: inferiorem, aut parem, quia perit in tuam gloriam, quàm maximum videri, quem præcedit vel exæquat. Equidem omnes qui aliquis in studijs egerunt, venerari, mirarique solent. Itaque honos erit in honorante, non in honorato, ex *Aristotele*. Sed qui laudat librum indignum, fallit præsentes & posteros: qui ope am legendo, pecuniam emendo disperdunt. *Plinius Iunior*, regnante *Traiano*, fuit præfatus *Aulicis*, & effusator eximius, qui talibus epistolis luit & illudit: Confimile fuit præcedentis sæculi vitium: id reprehendit *Iuuenalis*.

Quid Roma faciam? mensis mense, Iuueni.

Si malus est, nequeo laudare, & poscere.

Istam humanitatem *Pliny* non obseruauit *Parisannus*, quia nullum laudat, sed passim glosiatur se vicisse *Gallos*, *Anglos*, *Hispanos*, *Italos*, *Germanos*, Prof. flores Medicos, Anatomicos *Patauios*, & cum omnibus singulare certamen dimicasse: triumphator perpetuus: sic *Theophrastus* apud *Plinium*, *Neronis* principatu, maiorem cuncta placuisse, & rabie quadam in omnes aut sui Medici petorans, monumenta sua latronum iussu subuersa sunt. Si fato functus est *Parisannus*, meliore sui parte relicta, id est libris suis adhuc viuit per ora virum, quorum tutelam suscipere debent, qui illi patrocinantur, & tot coronis caput eius cingit, qui is est *Doctus* Physicus *Venetus* postremis libris solus encomiastes inter *Italos*. Verum vt in *Mugicis* lunt quædam laudationes effascinantium, quæ magis lædunt, quàm laudato profunt: vnde apud Poëtam.

Ex fœdera platum laudasti, Racheare frontem

Cingite, ne uati noceat mala lingua futuro.

Confimile puto elogium *Parisano* consecratum. Huic *Doline* tantopere placuit *Parisannus* eloquentia, vt in eius elogio vtatur nomine *Baronorum* pro *Baronum*, veluti *Parisannus* in epistola præliminari ad *Sabellius*, quæ lordida est, innumeris barbarismis & solæcismis conspurcata, nec melior quæ Imperatori dicata fuit, atq. tot præmis, eloquijs insignibus, torque aureo non mediocri & titulo Comitum *Palatini* remunerata. Id fecit, vt opinor, exemplo *Syllæ*, qui maius opus veris inficetis offerenti, donum dedidit, ea conditione, vt ad eum non amplius accederet cum talibus nugis. Sed satis or honorem Comitum *Palatini* merito tibi concessum, ob Latinitatis ignorantiam, vt loquitur *Gallicè*. *vous estes pau Latin*. Si doctissimorum Medicorum iudicia de *Parisano* requiras, quæ aliis laudantibus opponam, fideliora iuuenies capite pro me libri

de Circulatione sanguinis, Authore *Riolano*. Possem innumeras epistolas laudatitias & congratulatorias de meis operibus Anatomicis in medium proferre, sed modestia mea me reuocat ab ipsa ostentatione. Nam vt prudenter monet *Symmachus* lib. 1. *Omnis ostentatio non caret suspitione mendacis, quia quicquid assumitur, proprium sibi putatur, dehinc iactantia anara laudis, multum decoquit de pudore.* Conqueritur *Parifanus* de *Riolano*, quod nullo modo laceſcit, ipsam inique vexari, iniuriis affecerit, eiusque libros *Luco* & *laſſione* indignos iudicari. Cum tamen à proceribus *Academiz Parisiensis* laudatus & approbatus fuerint, vt et falso reletum fuit, deluſus ab eis, qui simulant amiciciam, & aliter ſentunt & loquuntur. Cur enim *Riolanus* insignatur & traſſatur, cum *Parifanus* sine ulla personarum acceptatione, omnes *Anatomicos* cribrari: Cur non eadem cribro ego, sua pauca de *Diaphragmate* non ſubmittit, an veritatis cribro (quod à *Parifano* depēdet) immenſum & liberum se erigit, cequo praeſtigio, ( & tu quodnam habes priuilegium ) an ab *Apolline* montes *Parnassi*. Cur non patienter admittit istas iniurias *Riolanus*, qui pro more ſuo nihil ſtatuit in difficultatibus. De *Diaphragmatis* verò motu, adeo dubius & obſcurus eſt, vt quid ſibi boni vellet, non facile colliges. Hanc eſſe putat modestam correſtionem, *Riolanus* iſtam iniuriam ſibi illatam ſubſcrituit. Nec vlciſcendi cauſa iudicium ſuum de *Parifano*, nobilibus *Exercitationibus* ſubtiliſſimis propoſuit, ſed veritatis amore, vt moneret lectores de imperitia & inſcitia ipſius hominis inſtar pauonis ſuperbientis. Nec poterat meliore loco, cum ipſo mitius agere, quam ipſum annumerando *Anatomicis*, de quibus ſincere ſuum ferebat iudicium. Sed ex omnibus notioniſus *Gallia*, *Germania*, *Italia*, *Anglia* doctiſſimorum *Medicorum*, *Academicorum*, *Parifanus* adſert teſtimonia, & approbationes ſuorum librorum, quibus placere, *Riolani* vero opera ſuere ſuſtituta, improbat & condemnata, quas tamen cenſuras manuſ reticere quam enſilare, contentus teſtimonio *Medicorum Parisienſium*, quia nullas poteſt proferre. Neque vnquam *Parifanus* ab vilo Authore citatus fuit & laudatus, vt *Riolanus* ab omnibus, qui de rebus *Medicis* & *Anatomicis* ab annis quadraginta ſcripſere: quorum ingentem catalogum poſſem contexere. Nunc *Parifanus* contentus eſt duorum *Parisienſium* *Medicorum* eſlogiis, quorum tamen arbitrio & iudicio ſe ſuæque ſubmittit. In iſtis epistoſis laudatoriis & commendatiſis librorum, fallacibus, non video nominatum *Riolanum*, & quidam *Medicus* innominatus optauit, vt leues quaſdam iniurias *Riolanus* tibi condonaſſet. Ergo te agnoſcit aggreſſorem. Addit: certe *Riolanus* noſter tantum eſt in rebus *Anatomicis*, vt ſi illum ſemel de gradu deieceris, nulla tibi reſtat amplius difficultas audienda, ad principem locum in hac difficultate, lego facultate, obtinendum & retinendum. Ergo ſuperiorem in *Anatomicis* *Riolanum* agnoſcit. Tanta vis eſt veritatis, vt culpam incogitante emendet, & quem oderis, etiam inſcienter extollas. Videris alterum *Medicum* obiurgare in quadam reſponſione, quod illius *laetratus Parisienſis* nullam verbum inſeruerit in ſua epistoſa. Nichilominus tamen, quia res concuſſa tot agitur, tue magnæ modestiæ & prudentiæ acceptum id referendum duxi: Ceterum, generalis de vitiis reprehenſio in iſſe procedit, inquit *D. Hieronymus*, cum nemini ſi iniuria, ſed omnes tanquam mali accuſantur. Sic duo *Medici Parisienſes* ſuppoſiti, innominato *Riolano*, in alius reprehendunt maleuolum animum, qui te non agnoſcunt pro ſummo *Medico*, & perito *Anatomico*. Similiter *Riolanus*, diſſimulatis *Medicorum* nominibus, iſtud ſcribendi genus epistoſolare, tanquam ridiculum commercium litterarium, verboſum, abſque doctrina damnauit, ac improbaui, licet, ſemperque laceris parere perſonæ, dicere de vitiis, lapidem in medios canes proiecit, ſi quem offenderit, ille latrabit, & lapidem remordebit. Obſicit *Parifanus* *Riolano*, quod in libello famoſo, cui titulus eſt, *Laurus Palmariæ*, diſcriptus & inſamatus fuerit à *Medico Parisienſi Palmariæ*: Is de Chymicis ſcripſerat abſurda multa, fingendo ſe reſpondere *Libanio*, Chymico, pro deſenſione *Scholæ Medicæ Parisienſis*. Hoc ſcripto nobis illudere, ac magis introducere chymica medicamenta multis *Doctōribus* viſum fuit. Super ea re conuocatum Collegium, huius libri cenſorem elegit *Riolanum Filium*, qui perleſto libro, poſt oſtiduum, ſuæ cenſuræ articulos toti *Scholæ* conuocatz obtulit: Inde decretum *Scholæ* aduersus *Palmarium* emanauit, vt niſi reſpiſceret & eiuraret ſcripto, manu propria ſignato iſtos articulos notatis, graui poena mulctaretur: quod cum reſcuſaſſet præſtare, *Scholæ* ingreſſu, honoribus, emolumentis priuatus fuit, & de catalogo regentium doctōrum expunctus: de iſto decreto prouocauit ad ſupremum Senatum: Caſſa ſolenniter & publicè in Senatu, ab oratoribus vtrimque diſceptata fuit, & irreuocabili Senatusconſulto, ſiue Arreſto, *Scholæ* decretum confirmatum. An

ideo taxandus venit *Riolanus*, quod veram & legitimam Medicinam tentatus fuerit aduersus imposturas chymicas Palmarij *Ioannes Duretus*, *Ludouici Flini*, eum vidisse meam censuram aduersus libellum famosum, scilicet Lauri Palmariam, sic subscripsit propria manu, quod conferuo & dubitanti ostendam. *Hic liber summa habet omnia insulti, errorum, impostura, arrogantia, p. Juny 1609. Io. Duretus.* Parens meus contra libros *Quercesani*, Censor perpetuus, à Schola electus fuit, & rogatus cum approbatione libelli apologet. Post adeptum doctoratus gradum voluit Parens, ut ei succederem in isto labore: Id in me recepi, & conatus fui defendere Scholam aduersus impostorē *Quercesanum*, nostros ægros in hac vrbē latrocinantē & officiosissimē chymicis remediis iugulantem. An ideo damnatus fuit *Riolanus* à Schola Parisiensī, cui placere, elusque famam tucti gratius & honorabilius semper duxit, quam fauere istis chymistis impostoribus, nostras praxes prædantibus, nec cum ipsis commercii habere voluit quæstus causa. At *Doctor Parisiensis* praeclarissimus, suis versibus inter illustres *Anatomicos* ipsum Riolanum non accensuit, sed Parisianum. *Nemo propheta in patria sua*, ac præsertim inter Medicos, quoniam inter mendicos regnat semper inuidia, quam expertus sum maiorem à quibusdam sycophantis & temulentis. An equā vrbē discederem, missas à Rege, desideratus à Serenissima Regina Matre ad suum seruitum, quo tempore iam in hac vrbē assequutus fueram locum inter primarios & magnos pragmaticos, non malis artibus, sed virtute duce, & comite fortuna, tunc potuissim instar *Romani Medici Stercini* apud *Plinium*, qui imputauit principibus, quod *Isestus* quingentis annuis contentus esset, sexcenta sibi quæstus vrbis fuisse, & numeratis domibus ostendebat. Sic ego ex populo, & stipendii annui principum, maiorem quæstum ostendissim, quā in aula Reginz, ex annuo stipendio decem millium libellarum, sed meum obsequium erga Regem, & Reginam Matrem, me ad mediocrem fortunam redegit, zelus domus eius comedit me: Itaque redux ad patrios lares pauperior fuerim, quā cum ad Aulam accessi. Atque pro omni remuneratione, sola obsequij gloria mihi relicta fuit, quinetiam magna pars stipendij substracta, ut composita summa in numerato esset. Nihilominus

*Æmulo dabitur quantum petis, & melius nos*

*Egimus.*

Sic in aula Regia viuatur, nisi habeas fautores, laudatores, & insignem artis gnathonicæ peritiam & assentionem eximiam, ais aio, negas nego, etiam ægrorum detrimento, vnde quæstus vberimus,

*Hec magnum a terius frustra spectabis æcernum.*

Post meum reditum, in Aula Regia, à quibus sperabam ad Regem fauorabilem accessum, contrarios recognoni, repulsentantes Reginz regnique ministris, meā presentia, Regi ægrotanti, inuicere ex obitu Matris renouatum iri: sicque à Regis conspectu me summouerunt: In hac vrbē Medicorum imperium inueni diuifum in factiones, ægris valde perniciosas, dum præualens præceos manceps, aliorum animos ædunt, & ad se conuertit, in odium & sæpe ludibrium alterius Medici ducti prohi, senioris, aliter opinantis cum ratione & experientia, quia numerantur suffragia, non ponderantur, cum tamen nihil sit magis inæquale, ac periculosum, quā æqualitas ipsa. Nam cum sit impar prudentia, par omnium ius est. Vbi de vita hominum agitur, ad lubitum vnus, alios ad se trahentis.

*Summula ne pereat, qua vultu testata venit.*

Sic animas hominum negotiantur Medici, inquit *Plinius*: Itaque si velis rem facere, loquendum cum multis, sapiendum cum paucis: Non ignoro, quod scriptum à *Plinio*, in epistolis, singulis integra re dissentire fas est, peracta, quod pluribus placuit, cunctis tuendum est. Ex istis fœderatis, nonnullos meæ famæ obstrictantes offendi, ne gradum peritiz apud populares nostros, & principes recuperarem, sed in hac ætate leuili contentus sum mea fortuna, modò sanus otio litterario fuar, & in Christo rectē viam,

ac proinde,

*me nemo iniungro*

*Fur eris, atque ideo nulli comes exeo, tanquam*

*Mancos & extincta corpus non vile dextra.*

Hicce finio meam querimoniam, quam extorsit spreta iniuria famæ, & exprobratus mei nominis contemptus, in hac vrbē *Parisinsī*. Atque claudio meam responsionem ad libellum famosum *Parisani*.

Cum igitur ad metam laboris Anatomici peruenirem, si Medicorum Anatomicorum expectationi abunde non satisfecerim, veniam deprecabor more Athletæ in stadio deficientis, vel succumbentis, qui populum extrema toties exorat arena. Nero postquam canere desisset in Theatro, conuersus ad iudices dixit, *omnia quæcumque facienda erant, feci, sed cunctus est in manu fortuna.* Sic de meis laboribus Anatomicis, Lectoribus liberum relinquo iudicium. Scio tamen, & hoc confiteri possum, Anatomen perfectius explicatam in hoc Opere, quàm à prioribus Anatomicis. Antea cæcus eram, & cæcitatem amabam, & ad tenebras ambulabam: gratias tibi lux mea, quæ illuminasti me, & cognoui te, lucerna Dei, spiraculum hominis, quæ inuestigat omnia secreta ventris, quia secreta corporis nemo percrutari & inuenire potest, nisi fuerit Dei lucerna illuminatus.

*Largire ergo mihi Rex, ô dignissime Regem,  
Vt te cognoscam, placeam tibi, deinde sciam me,  
Quid sim, quæ in terris causa produllas, & unde  
Huc veni, ac tandem quo rita sanctas abibo.*

## PSALTES REGIVS

Psal. 138.

**E**cce Domine, tu cognouisti omnia nouissima & antiqua: tu formasti me, & posuisti super me manum tuam.

Mirabilis facta est scientia tua ex me: confortata est, & non posero ad eam.

*Quia tu possedisti renes meos, suscepisti me de utero matris meæ.*

Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es: mirabilia opera tua, & anima mea cognosces nimis.

Non est occultatum os meum à te, quod fecisti in occulto, & substantia mea in inferioribus terræ.

Imperfectum meum viderunt oculi tui: & in libro tuo omnes scribentur, dies formabuntur, & nemo in eis.

FINIS.

PRÆTER MISSA SVIS LOCIS INSERENDA,  
quibus si velis frui, Paginæ locum notulâ signabis,  
vt legendo recurras ad istam Appendicem.



*AG. 17. post lineam 16. adde Hippocrates lib. 1. de articulis, Homerum producit, vt demonstrat in bobus per hyemem macilentis, Os fe-*

*moris, è suo acetabulo facile prolabi.*  
*Pag. 30. l. 21. post reprehenderet, adde. Ideoque si velis habere fideles versiones librorum Anatomicorum Galeni, non illæ sunt accipiendæ, quibus Vesalius manum adhibuit, sed elige versionem Guinterij Anderuarii pro Administrationibus Anatomicis, & recognitionem Sylag pro libris de usu partium.*

*Pag. 47. linea vltima. Idem lib. 6. de usu partium, cap. 12. vbi ordinem suorum librorum Anatomicorum proponit, notat encheirises à veteribus prius obitas fuisse.*

*Pag. 48. l. 8. post sectionem, adde. à vniuersis, diligenter secare significat.*

*Pag. 53. l. 33. post cap. 9 adde. Itaque apud Aristotelem, & Hippocratem in suis incantationibus, de commentariis intelligendum, ut dicitur in his incantationibus, de picturis.*

*Pag. 52. l. 17. post compleuit, adde. D. bet sensim assuescere huic spectaculo instar Leonis & Aglaonis filij, apud Platonem, qui cum circa muros Athenienses è longinquo vidisset interfecit homines, exhorruit istud spectaculum cadaverum iacentium, sed ipsa præsentia affluctus contredauit, curauit sepeliri, & inter cadavera interceptos verlabatur.*

*Pag. 12. l. 14. post meruerunt, adde. Forsan aliquis in lectione librorum versatus, opponet aliorum auctoritates, qui manu exercitium improbarunt. In artibus & scientiis honorabilibus Aristoteles lib. 5. disponit. Non continuo qui admirantur factum aliquis, incitantur ad id efficiendum. Imò quos sæpe delectat opus, & continentur opificum, quod in vnguentis visu venis & purpura, hac nobis grata sunt: attamen Trinitates & vnguentarius fordidos & viles contemnunt, qui verò viles per se artes obis, hic ad honesta studia sanctæ industriæ, in suislibus rebus præferri contra semetipsum se ipsum. Aristoteles iustitatur Boethius lib. 1. Musices, cap. 34. Omnis ars, omnisque disciplina honorabiliorum naturaliter rationem habet, quam artificium, quod manu atque opere artificis exercetur. Multo eum esse maius atque altius scire, quod quisque faciat, quam ipsum efficere, etenim artificium corporale, quasi seruientis famulatur, ratio vero quasi domina imperat. Galenus lib. ad Thrasibulum sub finem, ridet & describit insolentiam gymnastis, qui se præferebat Hippocrati & Galeno in hac arte, quod ipsi nescirent modos frictionum de quibus scriplerant, & iuuenem nudum introduxit in confesso Medicorum de arte gymnastica disponentium, vt demonstrarent frictionum modos: prudenter Galenus elusit istum hominem, & manum adhibere recusauit, quoniam Hippocrates lib. de Medico monet, vt nunquam se demittat ad vile ministerium frictionum, sed aliis relinquit: At in corpore humano manibus propriis tractare Anatomen, nemo nisi ignarus artis Anatomicæ, bene pexatus, & eleganter comptus recusauit, tanquam eleganti Medico indignum & indecorum, nili velit iubente Galeno, relegari cum Thessalo ad gynecum inter nentes mulierculas.*

*Pag. 8. l. 29. post manus, adde. Aristoteles lib. 2. de Anima, c. 9. notat hominem in sensu tactus præcellere cunctis animantibus. Inde colligit, hominem prudentiorem, quia qui dura sunt carne, ij sunt tardi ac stupidi, qui verò sunt carne molli, sunt ingeniosi.*

*Pag. 82. sub finem capitis 6. Vir doctus, etsi innominatus, libello Gallicè scripto & edito Lugduni Batanarum, contra circulationem sanguinis, existimat succum candidum, qui in venis lacteis Mesenterij continetur, esse portionem chyli pinguiorem, quæ generando adipi destinatur, atque deferri per vniuersum corpus, ad generationem adipis, quod non possum probare, nec admittere. Nam vias velim mihi*





*non esse scribendum vna, illud intestinum, sed vna. Id probat verbum Andromachi scilicet in Theriaca. Apud Pansum in membranis vetustis, Colum morbus scribitur per v, non u, quo primus Cæsar Tiberius laborauit.*

*Pag. 111. sub fine capiti 16. adde.* Admirabilis ipse implexus partium sibi incumbentium & adiacentium, diligenter euoluendus & notandus ad diagnosim multorum morborum qui ibi generantur. Si velis pancreas intueri, & reliquas partes vicinas, ac hærentes Diaphragmati, atque pericardij connexionem ad centrum Diaphragmatis, eiusque naturalem reuulsionem versus thoracem, atque viscerum nutritiorum, ac vitalium concatenationem ad Diaphragma, Sterni partes exteriores ritu Anatomico præparare conuenit, dein exactè rescindere sternum vtrumque more solito, eoque adempto facilis erit contemplatio partium vitalium & nutritiarum. Ac proinde manifestè videbis, & demonstrabis pancreas cum suo canali, distributionem venæ Portæ vsque ad originem, arteriam Splenicam repente iuxta Diaphragmatis partes infernas ad Lienem, arteriæ celiacæ distributionem ab exortu suo in trunco descendenti Aortæ, venæ Caux truncum separatam ab Hepate egressum. Venæ circa fastigium Hepatis, intra thoracem connexionem pericardij ad centrum necum Diaphragmatis.

*Pag. 113. l. 11. post animalium, adde.* Necessarium erat Venarum in Hepate discrimen, vt vnaquæque suum sanguinem peculiarem traheret. Vena Porta crassiores exsugit & distribuit omnibus partibus, quæ constituunt primam regionem. Vena Caux tenuiorem trahit ad Cor deferendum, ibi nouam elaborationem adeptus, mutatur in arteriosum, qui diffusus in corpus vniuersum, primum spiritus cum sanguine tenuissimo vitali supeditat, postea crassior transfusus in venas, recurrendo ad Cor, in transitu sanguinem crassiotem partibus omnibus impertit. Paterea venarum duarum discrimen erat necessarium, vt si vena Porta, & lecut fuerint obstructa, Lienque fungatur officio Hepatis, sanguis ibi elaboratus, qualicumque in venam Caux deriuetur. Vas autem per quod ad Caux transit, est arteria Splenica, quæ ab Aorta descendente oritur: inde sanguis labitur in cruales arterias, ab his in venas transit, vt ad Cor petueniat. Ibi nouam elaborationem adeptus, in vniuersum corpus effunditur, iuxta ritum circulationis.

*Pag. 120. lin. 3 post animalium, adde.* Cum copiosior bilis sit in Hepate, statim dolet Hepar, quod pueri Cor vocauit, ex Hippocrate, lib. 4. de morbis.

*Pag. 123. lin. 24. post Medicina, adde.* Licet in suis lectionibus Pliniani, agnoscat locum Pliny corruptum esse, sed neminem adhuc restituisse.

*Pag. 124. sub fine capiti 21. Horatius* focum & fomitem amoris iecur esse testatur, lib. 1. Ode 25. Cum tibi flagrans amor, & libido sequat circa iecur vlcerosum.

*Pag. 129. linea 28 post impediunt, adde.* Porto vit doctus innominatus, insignis Philosophus & Mathematicus, speculationi actionum corporis humani deditus, libello contra circulationem sanguinis Gallicè edito, agens de comæato chyli ad Hepar, suspicatur, venis lacteis reiectis, chylum per canalem proximam pyloro, fasileque patentem & peruium, nempe porum biliarium Hepaticum traduci ad Iecur, quamuis expurgationi bilis inferuiat. Hanc autem necessariam esse ad fermentationem chyloscos, vt necessarium est fermentum in panificio: sed cum omnis progressus coctionis fiat per secretionem excrementorum, & corpus nostrum solis dulcibus nutriatur, falsa quidem tellus, & quæ perhibetur amara, frugibus infelix, &c. inquit *Pæri*, ita sanguis biliosus, cui fel permixtum est, ineptus est alendo, sed dum attentius expendo istam opinionem, non absurdam esse puto in casu necessitatis, vt pote si intestinum Ieiunum sit obstructum ab aliquo tumore, & chyli præclusus descensus in tenuia intestina, vel mesenterium putrefactum & separatam ab intestinis, vt visum fuit. Tum auidum & famelicum Iecur, venis chyliis frustratum, exsugit chylum per meatum choloducum Hepaticum. atque etiam per ductum illum pancreatis & chyli traductione vel attractione absoluta, & fiet expurgatio fellis, vel sanguini permiscebitur, & per venas emulgentes secernetur.

*Pag. 133. linea 25. Animaduerto Aristotelem lib. 3. de partibus animalium, c. 7. scripsit* Lienem esse viscus necessarium, alibi alterum Hepar vocat, licet nothum, & Hippocrates sinistram Iecur appellauit.

*Pag. 147. linea 25. adde post flexurus.* Si vnus ren vel duo ab vlcere vel tabe consumantur, funguntur tamen suo officio, quod vidi in Domino Cancellario de Sillery,

& aliis, qui duos renes habebat consumptos, vt obseruatum in pollinētura ca duensis. Cancellarq: viuēbat tamē commodē, sine stranguria, & minxit facile vsq: ad interitum, quod indicat vrinam non elici, sed fluere ad renes.

Pag. 113. l. 42. post animaduēss, adde. Ideoque nihil putabant velandum, quia nihil tētibat refrenandum.

Pag. 147. lin. 32. adde. Salomon dicitur, l. t. Regum, cap. 2. ex renibus Davidi produisse.

Pag. 160. lin. 54. post deformitatem, adde. Apud Petronium quidam habebat inguinum pondus ram grande, vt ipsum hominem laciniā fasciā credēs, 3

Pag. 171. lin. 46. post id. vss, adde. Ex Autenna sen 20. lib. 3. non est turpe Medico, cū loquitur de rebus venereis.

Pag. 209. l. 5. In cadauere nutritis, si velis inuestigare meatus, per quos lac ē papilla prodit, à papilla tibi erit incipiendum.

Pag. 220. l. 34. post remigret, adde. Vel potius ne assatim sanguis in venam irruat, &ruptionem venę adferat.

Pag. 230. lin. 4. Facit etiam ad faciliorem expectorationem.


Pag. 232. lin. 37. post Cræco, adde. A corpiā, Dea Carna, siue Cardiana denominata fuit, quam Cordi præesse credebant antiqui. Nam huic parti Principi seruandæ nomen peculiare assignarunt, à quo precabantur, vt Cor & quæ sunt intus viscera salua conseruaret, teste Macrobo. Ex Cordis inspectione, præcipua pars Aruspici- nę dependebat. Antiquus enim erat sacrificiorum ritus, in quo Cor eximebatur, vt certior de futuris esset diuinitas, de quo meminit Galenus lib. de Placuis Hippocratis & Platonis, quod respexisse videtur Hippocrates lib. de Corde. Si quis veteris instituti probè gnarus, mortui animalis exempto Corde id obseruauerit. In Corde Medici duplicem debent considerare substantiam. Vnam materiam, quæ est Cor Alteram, æream, quæ est calidum innatum, diffusum per illam substantiam carneam, est enim inuēto vñ Hippocrati, lib. de Corde, quod fouetur à sanguine continenter affluente, atque hoc momentum & alimentum istius ignis innati, inuēto vocat Hippocrates, Aphoriz 14. lib. 1.

Pag. 241. sub finem pagina, quod Cor opitulatur confectiōni sanguinis, Galenus lib. 6. de placitis admittit, dum inuehitur in Erasistrarum, sic loquitur. Respondēbitis ita effectum, vt in iecore sanguis præparetur, atque inde ad Cor deferatur. Ibi postea reliquam formā perfectionem absolutam adepturus, quod certe ratione non caret. Nullum enim perfectum, & magnum opus repente vna aggressionē fieri, totamque suam expolitionem ab vno instrumento acquirere potest. Ac sane generaliter loquendo de animalibus, sanguis colorem rubicundum acquirit in Corde: nam in lampetra lecur est viri, de, vt in aliis piscibus diuersicolor, eum tamen sanguinis massa sit purpurea.

Quartimus doctissimus Philosophus, & Medicus commentario in librum primum Aristotelis de historia animalium, de sanguificatione facta in Corde sua præfert experimenta. In pullo lecur longè post Cordis systasim formatur ex luteo oui. Vnde diu colorem luteum retinet, & mihi maximum argumentum est vim sanguinis perficiendi, non in Iecore, sed in Corde esse, cū non solum Cor iam perfectum sit rubrum, & iecur adhuc luteum, sed ante lecur, & partes omnes Cor. quanquam album, sibi tamen sanguinem conficit, & quod in cadaueribus sæpe vidi, Iecore in diuersam pignus speciem perducto, ac fangi potius, aut sapiē corpus habente: Sanguis tamen pulcherrimus, ac multus in venis continetur, quod persuadet sanguinem in Corde, & venis confici, & à Corde primam originem habere, quod de origine venarum quoque dicendum est, cū eas in ovis primum à Corde exire videam, Iecore nondum consistente. Eandem doctrinam retinet, & fusius explicat sermone 2. de nat. hom. Pag. 243. ad finē pag.

Quod si velis more Paraly, dissecte & intrui cerebri flucturam, incipiendo à parte inferiore, absoluta anatome Thoracis, collum administrabis, ac demonstrabis musculos laryngis, ossis hyoidis, linguæ, pharyngis, capitis, colli antici & postici, venas iugulares, carotides, neruos recurrentes: primum detrahendo musculum latissimum, digastricum, mastoideum, leuatores omoplaræ, deinde separabis caput in prima & superiore colli vertebra, & caluam parte inferiore orbiculatim rescindes.

Pag. 247. lin. 3. post caput, adde. Cū enim opus imitari debeat opificem, qui sphaera quædam est & circulus, ait Hermes Trismegistus. Similiter fabrica hominis, opificius Dei, circulus est. Apud Apuleium, totus homo in capite & vultu con-

tinetur : nam prudentia & sensus omnis in illa parte consistunt, cætera omnia membra capiti ancillantur. Siquidem hominis nota inscripta est vultui, quia in facie hominis duæ nrlarum eminentiæ, per superciliorum arcus coniunguntur, superne cum naso, inde ad labra protensa representant litteram *M* intra cuius lineas duæ cavitates oculorum efformant duas litteras *oo*, quæ evidentius in oculis emaciatorum conspiciuntur, sub hac imagine  Inde omne legitur in facie : ac proinde, *signatum est super nos lumen vultus tui Domine.*

*Pag. 278. lin. 35. post cap. 6. adde. Tulpus huthorem æqueum regeneratum vidit, & repositum vocæ prolapsum ex vulnere corneæ, p. 62. Observat.*

*Pag. 283. lin. 156. post determinatur, adde. Intra Concham ductus est in palatum peruius iuxta apophylum pterygoidem, per quem captas spirare putabat Alcæmon, sordes auris expurgantur, surdi audiunt, si in os aliquis loquatur, sed respirationem fieri per aures in orihopnoea non concipio, quia ductus ille ab aure in palatum, non penetrat in laryngem, ubi obstructio & strangulatio continetur, ideoque Tulpus doctissimus fallitur, pag. 70. suarum Observat.*

*Pag. 284. lin. 8. post capitulo, adde. Nasi deformitatem, inquit Hippocrates, lib. de Artic. homines maxime oderunt.*

*Pag. ibid. lin. 55. post sunt, adde. De polypo narium doctè differt Tulpus 50. suarum Observat.*

*Pag. 286. sub finem capitis 7. adde. Membrana palati interdum crassescit per fluxionem, & adeo intumescit, ut fauces obstruat, veluti sciancta & propendeat. Id æpius vidi, lege Tulpium, p. 73. suarum Observat.*

*Pag. 288. lin. 52. post spatium, adde. Vidi anno 1637. linguam manifesto intervallo fissam ac bifidam, à mucrone usque ad dimidium. Istæ duæ partes erant subius junctæ subtensa sola membrana. Præterea lingua erat admodum spissa & dura, ac vesfuti callosa & scabra. Id cum D. Pimpernelle, Chirurgus peritissimo suspicati sumus emanare à lue venerica, ex salivâ oris impuri. Vidit Tulpus mulierem, quæ lingua nebat, filum in acum traiciebat, atque scribebat, cum manibus & pedibus careret ad opusaliquod ineptis.*

*Pag. 290. l. 16. post appellarent, adde. Dico ab attollendo, quia facile turgescunt & intumescunt.*

*Eadem pagina l. 10. post sunt, adde. Tumor lethalis interdum ex glandulis sub mento induratis ac scirrhosis accidit, quem vidi, ut eleganter descripsit Tulpus, pag. 85. Observat.*

*Pag. 279. sub finem, cap. 10. De generatione scrophularum circa ingulares venas perite scripsit Tulpus, quod etiam observavi.*

*Pag. 294. l. 41. post exiguum, adde. Veteres habebant instrumentum ad releuandam vvulvam, quod staphylopartum vocabant.*

*Pag. 315. sub finem capitis 21. adde. Musculi parvi occipitij articulationi circumiecti videntur potius ad firmitatem articulationis, quam ad motum comparati. Ideoque adipe duro sunt infarcti.*

*Pag. 321. linea ultima post separatur, adde. Nec prima costa movetur, quia latior, cæteris brevior, & spatium ad motum angustius.*

*Pag. 333. l. 31. post obtinuerunt, adde. Hoc musculo refecto versus suum tendinem, flexionem pedis admittit, & catena releuari debet ad incessum, & ambulationem.*

*Pag. 341. sub finem capitis 48. Transpositio est arteriarum pedis, ideoque venies ad pag. 347. & textum à linea 121. adiciet.*

*Pag. 349. linea 8. post caput, adde. Notatum ab Hippocrate, Aristotele, Galeno, spinam tanquam carinam nadis primam formati, ideoque fundamentum esse reliquarum partium. Eleganter Salmasius locum Platonis in Timæo, quo fatalis moriendi necessitas declaratur, interpretatur de spinæ compagine dissoluta. Nova igitur totius animalis compositio, quæ non habet Trigonum, ex novis veluti coagmentata statuminiibus, firmâ eorum inter se compagem nanciscitur. Vocat Plato, σπονδυλον, spondylos à figura, ἄρτερον, ἄρτερον, ita tumina nanis: itaque ubi Tigonorum, quæ medullam spinæ continent, vincula satisfecit, amplius subsistere nequeunt, tum labori cædunt, & disuncta laxataque, animæ nexu derelinquunt. Vide Salmasium lib. de climactericis, pag. 764. & sequentibus. Istæc interpretatio magis aridet, quam illa quam profert Talmontinus, ex Marfilio Fisco de elementis Trigonis, quæ contrarietate sua dissolvunt harmoniam corporis.*

*Pag. 318. linea 23. post debent, adde.* Caluities, neque in posteriore parte capitis, neq. in eius lateribus fieri solet, propter musculos. In alopecia à lue venerea pili magis desuunt in musculosis partibus, quia hæ parres plus vitiosi humoris continent: Tempora citius canescunt, quia sunt humidiora.

*Pag. 397. sub p. pag.* De mortuo Forti à matre niurua spontè prodeunte, *legè Hæstetserum, parte 2. Decadis 6. Renssum, epistola 1. Hildanum pag. 540. editionis vltima in fol.*

*Pag. 419. linea 50. post adscriptum, adde.*

*Quis dubitat possit hæc hominem canisgere calo,  
Eximiam Natura dedit linguamque, capaxque  
Ingensum, velacem animam, quem denique in unum  
Descendit Deum, atque habitat, ipsamque requirit.*

*Pag. 456 l. 43. post ign, adde.* Apud Hippocratem in Coactis Dureti, pag. 105. si dissectione facta, Os dissociatum cernitur, siue dubio moriuntur: Durus & imm. Dureti interpretatur de putrefactione Ossis. Ego vero intelligo de separatione Ossium in futuris, quia diallasis, est morbus symphyseos, & laxata fuit sutura, vel à tumore Cerebri inflammati, vel à sero exsudante per luturas.

*Pag. 541. l. 18. didici ex Plinio, lib. 29. cap 1. Anceps ac lubricum offerretur omnium naturarum initium, salum vitique, quia steriles gratio, difficultates in promendo: Me tamen re-creat, & in hoc labore difficili consoletur Plinius Nepos: Rerum quas assequi .np. m. p. x. sumptio ipsa iucunda est. Audendum est, inquit Galenus lib. de v. n. respirat. & venas inuestiganda, quam licet non assequamur, omnino tamen propius, quam nunc sumus, ad eam peruenimus.*

*Pag. 552. l. 35. post periculosa, adde.*

**Obiectio 30.** Validissima hæc ratio producit aduersus Circulationem sanguinis per Cor. Sanguis venosus per truncum Cana vsque ad singulum excurrent, non habet supra Cor, iuxta Canam valvulas, siue repagula, quibus circa Cor sitatur, ut nequeat istum iuxta tram cedere. Cum igitur ascendat ad axillas, potest etiam descendere ad manus, inde transire in arterias, cum utriusque vasis mutua sit, id est, venarum & artieriarum communicatio per Anastomoses, ex Hippocrate & Galeno Itaque potest dari Circulatio sanguinis, sine transiitione necessaria per medium Cor, vel per medios pulmones, ut probe vult, & inuestitur Circulatio sanguinis Haruei, & Riolani.

*Responso.* Verissima esset hæc ratio, si daretur Circulatio sanguinis, sine transitu per Cor, & medios pulmones, sed sanguis qui in venis continetur, non potest habere per omnes arterias traductionem, nec expulsionem. Atqui impetuosam sanguinis arteriosi traductio impedit sanguinis à Venis in artenas progressum, ideoque non potest redire sanguis à venis in arterias, nisi transeat per Cordis septum, vel à Corde per medios pulmones, & licet ipsa circulatio admittatur, quia non est impossibilis, & ab Erasistrato recepta per paremptosim, non est tamen naturalis: nec vllum foret discrimen sanguinis venosi & arteriosi, si venosus transiret in artenas, vasis & loci differentia, vnde manat sanguis, utriusque vasis & sanguinis discrimina id ostendunt.

**Obiectio 31.** Discrimen vasis & loci, vnde manat sanguis, non impediunt istam novam Circulationem sanguinis, quoniam arteria facta fuit àrior vena, ut motus Cordis, & violentus impetus sustineret, vena non mouetur. Itaque sanguis à Cordis sinistro ventriculo procedens, ratione sue tenuitatis & caloris primò enolat ad Cerebrum, ascendens per Carotidas, ab axillaribus descendit in arterias brachij transique in venas, quæ per truncum Canæ deducunt vsque ad artus inferiores. Inde in arterias labitur vsque ad Cor, quod non ingreditur, sed transit in truncum ascendente Aorta, itque reditque viam continuo cursu: restantur autem appulsis sanguinis arteriosi, qui continenter in aortam cum impetu effunditur in systole Cordis, cuius beneficio arteria eundem motum suscipiant, videlicet eodem instanti, pari motu vibrata, nec ille exiussus & transitus iuxta Cor impedit istam expulsionem sanguinis arteriosi, quia sanguis ille validissimus hui & illuc dispellitur.

*Responso.* Istæ via quamvis sit possibilis, non est tamen naturalis, quia omois perverteretur Cordis & artieriarum motus, ideoque magna fieret sanguinis venosi & arteriosi confusio: hoc modo nota fuit veteribus Circulatio sanguinis, tamen noq. impedit traductionem sanguinis per Cor ad spiritus & vitalis sanguinis generationem, sed confusus cum sanguine venoso, vitalis sanguinis viam & facultatem destrueret.

**Obiectio 32.** Si defectu Hepatis sanguificantes propter scirrhum Hepatis substantiam occupantem, obstructi fuerint meatus sinuatum partium Hepatis, id est Portarum, quibus chylus ingredi solet, & penetrare: Tunc ex periorum Anatomicorum consensu, Lien eius officium impleret, & sanguinem conficeret. At si sanguis ille tubulis Venarum Portarum conclusus destinatur pro nutritione alimentarium partium, non potest refluerere in Canalem, ut Cordi tradatur ad vitales spirituum generationem, & sanguinis circulationem, nulla enim sunt vtae. Ergo non datur circulatio sanguinis.

**Responsio.** Etsi Lien fungatur officio sanguificandi deficiente iecinore, inuenio tamen viam, per quam in Aortam descendentem traducitur, inde per venas recurrit ad Cor. Via illa est arteria splenica, amplitudine æqualis splenicæ venæ, atque eo fine conditam fuisse puro, non tantum ut sanguinem arteriosum Lieni subministraret, sed etiam in casu necessitatis sanguinem recusat in Aortam descendentem.

*Pagina 554. linea 26. post insinuant, adde.* Summæ autoritatis esse debet, id in quod ore vno plurimæ consentiunt gentes, ait *Tullius*. At *Angli, Belgæ, Germani, & Galli*, publici Medicinæ Professores Circulationem sanguinis approbant. Itaque non est repudianda tanquam falsa & tìdìcula. Despicitur tamen à nonnullis propter dissensum & inconstantiam Authorum in eius explicatione. *Aristoteles libro 13. Metaphysicæ*, scribit *Pythagoræorum* inconstantiam in ratione numerorum, illam doctrinam suspectam reddidisse: dissensus Authorum in Circulatione sanguinis, est dumtaxat, vel in tota massa sanguinis, vel eius portione circulanda, intra horam semel, vel intra diem naturalem bis terve: sed ad Cor redire sanguinem omnes admittunt. Varias super ea re opiniones proposui, ut veritas magis eluceat. Sic eleganter apud *Xerxem* in re difficili agitata effatus est *Artabanus*, primus regni *Persarum* administer. Fieri non potest, o Rex, quom sententia sibi aduersantes non fuerunt propositæ, ut quis meliorem eligat, sed ea quæ producta sunt utendum. At quom contrariæ propositæ fuerunt, delectus præbetur: quemadmodum autem purum non per se dignoscimus, nisi putissimæ collatione facta.

*Pagina 591. linea 30. post epidem, adde.* Fuit quidem secta vena, inquit *Duretus*, sed infelicitè, ob cephalalgiam & otalgiam, quia liberaliter fuit e ductus sanguis, inde laesum caput euacuatum, & perfrigeratum, quia non est facta suppuratio. Phreneticus factus est, & interit. *Aristoteles* incommoda sanguinis liberaliter effusi proponit libro quinto de historia animalium, cap. 19.

*Pagina 592. linea 36. post Aphorism, adde.* Acheloi vxor lib. 4. epid. abortiuit, cum esset sanguinea, inde necessitas venæ sectionis designatur in gravidis plethoricis.

Ex Circulatione sanguinis dependent in praxi, duæ notabiles quæstiones scilicet necessaria ad salutem mulierum, & Medicinæ dignitatis splendorem & conseruationem.

*An in pauperis ex suppressione lacrimarum acuto morbo laborantibus, semper è pede, vel alternatim è pede & brachio sit detrahendus sanguis, & si absolutè necessaria sit venæ pedis sectio.*

*Alteru quæstio est, an in muliere gràmida, quom mensi liceat tutò secare venam pedis, si malo acuto tentetur, qui tale remedium exposulet.*

Quod spectat ad primam quæstionem, quamuis à *Fernello & Corthesio* in *Miscellanæis*, tractata fuerit affirmatiue, è brachio solo sanguinem demendum, meum super ea re iudicium interponam. Considerandum igitur an paulò post partum suppressa fuerint lochia tunc è pede liberaliter detrahendus sanguis, ut fiat reuulsio ad locum convenientem, si sursum resluxerint: Atque bis terve iteranda ab utroque pede sanguinis detractio, modò non hæreant partibus suprà lecur, ubi dolore vel inflammatione dispositionem excitarunt. Si vero à partu, quinque vel sex diebus exactis supprimantur, celebrata prius venæ sectione è pede, deinceps è brachio sanguis detrahendus erit. Nam sanguis ille lctifer, vel est purgamentum substantiæ vterinæ tempore gestationis vsque ad partum tumidæ, tum conseruantis sanguinem ad nutritionem Fœtus, vel superfluum ex residuo alimentacionis: vel est sanguis in vasculis vteri proximis, nempe hypogastricis venis & arteriis, quem diximus non circulari, si sanguis vterinæ substantiæ non fuerit sufficienter expurgatus, & inflammatio inde consequuta cum tumore & distensione vteri. Certum est sanguinis è pede detractio nem necessariam esse, multoties repetitam, quæ reuellet & vacuabit ex parte affecta,

si depresso & detumefacto utero, sanguis iste refluat sursum, non debemus esse admodum solliciti in ipso reuellendo ad locos muliebres, quia in venam Cavam refluens, cum massa sanguinis circulator, sicque vitium per Circulationem emendatur: nec speranda reuocatio ad uterum, nisi Natura onere lubeuata, per istam vtericam viam nondum oculosam & exsiccata, auandet sanguinem non lochiorum, sed superfluum adhuc propter plethoram ad vires, vel impuritatem massæ sanguineæ, ad uterum tanquam emissarium in muliere transmittat, paulò post a partu, cum habeat adhuc partes illas dilatatas & laxatas.

Alterius quæstionis difficilior est explicatio & resolutio.

An mulieri grauidæ acuto morbo laboranti, puta graui, cephalico, vel hysterico affectu, ab euaporatione ex utero, liceat è pede sanguinem detrahare, & quibus mensibus tutius, & qua quantitate, semel vel bis iterari possit sanguinis detractio. Scio hanc quæstionem fundamentum habere in morbis acutis, epilepsia, erysipelate vteri, doloribus acerbissimis, febribus ardentibus, quæ dependent ab utero. Mulieres ex *Aristotele*, abundant sanguine circa uterum. Itaque non est dubium detrahendum esse sanguinem prægnanti mulieri acuto morbo laboranti, etiam Fœtus damno & periculo, quia præstat studere & aduigilare matris saluti & incolumitati quàm Fœtus, cum eius vita à matre dependeat, atque toties mittendus erit sanguis, quoties magnitudo morbi id remedium efflagitabit: sed quæstio in eo consistit, num è pede conueniat venæ sectio, & secura sit? Nam, si ex *Hippocrate*, mulier grauida vena lecta abortit, multò magis è pede vacuato sanguine, quia subducitur pabulum Fœtui, ex *Galeno in Commentario*. Siquidem hoc remedij genus pronocandis mensibus destinatum est, ex eodem *Galeno*, atque ad exonerandum uterum, & ab eo loco reuellendum, quidquid continet molestum & dolorificum: satius esset è brachio sanguinem educere quantum expedit, quàm è pede, quia per Circulationem sanguis totus ab infernis partibus supernè recurrit ad Cor: Atque supra Iecur maiore copia continetur sanguis, quam infra, ratione partium thoracicarum & capitis, quod magnam partem absorbet. Itaque venæ sectio brachij æque reuellere potest ab utero, quia Iecur medium corporis constituit ex *Galeno*, & reuulsio fieri debet in partem contrariam. Præterea deplet partes Thoracicas & Cephalicas ocyas & commodius. At si prima vel secunda venæ sectio fieret in pede, plenius adhuc vasculis vterinis, tolerabilis fieret, sed non adhibetur, nisi iam exhaustis superioribus partibus: ideoque sanguis qui concluditur circa locos muliebres in hypogastricis vasis, reuelliatur atque præcipitur Fœtui: inde potest abortus succedere, si defraudetur suo pabulo.

Deinde venæ pedis propinquior est utero, quam sectio brachij ad abortum prouocandum. Adde quod quantum sanguinis detrahatur è brachio, propter recursum sanguinis ad Cor per truncum venæ Cavae, tantumdem affluit iuxta Cor. Deinde venæ sectio pedis proxime trahit per venas & arterias ab utero, quod non facit venæ sectio brachij. Quare præstat in grauida muliere sanguinem è brachio detrahare quàm è pede, nisi Medicus intendat abortum prouocare, ad saluandam matrem ab imminenti periculo mortis. Quod si grauida esset in summo viræ periculo constituta, & citra intentionem abortus, indigeret venæ pedis sectione, viribus valentibus, satius esset à sexto mense vsque ad novum inclusine detrahare, quamvis Fœtus sit grandior, quia intra substantiam vteri fungosi, & intra placentam ism crassam & amplam, magna Naturæ providentia sanguis continetur ad nutritionem Fœtus per aliquot dies, tanquam in promouendo, sed aliis mensibus præcedentibus eum placenta sit exigua, nec firmiter adhæreat parietibus vteri, qui nondum crassissimè satis capacem obtinuit ad forbendum & continendum sanguinem adhuc fluidum circa locos muliebres, in vasis hypogastricis, potest per venæ sectionem è pede insular mensuræ purgationis reuocari, sicque præripi utero, ac proinde abortus consequere-

*Zacutus Iudeus* Christianorum hostis coniuratus, more istius nationis, ut procrearet infanticidium insit *Herodis*, istam quæstionem mouit, atque obstinatè tuetur leuibus ratiunculis, uti perissimè ostendit vir doctissimus *Vlp. Fortunatus Plemius*, ut nefas sit eius opinioni adherere: habet solum fautorem *Mexiam*, qui primus istud dogma nouum perniciosum proposuit, nec validius probauit, hisdem enim rationibus ambo vtuntur, ab experientis metecriticum petitis, quæ abortum

provocare nituntur venâ pedis sectâ multoties, ut votum assequantur; dein ex mulieribus gravidis per totum gestationis tempus menstrualibus, sed istæ meretricies sunt sanæ, atque sanguis ille menstruus per venas cervicis fuit guttaim in plethoricis mulieribus. Careat successibus opto, quisquis ab evenu tacta notanda putat. Innumeras habeo historias mulierum gravidarum, quæ abortire ex illo remedio interpestive celebrato, præstat semper securè agere, quam experiri remedium suspectum ac periculosum absque necessitate.

Alteram quæstionem satis difficilem, attamen vulgarem in ore omnium medentum propono, & explico per Circulationem. An venæ sectio sit potentissimum deobstruens, ad referandas viscerum nutritionum obstruções cum levi febre, vel nulla. Credunt multi Medici corpus reddere *lipum*, fluxile, quia desiderat *Hippocrater* in morbis, ut adsit *lipia*, fluiditas humorum, siue sanguinis iacta vasa, qui si careat isto fluxu putrescit, & suffocat, vel Cot, vel pulmones, aut Cerebrum, cuius remedium est liberalis venæ sectio ex *Hippocrate*, quæ prævertit isthæc pericula imminentia. Cum autem viscera nutritia, Hepar, Lien, Pancreas, & Mesenterium sint obstruccionibus obnoxia præ cæteris partibus, quia partes sunt culinariz, quæ præparant alimenta toti corpori, ideoque facile sordescunt: quemadmodum in culina ad nutritionem amplissimæ familiæ, non possunt alimenta præparari, coqui, dispensari sine foridibus huc & illuc dispersis: Similiter in corpore humano id frequenter accidit, itaut nisi diligenter & sedulò sordes enertantur, culinam totam, eiusque penuria inquinari necessum sit. Item canales & tubuli Portæ, qui pertinent ad alimenti distributionem, eodem vitio tenentur: itaque obstruuntur partes illæ commemoratæ ab humoribus, vel intra vasa maiora Portæ fluitantibus, vel intra viscerum carnes conclusis, & hærentibus, vel venulis capillaribus incuneatis. Viscera autem illa ex substantia venis & arteriis intertexta componuntur, vasa ista sunt exigua & capillaria, ideoque humores intra illos canales hærent, vel fluidi, vel incrassati & fixi: si fluidi facile expurgantur, & sponte secedunt, si crassi & fixi, per ealorem febrilem magis incrassantur, si humor diffusus fuerit per carnem parenchymatis, vel est tenuis & lerosus, & secernitur, si crassior, per æstû febrilem inspissatur: tumius adhærescit, nec sponte potest separari, id est coqui. Propterea incidentibus & attenuantibus mediocriter calidis veteres utebantur, ut apparerentium humorum ad purgationem, id est secretionem. Totâ istâ doctrina nititur duobus Aphorismis *Hippocratis*, concocta medicari oportet, non cruda, & altero, corpora cum quis purgare voluerit, fluida facere oportet. Ex hoc discursu verissima peti potest indicatio purgationis convenientis, siue per vomitum, siue per seccum. Quod spectat ad vrinas, quæ religiosè & sollicitè obsevantur à Medicis, sæpissime sunt fallaces, siquidem non sunt perpetuo derivatæ ab istis humoribus, qui contumaciter obstruunt partes illas, sed excipiunt & devehunt secum sordes obvias, per emulgentem venam & arteriam ad renes: At Pancreas & Mesenterium per refluxum in Hepar, nec aliæ sunt viæ per quas derivari possint ad renes, aliarum partium putâ pulmonis sordes possunt per vrinas derivari ad renes: atque massa sanguinea vasorum circulantium defæcat per vrinas. Itaque si perturbatæ & confusæ fuerint initio morbi, indicant summam sanguinis confusionem, & potissimum bilis, quæ non petit fundum propter levitatem. Atque hæc præmittenda duxi ad faciliorem intelligentiam obstruccionum aluiuæ regionis, præparationem & coctionem humorum, & vrinæ iudicia de tali negotio, quod perscitur in prima regione. In istis obstruccionibus resoluendis, id est, ad deobstruendum meritò queri potest, an expediat venæ sectio sæpius repetita, si febris nulla compareat, aut leuissima.

Ut veritas huius quæstionis facilius innoteat, considerare oportet in Hepatis substantia duas partes distinctas, vasa quoque diuersa: Superiorem gibbam, quæ radices venæ Cruz excipit, alteram Cauam, quæ radices venæ Portæ admittit. Vnumquodque vas ex Hepate elicit sanguinem sibi proprium, & familiarem, vena Porta crassiores trahit, ut Caua renuiorem & puriorem. In omni morbo nisi vires deficiant & languent ab exhausto, sanguis demi debet, si corruptus appareat, & vires ferant, morbusque possulet, audacius iterabitur venæ sectio. Hac arte deplentur vasa circulatoria, & obstruccionum maiorum vasorum secundæ regionis defætu liberi excursus sanguinis liberatur, ut minorum vasorum per corporis habitum sparforum obstruccioni, ex prohi-

bica transpiratione foluitur. At per inedia inopia pabuli, fanguis venæ Portæ minuitur, quod fi regurgicer, vena pedis fefta fubtrahitur plenitudo fecutus ac felicius, quam fefta vena brachij pro tertia & quarta vice, ne impuritas illius fanguinis in morbis vtriplurimum impuri, in venas maiores fecundæ regionis rapiatur, inicitque mafam fanguineam, ac proinde etiam quarta venæ feftio ex altero pede conducibilior erit, quam è brachio propter rationes iam allatas: fed perfeuerante morbo cum leuiffima febre, vel nulla, fi fufpicio fuerit aliculus vifeeris infigit obftrufti ab humore craffo vifcido, An venæ fædo per epaphærefim fæpius iterata, obftruftiones illas refoluere queat, dubitare licet. Neutiquam, imo vires diuerfæ, id eft, calor natiuus ad fufituendam morbi longitudinem neceffarius minuitur: præferenda purgatio per epicrafin, cum aliis remediis attenuantibus, aperientibus infarctus, etiam emollientibus, tam in eis affamptis, quam ad motus opus eft.

Circulario fanguinis docet, quomodo fit fuccurrendum capiti laboranti. Nam fi fanguis per carotidas tantum afcendit ad Cerebrum, & defcendit per iugulares, è vena fæpius fefta in brachium plurimum proderit, atque eacurbitulæ eruentæ ficcæ, ac frequenter ad motus fummis humeris, collo, & inio, friftiones duræ artuum fuperiorum & inferiorum etiam confrent, ad reuulfionem, deriuationem, atque vacationem partis affectæ.

Pag. 630. l. 40. *poft conftituit, adde.* Equidem facit *Laurentius* ex *Fernelio*, cap. 1. li. 2. *meth. med.* bene expreffiffe iftas regiones corporis, fed emendare debuerat quæ præuefcripta funt, quæ recte, laudare: mea correctio melius exponit, ac determinat iftas regiones.

Pag. 791. linea 38. *poft animantibus, adde.* *Hofmannus* pag. 82. dextrum ventriculi orificium cumulum neruorum habet, ob quos eft valde fenfibile, finiftrum fubftantiâ glandulofam habet. Situm ventriculorum immutauit, ac proinde quæ habent peculiaria: nam dextro conueniunt, quæ tribuit finiftro, nec eius fubftantia eft glandulofa, qualis in canibus reperitur.

Pag. 793. linea 42. *poft ligamentis, adde.* Vifa fuit ab *Hofmanno*, *Patani* mulier, quæ non femel pepererat, carere vtraque arteria fpermarica, quod eft ordinarium, cum non habeant mulieres arterias fpermatikas à trunco: Vidit etiam *Bafilea* veficæ circofoides, quas *Heraphilus*, *Galeno* teftante nunquam viderat, ergo fuit accuratior *Heraphilus*, pag. 18. *anti-Fernelij*.

Pag. 831. *fub finem præfationis.* Confimilem hiftoriam inuenies apud *Tulpium*, pag. 250. *fuatum Obferuationum*.





R A R Æ

OBSERVATIONES  
ANATOMICÆ.

*I* *lib. artis Cyclonomice Cornely Gemma*, cotyledonum species non nisi in gravidis, recenter dissectis vteris ostenduntur, ut mihi ipsi tum sexto foetum viralem exsecanti coram contigit his meis oculis intueri, illic sæpe videre datum est duplicem triplicemque venam azygæ sociam à sinistris, tres quatuorve arterias feminales.

Os Cordis in duobus virorum cadaueribus deprehendit ad tra, dices arteriæ magnæ, & venæ arterialis, semel vidit quadruplices renes, semel Hepar duplex, semel denique Hepar in sinistris, Lienem in dextro collocari.

In isto discursu multa mihi suspecta sunt, præsertim quod spectat ad cotyledonas, ad venam azygon sinistram, & Hepat duplex, quod nondum vidi à quoquam observatum.

Nupet ad me scripsit *vir doctissimus & peritissimus in arte Medica, Senior, & Decanus facultatis Medicae Nannetensis apud Aremoricos, D. Besseau*, de transpositione, siue mutato situ Hepatis & Lienis, his verbis, quæ recito. *Vir nobilis quadraginta annos natus, supremæ vius ex duabus Britannicæ Curis Consiliarius, die 28. Aprilis, febre purpurata obit, anno Domini 1648.* Aperto cadauere inventum est Hepar in sinistro hypochohdro possum, amplum. & vna sui parte ad sinistrum vsque hypochohdrum protensum, sub cuius sinem Lien parte dextra hypochohndri latitabat, parvus admodum & rotundus, totus decolor, & in superficie rugosus, parvi calci molis figuram referens ex quo, sicut nec ex Hepatis carne dissectis, sed nec ex reliquis partibus corporis incisis, ne guttula quidem sanguinis manavit, (*forsan erat intra tubulos venosus & arteriosus concretus.* Riolanus.) sed quod magis animaduertendum, Cordis basis sub sinistra mamma reperta, mucrone sub dextra locato, quod laborans febre pluribus annis ante obitum correptus, palpante regionem Cordis Chirurgo, propheticè quasi visus est animaduertisse, quærenti prædicto Chirurgo palpitacionem, de qua conquereretur, sub sinistra mamma, quem ut ad dextram se conuerteret mammam, monuit, dicens se non ut cæteros alios esse compositum, quod certe mirandum, virum nunquam in Anatome versatum, cui situs partium corporis erat omnino incognitus vaticinasse, & quæ postea mira visa sunt, oraculi in modum exposuisse. Sed & hoc notandum maximo, illum nupsisse eleganti, & bene partibus omnibus animi & corporis compositæ vxori, cum qua per duodecim circiter annos pacificè vixit sine liberis, quibus in genitalibus eius partibus nihil deficiens fuerit repertum, nec in structura tota reliqui corporis, quæ ceterè omnia mihi animaduersione digna visa sunt, & te, ut spero, non indigna. Si accuratior fuisset inuestigatio partium nutritiarum, haud dubie inuenissent orificiorum ventriculi mutatum situm, pylorum in sinistro lare, propter meatus cholidochi in sectionem ad duodenum, quod debuit esse locatum sinistrorsum, ut vena Porta, & Caux origines, & venæ spermaticæ sinistræ origo in dextro lare ab omni gente. *Restat Collega doctissimus Medicus, & peritissimus Anatomicus Dom. Puy'son*, vidit cum *D. Sime. Vimpernelle, Chirurgo peritissimo*, in cadauere infantis sedecim men-

les prouecti, secur in sinistro hypochondrio, Lienem in dextro cum magna portione ventriculi eò inclinati. Aperto thorace inuentum fuit Cor in dextrum latus propendens, pulmones in ea cavitare dextra locati, vt in sinistra naturaliter. An quibus Cor ite falit circa mamillam dextram, talis inest conformatio, dubitare licet: nihil affirmo, quoniam id non satis liquet.

*Anna Domini 1633.* visa fuit Lutetiz Parisiorum puella Germana annos quatuor eum dimidio nata, quæ toto corpore villosa erat, capitis pili erant candidi, reliqui corporis pili subnigricantes & duriores, barba promissa erat trium digitorum longitudine, ex cavitatibus aurium pilus satis copiosus pullulabat, atque circa aures comam habebat productam semipedis longitudine, ex relatione Domini Puyson, Memini me legisse in peregrinationibus noui Orbis, quendam ex naufragio saluam, ad insulam desertam delatam incolis destitutam, vbi mansit nudus per decennium, atque defectu vestimenti ad eo hirsutum euasisse, vtpili manus longitudinem æquarent, cum fuit ereptus ab ista miseria, naue illac transeunte.

Idem D. Puyson vidit in iuencula mortua febre ardente, sanguinem concretum intra venas, & clauiculis vsque ad inguina, & intra arterias sanguis concretus, erat similis sebaceæ substantiæ, siue medullæ sambacinae porosæ similissimus.

Monstrum mirabile bicorporeum viuens visum fuit *Luxitæ, in Anglia & Belgio* monstratum, vbi illud inspexi, sed non adeo diligenter obseruaui, vt fecit Dominus Puyson noster Collegæ doctissimus & peritissimus Anatomicus: eius Iconem expressam reperies apud *Licetum, libro secundo de Monstris, cap. 22.* Cum peragravit regiones Belgij & Angliæ annum vigesimum ætatis agebat. Viuens ille, reliquo corpore bene formatus erat, sed alterum corpus viuens mutilatum in pedibus & manibus gestabat, ventri agglutinatum circa vmbilicum vsque ad sternum, exerti & prominentis corporis caput erat prægrande, oculi clausi, discussis palpebris, os apertum erat cum dentibus, quod continua saliuatione mædebat, nec per hanc partem potum, nec alimentum sumebat, motus pectoris non erat manifestus ex respiratione, Cordis tamen motus sentiebatur: in vnaquaque manu iuxta tres tantum digiti exstabant, masculi notæ apparebāt in partibus genitalibus, quamuis non essent exactè formatæ, absque seroto & testiculis, podex non erat perforatus, nec peniculus peruius: motum habebat labiorū, quamuis maxilla inferior sit immota: nullam vocem, vel eiulatum edit, punctiones & vellicationes percipit, quia contrahitur, sed non transeunt ad fratrem *Basilum*, qui ipsum fascia per collum circumducta gestat. Si quæras, quomodo nutriatur: respondebo more Fœtus intra Vterum matris per venam vmbilicalem, quæ vehit ex Hepate alterius fratris *Basilis*, ad Hepar istius monstrosi sanguinem, excrementa, quæ in intestina d. ferri deberent, & in vesicam. Traducuntur per porum cholidochum in ventriculum, inde saliuatio continua ex serosi humoris istarum partium nutrimentum, rorūque corporis deriuatione ad os.

Cum autem in Aula Regine simiam femellam obiter dissecui, cum talem crudelitatem fieri in sua simia dilecta nollet *Ducissa d'Ornano*, vidi secur in quinque lobos sectum, intestina similiter disposita, vt in homine, colon superne reflexum, appendicem cæci ampliorem quam in homine, æqualem ipso intestino, renes figuram habent dissimilem. Matrix humanæ similis est, testiculos habet, cornua vt in muliere, elitoris exaqtè formata, in apice Nympharum colloata supra os pubis, Cor non est simile humano, quia oblongum & acuminatum, in pedibus & manibus obseruaui mirabilem illam intexturam tendonum musculorum subtilissimis, & profundis.

Cum profectus fuisset Carnutum, vt votum soluerem beatissimæ Mariæ Virginis, Sacelli sacrista sexagenarius me consuluit de inueterata dysuria, interdum stranguiria. Iudicauit subtile calculum in vesica, vnicum salutis periculum in eius extratione. Maluit æger viuere in ista miseria, quam periclitari vitam. Tandem ischuria vesicali interit. Medicus Caranensis doctissimus ac peritissimus, Dominus Ludouicus Patin mihi scripsit, quæ in eius vesica reperta fuere rara. Referam eius verba. Cum venimus ad renes, hos cernere erat dimidio maiores solito, sero repletos & turgent, nullo modo obstructos, aderant in sinistri parenchymate minuiiores aliquot arenolæ. Venimus ad Vreteres, quos inuenimus amplissimos, & ita distensos, vt minorem digitum facillime possent admittere, sed in eis nihil præter serum: vt autem vesicam attigimus, sensimus in ea delitescere solidum quidpiam & durum, ea aperta

occurrunt nobis duo corpora nuci iuglandis magnitudine firmiter adhærentia, vnum densum, & vndique sibi simile, alterum sanguine coagulato intus repletum: ut auius cum aliud se offerret longe crassius, totam vesicam exsecuimus, & pro corpore cauo membranoso extenso quale vesicæ esse debet, plenum, solidum, contractum reperimus. Certe fundo excepto, vix vnicuique lotij continendi capaci, reliquum omne moles occupabat glandulosa, albicans, & quodammodo callosa, ab ambiente membrana nulla arte separabilis, & in quam ipsa vesicæ substantia omnis abiisse, & versa esse videbatur. Aequabat illa pugni vnus maioris crassitiam, in medio canaliculus Vrethræ continuus, sed admodum exilis, ad fundum tamen vsque perueniens, & totam ipsam massam permeans, quem vnâ ex superioribus glandulis obturasse, & ischuriam fecisse patet est suspicari. Hæc omnis observatio nostra.

## F I N I S.

\*\*\*\*\*

SUMMA PRIVILEGII.

Christianissimi Regis Ludouici XI<sup>VI</sup>. priuilegio, licet D. Ioanni Riolo, Doctori Medico Parisiensi, Anatomies & rei Herbarie Professori regio, Professorum regiorum Decano, & Reginae Matris Ludouici XI<sup>II</sup>. Mariae Medice Medico primario ac postremo, quando voluerit typis mandare Opera sua Anatomica, vetera, recognita & auctiora, quamplura noua, cum Opusculis Anatonicis nonis, de motu circulatorio sanguinis in Corde, nouam Doctrinam, & Animaduersiones in recentiores Anatomicos septem, &c. tali forma & qualibus typis elegerit, tam Latino quam Gallico idiomate, idque in annos decem, ab ipso die numerando, quo prima editio perfecta fuerit: Cuius Priuilegij vni & facultatem omnem dictus D. Ioannes Riolo transtulit in Cassarum Metaras, Bibliopalam Parisiensem. Quod si quis in hoc Gallia regno, aut extra illud, ipsa Opera Anatomica, &c. sine Cassari Metaras consensu excudere, aut vnum exponere audeat, nouerit, se vltra Exemplarium confiscationem, graui poena multarum iri, qualis habetur in Diplomate regio. Datum Lutetia Parisiorum, 9. Februarij 1648.

DAVDIGVIER.

Ad faciem deducta fuit istae Editio die 15. Aprilis, 1649.



# I N D E X

## AMPLISSIMVS ET ABSOLVTISSIMVS ALPHABETICO ORDINE DIGESTVS,

Rerum omnium memorabilium, quæ in hac D. *Ioannis  
Riolani*, Doctoris Medici, & Regij Professoris,  
*Anthropographia*, & annexis *Opuscu-  
lis* continentur.

## A



**ABDOMINIS** musculi deseri-  
buntur 83. de eorum nu-  
mero, & ortu controversia,  
*ibidem*.

In eorum origine dissentiunt  
Anatomici à *Galenis*. *ibidem*.

de eorum origine defooditur *Galenus* doctri-  
na aduersus *Andream Laurentium*. 84  
ad compressionem ventris primarid constru-  
cti sunt, respiciationi ennfertune, dumtaxat per  
accidens. *ibid.* de eorum origine: nonam opi-  
nionem commentus est *Fabricius* ab *Aqua-  
pendente*. 84. 85. refutatur. *ibidem* de eorum  
ortu & insertione verissima est *Galenus* doctri-  
na. 86. quæ confirmatur quinque rationi-  
bus. 87. eorum administratio traditur.

89

partium in Abdomine contentarum diuisio.

91

Abdominis tumores prominentes versus im-  
bilicem, ab Epiplois multis humoribus sar-  
to factoque sæpe produuntur.

97

Abdominis musculi decem enumerantur.

114

Abortus & effluxus, quomodo inter se diffe-  
runt.

103

Abscessuum ventris consideratio necessaria est  
Medico.

76

Accidentia non migrant de vno sobiecto in al-  
terum.

150

Acidulus humor vinentis animalis ventriculo  
inhæsit & congenitus est, qui instat fermenti  
per alimentum diffunditur. 607. eius vsus &  
vires.

ibid.

Acidi humoris triplex vsus in ventriculo.

609

Aeromium quid est. 503. de eo frustra & im-  
merito *Galenus* acculat *Pesalium*.

ibid.

Aeromij significatio quadruplex est.

ibid.

Actio partium, quid ab vsu differat.

70

Actionem omnem à similari parte proficisci vult  
*Galenus*. 71. contra mentem *Aristotelis*.

ibidem.

Actiones fiunt à facultato.

ibid.

Actionum diuisio.

ibid.

Actiones partium multæ, licet instinctu Naturæ  
sunt, nihilominus sunt animales, ac volun-  
tarie.

102

Adeps à pinguedine, quomodo differat.

80

Adipis vsus varij recensentur.

83

Adipis causa materialis & efficiens.

ibidem.

Adeps per inedias in alimoniam conuertitur.

*ibidem*. in mulieribus semper vberior reperti-  
tur.

ibid.

Adipis conerctio intra vasa iuxta Cor mortis  
causa est.

703

Adipose membranæ varij vsus recensentur.

ibidem.

Aër non potest ad Cor permeare, ad generatio-  
nem spiritus vitalis, cum nulla sit communio  
brachiorum cum riuulis arteriæ venosæ: ran-  
tium inspiratur ad refrigerium pulmonis, qui  
qualitatem suam Cordi communicat.

191

*Egypti* reges propria manu, corpora mortuo-  
rum ad scrutandos morbos secabant.

45

*Egypti* Medici in Chirurgia & in Anatomo-  
multa inuenerunt. *ibidem*. in conuulsiis hu-  
manum sceletum circumferebant. *ibid.* Ana-  
tomieis dissectionibus delectabantur adhuc  
tempore *Galenis*.

ibid.

*Egypti* Medici in Medicina plurimum profe-  
cerunt, propter opportunitatem dissecando-  
rum cadauerum *ibidem* mollis erat cadaue-  
ra medicata asseruare, *ibid.* per singulos an-  
nos Cor augeri in homine existimant.

ibidem.

*Egypti* sacerdotes hominem munda similem  
esse credebant.

74

apud *Egyptios*, gastratores viui corio spolia-  
bantur.

79

- Ægypti* primi coluerunt illam, de qua nascimur omnium patentem, quam sanctus *Nume* mensulam vocabat. 154
- Ægypti* *Phrygia* etiam coluerunt. 155
- in *Ægypto* mulieres aliquando excidebantur. 153
- Ægypti* olim nuptus virginibus, nymphas antequam promitterent, refecare solebant. 156.
- & 189
- apud *Ægyptios* iugulares venæ secantur. 113
- Ægypti*, quare putant hominem non vivere ultra septimum annum defectu Cordis. 134
- apud *Ægyptios* nasus amputatur mulieri in adultære deprehensæ, vi viveret in perpetua defœtinitate, quæ formæ abusa fuisse ad lindiem. 183
- Ægypti* conceptis verbis capillum pueri defectum diuisi suis nuncupant, ut ab aduersa valetudine respiciat. 314
- apud *Ægyptios* libri circumferantur à *Mercurio* conditis de cõstructione corporis humani, qui solum dicebantur ab illis Medicis, qui passim gessabant. 412
- Ægypti* cum vespillonem, siue pollinctorum, & muricem tractantem designare vellent, canem pingebant. 430
- Ægyptiorum* diuinitas prima *Anubis*, patens *Isidis* et *Osiris*, quibus inuentio Medicinæ tribuitur, per canem cõsignificata fuit. *ibidem*.
- Ægypti* veteres in consuetis publicis scelerum hominis ostentabant, ut studua mortis cogitatione, à vitis reuocarentur. *ib.*
- Ægypti* Sacerdotis monitum ad *Solomonem*. 433
- Ægyptios* verisimile est in omnimoda abstinentia detinuisse ægrorantes, quando prohibuerunt ante quartum diem quidquam moueri per medicinam. 600
- Ægypti* veteres simulacro *Serapidis* specie hominæ, pro capite calum inposuerunt. 251
- Ægypti* *Aberis* æuo, per caput regis iutabant, quod iustitiam quæ violaret, capite plectebatur, nec villo se pretio redimere poterat. *ib.*
- apud *Ægyptios* tanta fuit olim capitis veneratio, ut infano etiam cultu caput omne venerentur, & à capitis brutorum prius abstinerent, diuinitati iniuriæ facere arbitrati, si quis illa cumedisset. 252
- Ægypti* per caput *Lutem* designabant. *ibidem*.
- apud *Ægyptios* Oculi sceptrum superimpositus, principis erat hieroglyphicum, imò etiam Dei, ut supremi principis, & rerum dominationis. 258
- Ægypti* regibus studium erat fœturi corpora mortuorum. 49
- Ægypti*, quare oculum linguæ subieciunt. *ib.*
- Ægyptius Persæus* superbus & insolens ferit, rudis & barbarus, passim ineptias & foecissimos effudit. 3 vide *Persæum*.
- Ænigma difficillimum *Thæbanis* à *Sphinx* propositum de homine ab *Oedipo* solutum. 419
- Æthiopi* infantes, ex vtero, cutis nigredinem secum adferunt. 78
- Æthiopi* infans homines negetum in temperatis regionibus oblerantur. 356
- Æthiopi* vngues nigrescunt, quia ex cute nigra originem habent. 359
- Alexander de Tenedos*, Princeps Illustrissimus, nulli spirandi dîfficultate quando vixi, laborauit, quam et habere collas per totam longitudinem offras. 207
- Alexander Major*, Professor *Patanus*, aluæ laudis inodius, ex suis scriptis medicenter eruditus. 719
- Alexandri* Schola Iudat à *Galeno*, propter *Anatome* exercitum. 63
- Alexandri* Schola Medicinæ studium olim valde celebrat. 63
- Alexander* eruditum fuisse iussit, ab eum commendandam aut perire. *ib.*
- Alioquin in ventriculo quomodo coquatur. 607
- Allantois membrana vnde data. 355
- quare necessitas, si in dentibus. *ibidem*.
- eam in humano fœtu consistit *Sylus* contra rei venationem, vi descenderet *Sylus*. 376
- Allantois nulla est in humano fœtu. 356
- Alopecia ex viti fungorum contracta, cibus eucharistia teparata, videt *Galenus*. 352
- Alopecia quandonam iudicatur insanabilis. *ibidem*.
- Aulus Iustinus* erat *Indus*, à quo plura sunt conficta quam facta. 762
- Ambrosii* *Pætes* Opera Authores habent Medicos *Parilenses*. 31
- eius *Anatome* multis sciat erroribus. *ibidem*.
- Ammaurosis* fit per obstructionem nervi Optici. 264
- in Amnio viti fœtus cum sudore continetur. 375
- extra Amnion nullus humor reperitur. *ibidem*.
- Amnios aliquando inflat capiti vel galeæ, infantis caput obuoluit. *ib.* vnde pueri dicuntur galeati. *ib.* quibus bene ominantur mulieres futuræ felicitatis. *ib.* de pisco isto, suo galea, vel pueri viratibus, aut galeatis aliquot exempla adferuntur. 376
- Amoris naturam verbus tantum exprimere veteres Philosophi erubuerunt. 133
- de Amore leuicem habituri quidam veteres in publicum velata facie prodibant. *ibidem*.
- Amuleum aduersus colicos dolores ex præciso Umbilico. 380
- Anatomosis venæ mammae rix & epigastrica, comprobatur à *Sylus* & *Kilano*. 84
- per eam nemo debet inficiari, mammarum & vteri consensum perfici. *ib.*
- Anatomosis venarum Portæ & Caus inira Hepar an sit vlla i. it. illam repudiat, & inficiatur *Galenus*, *ibidem*. nec eam vquam videte potuit *Falopus*, *ibidem*. à *Piccolino* videtur priuim depicta & introducta. *ibidem*. & cõfirmata ab *Hieronymo Fabricio* ab *Aquapendente*. *ibidem*.

- Anastomosis illa, si quæ sit vix oculis deprehenditur, quamvis admitti debeat, *ibidem*.  
obscura est, aut nulla in Hepate adulti hominis. 112. euidenter innoscitur in Fœtu recens edro. *ibid.*
- Anastomosis alia traditur à *Galeno*. venæ Putræ cum Caua, mediante vase, per quod à Caua in Portam, purulenta materia thoracicarum partium translatæ expurgari potest per intestina. 112
- Anastomosis mutua lienalis arteriæ anfractuosa cum venâ splenica. 119
- Anastomosis venarum mammarum atque epigastricæ, euidenter est in muliere, quàm in viro. 176
- Anastomoses vasorum Cordis in Fœtu à *Galeno* fuerant descriptæ, vt & à *Fallope* et *Carcano*. 672
- ad admodum Cordis constructæ sint, an alenque pulmonibus desinunt. *ibid.*
- de eorum vii conuenientia inter *Andream Laurentium*, Medicum Montpensensem, & *Simonem Tietrum*, Medicum Patisiensem clarissimum. *ibid.*
- Anastomosis venæ Azygæ cum Emulgente demonstratur. 222
- ex illa Anastomosis quidam colligunt, inchoante pleuritide, ex *Arabum* doctrina, Sapbeam vtiliter licet. *ibid.*
- per hanc Anastomosis pus Empyricorum, hoc est suppuratæ pleuritidis vniuersa per vrinæ expurgatur. *ibid.*
- Anastomosis venæ thoracicæ cuiusque lateris, cum ramulis Azygæ constat. *ibid.*
- per quas Anastomosis conuulsa pleuritidis materia, siue lateri impactus humores exhauritur. *ibid.*
- Anastomosis mutua venarum & arteriarum, tam internarum, quàm externarum, *Galeno* et *Angeli* nota. 224. imò & *Hippocrati*. *ibid.*
- Anastomosis inter venam Portam, & venam Cauam rara est, & vix voquam occurrit. *ibid.*
- Anastomosis venæ Cauæ cum Arteria venosa, sæpius in adultis adhuc huius reperta. 238
- Anastomosis altera semper est exsiccata & abolita. *ibid.*
- de Anastomoseon vasorum Cordis, & eius motu, sententia & conuulso *Rulano*. 394
- Anastomoses vasorum Cordis in Fœtu, quem vsum habeant? 392
- Anastomosis venarum & arteriarum sunt in cruribus ab inguine vsque ad pedes, in brachiis ab axilla vsque ad manus. 398
- Anatome duplex, præctica & theoretica. 619. & 630.
- Anatome hominis sublimem & præstotem cognitionem requirit. 122.
- Anatome est oculus Medicinæ. 122. & 16
- Anatomes cognitio necessaria Philosophis & Medicis. 15
- Anatome fenestra est ipsa quam *Adams* in humano corpore desiderabat. *ibid.*
- Anatomes ad faciem eodam Medicinam summam necessitas ex *Grecorum* & *Arabum* sententia. *ibid.*
- Anatomes rudimenta olim cognita præcis temporibus apud *Israhelitas*. 16
- Anatome simul cum Medicina nata est, & adoleuit. 18
- Anatomes, quis primos Inuentor. *ibidem*.
- Anatome, quare olim exosa & inuisa. *ibidem*.
- Anatomen intermortuum suscitauit & inflauit *Hippocrates*. 19
- Anatomei aliqui *Galeno* posteriores, Græci & Latini recensentur. 28
- Anatomes vtilitas in partium naturæ scientia, non 10 appellationibus sua est. 36
- Anatomen Dignificati, vt necessitatem artem excoluerunt. *ibid.*
- Anatomen vocat *Agrippa* horrendam lanienam & theatralem carnificiosam. *ibid.* eandem vocat *Paracelsus* mortuam, & cadauerosam. *ibid.*
- Anatomiam in metallis excogitauit *Paracelsus*, ridiculam & inaudiam. 36
- Anatome, an sit pars Physicæ? 37
- Anatome, an sit Chirurgi proprietaria. *ibidem*.
- Anatome duplex, Physica & Medica. 38
- Anatome Medicinæ fundamentum & principium. *ibid.*
- Anatome Sophistica à *Galeno* agitata. 38
- Anatome vniuersa, vt persèdè demonstretur, plura cadauera habere conuenit. 60
- ad Anatomen accommodata tempestas hyberna est. 61
- Anatome duplex, priuata & publica. 64
- Anatomicæ confessionis præcepta quædam recensentur. 67
- Anatome qua doceri debeat methodo. *ibidem*.
- Anatomes Inuencor perhibetur *Alemau*, antiquus Philolophus. 386
- Anatomen viuam in brutis exercebat *Galenus*, innocentiore doctriæ studio, vt quantumdam partium obscuras & incompleta actiones exploraret atque dignosceret, idem præstat *Rulani*. 411
- ad hanc Anatomeo aptius sunt grandiora animalia. *ibid.*
- Anatomes ipsius ambitu coercetur vniuersa mendendi scientia. 410
- Anatomica doctrina secto commendatur. *ibidem*.
- per Anatomen humanæ naturæ cognitio comparatur. *ibid.*
- Anatomes docendæ & cognoscendæ duplex est methodus, lyrica & analytica. 433
- de anatomice artis cunctis & ignorantie querimonia. 439
- Anatomeo alphabetum Medicinæ vocant *Censtis*. 39
- Anatomes quodnam est subiectum. 39
- Anatome duplex, vniuersalis & particularis. 40
- Anatomes docendæ methodus optima est analytica. *ibid.*

Anatomica rudimenta, an ab humano corpore  
sint inchoanda, an à brutorum corporibus. 41  
An- tome in corporibus humanis celebrata &  
exulta fuit ab antiquis. 45  
Anatome duplex, theoretica & practica. 46  
Anatome quoqueam precedere debeat, an practi-  
ca? 47  
Anatome multis modis defuitur. 48  
Anatome idem est, quàm accurata & repetita le-  
ctio. *ibid.*  
Anatomes finis est partium cognitio. *ibid.*  
Anatomes diuisio multiplex. 49  
Anatome in corpore hominis morbo cunctis, v-  
tilissima est in causis morborum dignoscen-  
dis, & aptissima ad conuenientem remedi-  
orum vsum explorandam. 49  
Anatomicum Collegium quid. *ibid.*  
Anatome alia est vtilis, alia superflua. *ibid.*  
Anatome sophistica *Galeni*, quid est. 50  
Anatomes finis duplex constituitur. *ibid.*  
Anatomen qui despicitur, Philoſophi titulo in-  
dignos esse cecit *Aristoteles*. 51  
Anatomicis in rebus illustratio à puero requiri-  
tur. *ibid.*  
Anatome pueris demonstrari solebat in veteri  
*Alexandria* familia. *ibid.*  
in Anatomiz studio, quænam conditiones re-  
quirantur. 51  
in Anatomie, vt in Medicina, oculis magis cre-  
dendum est, quàm opinionibus & libris. *ibid.*  
Anatomes cognitio ex librorum lectione, atque  
inspectione vnus aut alterus cadaveris hu-  
mani, à Chirurgi perfunctione dissecti, disci  
non potest. 615  
Anatomicis ex libris nugæ imitationem in-  
dicant *Galenus*. 52  
Anatome Iconica, & per picturas multos dele-  
ctat, admirationem pariendo, sed parum est  
vtilis discenibus. *ibid.*  
Anatomicæ imagines ac picturæ erroneæ om-  
nes fallaces ac imperfectæ. *ibid.* et 53  
Anatomes pictæ mentuonem *Galenus* nullibi  
facit. 5  
Anatomiz studiosus vna vel altera Anatome  
contentus esse non debet. *ibid.*  
Anatomici quidam illustres, tempore *Galeni*.  
54  
Anatome quibusdam in locis crudelis, & inhu-  
mana censebatur. *ibid.*  
in Anatomiz studio quinque conditiones re-  
quirunt *Galenus*. *ibid.* alix quoque requiran-  
tur. *ibid.*  
Anatomici Doctoris conditiones recensentur.  
55  
et Anatomes contemptu gloriæ suæ salutem  
debent Medici repetere. *ibid.*  
Anatome nãgri vigeret, atque splendesceret,  
si cultores haberet Medicos. 56  
Anatomica Encherisid nihil est magis ope-  
rum, atque fastidiosum. *ibid.*  
Anatomicæ operationes non sunt indignæ, aut  
indecoræ Medico. 58  
Anatomia duplex, ea *Galeno* vna vtilis, quæ  
ad vsum Medicum est necessaria: altera, su-  
pra vsum artis, quæ ornamenti & voluptatis

plus adfert, quàm utilitatis. 59  
*Andrea Laurentius* Opus Anatomicum lauda-  
tur. 51. videtur à *Gellado* inique reprehen-  
sus, *ibid.* pluribus abundat erroribus in re An-  
atomica, 52. suis manibus nunquam Anato-  
mica tradidit, *ibid.* eius scripta Anatomica  
examinantur. 615  
in Aegina suffocante, frustra tentatis & admi-  
nistrais omniibus remediis, laryngitonia, vel  
potius Bronchitonia securè fieri potest in-  
tra laryngem. 142  
*Angli*, quamvis catuioiri præ ceteris nationi-  
bus, à venæ sectione abhorrent, quo tamen  
præsidio potissimum indigent supra alias gen-  
tes. 585  
*Anguei* musculi nomen & inuentio debentur  
*Risalamo*. 828  
Ani, siue podicis nomen sunt musculi, 129. eius  
musculorum numerus, cui multiplicatus ab  
Authore. 330  
Anima hominis ex *Platone*, non potest penitus  
cognosci, nisi spectetur in altero quopiam,  
cui analogia respiciatur. 421  
Anima est id quo viuimus, sentimus, ac intelli-  
gimus, ex *Aristotele*. 597  
Anima factus ex *Galeno*, non est otiosa, nam  
in ipso operatur, à nullo educta, & per se  
ipsam. *ibid.*  
Anima se habet instar numeri & figuræ, vt bi-  
narius comprehenditur ternario, & trigoni-  
um tetragono, sic formæ per ordinem &  
successionem quandam introducuntur, ita  
vt rationalis vtriusque sub se comprehendat,  
etiam si rationis officia non exerceat. 594  
Animus hominis res omnes æternam intelligit,  
& seipsum cognoscit: non potest. 2  
Animus est hominis forma & perfectio. *ibid.*  
Animam à corpore separatam iugiter suam sepa-  
rationem credunt *Arabes*. 5  
Animus solus hominem constituit. 57  
Animæ considerationem vult *Aristoteles* pre-  
cedere huiusmodi animalium. *ibid.*  
Animæ natio a non potest deprehendi, ignoratâ  
totius corporis naturâ. 38  
Animæ notitiam posse comparari *Plato* negat,  
nisi cognitâ corporis nostri structurâ. 51  
Animam corporis ergastulum deiecit, suas vi-  
res exerceat, & functiones obire non potest,  
nisi corporis adiuta instrumentis. *ibid.*  
Animam hominis esse sphericam demonstra-  
tur. 247  
Animæ rationalis operatio similis est circulo.  
*ibid.*  
Animæ proprium esse motum circularem statuit  
*Averroes*. *ibid.*  
Anima est cælestis auræ particula, etc. 249  
Anima pienosissima hominis particula, in capite  
tanquam actopoli collocata. 257  
Animellæ *Banham*, sunt glandulæ faciei. 718  
Animæ descendentes diuisio? 145  
Animæ nomen vnde deductum? 225  
Animæ truncus diuiditur. *ibid.*  
in Animæ ostio oſſiculum appositum, quem  
vsum habeat. 257  
Aphoriz nomen intelligit *Hippocrates* epilep-  
siam, apoplexiam, & lyncopem cardiacam.  
591

Apophysis quid est, ea *Galenus*, 448. eius plures differentiæ. *ibid.*  
 Apophyses usus varius. *ibid.*  
 Apophyses appellatio propria est, vel impropria. *ibid.*  
 Apophysis vermiciformis in Cerebro, quid. a 59. & 161.  
 Apophyses clinoides sunt ossis sphenoidis. 470. vt & Apophyses pterygoideæ. *ibid.*  
 Apoplexia non tam fit per arterias torcularis obstruatas, quam per venas Cerebri nimio sanguine turgentia. 154  
 Apoplexia illius ventriculus fit in plesu mirabili. 161.  
 in Apoplexia non obstruunt ventriculi Cerebri. *ibid.*  
 Apparatus Anatomicus, vetus & novus. 59  
*Asclepius* magis fuit acutus, quod scelerum sibi fieri curasset. 429  
 Aqua est alimentum ignis, ea *Aristoteles*. 119  
 Aqua, vel serosus humor, qui circa pericardium continetur, concretionis adipis confert. eiusque duram consistentiam conferuat, ne calore liquetur. 235  
 Arachnoides membrana pertinet ad vitreum humorem, & eadem est cum amphiblastoide. 719  
 Arca Noë ex fabrica humani corporis accepta fuit. 4  
 Archigenes per ætatem ambitiosus & vehementius egit contra quosdam, vt venæ illos, & veteres. 613  
 Archimedes votum, vt totam terram moneret. 2  
 Aristoteles Christi aduentum vete dicitur præfuisse. 6  
 ab Aristotele qui discidebant olim, erant omnes Sophistæ. 11  
 Aristoteles magna elogio recensentur. *ibid.*  
 Aristoteles excelsit in Medicina & Anatome. 22  
 Aristoteles patentes, & scripti medicinalia. *ibid.*  
 Aristoteles etiam humana cadavera secuit. 13  
 Aristoteles *Alexander Magnus* iussu & sumptibus regis, magnum illud Opus de Animalibus concinnavit, & adornavit. 24  
 Aristoteles multa mutatus est ex Hippocrate. *ibid.*  
 Aristoteles seniel tantum nominavit Hippocratem. *ibid.*  
 Aristoteles libri de Animalibus, quomodo debent distribui. *ibid.* his sunt artentè legendi, qui volunt periti Anatomici fieri. 25  
 Aristoteles fuit præstantissimus Anatomicus. 34  
 Aristoteles non fuit post eam Venerem. 161. quomodo eo loco sit explicandus, aut excusandus. *ibid.*  
 Aristoteles primus prodidit sanguinem continuo affluere ad Cor, propter morionis perpetuam continuationem & productionem. 55  
 Aristoteles vitam hominis universam circulum appellavit. 557  
 Aristoteles celeberrimus in signi flagitio artem corripuisse, quare diceatur. 167  
 Ars est primum principium rerum artificialium in quo veluti extremo conquiscentium. 84

Ars multa perfectius facit, quam natura, ex *Aristotele* & *Fernelio*. 600  
 Arteriarum radialis est in Corde, unde truncus expullos, qui Aorta nominatur. 225  
 Arteriz magnæ, quæ Aorta dicitur, diuisio in duos ramos, ascendentem & descendentem. *ibid.*  
 Arteria Axygos, quare nulla datur. 116  
 Arteriarum universi corporis diuisio. 144  
 Arteria peculiaris nulla à Corde ad annularem digitorum manus sinistræ porrigitur. *ibid.* eluduit & refellat *Leonis Lemnij* error. *ibid.*  
 Arteriz curialis distributio. 347  
 Arteriz, si turè secantur, earum sectio plus prodesit ad extinguendum incendium febile, quam vixit duodecim sanguinis ventrum. 600  
 Arteriarum sectione non est abutendum. *ibid.*  
 Articulæ propriè, quid significat. 449  
 Articulæ apud Hippocratem multiplex acceptio. *ibid.*  
 de Articulis *Galenus* doctrina accuratè explicatur. 450  
 an sit de essentia Articuli vt motum habeat. *ibid.*  
 Articuli duæ sunt species. 471  
 Asclepiades, è Rhetore factus Medicus, maligna garrulitate veterem Medicinam cunctis inuisam & exosam reddere tentavit, dum Hippocratis, eiusque seculi doctrinam contumeliose *Moris Medusianæ* appellavit. 430  
 Asclepiadis errores non aliunde manabant, quam ex conspectu Anatomico. 410  
 Aschy venæ lacteæ recepit sunt, & approbate in omnibus Academicis 608  
 Asellus primus Inuentor & Demonstrator venarum lactearum. 416  
 Asellum novum & quartum genus vasorum melataicorum, inuenit, & venas lacteas nominavit, 108. eras demonstratio & experientia. *ibid.*  
 Aspetz Arteriz canalis structura, 121. quomodo differt in brum ab homine. 16  
 Athleta, qui in promouenda corpora firmitudine & robore studium omne ponebant, ad eorum vique curabant sibi refecti capillos. 314  
 Audicus est sensus disciplinæ, ad excipiendam ab aliis artem, scientiam, sapientiam, visum accommodator. 181  
 Audrum grauem, aut furditatem inducit maledictis membrana auris internæ. 282  
 Auditio, quomodo perficitur. 283  
 Angustus edentulus fuit, & longiuus. 481  
 Diuus Angustinus libros *Reuolutorum* composuit, quibus suos errores agnoscit, & emendat. 613  
 Aures qui duris scalpunt, quare rursunt. 264  
 Auris externæ & internæ musculi. 310  
 Auris internæ antrum, veteribus inaccessum, in quo magnum Naturæ artificium elucet. 471  
 huius admirabilis structura, quare veteribus Anatomicis ignota & indicata fuit. *ibid.*  
 Aures cetopirbecorum & simiarum eadem habent ossicula, quæ homines & pisces. *ibid.*



- cameræ quatuor in Aure interna, nempe porus acousticus, & pelvis siue concha. *ibidem.*
- Auris internæ cæritas labyrinthus vocatur. 473. quarta verò cochlea, à flexuosa meatui obliquitate. *ibidem.*
- Auris internæ transmissula enamerantur. *ibidem.* malleus, incus & stapes. *ibidem.* semper sunt æqualis magnitudinis, tam in recens natis, quam in adultis. *ibidem.* curæarum substantia dura sit ac densa, & à cæteris ossibus planè distincta. *ibidem.* quare in concha fuerunt collocata. 474. eius positionis usus variq. *ibidem.*
- io Auris structura observandus aqueductus Fallopi, siue canalis ossis. *ibidem.*
- Aurium usum proximam à leminibus natura nobis dedit. 281
- in Auribus animom habitare credebatur *Xerxes.* *ibidem.*
- ex Aurium morbis maius impender periculum, quam oculum iquare. *ibidem.*
- Auris non est dignitate inferior oculo. *ibidem.*
- Auris diuisio in externam & internam. *ibidem.*
- Auris vasa, *ibidem.* eorum scarificatio eo in Cedemat commendat *Hippocrates.* *ibidem.* venarum sectionem pone Antea facere *Scythæ* infecandos solus notavit *Hippocrates.* *ibidem.*
- hanc venarum sectionem pone Aures inutilem esse monet *Galenus.* *ibidem.*
- Auriculæ quibuldam pro arbitrio moventur. 281
- Auriculæ ad humeros usque protensas habent *Calceonæ.* *ibidem.*
- Aures geminas, quare Natura constituit. *ibidem.*
- Aures duas, sed vnicam linguam nobis tribuisse narrabat *Leus Citiensis,* ut duplo audiamus, quam loquamur. *ibidem.*
- Auris internæ descriptio, cum suis canaliculis. *ibidem.*
- Auris internæ structura nota fuit *Hippocrati & Aristoteli* melius quàm *Galeno.* 283
- Axyg. venæ sius. 280. eius venæ externæ in omnibus animalibus non est similis. 221. in quibuldam animalibus gemina est. *ibidem.* eius diuisio in duos ramos. *ibidem.*
- in Axygo valvulas comprehendit *Riolanus,* *ibidem.* refeluntur multis Anatomici, quare si cæritas, metas nugas, & chumæricas appellatur. *ibidem.*
- Axygon interdum deesse solus notavit *Sylvius.* 221
- Azygos, quare vnica, & à dextris tantum positus. 221
- Azygos, quare nullam habeat arteriam comitem. *ibidem.*
- Azygi venæ ramos descendens non commistitur emulgenti venæ, sed infra emulgentem in truncum Cauæ interitur. 693
- B.
- Barba est iocex facultatis procreatricis. *ibidem.*
- Barbæ piliaugentur entu, cum reliqui. nempe capitis & superciliorum, minuantur. *ibidem.*
- Barbas ficti quosdam mulieres certum est, ex *Hippocrate,* & aliis. *ibidem.*
- Bartholinus Philosophus fuit. & Medicus eruditus. 687. inuita delumpit ex scriptis *Riolani.* *ibidem.* omnes Europæ Academiis peritissimus. *ibidem.* tam dextro Mercurio suffragatur, ut nequidem *Laeterna Dea* furum deprehenderet. *ibidem.* Galliamle vidisse testatur in suis peregrinationibus. *ibidem.*
- Bartholinus nunquam dissecuit humana cadavera. *ibidem.* ex Medico factus est Theologus. *ibidem.*
- Bartholinus Filius *Laurentbergium,* quare vocauit Vmbraicum Anatomicum. 682. vaniam deprecatur, quod ex suo Cerebro in Anatomicis nihil adhuc parturit propter iuuenilem ætatem. 758
- Bartholinus multa desumpit ex *Riolano.* 763. 770. & seq. refellitur super capitulo arrabilaris. 770. 771
- Bartholinus ex *Riolano* pene omnia desumit. 776. fallitur in aqua pericardij. 778
- Bartholinus nimis multa, & vbiq; ferè desumit ex *Riolano,* suppressio eius nomine 85. & aliis.
- Barthelemy *Engelshaus* quantum fuerit Anatomicus. 31
- Barthelemy *Engelshaus,* librum scripsit de vena azygo. 250
- Bauhins quænam scripsit Anatomicæ. 33. fuit eximius compilator. *ibidem.* fuit indodus & imperitus Anatomicus. *ibidem.* in eius Anatomicæ scripta Animaduersiones *Riolani.* 685
- Bauhins ignorauit penitus naturam & situm sphincteris vesicæ. 695
- Bauhins multa desumpit ab *Engelshaus,* suppressi nomine. 725
- Bestia quænam sit illa, de qua *Meiræus* conquebatur apud *Athenæum,* dicebat se animal a le e, quod scriptum absumeret. 154
- Benseroucy optimo de sanguificatione quadam facta in renibus refellitur. 770
- Bibliotheca, viro erudito, qualis est *Riolanus,* senectutis est solatium & oblectamento. 813
- Bilis duplex sub Hepate. vna fluens assidue in intestina, quæ choleram morbum & dysenteriam excitat; altera, quæ non fluit, nisi copia descendat vesiculari. 749
- Bilis excrementitia Hepatis duplex, crassa & tenuis. 660
- Bi is virtutisque natura & usus. *ibidem.*
- Bilis flauæ collectio, & mors sub Hepate, an sit ad vitam necessaria. 125
- Bilis per quam viam feratur ab Hepate ad intestina. *ibidem.*
- Bilem ab Hepate per vesiculam attrahi statuit *Aristoteles.* 126
- Bilis crassa multplex. *ibidem.*
- Bilis crassæ peculiaris usus. *ibidem.*
- Bilem ab Hepate directè traduci in leionum probatur experimento & rationibus. *ibidem.*

**B** Arba vnde dicta 358. quare viro concessa fuit Barba, non mulieri. *ibidem.*

Balus collectio ad vitam necessaria, usque ad vitam vitæ spiritum conferuat. 127  
 Bilem suam puram ieiunium quidam euomunt tertio quoque die. 128  
 Bismus pater, Galiz Polemarchus ventriculum habebat calidissimum. 609  
 Bona Dea operta detegere olim mulieribus nefas erat apud Romanos: capitale eis erat hæc mysteria videri. 177  
 Boni nullius sine socio inuicem est possessio. 541  
 Brachij musculi multi recensentur. 316  
 Brachium quid est. 105. vnde sic nominatum. *ibidem.*  
*ibidem.* duo eius extrema diligenter obsecantur. *ibid.* vindicatur *Galemi à Vesaly* columnia. *ibid.*  
 Bubones venerei, quare supra inguen appa-  
 reant, vel in flexu inguinis: pestilentes verò  
 & alij, infra inguen. 91.  
 & 92  
 Bubonis pestilenteris materia longius elimina-  
 tur, quia spiritiosa. *ibid.*  
*dem.*  
 Bubo venereus fit supra inguen, aut in flexu in-  
 guinis. 92. quomodo fiat in mulieribus  
*ibidem.* & per quam viam. *ibi-*  
*dem.*  
 Bubonum materia tota ferè exhauritur per  
 sapientem sectionem. *ibid.*  
 Bubones vnde dicti. 117  
 Bubones venerei quomodo fiant in mulieribus,  
 vt & in viris. 184  
 Bubones vascel, quomodo fiant in mulieri-  
 bus. 752  
 Bucrinus Anatomica tractatum *Riolani* au-  
 diuit & spectauit. 35. ex *Lutherano* Catho-  
 licus factus est. *ibidem.* fit *Monachus* *Domi-*  
*nicanus* *Parisijs*. *ibidem.* ex dysenteria attrabi-  
 lilaria motuatur. *ibidem.*  
 Bucrinus amici & præceptoris sui *Spigelij* li-  
 bro Anatomico natiui admostrat. 735  
 Bucrinus in Italia incarcerationis, Inquisitorum  
 edicto, crimen expiauit mutatione Religio-  
 nis, ex *Lutherano* factus Catholicus. 739  
 Bucrinus in *Spigelio* multa perturbauit super  
 mentibus choldochia. dum voluit *Riolani*  
 inuenta occultare aut obcurare, ne furto  
 agnosceretur. 730

C

Adauer suspensum, quamuis telluris intrin-  
 se pondus existeret, & tanquam exci-  
 noma. membrumque vitiatum ab hominum  
 consortio refectum fuerit, moriendo tamen  
 magis profuit, quam viuendo. 414  
 Cadaver suspensum varias Medicinas suppeditat  
 ad sanitatem aliorum conferuandam. *ibid.*  
 414. ex eo *Mumia* optima conficitur. *ibi-*  
*dem.* alia quoque remedia quam multa ex  
 eo delinuntur aduersus varios affectus.  
*ibidem.*  
 Cadavera eorum non sunt secunda, qui mali-  
 gna. aut ardeat febre interierunt. 49. vt  
 & eorum qui ex febre pestilente obierunt.  
*ibidem.*

in Cadauere ad Anatomem destinare requiritur  
 conditiones à *Fernelio & Sylui.* 60  
 Cadavera occisi & violenta morte sublata, cor-  
 ruptioni an sint magis obnoxia, quam quæ  
 naturali morte decedunt. *ibi-*  
*dem.*  
 Cadavera ad dissectionem Anatomicam des-  
 tinata, supra scordium & clematitem daph-  
 noidem, siue viam perueniam debeat re-  
 cumbere: interiora verò aqua salia, aut a-  
 qua vitæ, aut aceto lauati debeant. 61  
 Cadaveris eructatio ad conspectum siccitatis,  
 quas habet causas. 6 t. leues eius rei sunt con-  
 iectura. *ibid.*  
 Cadavera feminarum prona in aquis, musculo-  
 rum supina fluitant. 402  
 Cæcum intestinum, quare sic dictum. 102  
 Cæcum intestinum explicatur. 103. an habeat  
 aliquid immutatum. *ibidem.* non decidit in  
 Scrotum, vt *Ileon.* 104  
 Cælestes orbis in motu suo musicalem harmo-  
 niam, siue concentum admirabilem effici-  
 unt, ex mente *Pythagoræ*, qui non perci-  
 pitur à nobis propter mundi tumultus. 102  
 Cæspitium sanguinis translationem per Cor sub-  
 olfecit. 355  
 Cæses, siue *Cæses* in da ducti, quod matris  
 mortuæ seculo victo in lucem prodierunt, au-  
 thore *Fistis.* 389  
 Calculi casu vesicæ fundo versos in ventrem  
 possunt extrahi & eiici. 316. hæc operatio  
 olim tentata est, & nunc administratur satis  
 feliciter. *ibid.*  
 Calidum innatum ventriculi refectum est, &  
 simul cum calore agit in alimentum. 607  
 Calor quo fruitur homo viuens, similis elemen-  
 to stellarum, beneficus est, non incendiarius. 349  
 Calor elementaris qui continetur intra canales  
 arteriarum retis mirabilis, & venarum ple-  
 xus choroidis, interdum intenditur. *ibi-*  
*dem.*  
 Canales, siue fistule quatuor, quibus continetur  
 sanguis rigaturus Cerebrum. 854  
 Canalis tertius, quare Torcular appelletur.  
*ibidem.*  
 Canaliculus Cerebri vsus. *ibid.*  
 Canaliculus per quem adpettum surdi au-  
 diunt. 395  
 Canaliculus auris, si obtrudetur crasso humore,  
 vel moco, humores, vel status irruentes in  
 cauitates aoris, nec exitum habentes, vel sur-  
 ditiem, aut tinnitum, vel susurros produ-  
 cunt. 711  
 per Canaliculum ab Aures Os surdi per acci-  
 dens audiunt, si quis cisis Os loquatur. 735  
 Canes, quare attributi *Apollini*, & *Esculapio*,  
 & *Chironi.* 430  
 Canes venatiles, & rerum naturalium specu-  
 latores, *Tullius* vocauit Philosophos. 430  
 Canes qui euiscerant, quare magna ex parte  
 sunt splentici. 440  
 Canina caro an salubriter estetur. 41  
 Canini dentes, quare sic dicti. 483. quibus  
 a iij

- in dextra parte gemini sunt supernè, fornicum  
blandimenta pollicentur. *ibid.*
- Capni dentes, quare vocantur *Ocalery*. *ibid.*
- Capita acota semper sunt viriola. 46 a
- an pro varietate figurarum Capitis futurarum  
omena, & situs immutetur? *ibid.*
- Caput quid est, ex *Galeno*. 464
- Caput amplè cunctibulæ comparatur. *ibid.*
- Capitis motus, tam rectus quàm obliquus, quo-  
modo fiant. 439 490
- in Capitis multis affectibus venæ sectionis festi-  
natæ necessitatem docet *Hippocrates*. 59 1
- Capitis deplendi via brevis cilet, & expedita per  
iugulares externas, si bodie secarentur. 599
- Capitis dissimilitudo in homine ab aliis ani-  
manibus 427
- Caput humanum septem orbibus præditum. 448
- Capitis dignitas demonstratur. 411
- Caput nobilissimum est, ac diuinissimum corpo-  
ris membrum. *ibid.*
- Caput sic dictum, quod inde capiant initium  
sensus & nerui. *ibid.*
- Capiti magnus honor & calus exhibitus, quia  
saluus hieroglyphicum existit. *ibid.*
- Capite bene habente, reliquum corpus sanum  
existit. 251
- ad Capitis dolorem animus perturbatur. *ibidem.*
- Caput tam in aliis animalibus quàm in homine,  
non est tanti momenti ad vitam quanti Cor. *ibidem.*
- Capitis vniuersi diuisio. *ibid.*
- Capitis earent administratio Anatomica. 253
- Caput à *Galeno* in tres partes diuiditur, dum  
ait, Cephalalgiam esse Capitis merè affecti  
symptoma, furdraem Cerebri, manuum tre-  
morem neruorum principij. 258
- Capitis musculi communes & proprii 314
- Capitis magnitudinem solani homo habet in v-  
tero. 407
- quare Caput homini ceteris partibus grandius  
Natura concessit, ratio *Admirabili*. *ibid.*
- ex Capitis magnitudine reliquorum Ossium na-  
tura dependet. 460
- Caput ortu, dignitate & situ primum existit in  
Corpore. *ibid.*
- Caput vnde, & quare sic dictum. *ibid.*
- Capitis partes variz. *ibid.*
- Capitis significatio propria, & diuisio in cra-  
nium & faciem. *ibid.*
- Capitis figura naturalis & deprauata 461
- Capite exiguo præditu, flagitiosi Cerebri indi-  
cium ostendunt. *ibid.*
- Caput exiguum plurimi spiritus capax esse ne-  
quit. 462
- Capitis exigua semper praua sunt, ex *Galeno*. *ibidem.*
- Capfulæ atrabiliariz *Bartholini* describuntur,  
& probantur à *Perlungio*. 315
- Capularum atrabiliarum auctor est *Bartho-  
linus*, sed nomen est inane, sine subiecto,  
770. refelluntur ipsæ capfulæ. *ibid.* &  
771
- Caput hominis est *Macrocosmus*. 245
- in Capite, vt in anima hominis continetur com-  
paratio hominis cum magno mundo. *ibid.*
- Caput hominis ad formam orbis celestis figu-  
ratum. *ibid.*
- Capitis tanta est dignitas, vt ratione illius ho-  
mo dicatur ad imaginem Dei factus. 246
- Caput estotius corporis velut ara munitissima. *ibid.*
- in Capite residet Anima, sensum facillitio di-  
para, rebus omnibus instructa, quibus vni-  
uersum corpus sustentatur. *ibid.*
- ab ipso Capite venas nasci non est inuentum  
*Pelopi* præceptoris *Galeni*, alij enim scrip-  
tante *Aristotelem*. *ibid.*
- Caput ex *Hippocrate*, morborum radix est. *ibidem.*
- Capitis figuram ad rotunditatem mundi *Dij*  
fixere, ex *Platone*. *ibid.*
- Caput ad figuram orbis celestis formatum esse  
scribit *Aristoteles*. *ibid.*
- Caput cum maiore mundo comparatur, *ibid.* &  
247
- Capitis præstantia pendet ab intellectu. *ibid.*
- Caput in quolibet formationis tempore reli-  
quos partibus semper grandius apparet. *ibidem.*
- Caput ceteris partibus grandius, homini natura  
cur concessit. *ibid.*
- de Capitis magnitudine reliquorum ossium na-  
tura dependet, ex *Hippocrate*. *ibid.*
- Caput est sedes animæ, que simul atque corpo-  
ri infunditur, suum domicilium architecta-  
tur, exornat & amplificat, ex sententia *Aer-  
corialis*. *ibid.*
- Carcinus* Anatomicus *Italus*, discipulus *Fello-  
pi*. 244
- Cardiacorum remedium in arte Medica spe-  
ciosum est iudicium, commendatio eximia, ma-  
teria pretiosa, sed abusus maximus, imò ex-  
pissimè perniciosus. 596
- Cardiaca remedia quidam manifestis agunt  
qualitatibus i alia oculis, siue proprietas  
quidam dicuntur agere, quæ peritis Medicis  
valde est suspecta & infida. *ibid.*
- Cardiacum remedium, quid est. *ibid.*
- Carne quatuor species consistuntur. 598
- Caro an sit pars princeps in musculo. 299
- Caro in musculo nullam actionem edit, sed tan-  
tum vim præstat. *ibid.*
- Carnis usus multiplex, ex *Platone*. *ibid.*
- Caro est fundamentum & cunctis fibrarum, quæ  
ruborandis & consistendis partibus infer-  
uiunt. 118
- Carolus Pifo*, *Medicus Parisiensis*, librum scripsit  
eiusdem, de morbis à sero. 218
- Carolus Quintus* ab Academia *Salernitensi*  
quefuit, antea *Medicus Christianus humani  
sacros caduera*. 34
- Carotides arteriz vnde sic dicuntur? 226
- in Caro an potius obstruantur arteriz, quàm  
venæ aut nerui? *ibid.*
- Capri musculi recensentur. 38
- Carpus vnde dictus. 309
- Carpus octo constat ossibus. *ibid.* quomodo  
inter se conueniunt. *ibid.*
- Cursus optimo de circulatione sanguinis ex-  
aminatur. 166
- Caruncule vniuersique vasis circulatorij officio  
insitæ valvulæ apponitur, quæ vti. 167
- Caruncule myrthoides in ceruice vteri descri-

bumus. 187  
 de Carunculis figmentum *Strutius Pinus* re-  
 fectitur. *ibid.*  
 in *Isaaci Casanovi*, viti doctissimi cadauete,  
 quasi duplex vesica deprehensa fuit, in qua-  
 rum una lapis stabulabatur. 190  
 Castrandi modus facilis sine ulla sectione. 163  
 Castratio mulierum, quomodo intelligenda?  
 183  
 Castrari an possint mulieres? *ibid.*  
 in Casuistarum libris magnæ obsecrationes con-  
 tinentur. 171  
 Causis prudenter dictum de agro pessime  
 mulcato. 56  
 Cautas inter septum & ventriculum pituita  
 plena, nihil est aliud, quam Omentum glo-  
 metatum versus Lienem, in quo pituita mul-  
 ta cumulat. 699  
 Cauterium latum appressum, ad curationem  
 herniæ reductis intestinis, præstantius est re-  
 medium puncto illo autem, inuolui & fallaci.  
 91  
 Centrum corporis duplex, longitudo & ro-  
 tunditas: nempe lymphis Ossium pubis,  
 & vmbilicus. 94  
 Centrum vtrumque est vmbilicus, modò fiat  
 mensura in corpore infans. 95  
 Centrum partium internarum & medium ra-  
 tione vmbilici, *Galenus* in renibus colloca-  
 uit. *ibid.*  
 Centrum partium internarum potest esse in  
 Hepate. *ibid.*  
 Cerebrum homini amplissimum, & quatuor  
 boum Cerebri grandius atque ponderosius.  
 10.  
 Cerebrum vni homini in infantia palpitat, nec  
 corroboratur ante primum sermonis exor-  
 dium. *ibid.*  
 de Cerebri motu magna est inter Anatomicos  
 dissensio, quæ *Galenus* in hac re dubius &  
 incertus fuit. 414  
 Cerebri motus eum Cordis motu, an coincidat.  
*ibid.*  
 à Cerebro defertur vis motus Laryngis, per  
 duplicem neruum recurrentem. *ibid.*  
 Cerebri structura interior partium infetiorum  
 figuram æmulatur. 246. probatur illud per  
 inductionem. *ibid.*  
 in Cerebro febres omnes ortum habere, ibi  
 nasci, & inde detruari in vniuersum corpus  
 demonstrauit eruditus Medicus *Puducius*.  
*ibid.*  
 in Cerebro possunt ostendi Poli duo, arcticus &  
 antarcticus, super quibus Orbis voluitur.  
 249  
 Cerebrum calore fruitur & fouetur, quamdiu  
 viuunt homo. *ibid.*  
 Cerebri moles interior in quatuor ventriculos  
 diuiditur quemadmodum terra magni mun-  
 di diuiditur in quatuor partes, *Europam*,  
*Asiam*, *Africam*, & *Americam*. *ibi-*  
*dem*  
 in Cerebro quatuor venarum patia repetun-  
 tur. *ibid.*  
 in Cerebro interiore lapides generantur, & me-  
 tallia. *ibid.*  
 Cerebri meninges vnde dicuntur. 253  
 Cerebrum omnibus non est exanguis, vt scri-

psit *Aristoteles*. 234  
 Cerebri arteriæ multæ sunt, sed parue, ne ni-  
 mis ferueat Cerebrum, quod morbos &  
 mortem induceret animali. 255  
 Cerebrum ipsum mouetur, præter arterias &  
 meninges. *ibid.*  
 Cerebrum propter venulas inflammatione po-  
 test tentari. 256  
 Cerebrum vnde dictum, an quasi Ceteum.  
*ibid.*  
 à Cerebris, cur veteres abstinerent in edulis.  
*ibid.*  
 Cerebri substantia, angululosa, an medullo-  
 sa? *ibid.*  
 Cerebrum, quomodo omnium ferme fluxio-  
 num principium. *ibid.*  
 Cerebri magnitudo in homine amplior est,  
 quam in cæteris animalibus, imò elephantii  
 Cerebro, maior. *ibid.*  
 Cerebrum hominis duobus bouum Cerebris  
 grandius esse affirmat *Ruffus Ephesius*.  
*ibid.*  
 Cerebrum humanum in statua appensum,  
 trium librarum mercatoris pondus ædquat.  
 256  
 Cerebrum quare datum homini amplissimum.  
 257  
 Cerebrum in plenitudo turgescit in profundis ca-  
 pitis vulneribus, decrescere Luna subfide-  
 t. *ibid.*  
 Cerebrum, quare frigidum & humidum  
*ibid.*  
 Cerebro frigidior nulla pars est in corpore, &  
 comparetur cum aliis partibus corporis fri-  
 gidis. *ibid.*  
 Cerebrum frigidum, vt Cox refrigeraret.  
*ibid.*  
 Cerebri & Cordis motus compassio & reactio,  
 quomodo fiant. *ibid.*  
 Cerebri structura mirabilis non est eadem in a-  
 nimalibus, quæ in homine reperitur.  
*ibid.*  
 Cerebrum quare anfractuosum factum est.  
 258  
 Cerebrum priusquam rescindatur, in eo duæ  
 partes considerande, Cerebri substantia, &  
 veterum principium. *ibid.*  
 Cerebri moles optime diuiditur in tres partes.  
 Cerebrum proprie dictum, Cerebellum, &  
 spinalem medullam. *ibid.*  
 Cerebri in minores partes diuisio. *ibid.*  
 Cerebellum quid est. *ibid.*  
 Cerebrum tanquam magna glandula, fumis  
 æstuantium vaporum, aut sanguinis in ve-  
 nis ebullientis vaporibus facile impletur.  
*ibid.*  
 Cerebrum hominis amplissimum indiget mol-  
 to sanguine, qui in suppeditatur à Corde.  
 615  
 de Cerebri vtu ad Cordis refrigerium non est  
 adeo ridicula *Aristotelis* opinio. 680  
 Cerebrum est metropolis frigidi & glutinosi.  
*ibid.*  
 Cerebrum maxime refrigeratur per circula-  
 tionem sanguinis, & sinu longitudinali ressen-  
 tis in venas iugulares. 680  
 Cerebrum mouetur per sui corporis dilatatio-  
 nem & contractionem. 714

Cerebrum quare distinctum à Cerebello. *ibidem.*  
 Cerebelli sinus est quartus ipse ventriculos, quem cisternam recte nominavit *Aranus*. *ibidem.*  
 Cerebrum veram inflammationem patitur, & abscessum puruleum. 754  
 in Cerebri vulneribus diligeret observanda Luna, ex *Fallopio*. 755  
 Cerei quidam felle carent, & diu vivunt. 725  
*Choromantiam*, ac proinde *Onychomantiam* nihil penitus veri, nihil sani coornere eleganter demonstrat *Camillus Baldus*. 563  
 Cibirurgia non potest exquiri scriptis mandati. 421  
 Chirurgia nomen multiplici modo sumitur apud *Galenum*. 439  
 Choana, siue infundibulum Cerebri, quid est. 561  
 Cholera morbus, unde nomen habet? 99. an à bile, an à pitte affecta, ut vult *Trallianus*. *ibidem.*  
 Chorda est nomen Græcum, unde Cordapfus, nomen morbi inest *Galenum*. 655  
 Cordapfus unde dictus. *ibidem.*  
 Christiana religio prohibet conceptum semen elicere, & prohibet tanquam magnum facinus, grauique supplicio expiat. 403  
 Chyli tractio & transitus ad Lienem per medium pancreas, si opo canalis à *Vesungo*, *Anastasio Patavino* reperti. 573  
 Chyli motus duplex est, vnus locis intra ventriculum, alter progrediens, de loco in locum extra ventriculum. 606 uterque iste motus, quid est. *ibidem.*  
 Chylus, quomodo fiat. *ibidem.*  
 in Chylorum numerum animalium considerari debet dissolutio, eodum & distributio. *ibidem.*  
 Chylus in ventriculo quomodo fiat. 607. extra ventriculum quomodo moueatur. 603  
 Chylus in usque sunt calidior ventriculo celeritate pericitur, & effluit à ventriculo. 619  
 Chyli analysis à *Paleo* proposita prorsus aduersus circulationem. 610  
 Chymei nullam digestionem magis naturalem esse putant, quam quæ nimis estote pericitur. 106  
 de Cibi quotidiani demeromagna sic quotidie dissipari, vel crebro per alium, per transpirationem, & respirationem. 612  
 Circulatio sanguinis ad vsum modicum reuocanda. 541  
 per hanc Circulationem sanguinis, *Galen* Medicina non mutatur. 542  
 Circulatio sanguinis in studio Anatomico omnibus inueniunt præceteris, in quamque lucem & incrementum deferit Medicina. *ibidem.*  
 isthæ Circulatio magni est in Philosophia & Medicina momenti. 551  
 Circulatio sanguinis nouo modo explicata ab *Harnes*, nunc in aliquibus morborum causis & locis, atque eorundem curationibus. 554  
 Circulatio sanguinis nouo modo explicata à *Rulano*, nihil mutat in Medicina, sed mor-

borum curationi plurimum conferre, atque Medicinam veram illustrat. *ibidem.* eius fundamenta constituuntur. *ibidem.* cogitata sunt *Arystoteles*, cuiusque sectionibus, imò ante *Arystotelem*, *Hippocrati*, & aliis, non sunt incognita. 555  
 Circulatio sanguinis præsertim Philosophis non ignota, *Empedocles* & *Platon*. 553. eadem probatur ex variis locis *Hippocratis*. 556  
 Circulationem sanguinis duplicem designauit *Hippocrates*. *ibidem.*  
 Circulatio sanguinis non fieri per pulmones probatur ex impossibilitate & incommoditate. 560  
 Circulatio sanguinis nequaquam sit quondam ter aut plures, ex fundamentis ab *Harnes* propositis. 564  
 de Circulatione sanguinis disquisitione, est purum purum Anatomicum mysterium, ex opinione *Luem*, viti doctissimi, & eamque Philosophi. 570  
 Circulatio rotas sanguinis est impossibilis & incommoda, atque opus est in medendo plane perniciosum. 574  
 de Circulatione sanguinis opinio propria *Rulano* constituitur. 577. alia non a proponitur. 579  
 Circulationis vitilæ declaratur. 580. quæ duplex est, Physica & Medica. *ibidem.*  
 Circulatio sanguinis Chirurgis nota esse debet. 581. & 582  
 ex Circulatione sanguinis quasnam vitilæ Medicus percipiat ad bene medendum. 582  
 Circulatio sanguinis explicat errores, & causas variorum pulsum. 583  
 Circulatio sanguinis febrium causas, sedes, insultus, siue iuuatiles facile explicat. *ibidem.*  
 Circulatio sanguinis ostendit in omni febre, & magnis morbis à plethora, vel cacochymia summa, maiorem canalium enatis, non esse patendum detractioni sanguinis, in omni sexu & ætate, etiam in gravidis, si tale remedium morbis requirit. 584  
 Circulatio sanguinis docet modum, quo sit mittendus sanguis in impura vasorum plenitudine. 589  
 Circulatio sanguinis, an impediat fluxum humoris impuri in habitum corporis, ut in variis, morbillis, cithymatis & exanthematis febres purpureæ? 590  
 Circulatio sanguinis pergandi tempora, quantitatem & modum indicat. 595  
 Circulationis sanguinis vitilæ confirmatur ad vsum medendi. 596  
 ex Circulatione sanguinis delectus venarum in mirrodo sanguine facilius innotescit. 597  
 per Circulationem sanguinis dignoscitur, quomodo sit minuendus ad curationem morborum, an per venæ sectionem, vel digitum, & quænam via sit tutior? 599  
 Circulatio sanguinis *Hippocrati* & *Arystoteli* videtur fuisse nota. 601  
 ex Circulatione sanguinis Medicos solers cuius pulsum & respirationis dignoscit, discit etiam in curationibus morborum, rectam methodum vitendi phlebotomia & purgatione. 602

à Circulatione sanguinis longè differt cyclica  
medicatio Methodicoium. 603  
per Circulum medet, quid est. *ib.*  
Circulus duplex, vnus rasiumptiuus, alter re-  
corporatiuus, huc metalynticicus. *ib.*  
*idem.*  
Circulatio sanguinis est necessaria ad ipsius de-  
fecationem & renouationem. 612  
Creatio sanguinis *mysterium Naturæ.*  
613  
Creatio sanguinis non pati passu prodit per  
Cerebrum, vt in canalibus maioribus Aortæ  
& Causæ. 615  
Circulatio sanguinis nulla est in Fœtu ad duos  
menses, sed à matre venit, dum sanguis ter-  
rurrit ad Cot matris. 616  
Circulationis sanguinis author an sit *Paulus*  
*Sarpi*, *Monachus Serrus*, *Thiologus Veneti.*  
787  
Clauicula vnde dicta. 504. eius sunt duæ  
partes. *ib.*  
quare Clauiculæ oppositæ. *ib.*  
propter rianus actiones data est. *ib.* eius si-  
gnæ & conuexio. *ib.*  
Clitoris vnde dictus. 188 diuersa eius nomina,  
& partes varæ. *ib.*  
Clitoridis musculi. *ib.*  
Clitoris est amoris dulcedo, libidinis sedes, ac  
tritus mensus. *ib.*  
Clitoris in quibusdam extesit, & ad Penis  
magnitudinem augetur. *ib.*  
Clitoris tubiymphæ nomine, veteribus inno-  
tus. 189  
Clitoris nomen à recenitoribus Græcis fuit ex-  
cogitatum. *ib.*  
Clitoridis structura quomodo inuestiganda.  
101  
Clitoridis musculi describuntur. 329. eorum  
vñs. *ib.*  
Coccyx, quare sic dicatur. 497. eius vñs, &  
structura. *ib.*  
Cœliacæ artetix micantis palpitatio supra Vm-  
bilicem appressa manu non manifestè peti-  
puit, propter supra posita intestina, miñima-  
gium intus conceptum fuerit incendium, vel  
abdomen macilentum ac depressum. *ib.*  
Cogitationes postemæ sunt psonibus sapientio-  
res. *Dies dies evanitas verbum, & nox nocti indin-  
cas feruorem.* 542  
Cognitio sui ipsius, res difficillima. *a*  
Cognitio sui ipsius quanti momenti. *ib.*  
Coli intestini nomen quomodo scribi debeat.  
656  
Colici dolores à *Fernelio* descripi non consti-  
tunt in Colo intestino, sed in peritonæo, &c.  
92. crudelissimi sunt, & admodum diuturni.  
*ib.*  
Colici dolores sunt ab humore tenui & acerrimo,  
qui vix potest deishi è spatio membrana-  
tum in quibus concluditur. *ib.*  
Colicus dolor *Pyloricus* non fuit ignotus olim  
*Medicus Persicus*, ante *Africam*, *Ci-  
tesium* & *Salinasium*. 656. designatus fuit o-  
lum à vñs clarissimis, *Fernelio* & *Hallerio*.  
*ib.*

Melodunensis & populi Asiaticis fami-  
liaris est, & *Endemus*. *ib.*  
Colicus dolor *Pyloricus*, in pascalyfin sape de-  
finit. *ib.*  
Collado nimis animosè *Laurentium* est insecti-  
tus. 614  
Colli recensentur octo musculi. 515  
Colli motus lateralis, nullis peculiaribus mus-  
culis peragitur. *ib.*  
Colli musculi omnes si simul agant etruis fama,  
etreda & rigida consuetudinis, vt in tetano.  
*ib.*  
Collum quid, & vnde dictum 189. eiusdem v-  
sus. *ib.* qui sunt angustia Collo, quomodo  
sunt obnoxij phthisi. *ib.*  
Colli partes varæ. *ib.*  
in Collo & oris spatio plures glandulæ conti-  
nentur. 290 eaium glandularum vñs multi-  
plex. *ib.*  
Colon intestinum, vnde dictum. 104  
Coli valvula describitur. *ib.* est circularis &  
membranosa in medio pertusa, *ib.* eius in-  
uentor non est *Bambani*. *ib.* eam *Heri*  
operculum appellauit *Farolus*. 105  
vetus eius inuentor est *Farolus*. *ib.* imò  
*Salomon Aibetius*, & *Archæus Piccolomus*.  
*ib.*  
Coli valvula vt demonstretur, quid agendum.  
*ib.*  
Colon intestinum, cur in homine solo ad supe-  
riora reuoluitur, duæ rationes adferuntur.  
106  
Colon in homine solo billis vñsculam costringit.  
*ib.*  
Colicos dolores molestissimos in mesenterio  
delite fecit primus obseruauit *Fernelius*. 109  
Colorum examen & verum scintinum, res val-  
de implicita & obscura. 356  
Colostrum proprix matris, an sit loctensum *Fæ-  
rui*. 757  
Colo intestinum mesenterio caret. 748  
in Comparationibus rerum nihil est tam simile,  
quod non habeat aliquid dissimile. 149  
Conatium, quare *Natura* apposuit in vestibulo  
canalis, qui est à rectio ad quartum ventericu-  
lum. 261  
Conformationis nostri corporis modus, & ra-  
tio. 388. de ea quid sentierint *Aristoteles* & *Ge-  
lenus*. *ib.* eius tempora quatuor ab *Hippo-  
crate* constituta. 381. certis temporum spaiis  
ea definire est impossibile. *ib.*  
Conformationis tempus, an sit varium in mari-  
bus & feminis. *ib.* eius, vt nec motionis, nec  
absolutionis, nec egressus in lucem pñfinitus  
est terminus. 382  
de Conformationis tempore leuis contrarietas  
inter *Hippocratem* & *Argulæum*. 386  
Conformationi est ineptum semen aquosius &  
humidius, vt videtur est in calcis, qui coagu-  
lat non possunt, nisi fecerit seio. 388  
à Conformationis principio, à toto Fœtu exha-  
lat vapor, qui ludosi perfecti animalis pro-  
portionem respondet. *ib.*  
Conformatio partium opus est diuinum. 407.  
quomodo fiat. *ib.*  
*Barrogi* opinio de Circulatione sanguinis per  
Coi & pulmones examinatur. 566  
Cólueruq; etiam pati errorib. patrociniis. 686

- Consulio quæ fit in castratione ex amputatione Testis, quomodo fiat, & oriatur à spalmo cy-nico. 166
- Convulsiones rariò adfunt in hysteris affecti-bus. 184
- Convulsiones interdum patiuntur, qui pleuri-tide laborant. vel paralytici fiunt. 216
- Cordis dignitas atque præstancia. 202
- Cor nobilissima totius corporis pars. 232
- Cor Sulem hominis veteres vocantur. *ibid.*
- Cordis cum Sule comparatio. *ibid.*
- Cor diu vitæ non maceratur, neque vitæ sup-  
plicia trahit grauiora. *ibid.*
- in Corde partes omnes similes corporis repe-  
riuntur. *ibid.*
- Cor est fundamentum reliquarum partium cor-poris. *ibid.*
- Corde carens nullum vnquam animal vsum  
fuit. *ibid.*
- Cor vnde dictum? ao à currendo? *ibid.*
- Cordis substantia durissima & crassissima. *ibi-  
dem.*
- Cordis caro, quomodo differat à carne, siue sub-  
stantia musculorum. *ibid.*
- Cor, quomodo dici possit musculus, seu princi-  
pium motus naturalis. 233
- Cordis substantiam, quomodo adeps oblinat.  
*ibidem.*
- Cordi visceri calidissimo, quomodo adeps hæ-  
reat. *ibid.*
- de Cordis pinguedine, siue adipe multa. *ibid.*
- Cor situm in media Thoracis capacitate inflat  
Solis, qui Cor mundi dicitur. *ibidem.*
- Cor an sit in medio corpore positum? *ibid.*
- Cordis portio maior, cur io latus sinistrum re-  
cumbat? 234
- Cor in thorace locarum habent omnia animan-  
tia. ex *Aristotele*, præter asellum piscem.  
*ibidem.*
- Cordis magnitudo non omnibus eadem. *ibi-  
dem.*
- Cor pusillum, aut mediocriter datum est audaci-  
bus. *ibid.*
- Cor humo grandius oblinuit, proportionem cor-  
poris, reliquis animantibus. *ibid.*
- Cordis figura conoides, seu turbinata. *ibid.*
- Cor figuram pyramidalens quare obtinuit.  
*ibidem.*
- Cordis partes duæ, basis & mucro. 235
- Cordis ventriculi duo, & eorum differentie.  
*ibidem.* eorum numerus controuertitur. *ibi-  
dem.* tres sunt Cordis ventriculi in piscibus.  
236
- de Cordis ventriculis, quis calidissimus? *ibidem.*
- dextrum Cordis ventriculum calidiorem iudi-  
cauit *Aristoteles*, quia primus mouetur, & vi-  
tissimus moritur. *ibid.*
- Cor duplicatum, quomodo reperiatur. *ibid.*
- Cordis auriculæ, siue appendices, vel apophy-  
ses. *ibid.*
- Cordis auriculæ peculiarem motum habent à  
Cordis motu distinctum. 237
- Corde eorum qui veneno sublati sunt, siue mor-  
bo cardiaco perire, cur non possunt crema-  
ri? 237
- nisi Corde extracto Locus piscis non exardet co-  
quitur. *ibid.*
- Cor *Germanici*, quare comburi non potuit. *ib.*
- Cordis vasa quatuor, duæ venæ & duæ arteriæ.  
*ibidem.*
- an à Corde per pulmones sanguis traducatur.  
239
- trans Cordis septum sanguis traducitur, quam-  
uis hæc foraminula in mortuis non sint ad-  
eò manifesta & lata, vt in viuientibus. *ibi-  
dem.*
- de Cordis neruis magna inter *Galenum* & *Re-  
centiores* altercatio. *ibid.*
- Cordis ligamenta robustissima, quem vsum ha-  
beant. *ibid.*
- Cor quomodo dici possit radix & origo neruo-  
rum, ex sententia *Cremantini*. 240
- Cordis facultas pulsifica ipsi innata, ex paren-  
chymate procedit, non autem à neruis. *ib.*
- Cordis motus ex *Aristotele*, naturalis est, non a-  
nimalis, ac voluntarius. *ib.*
- Cordis motus non pendet ab affluxu sanguinis.  
*ib.*
- Cor palpitat statim atque formatum est. *ib.*
- Cor euulsu & reiectu à suis vasibus in animali  
viuente, aliquandiu palpitare deprehendi-  
tur, siue vilo appulsu sanguinis. *ib.*
- Cordis motus duplex, diastole & systole. *ib.*
- Cor, quia dilatur, impletur. 241
- in Corde quatuor sunt motus, tempore & loco  
distincti. *ib.*
- Cordis & auricularum motus sunt successini,  
cum summa celeritate. *ib.*
- Cor an primum generetur & perficiatur. 245
- Cor ab *Aristotele* vocatur *piscis emancipans*. *ib.*
- Cor est quasi totum animal. *ib.*
- Cor & secus eodem sermone momento generan-  
tur. 246
- Cor statim atque inchoatum est, micat. 247
- vasorum Cordis in Fœtu seu dicitur admirabilis,  
occasionem dedit inquirendi, quo fine *scds*  
fuerit. 249. hæc quæstio à viris doctis animo-  
sè disceptata fuit, *Simone Puerro*, *Andrea*  
*Laurentio*, *Bapista Larca*, *Nymmano* &  
*Vincenzo*. *ibidem.*
- Cordis actio ad vitam, æquæ est necessaria,  
atque Solis ad mundi conseruationem. 90
- in Corde natiuus calor velut in foco conserua-  
tur. *ib.*
- Cor in prima partium generatione statim palpi-  
tat. *ib.*
- Cor cum prius formatur moueri incipit.  
391
- Cordis motus, & arteriarum matris est im-  
pugnatus color ipsius Fœtus. *ib.*
- Cor in Fœtu non enari probatur singulari ex-  
perimento allato, à *Galeno*. *ib.*
- vasorum Cordis vius aboletur Fœtu in lucem  
edito. 392
- Cor non tantum in perfectis, sed etiam in Fœ-  
tibus suppedinat arteriis vim qua mouetur.  
391
- Cor mouetur absque respiratione in Fœtu. 297
- Cor mouetur sine pulmone in Fœtu, sed pulmo  
non potest moueri absque Corde, etc. 397
- de Cordis motu egregie multæ obstruuntur.  
415
- Cor resedup & tabulæ impositum palpitat ad-  
huc cum auriculis, quæ postremæ pulsant,  
ita ut motus Cordis in eis languescat, & emo-  
riatur. *ibidem.*

au Cor & arteriae diversis temporibus mouentur. 416  
 de Cordis officulo multa præclara. 421. eius meminit *Aristoteles*. *ibidem*. in bouine est Aorta ralis indurata. *ib.*  
 Cor à primo vitæ ortu visque ad vltimum vitæ spiritum indefinenter agitatæ duplici motu alterno, cui gemina quies est interiecta quorum vnus dicitur diastole, alter systole, quibus interiecta quies vocatur peristystole. 554  
 Cor materiam sanguineam non aliunde reponit, quàm à vena Cava. 555  
 Cordis motus proprii sunt systole & diastole. 553  
 Cor palpiat statum, atque eius rudimentum exstat. *ibid.*  
 Cordis motus non pendet ab impulsu sanguinis, quamuis sit necessarius ad motus perennitatem. *ibid.*  
 Cor prius debet excipere, quàm expellere. *ibidem*.  
 in Cordis motuambo ventriculi æqualiter, & eodem tempore mouentur. 560  
 Cordis & pulmonum motus sunt contrarij. 561  
 Cor non possit suum motum continuare, neque artiusculum sanguinem fabricare, sine impulsu sanguinis venosi. 577  
 Cordis robur consistit in eius temperie, & substantiæ integritate. 596  
 Cordis partes organice recensentur. 583  
 Cor à quibusdam ladi possit in parte sui exterioriore. *ibid.*  
 an sanguis intra maiores canales assidue per Cor æquolentur possit putrefcere, an aliunde accedat putredo? 598  
 Cor est fides caloris, tam naturalis, quàm ignei, id est, febrilis. 612  
 Cor tardè perficitur propter opotosam eius fabricam. 617  
 Cordis & arteriarum pulsatio tactu & oculis deprehenditur, sed causa nobis est valde obscura, suli *Des* cognita. 618  
 Cor diuiazat sanguine indiget ad sui motus continuationem & elaborationem sanguinis arteriosi, quem vnioerlum corpus transmittit. 620  
 Cor pelli tectilo ab incubatu die palpiat, non dum exeaturo. 671  
 Cor & arteria eodem instanti simul & semel non mouentur. 676  
 Cor aliquando fecit latus de atrum pectoris, & suum mutat: hoc apparuit in *Maria Medica, Insensu XIII. Christianissimi Francorum Regis Marci*. 703  
 Cor qualitate tantum aeris frigidi recreatur 754  
 Cordis & arteriarum motus repetendus non à sanguine. sed ab infra facultate, siue pendet ab anima, siue à calido innato. 794  
*Cornelius ab Hagelanda* de sanguinis circulatione traçauit. 554  
*Cornelius ab Hagelanda* opinio de Circulatione sanguinis examinatur. 658  
 Corporis humani cognoscendi maxima difficultas vnde. 2

Corporis humani commendatio. *ibid.*  
 Corpus est telluris inuile pondus. *ibid.*  
 Corpus est animi domicilium. *ibid.*  
 Corpus humanum ex fortuito atomorum concurſu non constat. 4  
 Corporis humani materia quæ. *ibid.*  
 Corpus hominis præstantissimum ea formato- re & materia. *ibid.*  
 in Corpore humano circularis figura omnium præstantissima deprehenditur. 4  
 Corporis humani venustas, & conueniens longitudo. *ib.*  
 Corpus humanum non est carcer & supplicium animæ. *ib.*  
 Corpus est enclaudum propter animam. 5  
 Corpus humanum carido est salus. *ib.*  
 Corporis humani dignitas ea incarnatione *Crispi* desumenda. 6  
 Corpus humanum, vnde mundo comparatum. 7  
 Corpus humanum non est tumultuarium & incogitatum Naturæ opus. *ibid.*  
 Corpus humanum quo modo diffuset à corpora reliquorum animalium. 8  
 Corporis humani partes internæ à brutorum partibus internis dissimilimur. 9  
 Corporis humani triplex constitutio, secundum *Aristotelem*, ex elementorum virtutibus, ex similibus partibus, & ex dissimilibus. 68  
 Corporis humani diuisiones multæ reconduntur ex variis Authoribus. 73  
 Corporis diuisio secundum astutorum naturam. 74  
 Corporis centrum an sit vmbilicus. 94. eiusdemodi centrum duplex est. *ibid.*  
 Corporis nostri æconomis perinde se habet, ex *Aristotele*, atque ciuias bonis legibus instituta, in qua postquam semel ordo constituitur, non opus est secundo ducere. 102  
 Corpus humanum est instar Palatii regij, in quo distinctis locis culina officia & ministreria separentur à domicilio Regis. 102  
 Corporis nostri rex est vnicus Cor, in pectoris solio sedens. *ib.*  
 Corpus etiam propter pulmonem. *ibid.*  
 Corpus humanum esse instrumentum musicum probatur ex variis Authoribus. *ibid.*  
 Corpus humanum, quare dicitur *Psalterium detachardum à Davide*. 203  
 Corpus nostrum nil est aliud, quàm harmonicum instrumentum omnibus uicibus abolutissimum. 268  
 Corpus humanum, tam in æternis, quàm in terrenis partibus geminatum. 340  
 Corporis nostri conformatio maxime totius & exercuit doctorum ingenia. 380. eam multo facilius est verbus explicare, quàm reipsa construere. *ib.*  
 Corporis humani partes, an simul procreentur, an successiue, ordine quodam necessitatis & dignitatis seruato, & in eo ordine quænam pars prima producat. 384  
 in Corpore bene habito, & sanguineo, 24. libris sanguinis reperiuntur, ex *Ancrona*. 617  
 Corporis diuisio à *Diele* proposita therapeuticæ est, non Anatomica. 632



*Cofiz* vnde sic dicta. 499. eorum numerus est incertus. *ibidem*. eorum substantia & figura, quæ. *ibid.*  
*Cotyledones* non sunt carnes vitæ venarum & arteriarum in vterum definitum. 181  
*Cotyledones* in humano vtero an reperiantur. 167  
*Cotyledones* exponit *Galenus*, ota vasorum, quæ in vterum definiunt. 368  
 nullæ sunt in humano vtero, ex *Fallopio*. *ibidem*.  
*Copulationem de la Adere*, quid vocent obftrictices. 774  
*Coza* vnde dicta. 53  
*Cranium* quid est. 460. Cur cotuodum. *ibidem*.  
*Cranij* ossa enumerantur. 467  
 eorum ungulorum consideratio & diuisio. 468. male diuiduntur in propria & communia. *ibidem*.  
*Cranij* carinae tres, nempe fossæ, foramina & sinus. *ibid.*  
 Cremandi corpora consuetudo statim post obitum, quibus temporibus inducta fuit apud *Agyptios*. 414  
*Cremans Anatomia* *Petripatetica* desideratur. 34  
*Cremennus*, præstantissimus Philosophus, sanguinis translationem per Cor est subodoratus. 315  
*Cremennus*, Philosophus *Petripateticus*, circulationis sanguinis gustum oboia dedit. 613  
 Crina, *Medici* *Massiliensis* liberalitas, in exstinguendis patris mutis. 66  
*Crythallinus* humor. gemma Oculi. 278  
*Crythallini* pelluciditas & præstantia. *ibid.*  
*Crythallini* substantia & figura. *ibidem*.  
*Crythallinus* medium oculi non occupat, sed extra centum locatus, pupillæ vicinus est, ut clarior & vbius fiat visio. 279  
 Cubitus duobus constat ossibus, quæ ut variæ connectuntur articulationibus, ita diuersos reguere moria. 317  
 Cubitus vnde dictus. 306  
 in Cubito multa notanda veniunt. 307  
 Cubiti cum radio connectio. *ibid.*  
 in Cubiti histuria vindicatur *Galenus* aduersus *Columbum* et *Vesalium*. 308  
 Cuticula quid. 77. an habeat aliquem sensum. *ibidem*. eius affectus. *ibidem*. quomodo generatur. *ibidem*. & quando 78. sine Cuticula qui nascuntur, infeliciter viuunt. *ibidem*.  
 ad Cuticulæ generationem tres causæ concurrunt. *ibid.*  
 Cutis quid est. 79. vnde dicta. *ibid.* à sensu originem suam trahit. *ibid.* quare porosa & foraminolenta. 80  
 Cutem raram habentes, & frequentibus poris peruiam, ab internis minus læduntur. *ibidem*.  
 Cutis raritas ventris consumptionem inducit. *ibidem*.  
 Cutis actio est tactus. *ibid.* eius usus ad agendum. *ibid.*  
 Cutem inter animalia tenuissimam habet homo. *ibid.*

ratione Cutis tenuioris & imbecillioris, *ibid.*  
 lusus homo vitiligine tentatur. *ibid.*  
*Cybele* sacrificuli, quare omnes olim erant castrati. 166  
*Cynicus* spasmus, quid est, & quomodo fiat. 311  
*Cytotomia*, quæ administratur ad eruendum calculum grandiorum, quomodo eos plerumque reddat ad venerem inuálidos aut infæcundos, qui secti fuerint. 165

## D.

*Dæmon* & homo differunt genere physico. 835  
*Dæmones* posse generare fabulosum videtur. *ibidem*.  
 Deglutitio nulla fit, si lex datur imaginatio. 199.  
 an sit actio mixta ex naturali & animali. *ibid.*  
*Democritus* petitus fuisse videtur *Anatomicus*. 17  
*Democritus* epistolæ ad *Hippocratem* supposititæ. 18  
*Democritus* animalia dissectabat, ut bilis naturam atque sedem inueniret. 43  
*Democritus* de relegendis vngulium scripsit. *ibidem*.  
*Democritus* hominem appellauit *Microscopum*. 344  
*Democritus* fuit petitus *Anatomicus*. *ibid.*  
*Democritus* scripserat de natura hominis, siue de carnalibus duos, &c. *ibidem*.  
*Democritus* Fertum suis aquis innatantem nauem comparabat, quem vmbilicus velut anchora nauem, sistit. 388  
*Democritus* in secundis hominibus occupatus, infans fuit iudicatus ab *Adriano*. 33  
*Democritus* solus inter *Athenienses* sapere iudicatus ab *Hippocrate*. *ibid.*  
*Democritus* inter *Anatomicos* centenarius decessit. 56  
 ex *Democriti* doctrina, *Epiploon* dominus ventris dicitur, apud *Hippocratem* in *Epistola*. 98  
 Dentes an ossibus annumerari debeant. 479  
 Dentium triplex est generatio, ex *Hippocrate*. *ibidem*.  
 Dentes continuè crescunt vsque ad extremam vitæ periodum. *ibidem*.  
 Dentes etiam mortuis crescunt. *ibid.*  
 Dentes medullâ carent, & solo sanguine nutiuntur. *ibid.*  
 Dentes soli aciem ferri respondent, nec sculpi possunt. 480  
 Dentes ignibus inuicti sunt. nec cremantur cum reliquo corpore, quinetiam incorrupti perennat. ut sint semina fructificandi corporis in retranslatione. *ibidem*.  
 Dentes, iam exquisitum sensum habent, ut etiam cum lingua de saporibus iudicent. *ibidem*.  
 Dentes phlegmone laborant, non aliter quàm carnosæ partes. *ibid.*  
 eos qui Dentes ab ossibus separant, *Galenus* vocat *sophistas*. *ibid.*

Dentes soli inter ossa exquisitè sentiunt.

*ibidem.*

Dentes vnde dicti.

*ib.*

Dentes ossa sunt in sua specie, ex *Scalgero*.

*ibidem.*

Dantari quidam in locum prodierunt, quod o-

*ibi lem.*

Dentes sunt Ossa sui generis omnium durissima,

*ibidem.*

vocis formandæ cibique comminandi in-

*ibidem.*

strumenta.

*ibidem.*

Dentes duobus constant partibus.

*ibidem.*

Dentes quomodo sint inhi.

*ibidem.*

Dentes si in palato prodant, contra nasorum

*ibidem.*

est.

Dentium naturalis compositio in ambabus ma-

*ibidem.*

nifesta admirabilis est.

*ibidem.*

Dentes, si in duos ordines distribuuntur, con-

*ibidem.*

trastantur.

Dentes in pterygoidibus continentur, sine viliis spa-

*ibidem.*

tiis, quibus os erat continuum pro dente.

*ibidem.*

482. exempla multa afferuntur.

*ibidem.*

Dentium numerus est varius pro ratione xia-

*ibidem.*

tum.

Dentes qui plures habent, ij sunt vitæ longio-

*ibidem.*

res.

Dentium diuisio in tres ordines.

*ibidem.*

Dentes canini, vnde sic dicti.

*ibidem.*

Dentes molares describuntur.

*ibidem.*

Deotium magnitudinem metiuntur Anatom-

*ibidem.*

ici, radicem omento.

Dentium radices simplices sunt, duplices vel tri-

*ibidem.*

plexes.

Deores ex quæsitissimo sensu sunt præditi, & do-

*ibidem.*

lore veritatis acerbissimos et cruciatu adferunt.

Dentis extractio seorsimim annumeratur tor-

*ibidem.*

mentosa.

Dentibus nihil magis necessarium habent homi-

*ibidem.*

nines.

Dentes detractione quidam mortui sunt.

*ibidem.*

Dens si fuerit corrosus, & mouetur, eximatur,

*ibidem.*

&c.

Dentibus hominum quoddam virus inest.

*ibidem.*

ex motu iati hominis, sine viri, siue

*ibidem.*

multis, non semel vidit abortiam gangre-

*ibidem.*

nam *Rulandus*.

*ibidem.*

Dentes oclariæ, quare sic dicuntur.

*ibidem.*

& 738

*ibidem.*

Dentium incisorum & caninorum radices sepe

*ibidem.*

reperiuntur iocuræ.

*ibidem.*

738

*ibidem.*

Dentium artificem esse sapientissimum colligere

*ibidem.*

licet ex imagine ipsius nobis insculpta.

*ibidem.*

5

*ibidem.*

Dentis sub humana imagine orbem tegrarum per-

*ibidem.*

ambulas, secundum quosdam veteres.

*ibidem.*

6

*ibidem.*

Dentis, quare suam imaginem in hominem trans-

*ibidem.*

fudit.

*ibidem.*

6

*ibidem.*

Dentis est homo immortalis.

*ibidem.*

11

*ibidem.*

Dentis ab initio mundi masculinum & feminam

*ibidem.*

formauit, quos stabili nubio coiuuictos,

*ibidem.*

ad speciei propagationem conspuare voluit.

*ibidem.*

138

*ibidem.*

Dentis soli competit trium dierum sepultura, &

*ibidem.*

resurrectio.

*ibidem.*

400

*ibidem.*

Dentis manifesta suæ Sapientie & Providentie,

in ovis signa exculpit, quare.

418

Dentis quamvis finxit ac destinaverit hominem

ad virtutem, ei tamen liberum indulsit ar-

bitrium, ut quam vellet, sequeretur viam,

aut virtutis, aut vitii.

578

Dentis, Nasorum & Alarum semper agunt aliquo

sine, finisque tegit eorum actiones.

332

Dentis solus novus tres motus contrarij eodem

tempore, vel successivè fiunt.

112

Dentis sunt robustiora sinistris

271

Dextrum natura melius est sinistro, præsertim

in humine

*ibidem.*

Dentis sedem melancholicæ hypocholeæ

in pyloro collocabat, qui continenter arde-

ret

118

Diaphragmatis nomina varia.

210

quid est & quidnam deest.

*ibidem.*

Diaphragmatis actio & usus.

211

Diaphragmatis duæ partes præcipue.

*ibidem.*

eius vesse, atque & nervi.

*ibidem.*

Diaphragmatis dignitas, & vis in faciendis

morbis.

*ibidem.*

Diaphragmatis vulnera, quomodo sunt lethali-

lia

*ibidem.*

Diaphragmati veteres referenda mentis sub-

tilitatem, & ideo præcipuum hilaritatis sed-

em constituebant.

212

Diaphragmatis in usu, actione sua & situ, con-

sideratio, propter viciniam viscerum, magni

est in Medicina momenti.

*ibidem.*

Dem.

Diaphragma an sit musculus? cur sit circula-

ris? vnde motum habeat?

*ibidem.*

Dem.

Diaphragma an sit musculus unus & simplex,

an duplex?

*ibidem.*

Dem.

quod Diaphragma non sit musculus duplex.

213

Diaphragmatis motus qualis sit.

214

Diaphragmatis motus irrequietus vnde proce-

dat? 215. an à Corde? an à pulmonibus?

*ibidem.*

Diaphragmatis motus casu certa non potest as-

signari.

303

Diaphragma est liberæ respirationis instrumen-

rum vniem.

312

Diaphragma musculus est admirabilis, tam in

sua compositione, quam actione, partes na-

turalis à vitibus separans.

*ibidem.*

quaro

dicuntur septum transversum.

313.

vbinaam

habeat caput & finem.

*ibidem.*

in Diaphragmatis inflammatione, videntur

suboritur phrenitis?

675

Diaphragmatis vius multiplex recensetur, con-

tra *Bambinum*.

701

Diaphragma non est duplex musculus.

712

Diaphragma potest lacerari ex arbitrio nostro, &

sine huiusmodi læsione, vita ex nostro arbi-

trio deponet, quod tamen Religio Chri-

stiana, & leges Politicæ verant.

777

Diaphragma coarctatum est, quia suspenditur,

& velut serrabitur à mediastino.

774

- Diaphragmati accepta referenda est respiratio. 846
- Diaphragma oritur à lambis per suas apophyses. 847
- Diaphragmaris venter & finis ubi sunt. *ibidem*
- Diaphragma conditum est ad respirationem, quæ facta fuit propter refrigerationem sanguinis assidue in Corde ebullientis. 847
- Diaphragma duos habet motus actiuos. 848
- Diaphragma est musculus in sua specie particularis, in sua structura & actione admirabilis, quia non amulatur formam aliorum musculorum, neque sequitur aliorum actionem. 848
- Diaphragma duabus constat partibus præcipuis. *ibidem*
- an sit simplex musculus. *ibidem*
- Diaphragmaris actio est admirabilis. *ibidem* eius finis & figura. *ibidem*
- eius motus à Corde manat. *ibidem*
- Diaphragma est stibellum ventris. 852
- Diaphragmæ appellatur osium compositio propter motum voluntatiæ comparatam. 458
- eius species enumerantur tres ex Galeno. 458
- tribus illis differentiis quartam addit Fallopius, quam trochoidem nuncupat. 454. ab alius articulationibus plane diuersa est. *ibidem*
- Digitorum pedis musculi describuntur. 354
- Dignorum crymoo & numerus. 311
- Digitorum musculi recensentur. 319
- Dilatatio partium genitalium opus est Nature, non Fortis. *ibidem*
- Diligens in adulterio deprehensus, quid responderit interrogatus, quid agerit. 177
- Dinumum illud dicitur Medicis, cuius causa ignoratur. 835
- Doctores Anatomici conditiones recensentur. 58 & 59
- Doctrina illa est optima, quæ vna voce traditur. 418
- Dolores externi abdominis, diuturni si fuerint & acerbissimi, quare diligenter à Medicis sunt obseruandi. 76
- Domni scientia est per quam vititur seruis. 56
- Dnumus est, non in possidendo seruos, sed in vitando seruos. *ibidem*
- Dorsi & lumborum musculi, quibus spina movetur. 313
- Dorsum, quare sic dictum. 493
- Duodecim habet vertebra. *ibidem*
- Dumet Medici Parisiensis extrinsecus opinio, de modo quo medicinam fecisse videtur Hippocrati. 589
- Durum dicitur quod concretum est. 441
- Dysenteriz curatz, eros & consumptis intestinorum fibris, vnde succedat alui fluxus inuoluntarius. 101
- Ecceardi Leuchneri opinio de calculis sanguinis expenditur. 508
- Effluuium aquæ & sanguinis ex aperto latere nostri Saluatoris in Cruce pendens, naturale non fuit, sed miraculosum, ex omnium Theologorum confessione, & Medicorum etiam Lutheranorum, ut videre est in orationibus Philippi Melancthonis. 677
- Erysipelatosis causa non est aliunde reperenda, quàm ex flauibus intra Omentum conclusis. 93
- Engastrimythi dicuntur, ex Galeno, qui clauso ore loquuntur ex ventre, ac si loquerentur ex ore. *ibidem*. talem nebalonem vidit Iunonius. *ibidem*
- Elenfina (seris) impostores sacrificuli, simulacrum virilis membri tot integumentis tamdiu coopertum, tandem reuelatum ostendebant. 157
- Embryo. vide dictionem Fetus.
- Empiricorum Anatome erat fortuita. 56.
- proximum est nuptamentum, ex Galeno. *ibidem*
- Entia non sunt multiplicanda sine necessitate. 330
- Epaminondas munus fili demandatum, quod erat sordidum, ac ignobile, reddidit splendidum & ambrosiosum. 423
- Epiglottis in homine oculos habet musculos erigentes & deprimentes, vt io bruis animalibus, quæ pronaterram spectant. 313
- Epiglottidis motus est naturalis. *ibidem*
- Epiglottidis definitio & vsus. 291
- Epiploon vnde dicatur. 91. quare dicitur Omentum. *ibidem*. eius substantia & figura. *ibidem*
- Epiploon maximum simæ & homini concessum ex Galeno, *ibidem*. vnde illa duo animalia Epiplocece rentantur. *ibidem*
- Epiploon iofra vmbilicum naturaliter non descendit. 96
- Epiplocece sinistra frequentior quàm dextra. *ibidem*
- Epiploon in homine, toti Colo intestino adnexum. *ibidem*. ab Hippocrate, Dominus ventris dicitur. *ibidem*. qua ratione sic nominatur. *ibidem*
- Epiploon singulis primæ regionis partibus adhaerescit. 96. est propagatio mesenterij. *ibidem*
- Epiploï diuisio in quatuor partes, ad curandam morborum necessaria & accommodata. *ibidem*
- quare infra Colon intestinum factum est pendulum. 97
- Epiploon semilibre pondus vix excedit. 98
- flatus in Epiploo conclusi faciunt strepitum ventris dignum. *ibidem*
- Epiploon adiposum, quasi ventriculo adnexum. *ibidem*
- ventriculi elefasciendi causa constructum. *ibidem*
- Epiploï magna portio potest abscindi sine vilo depericulo coctionis incommodo. 99. figura eius varia. *ibidem*

## E.

Ecceardi Leuchnerus, Professor Academicæ Herfordens, contra Harneum scriptor de circulatione sanguinis. 554

Epiploon describitur ab *Aristotele*. Ibidem. of-  
ferebatur cum renibus in sacrificiis. *ibidem*.

aruphiles ab eo signa petebant suæ vaticina-  
tionis. *ibid.*

Epiphylus quid est, ex *Hippocrate* et *Galeno*.

447

Epiphyseon visus multiplex.

*ibid.*

Epiphyles habent etiam minora ossa.

448

Epiphysen visus primarius est ad generatio-  
nem ligamentorum, quibus musculorum on-  
go firmetur.

449

Epilepsia in Fœtu intra locos muliebres adhuc  
latente procreari potest.

387

Epileptice & hysterice mulieres ad funus elata  
sepe reuixerunt.

398

Epileptice & hysterice mulieres, quæ spiratio-  
ne, sensu morque organa reuixisse dicun-  
tur, ultra duodecim horas vitam non produ-  
xerunt.

400

Epididymus est principium vasæ eiacularis,  
quod ab ea producit.

163

Epididymus quid significet.

*ibid.*

Epididymus longè distat à prostaticis & parasti-  
dis.

*ibid.*

Epiglottis in homine solo caret musculis.

728

In Epiphora sunt humores in fauces euocandi.

475

*Erasistratus* Medicus, ex *Aristotele* filia oriun-  
das, qui florebat ævo *Theophrasti*, cuius fue-  
rat discipulus. Cuius qui Anatomiam collapsam  
ac penè sepultam erexit, ac instaurauit, aui  
fuit *Aristoteles* opinionem sequutus. Lienem  
per accidens tantum necessarium esse susti-  
nuit.

133

*Erasistratus* quid diuersum senserint à sensen-  
tia *Præceptoris* de actione Lienis.

*ibid.*

*Erasistratus* quem Lienis vsum tribuit, emulgen-  
di potum superfluum ex ipso ventriculo, ab  
*Hippocrate* mutatus est.

*ibid.*

*Erasistratus* *Hippocrati* scripta quanti faceret.

*ibidem*.

*Erasistratus* opinio de vfu Lienis resutatur.

134

*Erasistratus* in hœdis laudentibus, vidit artetias  
in ventris laque referas.

416

Ergasia Anatomica ex quibus consistit.

62

Errantem qui laudat, erentem confirmat, & qui  
adulatur, ad erentem allicit.

623

Error levis in principio, maximus euadit in fi-  
ne.

637

Est magnum etimen petrumpe virginis Hy-  
men.

697

Ethmoidis nŕis partes multæ substantiâ dissimi-  
les.

471

eius vŕus varu recensentur.

*ibidem*.

Ethmoides os *Galeno* cognitum fuit.

312

*Eunuchs* seminale humorem emittunt, sero-  
rum & infæcundum.

164

*Eunuchs* sunt mulierum amatotes maximæ.

*ibidem*.

*Eunuchs*, & qui venetem non exercent, calui-  
tio rari laborant.

255

*Eunuchs* olim à sacris arcebat, tanquam ho-  
mo imperfectus.

156

*Eulachy* picture Anatomice & figure de re-  
num structura, laudem metentur, tanquam  
veræ & legitime.

53

Experientia plus debet tribuere Medicis, quàm  
rationibus.

405

Excrementa sunt æquè cetera signa coctionis,  
quàm cineres exustumis.

387

Excrementa secundæ coctionis in Fœtu.

*ibidem*.

Excrementa tertie coctionis in Fœtu sunt sudor  
& sordes.

388

Extorui seu viscerum caput, Hepar reputatur.

221

Extæ vnde dicantur.

*ib.*

Extispicum sine contemplatio viscerum, ab He-  
pate, mero aruspicum, est auspicandum.

*ibid.*

Extæ vitalia, quor sunt.

*ib.*

F.

*Fabius ab Aquapendente* magnus, fuit An-  
atomicus.

31

Fabula ex *Platone* desumpta, qua homo dicitur  
diuinum quoddam miraculum.

419

in Facie totus homo tanquam in parua tabella  
continetur.

246, 265, 266

ex Facietota dependet Physiognomoniam.

*ibidem*.

Facies vni homini concessa, reliquis animanti-  
bus ns, vel tristem.

265

Facies, quasi factura corporis, & à faciendo di-  
cta.

*ibid.*

Facies ob artificij elegantiam & pulchritudinem  
admirabilemque cum animo consensum, ce-  
liqua membra dignitate ac pulchritudine  
longè superat.

*ib.*

Facies commendatæ & elogia.

*ibid.*

Facierum in hominum genere diuersitas, ma-  
gnum est in terris miraculum.

*ibid.*

in Facie nerui apparentes, alios neruos intus de-  
litescentes significant.

*ibid.*

Facies totius Physiognomonie pars est præstan-  
tissima.

*ib.*

Facies laudabilis vestigium boni Cordis.

*ibidem*.

Facie qui fuerit deformiore ex pluribus accu-  
satis, primus quæstioni subici debet.

*ibidem*.

Facies non solum motes animi, sed & metatem,  
& sexus discrimen constituit.

*ibid.*

ex Facie maiestas & veneratio hominis depen-  
det.

267

Facies cetera vitæ & temperamenti suppediat  
indicia, ex colore apparente.

*ibid.*

Facies pulmonis zŕsum declarat.

*ib.*

ex Facie *Galeni* iudicabat Hepaticos.

*ibidem*.

Facies in zgrois exploranda, sitne sanorum  
similis, an dissimilis, ac multum immutata.

267

Faciem cadauerosam describit *Hippocrates*, ex  
quam mortem præagite licet.

*ib.*

Facies duplici modo consideratur.

*ibid.*

Facies hominis est id quod inter Caput & col-  
lum continetur.

*ibidem*.

Facies in tres partes diuisio, id est, in frontem  
& vtramque maxillam.

*ibid.*

Facies diuisio in partes continentes & conten-  
tas.

267

Faciei venæ, arteriæ & netoi.

*ibid.*

Facultatum omnium integritas vitam constituit, quæ simul atque conformatum est corpus, 390  
 Facultates animæ matris & Fœtus esse diuersas probatur 40  
 Facultas animalis est actio Cerebri ad voluntarias functiones edendas, estque duplex, princeps & ministræ. 400  
 virtusque diuisio. 404  
 Facultates animales principes in Fœtu oriuntur, cum nulla imaginationis, nulla cogitationis & memorie sit necessitas. 404  
 Fallopius Proficissor Parauinus, astem Anatomiam plurimum illustrauit, nouisque inueniæ locupletauit supra Syllabum & Vesaliũ. 30  
 Fallopius, Anatomicorum Coryphæus & Musagetes merito vocatus, Herophilæ assimilandus laudatur, & ab Hofmanno repichensione vindicatur. 804  
 Fama quid est, & vnde dicta. 666  
 Febres singulorũ & conuulsivæ, quæ succedunt in fractura calcais, ex Hippocrate, non sunt per epigenesim, sed per sympathiam neruuli generis. 657  
 Femina necessaria sinit, quæ locum & materiam generandi præberet. 151  
 Femina contra nebosè vocatur Aristoteles, maiorem imperfectum, monstra & præuocationes Naturæ mares cogitantis. 404  
 Femineitas ipsa est quædam perfectio speciei. 104  
 Femina. quomodo differat à mare, ex Aristotele. 104  
 Femina est, quod in seipso genetate potest. 404  
 Femina, an olim fuerint in mares mutare. 404  
 Femina quæ in mares impossibilis est mutatio. 151  
 Feminae nudæ ad pubem vsque inspielebantur à Medicis & obsecratis priusquam nuptiæ contraherentur. 167  
 Femina vnde dicta? an à fenore? an à Fœtu? 172  
 Femina, quare pluribus abundat eacrementis. 175  
 Feminae non omnes habent semen, ea sententia Caspari Heisteriano. 182  
 Femina frigida & imbecillum animal, multis abundat eacrementis. 199  
 Femoris musculi deferuntur. 330  
 Femoris defectu pro. 514  
 Femur non tantum ambulationis, verum etiam stationis & rectitudinis causa est. 515  
 in Femore quædam obseruanda. 516  
 Ferrum pietas, quæ nunquam nisi in dispar genus læuunt, maior quam in hominibus. 41  
 Ferrius neminem admittit ad lectionem suæ Pathologiæ, nisi fuerit rei Anatomice gnarus ac peritissimus. 16  
 Ferrius Paulus docuit Anatomia. 30  
 Ferrius suam Medicinam exordiu ab Anatomia. 39  
 Ferrius Anatomem primus Parisi illustrauit. 54  
 Ferrius vniuersum corpus elegantissimè diui-

sit in regiones publicas & priuatas. 73  
 Ferrius proderet notauit nulquam in parte inferiore perforatum esse peritonæum. 91  
 à Ferrius defecti dolores colicivbiuam procreantur. 92  
 Ferrius in mesenterio & panerete diuturnorum, & conuulsium morbotum fundamentum, fomentum ac seminarium constituit. 109  
 Ferrius observatio insignis de sollicito scelle vacuo post mortem reperto, in quibusdam, sine vlla alia mortis causa. 125  
 Ferrius malè dictum parat splem à supplendo. 129  
 Ferrius sententia de Lienis vsu. 137  
 Ferrius credidit ex renu imbecillitate serm non amplius trahentium, leucophlegmatiam generari. 144  
 Ferrius existimauit vesicam non inflammari, sed tantum ceruicis vesicæ musculum, siue ipsam ceruicem quæ carnosæ est, musculi sphincteris circumiecta. 150  
 Ferrius seminale materiam Testis substantiam non ingredi affirmat. 162  
 Ferrius primus ea Reentriuribus obseruauit meatum, siue canaliculum, per quem in grauidis semen eaceni probabile est. 178  
 Ferrius per corpus veri, quid intelligat. 180  
 Ferrius putat vterum vsque ad ventriculum sursum efferri. 184  
 Ferrius quid senserit de situ venæ azygæ. 210  
 Ferrius ante Vesaliũ designauit anastomoses thoracæ venæ cuiusque lateris, cum ramulis azygæ conflatis. 221  
 Ferrius notauit in pulmonum affectibus, finistram potius bichuam, quam dextram esse appetendum, quare. 238  
 ex Ferrius opinione inter cutem capillariam, & pericranium magna portio fluxionum generatur. 404  
 Ferrius magna vasa in externa parte capitis collocaat, in quibus serolum humorem, materiam arthritidis cumulari & coagari arbitrat. 253  
 Ferrius negat in vlla hypochondriorum inflammatione, sanguinis fluxorem per naves prodesse, nec in vasis & sebribus continentibus, per quos humores in maioribus venis putrescenti conferte, nisi forte immoderatior succedat euacuatio, quam summa viri dissolutio semper vitanda consequitur. 255, contraarium probatur ea Hippocrate & Galeno. 404  
 Ferrius non satis probabile dogma reputat, Cerebrum esse principium omnium penè fluxionum. 256  
 Ferrius in pleau mirabili generari & formati apoplexiam illarum ventricula sustinet, & probat ex propria inspectione. 261, quod probatur à Rudino. 404  
 Ferrius fibras venarum in missione sanguinis spectandas esse monet. 343  
 Ferrius admirabile scribit, pilos, cum ad iustam magnitudinem perueniunt, non ultra promitti trahique posse, tametsi materia ad radicem suppetat, vnumque ea hisse, in quibus non aliud quam miranticeat Dei & Naturæ providentiam. 356

*Fernelius* vult sanguinem materiam ab Hepate Factus purgari. 387  
*Fernelius* vult sudorem ē prae cordis humidis & calentibus in habitibus corporis effundi. 388  
*Fernelius* Cordi motum tribuit in lœtu, adhuc in vtero concluso. 397  
*Fernelius* motionis tempora incerta esse pronuntiat in Fœtu, siue mas fuerit, siue femina. 400.  
*Fernely* opinio de situ Fœtus in vtero. 401  
*Fernely* sententia relictur de diuerso marium & feminarum situ in vtero. 402  
*Fernelius* inter casus difficilis partus, recenset Oblium pubis firmiorem compactionem. 404  
*Fernelius* in opinionibus suis interdum inconflans fuit. ib.  
*Fernelius* obseruauit in Fœtu quadagesimali, caput par auellanz, maius quàm pro reliquit corporis ratione, quod non credit *Ryslaanus*. 407  
*Fernelius* à spina suam Osteologiam exorditur. 460  
*Fernelius* Ethmoidis ossis portionem maxillæ superne attribuit. 472  
*Fernelius*, & alij Anatomici triginta vertebrae constitunt. 488  
*Fernelius* in secunda corporis regione contionuarum febrium sedem assignat. 384  
*Fernelius* tradit *isacianum* ad meditationem potius, quàm ad mendendi rationem vitam omnem contulisse. 387  
*Fernely* sententia de modo tollendæ plenitudinis vasorum per vnam sectionem, quæcumque illa fuerit, siue pura, siue impura. 389  
*Fernelius* putauit pulmonem facilius depleri, si secretu vena biachij sinistra. 398  
*Fernely* rationem non probat *Ryslaanus*. 399  
*Fernelius* scripturam multa perfectius facere, quàm ipsa natura. ex *Aristotele*. 600  
*Fernelius* Scholæ veteratur omnes, & agnoscunt à *Galenis* secundum. 789  
*Fernelius* valde iuuenis scripsit de *Mathematicis* disciplinis. ibid.  
*Fernelius* Lucetæ Philosophiam docuit in Collegio sancti *Barbara*. ibid.  
*Fernelius* fuit elegantissimæ Latinitatis. 789  
*Fernelius* multa inuenit in Anatome. 883  
Fibrarum relictio, an sit seruanda in venarum sectione? 342  
Fibræ quid sint? ibid.  
Fibrarum triplex differentia ex situ constituitur. ibid.  
Fibrarum actio est ipsarum in sese contractio, ad attrahendum, retinendum & expellendum. ibid.  
Fibræ potius habent vsum quàm actionem. ibid.  
Fibræ an reperiantur in venis? ibid.  
Fibræ in reclinandam in venis non aspernatur *Risfordus*, Medicus Parisiensis. 343  
Fibrarum reclinandam repudiat *Scaliger*. ibid.  
illam reclinandam adeo commendat ab *Hippocrate*, de situ partium intelligere oportet. 344  
Fibrarum vltus etiam à *Galenis* assignatur expellitur 118. eadem actio & differentia. ib.

Fibras parum curauit *Galenus* ad edendas actiones. ibid.  
per vnicam Fibrarum actionem, Naturam omnes suas actiones petiscere *Carpus* obseruauit. ibid.  
Fibrarum relictio in sanguinis missione iam dudum capiosa est. 399  
Fibrarum vltus duplex, motus, & carnis cultio. 639  
*Fernely* contendit tertio à conceptionis die animam rationalem infundi ratione motus Cordis. 338  
Figura est situs partis in motu. 302  
Figuras musculorum dolorificas, & eas quæ dolore careant, Medium scite expedit. 304  
Figuræ musculorum mediae sunt, aut extremæ. ibid.  
Filiis est perfectio rei, idemq. est finitum, quod perfectum, idem perfectum, quod totum: totum verò cui pars nulla deest. 332  
Fissile illud est ea *Aristotele*, quod meatus in se habet. 354  
Flatulentia medetur venæ sectione. 382  
Flumina magna quatuor procedunt ex Paradiso, vniuersum terrarum orbem abluunt & irrigant, *Nilus*, *Ganges*, *Tigris* & *Euphrates*. 237  
Fœconditas in feminis prerogatiuam esse, inunctis medicamine oculis saluam infici affirmat *Plinius*. 475  
Fœtus adhuc vtero conclusus, vesiculam sellæm bile plenam habet. 125  
Fœtus vitalitatem ea vnguibus cognosci prodidit *Hippocrates*, &c. 361  
Fœtus humani Anatomen etiam tractarunt veteres. 362  
de Fœtu humano primus scripsit inter Recentiores *Arantius*, qui miracula formationis Fœtus, & Vteri prægnantis detexit, & aperuit. ibid.  
Fœtus humani à veteribus inspecti & obseruati. 369  
Fœtus consideratio duplex est constituenda. 364  
in Fœtu partes considerandæ, propriæ & communes. ib.  
in Fœtu humano duæ sunt tantum membranz. 367  
Fœtus membranz, an sint propagationes membranarum abdominalis. 369 de earum origine variaz adferuntur variorum Authorum sententia. ibid.  
Fœtus humani membranz sunt tantum duæ. 370. tertia brutis communis. Allantois dicta, nunquam in humano Fœtu reperitur. 371  
Fœtus quando non potest amnion exeuere, cogitur capite leuato in lucem prodire. ibid.  
Fœtus in vtero conclusus per vterum mingit, & cæca vterum. 375. 378  
in Fœtu humano Vrachus est solidus, nullo foramine peruius. 378  
Fœtus dum formatur, quæ particula generetur, & consistat, ipse nonit euidenter, qui formauit eam Creator nolet. 382  
Fœtus generatio eo modo se habet in vtero mulieris, vt pullificatio ex ovo. ibid.

Fœtus humani generatio demonstratur ex historia pullificationis. 353  
 Fœtus generatio comparatur ab *Aristotele* plantarum productioni. 385  
 Fœtus nutritur, ut singularum partium moles alimenti accessione augeatur. 386  
 Fœtus aliter nutritur in utero, quàm extra uterum. *ibid.*  
 Fœtus an ore sumat alimentum  
 in Fœtu alimentum via est vena umbilicalis. *ibid.*  
 Fœtus si nova hæmatosa. *ibidem.* & 387  
 in Fœtu duplex est admittenda cœctio, hæmatosis & homœostis. *ibid.*  
 Fœtus, quomodo sudorem emittat, adhuc tenebatur. quem homines nonnulli violento motu profundunt. 388  
 Fœtus non potest semper eodem loco stare, & quiescere. *ibid.*  
 Fœtus suis aquis innatantem naui comparabat *Democritus*, quem umbilicus velut anchora nauem sistit. *ibid.*  
 an Cor in Fœtu propria & vitali facultate sit præditum, & mouetur. 389  
 Fœtus exintra matre aliquandiu superstiti vivit, & interdum vivus ereptus fuit. 390  
 Fœtus non est pars motus integrans, neque essentialis, quia detracto Fœtu, mater non dicitur mortua, & imperfecta. *ibid.*  
 Fœtus facultates emanant à semine, non ab utero matris. 391  
 Fœtus vero conclusus non respirat, orante pulmone. *ibid.*  
 Fœtus in utero conclusus, an vocem eiulantis distinctam emittat. 393  
 Fœtus vivit vitam plantarum, deinde animalis. *ibid.*  
 Fœtus propria vita vivit, vitales actiones edit, ac proinde Cor ei movetur. 397  
 Fœtus in utero ex matre vivit, & ut valet mater, ita & Fœtus. 398  
 de Fœtu *questio memorabilis & admiranda*, an Fœtus exintra matre tamdiu superstiti fuerit, ut post triginta sex horas ab interitu matris, vivus saepe impetu ab ergastulo suo eumpere potuerit? 398  
 Fœtus propriam vitam habet à seipso, sed ea consuevit à matre, dum sedem, forum & alimentum aliunde suppeditat. 399  
 Fœtus rariè vivus extrahitur ex secro matris utero. 400  
 Fœtus est præditus animali facultate. *ibid.*  
 Fœtus an dormiat, & vigilet? *ibid.*  
 Fœtus in utero est contractus & conglobatus, multis de causis. 401  
 Fœtus in eo situ, quomodo habet partes in utero compoſitas, ex sententia *Hippocratis*, *Aristotelis* & *Galenus*. *ibid.*  
 ne Fœtus nascatur procurare, non solum habetur pro homicidio, verumetiam pro homicidii perpetracione. 403  
 Fœtus ex utero in lucem proiectus, vitam ab eulatu quare suscipiat. *ibid.*  
 Fœtus multis diebus temporibus, & diversis

rum ætatem vidit *Rudanus*, in quibus raris multa obſervavit. 411  
 Fœtus unde fit, ut incolumus sæpe subsistat post summam sanguinis materni vacacionem. 736  
 Fœtus, *Venerius*, iunioris *Anatomici*, scripsit de transitu sanguinis à dextro ventriculo Cordis in sinistru. 339  
 Fœtella à *Plinio* palpitans vertex nominatur. 407. non ante induratur, & in os mutatur, quàm Cerebrum sicciis evaserit, oec corroboratur ante primum formosum exordium. 407  
 Foramen est ductus utraque parte perius. 474  
 Foramina cranij sunt interna vel externa. *ibid.*  
 eorum numerus. *ibid.*  
 Formæ rerum omnium actione cognoscuntur. 444  
 Fortis non est *Aristoteles*, qui idem non sit prudens. 839  
 Fortunatus *Plempj*, Professoris Louanienſis opinio de sanguinis circulatione expenditur. 567  
 Fortunatus *Lucius*, Philosophus & Medicus præstantissimus, circulationem sanguinis *Hermesianum* explosit, & novam commentus est. 514  
 Fortunatus *Lucius* de Circulatione sanguinis in Corde, nova opinio examinata. 570  
 Fortunatus *Lucius* est Medicus eruditissimus & eximius Philosophus. 571  
 se Peripateticum præsitetur, & ex mente *Aristotelis* ubique loquitur. *ibid.*  
 Fossa quid est. 474  
 Fossæ cranij internæ & externæ, quorū sunt. *ibid.*  
 Frons unde dicta. 267. est animi ignis. *ibid.*  
 frontales & superciliarum musculi. 306  
 Fuchſius non erat Anatomus. 30  
 Fuchſius fuit *Vesali* limia & imitator, ne dicam plagarius absolutissimus. *ibid.*  
 Fuligo est ipsius pinguis exhalatio, ex *Aristotele*. 351. siue vapor terrestris, ex *Galenus*. *ibid.*  
 an ex fuliginosa materia procreetur, aut nutantur pili? *ibid.*

G.

**G**alenus omnium Medicorum conatus in Anatomice rei studio longè superavit. 19  
*Galenus* passim multorum Anatomorum factis mentionem. *ibid.*  
 de *Galenus* in *Aristotelem* contendente iudicium *Averroes*. 25  
*Galenus* rudem & imperfectam *Hippocratis* Anatomem exornavit, atque perfecit. 26  
*Galenus* peregrinationes & præceptores. *ibid.*  
*Galenus* in Anatome multa primus invenit. *ibid.*  
*Galenus* excusatur à calumniis recentiorum. 27  
*Galenus* in quibusdam erravit, quomodo excusandus. *ibid.*

- Galeni* elogia multa tacebantur. *ib.*  
*Galeni* tantum interpretatioes fuot, *Anato-*  
*mica Riolani.* 28  
*Galeni* libros suos Anatomicos ceteris præ-  
 fert. 39  
*Galenus* brutorum corpora, quare sæpe disse-  
 cuit. 42  
*Galenus* capram grauidam & viuentem, quare  
 dissectuit. 43  
*Galenus*, an humana cadauera dissectuerit? 44  
*Galeno* attributus liber quidam *de natura &*  
*ordina cuiusque partis*, est alicuius *Iudei.* 45  
*Galenus* solius hominis Anatomen descripsit,  
 quamuis brutorum cadauera dissectuerit. 46  
*Galenus* elephantem mortuum Romæ dissectuit.  
*ibidem.* eos reprehendit, qui Anatomen ex  
 humanis corporibus ediscunt, ac repetunt.  
*ibidem.*  
*Galenus* theoreticam Anatomen distinxit à pra-  
 ctica. 46  
*Galeni* iudicio, in dissectionibus parum peri-  
 tus fuit *Aspiteres.* 47  
*Galenus* etiam rogatus, Medicis Romanis, qui  
 ad pectandum Cor elephantis morui con-  
 uenerant, osculum Cordis ostendere oo-  
 luit, quod tamen suis discipulis indicauit.  
 50  
*Galenus* corporis nostri structuram & specula-  
 tionem vocat hymnum verum nostri Con-  
 ditoris, veramque pietatem: & perfectissi-  
 mæ Theologie verum principium consti-  
 tuit. *ibid.*  
*Galenus* plantas quare pingi noluit. 52  
*Galeni* vitæ & longinquæ peregrinationes, ut  
 sui temporis Anatomicos consuleret. 54  
*Galenus* ad Anatomiam manum dumtaxat, &  
 oculos requirit. 55  
*Galenus* *Pamphilus* librum damnavit, quod au-  
 sus fuisset herbas describere, quasne quidem  
 per somnium viderat. *ib.*  
*Galenus* illos subsannat, & grauitur increpat,  
 qui ex caehedia docent Anatomen. *ibi-*  
*dem.*  
*Galenum* nihil tam *Roma* commendauit sicut  
 admirabilem reddidit quam Anatome. 57  
*Galenus* in sue viscera demonstrabat 60  
*Galenus* electum & destinatum animal ad Ana-  
 tomen frequentius in aqua suffocabat.  
*ibidem.*  
*Galeni* variis utebatur instrumentis in admi-  
 nistranda Anatome. 62  
*Galenus* publicam Anatomen administrabat  
 Romæ, in templo *Pacis*, præsentibus Roma-  
 nis proceribus. 65  
*Galenus* à ventre inferiore sectionem Inchoa-  
 bat. 75  
*Galenus* primus voluit faciem sanguinis, nem-  
 pe crassum & sæculentum humorem, qui di-  
 citur melancholicus, à Liene prolectari &  
 absorberi. 113  
*Galenus* Musciseognitionem Medico necessa-  
 riam esse statuit. 105  
*Galeni* simia quæ tabida mortua est, sine hu-  
 more seroso in Pericardio reposita fuit. 119
- Galeni* temporibus eadem fuit mundi & homi-  
 nis structura, quæ fuit tempore *Hippocrati-*  
*s.* 110  
*Galenus* de moribus dubiis & obscuris muscu-  
 lorum librum sæpius pollicetur. 103  
*Galenus* curiosum venatum delectum neglexit.  
 142  
*Galeni* tempore Medici ad eum vsque detonsi  
 erant. 154  
*Galenus* admiratur summi Opificis industriam,  
 in ortu & dispositione ciliotum, quæ con-  
 tra naturam aliorum pilorum, dure cartila-  
 gini adherent, nec crescunt. 157  
*Galenus* cum calibem vitam duceret, tardè, vel  
 nunquam patietibus mulieribus inseruit.  
 171  
*Galenus* admittitur infantis exitum, quod nullà  
 vulneratà particulà, neque membro exarti-  
 culato prodeat. 405  
*Galenus* io se difficili ab *Hippocratis* dictio-  
 ne, tanquam à Dei voce semper auspicatur.  
 406  
*Galeni* dubius fuit, & incertus super quæstio-  
 ne de motu Cerebri. 414  
*Galenus* à patre in humanioribus literis ad 14.  
 ætatis annum eruditus & enutritus fuit, ab  
 eoque tempore ad Philosophiam perductus.  
 421  
*Galenus* vbi se dedit Medicior, præstantissimos  
 io hac arte professores, atque præceptores,  
 per omnes *Græciæ* regiones inuoligauit, ad-  
 iuit & audiuit. *ib.*  
*Galeni* præceptores enumerantur. *ibid.*  
*Galenus* coactus fuit à docendi officio procius  
 abstinere, cum *Aspiteres* à nonnullis habere-  
 tur. 422  
*Galenus* generosè contempsit aliorum Medi-  
 corum inuidiam. 423  
*Galenus* exosus, & conuitiis exceptus ob as-  
 siduum Anatomæ studium. *ib.*  
*Galenus Roma* res Anatomicas tractabat, ab-  
 que Chirurghi ministris, quamuis Vrbis ipsa  
 Chirurgis abundaret. *ibid.*  
*Galenus*, an sit author libri *de Ossibus*? 431.  
 probatur esse *Galeni.* 432  
*Galenus* suos libros distinguebat in Isagogicos,  
 & Perfectos: Isagogicos Tyronibus: Perfe-  
 ctos proutis conuenire scribit. *ib.*  
 quod *Galenus* in rebus Anatomicis, ceteris  
 sit præferendus, & quid in eius lectione A-  
 natomica sit obseruandum. 433  
*Galenus & Hippocrates*, maxima post *Apollonium*  
 & *Esculapium* Medicinæ numina. *ib.*  
 nec fallere, tardè falli vquam potuerunt.  
*ibidem.*  
*Galenus* veritatem vnice dilexit, & omnibus  
 Medicinæ studiosis commendauit. *ibid.*  
*Galeno* comparati reliqui Anatomici, infantes  
 & naui videntur. 434  
 in *Galeni* lectione Anatomica, tria sunt conside-  
 randa. 434  
*Galenus* omnia spectare & inuigilare non po-  
 tuit. 435  
*Galenus* duorum hominum sceleta habuit.  
 436  
*Galenus* ab ossibus ordiendum esse vult in do-  
 ctina Anatomica. 437  
*Galenus* Chirurgiam exercuit, & in patria sua



- Parasitus* cunctandis gladiatoribus à Pontifice prædictus fuit 440
- Galenus* quædam ignoravit, vel omisit in offi-  
cibus Capitis, & quædam ra. 472
- Galenus* innotescit Os Cordis, Os Ethmoides,  
Os Hyoides, & Aures Officula. 521
- Galenus* febribus faciat prophetas non scribo-  
re *Germans*, aliisque agnibus & barbaris  
hominibus. &c. 585
- Galenus* ratio mentis non est sectionis, quæ ta-  
men ex legibus medendi à *Galenus* constituitur  
est perniciosa. 587
- Galenus*, quomodo fecerit medicinam cum &  
sine sanguinis missione. 587
- Galenus* egregia & audacia facta admittit licet,  
sed non insitit, siue periculo ægotantium,  
& attitit merita reprobatione. 587
- Galenus* *Erassistratus* in omnibus Medicinæ par-  
tibus viri admirabilis, scripta ardentius re-  
prehendit. 587
- Galenus* *Archigenem* infestus est vi famam e-  
ius deprimentem, solum magis extollit. 587
- Galenus* in curatione morborum cauere legendus  
est, propter varietatem & discordiam, quæ  
in eius scriptis legitur. 587
- Galenus* ad meditationem potius, quam ad me-  
dendi rationem vitam omnem contulisse vi-  
detur, ex *Franchis*. 587
- Galenus* in hæmorrhagia valida natum, quo-  
modo languinem misit. 589
- Galenus* febrium intermittentium sedem con-  
stituit in cap. Ilaribus venis, per habitum cor-  
poris dispersis. 601
- Galenus* innotuit errores Medicorum notuit  
& emendavit 623
- Galenus* cum cæteris Anatomicis, *Lycus* errores  
emendavit, quos præcipue de rebus Ana-  
tomice scriptis vulg. fecerunt. 623
- Galenus* *Cæcus Hippocratis* non est interpreta-  
tus. 627
- Galenus* neminem propter solæcismos huius re-  
prehendi monet, modo sem. ipsam perfe-  
cti deservit: præstat enim lingua quam vi-  
tâ solæcismos & barbarismos committere.  
634
- Galenus* caelebs vixit, nec de morbis mulierum  
scripsit. 736
- Galenus* excusat Medicos, qui incongruè &  
barbare loquuntur, & libellum scriptis ad-  
negit eos qui reprobantur Medicos solæ-  
cismos. 846
- Galla* duas habet Scholas, Medicorum studio  
florentes, & æmulo doctrinæ studio inter se  
decertantes, nempe *Parisensem* & *Montensem*. 63
- Galli* ex *Hispanis* lubeant amplectuntur & usur-  
pant venæ sectionem, quam *Germans*, *Belgæ*,  
*Angli*, populi que Septentrionales reformi-  
dant. 585
- Gallus* quatenus emendit, & quibus mollis, ac  
senecta est caro, *Galenus*, minus sanguinis  
detrahere consuevit. 585
- Gallus* non est tanta longitudo & fortitudo pen-  
nis quanta *Indis*, (ex relatione *Spiegelii*.) ad-  
eior quæat introduct in cauitatem vteri, pe-  
netrando oculum internum vteri. 752
- Garamantes* vxores habent communes & co-  
rum vnusquisque filios in elugie patris ag-  
noscit. 671
- Gargæon* an habet, & cur aliquos musculos.  
294. est vocis plethrum. *idem* eius ligamen-  
ta. *idem*.
- Gargæon* unde dicitur. 294
- qui *Gargæone* carent, eunt tibi sunt obnoxii.  
*idem* non est temere abscindendus. *idem*.  
non est pars inutilis. *idem* indignus quidam fa-  
pra alios eius vias. *idem*.
- Gargæonis* musculi quatuor. 314
- Gargæon* est plethrum vocis, ex *Galenus* 801
- Gargæon* vir doctissimus & Professor Regius,  
meum quendam obseruauit in Cord. ho-  
minis insolium. 235
- Gemelli* communem habent placentam, quæ v-  
triulque vasa umbilicalia recipit. 374
- Gemelli*, an vnica sit anima, an vna cuique?  
838
- Gemini* quidam adeo sibi similes, vt omnibus à  
domestici & amici inter nos possent. 53
- Generatio hominis ex *Hippocrate*, sicut huius  
culo, in quo, neque flos, neque principium  
obseruatur. 384
- Genitalium partium descriptio. 157
- Genitales partes. quare plus luxuriant. 158
- Genitalium partium vitium administratio Ana-  
tomica demum datur. 165
- Genitalium partium mulieris historia baccens  
ignorata fuit. 177
- Genitales partes viti & mulieris à *Lacryna* sul-  
cus & vomer vocantur. *idem*.
- Genitalium partium mulieris administratio Ana-  
tomica. 200
- Georgius* *Hydi*, Doctor Medicus Londinensis,  
scripsit pro *Harnis*, contra *Parasitum*, de  
Circulatione sanguinis. 154
- Germans*, *Belgæ* & *Angli* reformidant sangui-  
nis detractionem, quam *Hispani* & *Galli* lu-  
benter amplectuntur & usurpant. 585
- Germans* propter non misum sanguinem, à fe-  
bribus ardentibus exoritur, aut suffocari  
petunt, vel incidunt in apoplexiam, vel pa-  
ralysim, aut alios diuturnos affectus & im-  
medicabiles, cum tamen isto præsidio sum-  
mopere indigeant. *idem*.
- Germanica* natio laudatur, vt omni seculorum  
genere excubia, ingenuosa, & admodum la-  
boriosa. 686
- Germanica* lingua ferme tota ex *Hebraea* deriva-  
ta. 681
- Germanus* *Antimus*, Medicus Parisiensis, artis  
Anatomicæ illustrator imprimis claus.  
63
- Glandule sunt, vbi sunt humiditates cznotæ.  
110
- Glandula magna in superiore parte Renis.  
144
- Glandula lacrymalis consumpta, vel erosa, pa-  
rit æglopa, fistulam lacrymalem. 172
- Glandule sex in faucibus latitantes. 190
- earum tumor & dolor, quomodo dicatur ab  
*Hispanis*. 16
- Glandule spongiosæ excrementa Cerebri pi-  
rantia exurgentes & absorbentes. 295
- Glandule ad radicem linguae appositæ malè di-  
cuntur glandule. 643

Gloria debetur. 291 eius usus. *ibidem* deest animantibus humanis. *ibidem* non est principale vocis instrumentum. *ibidem*.

Gloria est instrumentum præcipuum vocis cum occurrerit recitanti. 685. eam *Galenus* gloriatu supra præcedentes inuenit. *ibidem* eandem ignorat *Lum. interpres*. *ib.*

Gloria in homine est tantum castilaginosa & membranosa. 713

Glotride bruta eadem. 727

Gonae de bris, quid sit. 736

Inter Grammatici virtutes numerat *Fabius*, quædam nescit. 438

Guido de *Canisero* penitit admodum strumarum scaturigine à melenterio repetit. 108

Gingivæ quid, & vnde dictæ. 183

*Grimmerus Andron* ni primus fuit restaurator Anatomies in Academia Parisiensi, ex doctrina *Galeni*. 805. auditores & discipulos habuit *Vesalius* & *Rondeletium*. *ibidem*. eius viæ breuiarium. *ibidem*. maxime opere laudatur à *Vesalio*. *ibidem*.

Gymnasmus duplex ex *Galeno*. 453

de *Gymnismo* particularis observatio. *ibidem*.

*Gymnismus* significat cardinem & clauum, quibus ianua continetur. *ibid.*

*Gymnismus* ex *Ingraffia* quadruplex. *ibidem*.

*Gymnosophista* ab exorto Solis usque ad occasum, contentus oculis orb. in candidissimis fideis interiebant, in globo illo igoero rimantes secreta quædam. 477

## H.

**H**æmostofium nouum fieri in Fætu non est dubitandum, ex auctoritate *Galeni*. 113

Hæmothoides internæ & externæ. *ibidem*.

Hæmothoides rarè sunt prouocandæ, ex doctrina *Galeni*. *ibid.*

Hæmothoidibus non est assuescendum, cum sit eorum fluoꝝ præter naturam. *ibidem*.

Hæmothoidum fluoꝝ non est prouocandus, nisi malum aluius partibus tosideat. *ibidem*.

Hæmothoidales venæ porgant primæ regionis impunitatem. *ibid.*

per Hæmoth. idas quando sanguis est educendus. *ibid.*

Hæmothoidales venæ ab hypogastrico procedunt, verèbrius ignotæ fuisse. *ibid.* eas inueniunt trecentos Medici. 114

Hæmothoides internæ & externæ, quomodo inter se differant. *ibidem*.

per Hæmothoidas singulis mensibus, crasso & faculento sanguine repurgantur melancholici. 115

Hæmothagiæ ingentes narium ex Cerebri sinibus, si e. Tolerari emanant. 213

Hæmothagiæ narium, cur solus homo inueniat, alia in obnotius. *ibid.*

Hæmothagiæ narium, ut sit critica, quid requiratur. 235

Hæmothagiæ magnas sistit arcta & vehemens autem oclusio, ex *Galeno*. 164

Hæmothagiæ, siue per nares siue per hæmothoidas, siue per viciu in mulieribus, frequentiores sunt in regionibus meridionalibus, quàm in frigidis & temperatis. 394

Hæmothagiæ expectabat *Hippocrates* in febribus ardentibus, & aliis morbis inflammationis capitis, thoracis & ventris inferioris. *ibidem*.

Hæmothagiæ multæ difficilia mala dissoluunt. *ibidem*.

Hæmothagiæ aduenientem lubenter excipiebat *Hippocrates*, si recte & rite fluere, stillantemque promouebat, & immodicè vel male fluentem sistebat, sed à venâ. 193

in Hæmothagiæ venæ sectioem laudat *Hippocrates*. 392

Hallucinati nunquam, supra caput boni moris est, sed quam minimè abetate, solus est artificis, auctore *Galeno*. *ibidem*.

Harmonia celestis & mundana à quibus inuenitur. 103

Harmoniz nomen multis modis sumitur. 436

*Hærcus* & eius sectatore, dum agunt de Circulatione sanguinis, fauent opinioi *Aristotelis*. 548

ex *Hærcus* sententia Circulatione sanguinis mendendi methodum immutat. 342

*Hærcus* inuenit ex quæstionis de Circulatione sanguinis in Corde. quam elegantis scripto proposuit. 553-555

*Hærcus, Angelus*, Medicus eruditissimus. *ibidem*.

plurimum ei debet de tam eximio inuenito, hodie vix sapientum chorus, & grata posteritas. *ibid.*

*Hærcus* opinio de Circulatione sanguinis examinatur & refellitur. 558

*Hærcus* tres opiniones omniæ falsæ de Circulatione sanguinis. *ibid.*

*Helius ferus* *Constantini, Iuliani Cesaris* coniux, in Gallie eum matrem genuisset, infantem perdidit, quod obstitit corrupta mercede, mox natum præsepto plusquam conueniebat umbilico, necauit. 380

Hemicranis, quomodo fiat. 754

*Henricus de Hermandanilla Medicus Parisiensis*, Anatomem ostendebat in piæuris, defuncti cadauerum. 66

*Henricus Regius* Circulationem sanguinis propugnauit in sua *Physica*, quamuis in quibuldā deficiat ab *Hærcus*. 334

*Henrici Regii*, *Medici Vlerantini*, vici doctissimi opinio de Circulatione sanguinis expeditur. 368

Hepar definitur, 110

Hepar potissimè diligenter explorabant Expertifices. *ibid.* est nutriticus & vitæ fundamentum, *ibid.* eius virtutis debemus, si vita contingat optima. *ibid.*

Hepar sanum esse non potest, nisi affectis insectis. *ibid.*

Hepar estispij fundamentum. *ibidem*.

io Hepate diuinationis sedem col' oest *Plato.*

*ibidem.*

Hepatis fibrarum nomina referri possunt ad

quatuor facultates ipsi proprias *10.*

Hepar & pancreas a sculp. emat, quomodo intelligenda. *121*

cicium Hepat abscessus sunt, & sordes plurimum epacerantur, quæ tandem in Epiploon incidunt. *16.*

ab Hepate quia caput eorum, seu viscerum reputatur, exspiratum siue consensatio viscerum moie Arupitum est irchoanda.

*ibidem*

Hepat, quare vocetur parenchyma. *16.*

Hepatis parenchyma ea semine effingit. *16.*

Hepatis sum, regiones, vasa duplicia. *121*

Hepatis anneau & ligamenta. *121*

Hepar & humani lobis, an sint plures. *16.*

Hepar hominum bubulo similitudinem. *123*

Hepar in mortui veritatem patiens. *16.*

Hepati dolores acutissimi & frequentissimi videntur contingunt. *16.*

Hepar arterias habet à cordi aca. *16.*

Hepar alimentum principatum obinet. *16.*

Hepar est rad cat o venarum. *16.*

quate multi morbi est obnoa um. *16.*

Hepatis abscessus caputgantur per ventriculum. *16.*

Hepatis cum Capite societas vnde *16.* per quas

vias an per nervos, an per venas. *16.*

Hepatis dolores sunt acutiissimi. *124*

Hepar grandis habet iset homines, qui luot voracissimi. *16.*

Hepatis magnitudo ea digitorum longitudine cognoscitur. *16.*

Hepatis prauitas semper est noxia. *16.*

Hepar an sit sedes lous veneris *16.* an libidinis. *123*

*Hæcalem* scelerum vitiorum & monitiorum do-

mitorem videri ad calum edocuerunt. *80*

*Hermaphroditi* omnes fuisse initio mundi *Plato* fabularum. *121*

*Hermaphroditi* puella visa & dissecta à *Riolano*. *127*

*Hermaphroditi* mulieres, quomodo sunt accipiendæ. *129*

de *Hermaphroditum* in postura, et exempla memorabilia. *16.*

*Hermaphroditum*, suntne iomonitiorum catalogum referenda? *835* an veramque venereem possint exercere. *16.*

*Hermesem Trismegistum*, tanquam Authorem & Inuentorem omnium rerum, tam veratam, quam falsarum prædicauit antiquitas, auctore *Galeo*. *613*

*Hermesodorus Ephesius* è ciuitate expulsus à suis popularibus, quod esset vir bonus & pius. *17*

*Hermipulus* sexcentos homines secuit, vt naturam hominis sciret, auctore *Tertulliano*. *45*

laudatur à *Galeo*, propter consummata in Anatomia scioriam. *16.*

*Heresiphium* puliam Cordis & arteriarum, in musculos pedes descriptum. *104*

*Hermipulus* præstantissimus Anatomicus non dubitauit Præceptorum sui Præceptoris sectores adnotare & eam gate, ne puellitas etoidem

erroribus deciperetur, quibus ipse iuerat deceptus. *681*

*Hieronymus Fabricius ab Aquapendente*, ann. m. scilicet 90 attingebat, cum solus conceffus, & tamen fuit Anatomicus. *56*

*Hippocrates*, magnus fuit Anatomicus *17*

*Hippocrates* Collapsum, ac pene iuermortuum Acontomen instaurauit. *19*

*Hippocrates* ea hominis vifibus vertebras hominibus diuifit. *6*

*Hippocrates* discipulorum Medicorum duo genera constituit. *12*

*Hippocrates* aduocatus ab *Ardians* *Ivt D. me-* crus medicinam faceret, eique mentem alienatam restitueret. *55*

*Hippocrates*, quid senserit de vfu Lieris. *113*

*Hippocrates* doctrina multialia multa conseruata ex *Fluoro*. *105*

*Hippocrates* an præ vetercundia totum pauciorum negotiorum commisit oblitiscitibus? *371*

*Hippocrates* tempore magnus erat præceptorum erga discipulos amos, vtiliumque discipuli præceptores paruenim loco habebant ea mandata veterum. *112*

*Hippocrates* Medicorum sui temporis inuidia expertus est. *16.*

*Hippocrates* multos discipulos habere voluit, quos in pchileotis per *Græciam* grassantibus, in diuersas regiones mittebat, vt publico instructerent. *16.*

*Hippocrates*, *Apollini* Medicinæ parenti, cadaveris humani ceteram officam dicauit. *430*

*Hippocrates* totos ossa & cadavera petperuò veritabat. *16.*

*Hippocrates* *Apollini* *Delsbica* scelerum humanorum æt fabricatum religiose consecrauit. *16.*

*Hippocrates* Medicinam facit duplicem, vnam Tytonum, aliam prouectorum in arte. *431*

*Hippocrates* præcipuum studium furtio oblitus in libros *Hippocrati* adulterina multa interple- runt, teste *Galeo*. *463*

*Hippocrates* petitus fuit Anatomicus, & ab eo vniuersa Anatomie fuit descripta. *512*

*Hippocrates* omnium bonorum nobis est auctor. *16.* scripsit multa Anatomica. *16.*

scelerum æneam *Apollini* *Delphis* consecrauit. *16.*

apud *Hippocratem* vniuersæ Anatomies semina huc & illic sparsa reperiuut. *16.*

in scribendo fuit religiosus & accuratus. *16.* eius encomium ea *Lucræcio* desumptum. *16.*

*Hippocrates* duplicem sanguinis circulationem designauit. *516*

*Hippocrates* io arteriarum interceptionibus venam fecit. *517*

*Hippocrates* ægris suis venæ sectionem tardè adhibuisse videtur. *515*

*Hippocrates* venæ sectionem subiecit, tanquam remedium ordinatum. *16.*

*Hippocrates* ægros multo per crisis Naturæ beneficio liberati. *516*

*Hippocrates* quo fine scripserit *hystæris* *Enkle-* micas. *16.*

*Hip-*

*Hippocrates* paucis, sed probatis & selectis re-  
medis vult esse in medendo. 586  
*Hippocrates* adhuc iuuenis, in operibus artis  
conditum sibi exercitatus, libros Epidemicos  
peregrinando conscripsit, &c. ibid.  
ut *Hippocrates* medicus Medici multa notatur  
ante *temperia Cornelii Celsi*. ibi-  
dem.  
*Hippocrates* excellit in arte prælagendi.  
ibidem.  
*Hippocrates*, quomodo intelligendus de iis que  
scripsit in libris Epidemicis. 586  
*Hippocrates* obcuritatem in multis reprobendunt,  
qui ob propriam imbecillitatem non possunt  
*Hippocraticæ* virtutis magnitudinem assequi.  
ibidem.  
*Hippocrates* alius medicæ conditor, infano amo-  
re amplexus est venæ sectionem, camque ex  
*Galeno*, in singulis penè morbis adhibuit.  
587  
*Hippocrates* venæ sectionem vocavit principale  
remedium à quo fit inchoandum, & incurra-  
tione morborum purgationi iubet permitti-  
tæ. ibid.  
*Hippocrati* fuit vñtata venæ sectio. 588  
*Hippocrates* oñauo die sanguinem detrahit A-  
naxioni plenitico, pæter consuetudinem  
Medicorum sui sæculi. 591  
*Hippocrates* in variis morbis, & quampluribus,  
venæ sectionem præscripsit. 592  
cuius exempla multa recensentur. ibid.  
& 592  
*Hippocrates* etiam in hydropæ sanguinem mlie-  
ti. 592. vt & in dolore renum à calculo, in  
venæ stillicidio, mendi difficultate, & partu  
difficili. ib.  
docet in genere detrahendum esse sanguinem  
in omnibus febribus acutis, & aliis multis af-  
fectibus. ib.  
*Hippocrates* experimento omnia comprobauit,  
quæ docuit & scripsit. 593  
*Hippocrates* non fuit Empiricus. ib.  
fuit valde accuratus in tradenda methodo se-  
candi venam. 594  
est admirabilis in modo secandi venam. ib.  
an *Hippocrates* sæpius iteratè venæ sectionem?  
ibidem.  
*Hippocrates* hirudines nouerat, sed ipsis nun-  
quam est vñs, quare? ibid.  
*Hippocrates* in acutis ægros nutrebat aquâ hot-  
dei, sue pitiana, melicrato & aquosis potio-  
nibus veterimis, donec ardor febrilis de ser-  
buisse, aut ad septimum diem æger perue-  
nisse. 613  
*Hippocrates* scribit in sanis omnes carnes san-  
guine & spiritu repleti, in ægris flari & sero.  
617. & 762  
*Hippocrates* errores suos ingenuè confessus est.  
622  
*Hippocrates* notat vniuersum corpus inter car-  
nes per sanitatem repleti spiritu & sanguine,  
in morbis flari & sero, vnde sunt rheumatismi.  
762  
*Hippocrates* in asthma, & aliis affectionibus  
pulmonum vomitum consuluit. 780  
*Hippocrates* vidit lapidem excretum à vulua sa-  
mulæ *Dræstis*. 836  
Historiæ quorundam, quæ patibulo ad Thea-

trum Anatomicum delati, laxato & resolutio-  
laqueo strangulatorio reuixerunt. 60  
Hoc post hoc, ergo propter hoc, non valet con-  
sequens. 840  
*Hofmannus*, Medicus eruditissimus, 33. habuit  
præceptorem *Crematium*. 34  
*Hofmanni* ineptiæ de vñ Lienis, quæ Physiolo-  
giæ medicam euerunt. 139  
*Hofmanni* conclusiones quatuor falsæ de semi-  
ne mulierum recensentur. 182  
*Hofmannus* intusitam reliquit circulationem  
sanguinis, vnde non videtur eam probare,  
nec tamen auspi fuit eam refellere. 555  
*Hofmannus* scripsit doctissimè de vñ Cerebri ad  
Cordis refrigerium, secundum mentem *A-  
ristotelis*. 630  
*Hofmannus* dum se constituit censorem & ar-  
bitrum rerum Anatomicarum, detegit suam  
insiciam in hac Medicinæ parte. 632  
*Hofmannus* nimio fastu & ignorantia carpit  
Auctores septem, quos elegit castigandos,  
tanquam igoaros, imperitos, &c. 789  
*Hofmannus* ridiculè carpit *Fernelium*. ib.  
*Hofmannus* iniquissimè vocat *Fernelium* et *Ar-  
gennerium*, biennosos arietes. ib.  
*Hofmanni*, Medicus quidem eruditus, vt te-  
stantur monumenta ingenij, sed insolenter  
abutitur sua doctrina, in contemptum alio-  
rum. 790  
*Hofmannus* non est Anatomicus, nisi vmbati-  
cus, ex picturis, & aliorum relationibus. 793  
*Hofmannus* loquitur, & errat more vulgi. 795  
*Hofmannus* iam dudum promittit sua Physiolo-  
gica. 796  
*Hofmannus* multa ignorat in Anatome. ib.  
ab *Hofmanni* calumnia & reprehensione vin-  
dicantur tres doctissimi Professores Anato-  
mici, *Ioannes Gvnerius*, *Iacobus Sylvius*, &  
*Fallupius*. 802  
*Hofmannus* non peperit *Guinerio Andermace*.  
803  
*Hofmannus* nimis liberè & licentiosè castigat  
omnes Medicos in suis *institutionsibus Aca-  
demicis*, vt solus sapere videatur. 804  
Opoti Anatomico nunquam manum admo-  
uit. ibid.  
*Homerus* peritus fuit Anatomicus. 17  
Homo magnus quid est, & admirabile. 2  
Homo res magna & pretiosa. ib.  
Hominis elogia multa recensentur. ib.  
Hominis compositio. ib.  
Hominis est magni pretij apud opificem *Natu-  
ram*. ib.  
Homo non est demonis opus, sed Dei, aduer-  
sus quosdam hæreticos. ibi-  
dem.  
Homo est imago Dei, et eam naturam habens.  
6  
Homo postremus est à Deo creatus tanquam  
microcosmus. ib.  
Homo rerum conditarum finis censendus est.  
ibidem.  
in Hominis fabrica conclusa est omnis *Natu-  
ræ sapientia*. 7  
Hominis cum mundo consensus magnus.  
ibidem.  
Hominis visibilis magnum miraculum videndi  
alliditate vilesit. 7

- Homo erectus fuit, vt omnem figuram imitari posset scilicet flexendo. 8
- Hominis & leonis differentia. *ibid.*
- Homo solus inter animalia erectus, ex *Aristotele*, quare. *ibid.*
- Homo quare est omnium animalium prudentissimus. *ib.*
- Homo ex doctrina *Chaldeorum*, animal est varix ac multiformis & deflectionis naturæ. *ibidem.*
- Hominis multa insunt pecuniaria, quæ in cæteris animalibus non deprehenduntur. 9
- Hominis soli gloriæ concessa, vt omnium animalium voces imitari queat. 10
- Hominis in commendationem multa producuntur, ex *Aleleo*. 11
- Homo solus inter animalia ridet. *ibid.*
- Hominem quasi venerantur cætera animalia. 12
- Homo solus leonem ferocissimum animal, vincit & edumat. *ibidem.*
- Hominis magnanimitas imperium in omnia animalia matris & terræ etiam vastissimæ. *ibidem.*
- Hominis dominatus in omnia terrena datus. *ibidem.*
- Homo est Deus mortalis. 12
- Homo tam pulchrum est opificium, quam pulcherrimum esse potest. 13
- Homo non est opus remedium & inconsummum. *ibid.*
- Hominis prærogatiue multæ recensentur. *ibidem.*
- Homo præcipuum est Dei opus. 14
- Hominis natura parvus est mundus. *ibid.*
- Hominis operatio communis est motus. *ib.*
- Hominem viuum locare, an sit necessarium, & liceat. 42
- Hominum cura apud veteres *Asiæ* nefas habebatur, & quare. 44
- Hominem vixta censuram annum non viuere, quare credebant *Ægypti* Medici. 45
- Hominis structuram quo sine speculatur Philosophus. 50
- Homo solus ratione cutis tenulioris & imbecillioris viriligne tentatur. 80
- Homines quidam fel non habent, quorum valetudo firmior, & vix longior. 113
- Homini non licebat vtramque naturam inducere, maris & feminæ. 151
- Homo præstintissimum animal, naturæ incultum. 164
- Homo solus est animal natum pudoris ac verecundæ participes. 153
- Homo natus est ad musicam, vt laudes Dei perpetuo prædicet. 203
- Homo solus musæ capax est, non tantum propter intellectum, sed propter organa phonica & symphonica, quæ in eo solo reperiuntur. *ib.*
- Homo supra cæteras animantes extollitur ac præfertur, dum mundo comparatur, &c. 240
- Homo microcosmus, ex *Aristotele*, *Porphyrio*, *Protagora*. *ibid.*
- ca *Galeno*, & *Ruffo Epheso*. *ibid.*
- Hominis cum mundo comparatio *ibid.* ex variis auctoribus. *ibidem.*
- ipsum similitudinis Hominis cum mundo causas assignat *Aristoteles*. 245
- Homo quare Microcosmus dicitur, ex *Porphyrio*. *ibidem.*
- Homo sibi soli præ cæteris animalibus propriam habet facultatem rationalem *ibid.* propter eam solum dicitur Microcosmus. *ibidem.*
- Homo dicitur ad imaginem Dei factus ratione capitis. 246
- Homo totus in facie tanquam in parua tabella continetur. *ibid.*
- Homo totus in capite continetur, & in eo perquirenda est analogia microcosmica. 247.
- & 251
- Homo in vtero solum habet caput magnitudinem, ex *Alberto Magno*. *ib.*
- Hominis caput ab aliorum animalium capitibus valde dissimile. *ib.*
- Homo solus inter animalia narium, hæmorrhægiæ cur sit obnoxius. 255
- Hominis supra reliquos sensus visum maxime diligunt. 269
- Hominis animalium superbissimi origo frivola. 263
- Homo est animal politicum, natum ad civilem societatem, & variis adiones obnoxius. 449
- Hominibus est familiare omnia sibi ignorere, nihil aliis remittere, & inuidiam rerum non ad causam, sed ad voluntatem personalem dirigere. 542
- Homo quare meritis dicitur bulla. 616
- Hominis in vtero materno prima delineatio. *ibidem.*
- Homo totus à natiuitate morbus est. 616
- Homo solus cur sedere possit, nullum autem quadrupedum, 792
- Homini vix non omnia scire datum est. 809
- Hominis, quare frequenter deformes scitus pariant, quam bellus. 837
- Humor seminalis duplex est, nempe prolificus, & alter saluialis intercondus. 164
- in quibusdam partibus Humor ille duplex resistit. *ib.*
- Humoris aquei, quo factus in vtero circumdatur, causa materialis. 388
- huius Humoris in vteri gestatione & partu magna est necessitas. *ibid.*
- Humor serosus duplex in vtero videtur contineri. *ibid.*
- Humor seminalis duplex in partibus genitalibus continetur. 664
- Humor sacrementitius duplex in Cerebro generatur. 711
- Humor sacrementitius Cerebri, si labatur in medullam spinalem, per obstructionem canaliculi, paralyticum excipit. 613
- Humor albidus, tenax & glutinosus, in spatium quo extremitates Ossium inter se articulantur, continetur, & in morbis articulosum crescit, & luxuriam magno ægrotum detrimentum, & in bobus magna quantitate colligitur. 736
- Humorum transmutationes sunt in hypochondriis. 136
- Hypochondria qualia esse debeant, vt sanitate perfectam sentiantur. 76 à Medicis sunt dili-

generis sangenda, & respiranda facilitate ex-  
ploranda. *ibid.*  
Hypochondrij vox non fuit nota *Aristoteli.*  
689  
Hymen membrana virginittis index & testis,  
describitur. 189  
Hymenis varia nomina recensentur. 190  
Hymen quid est. *ibid.*  
Hymenem Arabes videntur agnouisse. *ib.*  
Hymenis situs. *ibid.* an in omnibus virginibus  
inueniatur. 191  
Hymenis vfus. *ib.*  
Hymenem vidit *Rolando.* 191

## I.

**I** Arabus *Angustus Thuanus*, in Senatu Pari-  
sienfi Praes clarissimus, repentina & mo-  
pina gangraena correptus, cum diti cru-  
ciatibus intra sex horas expirauit. 110. eius  
cadauer dissectio, & mira in eo reperta.  
*ibid.*  
*Jacobus Carpenfis*, *Histans* duos lue venerea la-  
boratos viros secuit. 45  
centena plurima cadauera secuit. *ibid.* quae-  
re & patris, *Bononi*, secedere cunctus est, &  
io exitum nullus. *ibid.*  
*Jacobus Carpus* plulquam centena cadauera dis-  
secuerat. 19  
*Jacobus Syluius*, quid scripserit Anatomicum.  
*ibidem.*  
*Jacobus Syluius*, Medicus Parisiensis vindicatur  
à reprobatione *Hufmanni.* 803  
Iecur vnde dictum. 121  
Iecur. Vide *Hepar.*  
Ilei nomen non à parte affecta, sed à sympto-  
mate deducitur. *ibid.*  
Ileon intestinum solum in ferorum decedit, &  
facit enterocelen. 104  
Ileon omnium intestinorum est longissimum,  
eius situs paucis melioribus sententis. 101  
Ileus, siue voluulus morbus, vnde dictus.  
*ibidem.*  
Imaginatio, in humores & spiritus magnum  
habet impetum. 85  
Imaginatio potest immutare subiectum penes  
accidentia, sed non potest immutare rerum  
species. *ibid.*  
Impubertas quaedam datur naturalis, vt in qui-  
busdam populis *America.* 339  
Infantes an ludent, an pilis careant. 358  
Infantes omnes sunt pumiliones, quare 3  
de Infantibus posthumis, qui ab vtero matris  
mortui viui prodierunt, exempla scribere  
tres viri egregij. 400  
Ingeioia hominum alia sunt sublimia & perfe-  
cta, alia humilia & imperfecta. 411  
Ingenij humani conditio erroribus obnoxia est,  
imò erroribus interdum delictatur. 686  
Ingenium magnum nullum est sine venia. 35  
Ingenij discipuli instar pistorum aduersus ma-  
trem recalcitrant, præceptoribus insul-  
tant, profectonam loquam obiciunt, &  
tanquam minus paedagogicum vituperant,  
quod potius laudare deberent. 411  
Insecta vt muscae, papilioes, &c. quomodo  
mouentur? an aliquid musculis analogum  
habeant? an spiritu influente mouentur si-

ne musculis, vt nos moueri consili *Aristote-*  
*les.* 303  
Insecta non indigebant musculis, quia molem  
corporis auxiliens, propter exiguitatem cor-  
poris. *ib.*  
Insectorum, vt apum & culicis motus admi-  
ratur *Plinius.* *ib.*  
Institutio à puero, in Medicina admodum ne-  
cessaria est. ex *Hippocrate.* 411  
Instrumentorum varia supellex requisita, ad  
adminstrandam Anatomem. 62  
Inuestina priusquam venae Portae & arteriae ce-  
lica distributio perquiratur, quare demon-  
strari debent. 691  
Inuestina ventriculi mancipia. 99. vnde sic di-  
cta. *ibid.*  
Inuestinorum situs ad bene medendum scitu oc-  
cessarius. 100  
Inuestina crassa in homine superiora sunt.  
*ibidem.* nun sunt ventriculo continuata.  
*ibidem.*  
in ventriculi partibus non sunt numeranda;  
ex *Fernely* et *Galen* sententia. *ibid.*  
Inuestina longitudinem corporis septies æ-  
quant. *ibidem.* earum longitudo est cubito-  
rum fere tredecim. *ibid.* quinam est vfus il-  
lus longiorinis. *ib.*  
Inuestinorum diuisio in tenuia & crassa. 101.  
eorum numerus apud veteres incertus. *ib.*  
Inuestinorum membranae, quor sunt. *ib.*  
Inuestinis robur addunt fibrae multiplices.  
101. eorum motus peristalticus quomodo  
fiat. *ibidem.*  
Inuestinum primum est Duodenum: secundum  
Icium, quare sic dictum, quare rubicun-  
dus. 102  
Inuestinorum nomen recensetur. *ibid.*  
in fabrica Inuestinorum aliquid immutatum  
fuisse existimat *Syluius*, propter cæcum. 103  
Inuestina peristaltico suo motu, instar magni  
lumbri, aut longioris serpentis motu cien-  
tur. 4. eorum motus peristalticus duplex  
est. *ibid.*  
*Ioannes Veslingius* postremus Anatomicus, de ro  
Anatomica scripsit. 805  
quibus nominibus displicet *Rolando.* *ibidem.*  
est doctus & peritus in Anatomicis. 806.  
multa desumpit ex *Rolando.* 810  
*Iosias Rex Iudaorum*, cum vellet idolorum tem-  
pla contra Dei legem exstructa profanare, &  
omnem loci religionem adimere, mortuo-  
rum ossa in illa intulisse scribitur. 419  
*Iambertus* docet humores non putrescere in ve-  
nis. 381  
Iris in Oculo, quid est ex *Galen.* 176  
ex septem circulis sibiipsis ordine insidenti-  
bus, crassitie tamen & colore discrepantibus  
constatur. *ibid.* eorum septem circulozum o-  
rigo. *ibid.*  
Iris in oculo limbus est pupillae variegatus, di-  
uersicolor in diuersis hominibus, cui atrox  
est circulus ciliaris. 184  
in Michiade notha, pyrotica ad flexuram natium  
appiunt debent, & illæ partes illi empla-  
stro epistastico. 147  
in illa ueni rigineur ab hypogastricis venis  
& arteriis superterentis, quare non possunt  
exsiccati necui, nisi exsiccatis vasis hy-

pogastrix per multiplices venarum sectiones  
 brachiorum & pedum, & sanguis  
 marginibus ansepis admotus. *ibid.*  
*idem.*  
 Isthmus in faucebus est Laryngis & Pharyngis  
 coniunctio, etc. 192  
 Isthmus apud Geographos nihil est aliud quam  
 arcta terra inter duo maria. *ib.*  
 Indes non tam mederi quam fallere *Chrysianus*  
 didicertunt. 762  
 Indes homini cadaveris inspectio & attrecta-  
 tio erat interdicta. 15 & 45  
 Indes Anatomice doctrinæ studium excolu-  
 runt. 20  
 Indarum quorundam studium Anatomicum  
 probatur per quasdam observationes. 21  
 Indas non licebat humanum cadaver attinge-  
 gere.  
 Indus fuit, vel *Arabis*, Author libri *de natura*  
 & ordine cuiusque partis, qui inter spūtos  
 Galei libros numeratur. 45  
 Indes fuorum cadaverum ossa adhuc hodie al-  
 servant. 437  
 Iugularis vena externa, an possit in apoplexia  
 tuto secari 223 quoloco est aperienda. *ib.*  
 Iugulares, quare dicuntur *Lysa*. *ibid.*  
 Iugularium venarum aperiatio, an sit periculosa?  
*ibid.*  
 Iugularis interna non potest sine periculo lau-  
 ciari, neque secari. *ib.*  
 ex Iugulari externa aperta citissime depletur &  
 exoneratur Cerebrum. 224  
 Iugularis externæ diuisio. *ibid.*  
 Iugularis vitiosque internæ & externæ commu-  
 nis. *ib.*  
 Iugulares venæ continuantur & expanduntur  
 in arterias intra canales Cerebri. 255  
 Iugulares venæ nullæ per meninges dispergun-  
 tur. 757  
 Iugularis externa nullas habet valvulas, sed in-  
 terna tantum. 757  
 Iugularis interna à veteribus in apoplexia tu-  
 to & salutariter incisa non fuit, quia profun-  
 da est, nec tactu aut visu deprehendi po-  
 test, quia tegitur musculo mastoideo, &c.  
 703  
 Iulius Alexandrinus homini corporis disse-  
 ctiones excolat habuit. 36  
 Iulius Cæsar Aramius supratriginta annos A-  
 natomen excoluit. 37  
 Iulius Cæsar Placcinius elegantissimis ico-  
 nibus eam Anatomicam locupletavit. 33  
 Iulius Iulianus quid scripsit in Anatomicis.  
 34  
 Iupiter nequit omnibus placere, nullaque li-  
 tera adeo perfecta reperitur, quæ leuam a-  
 liquam non patitur. 643  
 Iuramentum enim necis reum damnant, qui gra-  
 uiam sepielient, non prius extractio Fortu.  
*ibid.*

## L

Labia & labra, quomodo inter se differant?  
 281  
 Labium est nomen homonymum. *ibid.*  
*idem.*  
 Laborum substantia & plures usus. *ibid.*  
*idem.*

Laborum motus sunt admitabiles. 109  
 Laborum multum, quoniam, & quæ sunt  
*ibidem.*  
 Labæ venæ mesenterij, detectæ ab *Affelio*.  
 108 eas subodorati sunt *Erasistratus* & *Galenus*.  
*ibidem.* eas ridet & eludit *Jacobus Præ-*  
*microsius* validis rationibus. *ibid.*  
*idem.*  
 Labæ venæ *Affelio* si admittantur, perit illa  
 Anasomosis venæ Causæ cni porta. *ibid.*  
*idem.*  
 Labes quare dicuntur tenuia intestina. 110  
 Lactis materia non suppediat mammae per  
 vapores è pancreate, aut ventriculo elatos.  
 311  
 Lactymalis puncta quæ sunt. 272  
 Lactymales fistulae quomodo generentur.  
*ibidem.*  
 Lapidem bene politum nunquam tenere mo-  
 uere oportet. 148  
 Larynx ex quinque cartilaginibus componitur.  
 291  
 eorum descriptio. *ib.*  
 Larynx minor sit in mulieribus, quam in vi-  
 ris. 292  
 Larynx habet musculos proprios. *ibid.*  
 Laryngis vox *Hippocrati* tempore nondum e-  
 rat in usu, sed in pharynx. *ib.*  
 Laryngis musculi quatuordecim. 313  
 Laryngis cartilagine quinque constanti debent.  
 727  
 Laurentius; Scholæ Medicæ Parisiensis alum-  
 nus Henricum 11<sup>m</sup> hortatur, ut professorem  
 Anatomicum & Botanicum creet Parisi.  
 64  
 Laurentius, vir doctus, voluit operibus (ingenij)  
 sui fretus, aliena melle distendere, & suavia  
 librum inscriptionibus variis Auditorum re-  
 fecisse, ne in maiorem molem excresceret,  
 contentus fuit diguimad fontes incedidisse,  
 & Auditori verba præcipue produxisse. 624  
 Laurentius multa noxia pollebat in suo opere  
 Anatomico, & veteribus incognita, quod  
 non preliit. 626  
 Laurentius figuræ Anatomice non sunt aliis me-  
 liores. *ib.*  
 Laurentius præfationes vndenam desumptæ fne-  
 runt. *ib.*  
 Laurebergius non fuit ignobilis Medicus. 688  
 quamvis *Thomas Bartholinus* Filium eum ap-  
 pellat *Embraticum Anatomicum*. *ib.*  
 Laurebergius non est peritus Anatomicus.  
*ibidem.* tinnit & falso reprobendit *Lauren-*  
*tium*. *ibid.* ex picturis, vel ex dissectionibus  
 animalium Anatomem didicit, vt *Bartholinus*.  
*ibid.*  
 de conformatione partium in *Laurentio*, nihil  
 reprehensione dignum offendit, quia non in-  
 tellexit, nec obtinuit. *ib.*  
 Laurebergius inique agit cum *Laurentio*. 321  
 ipse plurimum peccavit in Anatomicis suis  
*ibid.*  
 Lienem frustra conditum scripsit *Erasistratus*.  
 133  
 Lienem *Raffus Ephesus* ignauum membrum,  
 & nullo fungens ministerio vocauit. *ibid.*  
 Lien niger obliuatur in temperaturis calidis,  
 siccisque animalibus. *ibidem.*

Lien humore melancholico non nutritur.  
 134  
 Lienis excrementum quod fertur ad ventricu-  
 lum, quoniam vilius habet: an ad excitandam  
 appetentiam, ut volunt *Greci*? an ad robo-  
 randum ventriculum, ut imaginantur *Ara-*  
*bici*? *ibid.*  
 Lien nun potest esse humoris melancholici fe-  
 des & vasculum. *ibid.*  
 Lienem esse spongiam & emunctorium humo-  
 ris melancholici crassi & faeculentum primus  
 voluit *Galenus*. 135  
 Lienosorum symptomatica Corisplum appetere  
 & lacerare videntur. *ibid.*  
 Lienosis palpitatio Cordis admodum familia-  
 ris. *ibidem.*  
 Lien non habet plexus venarum & artiarum.  
*ibidem.*  
 Liene carent animalia quae pulmones nullos  
 habent, aut exiguos, vel exiguo praedita sunt.  
*ibid.*  
 Lienis officium legitimum est hematosi opitu-  
 lant. *ibid.*  
 Lienem aequae fontem vocavit *Hippocrates*.  
*ibidem.*  
 Lien de ventriculo aquam exsugit, ubi homo  
 bibit amplius quam par est. 136  
 Lienis morbi quatuor defectui ab *Hippocrate*,  
 ortum dicunt ab aliis humoribus assumptis  
 à Liene. *ib.*  
 Lien affectum indicat vinarum tenuium mi-  
 nus, in longis febribus erraticis. *ibid.*  
 Lienem multo sero sciatere inde liquet, quod  
 melancholici sero magni putatotes, & co-  
 piose surgant. *ibid.*  
 Lienem quae conducunt medicamenta, debent esse  
 hydragoga. *ibid.*  
 Lien per remedia exoneratur. 136  
 Lien ab immodico aequae potu laeditur & intum-  
 escit. *ibidem.*  
 Lienosis nihil magis prodest quam potus, &  
 perierit aequae parsimonia. *ibid.*  
 Lienis vitio nascitur hydrops. *ib.*  
 Lienem magnum habent animalia, quibus pul-  
 mones sunt magni, & multum potus delectan-  
 rant. 137  
 per Lienem, aequae medicatae magna copia as-  
 sumpta cito sciuntur. *ib.*  
 Lien saepe vitiatum apparet in hydrope, & aliis  
 affectibus, qui ab Hepate manare credun-  
 tur. *ibid.*  
 Lien Hepatis officio quandoque fungitur  
*ibidem.*  
 Lienem adulterinum Hepar vocavit *Aristoteles*.  
*ibidem.*  
 Liene quae carent animalia, bipartitum habent  
 Hepar. *ib.*  
 Lien quomodo verè dici possit Hepati opitula-  
 ti. *ib.*  
 Lien ab *Aristotele* secus sinistram appellatur.  
 138  
 Lien in homine maior, quam in ceteris anima-  
 libus. *ibid.*  
 Lien est emunctorium Hepatis, & recondito-  
 rium crassioris sanguinis, ex propria senten-  
 tia *Rulani*. 139  
 Lien etiam chylosi infertur. *ibid.* & 140  
 Lien tumet & turgit, perierit in hypochon-

driacis. 115  
 In Lienosis hydroporis turgit & murmur so-  
 lent excitari, statimque frigida hausta est.  
*ibid.*  
 Lienosis natium haemorrhagiae superueniente la-  
 oantur. *ibidem.*  
 exempla duodecim *Hippocrate*. *ib.*  
 Lien habet suam arteriam propriam. 115  
 Lien unde dicitur. 119  
 Lienis parenchyma inflammatum palpitare de-  
 prehenditur. *ib.*  
 Lien & caput maximè sunt morbis obnoxia.  
*ibid.*  
 Lien mollis ac fibrosus. *ib.*  
 Lienis temperamentum calidum est. 130  
 Lienis partes & magnitudo. *ib.*  
 Lienis minoribus quibus corpus floret. *ib.*  
 Lienis magnitudo facit *Sarbinum*. *ib.*  
 Lienis paruitas, tam est in vitio, quam ipsius  
 magnitudo. *ibidem.*  
 Lien parvus semper est praefectendus maior.  
*ibidem.*  
 Lien quartae linguae viscus dicatur. *ib.*  
 Lienis timor medicamentorum usu tutius im-  
 minuitur, quam partis veteratione. *ibid.*  
 Lien humanus longus, & angustus. *ib.*  
 Lien est subtilior, & rectore nigrior semper  
 apparet. *ibid.*  
 Lien rotundus in cornigeris. 131  
 Lien ruptis ligamentis interdum visus est ad  
 hypogastrium prolapsus supra venter, qui  
 per biennium mole speciem Medicos fecelle-  
 rat. *ibid.*  
 Lien aliquando locum permutat. *ib.*  
 duplex aliquando visus est, *ibid.* eius arteria  
 notatione digna. *ib.*  
 Lienis, quare data arteria, tam insignis. *ib.*  
 Lien per quas vias sese exoneret. 131  
 Lienis vasa obseuta. *ib.*  
 Lien, an possit tunc eximi? *ibid.* cursoribus  
 iurati dicunt. *ibid.*  
 Lienem per infirmionem exemptum mentiantur  
 quamplurimi Empirici. *ib.*  
 Lienis vitio periculosa, nec potest fieri sine vul-  
 nere. *ibid.*  
 Lienis vulnera omnia sunt lethalia. *ibid.*  
 In Lienis antiquis affectibus sinistram hypo-  
 chondrium veteres crebant. *ibid.*  
 Liene qui priuantur, postea denteris & infeli-  
 cius viuunt. 133  
 Lienis actio an sit vitiosa. *ibid.*  
 Lienem per accidens tantum esse necessarium  
 putavit *Aristoteles*, primus ex antiquis.  
*ibid.*  
 Lingua pulcherrima omnium in corpore par-  
 tiu, sermonis fons & dux gustusq. index. 136  
 Lingua loquelae mater, annus nuntius, gustum  
 custodiens, minutis denum septemculis, et  
 ex *Democrito*. *ibid.*  
 Lingua infirmitas tanquam profanum men-  
 brum non adhibebatur. *ibid.*  
 Lingua quid melius, lingua quid perius eadem.  
*ibid.*  
 Linguae elogium varia. *ibid.*  
 de Lingua potestate elegans & facetus *Apolo-*  
*gus*. *ibid.*  
 Linguae referenduse est partium peineipatus.  
*ibidem.*



Lingux inspectio, an faciat ad morborum cognitionem 257  
 Lingux finis pericoposissimus. ib.  
 Lingux structura ex musculis, &c. ibid.  
 Lingux humanæ figura pyramidalis. ibid.  
 ex Lingua nulli suulheres loquaciores. ib.  
 Lingux diuisio, & vasa. ib.  
 Lingux & pudendis tantum Natura frenulum indidit. 208  
 Lingux frenum in canibus degenerat in vermem, & est causa tabies. ib.  
 Lingua vnde dicta, eius actiones. ib.  
 Lingua est vocis dearticulatz organum. ibidem.  
 Lingux motus sunt inexplicabiles, propter admirabilem eius volubilitatem. 311  
 Lingua quatuor habet mucus. ibid.  
 Lingua pri. prio motu cietur. 645  
 Locus vacuum inter pupillam & corneam in quo concretus humor, qui lussationem patit. 275  
*Lu. iunioris Vnguez & Bohemia Rex*, siue cuticula natus, iam adolefcentis canos albat capillos. 78  
*Lu. iunioris X. Galliarum Rex* permisit *Medici Parisiensis* rutilent capite damnam, & calculo laborantem, viuum in perineo secare, vt calculi vesicæ extrahendi modum perquirerent, anno 1474. 41  
 Lumbi sunt carnes ad flumina, vt possint moueri & incuruari ad generationem 90 10 11a est sedes libidinis. *ibidem*. supra lumbos immotus tota spina mouetur. ibid.  
 Lumbi vnde sic dicti 495. quinque constant vertebra. ib.  
 Lumbi Os Sacrum quare subternitur. 496

## M.

**M**aledictus à Deo, qui pender in ligno. 41  
 Mantricor bellua *Indica*, triplici dentium serie prædita est, ex *Aristotele*. 482  
 Manus habent mulieres, vtri mammillas, reliqua animalia habent vbera. 208  
 Mammæ vnde dicuntur. *ibidem*. quæso sine viuis & mulieribus datæ sunt & constructæ. *ibidem*.  
 Mammæ non fuerunt additæ pectori ad Cordis tutelam. ib.  
 Mammarum vtilitas secundum *Phanarium*, ex *A. Gelio*. ibid.  
 Mammarum structura. 10 quare geminz. 209.  
 earum magnitudo nimia. ibid.  
 Mammæ in pectore solus habet homo, vesperilio & elephas. ib.  
 Mammæ, quare in pectore positz. ib.  
 Mammæ an habeant arterias? 20  
 Mammarum cum vtero commercium perficitur per anastomum mammarum cum epigastri- ca. ib.  
 Mammæ habent maiores. quæ per incalcescentiam veneream feminæ factæ sunt. ib.  
 Mammarum neui vnde ortantur? ib.  
 Mammarum venæ olim fecabantur ab *Hippocrate*, in partium thoracicarum inflammationibus & doloribus, vt in pleurinde & pneumonia. 214

Manum instrumentum sapientiz solus homo adeptus est. 9  
 Manus tota in tres partes diuinitur, vel potius in quatuor. 303  
 Manus extremæ diuisio 309  
 Manus duplici modo accipitur. ib.  
 Manus vnde dicta. ib.  
 Manus homin. diuisa fuisse indicauit *Aristoteles*, quia est animal sapientissimum. ib.  
 Manus est instrumentum apperceptionis. ib.  
*Mariscus Medicus Parisiensis*, attis Anatomiz & dissectionis author præclarus. 63.  
 fuit auditor *Silui*, & Scholæ *Parisensis* Medicæ oculus. ib.  
 Mares est, quod in alio generare potest. 151  
 Mares pro feminis ab impositis aliquando haberi sunt. ib.  
 Mares superueniunt citu generosæ gallinæ ex paria semel de gallo victoris. 153  
 Mares in feminas lue speciei nunquam seuiunt. 171  
 Mas & femina quomodo differant. 172  
 Mas in procreandi actione voluptate maiori afficitur, quam femina, licet *Tireas* aliter censuerit. 175  
*Maris* dolebat plurimum, dum secaretur vasis, & curationem morbo crudeliorem esse dixit, nec passus est in altero erure varices percutari præ doloris acerbitate. 69  
 Maxille inferioris musculi. 318  
 Maxille duabus constat facies, superiore & inferiore. 476  
 Maxilla vnde dicta. ib.  
 Maxilla superioris quor sunt ossa. ib.  
 in eorum numero constitundo, quare incertus & inconstans fuit *Galenus*. 477  
 in Maxilla superiore sunt decem forata. ib.  
 Maxilla superior in homine, & alia animalibus est immobilis exceptis pitaco, crocodilo & phœnicoptero. *ibidem*. quare in homine est stabilis. *ibidem*. ex pluribus ossibus constat. 478. eorum enumeratio accurata. *ibidem*.  
 Maxillam inferiore ex omni animalium genere homo pro magnitudine corporis breuissimam habuit, quare. 485 eius structura. ibid.  
 vasa est aliquando quæ omni penitus articulo & motu carebat. ibid. an constet ex duobus ossibus. 486  
 Meatus quidam *Aristoteli* notus, qui ab ante in palatum tendit, cuius beneficio sardi aperto aures audiunt. 472  
 Meatus quidam ab oculis in palatum vsque protenditur, per quem eorum excrementa euacuantur. 475  
 Meatus ille prope maiorem angulum oculi situs est. ib.  
 Meconium, quid est. 387. & 410  
 Medendi methodus legitima per venæ sectionem, ex Circulatione sanguinis clare innotescit. 384  
 Mediastinum dicitur reduplicata pleuræ reflectio. 316  
 vnde sic dictum. ib.  
 Mediastini cavitatis quam late pateat. 217  
 Mediastini vasa. ib. euident vasa. ibid.  
 Mediastinum nil est aliud, quam Pleura vitæque reduplicata. 702

Medici *Romani Germanorum* militum corpora  
dissecarunt. 45  
Medicorum partium cognitionem ad tria omnino  
artis opera trivocat, morborum dignationem,  
futurorum praenotionem, & curationem  
51  
Medici prisci domesticis corporum dissectionibus  
suos pueros docebant, & omnibus Medicinæ  
partibus doctrinam Anatomicam inferebant.  
*ibid.*  
Medicus oculos & uniuersum corpus nosse de-  
bet, si velit perfectè mederi. 46  
Medici vix hodie discunt, quæ ad manus ope-  
rationem pertinent. 52  
Medici contemplatores qui dicendi. 56  
Medici *Periphrasice* ante *Zechum*, senibus, ubi  
non licet tentare lapidis extractionem, per-  
tinet sectionem consulere, tanquam emissarium  
continuum urinae absque dolore aut le-  
ui. 149  
Medici elegantiores, à vulgo Medicorum dis-  
tincti, passim gestabant. 423  
Medici osseum larynem terribilamentum  
non debet commoueri. 439  
quod *Medicorum* est, promittunt Medici. 567  
Medici quamvis vilitates percipiat ad bene  
medendum ex Circulatione sanguinis 582  
à Medicis petitis status est consilium petere,  
inquit *Ar.oteles*, quam à libris repetere  
suum curationem. 586  
Medici veteres tempore *Galen*i, ante quartam  
diem detrahebant sanguinem quo crasso  
tunc remedium nefas erat administrare.  
501  
Medici redarguit *Galenus*, nimis sedulos  
& officiosos, in remediis importunè & im-  
tempèstivè adhibendis, ubi quiescendum ar-  
rat, quod perturbat motus naturæ, impe-  
ditque crises. 600  
Medicus ex *Pido Viduo* plures sanatur agri-  
tantes, si sciet se naturæ ministrum esse.  
*ibidem.*  
Medici, quid discit ex Circulatione sanguinis?  
601  
Medici veteres erant Philosophi, nec tracta-  
bant mulierum morbos, quorum cura obste-  
tricibus erat demandata. 756  
Medicine vulgaris diuisio in tres partes. 38  
Medicinæ prior pignus ac fundamentum est An-  
atome. *ibid.*  
Medicinæ principium est natura hominis. 39  
Medicinæ duæ sunt partes, contemplatio & a-  
ctio. 46  
Medicinæ partes duæ eximæ, Anatomie & Chi-  
rurgia. 51  
Medicinam qui iam prouecta ætate discabant,  
*Antiqui* dicebantur. 52  
Medicina sicut possessoribus & artificibus mul-  
tum laboris & molestiarum exhibet, ex  
*Hippocrate*. 56  
Medicina tunc corrupta fuit, cum ad verba  
garrulitatemque descendit: idem dictum ve-  
lim de Anatomie. 58  
Medicæ professionis magnitudo unicuique li-  
berum permittit arbitrium, quod sentire ve-  
lit de rebus probabilibus, aut verisimilibus.  
134  
Medicus scire debet & callere Musicam, ex *Gal-*

*ieno*. 105  
Medici tempore *Galen*i, ad curam visque detenti  
erant, valetudinis suæ consulentes, ex *Galen*o.  
154  
Medicina potissimum indiget institutione sub  
praecipitis. 421. eius rei ratio adfertur  
necessaria. *ibidem.*  
in Medicina, ut in bello, an liceat bis peccare.  
*ibidem.*  
Medicis hoc vitii genus videtur infirmum & con-  
genitum, ut perpetuo inter se dissident odio,  
& invidentiâ plusquam canina felo perpe-  
tuo mordeant, atque conficiant, praesertim  
si in eadem urbe eademque vicinia moren-  
tur. 422  
Medullæ multiplex acceptio. 446. an sit ali-  
mentum, an excrementum ossium. *ibid.*  
Melancholia à Medico improptè appellatur  
huiusmodi melancholicus, cum sit nomen mor-  
bi. 771  
Melancholicorum somnia sunt, & effectus ima-  
ginationis laeæ, cum vetule se subigi affir-  
mant à demone. 835  
Membrana communis Musculorum quid est.  
82  
eius usus. *ibid.*  
musculos uniuersi corporis circumdant instar  
vinculi & inuolueri communis. *ibid.*  
est etiam adipis, qui totum corpus ambit  
fundamentum. *ibid.*  
ibi desit, ubi adeps deficit, ut in fronte, ca-  
pite & facie. *ibid.*  
Meninges Cerebri vnde sic dictæ. 253. & quid  
sint. *ibidem.*  
quæ Martes vocantur ab Arabibus. *ibid.*  
ex Meningibus Cerebri sola externa pulsatorio  
motu cietur. 255  
Meninges crassæ, siue dura mater describitur.  
254  
alterius Meningis, siue piaë matris Arabum de-  
scriptio. 256  
Mens hominis formarum præstantissima. 7  
Mensitur sanguis in mulieribus, tam vacuis,  
quam prægnantibus per cervicem uteri eua-  
duatur. 185  
Mentula vnde dicta. 158  
*Mercatus ex Laurentio* sua Anatomica de prom-  
psit. 32  
*Astercialis* censuram fecit accuratissimam li-  
brorum magni *Hippocratis*. 593  
Meticidæ verus qui inhabitant, cur oculis ni-  
gris nascantur. 270  
Mefarsicarum venarum usus excutitur. 122  
de illo vsu libellum ex professo scripsit *Ca-*  
*stus*. *ibid.*  
Mefenterium est peritonæi soboles. 107  
Mefenterij & lumborum sympathia, paraly-  
seos & nothi doloris colici murtæ successio,  
mefenterium esse peritonæi sobolem mani-  
festè demonstrant. *ibidem.*  
Mefenterij diuisio ex *Galen*o, in duas partes.  
108  
Mefenterium tria habet vasorum genera.  
*ibidem.*  
in Mefenterio novum & quartum genus vaso-  
rum supet inuenit *Acellus*. *ibid.*  
ex vasis subodoratus fuerat *Erasistratus*. *ibid.*  
ut & ipse *Galenus*. *ibid.*

Mefenterium, istione glandularum, quibus totum factum & factum est, radix est & fundamentum strumarum. *ib.*  
 Mefenterium exquisito sensu praeditum esse multoties observatur *Riolani*. *ibid.*  
 contrarium sensu *Boerhaave*. 109  
 Mefenterij usus ex *Aristotele*. *ibid.*  
 Mefenterium *nucula* *Medicorum* iute perhibetur. *ibid.*  
 in eo multi morbi delitescunt. *ibid.*  
 Mefenterij morbus exacerbat. *ibid.*  
 Mefenterici rami divisio in quatuor furculos. 113  
 Mefenterica arteria describitur. 115  
 Mefenterium, an habeat quatuor genus vasorum, quae dispersa iocunctis applicantur ad exsugendum chylum, quem deducant ad cauum Hepatis prope venam portam. 46  
 Mefenterium triplex, quare constituat *Galenus*. 692  
 Meteorismus abdominis post partum, à flaribus in Epiploa conclusis; fortibus dumtaxat chalaribus & resolventibus discutitur. 98  
 Methodici repudiabant Anaxagoram. 36  
*Metabolicorum* Medicorum *Cyclis* medicatiu longe differt à Circulatione sanguinis. 603  
 quoniam erat illa medicatio. *ib.*  
 Methodici erant *Calvus Antellanus*, & *Ostianus Heratannus*. *ibid.*  
 Methodus duplex docendae Anatomiae, analytica & synthetica. 67  
 Methodi analyticae triplex ordo constituitur. 68  
*Michael Angelus* pater, ut *(brissum crucifixum)* morietem depiogeret, hominem tenuit, & tuci affixit. 43  
*Michael Marascotus*, *Medicus Parisiensis*, post *Sylvium* praecceptorem, nomina musculi imposuit. 742  
 Microcosmus, quare dicatur homo. 244. 245  
 Microcosmus est caput hominis. *ibid.*  
 Microcosmus in capite eandem continetur. 250  
 Miraculosum est, & paxit Naturae legem, quod ex latere nostri *Saluatoris* lancea perfosso, illico sanguis & aqua effluxerint, cum paucus humor in viuentibus intra Pericardium coarctatur. 279  
 Miraculi usus probatio ex sacra Scriptura. *ibid.*  
 ex *Carpo* & *Christiano*. *ibid.*  
 in Miraculi usus fide citantur *Laurentius* & *Ron leletius*. *ib.*  
 Miraculosum esse eam aquam demonstrat *Calvus*. *ibid.*  
 Mola catta veterum geocia, iuxta ipsius suodum in valis permaribus, ea opinione *Atarguerdis*, ostendit aliud, quam tectus so tubi veteri. 180  
 eius rei exemplum refertur. *ibid.*  
 & 181  
 Molares dentes, quare sic dicti. 483  
 eorum numerus. *ib.*  
 prodeunt interdum cum magis cruciatibus. *ibid.*  
 Molares dentes omnes mutantur & renascuntur, praeter gequinos, qui casidit, novamquam regenerantur. *ib.*  
 Mollitudo lenitudo & humiditatis soboles

est. 316  
*Adamas* io hominis opificio reptehendebat, quod fenestratum ooo habebat pectus. 170  
*Adamas* in pulcherrimo Veneris corpore, nihil reptehensione dignum invenire potuit praeter Lindalias crepitantes. 170  
 monachi nomen hodie est odiosum. 813  
 monstra, ut corporum, sic animorum vitia *Platon* appellavit. 80  
 monstrum quid est. *ib.*  
 monstri *Lucretii* nati descriptio. 831  
 monstra quoniam possint nominari. 832  
 monstra in specie, ordinem naturae magis perueunt, quam mostra in individuo. *ibid.*  
 Monstrorum non sunt eae species, proinde nec essentiales, seu specificae differentiae. 833  
 Monstra omoia ad duo prima genera reduci possunt. *ibid.*  
 Monstrum dicitur, aut io specie, aut io individuo. *ibid.*  
 Monstrorum causae secundum speciem. *ib.*  
 Monstrorum vatorum exempla. 834  
 in Monstrorum catalogum au sint *Hermaphroditi* referendi. 835  
 Monstrorum causae in individuo. 837  
 Monstra an interfici debeant ea Romanorum praeccepto. 839  
 Monstra io profluente abieciuntur, ex legibus duodecim tabularum. *ibid.*  
 Monstri Fetus *Athenis* io mare proliciebantur. 839  
 intermissam hanc consuetudinem *Constantinus Imperator*, monstrorum frequentia perterritus renouavit. *ibid.*  
 eius legis rationes tres afferunt. *ib.*  
 Monstrum in specie videtur protinus interficiendum. *ib.*  
 Monstra an aliquid triste minentur. 840  
 Morbi specie causaeque conveniunt, solis dumtaxat partibus affectis differunt, ex *Hippocrate*. 840  
 Morbilli. Vide disionem, *Varola*.  
 Morborum ferè omnium munera residet in prima regione corporis, atque febrium intermittentium sedes ibi collocatur. 602  
 ut io Morbus signum est inianiz festucae colligere, sic deliniant ingenij, non philosophantis iudicium est, in minutis quibusdam colligendis occupari. 687  
 Morbus quid est. 77  
 Morbi cuticulae quoniam. *ib.*  
 Mors inevitabilis ab etosis vasis cranialibus. 165  
 Mortis meditatio quid est, ex *Asclepiade* apud *Galenum*. 430. quid ex *Platone*, *Pythagora*, *Dino Hieronymo*, & aliis. 431  
 cum Mortuus nonnulli larum luctantur. 613  
 Motus roscus musculorum perpetuus est impossibilis, ea *Galeno*. 289  
 Motu ignorato naturam ignorari necesse est. 301  
 Motus est quaedam actio, qua musculi prior habitus immutatur. 302  
 motus causa efficiens est anima ab appetitu mota, cui triplex instrumentum famulatur, Cerebrum, nervus & musculus. *ib.*

- Motus quomodo fiat. *ib.*  
 Motus infectorum, qualis sit. 303  
 Motus quorundam musculorum peculiares, admirabiles, inexplicabiles. *ib.*  
 Motus diaphragmatis causa certa non potest assignari. *ib.*  
 de Moribus dubiis & obscuris musculorum, librum scriptum pollicetur *Galenus*. *ibid.*  
 Motus vite tonicus, quid est. *ib.*  
 Motus Capitis duplex est, rectus & obliquus. 489. quomodo fiant isti motus. *ibid.*  
 Motus obliqui dux sunt differentiarum. 490  
 de Motu Capitis, tam recto, quam obliquo, conclusio *Riolani*. 491  
 Motus fieri debet super aliquo quiescente. 512  
 Mulier postremum fuit opus *Dei* tanquam perfectissimum. 171  
 Mulierem iniquius est occidere quam vitulum. *ibid.*  
 Muliebris corporis Anatomie, quare necessaria. *ibid.*  
 Mulierum quicquid monia apud *Socrum*, de Medicis, qui sunt valde solliciti in discernendis & curandis virorum affectionibus, neglegentes admodum in morbis mulierum inuestigandis, atque mediandis. *ibidem.*  
 Muliebre corpus à virili quomodo differat. 172  
 Mulier unde dicta 172. quomodo ratione substantia differat à viro, ut & ratione temperamenti. *ibid.*  
 Muliebris corporis à virili differentiarum aliarum recentiorum quamplurimarum. *ibid.* & 173  
 Mulieres breuioris sunt vite quam viri. *ibid.*  
 Mulieres superantur à viris in facultatibus animalibus 174. ut & in Vitali. quare consistit in respiratione & pulsu. *ibid.* quemadmodum & in Naturali. *ibid.*  
 Mulierem non tenent Tenonem interduo, ut vulgè *Aristoteles*. 176  
 Mulier & viri coniugium *Pythagoras* apertè à *Platonis* archè dicitur. 177  
 Mulieribus nulla fuit pensata, quamvis *Galenus* admittat. 179  
 Mulieres an habeant semen proprium, profluentem, & necessarium ad procreationem 181  
 Mulieres carent illo passium seminalium apparatu, qui requiritur ad productionem seminis, ut in viris. 182  
 Mulier sola sine viro an possit in se concipere Fœtum, sed pusillum, ut voluit *Falesius*. 182  
 Mulieres semen habent secundum, ex opinione *Hippocratis* & *Galenus*. 183  
 Mulier an castrari possit? *ibid.*  
 Mulieres ab exemptis testiculis, vel detracto vtero, in maximum vite discrimen adducuntur. *ibid.*  
 Mulieribus non possunt testes castrari cum securitate, propter connexionem quam habent cum aliis partibus. *ib.*  
 Mulieres, eorum primis gestationis mensibus, de dolore semotum interiorum conquiescant. 184  
 Mulieres hysterice sunt splenitice & melancholicæ, vicissimque splenitice evadunt hysterice. 185  
 mulierum *Turcarum* lascivia. 189  
 mulier quæ non peperit, quare menses non erumpant, ex *Hippocrate*. 196  
 Mulieres easdem partes generales non habent, quas viri obtinuerunt, & plusquam situ differunt. 200  
 Mulieris partes genitales diuiduntur in feminales & veterinas *ibid.*  
 mulieres sunt inexplicabiles & voraces. 101  
 Mulier, ex *Platone*, est animal intemperans, quod legibus regi non potest. *ib.*  
 Mulieres quomodo differant à viris, ratione partium genitalium. 152  
 Mulier perfecta mutato sexu in virum non potest degenerare. 153  
 Mulierum dissectionibus Austriacis oblectatur *Riolanus*. 167  
 mulier deposita tunicâ vetecundiam exuit. *ibidem.*  
 mulieris partibus genitalibus inspectis, nemo est adeo stupidus & hebes, qui voluprate quadam animi non perfundatur, dum innotuit sui ortus incunabula. 168  
 mulier si occidat leonem furibundum, qua arte ab eius furia se tuatur? *ibid.*  
 mulier est admirabilis in partibus verendis, quasi reuerendis. *ibid.*  
 mulier habet corpus delicatissimum, carnem tenuellam, cutim politam, &c. *ib.*  
 muliebris corporis elegantia enarratur. 169. & seq.  
 mulierum manus ipsos manes movent. 170  
 muliebris vicius diuissima fasulla. *ib.*  
 muliebre corpus quantum dignitate virili præstet. *ib.*  
 mulieris formosæ patres omnes versibus descripsit à *Ioanne Neufano*, in *Sylva nuptiali*. 170  
 mulieri *Deus* concessit omne ornamento. *ibid.*  
 mulieres audacissimas amoribus à *Demonibus* fuerunt adamatz. 171  
 mulieres quædam barbata fieri certum est. 178  
 mulieribus adules barba consurgit, ex suppletionem mensium. *ibid.*  
 Mulierem hunc admisisse testis est *Herodotus*. 184  
 mulieres quædam malunt canibus & cerentiptheis congeri quam viris, cuius rei exempla subiiciuntur. *ib.*  
 mundi mappa veteres depictas habebant. 33  
 muscam ratione sui motus, Soli anteponeere non dubitavit *Diogenes Laërtius*. 303  
 musculi infectio eius origini semper opponitur. 89  
 musculorum abdominis administratio Anatomica. *ibid.*  
 musculorum cognitionem vtilissimam esse probatur. 197  
 musculorum Anatomem Chirurgo necessariam esse fatetur *Auerroes*, sed inutilem medico, ideoque refellitur. *ib.*  
 musculus quid est, & unde dictus? *ib.*  
 musculi proprium opus est contrahere. *ib.*  
 musculi an sit voluntarij motus instrumentum. *ibid.*  
 musculi omnes membranam habent propriam ac peculiarem. 297

Musculus nervi beneficio mouetur & sentit. 193  
 Musculus nullus mouetur, qui idem non sentiat. *ibid.*  
 Muscoli vnico habent fibratum genus, nempe rectum. *ib.*  
 Musculi non denominantur à fibris, sed à situ obliquo & transuerso. *ibid.*  
 Musculi caput nullum ligamentum subintrant. *ibidem.*  
 Musculi dux sunt partes essentielles & propriæ caro & tendo. *ib.*  
 Musculus omnis debet habere quatuor partium genera. *ibid.*  
 in omni musculo quænam est pars princeps. 199  
 Musculi paraprinceps est corpus tendinosum. *ibidem.*  
 Musculorum differentia, unde petantur. *ib.*  
 Musculus ex *Hippocrate*, est caro in orbem circumducta. 300  
 Musculi, quatenus est pars organica, diuisio in tres partes, caput, ventrem & tendonem. *ibid.*  
 Musculi caput & finis sunt eiusdem nature, nimirum nervosæ & tendinosæ. *ibid.*  
 Musculi natura tota in motu consistit. 301  
 Musculi sue motionis principium habent ab anima, & in eodem loco mouentur. *ibid.*  
 Musculorum motus causa obscura est, etiam sententia *Galeni*. 302  
 Musculi, quomodo moueantur, *Galenus* fatetur se nescire. 302  
 Musculi conuenienti structura præditi, virtute quadam ingenita suum opus peragunt. 303  
 Musculorum quorundam actiones sunt dubie & incertæ. *ib.*  
 Musculus nullus vnquam sine tensione est, nequidem cum in media figura consistit. 304  
 Musculorum diuisionem moliri penitus pro fibratum dicitur. 305  
 Musculo temporali dextro vulnerato sinistram conuelli scribit *Hippocrates*. *ibid.*  
 in Musculo, modus actionis quomodo inuestigandus. *ib.*  
 Musculi caput illis assignatur, vbi nervus inseritur. *ib.*  
 in Musculis diuersitas actionum cognoscitur ex vario fibrarum ductu. *ibid.*  
 Musculi cuiusque obscuras actiones examinandi methodus. *ib.*  
 Musculi omnes dum agunt curui, dum quiescunt erecti sunt, exceptis intercostalibus & abdominalibus musculis, qui contracti introcedunt, et relaxati relaxantur. *ib.*  
 Musculum circumscribit actio vniformis, & ventris à vicinis partibus facile separabilis. *ibid.*  
 Musculo discendendi modus & artificium. 306  
 Musculi frontis, siue superciliorum describuntur. *ib.*  
 Musculorum ope mouentur supercilia. *ib.*  
 Musculus solus, & palpatio nemine, & conuulsio nem patitur. *ibid.*  
 Musculi temporales, siue crotaphitæ descriptio. 311  
 eius origo, fibra & vulnera explicantur. *ib.*  
 eius sympathia admirabilis cum Oculo. *ib.*

Musculi distincti ad respirationem, tam violentam quam liberam. 311  
 Musculi abdominis habent actionem & vsum. 315  
 Musculorum totius corporis à Capite ad Pedes anacephalæsis. 319  
 Musculi multi reperiuntur nervis destituti, ipsique nervi sunt solidi, nequaquam petiuntur aut porosi. 320  
 Musculorum cognitio ex *Galeno*, est tanquam *Alphabeticum* & *Medicæ*. 791  
 Musculi cuiusque actio est contractio verius suum principium 848  
 Musica duplex, vocalis & mota, quæ motibus rhythmicis editur, & vitæque in humano corpore reperitur. 101 & 103  
 ad Musicam natus est homo, vt laudes Dei perpetuo prædicet. *ibid.*  
 Musicalium instrumentorum hominis discrimen à brutis. *ibid.*  
 Musicam suam, vocalem & mutam, edit ventris inferior. 104  
 Musica ventris inferioris. *ibid.*  
 Musicam in hominibus agnoscit *Hippocrates*. *ibidem.*  
 Musica apud veteres erat propædia. qui instrui esse debebant pueri nobiliores. 105  
 Mutationis in corporibus nostris causa multiplex. 107

## N.

de **N**ervis qui apparere in facie res mirabiles. 166  
 de Nervis libellum elegantissimum scripsit *Laudonius Segralus*, & *Medicus Mediolanensis*. *ibid.*  
 Nervus deformem vultum non reddunt. 167  
 Nervum amputatione cum magna infamia, mochi olim mulabantur. 183  
 Nervus apud *Lampyridum* vitiliores, ac venere aptiores censentur. 160  
 Nervus est odoratus instrumentum, Cerebri spiraculum, & eius per accidens canalis expurgatorius, modulandæ vocis fistula, ingratæ resoluans, si rheumate offendatur, ingenij iudicii index, nec mediocre faciei ornamentum. 183  
 Nervus amputabatur mulieri apud *Aegyptios* in adulterio deprehensa, vt viveret in perpetua deformitate, quæ formæ abula fuisset ad libidinem. *ibid.*  
 Nervus & aurium amputationem tanquam ignominiosum supplicium munatur Deus ciuitati *Hierusalem*. *ib.*  
 Natio regum quid inesse credebant *Perseæ*, nec alios quàm Nervos ad regiam dignitatem admittabant. *ib.*  
 Nasi & narum denervatio. *ibid.*  
 Nalo ptavus qui erant præditi, in lege *Mosæ*, indigni iudicabantur sacerdotio. 184  
 Nervus virilis, & ad veneris negotia pronus & alacres iudicantur. *ibid.*  
 Nasi diuisio in duas partes. *ibid.*  
 Nasi cartilagine quinque respondent. *ibid.*  
 Nasi musculi proprii & communes. 110  
 Natura nihil vnquam sine ordine accidentata est. 3

Natura nihil facit frustra. *ibid.*  
 Naturæ autem in fabrica hominis omnes Medici sunt admirari, teste *Galeno*. 1  
 Natura cuique animanti corpus animæ afficitur idoneum condidit. 9  
 Naturam multi redargunt super fabrica hominis. 11  
 Naturæ gratias egisse fertur *Plato*, quod hominatus esset. 12  
 Naturæ rerum vis atque maiestas, in omnibus momentis fide caret. 52  
 Naturæ archetypum potius sequi perstat, quam imitricem eius artem, omnino mancā, & rerum etiam umbras malè effigiantem. 53  
 Natura non nisi vno ad vnum vitur, & nunquam rale facit, quale *Dolphicus* gladius. 108  
 Natura nihil facit frustra, nihilque in fabrica humani corporis fortuitum occurrit. 134  
 Naturæ potentia ad plenum approbat, nihil ab ea sine aliquo occultiore causâ gigni. *ibidem*.  
 Natura non solet excrementa sua à parte ignobili ad nobilem expurgare. *ib.*  
 contra Naturæ legem est, si finis stræ spectemur vena à trunco, de extra ab emulgentie prodcat. 143  
 Natura vias rerum publicas nimium angustas effinxisse videtur. 147  
 Natura opificum suum in homine, quomodo immortale reddere potuerit. 151  
 Naturæ opificum multis annorum millibus iam consistit, beneficio generationis, quæ vix brevis vicem supplet ad immortalitatem. *ibid.*  
 Natura non minùs in feminæ, quàm matris generationem intendit. 152  
 Natura duobus instrumentis vitur, aëre & igne, ad menibrosam fabricam, eorum præsertim, quæ sinus aliqui de vesiculis habent. *ibid.*  
 à Natura talpæ oculi intus delineati foras propelli non potuerunt. *ibid.*  
 Naturæ consilium in formatione nostri corporis. 153  
 Naturæ numen est in omnibus, & honestum pulchrumque ingenium. 154  
 Natura produxit pilos ad velandas partes genitales. 158  
 Natura facit glandulas & pilos ad eundem usum. *ibid.*  
 Natura magis intendit generationem feminarum. 160  
 Natura pudicitie mulieris, etiam in defunctis adeo fuit sollicita, ut defunctarum feminarum corpora prona fluerent in aquis. 171  
 Natura in quem suam veterum muliebrem fabricauit. 177  
 Natura quæte vocatur pudendum muliebri. 186  
 Natura quum præuideret incommoda, quæ partibus cernerent ex plenitudine valorum, quodnam elegans artificium excogitauit. 182  
 Natura humana in omnem bonorum societatem à Deo est vocata. 245  
 Natura vnicuique animanti corpus animæ af-

fectibus idoneum condidit. *ib.*  
 Natura sensum etiam nonnullis in Capite collocavit, quod eius partis sanguis rempetatur modicè sit, & idopæus ad Cerebrum tepesciendum, tum ad sensuum tranquillitatem & integritatem. 117  
 Natura semper moliri solet aduersus cuiusvis easperantiam auxilium, per conjunctionem rei aduersæ, ut excessum alterius altero compenset, & moderetur. *ib.*  
 Natura lingue & pudendis tantum, strænum indidit, quoniam in his potissimum organis voluit homines esse modestos. 208  
 Natura cur musculos ossibus circumiecit. 296  
 Natura adinuens sibi accessus, non ex cogitatione, qualis sunt niscare, & ea quibus lingua subministrat, &c. 302  
 Natura incredula & non edocita, quæ expandunt, efficit. *ibid.*  
 Natura rerum nusquam magis, quàm in minimis tota est inquit *Plinius*. 303. & 331  
 Naturæ inimicum est omne nimium. 304  
 in Naturæ censu nihil est orisum, nihil abiectum & despicabile, quia nulla reest Naturæ, in qua non mirandum aliquid insit. 311  
 in rerum Naturæ contemplatione, nihil videri potest superuacuum. *ibid.*  
 Natura nihil facit frustra. 335  
 Natura quantum potest intendit generationis pilorum. *ib.*  
 Natura seminum ouis proxima est, ex *Theraphe*. 382  
 Naturæ potentia mirabilis cogit nos nihil non de ipsa credere. 398  
 in Natura rerum monstra sunt & miracula, inquit *Aurrihæ*. *ib.*  
 Naturæ erga mulieres singulari beneficium o-lucet. Ollium pubis & illam conformationem, quætingens omniarte parturientium dol-libus prouidit. 404  
 Naturæ arcana potius coniecturâ, quàm scientifica demonstratione cognoscuntur, cum nemo operantem Naturam inspexerit. 409  
 Natura humana nos charactere & effigie sua insigniuit. 417  
 Natura in humani corporis structura artifices nauem condituros est amulata. 437  
 Natura in nostro corpore nihil frustra molita est. 473  
 Natura cur homini politico & mansueto animalis duos tantum caninos dentes indidisset. 483  
 Natura cuiusque animalis corpus pro ratione formæ vtrum condidit. 526  
 Natura nunquam deficit in partibus ad vitam necessariis. 562  
 Natura in variolarum & morbillorum eruptione, leuata sarcinâ humoris vitiosi, reliquum facilius amandat in extimas partes corporis. 590  
 Natura per se docta vias inuiae nobis incompetas inuenit, ad se exonerandum. 599  
 Natura quare superne reflexit Colum intestinum. 635  
 Natura nunquam solet duo extrema dissimilis nature & substantiæ in se iungere, sine aliquo medio. 662

- Natura corporis formationem inchoat à Corde, quod exemplo probatur. 826
- Natura semper aspirat ad opus perfectum: quomodo est illud axioma intelligendum. 831
- Naturæ generantis paradigma est opus in suo genere absolutum. ib.
- Natura nihil est aliud quam ordo, vel causa ordinis in universo. ib.
- Natura ut novos mores, ita nova parit monstra. ib.
- Natura quamvis per se irrationalis, agit tamen semper cum ratione, nisi impediatur, quia dirigitur à sapientissimo moderatore, nempe Deo. 833
- Naturæ erroris causa immerito tribuitur, cum potius parentibus imputari debeat. ib.
- Naturale illud dicitur, quod sit semper, vel vltimum. 112
- Nauclerus ex libro nullus unquam euasit. 421
- Nephrotonia, quomodo secus possit administrari. 144
- Nervi diaphragmatici, recurrentes, stomachici & coliales describuntur. 127
- Nervorum plexus mirabilis in basi Cordis. ibidem.
- alter Nervorum plexus sub ventriculo inter renes & diaphragma obseruandus. ib.
- Nervus pluribus est instructa pulmonum substantia. ibid.
- Nervi omnes à spinali medulla & Cerebello prodeunt, ubi est spiritus animalis cisterna. 161
- Nervorum prima coniugatio est Opticorum. 163
- Nervorum Opticorum thalami, opus Naturæ admirabile, Anatomicis incognitum, & à Galieno descriptum. ibid.
- Nervorum Opticorum totius fuit officarius. ibidem illius connexionis diuulso repentinam cecitatem inuult, ex relatione Aris. ibidem.
- Nervus Opticus naturaliter separatus videtur, sine ulla visus lésione. ib.
- Nervus Opticus esse perforatus scribit Galenus ad spiritus animalis delationem. ibid.
- ad istam Nervorum Opticorum cavitatem detegendam tres conditiones requiruntur à Galieno: nempe ut animal sit magnum, nuper maceratum, & in lucido aere conspiciatur. 164
- Nervi sunt sapientia nihil temerè credere. 118
- Nervi Optici si perfoceantur, fit amaurosis. 164
- Nervorum secunda coniugatio mouet oculos. ibidem.
- Nervorum tertie coniugationis diuisio. ibid.
- Nervus innominatus non pauci spasmu correpti sunt. ibid.
- Nervorum quarta coniugatio tota in oculum abit. ibid.
- Nervorum quintæ coniugationis diuisio. ib.
- Nervus quintæ coniugationis quamplurima præstat in Cerebro. ibid.
- Nervi sextæ coniugationis diuisio. ibid.
- Nervorum septima coniugatio diuiditur. ib.
- Nervus Opticus alterius est naturæ, & ab aliis nervis omnino distinctus. 165
- Nervi oculorum sunt duo, opticus & motorius. 179
- Nervosorum partium pristinus totus unquam restituitur. 194
- Nervus an sit pars princeps musculi. 199
- Nervus ligamento non miscetur suo musculo. 300
- Nervi totius manus describuntur. 144
- Nervi anterioris femoris. 147
- Nervi, qui à spinali medulla prodeunt. 148
- Nervos omnibus partibus commodè suppeditare non poterat Cerebrum, propter paritatem multitudinem, & viarum distantiam. ibidem.
- in Nervi egressu, Naturæ solertia perpendenda. 149
- Nervorum è spinali medulla prodeuntium diuisio accurata. 350
- Nervi intercostalibus affectis vox admittitur. ibidem.
- Nervi brachiorum & crurum à spinali medulla prodeunt. ibid.
- Nervi omnes præter Opticum ex pluribus fibris contexti. ib.
- Nervi omnes sunt solidi, quod probatur ex Galieno. 351
- Nervorum cognitio non est diuinantium more à Diis petenda, sed ab experto Anatomico discenda. 412
- Nervi varii sunt appellationes. 418. & 459
- Nervi omnes à posteriori Cerebro oriuntur. 642
- Nicæi Atheniensis mulieres diligentissime pinxit. 168
- Nicolas Massa Anatomici elogium. 29
- Nicolas Pierre, Docteur Medecin Parisiensis eximius. 398
- Nihil facis dicitur, quod nou facis discitur. 605
- Nominum consideratio cuiusque artis principum est. 68
- Nosse seipsum, dictio quidem brevis, sed tanta res, quam Super solus scit. 418
- eam prudenter inculcabat Alexandro Magno quidam Scythiarum legatus. ib.
- Nosse seipsum qui cupit, & hominis structuram exquisitè notam & perfectam habere, in cadaueribus nocuum, & suspensorum hominum se diligenter exerceat, quæ ab exquisitis iudicibus, ad usum Anatomicum Medicis conceduntur, ne suspensa tetram contaminent. 411
- Nosse seipsum, nihil est aliud, quam totius mundi naturam nosse. 145
- Nuditas partium genitalium apud omnes gentes ignominiosa fuit. 167
- Nudum hominem inspicere granda nefas erat apud Persas. 168
- Woman: sententia de modo quo sit apoplexia in Cerebro. 114

O.

Ostrudtio nervi iuxta Cor, non potest inferre mortem repentinam. 704

Oculus Soli comparatur à Galieno. 143

Oculus pars est corporis pretiosissima, lucis viam viam distinguens à morte. ibid. & 168

Oculus

Oculos rium excolamus, animum ipsum cre-  
dimus attingere. Oculi est speculum animi.  
*ibidem.*  
ab Oculo tanquam à parte artificiosissima & o-  
perosissima formamodi capitis exordium sumit.  
Natura *ibidem.*  
Oculi quatuor primi formantur, vltimi tamen  
in omni genere animatum perficiuntur. *ib.*  
Oculi humani aliorum animantium oculis val-  
de dissimiles. *ib.*  
Oculus nihil est in vultu decentius, elegantius  
& amabilius. *268*  
Oculus idem est in homine, quod Sol in uni-  
uerso. *ibidem.*  
Oculum, si quis dolomalo homini ingenue co-  
ruisset, salutem fectebat: si seruo, ipse libet-  
tate donabatur. *ib.*  
Oculorum commendatio & præstantia. *ibi-  
dem.*  
Oculus mundi, Sol iussit x. & pater luminum  
Deus ipse nuncupatur. *ib.*  
Oculi debetur Philosophia, auctore Platone.  
*ibidem.*  
Oculi sunt animi pathematum si leles internun-  
tij, adeo vi animus oculis habitare videat-  
ur. *269*  
Oculorum eligia multa præclara. *ib.*  
ex Oculis morbum indacia depromuntur in  
ægris. *ibidem.*  
ab Oculis sterilitatis & fæconditatis signa pe-  
tuntur. *ib.*  
Oculi primi formantur, vltimi tamen in omni  
genere animalium perficiuntur. *ib.*  
Oculus vnde dicitur. *ib.*  
Oculorum confirmatio, situs, & numerus.  
*270*  
in Oculis varietas colorum est admirabilis. *ib.*  
Oculus dicitur fortior & robustior esse obserua-  
tur. *271*  
Oculorum singulatio non omnibus equalis  
data est. *ib.*  
Oculorum figura, quomodo rotunda appa-  
reant. *ib.*  
Oculorum etordia dicuntur supercilia à Ter-  
tulliano. *ib.*  
in Oculis foraminula duo, siue puncta lacryma-  
lia, per quæ lacrymas stillare dicunt. *271*  
Oculum constituent sex partes interæ intra  
orbitam recondite. *ib.*  
interna Oculi parte nemo voquam figuit. *ib.*  
Oculorum glandulæ duæ. *273*  
Oculorum musculi sex. *ib.*  
Oculus est organum visorium, ex multis con-  
stant particulis, quæ omnes ad vnam actio-  
nem, scilicet visionem conspirant. *ib.*  
in Oculo patrium genera quatuor: necne pars  
præiceps, pars sine qua non, pars adiuvans,  
& pars conseruans. *ib.*  
Oculorum tunica, & numerus eorum contio-  
uerfus. *ib.*  
Oculi tunicae propriè dictæ habent tantum  
duas, nempe Corneam & Vitræam. *ib.*  
Oculi quatuor tunice conuoluntur. *274*  
sex constituent à Krasianis, nempe com-  
munes, & tres propriæ. *ibidem. & 275*  
Culi humores tres, *278*  
de his humeribus controuersie. *ibidem.*  
Oculi vnde quibus alluntur, tria sunt. *279*

Oculi structura Hippocrati fuit explorata. *ib.*  
Oculi Anatomica administratio est admodum  
laboriosa, si Oculum intra luum capam con-  
clusus teneatur. *280*  
Oculorum musculi sex recensentur. *308*  
Oculi generibus affectus, quare contoleantur.  
*281*  
Oculi omnium puerorum statim à partu casus-  
culi sunt, postea mutantur in eam naturam,  
quæ futura est, quod in cæteris animalibus  
non conuenit, ex Aristotele. *404*  
Occipitales musculi duo describuntur. *307*  
Odontalgia sedata miraculi: nistat ex reflecto  
ramo arterie per quem fluxio fit in dentes.  
*282*  
Oesophagus est via cibi & potus ad ventricu-  
lum. *244*  
vnde dicitur. *ib.*  
eius structura *ibidem.* iter & ductus. *ib.*  
Omentum. Vide *Egplan.*  
Omnia tam in cælis, quàm in terris, & præter-  
itum in homine, circulator agi & conueniri,  
demonstrat Cornelius Gemma. *557*  
Omoplatæ vnde dicta. *302.* quare dicta scapu-  
la. *ibidem.* eius vsus. *ib.*  
ab aliis Ossibus non dependet. *ib.*  
eius figura itapezia. *ib.*  
nonnullæ eius partes ad musculorum origi-  
nem & insertionem plurimam conferant. *ib.*  
eius partes distinguantur. *303*  
Omoplatæ musculi proprii & communes.  
*316*  
an sublimi respirationi inseruiant *ibidem.*  
dem. *ibidem.*  
in Opere magno & eximio, oportet virum bo-  
num omnia aris, veniù dignari, inuocata ve-  
rò mulierè prosequi gratiâ. *425*  
Opera imperfecta si excedant, dicuntur *Gigan-  
tes*: si deficient, dicuntur *Pigmei*. *232*  
Opil drachmas aliquot exhiberi so *Isidoro*, ho-  
minibus morbi delirantibus, narrare *Leuinus*  
*Leuinus* & *Philopini*, ne villos humores dis-  
sipari contingat, sic crassiores spiritus eva-  
nescere, omniaque se aptè profertant. *60*  
Orbis ciliarum vniuersi diuisio generalis. *73*  
in Organo perfectio quatuor partium genera  
debent obseruari. *298*  
Origenes, Platani & Pythagore falsè puta-  
runt corpus humanum esse caretem & sap-  
plicium animæ. *4*  
Orpheus disceptus fuit à mulieribus, cum lin-  
guâ tantum peccasset. *172*  
Os, oris, quid est. *285*  
Oris vsus in tribus constat officiis, respirandi,  
sumendi victum, & eloquendi. *285*  
Oris duplex significatio apud *Galenum*. *ib.*  
Os quare ex-guum datum homini. *ibidem.*  
in Ore quænam partes contineantur. *ib.*  
Osium hyoidis descriptio & structura. *289*  
Os hyoides est linguæ fundamentum. *ibidem.*  
dem. *ibidem.*  
eius Ossis musculorum anatisi dissoluta, vt ac-  
cidit in paralyti, sequitur aphonía, ex *Isi-  
doro* sympathia. *290*  
Osium natura ignota nemo debet ad mus-  
culos accedere. *296*  
ab Ossibus initium Anatomies est repetendum,  
*ibidem.*



Os hyoidis musculi decem recensentur.

314

Ossium Ilium & Ossia Sacri simul iunctorum morus, & musculi describuntur.

315

Ossa Pubis quo sine moueantur.

316

quomodo moueantur.

317

Ossa Pubis io parto deduci probatur ex *Hippocrate*, *Alexp.*, *Carpo*, *Arystotele*, *Syluo*, & aliis.

405

idem probatur experientia, eni Medicus plus debet tribuere, quam rationibus. *ibidem*.

406

ipso quoque sensu composui potest hæc coo- troctesia.

ib.

Ossilago, ex *Arnobio*, Den est quæ durat & solidat paruis infantibus Ossa.

407

Ossium conspectum & contactum veteres reformidabant: verumtamen loca pallura & inunda reddi credebant, si Ossa homana receperent.

419

Ossa fuerunt olim Diis sacrificata.

ibid.

Ossa Sacrum sic dictum, quia in sacrificiis præ exteris Ossibus offerebatur.

ibid.

Osteologia in disciplinam Anatomica multò prius est cognita, quam ceteræ illius partes.

417

Ossa io conuiniis quotidie ad spectandum proponebantur, ut in *Egypto*.

ib.

Ossa inter partes similes locum primum iure sibi vendicant.

ib.

Ossa sunt corporis nostri fundamenta.

ibid.

Osteologiam potissimum excoluerunt veteres Medici.

438

Osteologie diuisio multiplex.

ibid.

Ossium qualitates tres.

439

Osteologia an pertineat ad Medicum?

ib.

ad fracturas & luxationes curandas tantum an *Artemiasia*?

440

Ossium definitio duplex.

ib.

Ossa cur sunt durissima?

441

Ossa liquari non possunt, sed adusi, sursumque emittunt.

ib.

Ossa comparantur lapidibus propter duritiem.

442

Ossa quomodo non sentiant.

ib.

Ossium materia duplex.

443

Ossium causa efficiens est spiritus semini implanatus.

444

Ossium forma duplex: à Medicis assignatur, essentialis & accidentalis.

444

Ossium finis vsus est, non actio, quam nullum Os exercet: et hæc duplex, communis, & particularis.

ibid.

Ossium discretio tres à *Galeno* propositæ, quarum prima est à magnitudine: secunda à cavitatibus: tertia à medulla.

445

Ossa cur sunt eadem & medullifera.

446

Ossa vnicò continuoque, si homo compactus fuisset, rigida & immobilis, velut *Marpesia* cautes steteret.

449

Ossium vniuersa coagmentatio, siue syntaxis *scelus* dicitur.

ibid.

Ossium coagmentationis in genere duplex est modus.

450

Ossium capita, ceruices & equanities enumerantur & explicantur.

455

Ossiculum quoddam Capitis memorator.

471

Os crystallinum quid est.

478

Os Sacrum quid est. 496 eius a *Physicis* & structura ex quinque aut sex Ossibus.

ibid.

Os hyoides vnde sic dictum.

486

varia eius nomina.

ib.

eius structura ex quinque vel septem Ossiculis.

ib.

Os hyoides est omnino separatim ab alia, & solum per carnes musculosas, & ligamenta Ossibus adhærescit.

487

Os nullum seorsum per se habetur, sed aut para est continui, aut rangis, & annectitur, ex *Arystotele*, quod est falsum de Osse hyoide.

ibid.

Os Sacrum, quare sic dictum.

496

exulceratum difficillimè sanatur.

ib.

Ossa illa magna cum Osse Sacro commissa, totum corpus sustineant, vice fundamenti.

511

constituunt compagem quandam Ossium, quæ seorsim mouetur in actu veteres.

ibid.

eorum varia nomina.

ib.

tres sunt eorum partes, Ossa Ilium, Ossa Ischia, & Ossa Pubis.

ib.

eorum Ossium triplex vsus.

513

Ossis Ilium descriptio.

ib.

Ossiculum Cordis describitur.

521, 522

Ossa Cerebri an deprehendantur.

ib.

Ossicula *Luz* & *Albaduram*.

523

Ossium omnium totius corporis numerus est incertus.

ib.

Osteologia corporis humani ex *Hippocrate* collata, & io ordinem digesta. 553. & pagina sequentibus.

ibid.

Ossiculum io hominis Corde sepe reperitur.

705

Ossa robis & Ilium eum Osse Sacro iuncta, mouentur in congressu cum muliere ad prolem dehiante, siue faciendo in lecto, siue itando.

744

Ossiculum Cordis vidit *Riolanus* in senibus, & in *Regina Maria Medicea*, post obitum ad pollicem aperto eaduerse.

778

Ossiculum in Aortæ orificio appositum sustinet valvulas ostiarias, siue ianitrices.

837

eiusmodi Ossiculum repperit fuit in Corde Illustissimi viri, D. *Nicolas*, primarii Prædicti Camaræ Computorum, octogenarii: & in Corde *Reginae Mariae Medicee*.

ibid.

eius Ossiculi vsus secundum *Arystotelem*.

ib.

Osteologia *Rabusea*.

10

*Quidam* in suis carminibus vitia sua non igno- rant, sed amant.

66

Ourachos quid est.

83

Ourachos in humano Fœtu solidus est, & imperatus, & ita gracilis, ut non sit verisimile vnoam per istam portionem necquam traduci, quæ non est maior in Fœtu, quam in adultis.

671

Ourachos, cur ascendat à fundo vesicæ ad vmbilicum.

ib.

P.

Platum quid est. 185. eius vsus.

ibid.

Palatum est pars oris superior, conuexa, foenicata, multis scabris asperitatibus, quas *Pilini* crenas appellauit. 478  
 ex quatuor olisbus constat. *ibid.*  
 quare fuerunt dura & densa. *ibid.*  
 in line venereis sapissimè perforantur magno vocis detrimento. *ibid.*  
 Palmaris mulculus deflexibitor. 319  
 Palpebrarum musculi describuntur. 307  
 Palpebrarum numerus & usus. 271  
 earum motus & substantia. *ibid.*  
 Palpebrarum pili sulqz hominibus concessi. 272  
 Palpebrarum pili nunquam plus iusto crescent, & desuunt rebus venereis inceptis, & quo visus venereis fuerit amplior, ad magis & celeritè canescunt. *ibid.*  
 Palpebrarum pili, quomodo Græcè & Latine dicuntur. *ibid.*  
 in Palpebris, cur natura tarsum effluxit. *ibid.*  
 Panniculus nomen est parè Latinum. 633  
 Pancreas inebriatum, aut scirrhodes factum, truncum Portæ restringit, vada chyli affluxus interceptus. 111  
 Pancreas focus est, & minera melancholicæ hypochondriacæ. 118  
 Pancreas videtur destinatum sustinendo & succedendo trunco Portæ, & rano spleuico deducendo ad Lienem. 417  
 Pancreas indicium fuit *Hippocrati*, cognitum *Aristoteli*. 109  
 Pancreas quid sit. *ibid.* eius situs & structura. *ibidem.*  
 Pancreatis usus excutitur. *ibid.*  
 Pancreas in morbois & melancholicis corporibus, est Lien secundarius, siue viscus Lienis vicarium. 110  
 Pancreas in *profride Thiano*, amplitudine sua & pondere iecur ipsum æquabat. *ibidem.*  
 Pancreas febrium intermittentium, & hypochondriacæ melancholicæ sedes est, ex *Fernelio*. *ib.*  
 in Pancreate sunt quidam meatus, olim *Fallope* cogniti. *ib.*  
 Pancreas obstruatum, Truncum venæ Portæ & intestinum comprimit. 111. iude chyli distributio intercepta aut retardata. *ibidem.*  
 Pancreatis usus multiplices. 811.  
 813  
 Paralytici quomodo fiant, qui pleuritida laborant. 216  
 Paralyticos materia per quas vias in spiritalem medullam facilius deriuatur. *ib.*  
 Paralyticum solet precedere, vel apoplexia, vel consulsio. *ib.*  
 Parastata duplices, circoideis & glandulosi quid sint. 163  
 Parastata circoideis & epididymis, quomodo inter se differant. 694  
 Parastata quid sit. *ib.*  
 Parastatum usus. *ib.*  
 Parastata est corpus varicosum autē testis possi-

tum, quod ante Rar, &c. 772  
*Pariani Anatomica* damnantur. 33. nou est Anatomicus sed barbarus scriptor. *ibid.*  
*Parianus* iudicio suo solus sapiens, omiscius, naturæ amicus, Phæbo ante alios dilectus. 843  
*Pariani* factus & insolentia. *ib.*  
*Parianus* magnus est ardore & nugator nugatissimus. *ib.*  
 in *Pariani* libris nulla est pagina, quæ non sciat spurciæ sermonis. 846  
*Pariani* cæcia charta. *ibid.*  
*Parianus* nugator subtilis. 847  
*Pariani* argumenta aduersus *Rislaum* da Diaphragmate reselluntur. *ibid.*  
*Pariani* fatuum & bardum ingenium. 349  
*Parisiensis Academia* laudatur da inuenta & illustrata Anatomia. 63  
*Parisiensis* ciuitas totius *Gallie* Epitome, & veluti Orbis in Vrbe, *Alexandria* vrbi comparatur. 64  
 studium Anatomicum in lucem excitauit & instaurauit, omnibusque nationibus communicauit. *ib.*  
*Parisiensis Medicina Schola*, Medicinæ studia in *Gallia* plurimum promouit. 63  
*Parisiense* solum octingentas circiter herbas profert, ad morborum curationem præstantissimas. *ibid.*  
*Parisiensis Medicina Schola* Anatomicæ doctrinæ gloriam sibi præ cæteris potest vendicare. *ibid.*  
 præstantissimos Anatomicos produxit, de quibus supra alias Scholas summo suo iure gloriatur. *ib.*  
*Parisienses Medici* Anatomem tanquam proprietariam sibi vendicant. 65  
*Parisienses Medici Doctores* tres, *Nicolas Perren*, *Ioannes Rislaum*, & *Andreas du Gloumin*, viri eximii & omni eruditionis laude præstantissimi, constituntur *Bruxellis* super *quædam* Medica memorabili, de Facto, qui viuis dicebatur prodissè ex vieto matris demortuæ. 398  
*Parisienses Medici* acerrimi semper fuerunt *Galenicæ* doctrinæ fautores & defensores. 433  
*Parisienses Medici* Colicum dolorem *Pillæ* nicum, siue Colicam *Pillæ* nicum nouerunt & descripserunt accuratè, imprimis *Fernelius* & *Hallerius*, ante natos *Malenem*, *Cristum* & *Salmasium*, & ipsius *Salmasii* in eosdem maledicentia reprimunt atque raruodit. 636  
 Parotides peripneumoniciis superuenientes, quare salutes assè solent. 264  
*Parvbasius Pistor Atheniensis* accusatur lesæ Reipublice, quod viuum senem emisset, torquisseque & interfecisset, vt ad exemplar tori, *Promethæa* pingeret. 43  
 Pars nulla per aandem viam attrahit, & expurgat sua excrementa. 127  
 Partibus in singulis tria sunt consideratione digna, Anatomico cognoscenda. 69  
 Partis structura res septem includit. *ibidem.*

- varies à philosopho & Medico diuerso modo considerantur. *ibid.*
- vars nulla sine actione recte desinitur.
- 70
- varies omnes sunt creatæ propter actionem. *ibidem.*
- in partibus organicis, siue compositis, quatuor partes integrantes sunt obseruandæ. *ibidem.*
- varium historia domi docebat, in schola vero earumdem actio & vius. 71
- varies omnes corporis sui rotundæ & sphaericæ. 92
- varium quatuor genera obseruantur à Galeno, in omni organo perfectio. 198
- varsque præcipua est actionis causa in quoque organo, duas habere debet qualitates & conditiones: prima est, vt sit similis: secunda, vt illi similis in vniuerso corpore nulla repetiatur. 299
- varies corporis tribus modis mouentur, &c. 302
- vars singulæ nostræ corporis nouerant, in quos vius sunt destinatæ, sua munia sine vilo dolore perficiunt, deinde lupo, cornu tantus petit. 303
- varies omnes fracturæ & luxaturæ in rigoris dolore carentibus, manuali operatione loci peritra standæ. 304
- varius quomodo fiat, & quænam eum adiuuent. 403. id ignorat Galenus, & administratur. *ib.*
- varius naturalis conditiones tres receleatur. *ibidem.*
- varius legitimus vsque ad vndecimum mensum. 408
- vars supra duodecimum mensem, raræ est, inadmirationis & valde suspecta. *ib.*
- in vniu. vniu. a pubis distrahantur. 404
- Paulus Rhetor apud Galenum, cum habitu corporis esse pituitosus, quotidie tamam pallidam bilem euomebat. 128
- Paulus Serpa, & Cælius Theologus & Scintia, prædicatur inuentor Circulationis sanguinis ante Haruenum, a Valio. 613
- idem ipse Frater Paulus fuit inuentor valuarum quæ sunt in vena. *ibidem.*
- paucis natus est, qui populum suæ ætatis cogitabat. 414
- variasi refertur hostimentum est. 790
- pedes ambulationis organa manibus proportionem respondent. 314
- pedum causa hominibipeds factus. *ibid.*
- pes vnde dicitur. 518
- pes quid. *ib.*
- eius diuisio. *ibidem.*
- pedum quid, & eius structura. 310
- pediculi inguinales cur gignantur plani & laui, & figura differat à pediculis capillorum: an ratione pilorum pubis, an ratione potius excrementi humoris? 319
- pedis, siue tacti musculi. 313
- pedis in tres partes diuisio. *ibidem.*
- Pelops, Galeni præceptor, principium venarum in Capite constituebat, cum videret venas in Cerebro ab aliis nullo modo productas, quod ante Pelopem alij proposuerant, & refelluntur ab Aristotele. 161
- pelops, Galeni præceptor, venas omnes à Cerebro vni credidit. 711
- venem quoque partem corporis principem ac nobilissimam sunt venerati quidam veteres, quare 154
- Penis sub nomine fascini à superstitiosis Romanis inter Deos relatus fuit. *ibidem.*
- Penis virilis, quate fascinum dicitur. *ib.*
- penis humanus eleganti potestate laudatur à Petre Bomba, Cardinale. *ib.*
- penia vnde dicitur. 158. eius substantia. *ibidem.*
- penis substantia, quænam est. 159
- penes semper a recto luno Sorri. *ib.*
- penis ligameota, & eorum substantia. *ibidem.*
- penis elegantet Moly Hameres comparatur. *ibidem.*
- in penes duplicem meatum quidam constituuunt. *ibidem.*
- penis cum Capite maximus est confusus. 160
- penis magnus durum & solidum ingenium portendit. *ib.*
- penis magnitudo ex nasi forma dignoscitur. *ibid.*
- peni correspondet Nasus in longitudine & crassitie. *ibid.*
- penis musculi quatuor deferuntur. 339
- penis non habet nomen à pendendo. 366
- pericardium quid est. 217. eius origo. *ibidem.*
- pericardij cum Diaphragmate colligatio, cur facta fuerit. 218
- an ea pericardio lato vitæ periculum. *ibidem.*
- pericardij serosus humor, an in viciis reperitur? *ib.*
- ille humor vnde generetur? 219
- pericardium fistula aut erosum totendum coarctatur. *ib.*
- in pericardio aqua est stimulus caloris. *ibidem.*
- Pericardium, si aliquando turgescat & distenditur ferro plurimo, quid tandem agendum, ubi vena sectio & purgatio nihil proficiunt. *ibid.*
- an intra pericardium in animali viuente aqua reperitur? 676
- negat Riolanus. *ib.*
- Pericles Atheniensis, vir prudentissimus, magno capite fuisse traditur. 462
- pericranium quid est. 253
- Perizonium perforari debet vsque ad vesicam, ad cathartendum calculum in vesica inclusum. 149
- perizonium vnde dicitur. 117
- malè redditur Latine *Interfermentum*, quod partes muliebres genitalis significat. 158

Perizoni nomen latius patet apud *Aristotelem*.

*ibidem.*

Peripatetici, vt vitam à nutritione non distinguunt, ita nec vitalem facultatem à nutritiua.

190

duo tantum principia facultatum constituunt, *naturam & animam.*

*ib.*

Peripneumonici, quare aures madente?

264

quare superuenientes illis parotides sunt fauillæ.

*ibid.*

Peritonæum in parte inferiore nusquam est perforatum.

91

intra peritonæi septum ex partes tantum continentur, quas alii & rigat vena Porta.

*ibidem.*

crassius est in mulieribus, quàm in viris ab vmbilico ad pubem.

*ib.*

Peritonæi tunica raris rarè laetantur.

*ibid.*

Peritonæum nullum habet certam figuram.

91

lombis adhæret, & mesenterium prodicit.

*ibidem.*

in peritonæo constituit dolores colici à *Fernelo* descripti, &c.

*ibid.*

Pestilentia à partibus meridiana ad occasum Solis ire solet.

65

*Petri Rami*, Professoris Regij vorum de treatibus Professoribus botanicis in *Academia Parisiensis*.

64

*Petri Geslandi*, viri doctissimi, Professoris Regij *Parisensis* in *Mathematicis*.

519

*Petrus Bembus*, *Carduelis*, poema scriptis admirabile de laudatione *Petri*, sine mentia, sub titulo *Præpi*.

154

*Petrus Paninus* multa pollicetur esse de te *Aristoteli*, quæ non præstabit.

33

Pharynx Oesophagi principium, septem musculis obsistit.

114

Pharyngis definitio & usus.

292

septem habet musculos.

*ibid.*

voluntarie moventur.

*ibidem.*

Pharyngis musculis relaxatis, & *pharynx* deperit perierunt, integris aliis facultatibus.

293

Phasylai, *Phoenicium* dux, cum attentius scelerum æneum *Hippocrati* inspexisset, se simile factum somniavit: inde paulò post macie contabescens, somnij eueotum complet.

431

*Philippus Ingrassius*, quid inuenit in *Anatome*.

14

*Philippus Scherbius*, *Germanus*, *Hofmanni* receptor, *Ferneli* præter æquum aduersarius.

783

*Potelomachus* non erat *Anatomicus*, sed tanquam philosophus *Anatomica* tractauit.

31

Pidiores quidam *Græci* *improbi* dicti, quod scorta & meretrices veniunt progete.

157

de pidus *Anatomicis Vesalii*, *Laurentij*, & aliorum, iudicium *Rulandi*.

53

*Polaxius* febres omnes ortum habere in Cerebro, ibi nasci, & inde delinari in vniuersum corpus eruditè demonstrauit.

847

vilæ figuram habent quadrangulam, more stipitum cauliumve quædam plantarum,

quod optici instrumenti res augentis beneficio oblorescere licet.

714

vilis luxuriosæ partes genitales hominis, quare.

158

vili nascuntur vbiunque sunt glandulæ.

*ibidem.*

vili naturam perfectiari non est occupatio ridicula, nec otiosa.

351

vilus res non est adeo vilis & abiecta, si Deus pilos capitis numerare digereur.

*ibidem.*

vilus vnde dictus. *ibid.* varietas eius derivationes.

*ibidem.*

vili varietatē definitiones.

351

vilorum diuisio in congenitos & postgenitos.

*ibidem.*

vilorum differentia multiplex.

*ibidem.*

vilus viciis, cui nullus nascitur, ex *Gardano*.

354

vilorum materia duplex, vna in qua, alia ex qua.

*ibid.*

vilorum materia in qua, est ipsa cutis, subiectum radicationis pilorum, &c.

*ibidem.*

Materia ex qua, est excrementum humidum fuliginosum, crassum & terrestrè.

*ibidem.*

vili eo procreantur aut oriuntur ex fuliginosa materia.

*ibid.*

ad vilos regenerandos, optimam viam euehy-  
mi legem, quæ pituitum & optimum sanguinem suppediter, requirit *Galenus*.

*ibidem.*

vili substantiam suam & colorem mutant pro varia condicione cutis, & humoris affluentis qualitate.

*ibid.*

vili in morbis magis increfcent, quàm per sanitatem, & in senio magis, quàm in iuuentute.

359

vili omnes sensum deficiunt senio vergente.

*ibidem.*

vili non aluntur in eis, sed crescent per appositionem.

*ibid.*

an vili veri & proprie natiuantur.

*ibid.*

vili forma duplex, essentialis & accidentalis.

*ibid.*

an vili sint animati?

*ibid.*

vilorum forma ovis est igitur, vt & partium similitudinem.

*ibid.*

vilos esse casuos in *Plica Poliorum* compertum fuit.

*ibid.*

vili sunt filiales, ergo cauti esse possunt.

354

vilorum causa efficiens quænam?

*ibid.*

vilorum finis triplex est.

*ibidem.*

355

vili largius etrumpunt, si sæpius tondentur.

*ibidem.*

vili maleficorum, an vis aliqua insit?

355

vilorum vilitas, ac necessitas.

*ibid.*

Vili producantur necessitate materie.

*ibid.*

Vili. neque sunt contra, neque præter naturam.

*ibid.*

- Pili morbos etiam occultos declarant. *ib.*  
 Pilorum colore, affusio & sanatio lepre dig-  
 noscebantur. *ibid.*  
 Pili mores animi etiam significant. *ibid.*  
 Pilorum regenerationem impedire, est opus  
 difficilimum. *ib.*  
 Pilorum differentie quamplures. *ibid.*  
 Pilorum longitudo & breuitas vnde depen-  
 deat. 356  
 Pilos, eodem ad iustam magnitudinem perueni-  
 ram, non vltra promitti trahique posse, tam-  
 etsi materia ad radicem suppetat, admirabi-  
 le videtur *Fernelio*, & vnum ex his in quibus  
 non aliud quam mirari liceat *Deo & Natu-  
 ra* Providentiam. 356  
 Pilorum colores ad duas causas reuocati. *ib.*  
 Pili in quibusdam partibus corporis pullulant.  
 357  
 Pilosius homine in capite nullum est inter ani-  
 malia. *ibid.*  
 Pili capitis propterea dicitur *capillus*, cuius  
 congeries in mulieribus *Coma* nuncupatur.  
 357  
 Pili palpebrarum vltra certum terminum non  
 excreverunt. *ibid.* eos nunquam defluere no-  
 tauit *Galenus*, nisi in magnis partis affecti-  
 bus, vt in lue venerea, & in elephantiasi.  
 358  
 Pili qui in genis & mento erumpunt, barbam  
 constituunt. *ibid.*  
 Pili pubes, an aliquem habeant usum? *ibid.*  
 poltremi canescunt, ex *Aristotele*. 359  
 Pilorum usus, qui in perinzo & circum podi-  
 cem magnâ copâ fructuare solent. *ibidem.*  
 Pili narum, quare *Vibrissæ* dicuntur. *ibid.*  
*Pennis* figmentum subtile & ingeniosum de ca-  
 runculis pendendi mulieribus. 667  
 Pisces qui non respirant, carent collo, pulmone,  
 & *finibus* *Cordia* ventriculo. 228  
 Pisces quare non edunt *vosum*. *ibid.*  
 Pituita ex capite copiosa defluit in *Romachum*  
*Fotus*. 387  
 Pituitosi homines febribus sunt minus obno-  
 xii, nec acutis morbis tentantur, quin etiam  
 viuiaciores sunt biliosi & melancholici.  
 256  
 Placenta in humano vtero quid, secundum ve-  
 teres & Recentiores. 372  
 Placentæ varium discrimen in varis animalibus.  
 372  
 Placenta quid est. *ibid.*  
 Placenta est sanguinis concreti moles carnea,  
 quæ attentione in sanguinem liquari & resol-  
 ui potest. 373  
 Placentæ usus. *ib.*  
 Placenta tota nonnunquam per septem dies  
 hæret in vtero. 374  
 Placentæ situs. *ibid.*  
 Placentæ in *Gallia* & *Germania* multorum ca-  
 dauum humanorum sectionibus manum  
 adhibuit, nectamen excelluit. 38  
 Placenta Naturæ gratias egisse fertur, quod ho-  
 mo natus esset. 32  
*Plempy Præfatus Louanensis* testimonium de  
 Clitoride. 669  
 Pleura quid? vnde sic dicta? 215  
 eius substantia. 216. cur gemina? *ibid.*  
 Pleuriticorum cadauera dissecta apparent ful-  
 gurita. 216  
 Pleuritis & peripneumonia sepe simul & semel  
 exoriantur. *ib.*  
 affectus uterque mixtus *pleuropneumonia* 217  
 citur à *Rosalio*. & à *Vincenzo Bonino*.  
 Pleura vnde exoritur. *ibid.* quomodo conspi-  
 citur. *ib.*  
 Pleura superiore Diaphragmatis faciem ob-  
 ducit. *ibid.*  
 Pleuritide inchoante, quomodo & cur sapie-  
 nte sectio utilis esse possit. 221. 222  
 Pleuritidis suppuratione vomica, quomodo & per  
 quam viam per vtrius expurgatur. *ibid.*  
 ia Pleuritide inferiorum costarum, foris prius  
 eliquatâ materiâ, cur catharticum exhiberi  
 consilii *Hippocrates*. *ibid.*  
 in Pleuritide qualiter, siue dextra, siue sinistra,  
 basilicam dextram semper secandam esse ma-  
 le putas *Vesalius*. *ibid.*  
 Plexus choroides in Cerebro, quid. 219  
 Plexus choroides quid differat à *rete mirabi-*  
 li? 262  
 in Plexu mirabili generari & formari apople-  
 xiam, illeis ventriculis Cerebri sustinet &  
 probat *Fernelius*. *ibid.*  
 Plexus choroides superiorum ventriculorum  
 Cerebri torus ex venis contextus est: *rete mir-*  
 abile, ad basin Cerebri locatum, ex arteria  
 constat, & reuera existit. 679  
 Plexus mirabilis venarum spermaticarum cum  
 arteriis, primum detectus fuit à *Joanne Gun-*  
 tero *Andernaco*, *Medico Parisiensi*. 613  
 Plexus dupliciter, vt & *Rosalio*, *Tissotus* anato-  
 mæ celeberrimi superbum *hæstosarum suarum*  
 exordium. 1417  
*Plinius* impie scripsit, hoc hominibus à Deus  
 concessum, quod à miseris quando libere  
 se liberare possint. 777  
 Podex vnde dicitur? 707. est tanquam vile man-  
 cipium, naturæ ministerii obnoxium. *ibid.*  
 quare ipsum illam obtinuit? *ibid.*  
 Podex ab officio & visu extollitur & laudatur à  
*Cælio Calcapino*. *ibid.*  
 non est causa fetoris. *ibid.*  
 eius compositio. *ibid.*  
 duplicem habet sphincterem. *ibid.*  
 Podicis pilus quem habet usum. *ibid.*  
 Potestate quodam admirabili *Petrus Tembus*,  
*Cardinalis*, descriptit *Penum humanum*,  
*Alentiam*, siue *Præapum*, sub hoc titulo,  
*Præapum*. 154  
 Pollicis musculi enumerantur. 322  
 Pollicis musculi enumerantur. 325  
 Polycetus propter elegantiam statum, *Cælius*  
 appellari meruit. 3  
 Polycetus pictor egregius, eleganter & argute  
 dicere solebat, molestissimum opus esse, cum  
 ad vineam peruenisset. 359  
 Porcus animal homini simillimum, quoad par-  
 tes internas. 60  
 Pottam venam, quare Natura condidit separa-  
 ram à vena Cava. 111  
 Portæ & Causæ venarum, an sit aliqua anasto-  
 mosis ad Hepat. *ibid.*  
 per Portæ truncum triplex humor Anere, &  
 commiscere putatur. 112

venæ Portæ officium eleganter describit *Galenus*. *ibid.*  
 Portæ iecoris qui primus nominavit, iocur ut  
 bi auribus amplius comparavit. *ib.*  
 Porta vena, quare sic dicatur. *ibid.*  
 eius principium, ubi debeat assignari. *ibid.*  
 per Portæ venæ truncum, veluti per Portam,  
 chylus iecur intratur. *ibid.*  
 vena Portæ, quomodo facili videatur. *ib.*  
 Præcepta traduntur de his, quæ sepe fiunt.  
 433  
 Præceptoribus qui nunquam vñ sunt, in operi-  
 bus artis sapius errant. 431  
 erga præceptores discipulorum ingratitude  
 summa hodie viget in Medicina. 432  
 Præcordia, quid sint *Plinius*. 433  
 Præfixa ætæ conditæ mortuos collaudabant.  
 430  
 Præputium quid est. 158. de curatu, quomo-  
 do queat refecti. *ibid.*  
 Præputium vnde dicitur. *ibid.*  
 Præputi, mentula, siue *Penihumanus* descriptus  
 à *Petro Bembo*, Cardinale, Poëmate quodam  
 singulari & admirabili. 154  
 Præputi apud *Grecos* magno in honore fuit.  
 155  
 Præputi in agris & villis, ut & in templis vrbium,  
 pro *Dei* cultus. *ib.*  
 Præputi *Romani* mulieres velare, togis prætex-  
 tis, sacrificare solebant. *ibid.*  
 Præputi de lascivie, vetares *Phonastorum* pe-  
 nem infibulabant, & vineulis ac subligaculis  
 coëtebant. 153  
 Præputius lactæas venas mesenterij ab *Asculio*  
 detectas ridet & eludit validis rationibus.  
 108  
 Primæfius, vis doctissimus, omnium primus  
*Hermes*. Circulationem sanguinis impugna-  
 vit argutis rationibus. 553  
 Primæfius videtur *Vallem* scripsit de *Circu-*  
*latione sanguinis*. 554  
 Primæfius circulari sanguinis *impugnatus*.  
 ceterimus. 564  
 Primæfius nimis subtiliter, exatè & seuerè a-  
 git contra *Hermem*. 565  
 Primæfius resellitur. 581  
 Principia effluvia prima ætæ planè differen-  
 tiam, tria sunt apud *Aristotelem*, in quibus  
 singulis est consistendum, *Mens*, *Ans*, & *Fa-*  
*culas*. 842  
 Principium primum ætæ artificialium, in quo  
 veluti extremo conquisicendum, *Ans* est.  
*ibidem*.  
 Priscorum virorum auctoritas & dignitas.  
 434  
 Præster *Martianus* fallitur in explicando *Hip-*  
*pocrate*. 588  
 Præster *Galenus* vulgarissimè expositio *Anato-*  
*mica*, *Chacum a son veronique à la teste*.  
 439  
 Pubes vnde dicitur. 157. eius partes. *ibid.*  
 Pudenda vnde dicta sunt, & cur sic dictæ par-  
 tes genuales in vtroque sexu. 153  
 Pudendorum humorum imaginæ antiqui  
 appendebat collo aduersos fastem. 154  
 Pudenda pro amuletis è collo puerorum sul-  
 pendebant *Romani*. *ibid.*  
 Pudenda apud multos in mysteriorum tribus

religiosis cur habita. 155  
 Pudendum virium veneratio fuit infana o-  
 lim apud *Athinas*. *ibid.*  
 Pudendis sacrificant quidam veteres. *ib.*  
 Pudenda hominis vidule gratias ac iacundius  
 habens mulieres, quàm reliquas corporis  
 partes perspexisse atque contempsisse. 155  
 Pudendum laudatur ex *Aristodemus*. *ibid.*  
 Pudenda virilia honeste Matrona inscens *Libe-*  
*ri* apud *Romanos* cotinere solebat. 157  
 ex Pudendi venis hemorrhoides in mulieribus  
 quandoque escitantur. 186  
 Pudendi muliebris motus *Martialis* notus. 138  
 ex Pudendorum inspectione sunt depromenda  
 virginitatis signa. 194  
 in Pudendi orificio sunt collocata virginitatis  
 signa. *ibid.*  
 Pueri in vtero sunt pumiliones, quia caput ha-  
 bent proportionis sui corporis valde ma-  
 gnum, contrà quàm in brutis animantibus  
 accidit, quæ in vtero partes inferiores supe-  
 rioribus maiores habent. 407  
 Pueri in vtero sunt pumiliones, quia habent  
 caput proportionis sui corporis valde ma-  
 gnum. 147  
 in Pulli generatione tria debent considerari,  
 nempe Efficiens, Materia, & Alimentum.  
 182  
 Pullificationis artificium, quomodo inuesti-  
 gandum. *ib.*  
 Pulmo vndenam dicatur. 118. quid est. *ibid.*  
 Pulmo ad æris præparationem, qui Cordi sup-  
 pediat, videtur necessarius. *ibid.*  
 Pulmonis substantia mollis & spongiosa. *ib.*  
 Pulmo calidior sanguine alitur, quàm reliquæ  
 partes. *ibid.*  
 Pulmo inter omnia viscera maximè sanguinis  
 cupit abundare. *ibid.*  
 Pulmo viscus est sanguisorbum. *ibid.*  
 Pulmonum morbi non curantur, nisi copiosa  
 sanguinis detrahatur. *ib.*  
 Pulmo ex tussis vel alia violentia, cur facile  
 rumpatur. 129  
 Pulmo est emunctorium Cordis, &c. *ib.*  
 Pulmo interdum tres habet lumbos. *ibid.*  
 Pulmonis alæ & lobi quem vñ habent.  
*ibidem*.  
 Pulmouis color, foramina & nervi. *ibid.*  
 Pulmoni sensum perexiguum, aut ferè nullum  
 tribuit *Galenus*, contra, scribit *Hippocrates*,  
 pulmonum inflammationes esse dolorificas.  
*ibidem*.  
 Pulmo interdum pleura adnascitur. *ibid.*  
 Pulmo, si coctis immediatè adhæreat, mole-  
 stam dyspnœam etiam in sanis hominibus  
 adfert. 130  
 Pulmonis cum pleura coherentia ad quid vir-  
 lis. 130  
 Pulmonis membrana tenuissima à pleura pro-  
 pagata, quo fine facta sunt? *ibidem*.  
 cur foraminulenta in felibus? *ibid.*  
 Pulmones duntaxat tussiendo per anacathar-  
 sis expurgantur. *ib.*  
 Pulmo & Thorax, quomodo per intestina &  
 renes possunt expurgari? *ib.*  
 Pulmo triplex habet valorum genus. *ib.*  
 Pulmonum motus, an sit inscius, an aduen-  
 tius controuertitur. 131

Pulmo Thoracis motum sequitur in violenta  
respiratione. *ibid.*  
Pulmo sequitur motum Cordis, si non passibus  
æquis, Thorax verò pulmonis motum. *ib.*  
Pulmone per senium arefcere & indurcfcente  
intereunt animalia. *ibid.*  
in pulmonum morbis non est patendum venæ  
fectioni, vbi funt ab humotum affluu. 239  
pulmones per fanguinis actiotionem etoli, vel  
non fati refrigerati, incalcfcunt, & feofum  
exarefcunt. 289  
Pulmonum ampliudo copiofum fanguinem  
defiderat. 519  
Pulmonum præfocatio in vatiosis & morbillis,  
liberaliter requirit fanguinis miffionem, etiam  
poft eruptionem. 590  
in pulmonis affectibus fanguinem detrahit *Hip-*  
*poerates*, variis in locis. 591  
Pulsum rem fallaciffimam in viuente *Celfus* iu-  
dicant. 564  
Pulfus immutati vatiz caufe recentifentur. 583  
Papilla nihil eft aliud, quàm foramen vuez,  
quod non fuit incertam vagari aciem, fed  
veluti canali dirigit. 275  
per Pupillam, quid intelligendum. *ibid.*  
Papilla, visionis instrumentum dicitur, quafi  
pupula. 276  
Papillæ definitiones vatiz adferuntur ex varis  
authoribus. *ibidem.*  
Papillam primam vifus partem effe ftatuit *Arif-*  
*totelis*. 277  
papilla eft foramen vuez tunicz. *ibid.*  
papillæ dilatio, vel mydriafis, aut anguftia,  
vel phififis, vifum immittit. *ib.*  
papilla derepente non poteft contrahi, atque  
dilatai, fine maximo dolore. 277  
urgendi tempus & modum indicat *Circulatio*  
*fanguinis*. 395  
urgendi tempus ex *Galeno*. *ibid.*  
urgendi huiusmodi, quomodo funt. *ibid.*  
urgationi quondam debet fuccedere venæ  
fectione. *ibid.*  
urgata ad purpuram collata faciliùs digofci-  
tur. 421  
violenta materis à thorace, quomodo per vi-  
nas & fecellum poffit expargari, conerone-  
tur. 421  
vredo fanguinis ferofi putrefcens, caufe eft  
eruentationis cadaveris ad confpectum lica-  
tij. 61  
vredo fanguinis, qui cootinetur in vena Ca-  
ua, elunat per *Circulationem*, & exurit ac  
confumitur igne. 612  
vylorus primum eft inteftinum, ex *Celfo*. 101  
pyramidales mufculi funt exigui momenti. 35.  
eorum vifus. *ibidem.*  
quoniam animalia carent iftis mufculis.  
*ibidem.*  
non femper teperintur in homine. *ibid.*  
an compunt veficam 87  
pyramidales mufculi ab Ofle pobis enafcuntur.  
242  
interdum unus adeft. *ibidem.*  
aliquando vterque deeft. 325  
ab his veficam compunti putat *Fallopius*.  
*ibidem.*  
pyroccum fatis feliciter fine vilo dettimento  
apponitur 104 dicitur, circa concuffum fagit-

talis &amp; coronalis.

631

Q

Q Væritio eft magui momenti ad humani ge-  
neris confervationem, *An Cor in Forti*  
*propria vitali facultate fui prædium, & monetur*  
quæque ad Medicum. Iutifperitum &  
Theologum pertinere videtur. 389  
Quæritio meretricis fanguinem fuam iratam o-  
piat, apud *Petronium*, fi vnaquam fe memi-  
nerit virginem fuiffe, &c. 194

R.

R Achis ex pluribus offibus conflata debuit,  
ne vno laxato, medullæ compreffio an-  
gulari fape funefta contingeret. 488  
Rady mufculi pronantes & fupinantes. 318  
Ratio eft manus intellectus in homine. 11  
Rationem quætere fanfu neglecto, eft infirmi-  
tas intellectus. 21 & 58  
Rationi quandonam credendum, ex *Arifto-*  
*tele*. *ibidem.*  
Realis *Columbus*, qualis Anatomicus. 30  
primò phatmacopolium exercuit. *ib.*  
Recti mufculi non tot funt, quot habet inter-  
fectiones. 88  
Rectum eft index fui & obliqui. 440  
Repentinè & inopinatè mortis caufa deprehen-  
fa in Corde. 219  
aliquot exempla fubiunguntur. *ibid.*  
Rèpreheni non debet, qui in ampla fegete  
ftipulam relinquat ad fpicalgium. 614  
Renes vnde dicti. 125  
Renes à fitu fuo interdum dimoveantur & lu-  
xantur. *ib.*  
Renum luxationis caufa quænam effe poffit.  
*ibidem.*  
Ren dexter magis eft obnoxia luxationi. *ib.*  
Renes pingues habere quibus lethale eft. 144  
in *Rembus* glandula magna fpectanda eft. *ib.*  
Renes firum habent in duplicatura peritonæi.  
*ibidem.*  
vulnerati & incidi poffunt integra & illæfa  
abdominis capacitate, quod certiffimum in-  
diciu eft *Nephtotomiam* fecit ad adminiftra-  
ri poffe. *ib.*  
ex Renum fupputatione fape accidunt abfcelfus  
mufculorum abdominis. *ibid.*  
Renes gemui, quare à Natura cooditi. *ib.*  
Renum inter fe coonexio & fymptathia. *ib.*  
Renum alio coonunio. *ib.*  
ex Renum imbecillitate ferum non amplius tra-  
hentium leucophlegmatia generatur. *ib.*  
fine vlla Renum obftructione vrina fuprà Re-  
nes aliquando intercipiunt. 144  
Renum parenchymate vifito & exoluto, facul-  
tas eorum attraxit aboleretur. *ibid.*  
ea illa Renum atonia fine vilo calculo in vefica,  
& vtroque Rene, cum vrinæ fuppreffione fu-  
pra renes interit *Polemarcus* & *Ornans*, in  
quo ambo Renes erant penitus effati & exo-  
luti. *ibid.*  
Ren dexter in animalibus minus pinguis, ex *Ar-*  
*iftotele*. *ibidem.* quia altior & propior tectis.  
*ibidem.*  
de Rene vnieo mirabili exemplum. 245  
Renes inxqualem fium habent. *ibid.*

- Renum inter se distantia. *ib.*  
 Renum figura in homine varia est. *ib.*  
 Renes naturā suā glandulosi, suos habent exiguos ad locum excolandum, eribrorum instar foraminibus peruios. 146  
 Renum caruncula & tubuli. *ib.*  
 Renum carunculae papillares primus agnoscit, & eleganter describit *Carpus*. *ibid.*  
 Renum morbi, quare eorum & effluēs. *ib.*  
 Renum vasa, eorum situs & usus. *ib.*  
 Renibus, quare datur magnae arteriae. 147  
 Renum usus si deficiat, multos morbos accersit. *ib.*  
 Renom vias publicas Natura nimium angustas effinxit. *ib.*  
 Renes ad elaborationem feminis, an conferant? *ib.*  
 Renes conferunt ad libidinem, dum incalescunt. *ib.*  
 Renibus temporalium & terrena rerum delectatio tribuitur. *ib.*  
 Renum consensus cum partibus superioribus & inferioribus vbi nam exponatur. *ibid.*  
 Renum diuersae fabrice aliquot exempla recensitor ex variis authoribus. 148  
 Renum cum vesica magnus est consensus, officij communione, & substantiae membranosaesymphathia per veretrem. 150  
 Rete mirabile dicitur à plexu retiformi. 783  
 Rete mirabile duplex in Cerebro. 262  
 quid differat à plexu choroidei. *ib.*  
 Rete mirabile ex caronibus arteriis contextum. 261  
 de illius hyparsi non est dubitandum. *ib.*  
 in eo generatur sopor ex repletione arteriarum, & somnus ab effusione sanguinis. *ibidem.*  
 Respiratio conglobina *Sancti*, miserabilem sortem, suspensum amare fletur, & radii eorum corpora effundit, donec stillat aqua de celo super interitum. 424  
 Respirationis finis est refrigeratio, & in ea causa efficiens, siue instrumentum est diaphragma. 347  
 Rictum Sardonium tribuit *Galenus*, musculo lato, suis quadrato. 777  
 Rectum intestinum, quare sic dictum. 106  
 locum se vulneratum facile consolidatur. *ibidem.*  
 quotuor habet neruos, per quos valde sensibilis redditur. 107  
 eius pars inferior anus dicitur *ib.*  
 Remissus, libro de Scorbuto, de Lienis adione sententiam *Hippocrati* & *Aristoteli* quadratibus rationibus confirmavit. 133  
 Dr. *Ioannes Riolanus*, Auctoris nostri Patris opinio de quodam morbo oculi, qui ita dicitur. 275  
 Riolani excusatio, imò causae, cui scribit in *Laurentium* & *Benedictum*. 686  
 Riolani opinio de Circulatione sanguinis constituta. 1577  
 alia noua opinio de Circulatione sanguinis proponitur. 579  
 eisdem quoque Circulationis accuratior explicatio. *ibid.*  
 Riolanus viginti septem annos natus, post octo annorum exercitium in Anatomica propria manu administratis, suae *Schola Anatomica* editionem permisit. 347  
 Riolanus est inuentor *Angoni* musculi, & illius nominis. 328  
 Riolanus quomodo indurus eum venit ad secundam & administrandam Anatomiam. 62  
 Riolanus primum Medicum *Hippocraticam* generalem & particularem pollicetur. 194  
 Riolanus primus detexit cartilaginem magni momenti, quam Natura appoluit in ambitu utriusque cauitatis supernae ribis. 739  
 Riolanus primus descripsit & nominauit molculos pharyngis. 741  
 Riolanus primus exposuit & inuenit motum Ossium Pubis & Ilium cum Ossis Sacro iunctorum. 744  
 Riolanus primus duplicem bilis meatum constituit. 749  
 Riolanus bis secus ex calculo in vesica. 751  
 Riolanus multa venositas seire dedit, & exercitatio assidua, etate sensueto, & studio atque exercitio Anatomico pet quadragesima quinque annos continuauit. 718  
 à Riolo rei Anatomicae vltimum complementum fuit additum. 719  
 Riolanus primus in Foetu & in puello vique ad iuuentutem, & ultra, humanos renes vtilibus similes indicauit. 770  
 Riolanus, Professor Regius factus, ut *Parisijs* doceat, & administrat Anatomiam. 64  
 Riolanus gratiarum actio ad *Dnum* pro studio Anatomico, & pro confecta *Anthropographia*. 417  
 Riolani querimonia aduersus ingratos discipulos. 423  
 Riolanus primus inuenit valvulam in inguinali interna, alius indicat & incognitam. 787  
 Riolanus Pater vindicatur à calumnia *Bartolini* super caritate neruorum. *ib.*  
 Riolanus Pater ridiculè vocatur ab *Hofmanno*, similia *Fagel*. 790  
 Riolanus primus origines & insertiones, numerum & nomina molarum propoluit. 306  
 Riolanus primus insignem pancreatis usum ex *Fernelio* tradidit, vicariam Lienis viscus appellauit, lecoris & Lienis spongiam & emundatulum esse probauit. 321  
 Riolanus Consules & principes vici publicis Galeni dissectionibus interfuerunt. 50  
 Riolanus Medicis dissecandi modum ostendit *Galeno*, cum antea more laicoorum, Anatomiam administrarent. 57  
 Riolanus impetrata quiete ob xtatem iam ingruiscentem, morbisque obnoxiam, *Adonij* cepit Anatomica tractata. *ib.*  
 Rotula quid est 517, varia eius nomina. *ibid.*  
 eius figura, & *Galeni* descriptio. *ib.*  
 Rotunda figura omnium capacissima. 273  
 Riolanus Epistulas quid scripserit. *ib.*

S.

**S**acratissima Virgo Maria nostrum Salutem concepit, Virgo ante Conceptionem, & post: in partu & post partum inuoluta Virgo permansit. 775  
 Saluastus, vir clarissimus, inquit, an varolae & morbilli fuerint morbi veteribus cogniti? 150



- Salmafius* reprehenditur de incerta aetate quam nonem *Medicis Parisiensibus* exprobrauit, super *Calice d'aire Pitonica*, quem putat ante sua tempora *Parisius* ignorum fuisse. 636
- Salomon* sapientissimus, tria difficillima censet, & quarum penitus ignorat, quarum sunt illa. 194
- Salomonis* verba, ex *capite 12. Ecclesi.* elegantiter explicata & exposta. 230
- Salustella Arabum* vbiunque constituitur, nou est soboles medianæ, sed cephalicæ. 732
- Sanguificationis opus est iō Hepate constitutum. 341
- Sanguis duplex, venosus & arteriosus. 182
- Sanguis quomodo transeat à dextro Cordis ventriculo in sinistru. 219 refertur sententia *Caluishi & Vesaly* super illo transitu. 239
- Sanguinis appulsus continuus ad Cor, directus tamen ab anima, motus petennitatem facit. 248
- Sanguis in posteriora reuellendus iō ingentibus narium hemorrhagis imò sanguine guttatum fluente, tepida ligandum est Caput, vt vberius fluat. 255
- Sanguis est cubito mittendi tres suae loci. 342
- Sanguis ab veto post partum, oisi expurgetur sufficiens, & remaneat per substantiam vteri diffusus, inflammationem inducit, & gaugrenolium. 365
- Sanguis maternus ab Hepate factus purgatur. 387
- Sanguis totus non circulat, sed ferme dimidium dumtaxat, alterum dimidium continetur in vena Porta, & canalibus minoribus venæ Causæ & Aortæ, qui nullo modo naturaliter circulant. 342
- Sanguis qui nam sit *circulatorius*. 342
- Sanguis est in perpetuo fluxu in illar fluminis & fontis aquæ salientis. 346
- Sanguis aliter mouetur in corporis circumfectione, aliter in Corde. 346
- Sanguis recipit fluere à Corde, & ad illud recurrit. 357
- Sanguinem ab arteriis fluere in venas probatur. *ibidem.*
- Sanguis per septum Cordis traditur. 359
- Sanguis eodem modo reuoluitur circulati motu in sanis, vt in ægris corporibus. 361
- Sanguis per pulmones transito violenta est, & eorum natura. 363
- Sanguis libæ 24. admittitur in corpore bene habito & sanguineo, ex more *Americana*. 362
- Sanguis totus non circulat, sed dumtaxat dimidius. 369
- Sanguis in venis & arteriis constet oīi distinctio & differentia. 374
- Sanguis continetur agnatus ac diffusus nou potest fieri. 375
- Sanguis venæ Portæ nou circulat, nec sanguis Cerebri, nisi rardè, quare. 378 & 380
- Sanguinem primæ regionis, siue venosum, siue arteriosum, vni circuli, manifestè demonstratur. 379
- Sanguis minorū valorum non circulat. 380
- Sanguis diffusatur per continuam illam reuolutionem ab arteriis in venas, itanscundo per Cor, vt redeat in arterias. 382
- Sanguinis mittendi indicationes vnde nam desumuntur. 384
- Sanguis, an sit mittendus omnibus febribus? *ibidem.*
- Sanguis quomodo sit mittendus in febribus continuis? 385
- anō Sanguine impuro, sit ille copiose detrahendus, vel parcius, ac potius expurgandus, quia cacochymiz debetur purgatio. 389
- Sanguine in febribus ardentibus & malignis puro & laudabili apparet: post varias phlebotomias, haud dubiè putredo non continetur in maiotibus canalibus venæ Causæ & Aortæ. 38
- Sanguis fluens per partes superiores quæ arteriæ & quomodo sistendus. 390
- Sanguis missio, an possit, vel auctere, vel retardare excretionem criticam variolarum, vel morbillorum? *ibidem.*
- Sanguinis missio *Medicorum Parisiensium*, vt nimis larga & licentiosa, quare vituperatur. *ibidem.*
- Sanguinem mitti nonum non est, sed nullum esse morbum, in quo sanguis non mittatur, oonum est, ex *Cornelio Celsi*. 391
- Sanguis nullus est remedium principale apud *Hippocratem*. 394
- Sanguis aliter distribuitur in ventre inferiore, aliter in Cerebro, aliter in reliquo corpore. 395
- Sanguis ex doctrina *Circulationis Hermiana*, per venas omnes, & præcipue per truncum semper ascendit, vel recurrit ad Cor, nequaquam descendit. 396
- Sanguis in ardente febre copiose detrahitur, si venosus fuerit, refrigerabit arterias, tandemque successione vacuū totus recurret ad venas, vbi magis refrigerabitur. 600
- Sanguis totus non circulat, nec per medios pulmones secundum naturam traosist à dextro Cordis ventriculo iō sinistru, sed per medium Cordis septum, porosum ac foraminulentum, nec solus arteriosus nutrit, venteriam venosus. 605. & 606
- Sanguis venosus venæ Portæ nullam habet circulationem. 606. 609
- Sanguis venosus, quomodo distinguatur ab arterioso. 609
- Sanguis minorum venarum non circulat. 611
- Sanguinis traditio per septum Cordis est vetè naturalis. 794
- Sanguis coactus in Liene impurus est, & valde ineptus alendo. 815
- Sanguinis Circulatio. Vide *Circulatio*.
- Saphema, inchoante pleuritide, quomodo & quare viliet aperitor, ex *Arabum* doctrina. 221
- Saphæa vena caret coniuge arteria, & nervus ab ea vena remotus est, ideoque secutè pertodit potest. 347
- Sapientiam veterum in sophisticam & inanem garrulitatem degeneratam prædicit *Tris megistius*. 38

Sapientia viri non est indecorum & indignum  
manus exercitum. 58  
Saraceni in pluitibus morbis aures posticas sca-  
rificant. 281  
Saxi an monstra dici possint. 8.4  
Sceletus quid, unde dicitur. 449  
Sceletos a *Fertillissimo* vocatur *erites cadaveris*.  
*ibidem*.  
Sceleti veteres Medici habuerunt, coaptata, &  
tytombus offendent. *ib.*  
Sceleti diuisio in caput, truncum & artus.  
*ibidem*.  
Sceleti pars secunda truncus appellatur, estque  
illud quicquid demptis artibus, & auulso  
capite remanet. 487.  
eius diuisio. *ibid.*  
Sceletum quid est, ex *Galeno*. 436  
Scholz Medicæ *Cœli & Cœli*, Medicinæ stu-  
dium nunc in *Græcia* floruerunt, ut prædicat  
*Galenus*. 63  
Schola *Ædæca Parisiensis* Anatomicæ doctri-  
næ gloriam sibi vindicat. 63  
Scholasticissimos produxit Anatomicos *ib.*  
herbas habet plusquam octingentas, quæ suf-  
ficiunt ad morborum depulsionem.  
Scitites dicitur, cum peritus causas cognosci-  
tur. 443  
Scorbutus ab *Hippocrate* descriptus.  
ex Lienis magnitudine nascitur. *ibid.*  
Sernum dictum, quasi scortum. 157  
Scyphus *Dingensianus* quomodo efformetur.  
*ibidem*.  
Seytharum sterilitas videntem pendat. 165  
Seytharum infecundos fuisse propter sectionem  
venarum pone aures, solus annotauit *Hippo-  
crates*. *ibid.*  
Secundæ vel secundinæ Fetus quid sint. 375  
Sedem tuam constituunt, ex *Galeno*, nempe In-  
testinum, sphincter, & anus. 319  
Semen confertur eodem sanguine, quo nu-  
tritur singula pars corporis. 183  
Semen à stomacho veteri auidi: à stomacho à ven-  
triculo famelico. 197  
Semen à sic medullæ spinalis desluitur. 148  
Semen si sit à toto deciduum, id sit ratione spi-  
rituum, non materię seminalis ab omnibus  
partibus decurrens ad testes. 817  
Semina omnia aliquid in se alimenti conti-  
nent, quod vñ cum generandi principio  
natura profundat, sicut in onis, &c. 164  
Semen vitile nihil ex se produceret, nisi loco  
accommodato calperetur & conservaretur.  
177  
à Semine corrupto, cur deterius habent mu-  
lieres quàm viri. 179  
Semen proprium an habeant mulieres, proli-  
ficum, & necessarium ad procreationem?  
181  
Seminis infecundi in mulieribus auctor est  
*Aristoteles*, dum sanguinem menstruum pro  
semine substituit. 181  
Semen utrumque est à toto deciduum.  
*ibidem*.  
Semina *Empedocles* comparabat ouis. *ib.*  
Semen muliebri, quare vtriplurimum fortius  
est, & calidius virili. *ibid.*  
in Semine mulierum fallitur *Hofmannus*. *ib.*

in Semine nimis futuri hominis ratio com-  
prehensa est, & legem barbe, & canorum  
nondum natus infans habet. 355  
Senes, quare acuti non cernunt, quia ut cate-  
rarum partium ceteris, sic oculis quoque so-  
lescentibus contrahitur, & crispior redditur.  
273  
Senus ipsi per se quidquam moliri & agere non  
possunt, sunt tantum ministri & interuenti,  
vel instrumenta, quibus vitur anima ad ius-  
sa sua descendit. 249  
Seprimi diei vim & imperium in Conceptione,  
abortu & partu agnoscit *Hippocrates*, eique  
magnam auctoritatem tribuit. 381  
Septimus dies terminus esse solet februm acu-  
tarum, nisi adsit inflammatio visceris alicuius  
principalis. 602  
Sesamoidea ossa *Galeno* innouerunt, ut & Os  
Cordis, Os Eihmoides, Os Hyoides, &  
Auris ossicula. 511  
Sesamoidem Ossiculum inuentioem sibi, sed fal-  
so, tribuit *Vesalius*. 513  
eorum descriptio, sicut & figura. *ibid.*  
eorum numerus est incertus. *ibid.*  
Sesamoidea multa, magnaque & ossa depre-  
henduntur in simia. 519  
Sexus necessitas & discrimen videntem intelli-  
gitur. 153  
Sexus non nisi in speciebus perfectis distinctus  
est. 152  
Seaum in plantis agnoscunt *Theophrastus* &  
*Plinius*, contra mentem *Aristotelis*. *ibid.*  
Sexus quibus notis distinguatur. *ib.*  
Sexus utriusque partis, quomodo sita dis-  
sint. *ib.*  
Sexus distinctio fuit necessaria, eaque in diuer-  
sa partium genitalium structura consistit.  
153  
Simia ut ridiculam habet animam, sic corpus  
est adepta ridiculum. 7  
Simia corpus ad humani fabricam propius ac-  
cedit. 40  
Simias & homines dissectuit *Galenus*, & tamen  
soliis hominis Anaxomen descriptis. 46  
Simia homini similissima quoad partes externas.  
59  
Simia spectaculum est odiosum. 60  
Simiarum varie sunt species. 515  
quænam selligenda ad usum Anatomicum.  
*ibidem*.  
in Simiis veteres Anatomici celebrasse certum  
est, imò ex ipso *Galeno*. *ib.*  
non tantum Simias *Galenus* dissectuit. *ib.*  
Simia, ut ridiculam animam habet, sic ridicu-  
lum corpus obtinuit ab humano quæsum.  
516  
Simia caput, suræ, facies describuntur.  
*ibidem*.  
Simia quid differat in dentibus ab homine.  
517  
Simia spina & ossa ei adnexa examinantur.  
*ibidem*.  
Simia costas per se fert viginti sex. 518  
Simia artus quid differant ab hominis. 519  
Simia ossa habet Sesamoides multa, eaque ma-  
iora, quàm in homine. 530  
Simile duobus modis dicitur apud *Galenum*.  
516

- Similitudines præstantibus etiam Medicis, errores & dubitationes parvunt, quas discernere prudentis, & periti est artificis. 516
- Simon Pinetus, Parisiensis Medicus* eruditissimus & Professor Regius. 389
- Simon Pinetus, Medicus Parisiensis* clarissimos, de vñ Anatomicon valorum Cordis in Foetu disputavit aduersus *Andream Laurentium*, Medicum Monspeliensem. 672
- Simon Pinetus, Doctor Medicus Parisiensis* præstantissimus, dicere solebat libros *Hippocratis*, femuaria totius Medicinæ continere, &c. 893
- obiit maximus ille vir anno xtatis quinquagesimo quinto, anno D. 1618. *ibid.*
- in *Simarum* regione incolae omnes nigros oculos habere scribunt historici. 270
- Sinus dicitur, quando euitas ab ore angusto in amplitudinem latebit. 478
- Sinus Cranij octo enumerantur. *ibid.*
- Situs pueri in vtero, quomodo intelligendus. 408
- Situs ille an sit Fœtui laboriosus & molestus, an sit medius, an extremus. 421
- Situs ille variat se secundum varios Auctores. *ibidem.*
- Situs ille, quare tam diuersus descriptus fuerit à variis Auctoribus. *ibid.*
- Sartorius apud Platonem* monet, vt non attendas, quis dicat, sed quid dicatur. 435
- Seranus* pudica Musa iocosa serius miscbat. 375
- Seli* astro splendidissimo præferendus est pes humani corporis. 7
- Somnare de mari, humorum agitationem significat, & humores corporis mari compantur. 556
- Somnus sensuum quies, au vigiliam præcedat in Foetu. 400
- Sophrenes* libris de *sternum* medicis, non cessabat addubitare, semetipsum corrigendo. 683
- Spasmus cynicus, qui nono die accidit in diuisione Festi, est signum lethale. 265
- Spasmus cynicus, siue canina convulsio, quomodo fiat. 717. 723. 725
- Sphenoides os vnde dictum. 470
- quare dicitur basilare. *ibid.*
- ex quatuor partibus constat. *ibid.*
- ante *Galenum* veteribus Anatomicis ignotum fuit, aut saltem indistinctum. *ibid.*
- duas habet facies siue tabulas. *ibid.*
- eius sinus quem habeant vñum. *ibid.*
- &c. 475
- Spigelius*, quid in Anarome præstitit. 34
- Spigelius* de humano Foetu librum edidit, absurdum multa & ridicula continentiem. 362
- Spigelius* testamento suo præceperat, vt viginti quatuor lectiones Anatomicas, quas exornauerat ad editionem dimitteret, ederentur in locum. 735
- Spigelius* totum penè librum de *Musculis* conrexit ex *Risleno*. 740
- Spigelius* nomina musculorum ab aliis inuenta retinet, & ipsorum actiones male exponit. 742
- Spigelius* opinio de musculis abdominis, quam nouam prædicat, examinatur. 744
- Spigelius* multa desumpsit, ex *Risleno*, de Lienæ, & eius luxatione. 710
- Spigelius* plagia multa ex *Risleno*. 752
- Spinalis medulla per osicam & fistulosam Kacheos cauitatem, circumscriptis partibus nervos securè distribuit. 348
- Spinalis medulla est Cerebri propago. *ib.*
- Spinalis medullæ corpus bipartitum ex quatuor radicibus constat. *ib.*
- Spinalis medulla non est apophysis, sed epiphysis. *ib.*
- Spinalæ medullam feminalem materis fontem & scaturiginem existimavit *Plato*, cum aliis veteribus. *ib.*
- Spinalis medulla vñum ferme similem habet cum Cerebro. 349
- ex Spinali medulla grauissimè & difficillimè homines xgroant. *ib.*
- ex eius resuscitatione tabes oritur, motusque homo, si medullam spinæ laesiua fuerit. *ibidem.*
- ex Spinali medulla hominis, angues & serpentes proceat veteres & recentiores prodiderunt. *ib.*
- ex Spinali medulla 28. nervorum coniugia scaturiunt. *ib.*
- Spina sedes & origo reliquorum ossium statuitur ab *Aristotele*. 419. & 487
- ex pluribus ossibus oculoalatis coagmentatur. 467
- Spina, vide *Lien*.
- Spondyli colli, quomodo inter se articulantur. 489
- Sternomanteis dicuntur, qui ex Thoece loquantur, ore clauso. 204
- quomodo fiat istud. 227
- Sternum vnde sic dictum. 300
- quod sunt ossa in sternum. *ib.*
- eius figura, & cartilago dicta xiphoides. *ibidem.*
- quomodo eius ossa inter se iungantur. 303
- Sternurnatio, quare sacra habeatur. 252
- Strumosa mamma, strumosa testes, iocus, melenarium & pancreas, tota strumosa. 365
- Strupor cruris in calculosis vnde. 769
- Succenturiati musculi semper repetiuntur, atque rarissimè ambo deficiunt. 649
- Sudorem, quomodo tenellis Embryo emittat in vtero, quem homines nonnulli violento motu profundunt. 388
- Sudor est excrementum tertie coctionis, vnde cumque effundatur. *ibid.*
- Superciliorum structura. 27
- Superciliorum eminentia quem vñum habet. *ibidem.*
- in Supercillis duæ extremitates. *ibid.*
- Superciliorum pili vñ nobiscum nascuntur, si cutis, vñ qui in palpebris sunt. *ibid.*
- eos non radunt *Aegyptii* sacerdotes. *ibidem.*
- Surdastri vñdenam vox rauca reddunt. 364
- Surdi natura, quare sunt surdi. *ib.*
- Surdi, vñde sunt auhelosi? *ib.*
- Surdi, quare minus quam cæci docti euadunt. 281
- ex Sorditate gravior accedit corpori dectumorum, quam ex cæcitate. *ib.*
- Surditatem perfectam temporis progressu paulatim. *ibidem.*

- larim angelicus inducit grauis auditus.  
*ibidem.*
- Suidi à naturae & moti, artificio admirabili edocentur ad loquendum & intelligendum aliorum conceptiones voce prolatae. 195
- Suiditatis naturae causa ab ortu. 735
- Suspensii quidam, quare non potuerunt strangulati, ratio ex *Cardano.* 61
- Sutura quid 455. triplex suturae differentia. *ibidem.*
- Sutura cranij quid, & eius differentiae. 464
- de Suiuius etiam preclara multa. 465
- an essent aliqua capita, sine sutura. 466
- an ea sint labiora. *ib.*
- interdum hiant in vehementissimis doloribus capitis. 467
- Iacobus Struuius, Medicus Parisiensis, artis Anatomiae, & dissectionis author illustrissimus.* 63
- Haggen Anatomiam elegantissimam edidit.* *ibidem.*
- Sylvius* Anatomem expoliuit *Marsseus.* *ibidem.*
- Sylvius, Medicus Parisiensis Herophilam assimilatus.* 64
- Sylvius* praeceptis instructus & informatus *Vesalius*, in *Aesclepias Italia* artem Anatomiam ipsam & introduxit. *ib.*
- Sylvius, Præfector Regij Parisiæ, Petrum Ramum* penè occidit, dum vini meracioris potu, oculis supra modum rumentibus & sanguine refertis mederi voluit, sine venæ sectione præmissa. 587
- Sympa* huiusmodi & intestinorum miranda, per quas vias perficiantur, vnde sequitur succedat arthritici doloris & colici. 657
- Sympathia* tenui cum ventriculo videntur pendere. 661
- Symphysis* articulo opponitur, & definitur naturalis ossium vni. 457
- Symphysis* nomen est ambiguum. *ib.*
- Symphysis*, aut cum iunctura aut absque medio. 458
- Symphyses* cum medio triplex differentia. *ibidem.*
- Synarthrosis* tres sunt differentiae. 451
- eius speciem recensentur. 452
- Synarthrosis* species peculiatae sunt tres, sutura, gomphosis & harmonia. 455
- T.
- T** *Arari* dicuntur omnes habere vitidae oculos. 170
- Templum *Salomonis* ad exemplar humani corporis conditum. 4
- Temporalis musculus, siue eropathiae descriptio. 511
- ex Tempore vulnere orta cecitas. *ibidem.*
- Temporalis musculus, si lesa inferiore maxilla distendatur, aut loco moueatur, torporem ac delirium excitat. *ibidem.*
- Temporalis musculi tanta est dignitas, vt ex eo laeso & vulnerato multa succedant symptomata pernicioosa. *ib.*
- eius vulnera sunt lethalia, vomitum & conuulsionem facientia. *ib.*
- Temporalia ossa describuntur. 466
- dix sunt in illis cauitates. *ibidem.*
- Temporalis musculi plagae sunt lethales. 476
- Tendo est pars similis à primo ortu producta, & pars princeps in musculo. 199
- Tendo non resultat ex ligamento & nervo simul mixtis. 300
- Tendinis definitio & natura explicatur. 301
- Terrae quoddam quasi fundamentum est magni mundi. 437
- Testes intra cauum abdominis ad pubertatem vsque latuerunt. 152
- Testis in inguine latens, specie herniae Medicos & Chirurpos fefellit. 153
- Testes sunt glandulosa corpora, ac veluti spongiosa, semini consensio destinata. 159
- Testes mole & magnitudine, vtplurimum inaequales. 160
- Testis sinister est natura frigidiore. *ibidem.*
- Testes extra septum Peritonaei, & cauum abdominis, quare fuerunt eiectioni. *ibidem.*
- Testes sic dicti, quod testentur virilitatem. *ibidem.*
- Testium cum pectore consensus mirabilis. *ibidem.*
- quomodo fiat iste consensus, tam in viris, quam in mulieribus. 160
- Testiculorum, quot sunt tunicae. 161
- Testiculorum actio & vsus. *ibidem.*
- Testes an dent formam semini. *ib.*
- in Testibus semen conoqui docet *Aristoteles.* *ibidem.*
- Testes per se stare non possunt absque calore influente à Corde. *ibidem.*
- Testes an sine absolute necessarii ad generationem. 162
- Testes etiam habent vsum pondere suo. *ibidem.*
- Testes sunt fecundi, & ad seminis generationem conditi, ex *Hippocrate.* *ibidem.*
- Testes quomodo consentiant ad elaborationem seminis. *ib.*
- Testes nulla cauitate sunt praediti. *ibidem.*
- in Testibus sanis ac integris virorum, semen nullum aut exiguum seruatur: in testibus mulierum abundantius reperitur, quamvis ferolum. *ibidem.*
- Testiculorum tres tunicae propriæ. 166
- Testiculi muliebres descriptio. 179
- eius textura & vsus. *ib.*
- Testiculi muliebres in hydropem insidunt, & aliquot eius exempla recensentur. *ib.*
- Testiculus muliebri nullo cremasteri musculo suspenditur. *ib.*
- Testes mulierum carent epididymide. 181
- Testium musculi cremasteres describuntur. 317
- Testium cum Corde consensus, vnde? 772
- Thalami neruorum opticorum *Galenus*, quinam sint. 717
- Thalesis* responsum interroganti *Persandro*, vnde putaret *Athenas*, tam frequenter extorri monstra, & quamnam attē eorum generationem impedit posse existimare. 333
- Theatrum superbum in Templo *Aesculapij* constructum à *Polycleto.* 65
- ad Theatri Anatomici constructionem qua requiratur. *ib.*
- Theatri locus, figura & materia. *ib.*

Thesis Medica de sanguinis circulatione, *Parisius* agitata, præfide *Domino Joanne Ri-  
lano*, anno 1644. pag. 541  
adversus eam Thesim objectiones adferuntur  
quammuliz. *ibid.* vsq. ad pag. 552  
inque saturis, & responderetur à *Domino Ri-  
lano*. *ibid.*  
Thoracis dimisio. 105  
quid sub eo nomine comprehendatur. *ib.*  
Thoracis figura, quare orbicularis. *ib.*  
eius structura, magnitudo & situs. *ib.*  
eius amplitudo & visus. 106  
Thoracis partes communes & propriæ. *ib.*  
*idem*.  
Thoracis vasa triplex, quomodo investigan-  
da? 110  
\*Thorax ob respirationis necessitatem perpetuo  
moietur. 112  
in Thorace oerui octo insignes veniunt obser-  
vandi. 117  
Thoracis muscoli, tam proprii, quàm commu-  
nes. 121  
Thorax duplici motu cietur, inspiratione & ex-  
piratione. *ibid.*  
Thorax unde sic dicatur. 128  
Thorax quid sit. *ibid.*  
in Thorace fabricando Naturæ scopi. *ibid.*  
eius figura & structura. *ib.*  
quare non totus ossileus. *ib.*  
Thoracis nomen est homonymum. 129  
Thoracis tria ossa constituiuntur, scilicet, collæ  
& dorsi vertebrae. *ib.*  
Thymus glandula, quare sic dicta. 131  
eius visus. *ib.*  
in mulieribus mollis & crassior esse solet.  
*ibidem*.  
super ea præceptum therapeuticum. *ib.*  
Tibia vix apte cubitus, duobus collat. 136  
eius connexio & figura. *ib.*  
in illius articulatione cum femore partes an-  
teriores & posteriores sunt observandæ. 137  
Tibiæ muscoli describuntur. 138  
Tonicus motus, quis est. 139  
Tonsillæ & solles sunt glandulæ faucium.  
"290"  
Tonsillarum visus. *ib.*  
Tonsura capitis frequens accendo visui maxi-  
mè confert. 144  
Tondenti ad eum in diuturno pueritæ euriâ  
consultat. *ellius*. *ib.*  
quare Tonsurâ cohibetur impetus in Vene-  
recti? 155  
Tonsura capillorum in *Avfalone* semel in an-  
no exoritur, ducentos scelos ponderabat,  
id est libras *Romanas* duodecim cum dimi-  
diis. 157  
Torpedo manum piscatoris insuperciat, trans-  
missa facilitate per rete, & tridentem pi-  
scatoris, ut magnes trahit ferrum, ut Sol  
momento totum hæmiphærium collustrat.  
159  
Tribades quænam dicantur 169  
Tuba vteri candidum sensen aliquando coori-  
net. 179  
Tubæ vteri, quæ visus, ex *Fallope*. *ib.*  
in Tuba vteri pusillus testis deprehensus. 180  
Tuba vteri eiusdem substantiæ & naturæ vult-  
ur cum vtero, *ib.*

in Tuba vteri Factum contineri probatur exem-  
plo singulari. *ib.*  
Tuba vteri, & Testes penduli possunt in hyle-  
ricis prefocationibus agitari. 184  
Tuba vteri *Fallope* & *Ruffi* Epistole innotuit  
669  
Tuberculum adnatum circa Cor, obstruens al-  
terutram pulmonum viam. 181  
*Tulpy, Hollandi*, Medici eruditissimi testimo-  
nium de Cluonia. 186  
Turpia multa sunt re, quæ dicuntur non ob-  
scenæ. 184  
Tympanum aëris, si à prima conformatione  
crassius & densius producatur, surditatem  
profert incurabilem. 721

## V.

VAcuationes quæ ad extremum dedu-  
cunt, sunt periculose. 602  
Vaginis Veneri aliquot exempla recensentur.  
393  
Vagus infans in Vetro coacti res esse ob-  
scura & incerta. 199  
*Valentinus* in crimen læsæ maiestatis incidit,  
quod Regis *Caroli IX.* partes genitales in-  
honestè tetigisset. 156  
*Valens*, Medicus & Professor *Leidenfis*, doctis-  
simus, æterna laude & commendatione di-  
gnus est cum *Harnes*, pro iis quæ scriptis do-  
ctrinatione sanguinis. 605  
*Valis* opinio de Lienis visu noua est & elegans,  
si probatur. 769  
*Valis* opinio de motu diaphragmatis, est ridi-  
cula. 777  
*Valens*, *Leidenfis* Professor, sanguinis circula-  
tionem ab *Harnes* inuencam, nouis expe-  
rimentis & rationibus roborauit. 554  
*Valis* op. nio examinatur de sanguinis circula-  
tione. 565  
*Valis* sapiens & laudabile consilium de mit-  
tendo sanguine in principio morborum.  
586  
*Valerius* nihil vidit in Anatomicis. 31  
erat hippos & lasciuus. *ibid.*  
Valuola Coli intestini primùm detecta à *Ua-  
rpi. Salomone Alberto* & *Arch. Piccolomine*. 105  
Valuolæ in medio canalibus hepatici nullæ sunt.  
186  
Valuolæ membranose nullæ sunt in extremita-  
tibus ductus cholidoci. 129  
Valuola in venis conuergentibus observata à  
*Speile*. 141  
Valuola intra Venteram, supra carunculam,  
extremitates vasorum ejaculantium cla-  
dentem circumfensa, ad orificium colli Ve-  
licæ, quæ femoralis humoris refluxum in  
veticam prohibet. 150  
Valuolæ in Vena Azygo, an sint aliquæ?  
211  
multi ex Anatomicis eas dari negant. *ib.*  
*idem*.  
*Rulmann* admittit & agnoscit. 122  
eorum Valuolarum situs & visus. *ib.*  
Valuola ærgia in Aortæ orificio posita.  
215  
Valuolæ quatuor Vasorum Cordis explican-  
tur. 238

enomerantur & diffinguntur. *ibid.*  
 Valvulae eiusmodi intueri non datur, nisi re-  
 secto Corde. *ib.*  
 Valvulae venarum, quid sint. 345  
 Valvularum usus multiplex. *ib.*  
 Valvularum quae sunt in venis colli Cerebrum  
 subcunctibus magnus usus. 346  
 de Valvulis & usulolis venarum libellum com-  
 posuit *Fabrie* ut ab *Aquapendente*. *ib.*  
 Valvulae venarum pectus inuenit & demon-  
 stravit *P. Panini*, & *Monachus Serrus*, &  
*metri*.  
 alis quoque etiam veteribus nota fuerunt,  
 & exploratae. *ibid.*  
 Valvulae venarum eleganter describit *Jacobus*  
*Sylvius*, *Medicus Parisiensis*. *ib.*  
 Valvulae corporis totius enumerantur. *ib.*  
 Valvulis, quare carcat arteriae. 347  
 Valvulae non in solo homine observantur, sed  
 etiam in venis aliorum animalium quadru-  
 pedum, circa divisionem muscularium venarum,  
 &c. *ib.*  
 Valvulae Cordis convenienti modo inter se  
 iunguntur & coniuvent, ex *Aueri*. 371  
 quod est saluim. *ib.*  
 Valvulae in Colo inest; non est in quor-  
*Bambus*. 692  
 Valvulae in potu bilario cystico non repertun-  
 tur. 699  
 Valvulae vasorum Cordis cedentibus, sanguis  
 in pulmonibus redundans, in Cor, vi teni-  
 gatur, fuga vacui, duabus vel tribus phlebo-  
 tomis depleta vena Cava. 238  
 Valvulae nullae sunt in arteriis. 387  
 Valvulae sanguinem ad exitum remeantem  
 coherere scripsit *Fegulus*, sed refellitur à  
*Kislano*. 819  
 Varietibus sanguis non reucllitur, imò magis  
 effluit per venas. 611  
 Variolis, annulus tenetur queri, quibus in-  
 per natis, priusquam secedat, & multum  
 multus sanguis & copiosus finitur effluere.  
 380  
 in Variolis & morbillis, aliisque excretionibus  
 cutaneis, quomodo sit mixtus sanguis  
 550  
 quare & io quo casu libenter est mixtus.  
*ibid.*  
 Variolarum à morbillis differentià ratione ma-  
 teriae & diversis locis erumpentis. *ib.*  
 Variolis, qualis Anatomica. 31  
 Vas breue, unde oritur. 114  
 eius usus. *ib.*  
 sanguinem multum effundit, à Lienē in suo-  
 dum Ventriculi. *ib.*  
 aliquot exempla recensentur. *ibid.*  
 praeferim in hypocondriacis. 115  
 Vasis brevis cum diaphragmatica sinistra com-  
 muno, quid praestet. *ibid.*  
 Vas breue, quomodo videri possit. *ib.*  
 Vasa spermatica multum recensentur. 178  
 Vasa vmbilicalia non sunt propagines vasorum  
 maternorum, ne quidem tuerentur cum vasis  
 maternis eiusdem generis, nisi ante forma-  
 tionem placentiae. 395  
 Vasa vmbilicalia, & vasa Cordis crescentes Fur-  
 cu extenduntur & crassescunt, atque dice-  
 dunt à Corde, &c. 399

Vasorum vniuersum corpus perseptantium enu-  
 meratio. 341  
 Vena Vmbilicalis est propago venae Portae, quae  
 ad Vteri partes deducitur, vix fugat sangui-  
 nem ad nutritionem & formationem viscerum.  
 691  
 Venae paucissimae in toto corpore reperiuntur,  
 quae non habeant comitem arteriam. 115  
 Vena Cava, unde sic dicitur. 141  
 eius descriptio vulgaris. *ibidem*. & 142  
 Venas lacteas ab *Asthis* tentatas detegendi  
 modus. 416  
 Venae lacteae *Asthis* si admittantur, corrumpit il-  
 la saniope celebrata anastomosis radicum  
 venarum l'orta cum radicibus venarum Cavae tota  
 Hepat. 417  
 Venae Cavae ascensus ad Thoracem. 220  
 Venae sectio semper est celebranda è directo la-  
 teris affectu, in omni pleuride, ex *Hippocrate*  
 & *Galeno* confilio. 221  
 Vena basilica potissimum est secanda, quare  
*ibidem*.  
 Venae Cavae truncus ascendens, cum ad Cla-  
 ues peruenit, in duos ramos subclauos scin-  
 ditur. 222  
 Venae Mammariae interos descriptio. 323  
 Venae insignes à subclauo ramo prodeuntes.  
*ibidem*.  
 Venae omnes brachij, quae hodie secantur, cum  
 ab eodem trunco, nimirum à axillari prodeant,  
 frustra laboratur in earum electione. 327  
 Venarum huius curiosum defectum neglexit  
*Galenus*. *ib.*  
 e contra videtur habuisse *Hippocratem*. 342  
 quae vena in quibusdam affectibus secanda.  
*ibidem*.  
 Venae an fibras habeant: & si habent, quo sine  
*ibidem*.  
 Venae atraheodi virtute carnes ipsas præce-  
 dunt. 343  
 Venae cum exaruerint, capiunt ad se biliosa  
 & acres ichores: hinc veniunt cauli & febre  
 malignae. *ib.*  
 Venae capitis, ubi calefactae fuerint, pirritam in  
 se ipsas attrahunt, ex *Hippocrate*. *ib.*  
 Venae sunt corporis nostri spacula, cum aë-  
 rem ad se trahant, & in reliquum corpus de-  
 ducant. *ibid.*  
 Venae artuum inferiorum describuntur. 344  
 Venae cruralis diuisio. 345  
 Venae supra malleolum posita non possunt secu-  
 ri secari, nisi ruerant. *ibid.*  
 Venae popliteae sectio veteribus vitata, cur ho-  
 die exoleuerit. 345  
 Venae malleolares aliquid faciant ad libidi-  
 nis pruriginem. *ibid.*  
 Venis malleolaribus sectis iocundum homi-  
 nem reddi scripsit *Hippocrates*. *ib.*  
 Venarum valvulae. Vide *Valvula*.  
 Venae magis trahunt, quam carnes, & cum ca-  
 lefactae fuerint, & exanatae, magis attra-  
 hant. 556  
 Venae lectio medetur flatulentiae. 582  
 Venae lacteae chyli ferre *Asthis*, quomodo ad-  
 mittantur à *Kislano*. 578  
 Venae sunt spacula nostri corporis. 348  
 per Venas d' statur sanguis, & refrigeratur.  
 385

- Vena sectio. Vide *Sanguinis missio*.
- Venæ sectionem vocavit *Hippocrates*, *principals remedium*, à quo sit inchoandum, & in curatione morborum purgationi præmittere iubet. 587
- Vena cephalica & saphena sepe non æquè refrigerant quàm basilica, poplitea, ischiadica, & alæ, quare. 597
- Venarum & arteriarum anastomoses sunt in eturibus ab inguine vsque ad pedes. 598
- Venæ infensiles esse non possunt, vt falsè putat *Bambinus*. 691
- Venenatus est hominis morsus aliis animantibus, vt nullum sit venenum, quod non in homine reperiat. 484
- Venter vnde dictus. 75
- quomodo considerandus eius figura. ib.
- diuisio. ib.
- Ventris centrum est umbilicus. ib.
- tres eius regiones. ib.
- Ventris partes sublimis & profundæ, quænam. ibidem.
- Ventris inferioris partium omnium securata diuisio in continentes & contentas. 76
- Venter, quare abscessibus est obnoxius. ib.
- Ventris inferioris administratio Anatomica, quomodo perficienda. 77
- Ventriculus humanus canino persimilis est. 103
- Ventriculus languidus ex alio pigra, & stercoris recto factore. 106
- Ventriculus quid est. 116
- vnde dictus. ibid.
- inter partes nutritias principatum obtinet. ibidem.
- ex Ventriculo reliquarum partium sanitas dependit. ib.
- rex est totius corporis. ib.
- laudatur à *Sereno Samonico*, deprimunt à *Plinio*. ib.
- eius actio ad vitam necessaria. ib.
- eius magnitudo, ex *Hippocrate*, quomodo intelligenda. ib.
- Ventriculus corporis magnitudinem sequitur. ibidem.
- eius magnitudo qui dignoscatur. 117
- Ventriculus animalium multiplex. ib.
- eius situs in abdomine, duplici de causa. ibid.
- inter Iecur & Lienem mediis consistit, instar leberis inter duos focos. ib.
- Ventriculus ingressum habet & egressum. ibidem.
- Ventriculi pars superior abscessus interdum patitur incurabiles. ibid.
- Ventriculi pars inferior, *Pileus* dicitur. ib.
- Ventriculi substantia, quænam. 118
- Ventriculi atunæ diuturnæ, quænam causa. ibidem.
- Ventriculus interdum luxatus & resolutus, infra vmbilicum descendit. ibid.
- in Ventriculum venæ multæ, quomodo insistantur. ib.
- eius figura rotunda. 119
- imò diuersa. ib.
- quomodo differat à Ventriculo brutorum Ventriculus humanus. ib.
- eius cum Cere sympathia. 119
- Ventriculi Alcymista quænam, ex *Paracelsi*. ibidem.
- Ventriculorum Cerebri amplitudo veteribus Anatomicis ignota. 128
- de atris ingressu in Ventriculos Cerebri, vt miscetur spiritui vitali, & ab utroque constitut animalis, dubitat *Kulanius*. 129
- Ventriculi 3. & 4. deferuntur. ibidem.
- & 160
- Ventriculus quartus Cerebri omnium nobilissimus, ex *Laurentio*, contra *Spigelium*. 160
- Ventriculorum Cerebri numerus. ib.
- Ventriculus quartus cisterna spirituum animæ. ib.
- Ventriculorum Cerebri vsus inter Anatomicos controversus. ib.
- an Ventriculi sint excrementorum Cerebri conceptacula. ib.
- Ventriculi quarti summa præstantia ad vitam conseruationem. 161
- ab eo obstructio detrepente sanus homo extinguitur, atque si floccatur. ibid.
- in præcipuo isto casu cum festinatione rapienda sunt præsidia. ib.
- aduersus eam obstructionem remedium. ibidem.
- Ventriculus defectu alimentari in Fœtu non potest chylicare, quamuis prædicti muli sit rostratus. 166
- Ventriculi spirituum pleni sunt, qui vndique excutunt, & præsertim in spinalem medullam, ac nervos inde deductos. 166
- Ventriculus Cerebri quartus debet esse siccus, omnis humoris expertus, eum sit præcipuissimus, maiorem visum, & facultatis. 173
- si in hunc quartum Ventriculum in viuentibus magnâ copâ humor infuset, subitæ mortis inuitabilis causa esse potest. ibidem.
- Ventriculus quartus Cerebri excrementis non abundat: quæ si ibi colligerentur, subitanæque mortem inferrent. 174
- Ventriculorum Cerebri optima diuisio. 178
- Ventriculi non sunt conceptacula excrementorum. 184
- Veritas est unica de eadem materia, atque de iisdem rebus eadem sunt dicenda. 306
- Vertebra vnius luxatio periculosior est, quàm plurium. 488
- Vertebrae multas condidit Natura ad securitatem, earumque numerus. ibid.
- Vertebrae non accensent Os Sacrum *Hippocrates* & *Galenus*, quia vnicum & continuum est, vertebraeque planè dissimile. ib.
- Vertebrae series in quatuor partes distribuitur. 488
- Vertebrae foramina inæqualia. ib.
- in singulis Vertebrae tres apophyseon differentur debent obseruari. ib.
- Vertebrae inter se colligatio & articulation. ibidem.
- Vertebra magna quædam est. 489
- Vesalius Lupinus* primū didicit Anatomicen. 70
- Medicus Parisiensis* vocat suos præceptores. ibid.

- tearum *Galem* corruptis, ut haberet, quod repellendecet. *ibidem.*
- Vesiculus* an hominibus visus secuerit? 43
- Vesiculus*, quare profectus in *Iudeam* & *Palistinam*. *ib.*
- Vesiculus* solus ex *Anatomicis* recentioribus, *Anatomicum* *ex* *ex* diligenter persequutus est. 47
- Vesiculus* & *Follipus*, in medio flore iuventutis & visus excepti sunt: an quia *Anatomici*? *ibidem.*
- Vesiculus* *Sylus* præceptis instructus & informat, in *Academias* *Italiae* ætem *Anatomicam* sparsit & introducit. 64
- Vesiculus* *Alacris* *Parisienses* suos præceptores agnoscit, & *Sylus* discipulum se proficitur. *ibidem.*
- Vesiculus* fecundus erat artifex, si non arrogantibus & insolentibus fuisset visus artis gloriæ. *ibidem.*
- Vesiculus* inter Recentiores, consert Lienem, instat alterius *Hepatis* opulenti ad sanguinis confectionem. 133
- Vesiculus* solitur, dum patet in omni pleuritide basilicam deatram semper esse secundam. 211
- Vesiculus* discipulus suos *Anatomicos* est explicatus ca. *Vesiculus* *Galem* fontibus. 434
- Vesicæ* præca conformatio rara est. 150
- Vesicæ* aliquando duplex inuenta est. *ib.*
- Vesicæ* corpus & collum seotum possunt affici. 151
- à *Vesicæ* paralyti urina supprimitur. *ib.*
- ex *Vesicæ* resolutione ischuria lethalis. *ib.*
- Vesicæ* oniscus aliquando callosus est. *ib.*
- Vesicam* exatit claudens muscularis sphincter delevit. 328
- Vesicæ* sphincter in muliere catenatus. *ibid.*
- Vesicæ* sacculi *humani* *physicissimi* serie vocatur ab *Archiepiscopo*. 128
- Vesica* non omnibus animalibus data est. *ibidem.*
- Vesica* humana ex *Aristotele*, est admodum magna. *ib.*
- Vesica* unde sic dicta. *ibid.*
- Vesicæ* alihortatio ad incrementum. 149
- Vesica* diffusa in vineis visus ex copia urinae, ischuria, sine omnimodam urinae suppressionem adfert, quia non potest sese satis contrahere ad excernendam urinam. *ibidem.*
- Vesicæ* quænam sit substantia. *ibidem.* & 110
- Vesica* hominis testatur sitque differt à vesica brutorum. *ib.*
- Vesica* proprium, ac separatam ventrem constituit. *ib.*
- Vesicæ* dislocatio, an sit possibilis? *ib.*
- Vesicæ* scissio, siue *Cystostoma*, in imo hypogastri pericli potest ad extrahendum calculum. *ibidem.*
- Vesica* hominis extrinsecus adipe multo est circumfusa. *ib.*
- Vesica* hominis interdum intus saccum habet, siue foveam, in qua sæpe grandiores lapides nidulantur & latent, qui immisso cathetere detragi, ac deprehendi non possunt. 150
- Vesicæ* ceruæ, quia catuæ est, incisa & val-
- nerata coalescit, non autem vesicæ corpus. 110
- Vesicam esse frigidissimam scripsit *Hippocrates*, cuiusque delectari. *ib.*
- in *Vesicæ* affectibus, cur veteris accidit. *ibidem.*
- de *Vesicæ* dignitate memorabilis sententia *Aristoteli*. *ib.*
- Vesicæ* magnus est cum rebus confusus. *ibidem.*
- Vesicæ* selle & sicut & figura. 124
- duplex eius canal. *ib.*
- quare fuit condita. 125
- eius vacuitatem diuturnioris vitæ causam veteres dixerunt. *ibid.*
- Vesicula* felica, quare fuit supposita & immensa reoti. 125
- eam habet bile plenam *Fœtus* adhuc videri conclusus. *ib.*
- mea calculi frequentet generantur, leues, & qui aquæ immersi innatant, ea bile coëctæ & concreta. *ib.*
- eiusmodi folliculo, siue vesicula, pleraque continent animalia. *ib.*
- eius diffusio in collum & fundum. *ib.*
- duplicem habet meatum bilari. *ib.*
- Vesicula* ooo omnibus animalibus data est. 127
- triplicem interdum habet canalem hepaticum. 128
- quænam illi sunt. *ib.*
- Vesicula* terrum quendam meatum in ventriculo inferi pertranseat iocundat *Galenum*. *ibidem.*
- Vesicularum* seminalium author perhibetur *Herophilus*. 163
- quos sunt, & ubi nam posita. 164
- eorum usus. *ibid.*
- in *Vesiculis* & prostaticis sedes est gonorrhæe virulentæ.
- Vesicularum* siue topica remedia debent ad-moueri ad sistendam gonorrhæam. *ib.*
- de *Vesiculis* io genitura, quid obseruauerit *Rulandus*. 384
- Vesicula* felica in cholera morbo, & dysenterici post obitum, nullo modo suo selle priuata & exhausta cernitur. 749
- Verba sunt rerum noia. 68
- Verborum vim qui ignorant, facili decipiuntur. *ibid.*
- Vermisio canibus rabiei causa, quo nullo canis io rabiem noo aguntur. 128
- Vettebræ, unde sic appellatæ. 487
- Vettebræ colli secunda, quare *Dens* vocatur ab *Hippocrate*. 490
- Vettebræ duæ primæ colli liberè mouentur. *ibidem.*
- Vettebrarum cavitates sunt inæquales. 491
- Vettebræ colli sunt septem. *ib.*
- quid in his peculiare notandum. *ib.*
- prima Colli vertebra omni spinæ caret. 493
- Vettebræ dorsales, quomodo diffiant à vertebra colli. 493
- naturalis earum numerus est duodenarius. 494
- Vettebrarum dorsales numerus costarum numero respondet. *ib.*
- Veteres post quartum diem in acutis morbus



- non amplius fecabant veuam, ex *Galen.*  
387
- Vino vendibili non est opus suspensa hedera.  
412
- Vir quomodo iudicatur ineptus ad generatio-  
nem. 183
- Virg virilis multa nomina recensentur. 118
- Virginem posse concipere quinque modis. sine  
lesione virginitatis, ridicule putatur *Bar-  
tholini.* 775
- Virginitas quibus notis integra & intererata  
dignosci queat. 191
- Virginitatem explorandi variz artes, & variz  
modi recensentur. 16
- Virginitatis explorande experimenta ridicula  
apud *Hebraeos & Persas.* 193
- Virginitatis signa incerta & fallacia. 16
- Virginitatis signa in suspensa mulieribus non  
sunt perquirenda 195
- Virgines olim oecas erat *Roma* strangulari.  
*ibidem.*
- Virgines *Nepolitane* aeris malignitatem ex-  
perimentur detrimento virginitatis. 16
- Virgines quandoam debent diligenter custo-  
diri 16
- Viri seminis corrupti vaporibus, non ira crude-  
litate infestantur, vt mulieres, quare ?  
772
- Virgatus*, peritissimus Anatomica *Patanius.*  
inueni canalem per quem fit tractus & tra-  
ductus o chylis ad Liecem, per medium Pan-  
creas. 572
- Viscera dicta, quasi vesica, quia iis optime nu-  
tritur. 321
- Viscera quanam essent, quibus uterentur ar-  
spices. 16
- Viscerum numerus. 16
- Viscerum usus multiplex. 16
- Viscera ad transmutandas vasorum, quare sunt  
posita 16
- Vitalis facultas nil est aliud quam actio Cor-  
dis, ad spiritus vitalis generationem. 390
- Vitalis facultatem Forti probatur. 16
- Vita duplex, essentialis & accidentalis. 16
- Vita Fortis absoluta non pendet à matre, &  
tres principales partes in Fetro certo quodam  
tempore suas facultates obeunt. 395
- Vitri humoris sitis, usus, consistencia, &  
quantitas. 879
- Vitæus humor & aqueus sunt eaccrementi,  
ideoque possunt augeri & immui. 16
- Vitæus humor aqueo nonnihil densior est.  
*ibidem.*
- Vitæus edito eleganti libello, Lienis actionem  
proferit omni- us veteribus inditam, quam  
tueret & mordicus retinet. 133
- Vitæus opinio de Liece nouis rationibus roba-  
tatur à *Rolano.* 134
- Vmbilicus, ventris centrum, & radia. 76
- Vmbilicium vasorum utilitas & necessitas.  
94
- Vmbilicus est quasi cæcæ & viocolum, quo  
venter est concatenatus. *ibid.*
- Vmbilicalis vena in homine solitaria, in brutis  
gemmata, nouumquam hat, & recluditur  
in hydropicis 16
- in Vmbilico tumor excitatus ex sanguine.  
*ibidem.*
- Vmbilici graues sunt affectus, ex viscerum mi-  
ttiturum subita affectione. 16
- Vmbilico frigida si affundatur, nultum grauius  
eacognari potest supplicium. 16
- Vmbilicus uodofus est coitus vasorum vmbili-  
calium. 16
- in Vmbilico centrum corporis *Galenus*, & ve-  
teres Medici collocantur. 16
- Vmbilico subiecta pars inferior, si in superiore  
longitudine ceciderit, illas morborum in Ven-  
tre inferiore eritatur, propter cruditates  
ibi congestas. 16
- Vmbilicalis vasa ex semine produciuntur, quia  
orto & generatione sunt prima, & ab iis ve-  
na & arteria corporis propagantur 378
- crusmodi vasa continua non tant effecta.  
*ibidem.*
- Vmbilicales arteria: cur ad Cor fontem vitali-  
tatis, vel ad truncum Aortæ non perue-  
niunt. 177
- Vmbilicalia vasa in lucem edito Forti sensim  
exatiscunt, & in ligamenta degenerant.  
*ibidem.*
- Vmbilicalium arteriarum diuisio. 16
- Vmbilici ductura ex vena, arteria gemina, &  
Vrachio. 16
- Vmbilici longitudo admirabilis in Fetro.  
379
- Vmbilicus contortus. vel nodo contractus in  
Fetro, atrophie vel mortis causa esse solet,  
propter coarctatum alimenti interitum.  
*ibidem.*
- Vmbilici longitudo, quas habeat utilitates.  
*ibidem.*
- Vmbilicus quibaldam nodis ad robur est di-  
stinctus. 16
- Vmbilici ductus, & reuolutio *Forni* caput fir-  
mat & continet, ne ante perficendam maturi-  
tatem suo pondere deorsum decumbat.  
*ibidem.*
- Vmbilicus, quomodo religandos. 16
- Vmbilicus priusquam recludatur, an sit san-  
guis intro repellendus, vel potius sinendus  
copiose effluere ad præcauendas variolas.  
330
- Vmbilicus præcisus, an valeat aduersus colicos  
dolores. 16
- Vnguia soli homini conuenit, vngula animalibus.  
359
- Vnguis, vnde dictus Latinis. 16
- Vngutum generatio, vnde repetenda. 16
- in Vngutum doloribus, vnde tenius accutissimus.  
*ibidem.*
- Vnguitus, quare douæ fuerunt manus ho-  
minis. 360
- de Vnguium generatione incertus *Galenus.*  
*ibidem.*
- Vnguis definitio. 16
- Vnguia dux partes. 16
- Vngutum inter te differentia multiplices.  
*ibidem.*
- Vnguis diuiditur in tres partes à Chironauris.  
*ibid.*
- ex Vnguibus diuinario nihil habet certi.  
61
- ea iis cetiores sunt prædictiones Medico-  
rum, ratione constitutionis naturalis, & con-  
tra naturam. 16

- ex Vagribus vitalitatem Fortis cognosci pro-  
didit *Hippocrates*. *ib.*  
de Vagribus telecaodis præcepta. *ib.*  
Vngutum vñs multiplex. *ibid.*  
ea Vnguibz saluta & mortis indicia petit  
*Hippocrates*. *ib.*  
Vngues rabidorum & suppuratorum sunt ad-  
unci: hydropicorum verò contradi eua-  
dunt. *ib.*  
*Falcherus* Center iuuenis obiit in *Gallia*. 31  
Volæ manuz mulculi describuntur. 318  
Voluntas duplex, ex *Scaligero*, vna cum ele-  
ctione, vt in homine sapiente: alia ab in-  
stinctu, vt infanti recens nato ad sugendum  
lac. 302  
Voluntas libera est, cogi non potest, alioquin  
homo non esset sui iuris. 340  
Volulus si quando insignis phlegmone, &  
gangranosis est in aliqua parte ilei. 810  
Vomeris os notum *Hippocrati*, & à *Fernelio* ex-  
pressum. 479  
Vomica pulmohum per quam viam potest ex-  
purgari, ea lententia *Cotes & Ad ang.* inter-  
pretum *Ancinæ*. 220  
Voracitas & ingluuius parens est, & nutrix in-  
finitorum malorum. 378  
Vox à Corde neutiquam proficitur. 415  
Vrachus in Vmblico, quare vñcus. 378  
eius vñs, origo & magnitudo. *ib.*  
in brutis perforatus, & abdomine egres-  
sus in duas vesicas oblongas capanditur, quæ  
Allancoidem tunicam constituunt. *ib.*  
Vrachus in humano Fetus solidus est, nullo fo-  
ramine peruius. *ib.*  
Vrachi descriptio accurata. 377  
Vreter vnde dictus. 14  
Vreteris substantia *ib.*  
quare vena illa dicatur ab *Aristotele*. *ib.*  
Vreteres quomodo sufficiant à vesica. *ib.*  
Vreteres aliquando gemini apparent. 143  
Vreteres, quare vretibus ignoti fuerit. *ib.*  
Vreterum angustia maximo cum cruciatu dila-  
tatur in descensu calculi. *ib.*  
Vreteres duplicato petitonæo includuntur.  
*ibidem*  
Vrina saccharis corporis humor dicitur à *Lucer-  
tio*. 148  
Vrñs solus suis membris obvolutus nasci-  
tur. 175  
Vrñus Fetus non est caro informis, quæ lam-  
bendo psalium figuratur. *ib.*  
Vrñs partium quid est, & quid differat ab æ-  
ctione. 70  
Vrñs non consistit in possessione, sed in æctio-  
ne. *ibid.*  
Vrñs est opus admiabile, & tanquam ab æ-  
nimali quodam profectum. 177  
de Vretero *Lyrii* opinio. *ibid.*  
Vrñs Testari comparatur, propter confimi-  
les æctiones, quas in generatione hominis  
exerceat. *ib.*  
Vrñi variz denominationes recensentur.  
*ibidem*  
Vrñus, quare dicitur matris, vulvæ & locus.  
178  
Vrñs vnde dictus. *ib.*
- Vteri cornua, quoniam sint. 180  
quoniam eorum vñs. *ib.*  
Vteri connealo cum partibus vicinis. 183  
Vteri quatuor ligamenta, quibus in suis sedes fi-  
stunt, & retinetur. *ib.*  
Vterum, quare *Julia Augusti* filia, navim ap-  
pellabat. *ib.*  
Vetus an possit in præfocationibus hystericiis  
ad Vmbilicum ascendere? 184  
Vteri plurimas æctiones status faciunt.  
*ibidem*  
Vetus non mouetur sua sede, neque deatras in  
hypogastrio. *ib.*  
Vetus per se non mouetur ex *Galeno*, sed domi-  
tiat eius appendices plenitudine distente  
huc & illuc circumferuntur. *ib.*  
Vteri consensus cum Liene per venas hæmor-  
rhoidales. 185  
Vteri vasa quamplurima. *ib.*  
Vterus corporis figura orbicularis est, & ob-  
longa. *ibid.*  
Vteri situs, tam in virginibus, quam in puer-  
peris. 185  
Vteri partes externæ recensentur. *ibidem*. &  
186  
Veternymphæ cristate. *ibid.*  
Vteri ceruix lono non rigatur. 187  
Vteri ceruicis spatium & longitudo. 196  
quid per eam sit intelligendum. *ib.*  
in qua Vteri parte cancer potissimum fiat.  
*ibidem*  
Vetus interdum bipartitus & duplex. 197  
& 198  
Vetus quomodo bipartitus. 199  
Vetus principatum ad vitam non obtinet.  
*ibidem*  
Vetus & prociat, & præciat. *ib.*  
Vteri consensus cum variis partibus corporis.  
*ibidem*  
Vetus partem in muliere totius corporis valde  
imbecilla. *ib.*  
ab Vtero morborum ilias toritur. *ibid.*  
Vetus mater ærumnarum dicitur à *Democrito*.  
*ibidem*  
Vetus prout valet, ita & totum corpus mulie-  
bre. *ib.*  
Vetus est animal serum & venenarum. *ibid.*  
*idem*  
Vteri mulieris grauidæ magnitudo, situs & fi-  
gura. 165  
eiusdem officium, ceruix & vasa. *ib.*  
Vteri mulieris pregnantis suspensæ *Parisijs*,  
descriptio. 166  
in Vtero humano an reperiantur cotyladones.  
167. & 168  
Vteri motus non est voluntarius. 697  
Vua, siue vuula quid. 893  
quare dicitur gargareon, siue gurgulio. *ib.*  
eius substantia quamnam. *ib.*  
& vñs multiplex. *ibid.*  
Vultus vnde dictus. 166  
Vultum distortum sequitur *distortio marum*.  
*ibidem*  
Vxoris futuræ facies consideranda, vt illius  
cum qua viuere debes mores deprehendas:  
præceptum *Nicostri* apud *Silvium*. 166

Z.

**Z**acchus fuit impostor *Iudeus*, qui suis epithematis gemmas, & lapidem bezoaricum addit. 695  
*Zacchus Lusitanus Indanus* imponit & illud it nobis *Christianus*. 762

*Zacchus* est caute legendus. *ibid.*  
*Zoroaster* eodem die quo natus est risit, perfa-  
 gio futurae scientiae. 404  
*Zoroaster* foveanella tantum palpitabat, ut im-  
 positam manum repelleret. 407  
*Zygoma* quale sit os. 476  
 eius structura, & quare *Os Paris* dicitur. *ib.*  
 eius usus. 48.

*Fine Indicis Anthropographia D. Ioannis Riolani.*

